



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



APC
0850

44

Library of the Museum
OF
COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.



Deposited by ALEX. AGASSIZ.

No. 6747
Dec 5, 1891 - Oct 26, 1892

McNAMEE
Rindgen

ARCHIV FÜR NATURGESCHICHTE.

GEGRÜNDET VON A. F. A. WIEGMANN,

FORTGESETZT VON

W. F. ERICHSON, F. H. TROSCHEL
UND E. VON MARTENS.

HERAUSGEGEBEN

VON

Dr. F. HILGENDORF,
CUSTOS DES K. ZOOLOG. MUSEUMS ZU BERLIN.

FÜNFUNDFÜNFZIGSTER JAHRGANG.

II. BAND.

2

Sm Berlin 1889.

NICOLAISCHE VERLAGS-BUCHHANDLUNG
R. STRICKER.

Inhalt des zweiten Bandes.

Erstes Heft.

	Seite
Dr. Ernst Schöff. Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Säugethiere während des Jahres 1888.	
Allgemeines	1
Anatomie und Physiologie	4
Entwicklung	34
Biologie (Land- und Forstwirtschaft)	52
Geographische Verbreitung und Faunen	62
Fossile Säugethiere	67
Systematik	82
Ant. Reichenow. Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel während des Jahres 1888.	
1. Geschichte, Litteratur, Museologie, Taxidermie	102
2. Anatomie, Embryologie	104
3. Hautbedeckung, Pterylographie, Flugvermögen	108
4. Mauser, Abänderungen, Bastarde	110
5. Palaeontologie	111
6. Geographische Verbreitung, Wanderung, Faunistik	111
7. Lebensweise	133
8. Jagd, Schutz, Pflege, Hausgeflügel	137
9. Systematik	143
Dr. Oskar Boettger. Bericht über die Leistungen in der Herpetologie während des Jahres 1888.	
Reptilia. Allgemeines	163
Anatomisches, Ontogenie, Biologie, Palaeontologisches (vergl. auch die einz. syst. Abth.)	166
Faunistisches (desgl.)	179
Systematisches (Lacertilia, Rhiptoglossa, Pythonomorpha, Ophidia, Ornithosauria, Dinosauria, Crocodilia, Chelonia, Sauropterygia, Ichthyopterygia, Rhynchocephalia, Proterosauria, Proganosauria, Theromorpha	192

IV

	Seite
Batrachia. Allgemeines	239
Anatomie, Ontogenie, Biologie und Palaeontologie (vergl. auch die einz. syst. Abth.)	240
Faunistisches (desgl.)	246
Systematisches (Ecaudata, Caudata Stegocephala)	251
Dr. F. Hilgendorf. Bericht über die Leistungen in der Ichthyologie während des Jahres 1887.	
Allgemeines	273
Anatomie und Physiologie	273
Entwicklung (incl. Phylogenie)	300
Biologie	310
Nutzen und Schaden. Fischzucht	312
Faunen	315
Fossile Fische	326
Systematik	328
Dr. Joh. Thiele und Dr. W. Kobelt. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Malakologie während des Jahres 1888.	
I. Bericht über Allg., Physiol., Anat. u. Entwickl. v. Dr. Thiele. Zeitschr., Jahresberichte, Sammelwerke, Lehrbücher und Vermischtes	378
Vermischte Mollusken	380
Amphineura	385
Scaphopoda	387
Cephalopoda	387
Lamellibranchiata	395
Gastropoda	406
II. Ber. über die geogr. Verbreitung, System. und Biologie von Dr. Kobelt.	
Verzeichniss der Publikationen	429
1. Geographische Verbreitung	443
2. Systematik	452
3. Biologie, Verwendung. Zucht etc.	469

Zweites Heft.

Dr. Ph. Bertkau. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im
Gebiete der **Entomologie** während des Jahres 1888.

Allgemeines	1
Arachnoidea	29
Linguatulina	31
Acarina	31
Tardigrada	39
Opiliones	40
Chernetina	41
Pedipalpi	42
Scorpiones	43

	Seite
Araneae	43
Solifugae	57
Myriapoda	57
Peripatina	57
Chilognatha	58
Chilopoda	60
Insecta	62
Thysanura	62
Rhynchota	64
Orthoptera (Genuina, Physopoda u. Pseudoneuroptera)	80
Neuroptera	106
Diptera	107
Lepidoptera	127
Hymenoptera	170
Coleoptera	199

Dr. G. Herbert Fowler. Bericht über die Leistungen in der **Carcinologie** während des Jahres 1887 (Uebersetz. v. Dr. F. Hilgendorf.)

Verzeichniss der Publicationen (mit Besprechung der Anatomie, Physiologie, Entwicklung, Faunistik)	265
Uebersicht nach dem Stoff (zu vorstehendem Verzeichniss) . . .	277
Systematik	279

Drittes Heft.

Prof. Dr. M. Braun. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der **freilebenden Würmer** während des Jahres 1888.

1. Vermes im Allgemeinen	1
2. Ringelwürmer	7
3. Aberrante Formen	37
4. Freilebende Plathelminthes	39
Anhang (Dicyemidae u. Orthonectidae; Trichoplax; Haplodiscus) .	44

Dr. von Linstow. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der **Helminthen** im Jahre 1888.


Allgemeines	46
Nematoden	49
Gordien	72
Acanthocephalen	75
Trematoden	76
Cestoden	84

Dr. W. Michaelsen. Jahresbericht über die **Bryozoën** für 1888.

Anatomie, Physiologie, Biologie	93
Systematik, Faunen	97
Palaeontologie	106

VI

	Seite
Dr. A. Collin. Bericht über die Brachiopodenliteratur des Jahres 1888.	
Litteraturverzeichnis	108
Allgemeines, Anatomie, Biologie	109
Faunistik, Systematik	110
Dr. Maximilian Meissner. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Echinodermen im Jahre 1888.	
Verzeichniss der Publicationen (mit Besprechung der Anatomie, Physiologie, Entwicklung, Faunistik)	111
Uebersicht dazu nach dem Stoff	128
Systematik	129
Dr. E. Vanhöffen. Jahresbericht für 1888 über die Coelenteraten mit Ausschluss der Spongien und Anthozoen.	
Verzeichniss der Publicationen	135
Allgemeines	139
Hydromedusen	143
Hydrocorallinae	147
Siponophoren	147
Scyphomedusen	158
Ctenophorae	162
Fossilia	163
Dr. A. Ortmann. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Anthozoen während des Jahres 1888.	
Ontogenie	167
Morphologie, Anatomie, Histologie	168
Systematik und Faunistik	172
Palaeontologie	173
Riffbildung	175



DEC 5 1891

Bericht

über die Leistungen in der Naturgeschichte der Säugetiere
während des Jahres 1888.

Von

Dr. Ernst Schäff.

Berlin.

Allgemeines.

Austen, E. E., Natural History in Southern Germany. — Rep. Rugby School Nat. Hist. Soc. 1887, p. 29—40 (Erschienen 1888).

Ball, V., Further Notes on the Identification of the Animals and Plants of India which were known to early Greek Authors. — Proc. R. Irish Acad. III S. T. I, p. 1—9.

Bolau, Heinrich, Waltiere, in Neumayr's Anleitg. z. wissensch. Beob. auf Reisen. 2. Aufl. Bd. II, p. 363—372.

Anleitung zur Untersuchung und Präparation toter Wale und ihrer Teile, Massschema, Beobachtung lebender Wale.

Brass, A., Kurzes Lehrbuch der normalen Histologie des Menschen und typischer Tierformen. Mit 210 Abbdgn. Leipzig 1888.

Büchner, Eugen, Instruktion zum Sammeln von Säugetieren. St. Petersburg 1888. Leider russisch!

Chauveau, Ad., Trattato di anatomia comparata degli animali domestici, riveduto e aumentato colla collaborazione di S. Arloing. Prima traduzione italiana nella terza edizione francese a cura dei dottori Frederico Boschetti e Vittorio Collucci, coll' aggiunta di un appendice d'istologia generale del dott. Tommaso Longo. Torino 1888.

Davis, J. R. Ainsworth, A Text-book of Biology: comprising vegetable and animal Morphology and Physiology. Philadelphia 1888.

Ellenberger, W., Grundriss der vergleichenden Histologie der Haussäugetiere. Mit 373 Abbildgn. und einem Anhang: Anleitung zu histologischen Untersuchungen. Berlin 1888.

Flower, W. H., Einleitung in die Osteologie der Säugetiere. Nach der 3. unter Mitwirkung von Hans Gadow durchgesehenen Original-Ausgabe. Mit 134 Figg Leipzig 1888.

Deutsche Uebersetzung der 1885 erschienenen III. Aufl. des bekannten englischen Werkes.

Gill, Theod., Eutheria and Prototheria. — Americ. Naturalist Vol. 22., p. 258—259.

Verf. betont, dass er die Ausdrücke Prototheria und Eutheria in einem andern Sinn brauche als es Huxley thut, bei dem die Bezeichnungen lediglich Synonyme für Ornithodelphia oder Monotremen und Monodelphia oder Placentaler seien (hierzu kommt noch Metatheria=Didelphia oder Marsupialia). Diese Anwendung der erwähnten Namen hält Gill für überflüssig. Er selbst fasst Placentaler und Marsupialer als Eutheria zusammen, während er die Monotremen Prototheria nennt; in dieser Art gebraucht sind nach G. die Namen „expressions of a higher generalization.“

Guida del R. Istituto Geologico di Bologna. Bologna 1888. 12°. Mit Illustr.

Enthält Angaben über fossile Säugetiere.

Hartmann, R., Die Säugetiere. In Neumayr's Anleitung zu wissensch. Beob. auf Reisen 2. Aufl. II, p. 528—562. Berlin 1888.

Allgemeine Winke für Reisende, welche, ohne Fachzoologen zu sein, Säugetiere beobachten wollen. 1. Einsammeln von Nachrichten über die in einem Lande vorkommenden Säugetiere, Beachtung der Reste und Teile von solchen, Beobachtung lebender Tiere. 2. Beschreibungen, Messungen, Zeichnungen, photographische Aufnahmen, Verbreitungskarten. 3. Sammeln, Conserviren, Versenden von Säugetieren oder Teilen derselben.

Hertwig, O., Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere. Jena 1888. 507 S. mit vielen Abbildgn.

Jackson, W. H., Rolleston's Forms of Animal Life. A Manual of Comparative Anatomy with Descriptions of Selective Types. Oxford 1888. 8°. Illustr.

Jentink, F. A., Catalogue systématique des Mammifères (Rongeurs, Insectivores, Cheiroptères, Edentés et Marsupiaux). Leiden 1888.

Enthält die im Musée d'hist. nat. des Pays-Bas befindlichen Arten der angegebenen Ordnungen.

Jordan, D. S., A Manual of the Vertebrate Animals of the Northern United States, including the district north and east of the Ozark Mountains, south of the Laurentian Hills, north of the southern boundary of Virginia, and east of the Missouri River. Inclusive marine species. V. Ed. Chicago 1888. 12°.

Die vorliegende (seit 1876 die 5.) Auflage ist wiederum neu bearbeitet und mit dem jetzigen Stande der Wissenschaft in Einklang gebracht worden. P. 314—344 enthält die Säugetiere des im Titel angegebenen Gebietes, im Allgemeinen nach Gill's „Arrangement of the Families of Mammals“ angeordnet, 116 Arten. Bei den Ordnungen findet sich ein analytischer Schlüssel zum Bestimmen der Familien, ebenso bei den grösseren Familien ein solcher für die Gattungen. Kurze prägnante Angabe der Merkmale ermöglicht trotz

der Kürze ein sicheres Bestimmen. Von Phociden ist nur *Ph. vitulina* angegeben (keine weitere Art? Ref.). Aehnliche Werke für grössere Gebiete wären sehr wünschenswert.

Katalog der von N. M. Przewalski während seiner Reise in Centralasien zusammengebrachten Zool. Sammlung. 34 S. Text mit Atlas von 11 Tfn. St. Petersburg 1887 (!) In russischer Sprache.

Lydekker, R., Mammalia. — Zoolog. Record for 1888, p. (35) 1—64.

Übersicht über die Säugetier-Litteratur des Jahres 1888. Im vor. Ber. nachzutragen dasselbe für 1887.

M'Fadyean, J., The Comparative Anatomy of Domesticated Animals. Part. I, Osteology. With Figg. London 1888.

Moreno, F. P., Informe Preliminar de los Progresos del Museo La Plata, durante el Primer Semestre de 1888. — Boll. Mus. La Plata 1888, p. 1—35.

Munk, J., Physiologie des Menschen und der Säugetiere. 2. verb. und verm. Aufl. Mit 90 Holzschn. Berlin 1888.

Natural History Plates for Schools, with full Description of each Plate. London 1888.

Von Säugetieren die Giraffe.

Perrier, Edmond, Eléments d'anatomie et de physiologie animales. Années V et VI. Paris 1888 (?) Illustr.

Reichenow, Ant., Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Säugetiere während des Jahres 1886. — Arch. f. Naturgesch. 53. Jahrg. 1887 (!) Bd. II., p. 1—48.

Derselbe, Handwörterbuch der Zoologie, Anthropologie und Ethnologie. Bd. V. Breslau 1888. 8°.

Enthält „Landschaft“ bis „Nervenleiste“; die nicht domestizirten Säugetiere behandelt A. v. Mojsisovics, die Haussäugetier-Rassen Roeckl.

Renooz, C., L'évolution de l'homme et des animaux. Histoire positive du développement primitif démontrée par le développement embryonnaire. Fasc. I. Paris 1888. Illustr.

Schäff, Ernst, Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Säugetiere während des Jahres 1887. — Arch. f. Naturgesch. 54. Jahrg. 1888. Bd. II., p. 1—90.

Derselbe, Leitfaden der Zoologie für Studierende der Naturwissenschaften und der Medizin. Mit 101 Abbildungen. Stuttgart 1888.

S. 186—214 behandelt die Säugetiere. Die Sirenia müssten richtiger als besondere Ordnung, nicht als Unterordnung der Cetaceen aufgefasst werden.

Schlosser, Max, Zoologie. Litteraturbericht in Beziehung zur Anthropologie mit Einschluss der fossilen und recenten Säugetiere für 1884. — Arch. f. Anthropol. Bd. XVII, p. 118—194.

Settegast, H., die Tierzucht. 1. Bd. Die Züchtungslehre. Mit 198 Abbildgn. und 5 Tfn. Rassetieren. 5. neu bearb. Aufl. Breslau 1888.

Steffahny, Emil, Zur Untersuchungsmethode über die Topographie der motorischen Innervationswege im Rückenmark der Säugetiere.

tiere, mit besonderer Rücksicht auf das Halsmark der Kaninchen. — Beitr. z. Anat. u. Physiol., hersg. von Eckhard, Bd. XII, p. 41—217.

Struthers berichtet über seine Methoden zur Darstellung und Conservirung von Gehirnen und Gehirnpräparaten. Proc. Anat. Soc. Great Brit. (in Journal of Anat. and Phys. New S. Vol. II., p. 309 ff.)

Súkhia, N. Hormasji Edalji, A Manual of Comparative Anatomy of Domesticated Quadrupeds. Bombay 1887!

Thomas, Oldfield, vergl. unter Systematik, Marsup.!

Wächter, C., Methodischer Leitfaden für den Unterricht in der Zoologie. Mit besonderer Berücksichtigung der Leutemann-Brass-Schumann'schen zoologischen und zootomischen Wandtafeln. 2. verb. Aufl. I. Die Wirbeltiere. Braunschweig 1888. Mit 157 Abbildgn.

Anatomie und Physiologie.

Allgemeines. Albrecht, Paul, Schemata zu Veranschaulichung Albrecht'scher vergleichend-anatomischer Theorien. Serie I, Bl. 4: Der rechtsseitige vordere und hintere Zwischenkiefer eines mit doppelseitiger Hasenschartenkieferspalte behafteten, jederseits tetrepiptodonten jungen Pferdes. 1 kolor. Tfl. in Gr. Folio. Serie I, Bl. 5. Der rechtsseitige Gesamtschneckenkiefer eines normalen jederseits triepiptodonten jungen Pferdes. 1 kolor. Tfl. in Gr. Folio. Serie III, Blatt 6: Quadratum, Metapterygoid, Ectopterygoid, Praeoperculum und Mandibula des Menschen. 1 kolor. Tfl. in Gr. Folio. Hamburg 1888. P. Albrecht's Selbstverlag.

Vergl. Brass Unter Allgem., Chauveau ebenda.

Cohnstein, J., und Zuntz, N., Weitere Untersuchungen zur Physiologie des Säugetierfoetus. (Aus dem thierphysiol. Laborat. der landw. Hochschule zu Berlin). — Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. XLII., p. 393—408.

Daremborg, G., Les injections sous-cutanées d'huile chez les cobayes et les lapins. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 702—704.

Verf. untersucht die Wirkung subcutaner Einspritzungen von Leberthran, Oelsäure, Petroleum etc. auf Meerschweinchen und Kaninchen und constatirt, nach welcher Zeit resp. bei welchen Gaben der Tod eintritt.

Vergl. Ellenberger unter Allgem., Flower ebenda.

Galtier, V., Nouvelles expériences tendant à démontrer l'efficacité des injections intra-veineuses de virus rabique en vue de préserver de la rage les animaux mordus par des chiens enragés. — Comptes rend. hebdomad. Acad. des sciences T. CVII, p. 798—799.

Verf. führt Beispiele an für die Richtigkeit seiner früheren Mittheilungen, dass man Wiederkäuer und Schweine, welche von tollen Hunden gebissen wurden, durch Impfen von Wutgift in die Venen gegen die Folgen des Bisses schützen kann.

Gegenbaur s. unter Anat. u. Phys., Skel.

Klaatsch, H., Ueber den Arcus cruralis. — Anatom. Anz. III. Jahrg., p. 679—686. Mit 3 Abbildgn. (Ref. Verh. Anat. Gesellsch. Versammlg. Würzburg 1888).

Durch Untersuchungen an Affen und am Menschen gelangt Verf. zu dem Ergebniss, dass sich die etwas complizirteren Zustände der Schenkelbeuge beim Menschen auf einfache Weise aus mehr indifferenten Verhältnissen ableiten lassen und dass Henle's Beschreibung des Arcus crur. durchaus richtig ist, während der Name von andern Autoren in verschiedenem Sinn gebraucht wird.

Lebouq, H., Recherches sur la Morphologie de la Main chez les Pinnipèdes. — Stud. Mus. Zool. Dundee I, p. 1—8.

Vergl. auch Lebouq unter Entwickl.

Mc Bride, J. A., Anatomical Outlines of the Horse. III Ed. London 1888.

Vergl. auch M'Fadyean unter Allgem., Munk ebenda.

Nehring, A., Die Altersbestimmung des Schwarzwildes nach dem Gebiss und nach dem Gewicht. — Deutsche Jägerzeitg. Bd. X, p. 721 ff., 741 ff., 757 ff.

Verf. giebt eine Darstellung des Zahnwechsels des Wildschweins und weist nach, dass das Gebiss sichere Anhaltspunkte zur Bestimmung des Alters bietet, während das früher bisweilen diesem Zweck dienende Gewicht sehr unzuverlässig ist.

Vergl. Perrier unter Allgem.

Rosenthal, J., Calorimetrische Untersuchungen an Säugetieren. — Sitzungsber. Kgl. Preuss. Akad. Wissensch. Berlin. Jahrg. 1888, p. 1309—1319.

Verf. stellt fest, dass ein im Ernährungsgleichgewicht befindliches Tier entgegen der bisherigen Annahme nicht stets die gleiche Anzahl von Calorien in 24 Stunden produziert. Es folgt daraus, „dass eine Berechnung der wirklich erfolgten Wärmeproduktion aus der Nahrung ebensowenig möglich ist, wie die aus den Ausscheidungen“. Die Verbrennung der Nahrungsstoffe im Tierkörper liefert nicht mehr, wie Dulong und Despretz gefunden hatten, sondern höchstens so viel Energie als den Verbrennungswärmen der Stoffe zukommt, meistens aber weniger. Es ist dies sehr natürlich, da nur unter ganz besonders günstigen Umständen die Verbrennung der zugeführten Nahrungsstoffe eine ganz vollständige ist.

Roussel, J., Des effets d'huile sur les animaux. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 749—750.

Mineralöle wirken schädlich resp. tödtlich bei subkutaner Einspritzung, Pflanzenöle dagegen nicht. (Vergl. oben Daremberg).

Struthers, John, On some points in the Anatomy of a Megaptera longimana. — The Journ. of Anat. and Physiol. New. S. Vol. II, p. 109—125. Mit 2 Tfn. 1887 erschienen!

Verf. untersuchte ein etwa 40 Fuss (engl.) langes, männliches Exemplar von *Meg. longim.*, welches 1884 in der Gegend von Dundee erbeutet wurde. Zunächst werden Maasse und Beschreibungen der

äusseren Teile gegeben, zum Teil unter vergleichender Berücksichtigung verwandter Arten und Gattungen. Von besonderem Interesse sind die beiden in einer Art Marsupium liegenden rudimentären Zitzen, 2 Fuss vor dem After befindlich. Weiter werden behandelt die Hautfurchen, Hauthöcker, Haare, Barten, Augen, Farbe etc. etc.

Derselbe, Forts. der obigen Arbeit a. a. O., p. 240—282. Mit 3 Tfln.

A. Beschreibung der Brustflosse in toto nebst Masstabellen; ferner genaue Untersuchung der Knochen und Knorpelteile der Vorderextremität, sowie der Muskeln des Unterarms und der Finger. B. Rudimentäre Hinterextremität, Knochen, Muskeln, Bänder, Funktion.

Derselbe, Forts. ebenda p. 441—460.

Wirbelsäule: Zahl und Maasse der Wirbel verglichen mit denen von *B. musculus* und *B. borealis*. Genauere Darstellung der Dorsal- und Lumbal-, sowie der Schwanzwirbel.

Derselbe, Forts. ebenda p. 629—654.

Rückenmark; Gelenk-, Quer- und Dornfortsätze.

Derselbe, Forts. Ebenda Vol. III, p. 124—163. Mit 1 Tfl.

Behandelt werden die Halswirbel, Rippen, Brustbein und „chevronbones“.

Vergl. Sùkhia unter Allgem.

Young, Alfred H., and Robinson, Arthur, On the Anatomy of *Hyaena striata*. Part I. — The Journal of Anat. and Phys. New. S. Vol. III, p. 90—105. Mit 1 Fig.

Beschrieben werden, mit steter Berücksichtigung der verwandten Formen, die Verdauungsorgane, Respirationsorgane, Harn- und Geschlechtsorgane einer weiblichen gestreiften Hyäne. Die letzteren Teile sind äusserlich betrachtet am lebenden Tier bei *H. striata* im männlichen und weiblichen Geschlecht nicht ganz so ähnlich wie bei der gefleckten Hyäne.

Haut. van Bambeke, Ch., Sur les follicules rencontrés dans l'épiderme de la machoire supérieure chez le *Tursiops tursio*. — Bull. Acad. R. Belgique, 3. Série T. XV., p. 503—514. Mit 1 Holzsch. u. 1 Tfl.

Verf. fand bei *T. tursio* am Oberkiefer eigentümliche Erhebungen der Haut, welche hohl sind und im Innern einen räthselhaften Kegel aus kohlen. Kalk oder eine stellenweise granulöse, bräunliche Masse enthalten. Die von M. Weber geäusserte Ansicht, dass diese Gebilde Beziehungen zu rudimentären Haaren böten, teilt Verf. nicht.

Vergl. Fjelstrup w. u.

Batelli, A., Delle glandule anile di alcuni Carnivori. — Atti della Soc. Toscan. Sc. Nat. Pisa. Mem. Vol. IX., p. 174—189. Mit 1 Tfl.

Verf. untersucht die Analdrüsen des Fuchses und der Katze. Er unterscheidet zusammengesetzte und einfache Drüsen, deren letztere besonders Stinkdrüsen darstellen.

Beddard, Frank E., Note on the Sternal Gland of *Didelphys dimidiata*. — Proc. Zool Soc. London 1888, p. 353—355. Mit 2. Holzsch.

Verf. beschreibt bei *Did. dimidiata* Wagn. ein am vorderen Ende des Sternums gelegenes Drüsenorgan, welches dem an der gleichen Stelle bei *Myrmecobius* befindlichen gleicht. (Vergl. Bericht f. 1887, p. 7).

Duclert, L., Determinisme de la frisure des productions pileuses. — Journ. Anat. Physiol. XXIV., p. 103—111. Mit 1 Tfl.

Verf. bestätigt im Wesentlichen die Ansichten v. Nathusius' über die Kräuselung der Wollhaare des Schafes.

Fjelstrup, A., Ueber den Bau der Haut bei *Globiocephalus melas*. — Zool. Anzeiger XI., p. 11—15.

Es scheinen weder Muskeln noch Nerven noch Drüsen in der Haut von *Glob. mel.* vorzukommen. Die Meinung Eschrichts, dass die Zahl und Anordnung der im Foetalzustande vieler Wale vorkommenden Haare constant und daher zur Unterscheidung der Arten geeignet sei, wird für die genannte Art widerlegt. Die meisten von etwa 370 auf den Färöern erlegten und vom Verf. untersuchten Expl. zeigten in der Unter- und Oberkieferregion kreisförmig angeordnete Poren von etwa 0,16 mm Durchm., während derjenige der ganzen Kreise etwa 0,5—1 cm betrug. Den Poren entsprechen auf der Unterseite des Stratum corneum befindliche, in das Str. mucosum hineinragende, kegelförmige Erhebungen. Bennett und Weber fanden Aehnliches, doch ist eine Erklärung dieser Gebilde noch nicht gegeben.

Krause, Rich., Beiträge zur Kenntniss der Haut der Affen. — Diss. Berlin 1888.

Verf. untersucht die Haut von Gorilla, Gibbon, Orang, *Macacus rhesus*, *Cynocephalus sp.*, *Cynocephalus pluto*, ferner von *Lemur sp.* und *Stenops gracilis*. Sowohl hinsichtlich der gröberen Strukturverhältnisse als auch der histologischen Einzelheiten finden sich in der Haut der Affen Verhältnisse, die den menschlichen sehr ähnlich, jedoch einfacher und klarer als letztere sind. Die Aufstellung zweier Typen des Baues des Stratum corneum, wie sie von Zander ausging, ist ungerechtfertigt. Stratum granulosum und lucidum sind sehr deutlich an Vola, Planta und Gefässschwiele. Im Stratum mucosum ist der Reichthum an Merkel'schen Tastzellen auf der Höhe der Tastballen bemerkenswert. An den Tastballen des Gibbons ist eine höchst gesetzmässige Verbindung zwischen Epithel und Bindegewebe festzustellen. In der Lippenhaut der Affen inseriren sich quergestreifte Muskelfasern an der Epidermis. Die verästelten Pigmentzellen der Affenhaut (Melanocyten) bieten eine ausserordentlich grosse Mannigfaltigkeit der Form dar. Zu untersuchen ist noch, ob, besonders in der Cutis, die Pigmentgranula in Zellen liegen oder ob sie auch frei im Bindegewebe vorkommen.

Leclerc, A., Sur la sécrétion cutanée de l'albumine chez le cheval. — Comptes rend. hebdomadaires de l'Académie des sciences T. CVII, p. 123—126.

Verf. untersucht den Schweiss des Pferdes und berechnet die Menge des Eiweisses, welches darin abgeschieden wird.

Smith, Fred, The Histology of the Skin of the Horse. — The Journ. of Anat. and Phys. New S. Vol. II., p. 142—153. Mit 1 Tfl.

In de Einleitung wird u. A. gesagt, dass das Pferd sowohl im Frühjahr als auch im Herbst die Haare wechselt. Eingehende Beschreibung der einzelnen Teile der Haut. Meissnersche Körperchen wurden nicht gefunden, Pacinische nur ein Mal ein einziges. Talgdrüsen sind überall auf der äusseren Körperoberfläche zu finden, besonders gross an den Mähnenhaaren, sehr zahlreich in den Lippen, wo dagegen Schweissdrüsen fehlen. Ganz vereinzelt stehen letztere in der Haut der Gliedmaassen. Die Haare lassen sich in 3 Gruppen teilen: Tasthaare, an den Lippen etc.; wechselnde Haare, auf dem Körper im Allgemeinen; Dauerhaare, in Schweif und Mähne. Die Wechselhaare werden zu bestimmten Zeiten 2 Mal jährlich abgestossen, dadurch dass sich unter ihnen ein neues Haar entwickelt, wodurch das alte absterbende Haar allmählich nach der Oberfläche der Haut gedrängt wird, um schliesslich auszufallen.

Struthers s. unter Anat. u. Phys. Allgem.

Variot, G., Note sur la nigritie du chien comparée à celle de l'homme. — Bull. Soc. d'Anthrop. de Paris 4. S., T. 11, p. 183—185.

Verf. untersucht die durch Pigment schwarz gefärbten Teile der Lippe, sowie die Conjunctiva von Hunden und vergleicht das Auftreten schwarzen Pigmentes mit dessen gelegentlichem Vorkommen beim Menschen, wobei sich analoge Verhältnisse ergeben.

Skelet. Allen, Harrison, The Occipito-Temporal Region in the Crania of Carnivora. — Science, Vol. XI, p. 71.

Verf. bemerkt, dass sich bei *Amphicyon*, *Dinictis* und *Archae-lurus* ähnliche Bildungen finden wie das sogen. Post-Tympanicum bei *Ursus* und dass diese Genera durch die Beschaffenheit der post-tympanischen Schädelgegend unterschieden werden können.

Brandt, Ed., Vergleichend-anatomische Untersuchungen über die Griffelbeine (*Ossa calamiformia*) der Wiederkäuer (*Ruminantia*). — Zool. Anz. XI., p. 542—548. Mit 2 Figg.

Die Arbeit enthält nichts Neues. Der Satz: Bei den Hirschen erhalten sich von den beiden seitlichen Mittelhand- resp. Mittelfussknochen nur mehr oder weniger starke untere Stücke dieser Knochen, während die mittleren und oberen Stücke derselben schwinden, dürfte falsch sein. (Nach Brooke sind von den 39 Hirscharten der alten Welt 36 plesiometacarp, d. h. mit am proximalen (also oberen) Ende des Kanonenbeins sitzenden Rudimenten der zweiten und fünften Metacarp. versehen. Bei den amerikanischen Hirschen dagegen sitzen die rudim. Metacarp. 2 und 5 am distalen Ende des Kanonenbeins, ausser beim Wapiti. Ref.).

Chudzinski, Th., Sur le sacrum d'un chimpanzé. — Bull. Soc. d'Anthropol. de Paris. 4. S., T. 11., p. 483—485.

Verf. beschreibt ein aus 7 Wirbeln bestehendes Sacrum eines Chimpansen: der letzte (7.) Wirbel desselben ist nicht etwa der erste

Schwanzwirbel, da der auf ihn folgende Wirbel genau die Beschaffenheit eines normalen ersten Schwanzwirbels zeigt.

Cornet, J., Note sur le prétendu pro-atlas des Mammifères et de *Hatteria punctata*. — Bull. Acad. R. Belgique 3. Série T. XV., p. 406—420. Mit 1 Tfl.

Verf. untersucht eine Reihe von Säugetieren, insbesondere *Erinaceus europ.*, *Crocid. aran.*, *Mac. sinic.* (ausserdem *Hatteria*) auf das Vorkommen des Albrecht'schen Proatlas und zeigt, dass derselbe ein Zwickelbein, Os wormianum ist, welches sich in den das Hinterhaupt an den ersten Halswirbeln befestigenden Bändern bildet. Das Vorkommen desselben ist sehr unbeständig. Vergl. unten Dollo.

Cuénod, Aug., L'articulation du coude. — Internat. Monatschr. f. Anat. u. Phys. Bd. V. p. 385—340. Mit 3 Tfn.

Verf. behandelt vergleichend anatomisch das Ellbogengelenk der Vertebraten im Allgemeinen. Marsupialier, Raubtiere etc. stellen einen primitiven Typus dar, weil bei ihnen die „flexion batracienne“, wie der Verf. es nennt, noch erhalten ist und Pronation und Supination mehr oder minder ausgeprägt sind. Beim Pferd und bei den Wiederkäuern mit reduzierter Ulna ist die Bewegung im Ellbogengelenk eine spiralige, ohne Pronation und Supination. Beim Schwein endlich verläuft die Bewegung in einer Ebene.

Dollo, L., Sur le Proatlas. — Zool. Jahrb. Abtlg. f. Anat. III., p. 433—446.

Der Inhalt dieser Arbeit wird durch die Schlussworte des Verf. gekennzeichnet: „J'espère avoir démontré que: ni au point de vue de la méthode, ni au point de vue de l'observation, ni même au point de vue de l'historique le travail de M. Cornet (Bull. Acad. R. Belg. 1888, T. XV, p. 406 ff. vergl. oben. Ref.) n'est satisfaisant. La seule chose qu'on peut en tirer — et dont l'auteur ne s'est pas aperçu — c'est une confirmation des vues de M. Albrecht qu'on s'était proposé de combattre.“

Gegenbaur, C., Ueber Polydactylie. — Morphol. Jahrb. Bd. 14. p. 394—406.

Verf. erörtert im Anschluss an die Unters. von Rijkebusch und Spronk die Polydactylie, wendet sich gegen Bardeleben's Auffassung der „Nähte“ in den Elementen des Carpus, sowie gegen die Ansichten dieses Forschers über das Verhalten des Abductor poll. longus, und kommt zu dem Schluss, dass das Auftreten überzähliger Finger oder Skelet-Elemente in den Extremitäten überhaupt als Missbildung aufzufassen sei.

Hervé, G., Crâne de gorille. — Bull. Soc. d'Anthropol. de Paris. 4. S., T. 11, p. 181.

Verf. bespricht einen erwachsenen Gorillaschädel, bei welchem ausnahmsweise die Nasenbeine noch nicht mit einander verwachsen sind.

Hittcher, K., Untersuchungen von Schädeln der Gattung *Bos*, unter besonderer Berücksichtigung einiger in ostpreussischen Torfmooren gefundenen Rinderschädel. Inaug. Diss. Königsberg i. Pr. 1888.

Verf. untersucht eine Anzahl in ostpreussischen Mooren gefundener Schädel von *Bos primigenius* und vergleicht dieselben mit recenten Rinderschädeln. Er gelangt zu dem Resultat, dass sich die Unterschiede, welche zwischen Ur und Hausrind zu konstatiren sind, durchweg auf solche beschränken, welche als eine Folge des wilden Zustandes und der späteren Reife des ersteren oder auch umgekehrt als eine Folge der Domestikation und früheren Reife des letzteren angesehen werden können, so dass mithin die Hypothese der Abstammung des Hausrindes von *Bos primig.* an Wahrscheinlichkeit gewinnen muss.

Kükenthal, W., Ueber die Hand der Cetaceen. — Anatom. Anz. III. Jahrg., p. 638—646. Mit 4 Abbildgn.

Verf. constatirt an Embryonen von *Beluga leucas*, dass die bei jüngeren Stadien vorhandenen 2 Centralia mit dem Intermedium verschmelzen, nicht mit Carpale 2, wie Lebouq behauptete. Das Ulnare des erwachsenen Tieres besteht aus Ulnare + Carpale distale 5. Später verwachsen Carpale 3 und 4 miteinander. „In früher embryonaler Zeit ist also der Carpus von *Beluga leucas* vollkommener als später.“ Bezüglich der Phalangen wird gezeigt, dass ihre Zahl in früher embryonaler Zeit grösser ist als später und dass die Verminderung der Phalangenzahl zu Stande kommt durch das jedesmalige Verschmelzen der Endphalange mit der vorhergehenden. Für *Globiocephalus* weist Verf. im Gegensatz zu M. Weber nach, dass der fötale Carpus in Bezug auf Zahl und Lage seiner Elemente mit dem erwachsenen genau übereinstimmt, dass ferner die Phalangenzahl in den embryonalen Stadien grösser oder mindestens ebenso gross ist als in den postembryonalen, und dass endlich das Pisiforme von der Ulna her stammt. Die Ansicht Ryder's, Baur's und Weber's, dass die Hyperphalangie der Cetaceen eine adaptive, phalangenartige Segmentation eines über die dritte Phalanx hinaus verlängerten Knorpelstrahls sei, ist mit den Resultaten des Verf. unvereinbar.

Derselbe, Ueber die Hand der Cetaceen (Zweite Mitteilung) — Anatom. Anz. III. Jahrg., p. 912—916. Mit 2 Abbildgn.

Verf. zeigt zunächst an einem Embryo von *Lagenorhynchus acutus* Gray, dass die Phalangen gleichwertig sind und nicht morphologisch verschiedenwertig, wie dies Ryder annimmt. Bei *Beluga leucas* wird constatirt, dass bisweilen sich zunächst ein Centrale mit dem Intermedium verbindet, während das andere noch frei bleibt. Frühere Untersuchungen ergaben, dass vor der Verschmelzung mit dem Intermedium die beiden Centralia unter einander verwachsen. Der früher aufgestellte Satz, dass in früher embryonaler Zeit der Carpus von *Beluga* vollkommener ist als in späterer, wird dahin erweitert: der Carpus von Embryonen von *Beluga leucas* ist vollkommener als der von Erwachsenen. Ähnliches gilt für die Phalangenzahl, welche

bei Erwachsenen geringer ist als bei Embryonen. Ferner wird festgestellt, dass die bei einem Embryo beobachtete Abspaltung einer neuen Phalangenreihe am 5. Finger bei einem grösseren Embryo weiter vorgeschritten ist. Hieraus folgt, „dass innerhalb der Cetaceen, wenigstens bei *Beluga*, eine weitere Ausbildung der Vorderextremität durch Vermehrung der Fingerstrahlen sich einstellt.“ Besonders hervorgehoben wird, dass dies in der gesamten Reihe der Säugetiere der einzige Fall einer derartigen Vermehrung der Phalangenreihen ist und dass nur bei fossilen Reptilien (Ichthyosauren) Analoga sich finden.

Leser, E., Ueber histologische Vorgänge an der Ossifikationsgrenze mit besonderer Berücksichtigung des Verhaltens der Knorpelzellen. — Arch. f. mikr. Anat. Bd. 32, p. 214—222. Mit 1 Tfl.

Im epiphysären Knorpelgewebe bildet sich durch Zellteilung eine Reihe eigentümlich platter Zellen, welche durch ihre Anordnung in langen Säulen das Längswachstum des Knochens bedingen. In der Nähe der Markräume wird das Protoplasma dieser Zellen blass und sieht hydropisch aus; der Kern verliert seine Gerüstsubstanz und wird blasenartig. Ganz in der Nähe der Verkalkungslinie, zum Teil auch inmitten derselben, sind viele der oft sehr geräumigen Knorpelhöhlen ganz leer, einzelne auch mit Resten protoplasmatischer Zellsubstanz angefüllt. Mitosen fehlen hier gänzlich. In die erwähnten Knorpelhöhlen dringen durch die Wände hindurch Gefässe, die sich mit roten Blutkörperchen füllen. Unmittelbar nach den Gefässen — räumlich und zeitlich — bemerkt man relativ grosse, granulirte Zellen von verschiedener Gestalt, welche die von den Gefässen frei gelassenen Räume ausfüllen. Sie stammen aus dem Mark und scheinen identisch zu sein mit den Osteoblasten Gegenbaurs.

Mazzarelli, G. F., Su di alcune anomalie osteologiche in un cranio di *Erinaceus europaeus* L. — Bollett. Soc. Naturalisti in Napoli Ser. I, Vol. II, Anno II, Fasc. II, p. 111—114.

Verf. beschreibt den Schädel eines Igels, welcher folgende Abnormitäten zeigt: 1) völlige Verschmelzung des Basisoccipitale mit dem Basisphenoid; 2) Verschmelzung des Ethmoids, Vomers, des rechten Nasale und des entsprechenden Ober- und Zwischenkiefers; 3) Höhle mit spongiösem Boden im rechten Frontale, und im Ober- und Zwischenkiefer.

Nehring, A., macht kurze Mittheilungen über einen Schädel von *Canis jubatus*. — Sitzgsber. Ges. naturf. Freunde 1888, p. 4—7.

Schwink, F., Ueber den Zwischenkiefer und seine Nachbarorgane bei den Säugetieren. München 1888. Mit 5 Tfln.

Slade, D. D., On certain vacuities or deficiencies in the crania of Mammals. — Bull. Mus. Harvard Coll. Vol. 13., p. 241—246. Mit 2 Tfln.

Struthers s. unter Anat. u. Phys., Allgem.

Weithofer, K. Anton, Einige Bemerkungen über den Carpus der Proboscider. — Morphol Jahrb. Bd. 14., p. 507—516.

Verf. zeigt, dass bei allen fossilen Proboscidiern, soweit bekannt, das Lunatum sich weit über das Trapezoid hinüberschiebt, während bei *E. african.* dieses Uebergreifen nur in der Jugend so weit geht, später sich vermindert und bei *E. ind.* im erwachsenen Zustand fast stets völlig verschwindet. Man muss dies jedoch wahrscheinlich nur als secundäre Taxeopodie bezeichnen. Im Verlauf seiner Untersuchungen bemerkt Verf., dass der Gegensatz zwischen Cope und Schlosser in Betreff der Amblypoden als Vorläufer der Diplarthra sich doch wohl ausgleiche, da Cope's hypothetische „Amblypoda hyodonta“ im Wesentlichen mit den von Schlosser als Vorfahren der Perissod. u. Artiod. angenommenen Formen übereinstimmen.

Muskelsystem. Adametz, L., Untersuchungen über den Bau und die Zusammensetzung der Muskeln bei verschiedenen Rinderassen, — Thiel's Landw. Jahrb. XVII., p. 377—606. Mit 1 Tfl.

Verf. fand u. a., dass das intermuskuläre Bindegewebe bei den Niederungsrassen des Rindes im allgemeinen sehr reichlich, beim Steppenvieh dagegen spärlich entwickelt ist. Die untersuchten Höhengschläge nehmen eine Zwischenstufe ein. Auch die Durchmesser der Fibrillen (wie der Muskelbündel) sind ausser vom Geschlecht und Alter von der Rasse abhängig.

Baraban, L., Sur l'existence de fibres élastiques dans l'épiploon humain et leurs modifications sous l'influence de l'âge. — Journ. Anat. Physiol. XXIV. p. 90—102. Mit 1 Tfl.

Bardeleben, Karl, Die morphologische Bedeutung des Musculus „sternalis“. — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 324—333. Mit 2 Abbildungen.

Unter dem Namen „Sternalis“ werden verschiedene Bildungen zusammengeworfen. Abgesehen von den Platysma- und Pectoralis-Varietäten handelt es sich entweder um eine tiefere Fortsetzung des Rectus abdominis, dem Transversus costarum vieler Säugetiere entsprechend — oder um den typischen „Sternalis“. Dieser gehört in das System der ventralen Längsmuskulatur, in das System des Rectus abdominis oder Pubo-hyoideus und ist eine atavistische, keine neue Bildung. Die Nerven stammen von den vorderen medialen perforirenden Aesten der Intercostales II—IV.

Debierre, Des anomalies des muscles coexistantes et corrélatives des anomalies des nerfs. — Comptes rend. hebdomadaires. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 86—90.

Behandelt zur Hauptsache 2 Fälle beim Menschen und giebt Bemerkungen allgemeineren Inhalts über Säugetiere.

Eichbaum, F., Die Fascien des Pferdes. — Arch. f. wissenschaftl. und prakt. Tierheilk. Bd. XIV. p. 280—309.

Gage, Susanna P., Form, Endings, and Relations of striated Muscular Fibres in the Muscles of minute Animals (Mouse, Shrew, Bat, and English Sparrow). — The Microscope, (Detroit). Vol. VIII. p. 225—237. Mit 3 Tfln. Ebenda p. 257—272. Mit 2 Tfln.

Gruber, W., Anatomische Notizen (Fortsetzung). — Virchow's Arch. Bd. 114, p. 363—374.

Behandelt vorwiegend menschliche Anatomie. No. IV (CCLXXII) (a. a. O. p. 369 ff.) wird beschrieben eine Vagina propria im Ligamentum carpi dorsale für den Bauch des Extensor digitorum longus manus für den Zeigefinger beim Menschen — und dieselbe analoge Vagina für den Bauch desselben Muskels für die 2. Zehe des Vorderfusses bei *Phascolarctos cinereus*. In No. V (CCLXXIII) (a. a. O. p. 371 ff.) erörtert Verf. die Teilung der Vagina am Ligamentum der Fascia cruralis in der Fussbeuge in zwei secundäre Vaginae für den Musculus extensor digitorum longus pedis bei dem Menschen und bei Säugetieren (*Didelphys*, *Phascolarct. cin.*, *Phascolum. wombat*).

Gruenhagen, A., Ueber die Muskulatur und die Bruch'sche Membran der Iris. — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 27—32. Mit 1 Abbildung.

Verf. weist nach, dass weder in der Iris des Menschen noch in derjenigen eines Säugetieres überhaupt ein glatter Dilatator pupillae vorkommt; der muskuläre Bewegungsapparat besteht nur aus dem Sphincter pupillae und der Gefässmuskulatur.

Kelley, Edwin A., Notes on the myology of *Ursus maritimus*. — Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1888. p. 141—154.

Behandelt hauptsächlich die Muskeln der Gliedmassen.

Kerschner, Ludw., Bemerkungen über ein besonderes Muskelsystem im willkürlichen Muskel. — Anat. Anz. III. Jahrg. p. 126—132.

Verf. entwickelt die Ansicht, dass die „Muskelspindeln“ Kühn's, welche identisch sind mit den „umschnürten Bündeln“ Fränkel's, complizirte sensible Endorgane seien, welche dem Muskelsinne dienen dürften.

Ranvier, L., Des muscles de la vie animale à contraction brusque et à contraction lente, chez le lièvre. — Comptes rend. hebdomad. Acad. des sciences. T. CVII. p. 971—972.

Verf. bestätigt durch einen Versuch seine früher geäußerte Annahme (a. a. O. T. CIV, 1887), dass beim Hasen diejenigen Muskeln, welche beim Kaninchen weiss sind, bei Reizen sich schnell contrahiren und nach Aufhören des Reizes ebenso schnell wieder ausdehnen, dass dagegen Muskeln, welche roten Muskeln des Kaninchens entsprechen langsam auf Reize reagieren.

Struthers s. unter Anat. u. Phys., Allgem.

Sutton, J. B., On the nature of Ligaments. Part. V. — The Journal of Anat. and Phys. New S., Vol. II, p. 542—553. Mit 3 Abbildungen.

Forts. früherer Mitteilungen. Behandelt werden die Extensoren des menschlichen Unterarms im Vergleich zu denen der Affen, ferner der Pyramidalis und der Scansorius (*Gluteus quartus*).

Windle, Bertram C. A., The Pectoral Group of Muscles. Abstract. — Proc. R. Soc. London. Vol. 45, p. 99—101.

Verf. giebt kurz die Resultate einer auf der Untersuchung von mehr als 50 Säugetieren beruhenden Arbeit über die Morphologie der Pectoralmuskelgruppe.

Windle, Bertram C. A., Notes on the Limb Myology of Procyon cancrivorus and of the Ursidae. — The Journal of Anat. and Phys. New S., Vol. III, p. 81—89.

Vergleichende Beschreibung der Muskulatur des Rückens, der Schulter, der Vorder- und Hinterextremität von *Proc. cancriv.*, *Cercoleptes*, *Nasua*, *Ursus*.

Derselbe, On the Myology of Erethizon epixanthus. — The Journ. of Anat. and Phys. New S. Vol. II, p. 126—132. 1887!

Es werden einige wichtigere Verhältnisse der Muskulatur hervor- gehoben, darunter einige Abweichungen von der durch Mivart be- schriebenen Musk. von *Erethizon dorsatus* (P. Z. S. 1882). Hierher gehört das Vorhandensein eines Pectoralis minor, der bei *E. dors.* angeblich fehlt. Auch der Flexor sublimis digitorum zeigt Abweichungen.

Nervensystem. Beavor, Charles E., and Horsley, Victor, Note on some of the Motor Functions of certain Cranial Nerves (V, VII, IX, X, XI, XII) and of the three first Cervical Nerves, in the Monkey (*Macacus sinicus*). — Proc. R. Soc. London. Vol. 44, p. 269—277.

Verschiedene Abweichungen von den bisherigen Anschauungen, so in Bezug auf den Facialis, Vagus, Hypoglossus. Tabellarische Uebersicht.

Dieselben, A further minute Analysis by Electric Stimulation, of the so called Motor Region of the Cortex Cerebri in the Monkey (*Macacus sinicus*). — Philos. Transactions CLXXIX. p. 205—256 X.

Diese Arbeit erschien 1887 (?). Vergl. Ber. f. 1887 p. 16.

Bellonci, J., Ueber die centrale Endigung des Nervus opticus bei den Vertebraten. — Zeitschr. f. wissensch. Zool. Bd. 47, p. 1—46. Mit 8 Tfln. und 4 Holzschn.

Nach einer Einleitung (Principien der Unters., Untersuchungsmethoden) untersucht Verf. zunächst den Tractus opticus der Vertebraten, wobei folgende Säugetiere behandelt werden: *Mus musc.*, *M. decuman. var. alba*, *Cavia cob.*, *Erinaceus europ.*, *Rhinolophus f. equin.*, *Lepus cunic.* Im Allgemeinen steht der Typus, welcher sich bei den Säugetieren findet, demjenigen der Reptilien am nächsten, entfernt sich dagegen weit von dem der Vögel. Von letzterem unterscheidet er sich durch die starke Entwicklung des Thalamus, durch die verhältnissmässig geringe Ausbildung des Corpus opticum und die starke Entwicklung des Corpus posterius (Corp. quadrigemina post.). Bei den Chiropteren ist das Auge und das Corp. opt. wenig entwickelt. Im II., Morphologie (im engeren Sinne) überschriebenen Kap. kommt Verf. zu dem Schluss, dass die Corpora quadrigemina posteriora der Säugetiere den Corp. posteriora der übrigen Vertebraten entsprechen; sie sind daher mit demselben Namen zu belegen. Seinen Ursprung und seinen histologisch-physiologischen Beziehungen

nach ist das paarige Corpus posterius eine vom ebenfalls paarigen Corpus opticum verschiedene Bildung; es steht viel mehr mit dem Hinterhirn als mit dem Mittelhirn in Verbindung. Kap. III behandelt in grossen Zügen die Struktur des Corp. opticum. Dieselbe ist bei den Säugetieren im Wesentlichen die gleiche wie bei den anderen Vertebraten, doch ist die radiäre und konzentrische Anordnung der anatomischen Elemente weniger deutlich erkennbar. Das letzte Kap. ist eine Zusammenfassung der gewonnenen Resultate, von denen hervorzuheben ist, dass kein Opticusbündel, sehr wahrscheinlich sogar keine einzige Opticusfaser in andern Gehirnteilen als in dem Corpus opticum endet.

Below E., Die Ganglienzellen des Gehirns bei verschiedenen neugeborenen Tieren. — Arch. f. Anat. und Phys., Physiol. Abtlg. Jahrg. 1888, p. 187—188. (Briefl. Mitteilung).

Verf. stellt fest, dass bei hilflos zur Welt kommenden Tieren (Mensch, Hund, Katze, Ratte, Maus, Kaninchen) die Ganglienzellen des Gehirns noch nicht fertig entwickelt sind, während die Gehirne der Foeten von Pferd, Kalb, Schwein, Schaf, Meerschweinchen schon in früheren Perioden, stets aber vor der Geburt in allen bezüglichen Gehirnpartien (Medulla, Kleinhirnrinde, Mittelhirn, auch schon in der Grosshirnrinde) fertige Ganglienzellenbildung zeigen. Die Entwicklung der Ganglienzellen schreitet im Gehirn von der Med. oblong., der Ausbreitung der Rückenmarkstränge folgend, von hinten nach vorn bis zum Grosshirn fort.

Broca, P., Mémoires sur le Cerveau de l'Homme et des Primates. Publié par S. Pozzi, Paris 1888. Mit 94 Abbildungen.

Brown, Sanger, and Schäfer, E. A., An Investigation into the Functions of the Occipital and Temporal Lobes of the Monkey's Brain. — Philos. Trans CLXXIX, p. 303—328. Mit 3 Tfn.

Cattaneo, A., Organes nerveux terminaux musculo-tendineux, leurs conditions normales et la façon, dont ils se comportent après la section des racines nerveuses et des nerfs spinaux. — Arch. Ital. de Biol. Tome 10, p. 337—357. Mit 2 Tfn.

Dogiel, Alex., Ueber das Verhalten der nervösen Elemente in der Retina der Ganoiden, Reptilien, Vögel und Säugetiere. — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 133—143.

Von Säugetieren werden Affe, Kaninchen und Katze untersucht. In der Netzhaut der angeführten Tiere sind 2 Arten von Nervenzellen vorhanden. Bei der einen Art teilen sich alle Zellfortsätze und gehen Netzbildungen ein, während die andere Art von Zellen nicht nur sich teilende (protoplasmatische) Fortsätze besitzt, sondern auch einen ungeteilt verlaufenden Axencylinderfortsatz, der in eine Nervenfaser übergeht.

Derselbe, Zur Frage des Verhaltens der Nerven Elemente in der Retina der Störarten, Reptilien, Vögel und Säugetiere. — Wratsch 1888, Nr. 24 (Russisch).

Vergl. vorher.

Dupuy, Eugène, Observation de destruction spontanée des centres moteurs chez un chien, sans paralysie consécutive. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 309—310.

Verf. demonstriert das Gehirn eines Hundes, bei welchem die rechte Hemisphäre Missbildungen zeigte, ohne dass irgend welche Störungen im Organismus bemerkt wurden.

Flesch, Max, Ueber die Deutung der Zirbel bei den Säugetieren. — Anatom. Anz. III. Jahrg., p. 173—176.

Verf. sucht darzuthun, dass die Zirbel der Säugetiere und des Menschen wahrscheinlich kein rudimentäres Organ sei. Für eine physiologische Bedeutung derselben spricht das Eintreten von Nerven und das Vorkommen eigenartiger Abscheidungen in der Zirbel, sowie die Existenz eigenartiger, epithelialer Strukturen auf der der Hirnhöhle zugekehrten Seite.

Gaupp, E., Anatom. Untersuchungen über die Nervenversorgung der Mund- und Nasenhöhlendrüsen der Wirbeltiere. — Morphol. Jahrb. Bd. 14. p. 436—489. Mit 1 Tfl.

Verf. giebt zum Schluss eine Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen Verhältnisse bei den Säugern, ohne eigene Untersuchungen.

Gotch, Francis, and Horsley, Victor, Observations upon the Electromotive Changes in the Mammalian Spinal Cord following Electrical Excitation of the Cortex Cerebri. — Proc. R. Soc. London. Vol. 45, p. 18—26. Mit 1 Tfl.

Hervé, G., La circonvolution de Broca chez les Primates. — Bull. Soc. d'Anthropol. de Paris. 4. S., T. 11, p. 275—314. Mit 4 Holzschn.

Verf. weist eingehend nach, dass sich normaler Weise beim Menschen und bei den anthropoiden Affen vier Stirnwindungen am Gehirn finden und dass sich dieser Typus durch Verdoppelung des binären Typus bei den niederen Primaten gebildet hat.

Jakimovitch, J., Sur la structure du cylindre-axe et des cellules nerveuses. — Journ. Anat. Physiol. XXIV., p. 142—168. Mit 1 Tfl.

Verf. stellt seine Untersuchungen unter Anwendung von Silbernitrat z. T. an Säugetieren an (Rind, Schaf, Katze, Hund, Kaninchen, Ratte, Maus). Er findet, dass Axencylinder und Nervenzelle nach demselben Typus gebaut sind; letztere ist nur eine mit einem Kern versehene Vergrößerung des Axencylinders. Beide bestehen aus sehr feinen Fibrillen mit einer nicht genau erforschten Zwischen-substanz; jede Fibrille besteht aus 2 verschiedenen Substanzen, welche sich verschieden gegen Silber verhalten. Die Querstreifung von Axencylinder und Nervenzelle sind die Folge der Struktur der letzteren und nicht künstlich entstanden.

Kerschner, Ludwig, Bemerkungen über ein besonderes Muskelsystem im willkürlichen Muskel. — Anat. Anz. Jahrg. III, p. 126—132.

Verf. fand auf Querschnitten von kindlichen und foetalen Muskeln im intrafasciculären Bindegewebe kleine Bindegewebsringe von der Struktur einer geschichteten Perineuralscheide. Innerhalb derselben wurden einige Querschnitte dünner Muskelfasern mit centralen Kernen, ferner vereinzelt Querschnitte von Blutgefässen und Nervenstämmchen oder Nervenfasern bemerkt. Nach einer historischen Uebersicht über die bisherigen Angaben über diese schon mehrfach als neu beschriebenen Gebilde entwickelt Verf. seine Ansicht, dass es sich um komplizierte sensible Endorgane handelt, welche dem Muskelsinn dienen.

Derselbe, Beitrag zur Kenntniss der sensiblen Endorgane. — *Anatom. Anz.* III. Jahrg., p. 288—296.

Fortsetzung der vorigen Arbeit. Verf. bezeichnet die erwähnten Bildungen als „Kölliker'sche Organe“ und die dieselben enthaltenden Muskelfasern als „Weismann'sche Muskelbündel“.

Lannegrace, Influence des lésions corticales sur la vue chez le chien. — *Comptes rend. hebdomadaires de l'Académie des Sciences*. 8. S. T. V., p. 708—714. Grösstenteils ophthalmologischen Inhalts.

Lussana, Ph., Circumvolutionum cerebralis anatomies humana et comparata, quam ex vero XXX tabulis exaravit. Ed. II. correctae et auctae. Patavii, 1888.

Molt, F., Microscopical examination of Clarke's Column in Man, the Monkey, and the Dog. — *The Journal of Anat. and Phys.* New. S., Vol. II., p. 479—496. Mit 9 Abbildgn.

Untersuchungen der Clarke'schen Säule ergaben, dass sich dieselbe nur auf ganz bestimmte Gegenden des Rückenmarks beschränkt, dass ihre Zellen mit Eingeweidefasern in Verbindung stehen, Verletzungen der Säule Störungen in den Eingeweiden verursachen und dass sie endlich im Zusammenhang steht zur aufrechten Haltung des Menschen. Sie zeigt bei letzterem besondere Eigentümlichkeiten gegenüber dem Affen und dem Hunde.

von Monakow, Rôle des diverses couches de cellules ganglionnaires dans le gyrus sigmoïde du chat. — *Arch. des sciences phys. et nat.* Période III. Vol. XX, p. 358—360.

Dasselbe deutsch in *Corresp.-Bl. f. Schweiz. Aerzte*. Jahrg. 18, p. 605.

Pansini, S., Delle terminazioni dei nervi sui tendini nei vertebrati. — *Boll. Soc. Natural. in Napoli* S. I, T. II, p. 135—160. Mit 2 Tffn.

Säugetiere p. 154—155. Die Golgi'schen Nervenkörperchen sind bei den S. am kompliziertesten gebaut und entsprechen in jedem ihrer Abschnitte einem ganzen Körperchen der Reptilien. Der Achsen-cylinder eines Nerven bildet durch Verzweigung mehrere Gruppen netzförmiger Nervenkörperchen, deren jedes Kerne enthält und von einer Henle'schen Scheide umgeben ist. Vergl. oben Cattaneo.

Petrone, Louis M., Sur la structure des nerfs cérébro-rachidiens. — *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Phys.* Bd. V, p. 39—47. Mit 2 Tffn.

Verf. beschreibt Neurogliazellen im intracranialen Teil einer Anzahl von Gehirnnerven und in den Wurzeln einiger Rückenmarksnerven.

Derselbe, Sulla struttura del tessuto interstiziale normale dei centri nervosi cerebro-spinali e dei nervi periferici cerebro-rachidiani. — *Gazzetta Ospitali Milano* Nr. 4, 11.

Saint Remy, G., Recherches sur la portion terminale du canal de l'épendyme chez les vertébrés. — *Internat. Monatsschr. f. Anat. u. Phys.* V. Bd. p. 17—38 u. 49—63. Mit 1. Tfl.

Verf. untersucht den Bau des hintersten Teils des Rückenmarks, besonders den „Terminalventrikel“ (fünfter Ventr.) Krause's, bei einer Anzahl von Vertebraten, worunter folgende Säugetiere: Ratte, Meersch., Kaninchen, Katze, Hund, Spitzmaus. Es sind ausserordentliche Verschiedenheiten in der Form des Rückenmarkkanals vorhanden. Nur bei der Spitzmaus verjüngt sich der Kanal allmählich, in dem Maasse wie das Mark an Dicke abnimmt; bei allen andern Säugetieren erweitert er sich vor seinem Ende in verschiedener Weise, bei jungen Tieren deutlicher als bei alten. Verf. schlägt vor, statt der Krause'schen Bezeichnung „ventriculus terminalis“ zu sagen „sinus terminalis“, da die Ventrikel ganz andere Bildungen sind als das erwähnte Organ. Jene sind das Resultat einer Ausdehnung des embryonalen Rückenmarkkanals, diese das Ergebniss einer Verzögerung bei der Rückbildung des Kanals.

Schäfer, E. A., A Comparison of the Latency Periods of the Ocular Muscles on Excitation of the Frontal and Occipito-Temporal Regions of the Brain. — *Proc. R. Soc. London*. Vol. 43, p. 411—412.

Verf. untersucht an Affen die Periode latenter Reizung der Augenmuskeln für die frontale und die hintere (temporale und occipitale) Area und fand dieselbe um einige Hundertstel einer Sekunde länger für die temporale und occipitale Area.

Derselbe, On Electrical Excitation of the Occipital Lobe and adjacent Parts of the Monkeys Brain. — *Proc. R. Soc. London*, Vol. 43, p. 408—410.

Verf. schliesst aus den durch Reizung des Occipitallobus und der angrenzenden Teile des Affengehirns erzeugten Augenbewegungen (subjektive Gesichtsempfindungen) auf einen Connex der gesamten Seh-Area jeder Hemisphäre mit der entsprechenden seitlichen Hälfte jeder Retina, sowie gewisser Teile des genannten Bezirks zu bestimmten Partien der Retinae.

Derselbe, On the Temporal and Occipital Lobes. — *Brain* 1888, p. 13—16.

Ein Affe reagierte nach Abtragung der oberen Schläfenwindungen noch auf Gehöreindrücke.

Stowell, T. B., The Glosso-pharyngeal Nerve in the Domestic Cat. — *Proc. Americ. Philos. Soc.* Vol. XXV, p. 89—94. Mit 1 Tfl.

Derselbe, The Accessory Nerve in the Domestic Cat. — *Ebenda* p. 94—99. Mit 1 Tfl.

Derselbe, The Hypoglossal Nerve in the Domestic Cat. — Ebenda p. 99—104. Mit 1 Tfl.

Turner, W., The Pineal Body (Epiphysis Cerebri) in the Brains of the Walrus and Seals. — The Journ. of Anat. and Phys. New S., Vol. II., p. 300—303.

Das Walross besitzt eine ungewöhnlich grosse Epiphyse; etwas kleiner, aber immer noch verhältnissmässig grösser als sonst bei den Säugetieren ist das genannte Organ bei den Seehunden. Verf. entwickelt die Ansicht, dass bei den Säugern, gegenüber den Lacer-tiliern, das bedeutende Wachstum des Tentorium und der Hemi-sphären des Grosshirns die Entwicklung der Epiphyse (und des Scheitelauges) gehemmt habe.

Turner, W., Comparison of the Convolutions of the Seals and Walrus with those of the Carnivora, and of Apes and Man. — The Journal of Anat. and Phys. New S., Vol. II, p. 554—581.

Vergl. Zool. Rep. Challenger Part LXVIII.

Virchow, Hans, Ueber das Rückenmark der Anthropoiden. — Anatom. Anz. III. Jahrg., p. 509—510. (Ref. Verh. Anat. Gesellsch. Versammlg. Würzburg 1888).

Bei Individuen verschiedenen Alters treten innerhalb derselben Spezies grössere Verschiedenheiten auf als bei verschiedenen nahe-stehenden Spezies. Orang und Chimpanse zeigen im Allgemeinen viele Aehnlichkeiten, während beim Gibbon stärkere Abweichungen, besonders vom Orang, sich geltend machen.

Derselbe, Ueber grosse Granula in Nervenzellen des Kaninchenrückenmarks. — Centralbl. f. Nervenheilk. Jahrg. XI, Nr. 2.

Vitzou, A.-N., L'entre-croisement incomplet des fibres nerveuses dans le chiasma optique chez le chien. — Comtes rend. hebd. de l'Acad. des sciences. T. CVII, p. 531—533.

Verf. zeigt an mit Hunden angestellten Versuchen, dass sich die von den Occipitallappen ausgehenden Nervenfasern im Chiasma nicht alle kreuzen, sondern dass etwa ein Viertel der von einem O. Lappen ausgehenden Fasern direkt zu dem Auge der entsprechenden Seite verlaufen.

Derselbe, Contribution à l'étude du centre cérébro-sensitif visuel chez le chien. — Ebenda p. 279—282.

Verf. kommt nach einer Reihe von Versuchen zu dem Ergebniss, (in Uebereinstimmung mit den Resultaten Munk's), dass das Seh-centrum des Hundes in der hinteren Hälfte der ersten, zweiten und dritten Windung der Occipitallappen liegt.

Waszkiewicz, Ph., Zur Frage über die Beziehungen zwischen der Zahl der Fasern in den Nervenstämmen und dem Körpergewicht bei Säugetieren. — Anatom. Anz. III. Jahrg., p. 206—208.

Kurze Zusammenfassung der Resultate einer später erschienenen grösseren Arbeit. S. dieselbe später.

Weinreich, Max, Ueber Nerven und Ganglienzellen im Säugetierherzen. — Diss. (Halle) Merseburg 1888.

Verf. untersucht Maus, Maulwurf und Mensch und gelangt zu folgenden Ergebnissen: „Die Nerven des Säugetierherzens stammen vom N. sympathicus und vom N. vagus; mit ihnen stehen Ganglienzellen in Verbindung. Dieselben scheinen nie apolar, wohl aber uni- und multipolar zu sein. Sie können sich zu Ganglien vereinigen und liegen als solche an der Vena cava ascendens, der Vorhofsscheidewand, der Grenze zwischen Vorhof und Ventrikel und am Ventrikel. Die Ganglienzellen gehören anscheinend am Vorhof vorwiegend zum N. sympathicus, die in den tiefer gelegenen Teilen des Herzens zum cerebro-spinalen System.“

Zuckerkandl, E., Das Riechbündel des Ammonshorns. — Anatom. Anz. III. Jahrg., p. 425—434.

Verf. beschreibt als „Riechbündel des Ammonshorns“ ein Verbindungsstück zwischen dem Lobus olfact. und dem Cornu Amm. Untersucht werden besonders Primaten, incl. Mensch.

Sinnesorgane. Alzheimer, A., Ueber die Ohrschmalzdrüsen. — Verh. phys. medicin. Gesellsch. Würzburg. Bd. XXII Nr. 8. Mit 2 Tfn.

Buck, A. H., A contribution to the Anatomy of the Elephant's Ear. — Medical News Vol. LIII, p. 107.

Duval, Math., Le troisième oeil des Vertébrés. Leçons faites à l'Ecole d'Anthropologie, recueillies par P.-G. Mahondeau. — Journ. de Micrographie T. 12, p. 250, 273, 308, 336, 368, 401, 429, 459, 500, 523.

Behandelt zusammenfassend in sehr eingehender Weise die bisherigen Untersuchungen über das dritte Auge der Wirbeltiere, wobei auch die Säugetiere, wenn auch nur in geringerem Masse, berücksichtigt werden.

Herzfeld, P., Ueber das Jacobson'sche Organ des Menschen und der Säugetiere. — Zool. Jahrb. Abtlg. f. Anat. III., p. 551—574. Mit 2 Tfn.

Verf. giebt zunächst eine allgemein gehaltene Beschreibung des Jacobson'sche Ganges mit besonderer Berücksichtigung des Schafes, sowie des Menschen, erörtert dann das Vorhandensein oder Fehlen des Jac. G. und des Nasengaumenganges bei einer Reihe von Säugetieren und untersucht endlich den speziellen Bau des Jac. Organs (die beteiligten Knochen, die Knorpel und die Weichteile, als Epithel, Drüsen etc.). Die Frage nach der Function des genannten Organs zu lösen, gelang dem Verf. nicht.

Hönigschmied, Joh., Kleine Beiträge betreffend die Anordnung der Geschmacksknospen bei den Säugetieren. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zool. Bd. 47, p. 190—200.

Untersucht werden Luchs, Bär, Esel, Eber, Hamster, Waldmaus, Haselmaus. Berücksichtigt werden fast nur die äusseren Verhältnisse, dagegen weniger die feinere Struktur, bezüglich welcher auf die Arbeiten von Lovén und Schwalbe verwiesen wird.

Klaatsch, H., Zur Morphologie der Tastballen der Säugetiere. Morphol. Jahrb. Bd. 14, p. 407 ff. Mit 2 Tfn.

Das Liniensystem der Hand tritt zuerst in beschränkter Weise bei den Beuteltieren auf, zunächst auf den Ballen, später auf den intermediären Flächen, wobei dann häufig auf der Höhe der Ballen eine Komplizierung der Linien eintritt. Die Carnivoren stehen auf einer primitiven Stufe, da bei ihnen sich die bei niederen Marsup. vorhandenen Warzen noch finden, manchmal jedoch in linien-ähnlichen Bildungen angeordnet. Die Nager stellen einen besonderen Typus dar durch die zapfenartige Entwicklung der Ballen, lassen aber ebenso wenig wie die Insektenfresser eine einheitliche Beurteilung zu. Zum Menschen führen von den Beuteltieren (*Phalangiata*) die Prosimiae und die Affen.

Klingberg, Beiträge zur Dioptrik des Auges einiger Haustiere. 1. T. — Programm der Domschule zu Güstrow. Ostern 1888, p. 1—22.

Paulsen, E., Ueber die Schleimhaut, besonders die Drüsen, der Oberkieferhöhle. — Arch. f. mikr. Anat. Bd. 32, p. 222—232. Mit 1 Tfl.

Untersucht wurden Kaninchen, Hund, Katze, Ochse, Kalb, Pferd, und Hammel. Das die Oberfläche bedeckende Epithel enthält vielfach Becherzellen, die früher nicht bemerkt worden waren. Eine Membrana hyaloidea wurde entgegen den Angaben Scheff's nicht gefunden. In einem menschlichen Sinus maxillaris, sowie in den betr. Höhlen der genannten Tiere vermisste Verf. nie Drüsen, doch waren diese von verschiedener Ausbildung. Oft zeigten die Ausführungsgänge blasenförmige Erweiterungen. Die Mehrzahl der Drüsen ist den Eiweissdrüsen zuzurechnen.

Rampoldi, R., Sulla fina anatomia della retina dei Mammiferi. Nota preventiva. — Estr. dagli Ann. di Ottalmologia Ann. 17, Fasc. 1.

Derselbe, Sull' anatomia della regione interna della retina dei Mammiferi. Nota istologia. — Ebenda Fasc. 2.

Retterer, Ed., Note sur la structure de l'iris chez les mammifères. — Comptes rend. hebdomadaires de la Société de Biologie. 8. S. T. V., p. 319—323.

Verf. kommt zu folgenden Resultaten: Faserzellen finden sich nur im Sphinkter der Iris; die Bruch'sche Membran ist (bei den untersuchten Säugern) nicht aus Faserzellen zusammengesetzt; dilatatorische Muskelbündel sind in der Iris nicht vorhanden.

Sardemann, E., Beiträge zur Anatomie der Thränendrüse. — Ber. naturf. Gesellsch. Freiburg. Bd. III, p. 95—125.

Tuckermann, Fred., Note on the Papilla foliata and other Taste Areas of the Pig. — Anatom. Anz. III. Jahrg., p. 69—73.

Verf. beschreibt die Pap. foliatae, die Pap. circumvallatae und die Pap. fungiformes des Schweines.

Derselbe, Observations on the Structure of the Gustatory Organs of the Bat (*Vespertilio subulatus*). — Journ. of Morphology Vol. II, p. 1—6. Mit 1 Tfl.

Derselbe, On the Gustatory Organs of *Putorius vison*. — Anatom. Anz. III. Jahrg., p. 941—842.

Verf. beschreibt zunächst die Zunge des amerikanischen Nörzes, darauf die eigentlichen Geschmacksorgane. *Papillae circumvall.* wurden in 2 Paaren angetroffen, während in der Regel 3 Paar vorhanden sind. Tastkörperchen sind nicht sehr zahlreich.

Derselbe, *The Tongue and Gustatory Organs of Fiber zibethicus.* — *The Journ. of Anat. and Phys. New S. Vol. II, p. 135—141.* Mit 1 Tfl.

Zunächst Beschreibung der Zunge in toto, dann der *Papilla circumvallata*, der 2 *Pap. foliatae* und der *Pap. fungiformes*. Im unteren Teil der *Pap. circumv.* liegt ein grosses Ganglion in einer bindegewebigen Hülle, von ihm aus gehen Nerven zu den Geschmacksknospen.

Willach, P., Ueber die Kristalllinse bei Säugetieren. Osterwieck 1888 (1887?). Dissertation, Erlangen.

Gefässsystem. Formad, H. F., *Comparative studies of Mammalian Blood.* — *The Journ. of Comp. Med. and Surg. Vol. IX. p. 254—312.* Mit 6 Tfln. und 15 Textfig.

Zunächst allgemeine Bemerkungen über das Blut; dann Vergleich und Unterscheidung von frischem menschlichem und Säugetierblut; Erkennung und Nachweis von menschlichem Blut in Criminalfällen, nebst Bemerkungen hierzu.

Frédéricq, L., *La pulsation du coeur chez le chien.* — *Arch. de Biol. Tom VIII, p. 493—622.* Mit Figg.

1. *Sur le tracé cardiographique des ventricules.* 2. *Sur le tr. card. des oreillettes.* 3. *Sur les phénomènes électriques de la systole ventriculaire.*

Gosse, H., *Dimensions des globules du sang chez différents animaux.* — *Arch. des sciences phys. et nat. III. Période, T. XXX, p. 311—312.*

Verf. teilt kurz mit, dass Messungen von Blutkörperchen ausgeführt an Photographien, welche mit starken Vergrösserungen erzeugt sind, das beste Mittel zur Unterscheidung von Blut verschiedener Herkunft ist. Bei einer und derselben Tierart zeigen sich Grössenverschiedenheiten je nach dem Alter des Tieres (Rind, Kalb). Auch Castration beeinflusst die Blutkörperchen.

Gutmann, G., Ueber die Lymphbahnen der Cornea. — *Arch. f. mikr. Anat. Bd. 32, p. 593—* Mit 3 Tfln.

Verf. untersuchte mit Asphaltinjectionen die Lymphbahnen in der Cornea von Rindern, Kaninchen, Schweinen und Menschen und stellte so Bilder der Saftlücken her.

Halliburton, W. D., *On the Coagulation of the Blood. Preliminary Communication.* — *Proc. R. Soc. London. Vol. 44, p. 255—268.*

Verf. fand durch Untersuchungen am Blut von Katzen folgendes: 1. Lymphzellen liefern als eins ihrer Zersetzungsprodukte ein Globulin, welches man Zellglobulin nennen kann. Dasselbe besitzt die bisher dem Fibrinferment zugeschriebenen Eigenschaften. 2. Fibrinferment, wie es aus dem getrockneten alkoholischen Niederschlag von Blut-

serum gewonnen wird, erweist sich concentrirt als Globulin mit den Eigenschaften von Zellglobulin. 3. Das durch Salzlösungen aus dem gewaschenen Blutgerinsel („blood clot“) ausgezogene Fibrinferment ist ein ebenfalls mit Zellglobulin identisches Globulin. 4. Serumglobulin aus Wasserbruch- („hydrocele“) Flüssigkeit präparirt, hat keine fibrinoplastischen Eigenschaften; es ist vielleicht besser Plasmaglobulin zu nennen. 5. Aus Serum gewonnenes Serumglobulin hat ausgeprägte fibrinoplastische Fähigkeiten. Dies rührt daher, weil es aus Plasmaglobulin und Zellglobulin, entstanden bei der Zersetzung der weissen Blutkörperchen, besteht. 6. Der Grund der Gerinnung des Blutes ist zunächst die Zersetzung der weissen Blutkörperchen; diese setzen Zellglobulin in Freiheit, welches als Ferment wirkt und Fibrinogen in Fibrin umsetzt. — Bestätigung und Erweiterung von Hammarsten's Ansichten, Gegensatz zu Wooldridge, welcher a. a. O. p. 282—284 eine Erwiderung veröffentlicht, wesentlich chemisch-physiologischen Inhalts.

Hochstetter, Ferd., Zur Morphologie der Vena cava inferior. — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 867—872.

Vorwiegend polemischen Inhalts, gegen die Angriffe Kerschner's gerichtet.

Derselbe, Ueber das Gekröse der hinteren Hohlvene. — Anatom. Anz. III. Jahrg., p. 965—974. Mit 3 Abbildgn.

Wahrscheinlich existirt bei allen Wirbeltieren, welche eine hintere Hohlvene haben, in der Anlage wenigstens, ausser dem dorsalen und ventralen Darmgekröse ein drittes Längsgekröse, welches den rechten dorsalen Rand der Leber mit der Wurzel des dorsalen Darmgekröses verbindet und sich bei den Säugetieren (und Vögeln) auch noch über die Leber hinaus nach vorn erstrecken kann. Dies Gekröse wird zum Träger des selbständig entstehenden Hohlvenenabschnittes.

Keibel, Franz, Netzbeutelbildungen in der Bruthöhle. — Anatom. Anz. III. Jahrg., p. 234—237. Mit 1 Abbildg.

Verf. beschreibt eine eigentümliche Netzbeutelbildung in der Bruthöhle eines gemeinen Bären, gebildet von einer die Vena cava inf. einschliessenden Pleuraduplikatur. Von einer Reihe auf diese Befunde untersuchter anderer Säugetiere zeigte nur ein Murmeltier eine ähnliche Bildung. Verf. vermutet, dass diese Netzbeutelbildungen durch Fetteinlagerungen bedingt seien, welche für die winterliche Schlaf- und Fastenzeit von Wichtigkeit sind.

Kerschner, Ludw., Zur Morphologie der Vena cava inferior. — Anatom. Anz. III. Jahrg., p. 808—823.

Eine Arbeit allgemeineren Inhalts, in der auf Säugetiere im Besonderen nicht eingegangen wird.

Derselbe, Nochmals zur Morphologie der Vena cava inferior. — Anatom. Anz. III. Jahrg., p. 943—947.

Wesentlich polemischen Inhalts.

Mc William, J. A., On the Rhythm of the Mammalian Heart. — Proc. R. Soc. London. Vol. 44, p. 206—208.

Untersucht werden Katze, Hund, Kaninchen, Ratte, Meerschweinchen, Igel.

Derselbe, Inhibition of the Mammalian Heart. — Ebenda p. 208—213.

Verf. beschreibt folgende Versuche resp. deren Resultate: Durchschneidung der Vagi, Reizung des Vagus, Wirkung desselben auf die Auriculae cordis, sowie auf die Ventrikeln. Ferner erörtert er die Wirkungen, welche eine auf eine bestimmte Stelle („inhibitory area“) an der dorsalen Seite der Aurikel-Oberfläche gerichteter elektr. Strom erzeugt: rapide, zuckende Bewegung der Auriculae, Verlangsamung oder Stillstand der Ventrikelbewegung. Zum Schluss einige Mitteilungen über den Effekt von Reizungen der Mündungsstellen der grossen Gefässe bei abnormen Zuständen, wie Asphyxie etc.

Munk, H., Weitere Untersuchungen über die Schilddrüse. — Sitzungsber. Kgl. Preuss. Akad. Wissensch. Berlin. Jahrg. 1888, p. 1059—1093.

Verf. erörtert eingehend die bei Hunden nach Exstirpation der Schilddrüse auftretenden Krankheitserscheinungen, die nach ihm aus Reizungen entspringen, welche die in der Umgebung der Drüse befindlichen Nerven erfahren. Lediglich die entzündliche Schwellung der Schilddrüsenlappen wird dem Tier verhängnissvoll, was auch der Fall sein würde, wenn keine Exstirpation der Drüse erfolgte. Beim Affen treten dieselben wesentlichen Krankheitserscheinungen nach der erwähnten Exstirpation auf wie beim Hunde, während bei anderen Tieren Verschiedenheiten wahrzunehmen sind. Diese beruhen wohl weniger auf verschiedenartiger Funktion als auf verschiedenartiger Empfindlichkeit der betr. Tierarten.

Rojecki, F., Note sur la disposition des troncs artériels des membres chez les singes du genre Macaque considérés par rapport à ceux des singes antropomorphes et de l'homme. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 281—284.

Tauber, A. S., Ueber die Topographie der Schilddrüse bei den Haustieren. Eine anatomisch-physiologische Studie. Wratsch 1888, No. 8 ff. (Russisch).

Virchow, H., Ueber Augengefässe der Carnivoren nach Untersuchungen des Herrn Bellarminow. — Arch. f. Anat. u. Phys. Physiol. Abtlg. Jahrg. 1888, p. 552—556.

Referat mit sehr vielem Detail. Von Carnivoren werden nur Hund und Katze genannt.

Waller, Aug. D., On the Electromotive Charges connected with the Beat of the Mammalian Heart, and of Human Heart in particular. — Proc. R. Soc. London. Vol. 44, p. 331.

Nur ein ganz kurzer Auszug.

Verdauungsorgane. von Brunn, Ueber Membrana praeformativa und Cuticula dentis. — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 506 bis 508. (Rev. Verh. Anat. Gesellsch. Versammlg. Würzburg 1888).

Verf. teilt mit, dass er die Membr. praeformativa genau so gefunden, wie sie zuerst von Raschkow beschrieben wurde. Da man nach

Beginn der Dentinbildung zwischen ihr und dem Rande des jungen Elfenbeins keine deutliche Grenze erkennen kann, so muss man daraus schliessen, dass die Membran verkalkt und die äusserste Dentinlage bildet. Die Cutic. dent. lässt sich leicht an Zähnen, welche dem Durchbruch nahe sind, nachweisen, besonders schön am Eckzahn eines 16—18 Tage alten Kätzchens. Deutlich sieht man, dass sie sich zwischen dem Schmelz und dem inneren Schmelzepithel befindet. Sie muss daher nach Beendigung der Schmelzbildung vom Schmelzepithel abgesondert sein.

Cope, E. D., weist kurz auf die Entdeckung von Zähnen bei *Ornith. anatinus* (vergl. unten Poulton) hin und schliesst hieraus, dass die Multituberculata wahrscheinlich Monotremen und nicht Marsupialier seien. (Am. Nat. XXII., p. 259.)

Döbner, Merkwürdiges Vorkommen im Gebiss eines Luchses. — Zool. Garten Jahrg. 1888, p. 346.

Der Schädel enthält in beiden Unterkieferhälften M 2.

Edelmann, R., Die Fortschritte auf dem Gebiet der Verdauungslehre unserer Haussäugetiere im letzten Dezennium. — Tiermedizin. Vortr. Bd. 1, Hft. 2. Halle 1888.

Ellenberger, Ueber das Vorkommen der Hakenzähne (dentes canini) bei Pferden. — Ber. üb. d. Veterinärwesen im Kgr. Sachsen für d. Jahr. 1887, p. 2—18.

Flesch, Max, Ueber Beziehungen zwischen Lymphfollikeln und secernierenden Drüsen im Oesophagus. — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 283—286. Mit einer Abbildung

Im oberen Teil des Oesophagus des Menschen und einiger Säugetiere stehen acinöse Drüsen mit Lymphfollikeln in direkter Verbindung, bei anderen Säugetieren dagegen nicht, z. B. beim Hunde, wo in der Speiseröhre Lymphfollikel fast ganz fehlen. Verf. meint, dass das Drüsensekret durch die von den Follikeln abgegebenen Lymphzellen chemisch verändert werde.

Galippe, Note sur les altérations des dents sous l'influence d'un séjour prolongé dans le sol. — Comptes rend. hebd. Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 572—574.

Verf. beschreibt die durch Mikroorganismen verursachten Veränderungen der Struktur von Zähnen, welche längere Zeit in der Erde lagen. (Vergl. Ber. f. 1887, p. 13, Roux.)

Kaufmann, Application de la méthode graphique à l'étude de la sécrétion parotidienne chez le cheval. — Comptes rend. hebd. Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 815—816.

Verf. untersucht die Speichelabsonderung der Parotiden vermittelt einer Fistel im Ductus Stensonianus, welche mit einem Registrirmanometer verbunden wird. Beim Kauen der Nahrung findet an der Seite, wo das Pferd gerade kaut, eine stärkere Speichelabsonderung statt als an der entgegengesetzten. Ebenso tritt bei jedem einzelnen Biss ein stärkerer Speichelfluss ein als in der Zwischenzeit, in der sich die Kinnladen von einander entfernen.

Killian, G., Ueber die Bursa und Tonsilla pharyngea. — Morphol. Jahrb. Bd. 14., p. 618—711. Mit 2 Tfn. und 43 Textfig.

Verf. untersuchte ein reiches Material vom Menschen, sowie eine Reihe von Wirbeltieren, meistens Säugern. Bei den meisten untersuchten Säugern fehlt die als Rachentasche bezeichnete Ausstülpung der Rachenschleimhaut gegen das Hinterhauptbein. Sie wurde gefunden bei *A. marmota*, *Sus scrofa*, *C. capreol.*, *Ursus* (nach anderen Autoren). Verf. schliesst sich an Schwabach an, welcher die als Rachentaschen bezeichneten Bildungen bei Erwachsenen als sekundär und als meist pathol. Erzeugnisse der Rachentonsille auffasst, und empfiehlt bei Erwachsenen statt Bursa pharyng. „Recessus“ oder „Pseudobursa“ zu sagen.

Betreffs der Rochentonsille wird constatirt, dass sie beim Menschen vom 6. Embryonalmonat bis zum Ende des 2. Dezenniums aus der Basisphenoidalgegend in die Basioccipitalgegend rückt. Sie ist bei den Säugern nicht so constant wie die Gaumen-, doch ebenso häufig wie die Zungentonsille. Ausser dem Menschen besitzen die Haustiere besonders grosse Rachentonsillen, was vielleicht auf die Lebensweise, den langen Aufenthalt in geschlossenen (staubigen) Räumen zurückzuführen wäre, möglicherweise auch mit Ernährungsverhältnissen in Zusammenhang steht.

In einem Nachwort erklärt sich Verf. gegen die Ansicht Schwabach's das der „Recessus pharyngeus med. embryonalis“ resp. die Bursa pharyngea embryonalis zur Rachentonsille gehöre und ihre Entwicklung einleite.

Lataste, Fernand, Des dents exceptionnellement monophysaires chez les mammifères diphyodontes. — Comptes rend. hebd. Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 37—41.

Verf. zählt die Fälle auf, in denen bei diphyodonten Säugetieren einzelne Zähne nicht gewechselt werden. Den ersten Pm. von Schwein, Robbe und Hund, welcher nicht gewechselt wird, sieht Verf. als zur zweiten Dentition gehörig an.

Loder, E. G., macht einige Angaben über einen ausserordentlich grossen Stosszahn eines afrikan. Elefanten. Derselbe hatte eine Länge von 9 Fuss 5 Zoll (engl.). (Proc. Zool. Soc. London 1888, p. 87.)

Moussu, Nerf moteur ou sécréteur de la glande parotide chez le boeuf. — Comptes rend. hebd. Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 280—281.

Verf. weist hin auf einen zur Parotis gehenden Zweig des Buccalnerven, „nerf parotidien“, welcher besonders geeignet ist zum Studium am lebenden Tier.

Nehring, A., Ueber die Form der unteren Eckzähne bei den Wildschweinen, sowie über das sogen. Torfschwein (*Sus palustris* Rütimeyer). — Sitzgsber. Ges. naturf. Freunde. 1888, p. 9—16.

Verf. erläutert zunächst, dass bei den verschiedenen Arten der Wildschweine die Querschnitte der unteren Eckzähne männlicher Individuen charakteristische Conturen zeigen. Sodann entwickelt er die Ansicht, „dass die Charaktere, durch welche sich *Sus palustris* Rüt. von *Sus scrofa ferus* unterscheiden soll, keine spezifischen sind,

sondern als Folgen einer primitiven Domestikation in Verbindung mit knapper Nahrung und rauher Lebensweise erscheinen.“

Poulton, Edw. B., True Teeth in the young *Ornithorhynchus paradoxus*. — Proc. R. Soc. London. Vol. 43, p. 353—356. Mit 1 Holzschn.

Verf. fand bei der Untersuchung einer Schnittserie durch den Kopf eines jungen Schnabeltiers echte Säugetierzähne in den subepithelialen Geweben des Daches der Mundhöhle. Später wurden sie auch im Unterkiefer festgestellt. Wahrscheinlich finden sich in jeder Kieferhälfte 3 Zähne. Der vorderste weicht in der Form von den andern ab und ist von ihnen durch ein Diastema getrennt. Er ist einspitzig, während die beiden hinteren mehrspitzig sind, im Oberkiefer mit 2 inneren, im Unterkiefer mit 2 äusseren Hauptspitzen. Die histologischen Befunde stimmen mit dem für Säugetierzähne typischen Verhalten. Diese Uebereinstimmung spricht dafür, dass die Zähne der höheren Säuger einen mehr ursprünglichen Typus bewahrt haben als die übrigen Organe.

Ranvier, L., Le mécanisme de la sécrétion. — Journ. de Micrographie. T. 12. p. 3—11, 33—41, 65—73, 104—111, 165—173, 212—218, 243—250, 298—303, 329—335, 364—368, 389—393.

Vorlesungen R.'s am Collège de France, stenographirt von J. Pelletan. Forts. — Behandelt im Wesentlichen die Speicheldrüsen und zwar zur Hauptsache von Säugetieren. P. 3—6 wird erörtert, dass bei den simplicidenten Nagern 3 Paar sublinguale Speicheldrüsen vorhanden sind (submaxillaris, retrolingualis und sublingualis), bei den duplicidenten dagegen nur zwei (submax. u. subling.). Es ist dies ein gutes Unterscheidungsmerkmal der beiden Gruppen. Weiter werden eingehend behandelt die Speicheldrüsen von Igel, Maulwurf und mehreren Fledermäusen.

Sanson, André, Puissance digestive des muets. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 316—318.

Verf. zeigt, dass Maultiere besser das Futter verdauen als Pferde.

Seeley, H. G., On the Nature and Limits of Reptilian Character in Mammalian Teeth. — Proc. R. Soc. Vol. XLIV p. 129—141.

Verf. setzt auseinander, dass die morphologischen Verhältnisse der Zähne bei den Säugetieren sich so vereinfachen können, dass die Säugetierzähne sonst für die Reptilien typische Charaktere annehmen. Umgekehrt können auch Reptilienzähne die Merkmale von Säugetierzähnen tragen (Empedias-Chrysochloris).

Verardini, F., Intorno la chirurgia del Pancreas sostenuto da esperimenti sopra animali vivi e da fatti clinici. — Mem. R. Accad. Sc. Istit. de Bologna. S. IV. T. IX., p. 245—250.

Grösstenteils Zusammenstellung der bisherigen Ergebnisse.

Wilckens, M., Beitrag zur Kenntniss des Pferdegebisses mit Rücksicht auf die fossilen Equiden von Maragha in Persien. — Nova Acta Leop. Bd. 52, Nr. 5. Mit 8 Tfln.

In der Einleitung giebt Verf. eine tabellarische Uebersicht über die Backenzahngebisse von *Hipparion medit.*, *Equus foss.* und *Equus caball.* nach den Angaben Rüttimeyer's und erläutert dann die Rassenunterschiede am Backenzahngebiss der lebenden Pferde unter Berücksichtigung der Angaben von Franck (Oberkieferbackenz.). Beim orientalischen Pferde ist der Breitendurchm. der oberen Backenzähne grösser oder mindestens so gross wie der Längsdurchmesser, beim occidentalischen ist er kleiner. Ferner ist beim abendländischen Pferde die Kräuselung der Schmelzfalten stärker als bei den morgenländ. Schlägen und dadurch bedingt ragt bei ersterem das Vorderhorn der Hintermarke weiter über das Hinterhorn der Vordermarke als bei den Orientalen, wie auch bei letzterem der sogen. „Sporn“ (eine kleine Falte an der Hinterbucht des Innenrandes der ob. Backenz.) weniger entwickelt ist oder gar fehlt. Ebenfalls durch die stärkere Schmelzkräuselung verursacht ist die stärkere Zweilappung des Pfeilers an der Innenwand des Vorderjochs beim abendländischen Pferd. Endlich zeigen auch die beiden Aussenfalten Verschiedenheiten je nach der Rasse. Auch die von Franck nicht berücksichtigten unteren Backenz. sind bei den beiden Pferdegruppen verschieden. Ein Mittelstellung zwischen abendländischen und morgenländischen Pferden nimmt das aus der Kreuzung beider hervorgegangene englische Rennpferd ein. Sodann wird erörtert, dass die Geschlechtsfolge von *Hipparion* durch *Equus foss.* zu *E. asin.* und den beiden Gruppen des lebenden *E. caball.* nicht angenommen werden darf, sondern für die beiden recenten Gruppen verschiedene Stammformen existirt haben. Wichtig für diese Frage sind die bei Maragha in Nordwest-Persien aufgefundenen Equidenreste. Dieselben gehören überwiegend zu *Hipparion*, während ein kleiner Teil einem echten *Equus* entstammt, welcher als *E. foss. persicus* bezeichnet wird. Es folgt dann eine eingehende Untersuchung und Vergleichung der Hipparionzähne gegenüber Pferdezähnen, wobei eine Auseinandersetzung über die Schneidezähne der Equiden eingefügt wird. (Unterschiede von „Fohlenzähnen“ = Milchschnidez. des Pferdes, „Pferdezähnen“ = Ersatzschnidez. des Pferdes, und Eselszähnen durch die Form der Zähne und ihre Schmelzfalten). Interessant ist der Umstand, dass die Milchschnidez. der recenten Pferde die Form der Ersatzschnidez. von *Hipparion* wiederholen. Verf. kommt auf Grund der angedeuteten Untersuchungen der Fossilreste von Maragha zu dem Resultat, dass das Hipparion und das fossile Pferd Persiens als Stammform der morgenländischen Pferde, das pikermische bzw. europäische Hipparion und dessen fossile *Equus*-Nachkommen als Stammform der abendländischen Pferde zu betrachten sind.

Athmungsorgane. Brown-Séguard et d'Arsonval, Nouvelles recherches démontrant que les poumons sécrètent un poison extrêmement violent qui en sort avec l'air expiré. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T V., p. 33—37.

Mit der ausgeathmeten Luft wird aus den Lungen des Menschen und der Säugetiere ein Gift ausgeschieden, welches nach den Unters.

der Verf. zu den flüchtigen organischen Alkaloiden gehört. Versuche an Kaninchen mit Einspritzung einer flüssigen Lösung des Giftes in das Blut und unter die Haut.

Bemerkungen hierzu von R. Wurtz ebenda p. 41—42, ferner von Dastre ebenda p. 43—44.

Dieselben, Nouvelles remarques à l'égard du poison pulmonaire. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 54—56.

Dieselben, Toxicité de l'air expiré, nouvelles recherches. — ebenda p. 90—91.

Dieselben, Remarques sur la valeur des faits qui nous ont servi à démontrer la toxicité de l'air expiré. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 99—104.

Weitere Mitteilungen von Brown-Séquard und d'Arsonval über das Gift der Atemluft ebenda p. 108—110, 151—153.

Dastre, Note au sujet de la toxicité des produits de condensation pulmonaire. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 43—44.

Verf. zeigt, dass das in der ausgeathmeten Luft enthaltene Gift nicht immer gleich wirkt.

Dastre, A., et Loye, P., Recherches sur la toxicité de l'air expiré. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 91—

Verf. suchen nachzuweisen, dass das von Brown-Séquard u. A. in der ausgeathmeten Luft gefundene Gift entweder nicht constant oder normaler Weise quantitativ nicht genügend ist, um schädlich zu wirken.

Dubois, Raphael, Sur le mécanisme respiratoire chez la Marmotte pendant le sommeil hibernant et pendant le sommeil anesthésique. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 841—842.

Verf. constatirt Verschiedenheit des Athmungsmechanismus beim murmelnd im Winterschlaf und im wachen Zustand.

Spoon, W. L., veröffentlicht eine Beobachtung über das Athmen von *Fiber zibethicus* unter dem Eise zugefrorener Gewässer. (Am. Nat. XXII., p. 539—540).

Exkretionsorgane. Guarnieri e Magini, Studi sulla fine struttura delle capsule surrenali. Nota preventiva. — Atti della R. Accad. di Lincei S. 4. Rendiconti Vol. IV, p. 844—847.

Vergl. u.

Dieselben, Etudes sur la fine structure des capsules surrenales. — Arch. ital. de Biol. T. X, p. 379—384.

Studien über die Nebennieren von Kaninchen, Meersch., Ratte, Hund, Rind und Mensch.

Hochstetter, Ferd., Ueber den Einfluss der Entwicklung der bleibenden Nieren auf die Lage des Urnierenabschnittes der hinteren Cardinalvenen. — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 938—940. Mit 2. Abbildgn.

Innerhalb eines Tages drängen die in der Entwicklung begriffenen bleibenden Nieren die Endabschnitte der Urnieren samt den entsprechenden Abschnitten der hinteren Cardinalvenen von der Aorta

und der Wirbelsäule ab. Veranlasst durch den Druck der Nierenanlagen entwickelt sich aus der hinteren Cardinalvene eine neue, anfangs schwache Vene, welche sich über die dorsale Fläche der Nierenanlage erstreckt und dann wieder in die hintere Cardinalvene mündet. Später weitere Veränderungen.

Rex, Hugo, Beiträge zur Morphologie der Säugerleber. — Morphol. Jahrb. Bd. 14, p. 517—617. Mit 5. Tfn.

Verf. untersucht die allgem. Formverhältnisse der Säugerleber, die allgem. und die speziellen Formverhältnisse des Portalbaumes und der Lappung der Säuglerl., die Gallengangsverästelung, dieselben Verhältnisse beim Menschen und endlich die Venae hepat. bei Säugern und Menschen.

Tizzoni, G., Sugli effetti dell' asportazione delle capsule surrenali nel cane. — Mem. R. Accad. Sc. Istit. die Bologna S. IV T. IX, p. 73—78.

Vergl. u.

Tizzoni, G., Ablation des capsules surrénales chez le chien. — Arch. ital. de Biol. T. X, p. 372—378.

Extirpation der Nebennieren bewirkt beim Hunde den Tod des Tieres unter denselben Todes-Erscheinungen und denselben Veränderungen des Nervensystems, wie beim Kaninchen. Diese Wirkungen werden auch erzielt durch die Abtragung nur einer Nebenniere. Der Tod tritt erst mehrere Monate nach der Operation ein, so dass er nicht als Folge der Verwundung bei dem operativen Eingriff anzusehen ist. Die Veränderungen des Nervensystems zeigen den Zusammenhang der Nebennieren mit gewissen Regionen des Rückenmarks.

Fortpflanzungsorgane. Albrecht, M., Zu den Anomalien der Geschlechtsorgane beim Pferde. — Wochenschr. f. Tierheilkunde u. Viehz. Augsburg, Bd. XXXI, 1887! p. 309—312.

van Beneden, Ed., De la fixation du blastocyste à la muqueuse uterine chez le Murin (*Vespertilio murinus*). — Bull. Acad. R. Belgique. 4. Série, T. XV, p. 17—27. Mit einer Tafelerklärung ohne Tafel!

Nach den Unters. des Verf. geht bei *Vesp. murin.* das Epithel des Uterus während der Placentation zu Grunde und nimmt daher nicht an der Bildung der Placenta teil. Die Uterindrüsen stehen in keiner Beziehung zur Placenta, wodurch die Existenz von „Utermilch“ hinfällig wird. Schon vor der Entstehung der Primitivrinne, wenn der Embryo nur zwei Keimblätter aufweist, ist die Verbindung embryonalen Epiblastes mit der Mucosa des Uterus so innig, dass man die einzelnen Elemente nicht trennen kann.

Derselbe, De la formation et de la constitution du placenta chez le Murin (*Vespertilio murinus*). — Bull. Acad. R. Belgique p. 351—364.

Ausser den oben erwähnten Resultaten der vorigen Arbeit weist Verf. nach, dass sowohl das Epiblast des Embryos als auch

die umgewandelte Uterinmucosa die epithelartige und kernhaltige äussere Schicht der Placentarzotten bilden und dass nicht nur das Bindegewebe, sondern auch die Gefässwände jene Schicht bilden helfen. In Folge der Umwandlung der Gefässendothelien circulirt das mütterliche Blut in Lacunen, welche ein aus anastomosirenden Kanälen bestehendes Netz bilden. Die erwähnte äussere Schicht der Zotten hat keine sekretorische Funktion; sie trennt das mütterliche und das foetale Blut, deren Austausch osmotisch vor sich geht.

Bimar, Recherches sur la distribution des vaisseaux spermaticques chez les mammifères et chez l'homme. — Journ. Anat. Physiol. XXIX, p. 265—273. Mit 1 Tfl.

Verf. untersucht die Arterien und Venen des Hodens bei einer Anzahl von Säugetieren und findet dass hinsichtlich der Gefässe und ihres Verlaufes bei allen sich analoge Verhältnisse finden wie beim Menschen.

Derselbe, Recherches sur la distribution des vaisseaux spermaticques chez divers Mammifères. — Comptes rend. hebdomadaires des sciences. T. CV, p. 80—83.

Verf. beschreibt den Verlauf der Arterien und Venen des Penis von Rind, Schaf, Pferd, Esel, Hund, Katze, Kaninchen.

Bordé, Lu., Sul modo di distribuirsi di terminare delle fibre nervose nell' utero di alcuni mammiferi: nota preventiva (Laboratorio di anatomia microscopica e di embriologia della R. università di Bologna). — Estr. dalla Riforma medica, Anno IV Nr. 70. Modena 1888.

Boulart, R., Note sur le placenta du Cervus mexicanus. — Comptes rend hebdomadaires Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 422.

Die Untersuchung der Placenta eines Weibchens von *C. mexic.* ergab die Richtigkeit der folgenden Einteilung der Wiederkäuer:

1. Placenta diffus: Camelidae, Tragul.
2. Placenta mit wenig Kotyledonen: Moschid., Cervid.
3. Placenta mit zahlreichen Kotyl.: Giraf., Antilop., Caprid., Bovid.

Brazzola, F., Ricerche sull' istologia normale e patologica del testicolo. Nota II. La cariocinesa nel testicolo normale. — Mem. R. Accad. Sc. Istit. di Bologna. S. IV. T. IX, p. 79—95. Mit 1 Tfl.

Dasselbe in: Rendic. Accad. Sc. Istit. di Bologna 1887—88, p. 42—44.

Verf. unterscheidet in den Samenkanälchen der Säugetiere spermatozoenbildende runde Zellen (cellule spermatiche) und Fuss- oder Stützzellen.

Chapman, Henry C., Observations on the female generative apparatus of *Hyaena crocuta*. — Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1888 p. 189—91. Mit 3 Tfln.

Eine eingehende Beschreibung wird nicht gegeben, da die Befunde mit den von Watson bekannt gemachten übereinstimmen. Hervorgehoben wird der gänzliche Mangel einer Vagina und die

Durchbohrung der Clitoris durch die Urethra. Entwicklungshemmung ist der Grund der eigentümlichen Beschaffenheit der weibl. Geschlechtsorg. von *H. crocuta*.

Düsing, Ueber die Regulirung des Geschlechtsverhältnisses bei den Pferden. II. Mitteilung. — Thiel's Landw. Jahrb. XVII, p. 373—386.

Vergl. Ber. für 1887 p. 30.

Duval, Mathias, Les placentas discoïdes en général, à propos du placenta des rongeurs. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 675—676.

Bemerkungen allgemeinerer Natur, z. T. in Beziehung auf die Arbeit Frommel's (vergl. u.)

Lataste, Fernand, Matière du bouchon vaginal des rongeurs. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 817—821.

Die Substanz des „Vaginalpfropfes“ entstammt den Samenblasen; sie zeigt gleiche Reaktionen wie das Sekret der letzteren.

Derselbe, Enveloppe vaginale et vaginité exfoliante des rongeurs. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 705 bis 707.

Verf. zeigt, dass die von ihm beschriebene „enveloppe vaginale“ kein Sekretionsprodukt ist, sondern in Folge rapider Desquamation der Vaginalschleimhaut entsteht. Diese Erscheinung ist analog der in der Gynäkologie als Vaginitis exfolians bekannten Krankheit.

Derselbe, Enveloppe du bouchon vaginal des rongeurs. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 732—733.

Mikroskopische Untersuchungen bestätigten die auf makroskopischem Wege gewonnenen Ansichten des Verf. betreffs des „bouchon vaginal“.

Morau, H., Des transformations périodiques de l'épithélium de la muqueuse vaginale de quelques rongeurs. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 831—832.

Verf. beschreibt die Veränderungen, welche die Mucosa der Vagina von Mäusen eingeht während der sogen. „période génitale“ d. h. in dem Zeitraum zwischen zwei „époques génitales“, wie Verf. mit Lataste den Moment der Begattung nennt. Dieser Zeitraum beträgt bei Mäusen 10 Tage. Das anfänglich vorhandene Pflaster-epithel verwandelt sich in mehrere Schichten hoher Cylinderzellen.

Nicolas, A., Sur quelques détails relatifs à la morphologie des éléments épithéliaux des canalicules du corps de Wolff. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 337—339.

Bürstenbesätze an den Zellen des sekretorischen Abschnitts der Wolffschen Gänge; Bildung heller Tröpfchen zwischen dem Kern und der Oberfläche der Zellen in der ganzen Länge der Wolffschen Gänge. Diese Tröpfchen treten aus den Zellen aus. Erklärung nicht gegeben.

Prenant, A., Note sur la structure des spermatozoïdes chez l'homme. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 288—290.

Verf. zeigt, dass die von Jensen (vergl. Ber. f. 1887. p. 27) bei einigen Säugern beschriebenen Knöpfchen, sowie der Spiralfaden auch bei Spermatozoen des Menschen vorkommen.

Retterer, Ed., et Roger, G. H., Structure des organes génitaux d'un chien hypospade. — Comptes rend. hebd. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 574—575.

Sanfelice, F., Spermatogenesi dei vertebrati. — Boll. Soc. Naturalisti in Napoli. S. I. Vol. II, p. 43—98. Mit 2 Tfn.

S. 49—66 werden Säugetiere behandelt und zwar untersuchte Verf. *Mus decuman.* Pall., *M. decum.* Pall. var. *albina*, *M. musculus* L., *Canis familiaris* L., *Cavia cobaya* Schreb., *Myoxus quercinus* L., *Erinaceus europ.* L., *Lepus cuniculus* L., *Felis domestica* L., *Talpa europ.* L. Im Allgemeinen geht die Entwicklung der Spermatozoen in allen Klassen der Vertebr. gleichartig vor sich. Bei den Säuget. (ferner Vögeln, Reptilien) produzieren die Spermatoblasten zuerst Spermatozoen, dann Elemente, welche letztere einerseits ernähren, andererseits ausstossen. Die Ausstossung der Sperm. wird begünstigt durch die Umwandlung eines Teils der Elemente des Samenkanälchens in ein Sekret. Die Sperm. sind nicht Zellen, sondern Zellkernen gleichwertig. Die färbbaren Teile der Sperm. stammen von der chromatischen Substanz des Kernes, die nicht färbbaren von der achromatischen. Nur bei den Säugetieren fand Verf. 2 verschiedene Formen von Sperm., die sich auch durch ihr Verhalten gegen Farbstoffe unterscheiden.

Sibley, Walter K., Undescended Right Testicle, Hypertrophy of the Left One in a Monkey. — Proc. Anat. Soc. of Great Britain, 1888, p. XXIV—XXVI. Mit 2 Abbildgn.

Verf. beschreibt ein Exemplar von *Macacus sinicus* mit hypertrophirtem linken, in der Leibeshöhle zurückgebliebenem rechten Hoden und giebt allgemeine Bemerkungen über Hypertrophie der Hoden.

Sussdorf, Die Eihäute eines Fohlenzwillingspaares. — Deutsche Zeitschr. f. Tiermedizin. Bd. 14, p. 240—242.

Tourneux, F., L'organe de Rosenmüller (époophore) et le parovarium (paroophore) chez les mammifères. — Journ. Anat. Physiol. XXIV, p. 169—192. Mit 1 Tfl.

Verf. untersucht das Rosenmüller'sche Organ und das Parovarium bei folgenden Tieren: Schaf, Ziege, *Cervus frontalis*, *Ursus malayanus*, Hund, Katze, Delphin, Walfisch, Kuh, und beim Weibe. Er findet, dass das Ros. Org. im Ganzen betrachtet und auch hinsichtlich der Beschaffenheit seiner Teile dem Körper der Epididymis homolog ist. Je nach der Art des Tieres finden sich gewisse Verschiedenheiten im Bau des Ros. Org. Vom Parovarium (Paroophor) finden sich Reste in dem grossen Ligament unter dem Ovarium (Schaf, Kuh, Delphin etc.)

Turner, Wm., An Additional Contribution to the Placentation of the Lemurs. — Proc. R. Soc. London Vol. 44, p. 277—282.

Verf. beschreibt einen graviden Uterus von *Lemur xanthomystax*. Derselbe stimmt im Wesentlichen überein mit den Befunden, welche

T. an *Propithecus diadema*, *Lemur rufipes*, *Indris brevicaudatus* feststellte (Philos. Trans. R. Soc. London 1876). Es bestätigt sich, dass die Placenta der Lemuren diffus, dass keine Decidua vorhanden und dass die Allantois als grosser Sack erhalten bleibt bis zur Zeit der Geburt. In den placentalen Charakteren finden sich also tief greifende Unterschiede zwischen Lemuren einerseits, Affen und Menschen andererseits, weshalb man erstere im System von letzteren trennen muss. In einer Nachschrift wird erwähnt, dass sich bei den untersuchten Arten, sowie bei *Propith. diadema* ein Epitrichium findet.

Woodward, M. F., Rabbit with an Undescended Testis, with Notes on the Descent of the Testis in the same Animal. — Proc. Anat. Soc. of Great Britain, 1888, p. XXI—XXIII. Ait 1 Abbildg.

Verf. beschreibt an einem 5—6 Monate alten Kaninchen, dass der rechte Hode im Skrotum sich befand, während der linke in der Leibeshöhle, dicht hinter der linken Niere lag. Allgemeinere Bemerkungen über Lage und Wanderung der Hoden bei den Säugetieren.

Entwicklung.

Allgemeines. Beard, J., A contribution to the morphology and development of the nervous system of Vertebrata. — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 874—884 und 899—905.

Säugetiere nur nebensächlich behandelt.

Czermak, Nic., Vergleichende Studien über die Entwicklung des Knochen- und Knorpelgewebes. — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 470—480.

Verf. giebt in 41 Sätzen die Resultate einer eingehenden Arbeit.

Drew, J., Notes on a Difficulty in Evolution. — Proc. Cotteswold Nat. Field Club 1888, p. 285—288.

Durand, J. P., La genèse naturelle des formes animales. — Rev. Sc. Nat. XLI, 741—752.

Gadow, H., On the Modifications of the First and Second Visceral Arches, with especial reference to the Homologies of the Auditory Ossicles. — Philos. Trans. CLXXIX, p. 451—486. Mit 4 Tfn.

Es werden vorzugsweise niedere Wirbeltiere untersucht, doch auch Säuger berücksichtigt. Verf. kommt zu dem Schluss, dass die Gehörknöchelchen, welche alle dieselbe Funktion haben, als ein einziges Organ angesehen werden müssen, welches einen Ursprung hat, nämlich den Zungenbeinbogen. Das Quadratum entspricht bei den Säugetieren dem Annulus tympanicus.

Ontogenie. Aswadouroff, K., Comparaison du développement des muscles chez l'embryon humain et chez les animaux à l'état adulte. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V, p. 677—678.

Verf. findet bei der Vergleichung der Muskelgruppen eines fünfmonatlichen menschlichen Embryos mit den entsprechenden erwachsener Kaninchen und Meerschweine, dass die am höchsten entwickelten Muskeln des menschlichen Embryos den weissen Muskeln

der genannten erwachsenen Tiere entsprechen. Diese weissen Muskeln sind höher entwickelt als die roten.

Behrends, G. J., Beiträge zur Kenntniss der Entwicklung des Nervus opticus und des Glaskörpers bei den Säugetieren. — Diss., Erlangen 1888. Mit 1 Tfl.

Verf. stellte seine Untersuchungen an Embryonen von *Mus musc.*, *Didelphys virg.*, *Lepus cunic.*, *Talpa europ.* und *Felis dom.* an und gelangte zu folgenden Resultaten: 1) Bei der Einbuchtung der primären Augenblase stülpt sich zugleich auch der Augenblasenstiel ein. 2) Der Nervus opticus bildet sich aus zwei verschiedenen Anlagen, dem Opticusstiel und dem Retinastiel. 3) Die Sehnervfasern entstehen gleichzeitig in der ganzen Länge des Opticus. Der Augenblasenstiel ist also „kein“ blosses Leitgebilde, sondern bildet direkt Nervenfasern. 4) Der Glaskörper bildet sich aus Mesodermzellen, welche durch den Augenbecherspalt einwachsen. (Retinastiel nennt Verf. denjenigen Teil des bei der Einstülpung der primären Augenblase zugleich eingebuchteten Augenblasenstiels, welcher mit der Retina in direktem Zusammenhang steht, Opticusstiel den nicht eingestülpten Teil des Augenblasenstiels, welcher sich direkt in die Pigmentschicht des Augenbeckers fortsetzt).

Bergonzini, C., Contributo allo studio della spermatogenesi nei vertebrati. — La Rassegna di science mediche. Anno III, p. 337—344. Modena 1888.

Biehringer, Joachim, Ueber die Umkehrung der Keimblätter bei der Scheerm Maus (*Arvicola amphibius* Desm.). — Arch. f. Anat. u. Phys. Anat. Abtlg., Jahrg. 1888, p. 279—286. Mit 1 Tfl.

Verf. konstatirt, dass die Umkehrung der Keimblätter bei *Arvicola amphib.* in gleicher Weise wie bei den bisher untersuchten Nagern durch Einwachsen eines aus den „Rauberschen Zellen der Deckschicht“ (Köl liker) sich entwickelnden soliden Zapfens (Träger Selenka's) in die Keimblase vor sich geht. In Bezug auf spezifische Besonderheiten schliesst sich in der genannten Beziehung *Arv. amphib.* am nächsten an *Arv. arvalis* an (Untersuchungen von Kupffer).

Biondi, Ueber Zwischenkiefer. — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 577—578. (Ref. aus den Verhandl. Anat. Gesellsch. Versammlg. Würzburg 1888.)

Verf. zeigt an Präparaten von Schweins-, Schaf- und menschlichen Embryonen zwei Ossifikationspunkte für jeden Zwischenkiefer. (Vergl. unten Köl liker).

Bizzozero, G., Ueber die Regeneration der Elemente der schlauchförmigen Drüsen und des Epithels des Magendarmkanals. — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 781—784.

Nach den Untersuchungen des Verf. spielen die sogen. Ersatzzellen bei der Regeneration des Magendarmepithels keine Rolle. Die schlauchförmigen Drüsen des Darmes unterscheiden sich dadurch von den wahren Drüsen, dass bei ersteren das Epithel eine direkte Fortsetzung des Ueberzugsepithels ist, zu welchem ihr Ausführungs-

gang in Beziehung steht und an dessen Funktion das Darmdrüsenepithel teil nimmt.

Bonnet, R., Ueber die Entwicklung der Allantois und die Bildung des Afters bei den Wiederkäuern und über die Bedeutung der Primitivrinne und des Primitivstreifs bei den Embryonen der Säugetiere. — *Anatom. Anz.* III. Jahrg. p. 105—126. Mit 9 Abbildgn.

An Schafembryonen fand Verf., dass noch vor dem Verschluss des Amnions die erste Anlage der Allantois als ein im Keimblasen-Coelom am Caudalende des Embryos gelegener Höcker auftritt. Dieser Allantoishöcker kann als caudale Darmausstülpung betrachtet werden, da er eine mit dem Hinterdarm communicirende Höhle enthält. Bald nach der ersten Anlage zeigt die Allantois der Wiederkäuer die Neigung zur Annahme der Sichelform, nicht derjenigen einer kugeligen Blase, wie bei andern Säugern. Bezüglich der Entstehung des Primitivknotens und der Primitivgrube schliesst sich Verf. den Ansichten Kupffer's an und betrachtet diese Vorgänge als Gastrulation. In der Primitivrinne sieht er den spaltförmig ausgezogenen Urmund, in den Primitivfalten die Urmundlippen und in dem ursprünglich rein epithelialen Primitivstreifen, von dessen Flanken, während er sich noch nach hinten verlängert, die Mesenchymproduktion beginnt, die aus invaginirtem Ektoblast bestehende, verdickte Wand der Gastrulhöhle.

Derselbe gab auf der Würzburger Anatomen-Versammlung Erläuterungen zur Entwicklungsgeschichte des Schafes unter Vorlegung von Präparaten und Zeichnungen. Er behandelte die erste Anlage des Mesoblasts, die Bildung der Aftermembran und Allantois, die erste Anlage der Urniere und des Wolff'schen Ganges. *Anatom. Anz.* III. Jahrg., p. 714—717.

Born, G., Ueber die Bildung der Klappen, Ostien und Scheidewände im Säugetierherzen. — *Anatom. Anz.* III. Jahrg. p. 606—612. Mit 3 Abbildgn. (Verh. Anat. Gesellsch. Versammlg. Würzburg 1888).

Verf. beschreibt Entwicklungsvorgänge am Herzen von Kaninchenembryonen unter Berücksichtigung einiger anderer Säuger.

Carius, Friedr., Ueber die Entwicklung der Chorda und der primitiven Rachenhaut bei Meerschweinchen und Kaninchen. — *Dissert.*, Marburg 1888. Mit 1 Tfl.

Beim Embryo des Meerschweinchens von etwa 13 Tagen wächst der Kopffortsatz des Primitivstreifens frei zwischen Ektoblast und Entoblast nach vorn. — Eine Anlagerung desselben an den Entoblast kommt für gewöhnlich nur an der äussersten Spitze und im Anschluss an die Eröffnung des Chordakanals vor. — Erst nach Eröffnung des Chordakanals erscheint die Chorda trotz ihres mesoblastischen Ursprungs in den Entoblast eingeschaltet. — Beim Kaninchen (ebenso wohl beim Maulwurf und beim Schaf) ist das Verhalten der Chordaanlage zum Entoblast anders als beim Meerschwein. Es besteht dort bereits vor Bildung des Chordakanals ein sehr enger Zusammenhang der Chordaanlage und des neben ihr gelegenen Mesoblast mit dem

Entoblast. Doch lassen auch diese Objekte die Erklärung zu, dass die vom Primitivstreifen gebildete mesoblastische Chorda sich secundär an den Entoblast angelagert hat. — Die primitive Rachenhaut besteht von ihrer ersten Anlage an bei Embryonen des Meerschweins und Kaninchens nur aus Ektoblast und Entoblast. Sie ist bei Embryonen des Meerschweins, welche noch keinen Urwirbel besitzen, also lange vor der Bildung des Kopfdarms als solche kenntlich und liegt bei diesen nach vorn von dem späteren Kopfende des Embryonalkörpers.

Cuénot, L., Sur le développement des globules rouges du sang. — Comptes rend. T. 106, p. 673—675.

Die Arbeit berücksichtigt Ichthyopsiden und Sauropsiden. Es entwickeln sich im Gegensatz zu diesen bei den Säugetieren die roten Blutkörperchen in der Milz. Sie entstehen aus Zellen mit „kleinen Kernen“ von 8—10 μ Durchm., deren Kern sich ganz auflöst und in Hämoglobin verwandelt.

Duval, Mathias, Les placentas discoïdes. Lettre du professeur Edouard von Beneden. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 729—732.

Briefliche Mitteilung E. von Beneden's, in welcher sich derselbe betreffs der Entwicklung der Placenta von Nagern etc. mit den Ansichten Duval's für übereinstimmend erklärt.

Falchi, F., Sur l'Histogenèse de la Rétine et du Nerf Optique. — Arch. Biol. Ital. Vol. IX, p. 382—399. Mit 1 Tfl.

Frommel, Rich., Ueber die Entwicklung der Placenta von *Myotis murinus*. Wiesbaden 1888.

Giacomini, C., Sul canale neurenterico e sul canale anale nelle vescicole blastodermiche di coniglio (Estr. dal Giorn. d. R. Accad. di Med. 1888 Nr. 4 u. 5). Mit 1 Tfl.

Vergl. unten.

Derselbe, Sur le canal neurentérique et sur le canal anal dans les vésicules blastodermiques du lapin. — Arch. ital. de Biol. T. X, p. 273—294. Mit 1 Tfl.

Zwischen Ekto- und Entoderm bilden sich an der Keimscheibe des Kaninchens an zwei Stellen Verbindungen, nämlich der neurenterische und der Analkanal. Sie entstehen zu verschiedenen Zeiten und sind nur von kurzer Dauer. Der Canalis neurentericus entsteht schon, wenn der Hensen'sche Knoten eben sichtbar wird, während der Analkanal nach völliger Entwicklung des Primitivstreifens auftritt und nach der Bildung des Mesoderms.

Hubrecht, Keimblätterbildung und Placentation des Igels. — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 510—514 (Ref. Verhandl. Anat. Gesellsch. Versammlg. Würzburg 1888).

Verf. bezeichnet als „Trophoblast“ die äusserste, epiblastische Schicht der Keimblasenwandung, welche beim Igel verdickt und mit wabigen Lacunen versehen ist. Von dem primitiven Trophoblast spaltet sich ein Teil nach innen ab, indem er peripherisch im ganzen

Umkreise mit dem Trophoblast noch in Zusammenhang bleibt, und wird zur Epiblastscheibe des Blastoderms. In der sich anschliessenden Diskussion Einwände von Beneden's (ebenda p. 514). Weitere Mitteilungen über die Entstehung von Mesoblast, Amnion, Allantois, Ernährung der Embryos. Schon in den frühesten Embryonalstadien dringt mütterliches Blut in die tiefsten, dem Dottersack unmittelbar anliegenden Lacunen. Verf. nimmt ein „aktives Einfressen“ in die Decidua von Seiten gewisser als „Deciduo fracten“ bezeichneter Zellen an. Zum Schluss Vergleiche mit der Entwicklung des Menschen.

Derselbe, Die erste Anlage des Hypoblastes bei den Säugetieren. — *Anatom. Anz.* III. Jahrg., p. 906—912. Mit 4 Abbildgn.

Verf. bringt neues Beweismaterial bei für die Richtigkeit seiner auf der Würzburger Anatomen-Versammlung gegebenen Darstellung der Entwicklung des Igels und betont, dass in der Keimblasenentwicklung der Säugetiere grosse Verschiedenheiten sich geltend machen, so dass von der Untersuchung einer einzelnen Art nicht auf die Gesamtheit geschlossen werden dürfe.

Humphreys, J., The Suppression and Specialization of Teeth. — *Proc. Birmingham. Phil. Soc.* Vol. VI, p. 137—161.

Keibel, Franz, Die Entwicklungsvorgänge am hinteren Ende des Meerschweinchenembryos. — *Arch. f. Anat. u. Phys., Anat. Abtlg.* Jahrg. 1888, p. 407—430. Mit 2 Tfn.

Bezüglich des Afters weist Verf. nach, dass derselbe beim Meerschweinchen aus dem hinteren Teil des Primitivstreifens hervorgeht, und zwar entsteht er ungefähr in der Gegend, wo sich, ebenso wie bei Kaninchen, Hund und Schaf, ein ektoblastischer Strang entwickelt, der, gegen den Mesoblast scharf abgegrenzt, vom Ektoderm zum Entoderm zieht. Verf. entwickelt weiter die Ansicht, dass diese Beziehung zwischen Primitivstreifen und After wohl bei allen Säugern die gleiche sei und dass, da bei den Amphibien der After aus dem Blastoporus hervorgeht, der Primitivstreifen der Säuger dem Blastoporus der Amphibien entspreche. Die Vergleiche, welche His und Kölliker zwischen Mund und After aufgestellt, seien daher wesentlich einzuschränken, ebenso Dohrn's Ansichten von der Entstehung des Mundes und des Afters der Vertebraten aus verschmolzenen Segmentalspalten. Endlich sprechen die angeführten Befunde gegen die Abstammung der Vertebraten von den Anneliden, da bei diesen der Blastoporus zum Munde wird.

Weiter weist Verf. nach, dass im Gegensatz zu den bisherigen Ansichten der Allantois des Meerschweinchens, wenn auch nur vorübergehend, eine nicht unbeträchtliche entodermale Höhle zukomme. Die Bildung der Harnblase ähnelt am meisten den betr. Vorgängen beim Menschen. Zum Schluss geht Verf. auf die Entwicklung des Wolffschen Ganges ein und erörtert von ihm beobachtete Befunde, welche es zweifelhaft machen, dass der Wolffsche Gang aus dem Mesoderm entsteht und nachträglich eine Verbindung mit dem Ektoderm eingeht.

Derselbe, Zur Entwicklungsgeschichte des Igels (*Erinaceus europaeus*). — *Anatom. Anz.* III. Jahrg., p. 631—637. Mit 1 Abbildg.

Vorläufige Mitteilung

Kölliker, Th., Ueber die einfache Anlage des Zwischenkiefers mit Demonstrationen contra Biondi. — *Anat. Anz.* III. Jahrg. p. 572—576. (Ref. aus den Verhandl. Anat. Gesellsch. Versammlg. Würzburg 1888.)

Verf. berücksichtigt hauptsächlich den Menschen, geht aber auch auf Säugetiere ein, bes. auf das Schwein, für welches nachgewiesen wird, dass das Os intermaxillare von einem Ossifikationspunkt aus entsteht.

Kolosow, A., Beitrag zur Lehre von der Entwicklung der Samenfäden bei Säugetieren. — *Centralbl. f. d. med. Wissensch.* 1888 Nr. 30.

Laulanié, Sur l'origine commune et le rôle variable de l'épithélium germinatif et des cordons sexuels dans l'ovaire. — *Comptes rend. hebd. Soc. Biol.* 8. S. T. V., p. 4—8.

„Les cordons de Pflüger et l'épithélium dit germinatif résultent primitivement de la spécialisation corticale des cordons sexuels qui se différencient sur place dans toute l'étendue du stroma.

Ces deux formations de même valeur et de même origine ont dans l'ovogenèse une part respective qui varie avec les espèces animales.“

Verf. stellt seine Unters. besonders an der Katze an.

Lockwood, C. B., Development and transition of the testis, normal and abnormal. — *The Journal of Anat. and Phys.* New S., Vol. II, p. 38—77 (1887) und p. 461—478 mit 1 Tfl., p. 505—541 mit 6 Abbildgn.

Vergl. diesen Ber. für 1887, p. 27.

Derselbe, The early development of the pericardium, diaphragma and great veins. — *Proc. R. Soc. London.* Vol. 43. 1887! p. 273—276.

Loewenthal, Nat., Zur Kenntniss des Keimfleckes im Ureie einiger Säuger. — *Anatom. Anz.* III. Jahrg., p. 363—373. Mit 7 Abbildgn.

Verf. fand, dass die Keimflecke von Ureiern der Katze, des Hundes und des Schweines amöboide Bewegungen zeigen und zwar nur bei den jüngsten Ureiern, also nur auf einer gewissen Entwicklungsstufe. Der Keimfleck kann sehr verschiedene Lagen einnehmen, sogar ausserhalb des Keimbläschens erscheinen, woraus Verf. auf Wanderungen des Keimfleckes schliesst. Er constatirt ferner gewisse Beziehungen zwischen der Formgestaltung des Keimfleckes und der Anordnung des Kerngerüsts. Endlich macht er aufmerksam, auf einige auffallende Färbungserscheinungen in den Keimflecken, sowie im Zelleibe einiger Ureier.

Mall, F., The branchial clefts of the Dog, with special reference to the origin of the thymus gland. — *Stud. Biol. Lab. J. Hopkins Univ.* Vol. IV., p. 193—216. Mit 3 Tfn.

Derselbe, The Branchial Region of the Dog. — Circulars from the Johns Hopkins University, Baltimore Vol. VII. Nr. 63, 64.

Martin, E., Ueber die Anlage der Urniere beim Kaninchen. — Arch. f. Anat. u. Phys. Anat. Abtlg. Jahrg. 1888, p. 109—122. Mit 1 Tfl.

Bei Embryonen von 12—13 Urwirbeln besteht zeitweise ein nach hinten frei endigender Wolff'scher Gang, dessen hinteres Ende bald darauf mit dem Ektoblast verschmilzt. Es lässt sich dies kaum anders als durch eine secundäre Verschmelzung der beiden Gebilde erklären. Auch die Untersuchung jüngerer Embryonen zeigte, dass der Wolff'sche Gang nicht ektodermalen Ursprungs ist. Die Urnierenanlage trennt sich bei Embryonen von 10—11 Urwirbeln im Gebiet des 9.—11. (höchstens 13.) in 2 Abteilungen, von denen die untere die Anlage der Querkänäle, die obere die des Wolff'schen Ganges darstellt. Der Wolff'sche Gang wächst dann frei nach hinten, um, wie vorher erwähnt, zeitweise sich mit dem Ektoblast zu verbinden. Ein Lumen entwickelt sich gleichzeitig in den Querkänälen und im Wolff'schen Gang bei Embryonen von 17 Urwirbeln in der Gegend des 14. Urwirbels. Bei Embryonen von 9 Tagen 19 Stunden finden sich Urnierenbläschen, deren Lumen stellenweise mit dem des Wolff'schen Ganges kommuniziert. Embryonen von 11 Tagen 2 Stunden zeigen die Bläschen zu geschlängelten Querkänälen entwickelt; der Wolff'sche Gang mündet dann in Sinus urogenitalis.

Masius, J., De la genèse du placenta chez le Lapin. — Bull. Acad. R. Belgique 3. Série T. XVI. p. 317—325.

Verf. teilt die Resultate einer grösseren Arbeit mit, welche eingehend die Veränderung der Uterinmukosa während der Schwangerschaft und das Verhältniss, in welchem Embryo und Uterus zur Bildung der Placenta beitragen, behandelt. Vor der Fixirung des Embryos im Uterus geht die Mukosa des letzteren eigentümliche Veränderungen ein. Weder die Drüsen noch das Epithel des Uterus nehmen teil an der Bildung der Placenta. Die Gefässe der Mukosa umgeben sich mit Zellschichten, welche durch mitotische Teilung sehr umfangreich werden, während das Endothel degeneriert und verschwindet. In jugendlichen Stadien enthält die Mukosa viele Leucocyten, welche sich zu einer gewissen Zeit in eigentümliche, nicht klar erkannte Körperchen umwandeln. Vordem sich der Embryo an die Schleimhaut anlegt, kann man an seinem Epiblast 2 Schichten unterscheiden, deren äussere sich sehr stark entwickelt und die Verbindung mit der Mukosa vermittelt. Im Lauf der Entwicklung der Placenta füllen sich die Hohlräume der bei der Umwandlung der Uterinmukosa sich bildenden Krypten bisweilen mit mütterlichem Blut, welches sich alsdann zwischen dem Epiblast des Embryos und der modifizierten Mukosa befindet.

Mazzarelli, Giuseppe F., Sur l'influence du mâle dans la production de quelques anomalies ou monstruosités. — Journ. de Micrographie. T. 12, p. 380—382.

Verf. schildert einen Fall, in welchem zwei von demselben Kater befruchtete Katzen, nachdem sie früher stets normale Junge gehabt, gleichzeitig Junge warfen, welche eigentümliche Missbildungen zeigten. Es wird hieraus der Schluss gezogen, dass dies durch den Einfluss des Männchens und zwar in Folge von abnorm entwickelten Spermatozoen verursacht worden sei, wie dies in andern Fällen schon beobachtet. Unter den erwähnten Abnormitäten ist Schwanzlosigkeit, resp. Verkrümmung des Schwanzes hervorzuheben.

Müller, Ueberzähliger Huf an der innern Seite beider Vorderfüsse bei einem Pferde (*Megalomelus perissodactylus*). — Oesterr. Zeitschr. f. wissensch. Veterinärkunde. Bd. II, p. 26. Mit 3 Abbildgn.

Nehring, A., Ueber die Gebissentwicklung der Schweine, insbesondere über Verfrühung und Verspätung derselben. — Thiel's Landw. Jahrb. XVII, p. 31—82. Mit 15 Textfig.

Verf. untersucht, gestützt auf ein sehr reiches, sorgfältig gesammeltes Material, die Gebissentwicklung der Haus- und Wildschweine und berichtigt verschiedene bisher verbreitete Unrichtigkeiten z. B. betreffs der bei der Geburt des Ferkels schon vorhandenen Zähne, sowie betreffs der Durchbruchzeiten verschiedener Zähne. Im Allgemeinen beeinflusst die Lebensweise, reichliche oder knappe Nahrungszufuhr etc. einigermassen die Entwicklung des Gebisses, aber bei weitem nicht so sehr, wie dies nach Angaben früherer Forscher der Fall sein müsste. Die Gebissentwicklung normaler Wildschweine geht in derselben Weise vor sich wie bei den primitiven Hausschweinrassen (Gegensatz zu Nitsche). In einem die aussereuropäischen Wildschweine behandelnden Abschnitt zeigt Verf., dass bei diesen die Entwicklung des Gebisses im Allgemeinen sich in derselben Weise vollzieht wie beim europäischen Wildschwein, abgesehen davon, dass bei gewissen Arten einige Zähne überhaupt fehlen. *Phacochoerus* und vielleicht auch *Potamochoerus* (hier das Milchgebiss) nehmen eine besondere Stellung ein. Im Schlusskapitel erörtert. Verf. den Einfluss der Ernährung auf die Schädelbildung. — Eingehende Tabellen liefern Beläge für die dargelegten Ansichten über die Gebissentwicklung.

Niessing, Georg, Untersuchungen über die Entwicklung und den feinsten Bau der Samenfäden einiger Säugetiere. (Von der med. Fakultät der Univ. Würzburg gekrönte Preisschr.) — Verh. physik. medicin. Gesellsch. zu Würzburg. N. F. Bd. XXII, Nr. 2.

Osborn, H. F., Observations upon the Foetal Membranes of the Opossum. — Proc. Americ. Assoc. for the Advancement of Science for 1887. Vol. XXXVI (1888), p. 261.

Piersol, G. A., Ueber die Entwicklung der embryonalen Schlundspalten und ihre Derivate bei Säugetieren. — Sitzungsber. physik. medicin. Gesellsch. zu Würzburg. Jahrg. 1888, p. 85—86.

Derselbe, Ueber die Entwicklung der embryonalen Schlundspalten und ihre Derivate bei den Säugetieren. — Zeitschr. f. wissensch. Zool. Bd. 47, p. 155—189. Mit 2 Tfln.

Verf. kommt zu folgenden Schlüssen: „1) Die inneren Schlundtaschen sind früher angelegt und entwickelt als die entsprechenden äusseren Kiemenfurchen und Kiemenbogen; ihre Entwicklung schreitet in der Ordnung ihrer Lage vor (von vorn nach hinten. Ref.) 2) Bei den Säugetieren bleiben die inneren und äusseren Taschen in der Regel immer durch die Verschlussplatten getrennt; möglicherweise kann ein Durchbruch an der zweiten Schlundtasche stattfinden. 3) Bei den ersten drei Schlundtaschen sind 2 Abteilungen zu unterscheiden, ein ventraler Flügel und ein dorsaler Schenkel (die Spitze); auch an der vierten Tasche ist eine Andeutung dieser Teile wahrzunehmen; von dem ventralen Flügel (denjenigen der ersten Tasche ausgenommen) wächst ein schlauchartiges epitheliales Gebilde aus. 4) Das mittlere Ohr entwickelt sich aus 3 Teilen: 1) aus der Rachenrinne; 2) aus der dorsalen Spitze der ersten Schlundtasche; 3) aus der seitlichen Schlunderweiterung. Die Paukenhöhle entsteht als sekundärer Auswuchs der Rachenrinne und der ersten Schlundtasche. Die Tuba Eustachii wird gebildet von dem verengerten gemeinsamen Raume der ersten Schlundtasche und der Schlunderweiterung. 5) Die Thymusanlage zeigt Abweichungen in ihrem Ursprunge bei verschiedenen Säugetieren, jedoch entstammt die Hauptthymusanlage der inneren 3. Schlundtasche; rudimentäre Anlagen können an anderen Schlundtaschen vorkommen (bei Kaninchen an der 2.); ein ektodermaler Ursprung der Thymus ist nicht bewiesen und aus phylogenetischen Gründen zu bezweifeln. 6) Die eigentliche Schilddrüse entspricht der mittleren Anlage, die untere seitliche paarige, von der 4. Schlundtasche ausgehende Anlage ist das Homologon besonderer Organe der niederen Wirbeltiere; ihr Schicksal bei den Säugetieren ist abweichend.

Podwyssozki, Ueber die Entwicklung des Graaf'schen Bläschens bei Säugetieren. Kiew. 1888. (Aus den Verh. d. gynäkol. Gesellsch. in Kiew.) Russisch!

Pouchet, G., Sur l'évolution des dents du cachalot. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 503—504.

Verf. beschreibt die Entwicklung der Zähne bei einem 0,30^{mm} langen Embryo von *Physeter*. Verschiedenheiten im Ober- und Unterkiefer.

Derselbe, Sur un kyste dentaire observé chez le cachalot. — Ebenda p. 505—506.

Verf. fand an einem äusserlich noch nicht sichtbaren hinteren Zahn eines *Physeter* eine eigentümliche Geschwulst, welche der Spitze des jungen Zahns aufsass und dieselbe stark angegriffen hatte. Hierdurch sieht Verf. die Thatsache erklärt, dass oft die letzten Zähne bei Cachelots auffallend abgenutzt erscheinen, während die übrigen noch intact sind.

Vergl. auch Renooz unter Allgemeines.

Retterer, Ed., Origine et évolution des Amygdales chez les Mammifères. — Journ. Anat. Physiol. XXIV. p. 1—80, 274—360. Mit 4 Tfn.

Verf. untersucht eingehend Ursprung und Entwicklung der Mandeln beim Menschen, ferner beim Rind, Schaf, Delphin, Hund, Katze, Pferd, Schwein, Kaninchen und kommt zu folgenden Resultaten. Die Bestandteile der Mandeln sind von zweierlei Ursprung, die eigentlichen Drüsenelemente entstammen dem Ento- oder Ektoderm, das Bindegewebe nebst Blut- und wahrscheinlich Lymphgefäßen dem Mesoderm. Die Mandeln entwickeln sich wie die Drüsen im Allgemeinen. Die Mandeln der Säugetiere und die Bursa Fabricii der Vögel sind homologe Organe. Bei allen Säugetieren haben die Mandeln eine ähnliche Entwicklung.

Sanfelice, F., Spermatogenesi dei vertebrati. — Boll. Soc. Nat. Napoli. Vol. 2 p. 42—98. Mit 2 Tfn.

Vergl. hierzu Sanfelice unter Geschlechtsorgane.

Derselbe, Spermatogenèse de Vertébrés. — Arch. ital. de Biol. T. X., p. 69—122. Mit 2 Tfn.

Nach einer histor. Einleitung und Notizen über die Untersuchungsmethode behandelt Verf. die Spermatogenese der Vertebraten und zwar 1) Die Elemente des Samenkanals und ihre Anordnung; 2) Die Karyokinese bei der Spermatogenese; 3) Die Bildung der Spermatozoiden (aus „Germinalzellen“ entstehen Spermatoblasten, deren Kerne die Spermatoz. liefern); 4) Die physiol. Regeneration des Samenkanal-Epithels und die Degeneration der Spermatoz. Von Säuget. werden untersucht *Mus decum*, *M. decum. var. albina*, *M. muscul.*, *Canis fam.*, *Cavia cob.*, *Myoxus querc.*, *Erinac. europ.*, *L. cunicul.*, *Felis domest.*, *Talpa europ.*

Schaffer, Josef, Die Verknöcherung des Unterkiefers und die Metaplasiefrage. — Arch. f. mikr. Anat. Bd. 32, p. 266—377. Mit 4 Tfn.

Durch eingehende Untersuchungen von Schafembryonen kam Verf. zu dem Schluss, dass eine wirkliche metaplastische Ossification am Unterkiefer nicht nachzuweisen sei. Ein genetischer Zusammenhang zwischen Knorpel und Knochen wird aber vielfach vorgetäuscht durch verschiedene Umstände, unter denen der am meisten hervortretende die morphologische und „färberische“ Aehnlichkeit zwischen chondroidem Knochen und osteoidem Knorpel ist. Die Formgestaltung des Unterkiefers wird hinreichend durch die Vorgänge der Apposition und Resorption erklärt.

Spee, Ferd. Graf, Ueber die Entwicklungsvorgänge vom Knoten aus in Säugetierkeimscheiben. — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 314—323. Mit 7 Abbildgn.

Verf. untersucht an Meerschweinchen und Kaninchen die am Hensen'schen Knoten sich abspielenden Entwicklungsvorgänge, besonders die Entstehung des Canalis neurentericus.

Strahl, H., Beiträge zur Kenntniss der Entwicklung von Säugetierembryonen. — Sitzungsber. d. Ges. z. B. d. ges. Naturwiss. zu Marburg 1888 p. 54—61.

Derselbe demonstriert auf der Würzburger Anatomen-Versammlung an einer Reihe von Durchschnitten, wie bei Säugetierembryonen die Area embryonalis ursprünglich vor dem Primitivstreifen in der Mitte zweiblättrig ist, dann durch Einwachsen des Kopffortsatzes dreiblättrig wird, um weiterhin durch die Eröffnung des Chordakanals an gleicher Stelle noch einmal zweiblättrig zu erscheinen. (Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 740—743.) Mit 8 Abbildgn.

Tourneux, F., Sur les premiers développements du tubercule génital et sur le mode de formation de l'anus chez l'embryon de mouton. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V, p. 633—636.

Derselbe, Sur les premiers développements du cloaque, du tubercule génital et de l'anus chez l'embryon de mouton. — Journ. Anat. Physiol. XXIV, p. 503—517. Mit 3 Tfln.

Derselbe, Sur la participation des canaux de Wolff à la constitution de l'extrémité inférieure (ou postérieure) du vagin chez le fœtus de cheval. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 379—381.

Verf. entwickelt die Ansicht, dass beim Pferde- wie beim Menschenfœtus der zwischen dem Sinus urogen. einerseits und dem Wolff'schen und Müller'schen Gang andererseits befindliche Kanal durch Verschmelzung der unteren Enden jener beiden Gänge entsteht, welches anfangs getrennt direkt in das Vestibulum mündeten.

Vassaux, Gustave, Recherches sur les premières phases du développement de l'oeil chez le lapin. Le Havre 1888. Mit 2 Tfln.

Vignal, W., Recherches sur le développement des éléments des couches corticales du cerveau et du cervelet chez l'homme et les mammifères. Avec 2 Pl. — Arch. de Physiol. Année XX, p. 228—255.

Willach, P., Beiträge zur Entwicklung der Lunge bei Säugetieren. — Rundschau auf d. Gebiete der Tiermed. Jahrg. IV, p. 65—66, 73—75, 81—82.

Wolff, Julius, Ueber das Wachstum des Unterkiefers. Zweiter Beitrag zu den experimentellen Untersuchungen des Knochenwachstums. — Virchow's Arch. Bd. 114, p. 493—547. Mit 1 Tfl.

Verf. stellte seine Untersuchungen mittelst der Markir-methode an Ziegen und Kaninchen an. Aus denselben ergibt sich, dass die Lehre vom ausschliesslich appositionellen Wachstum des Unterkiefers eine ganz und gar verkehrte ist, dass vielmehr der Expansion eine Hauptrolle zukommt, weniger stark in dem die vorderen Backenzähne tragenden Teil der Pars buccalis, mächtig am Ramus. Damit ist die Unhaltbarkeit der Flourens'schen Lehre von der Apposition und Resorption für den Unterkiefer bewiesen. — Aus den Verhältnissen der inneren Architektur der Knochen ergibt sich nach dem Verf. das Vorhandensein einer ausserordentlichen Aktivität und funktionellen Anpassungsfähigkeit aller Partikelchen der fertigen Tela ossea, nicht nur während des Wachstums, sondern während der ganzen Lebensdauer des Individuums.

Phylogenie. Auld, R. C., The derivation of the domestic polled breeds. — Am. Nat. XXII, p. 784—802. Mit 2 Abbildg.

Verf. weist nach, dass eine Anzahl der jetzt hornlosen Rinderschläge Grossbritanniens früher gehörnt waren und dass die Hörner erst allmählich „herausgezüchtet“ wurden. Das Wildvieh war seit langer Zeit grossenteils hornlos und hat z. T. die Entstehung der hornlosen domestizierten Schläge beeinflusst.

Beauregard, H., Considérations sur les deux dentitions des mammifères. — Comptes rend. hebd. Soc. Biol. 8 S. T. V, p. 230—233.

Verf. wendet sich gegen die Ansicht von Lataste, dass die Molaren zur zweiten Dentition gehören. (Die eigentlichen Molaren entstehen auf die gleiche Weise wie die Zähne der ersten Dentition, also wie das Milchgebiss.) Er betont ferner, dass die Entwicklungsgeschichte, nicht aber der Zeitpunkt ihres Erscheinens massgebend für die Einteilung der Zähne seien. Man dürfe nicht einfach „zweite Dentition“ und „bleibendes Gebiss“ identifizieren.

Derselbe, Deuxième note sur les deux dentitions des mammifères — Ebenda p. 259—261.

Verf. bekämpft die von Lataste geäusserte Meinung, dass nicht nur die Molaren, sondern überhaupt alle nicht gewechselten Zähne („dents monophysaires“) zur zweiten Dentition gehören. Er führt als Beispiel die Cetaceen an, bei welchen die Entwicklung der Zähne mit der typischen Milchzahn-Entw. übereinstimmt.

Vergl. unten Lataste.

Cope, E. D., The mechanical causes of the origin of the dentition of the Rodentia. — Am. Nat. XXII, p. 3—13. Mit Holzsehn.

Verf. zeigt zunächst, dass der Schneidezahn des Unterkiefers der Nager der zweite der Incisiven-Reihe ist, wie sich bei der Betrachtung der Gattungen *Calamodon*, *Tillotherium*, *Esthonyx* etc. ergibt. Sodann wird nachgewiesen, dass alle Eigentümlichkeiten des Nagerschädels (Fehlen des Postglenoidfortsatzes, Form des Unterkiefer-Gelenkkopfes, Insertion der Temporalmuskeln, Reduktion des Kronfortsatzes, Entwicklung innerer Pterygoid- und Masseter-Muskeln, Lage und Stellung der Molaren und Struktur derselben) mechanische Folgen des Längenwachstums der Incisivi sind. Das Gleiche ergibt sich bei der Betrachtung der Marsupialia multituberculata.

Darreste, C., Recherches sur les Veaux Natos ou à Tête de Bouledogue et sur les origines des animaux domestiques. — Bull. Soc. Nat. d'Acclimat. de France 4. Série, Tome V p. 5—11.

Verf. bespricht verschiedene Exemplare der Natos-Rasse und constatirt Verschiedenheiten im Schädelbau. Bei einem in Frankreich gebornen Kalb nahm das Lacrimale teil an der Begrenzung der Nasenöffnung. Weiter wird erwähnt, dass Mopskopf-Bildungen auch in Europa relativ häufig auftauchen; da aber die betr. Tiere fast immer sofort getötet werden, so können sie sich nicht fortpflanzen. Verf. betont die Wichtigkeit derartiger Züchtungsversuche für das Studium der Entstehung der Haustierrassen. Vergl. Ber. 1887.

Gaudry, A., *Les Ancêtres de nos Animaux dans les temps géologiques*. Mit 49 Abbildgen. Paris 1888.

Nach einer allgemeiner gehaltenen Einleitung (*Hist. des progrès de la paléontologie; évolution et darwinisme*) schildert Verf. die Faunen von Pikermi und Mont Léberon, wobei er genauer auf das Verhältniss der fossilen zu den jetzigen Säugetieren eingeht und einen besonderen Abschnitt den durch die Geologie bezüglich der alten Geschichte des griechischen Volkes gelieferten Aufschlüssen widmet. S. 94 ff., wo auseinandergesetzt wird, dass eine „Kleinfaina“ in Pikermi fehlt, wird bei der Aufzählung der wenigen aufgefundenen Kleinsäuger *Acomys* (*Gaudryi Dames* nicht erwähnt (Ref.)

Haacke, W., Ueber die Entstehung des Säugetiers. — Biol. Centralbl. 8. Bd. p. 8—16. Mit 2 Abbildgen.

Nach den Ansichten des Verf. entwickelten sich die ersten Säugetiere aus Formen, welche zwischen Amphibien und Reptilien, in Anbetracht der Eibeschaffenheit der Monotremen aber wohl näher zu den Reptilien zu stellen sind. Der erste Schritt war die Erwerbung eigener Blutwärme, welche die Entstehung eines Haarkleides bedingt. Dieses hatte sodann des Auftreten von Talgdrüsen und Schweissdrüsen zur Folge. Sehr wahrscheinlich legte das so beschaffene „Urhaartier“ Eier, ähnlich denen der Monotremen und der Reptilien. Da Verf. voraussetzt, dass die Entstehung der Eigenwärme in die Zeit eines kühlen Klimas fiel, so musste eine Bebrütung der Eier von grösster Wichtigkeit sein und da war bei der sonstigen Lebensweise des Tieres eine Einrichtung nothwendig, welche ein beständiges Mittragen der Eier gestattete. So bildete sich der Brutbeutel, wie er noch jetzt bei *Echidna* vorhanden ist und wie er bei den Beuteltieren sich von den Urhaartieren her vererbt hat. Die in dem Brutbeutel ausschlüpfenden Jungen leckten das Sekret der Schweissdrüsen der Mutter. Es bildete sich das Mammarorgan der Monotremen, aus welchem erst später durch Inanspruchnahme und schliessliches Ueberwiegen resp. alleiniges Funktioniren der Talgdrüsen die Milchorgane der eigentlichen Säugetiere entstanden. Der Ansicht Gegenbaur's, dass die Monotremen durch die Beschaffenheit ihres Mammarorgans von den übrigen Säugern schärfer getrennt wären, widerspricht Verf., da schon bei den Monotremen zwischen den Schweissdrüsen im Mammarorgan Talgdrüsen sich befinden.

Kollmann, J., Handskelett und Hyperdaktylie. — Anatom. Anz. III. Jahrg., p. 515—530. Mit 1 Tfl. (Ref. Verhandlg. Anat. Gesellsch. Versammlg. Würzburg 1888.)

Verf. erörtert auf Grund der bisherigen Forschungen über das genannte Thema mittelt seiner „Rudiment-Theorie“ die Hyperdaktylie (statt „Polydaktylie“) des Menschen. „Es giebt keine Stapedifera mit mehr als fünf Fingern, aber solche mit fünf Fingern und mit Spuren eines ulnaren und radialen Strahles (Mensch, viele Säuger, Reptilien und Batrachier). Diese Spuren liegen als oft schwer erkennbare Rudimente unter der Haut. In Fällen von Hyperdaktylie des

Menschen vergrössern sich diese Rudimente und treten verschieden entwickelt aus der Haut hervor. Der Rückschlag aus diesen Rudimenten liefert wahrscheinlich stets nur Rudimente, d. i. verkümmerte Finger. Hyperdaktylie ist keine pathologische, sondern eine thero-morphe Erscheinung und weist auf eine Reduktion von Strahlen hin, welche bei der Umformung der Fischflosse in eine Batrachierhand mit aufgenommen wurden. Hyperdaktylie des Menschen ist demnach eine besondere Form des Atavismus.“

Lataste, Fernand, Des deux dentitions, de lait on permanente, des mammifères, quelle est la dentition primitive? — Comptes rend. hebdom. Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 59—61.

Verf. entwickelt die Ansicht, dass weder das Milchgebiss noch das definitive Gebiss (Flower, Oldfield Thomas) das primitive sei, sondern dass beide gleichalterig seien, dass also schon die ersten Säugetiere diphyodont waren.

Derselbe, Considérations positives sur les deux dentitions des mammifères. — p. 203—206.

Verf. erörtert, dass die typische Bezahnung der Säuger die diphyodonte ist. Als typische Zahnformel nimmt er an $\frac{5}{5} + \frac{1}{1} + \frac{4+4}{4+4}$, (womit sich jedoch kaum alle Zoologen für einverstanden erklären werden).

Derselbe, Encore sur les deux dentitions des mammifères. — p. 475—480, 496—501, 537—540.

Entgegnungen auf die Aeusserungen Beauregards (vergl. oben).

Leboucq, H., Ueber das Fingerskelett der Pinnipedier und der Cetaceen. — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 530—534. (Ber. Verhandlg. Anat. Gesellsch. Versammlg. Würzburg 1888).

Verf. constatirt, dass die zur Stütze der Schwimnhaut dienende Verlängerung des Pinnipedierfingers der modifizierte Fingerballen, nicht aber ein das Fingerskelett modifizirendes Knochengebilde ist. Die Phalangen des Cetaceenfingers sind einander gleichwertig, die überschüssigen also nicht dem Fortsatz des Pinnipedierfingers homolog. Es ist also die Phalangenzahl der Cetaceen nicht eine Folge der Anpassung. Bei den Embryonen einiger Arten finden sich mehr Phalangen als bei erwachsenen Individuen. Hieraus schliesst der Verf., dass die Ahnen der Cet. noch mehr Phal. besaßen als die jetzigen Arten, dass sich die Phalangenzahl während der phylogenetischen Entwicklung der jetzigen Cet. verminderte und somit die noch bestehende Hyperphalangie vererbt worden, nicht durch Anpassung entstanden sei.

Magitot, Sur les deux dentitions des mammifères. — Comptes rend. hebdom. Soc. Biol. 8. S. T. V., p. 261—263.

Verf. betont, dass bei manchen Säugern der Zahnwechsel

äusserst früh eintritt und zwar in der Regel bei solchen mit kurzer Lebensdauer (Pinnipedier?! Ref.). Sodann wendet er sich gegen Beaugard (vergl. oben), indem er erklärt, dass (im Gegensatz zu Pouchet und Chabry) gerade die embryologische Entwicklung der echten Molaren beim Menschen diese Zähne der zweiten Dentition zuwies.

Mivart, St. George, On the possibly Dual Origin of the Mammalia. — Proc. R. Soc. London. Vol. 43, p. 372—379.

Verf. entwickelt die Hypothese, dass die Monotremen von einem Stamme sich ableiten, welcher gänzlich verschieden ist von demjenigen, welcher den Ursprung der übrigen Säugetiere darstellt. Sie bilden eine in der Entwicklung begriffene Parallelreihe zu den höheren Säugern (incl. Marsupialia). Während diese sich nach Huxley von amphibienartigen Vorfahren ableiten, entstammen die Monotremen sauropsidenartigen Formen. Für einen zweifachen Ursprung ist ein gewichtiger Grund die Verschiedenheit der Milchdrüsen bei den Monotremen gegenüber denen der übrigen Säugetiere. Ihre Zähne, welche keinerlei Beziehungen zu denen der Sauropsiden bieten, erhielten die Monotr. erst, nachdem sie sich von dem Reptilienstamm abgezweigt hatten.

Nehring, A., Ueber die Abstammung des Meerschweinchens. — Humboldt Bd. VIII, Hft. 4.

Es wird nachgewiesen, dass Peru wahrscheinlich die Heimat und *Cavia Cutleri* King resp. *Tschudi* die Stammart des Hausmeerschweinchens ist.

Osborn, H. F., The evolution of Mammalian Molars to and from the tritubercular type. — Am. Nat. XXII, p. 1067—1079. Mit Abbildg.

Verf. zeigt, dass der trituberkuläre Molar der Ausgangspunkt war für die Mehrzahl der übrigen Backenzahnformen. Nur wenige aberrante Formen schliessen sich aus. In der mesozoischen Zeit überwog der trituberkuläre Typus bei weitem; ähnlich war es im unteren Eocän und erst im mittleren Eocän begann die weitere Entwicklung und Umwandlung. Die Trituberkularität gliedert sich in 3 Stufen oder Typen: 1. Haplodonter Typus. Einfache konische Krone, einfache Wurzel, nicht von jener abgesetzt. Dieser T. noch nicht bekannt. Hieran könnte man einen Zwischentypus anfügen mit seitlichen kleinen Nebenspitzen an der Krone. Beispiel *Dromotherium*. 2. Triconodonter Typus: Krone dreiteilig, mit einem mittleren und zwei deutlichen Seitenkegeln. Wurzel doppelt. Beispiel Triconodon. 3. Trituberkulärer Typus: Krone dreieckig mit 3 Hauptspitzen, die mittlere bei den oberen Molaren innen, bei den unteren aussen liegend. Hiervon leiten sich weitere Subtypen ab. Für die verschiedenen Spitzen schlägt Verf. eine neue Nomenklatur vor, nämlich folgende:

Upper Molars.		Lower Molars.
Antero-internal cusp	= Protocone	Antero-external cusp = Protoconid
Postero- „ „	= Hypocone	Postero- „ „ = Hypoconid
Antero-external „	= Paracone	Antero-internal „ = Paraconid
Postero- „ „	= Metacone	Intermediate or antero-internal cusp (in quadritubercular molars)
Anterior inter-mediate „	= Protocone	= Metaconid
	nule	
Posterior inter-mediate	= Metacone	Postero-internal cusp = Entoconid.
	nule	

Es folgt dann eine Uebersicht über die Entwicklung der Spitzen bei den mesozoischen und tertiären Säugetiergattungen.

Rütimeyer, L., Ueber einige Beziehungen zwischen den Säugetierstämmen Alter und Neuer Welt. Erster Nachtrag zu der eocänen Fauna von Egerkingen. — Abh. Schweiz. paläont. Ges. V. XV. p. 1 bis 63. Mit 1 Tfl.

Im 1. Kap. „Einige Bemerkungen über Classification, insbesondere bei Huftieren“ wendet sich Verf. gegen die Cope'sche Einteilung der Huftiere auf Grund des Baues der Extremitäten. Besonders „kann der sogenannten Condylarthrie nur eine höchst relative Bedeutung beigelegt werden und zwischen ihr und der sogenannten Diplarthrie bestehen keine festen Grenzen.“ Obwohl das gewaltige Material der Amerikaner gewissermassen zu dieser Classifizierung aufforderte, so sind doch Vorder- und Hinterfuss zu verschiedenwertig, als dass sie neben einander gleichmässig für die systemat. Einteilung der Huftiere zu verwenden wären. Es dürfte sich mit der Zeit „die in Amerika eingeführte Sprache als undurchführbar erweisen“, während die weitere Arbeit an der Hand der von Cuvier und Owen aufgestellten Principien auf sicheren und zweckmässigeren Fundamenten ruht und sehr wohl auch das amerikanische Material umfassen kann.

Das II. Kap. „Einige neue Bindeglieder für die Säugetierstämmen Alter und Neuer Welt“ behandelt eine Anzahl neuer Funde aus dem Eocän von Egerkingen und bildet daher eine Fortsetzung zu den eocänen Säugetieren aus dem Gebiet des schweizerischen Jura (Denkschr. Schweiz. naturf. Ges. 1862). *Caenopithecus lemuroides* ist nicht zur Gattung *Adapis* zu rechnen, wie dies nach dem Fund von 1862 den Anschein hatte. Der Bau der Zähne, besonders der des letzten Pm., ferner die Beschaffenheit der an dem neuen Egerkinger Fund erhaltenen Reste des Oberkiefers und des Jochbogens deuten auf durchgreifende Verschiedenheit von *Adapis*. Dagegen werden 3 weitere Gebissreste zu der eben genannten Gattung gezogen und zwar zu *A. Duvernoyi*. Ueberraschend ist der Fund einer Anzahl von Oberkieferzahnreihen, welche sich direkt an die bisher auf die neue Welt beschränken Phenacodonten anschliessen. Verf. bezeichnet sie als *Phenacodus europaeus*. Damit wäre zuerst

das Vorkommen von Condylarthren in Europa nachgewiesen. Ein einzelner, wie die eben erwähnten Zähne trigonodonter Molar wird ebenfalls zu den Phenacod. gerechnet, aber der Gattg. *Protogonia* zugewiesen als *P. Cartieri*. Ein weiterer vereinzelt gefundener Oberkieferzahn, ebenfalls trigonodont, liess sich in keiner europäischen Gattung unterbringen, zeigt aber deutliche Anklänge an Cope's *Meniscotherium*. Zum Schluss giebt Verf. einen Ueberblick über die Beziehungen der Trigonodontie zu der bei der Mehrzahl der Huftiere herrschenden Zygodontie, wobei besonders *Phenacodus* und *Propalaeotherium* zum Vergleich herangezogen werden.

(Erwiderung und Kritik von Cope in American Nat. XXII, p. 831—835.) Vergl. ferner unten Schlosser.

Sanson, André, Sur l'origine des cochons domestiques (Réponse à un mémoire de Nehring). — Journ. Anat. Phys. XXIV p. 201—213.

Verf. sucht gegenüber den Ansichten Nehring's seine Ideen über die Abstammung der jetzigen Hausschweine von zwei besonderen, nicht mehr wild vorhandenen Arten, *Sus celticus* und *Sus ibericus*, aufrecht zu halten und bekämpft die Abstammung des Hausschweins vom Wildschwein. Dass er den Einfluss der Nahrung und der Lebensweise auf die Schädelbildung, sowie die Wirkungen des Muskelzuges und -Druckes leugnet, genügt, um seinen Ausführungen von vornherein einen zweifelhaften Wert zu verleihen.

Schlosser, M., Ueber die Beziehungen der ausgestorbenen Säugetierfaunen und ihr Verhältniss zur Säugetierfauna der Gegenwart. — Biol. Centralbl. Bd. VIII, p. 582—631.

Verf. giebt eine anschauliche Uebersicht über die verschiedenen Säugetierfaunen vom ältesten Tertiär an. Bei Besprechung des Puercobeds etc. bemerkt er, dass die von Rüttimeyer den Gattungen *Phenacodus* und *Protogonia* zugeschriebenen Funde aus den Bohnerzen von Oberbuchsitten in Wirklichkeit den *Periptychiden* oder gar primitiven Artiodaktylen zuzurechnen seien. Sodann erörtert Verf. die Beziehungen der geschilderten Faunen zu einander, sowie zu denen der Gegenwart.

Tornier, G., Die Phylogenese des terminalen Segmentes der Säugetier-Hintergliedmaassen. — Morphol. Jahrb. Bd. 14, p. 223—328. Mit 2 Tfn.

Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, vorwiegend auf vergl. anatom. Wege, unter Berücksichtigung aller dabei in Betracht kommenden Faktoren die Phylogenese des Säugethierfusses zu ergründen. Er weist gestützt auf ausführliche osteologische und Ligament-Untersuchungen nach, dass Astragalus und Calcaneus der Krokodilinen homolog sind entspr. Knochen der Säugetiere, und wendet sich dann der Anatomie des Calc.-Astr.-Gelenks der Krokodilinen und der Säugetiere zu, wobei er unter Berücksichtigung der Gelenk-Mechanik zu folgendem Resultat kommt: Die untersuchten Calc.-Astrag.-Gelenke bilden wahre phylogenetische Entwicklungsreihen. Die eine Reihe steigt von den Krokodilinen zum Menschen auf — gelenkfortbildende

Reihe — und zwar dadurch, dass in allen hierher gehörigen Gelenken die ursprüngliche Streckfähigkeit erhalten bleibt, während die Beugefähigkeit phylogenetisch aufwärts allmählich erlischt. Von den einzelnen dieser Reihe angehörigen Gelenken zweigen sich nun „gelenkumbildende“ Reihen ab, die eine Seitenentwicklung einschlagen und als parallele Entwicklungsreihen angesehen werden können. Diese Gelenke ersetzen die verloren gegangene Beugefähigkeit durch Ausbildung neuer Gelenkcharaktere und können als Gelenke mit Hyperbeugung bezeichnet werden. Je stärker in ihnen die Befähigung zur Hyperbeugung ausgebildet ist, desto weiter haben sie sich von der „gelenkfortbildenden“ Reihe entfernt. Solche phylogenetische Parallelreihen mit Hyperbeugungscharakter bilden die Calc.-Astrag.-Gelenke der Artiodaktylen, Perissodaktylen und Caniden. Die andern Formen der Calc.-Astrag.-Gelenke sollen in der Fortsetzung der Arbeit besprochen werden.

Vererbung. Bonnet, die stummelschwänzigen Hunde im Hinblick auf die Vererbung erworbener Eigenschaften. — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 584 — 606 (Verh. Anat. Gesellsch. Versammlg. Würzburg 1888).

Verf. weist in eingehender und überzeugender Weise nach, dass man „die Stummelschwänzigkeit der Hunde und der Haussäugetiere überhaupt als die Folge exzessiven Vorgreifens eines normalen Reduktionsvorganges an der Schwanzwirbelsäule“ auffassen muss und dass Haustiere, besonders der Hund, durchaus ungeeignet sind, um an ihnen die Frage zu studiren, ob das Koupiren der Schwänze durch Vererbung stummelschwänzige Nachkommen veranlasst.

Crampe, die Farben der Pferde von Trakehnen. II. Teil: Die Ergebnisse der Farben-Reinzucht. — Thiel's Landw. Jahrb. XVII. p. 755—885.

Verf. kommt nach eingehenden Untersuchungen zu dem Resultat, dass bei den Trakehner Pferden Farbe und Vererbung in bestimmter Beziehung stehen. Fuchse liefern ausschliesslich Nachkommen dieser Farbe, darunter stichelhaarige Fuchse und Fuchsschimmel. Von den Rappen werden ausser Rappen auch Fuchse, sowie Stichelhaarige und Schimmel dieser Farben hervorgebracht. Aus den Braunen fallen Pferde von allen Farben. Entgegen der sonst herrschenden Ansicht hält Verf. braun für die Urfarbe des Pferdes und er sieht in Schimmeln, Rappen, Füchsen die weissen, schwarzen und roten Farbenvarietäten der Stammform (entsprechend den bei vielen Arten auftretenden derartigen Farbenvarietäten).

Wilckens, M., Ueber die Vererbung der Haarfarbe und deren Beziehung zur Formveränderung bei Pferden. — Thiel's Landw. Jahrb. XVII. p. 555—576.

„In der Mehrzahl der Fälle vererbt einer der ungleichfarbigen Eltern mit seiner Haarfarbe auch seine Körperform.“

Zacharias, Otto, Zur Frage der Vererbung von Traumatismen, — Anatom. Anz. III. Jahrg. p. 373—379.

Verf. berichtet bei Gelegenheit einer allgemeinen Erörterung einige zu obiger Frage in Beziehung stehende Fälle von Menschen und Säugetieren.

Bastarde. Huet spricht über Leporiden und bezweifelt das Vorkommen derselben — Bull. Soc. Nat. d'Acclimat. de France 4. Série, T. V. p. 240—241 (Extr. des Procès-Verbaux.).

Jenner Weir giebt einen kurzen Bericht über verschiedenartige Equidenbastarde in Jardin d'Acclimatation resp. Jardin des Plantes (Zoologist III. Series, Vol. XII p. 102—103).

Derselbe erwähnt (ebenda p. 104) Bastarde von Schafen und Ziegen, welche dem Jardin des Plantes aus Chile zuzugingen. In einem Zusatz zu diesem Artikel wird bemerkt, dass derartige Bastarde „Chabins“ genannt in Chili, Peru und Argentinien sehr verbreitet und vollkommen fruchtbar (!!!) seien!

Biologie.

Allgemeines. Caton, J. D., The California Gray Whale (*Rhachianectes glaucus* Cope). — Am. Nat. XXII. p. 509—514.

Mitteilungen biologischen Inhalts: Lebensweise, Vorkommen, Fang. Die Art ist dem Aussterben nahe.

Vergl. auch Cockerell unter Biol., Feinde.

Geoffroy Saint-Hilaire, A., Renseignements sur les Castors du Rhône (*Castor fiber*). — Bull. Soc. Nat. d'Acclimat. de France. 4. Série, T. V. p. 321—324. Mit 1 Fig.

Die im Gebiet der Rhône vorkommenden Biber haben eine von der sonstigen abweichende Lebensweise angenommen, hervorgerufen durch die veränderte Lebensbedingungen, unter denen sie jetzt leben. Sie errichten keine „Burgen“ mehr, sondern graben Baue in den die Camargue gegen Überschwemmungen schützenden Rhônedeeichen. Sie werden dadurch sehr gefährlich und gehen in Folge davon ihrer baldigen Ausrottung entgegen.

Harting, J. E., The Badger, *Meles taxus*. — Zoologist, III. Series Vol. XII p. 1—13. Mit 1 Tfl.

Biologisches, Historisches, Linguistisches. Verf. constatirt, dass der Dachs in vielen Teilen der Britischen Inseln nicht nur recht häufig ist, sondern stellenweise auch immer zahlreicher wird. Interessante Notizen über die Trächtigkeitsdauer, welche unter Umständen 15 Mon. soll betragen können!

Inglis, J., Tent Life in Tigerland. II. Ed. London 1888. 8°. Enthält jagdliche und biologische Mitteilungen über indische Säuget.

Inverarity, J. D., Unscientific Notes on the Tiger. — Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. III, p. 143—154. Mit 3 Tfln.

Lataste, F., Notes prises au jour le jour sur différentes espèces de l'ordre des Rongeurs observées en captivité. — Extr. des Actes de la Soc. Linnéenne de Bordeaux Vol. XL. Mit 7 Tfln. 1887!

Verf. giebt eine Fülle biologischer Notizen und Mitteilungen, welche er durch tägliche Beobachtung einer grossen Zahl von in der Gefangenschaft gehaltenen kleineren Nagern machte.

von Lendenfeld, R., Bilder aus dem australischen Urwald. — Zool. Garten Jahrg. XXIX.

1. Das Schnabeltier loc. cit. p. 14—18; 2. Der Wombat, *Phascolomys wombat* p. 65—68; 3. Das grosse Känguruh *Macropus giganteus* p. 225—231.

Durchgehends Schilderungen des Lebens der genannten Tiere mit eingestreuten Bemerkungen über ihre Organisation.

Menges, Joseph, Ausdauer eines Leoparden. — Zool. Garten Jahrg. XXIX, p. 231—233.

Mitteilungen über Widerstandsfähigkeit gegen Hunger und Durst.

Nehring, A., spricht über ein im Berliner Aquarium befindliches Exemplar von *Halichoerus grypus*. — Sitzungsber. Ges. naturf. Freunde. 1888, p. 7—8.

Parker, H. W., Cat Phenomena. — Science Vol. XI, p. 96.

Bemerkungen über geistige Fähigkeiten bei einer Katze.

T. Southwell bezweifelt, dass der Maulwurf Wintervorräte von Würmern anlegt und giebt einige biologische Bemerkungen über das Tier. (Zoologist, III. Series, Vol. XII, p. 21—22.

Steere, J. B., Observations made in the Central Philippines. — Am. Nat. XXII, p. 622—626 und 779—784.

Enthält einige biologische Notizen über Fledermäuse, ohne Angabe der Art.

Derselbe, Six weeks in southern Mindanao. — Am. Nat. XXII, p. 289—294.

Enthält kurze Notizen über einige Säugetiere.

Ueber Kinder ernährende Wölfe bringt der Zoologist, III. Series Vol. XII, p. 87—98 einen Abdruck einer 1852 unter folgendem Titel erschienenen Schrift: „An Account on Wolves nurturing Children in their Dens. By an Indian Official.“ Eine von Hamilton Smith herrührende handschriftliche Notiz bezeichnet einen in Indien stationirten englischen Colonel als Autor des etwas abenteuerlich klingenden Artikels.

Nahrung. Vergl. Southwell unter Biol., Allgem.

Bewegung. Shufeldt, R. W., stellte fest, dass ein amerikanischer Hase (*L. callotis*) bei eiligem Lauf Sprünge von 12—13 Fuss macht (Zoologist, III Ser. Vol. XII, p. 259).

Färbung. Allen, Harrison, The distribution of the color-marks of the Mammalia. — Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1888, p. 84—105.

Wenn Tiere stellenweise Abweichungen von gleichartiger Färbung annehmen, so treten diese an bestimmten Stellen auf. Bei im allgemeinen unbehaarten Tieren finden sich in der Regel an entsprechenden Stellen Reste von Behaarung. Diese Stellen sind entweder Flecke an gewissen Körperteilen oder Streifen über den

Rumpf etc. Besonders gefärbte Abzeichen, bisweilen stärkerer Haarwuchs, treten auf in der Mittellinie des Rückens, auf der Dorsalfäche des Halses, in der Mitte der Scheitel- und Stirnpartie, am Bauch und an der Innenseite der Extremitäten, am Ulnarrand des Unterarms, in der Achselhöhle und der Schamgegend, als weisses Halsband, oft in der Gegend der Sinnesorgane, sowie an Nervenendigungen, nicht selten als Streifen an den Körperseiten, ferner in den Zwischenräumen zwischen Muskelmassen und endlich an Stellen, welche reich an feuchten Absonderungen sind. Nicht selten treten in Folge von Alter Umfärbungen an den erwähnten Stellen ein. In manchen Fällen ist die Färbung nicht symmetrisch auf der rechten und linken Körperhälfte, ebenso zeigt die vordere Körperhälfte oft einen anderen Färbungscharakter als die hintere. Alle einzelnen Fälle werden durch Beispiele erläutert.

Aplin, Oliver V., On the Assumption of the Ermine Dress in Stoats. — Zoologist, III Series Vol. XII, p. 141.

Verf. vertritt die Ansicht, dass beim Farbenwechsel des Hermelins im Frühjahr kein Haarwechsel stattfindet, sondern dass sich das weisse Haar in braunes verwandelt. Dabei soll die Umfärbung des einzelnen Haares von der Spitze her beginnen (wie dies vor sich gehen soll, ist unverständlich. Ref.)

Eckstein, K., berichtet kurz über eigentümliche Färbung von *Lepus timidus* und über Käfer fressende Katzen. — Zool. Garten Jahrg. XXIX p. 345—346.

Eimer, G. H. Th., Ueber die Zeichnung der Tiere. — Humboldt 7. Jahrg. p. 173—181. Mit 11 Abbildgn. und 1 Tfl.

In diesem VI. Kap. giebt Verf. allgemeine Bemerkungen über die Anpassung von Farbe und Zeichnung bei den Tieren und erörtert dann die Zeichnung der marder- und bärenartigen Raubtiere.

van Kempen, Ch., Sur une série de Mammifères et d'Oiseaux d'Europe présentant des anomalies ou des variétés de coloration. — Bull. Soc. Zool. de France XIII, p. 103 (104).

Verf. zählt 9 Säugetiere auf mit abnormer Färbung, meistens Albinos, einige anders gefärbt.

H. Scheinpflug berichtet kurz über ein weisses Reh. — Zoologist III. Series, Vol. XII, p. 298.

Taylor, W. E., giebt Bemerkungen über lokales Abändern der Färbung bei fliegenden Eichhörnchen aus Nebraska. (Am. Nat. XXII. p. 744—745).

Watson, W. H., berichtet über eine weisse Varietät des Maulwurfs im Zoologist, III. Series Vol. XII p. 387.

Wiepken, C. F., giebt eine kurze Notiz über einen Steinmarder mit gelber und einen Baummarder mit weisser Kehle. — Zool. Garten Jahrg. XXIX, p. 313.

Zipperlen, A., veröffentlicht kurze Notizen über die Färbung schwarzer Wölfe aus Nordamerika und von Präriewölfen. — Zool. Garten XXIX, p. 60.

Schlaf. Müller, Adolf, Beobachtungen über die Gewichtsabnahme der kleinen Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*) während des Winterschlafs. — Zool. Garten Jahrg. XXIX p. 247—248.

Ein Expl. verlor während einer fast fünf Monate dauernden Winterruhe etwa $\frac{1}{12}$, ein zweites $\frac{1}{9}$ seines ursprünglichen Gewichtes.

Brunst, Brutpflege etc. Huet, Note sur les Naissances, Dons et Acquisitions de la Ménagerie du Mus. d'Hist. Nat. — Bull. Soc. Nat. d'Acclimat. de France, 4. Série, T. V. p. 97—100.

Bemerkenswert ist, dass am 11. Dez. ein junges Gnu geboren wurde, welches im Alter von 3 Tagen eine Kälte von -13° ohne Nachtheil ertrug.

Vergl. ferner ebenda p. 865—866.

Lütken, Chr., Was die Grönländer von der Geburt der Wale wissen wollen. — Zool. Jahrb. III. p. 802—804.

Verf. teilt mit, dass nach den Beobachtungen der Grönländer bei den Walen das Junge mit dem Schwanz voran geboren werde und dass zwischen dem Anfang und dem Ende des Geburtsaktes mehrere Wochen vergingen. Eschricht berichtet dasselbe für die Braunfische, während nach Turner's und van Beneden's Ansicht der Kopf zuerst heraustritt.

Southwell, Th., On the winter breeding of the Otter. — Zoologist III. Ser. Vol. XII. p. 248—251.

Es wird statistisch nachgewiesen, dass der Fischotter meistens im Herbst oder (häufiger) im Winter wirft, höchst selten im Frühjahr.

Gefangenschaft. Blaauw, F. E., Resultate und Beobachtungen aus der Tierpflege. — Zool. Garten Jahrg. XXIX p. 3—5, 68—71, 130—132.

Behandelt von Säugetieren Gnu, *Hyrax capensis* und *Cervulus Reevesii*, Gefangenschaft und Zucht.

Coester, C., Der Siebenschläfer (*Myoxus glis*) in der Gefangenschaft. — Zool. Garten Jahrg. XXIX, p. 359—364.

Haacke, Wilhelm, Aus dem Leben des Präriehundes. — Zool. Garten Jahrg. XXIX, p. 321—329.

Beobachtungen in der Gefangenschaft.

Vergl. Huet unter Biol., Brutpflege.

Landois, H., Zur Pflege der Affen in der Gefangenschaft. — Zool. Garten Jahrg. XXIX, p. 129—130.

Gewisse Affenarten vertragen gut die Winterkälte Deutschlands.

Sclater berichtet über den Zuwachs an Tieren im Garten der Londoner Zoologischen Gesellschaft. — Proc. Zool. Soc. London 1888, p. 1ff., p. 87, p. 140, p. 219, p. 265, p. 291, p. 413, p. 564.

Derselbe giebt ebenda p. 1—2 eine Liste der im Londoner Zool. Garten lebenden Caniden.

Feinde. Cockerell, T. D. A., führt einen Fall an, dass *Mus muscul.* eine andere Muridenart, *Hesperomys sonoriensis* verdrängte, gerade es bei *Mus decum.* und *M. rattus* bekannt ist. — Zoologist, III. Series Vol. XII, p. 223.

Gottheil, W. S., Note on *Taenia elliptica* (Cat). — The Journ. of Comp. Med. and Surg. Vol. IX, p. 126—127. Mit 1 Tfl.

Verf. zählt die Cestoden der Katze auf (5 Arten) und beschreibt kurz *Taenia elliptica*.

Gros, H., Les Rats et les Mangoustes. — Bull. Soc. Nat. d'Acclimat. de France. 4. Série, T. V, p. 539—542.

Verf. schildert den durch die Ratten angerichteten Schaden auf den Antillen und die Wirksamkeit der als Gegenmittel eingeführten Mangusten.

Pouchet, G., Sur un nouveau *Cyamus* parasite du Cachalot. — Comptes rend. Acad. des sciences T. CVII. p. 698—699.

Kurze Beschreibung eines als *Cyamus physeteri* bezeichneten bisher unbekannten Parasiten des Potwales.

Pouchet et Beauregard, Note sur les parasites du cachalot. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V, p. 744—745.

Verf. fand auf einem Cachalot *Cyamus physeteri* sp. n., einen Trematoden, wahrscheinlich zu *Monostomum* gehörig, und eine nicht bestimmte Ascaris.

Railliet, A., Les Parasites du Chabain et l'Oesophagostome des petits Ruminants. — Bull. Soc. Zool. de France XIII, p. 216—218.

Verf. führt die Parasiten der durch Kreuzung von Schaf und Ziege entstandenen Bastarde („Chabins oder „*Carneros linudos*“) an und erörtert das Vorkommen dieser Parasiten auf den betr. Stammarten.

Krankheiten und Missbildungen. Alsbery, M., Ein milchgebender Ziegenbock. — Humboldt, 7. Jahrg., p. 158,

Verf. teilt einen durch behördliche Dokumente sicher beglaubigten Fall mit, dass ein zur Zucht benutzter Ziegenbock aus zwei etwa 4 cm langen, an den Seiten der Hoden befindlichen Strichen Milch gab. Dieselbe war reicher an Fett und Kasein als gewöhnliche Ziegenmilch.

Babes, V., Sur l'hémoglobinurie bactérienne du boeuf. — Comptes rend. hebdomad. Acad. des sciences. T. CVII, p. 692—694.

Verf. beschreibt eine in Rumänien endemische, oft mit der Rinderpest verwechselte Krankheit, bei welcher stets ein *Gonococcus*-ähnliches Bacterium auftritt, das wahrscheinlich die Hämoglobinurie verursacht.

Derselbe, Sur l'hémoglobinurie bactérienne du boeuf. — Journ. de Micrographie. T. 12, p. 448—449.

Beschreibung der Krankheitserscheinungen (Symptome, Verlauf) und der Mikroben.

Burke, Rich. W., Some rare forms of Eye-disease in veterinary practice. — The Journ. of Comp. Med. and Surg. Vol. IX, p. 18—19. Mit 1 Tfl.

Behandelt interstitielle Keratitis, Glaucoma und Granulomata der Cornea beim Pferde.

Cornil, M. V., et Chantemesse, A., La pneumo-entérite des porcs. — Journ. Anat. Physiol. XXIV, p. 618—655. Mit 3 Tfn.

Eingehende Untersuchungen über Geschichte und Etiologie, Darstellung besonders heftiger Fälle der Seuche in Gentilly und Marseille, pathologische Anatomie, Symptome und Diagnose, Prophylaxis.

Eckmeyer, Situs inversus viscerum beim Ochsen. — Berliner tierärztl. Wochenschr. Jahrg. VI, Nr. 48.

Ehlers, T., Verwachsener Muttermund (Harms) oder Verschluss des Gebärmutterhalses (Franck) bei der Kuh. — Rundschau auf d. Gebiete d. Tiermedizin, Jahrg. IV, p. 193—195, 201—204.

Galippe, V., Note sur l'existence d'une maladie analogue à la gingivite arthrodentaire infectieuse chez l'éléphant d'Asie. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V, p. 443—447.

Verf. beschreibt einen Fall der von ihm und Malassez beim Menschen als „Gingivite arthro-dentaire infectieuse“ bezeichneten Zahnerkrankung eines indischen Elefanten.

Körner, O., giebt Mitteilungen über Rhachitis bei jungen Löwen, z. T. nach Brit. Med. Journal, 24. Nov. 1888. — Zool. Garten, Jahrg. XXIX, p. 376—377.

Lee, Daniel D., A common Lesion of the Horse. — The Journ. of Comp. Med. and Surg. Vol. IX, p. 389—392.

Behandelt eine Verletzung des Ellbogens des Pferdes, welche beim Liegen des Pferdes durch den Druck eines Hufeisens entsteht.

Lungwitz, Beitrag zur Verknöcherung der Hufknorpel beim Pferde. — Deutsche Zeitsch. f. Tiermed. Bd. XIV, p. 21—45. Mit 1 Tfl.

Lutze, G., berichtet kurz über einen Fall von Kloakenbildung beim Hausschwein. — Zool. Garten, Jahrg. XXIX, p. 92.

Mégnin, Note relative à l'inoculation de la phtisie coccidienne aux lapins d'Australie. — Bull. Soc. d'Acclim. IV. Série, T. V, p. 155—156.

Verf. warnt vor Einführung der von Pasteur zur Vertilgung der Kaninchen empfohlenen Hühner-Cholera nach Australien, glaubt dagegen, die Uebertragung der bei uns bei Hasen und Kaninchen vorkommenden Leberfäule (phtisie de foie oder cocc.) für ungefährlicher und besser halten zu dürfen.

Derselbe, La Phtisie hépatique coccidienne du lapin et son inoculation aux lapins d'Australie. — Bull. Soc. Nat. d'Acclimat. de France. 4. Série, T. V, p. 385—395. Mit Figuren.

Verf. beschreibt eine in Frankreich unter den Kaninchen wütende und als „gros ventre“ bezeichnete Krankheit. Dieselbe rührt nicht von zu nasser Nahrung her, sondern ist zweifacher Art, entweder durch *Taenia pectinata* oder durch *Coccidium oviforme* hervorgerufen. Als Heilmittel wird Salicylsäure empfohlen, sowie Weidenrinde. Verf. rät, die durch *Cocc. ovif.* erzeugte Leberkrankheit auf die Kaninchen in Australien zu übertragen, um diese zu ver-

nichten. Das Mittel sei weniger gefährlich als das von Pasteur vorgeschlagene der Hühnercholera.

Müller, Hypertrophie des linken Hornes bei einem Ochsen ungarischer Rasse. — Oesterr. Zeitschr. f. wissensch. Veterinärk. Bd. II p. 24—26. Mit 2 Abbildgn.

Nicolas, A., et Prenant, A., Observations d'une monstruosité rare (Absence du maxillaire inférieur. Défaut de communication entre la bouche et les fosses nasales d'une part, le pharynx et le larynx d'autre part.). — Journ. Anat. Physiol. XXIV, p. 113—141. Mit 2 Tfn.

Eingehende Beschreibung und Darstellung eines mit den angegebenen Missbildungen behafteten, fast ausgetragenen Schafembryos.

Nocard, Sur l'immunité naturelle des moutons bretonnes à l'égard de la clavelée. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 824—825.

Angeblich sind die bretonischen Schafe immun gegen die Schafpocken („clavelée“).

Phisalix, C., Note sur la cyclopie chez les Mammifères. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V, p. 667—669.

Verf. erörtert die Befunde des Gehirns bei unvollständiger und vollständiger Cyclopie bei Mensch, Hund und Hammel.

Rietsch, Jobert et Martinand, Sur l'épidémie des pores à Marseille en 1887. — Comptes rend. hebdomad. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 66—68.

Salmon, D. E., Hog Cholera. — The Journ. of Comp. Med. and Surg, Vol. IX, p. 136—151.

Verf. behandelt die in Amerika durch ein besonderes Bakterium verursachte Schweinecholera, welche verschieden ist von der in Deutschland auftretenden Schweineseuche (Rotlauf, „rouget“ der Franzosen).

Schweizer, Fr., Ueber ein Cystadenoma papilliferum in einer Kaninchenleber. — Virchows Arch. Bd. 113, p. 209—221. Mit 1 Tfl.

Genauere Schilderung der sehr selten beobachteten angeführten pathologischen Erscheinung bei zwei achtwöchentlichen Kaninchen.

Semmer, E., Zur Frage über das Vorkommen des Typhus bei Tieren. — Virchows Arch. Bd. 112, p. 203—208.

Verf. schildert einige Fälle typhusartiger Krankheiten bei Pferden und Hunden, aus welchen sich jedoch nicht mit Sicherheit ergibt, dass wirklicher Typhus bei Tieren vorkommt.

Walley, Thomas, The Colon of the Horse — its Diseases and Derangements. — The Journal of Comp. Med. and Surg. Vol. IX, p. 1—17.

Fortsetzung des ebenso betitelten Aufsatzes im vorherg. Bd.

Derselbe, Malpositions of the Colon and Coecum. — Ebenda, p. 113—156.

Verf. erörtert Fälle von unrichtiger Lagerung (malposition) des Colon und Coecum, welche er als Hauptursache der Verdauungsstörungen beim Pferde ansieht.

Windle, Bertram C. A., Account of a Teratoma springing from the sphenoid of a Calf, with the results produced by the tumor. — The Journal of Anat. and Phys. New S., Vol. II, p. 423 bis 434. Mit 1 Abbildg.

Genaue Beschreibung des missgebildeten Kopfes eines Kalbes mit gespaltenem Gaumen, zweispaltiger Zunge etc.

Pion, E., Note sur la Rage chez les Herbivores (Boeuf, Mouton, Chèvre, Daim). — Bull. Soc. Nat. d'Acclimat. de France. 4. Série, T. V, p. 845—850.

Verf. beschreibt das Auftreten der Wutkrankheit bei Wiederkäuern, besonders beim Rinde und giebt eine Darstellung der Krankheit bei dem Damwild des Richmond Parkes bei London im Jahre 1886.

Nutzen und Schaden. Berthoule, Am., Une plaie en Australie. — Bull. Soc. d'Acclim. IV. Serie, T. V, p. 145—154.

Behandelt die Kaninchenplage in Australien.

Vergl. hierzu ferner Zoologist, III. Ser. Vol. XII, p. 321—328.

Gronen, Damian, Der Wolf in Russland. — Zool. Garten, Jahrg. XXIX, p. 237—241.

Meistens statistische Angaben über Schaden, Mitteilungen über Jagd u. s. w.

Hinckelmann, Schädigungen der Fischerei in der Ostsee durch Seehunde. — Mitteilungen des Deutschen Fischerei-Vereins 1886 (!)

(NB.!) Uebersetzungen in Bull. U. S. Fish Commission 1887 und in Zoologist 1888 p. 128—130.

The wild animals of British India. — Zoologist, III. Series Vol. XII, p. 361—367.

Bericht über die Zahl der durch wilde Tiere in Indien getöteten Menschen und Haustiere, sowie über diejenige der erlegten wilden Tiere.

Land- und Forstwirtschaft, Jagd etc. Adametz s. unter Anat. u. Phys., Muskelsyst.

Auld, R. C., The wild cattle of Great Britain. — Am. Nat. XXII, p. 498—509. Mit 2 Holzschn.

Verf. giebt zunächst einige Erörterungen über die Herkunft der britischen Wildrinder und zählt alsdann die einzelnen gehörnten und die weit zahlreicheren hornlosen (polled) Heerden auf. Zu jeder der hornlosen Heerden folgen erläuternde Bemerkungen.

Vergl. auch Auld unter Phylogenie.

Bungartz, Jean, Kaninchenrassen. Illustr. Handbuch. Magdeburg 1888.

Dalziel, H., British Dogs: Describing the History, Characteristics, Breeding, Management, and Exhibition of the

various breeds of Dogs established in Great Britain. II. Ed. Vol. I. London 1888 (?).

Fankhauser, Die volkswirtschaftliche und forstliche Bedeutung der Ziege in der Schweiz. Dissert. Bern 1887.

Geruzey, P., Le cheval moderne. — Bull. Soc. Nat. d'Acclimat. de France. 4. Série, T. V, p. 413—448. Mit vielen Abbildungen.

Erörterungen besonders über das moderne Reit- resp. Militärpferd, Behandlung desselben, Bewegungen etc.

Hittcher s. unter Anat. u. Phys., Skel.

Huidekoper, R. S., Origin of the Domestication of the Horse. — The Journ. of Comp. Med. and Surg. Vol. IX, p. 377—389.

Nach einer paläontologischen Einleitung behandelt Verf. speziell das Vorkommen von prähistorischen Pferderesten, schildert die Domestikation, deren erste Anfänge nach ihm in die Bronzezeit fallen, und erörtert die Geschichte des Pferdes in den früheren historischen Perioden. Nehring's Arbeit über die foss. Pferde wird nicht citirt, doch ist Verf. der Ansicht, dass neben den aus dem Orient stammenden Pferden auch die in Europa einheimischen Rassen domestiziert wurden.

Kaiser, Ueber die sogenannten doppellendigen Rinder. — Thiel's Landw. Jahrb., p. 386—403.

Landrin, A., Traité sur le chien. Paris 1888.

Lavalard, E., Le cheval dans ses rapports avec l'Economie rurale et les industries de transports (Alimentation, écuries, maréchalerie). T. I. Paris 1888.

Lesèble, L., Du Chien Militaire. — Bull. Soc. Nat. d'Acclimat. de France 4. Série, T. V, p. 209—225.

Verf. behandelt eingehend die Frage der Benutzung des Hundes zu militärischen, speziell Kriegs-Zwecken, und empfiehlt die französ. Schäferhunde.

Derselbe, La chasse ou loup en Russie. — Ebenda, p. 914 — 917. Mit 1 Fig.

Lie, Les chiens de chasse en Norvège. — Bull. Soc. Nat. d'Acclimat. de France. 4. Série, T. V, p. 617—624.

Es werden die verschiedenen in Norwegen zur Jagd benutzten Hunde beschrieben und die betr. Jagdarten geschildert.

v. Middendorff, A., Ueber die Rindviehrasse des nördlichen Russlands und ihre Veredelung. — Thiel's Landw. Jahrb. XVII, p. 267—328. Mit 7 Tfn.

Uebersetzung aus dem Russischen von B. Bajohr. Enthält Bemerkungen allgemeinen Inhalts.

Nehring, A., Ueber den Schädel eines Franqueiro-Ochsen aus Brasilien. — Sitzungsber. Ges. nat. Fr. Berlin 1888, p. 91—99. Mit 2 Abbildg.

Verf. beschreibt und bildet ab den Schädel eines Ochsen der durch überaus stark entwickelte Hörner und einige andere Eigentümlichkeiten ausgezeichneten Franqueiro-Rasse aus der brasilianischen

Provinz S. Paulo. Der Schädel zeigt im Allgem. den Frontosus-Typus. Verf. äussert die Ansicht dass die Eigentümlichkeiten der F.-Rasse sich in Brasilien herausgebildet haben.

Derselbe, Ueber den Einfluss der Domestikation auf die Grösse der Tiere, namentlich über Grössenunterschiede zwischen wilden und zahmen Grunzochsen (*Poëphagus grunniens*). — Ebenda, p. 133—141.

Verf. zeigt an Schädeln von *Poëphagus grunniens*, dass Domestikation zunächst die Grösse der Tiere herabsetzt. Zum Schluss wird auseinandergesetzt, dass sich in der Form und Bildung der Schambeinsymphyse Geschlechtsunterschiede bei den Wiederkäuern und Pferden ausprägen.

d'Orcet, Notes pour servir à l'histoire du cheval en Amérique. — Bull. Soc. Nat. d'Acclimat de France. 4. Série, T. V, p. 877—893, 950—964, 1036—1049, 1109—

Verf. giebt einen Abriss über die Abstammung des Pferdes, eine Darstellung der Einführung desselben in Amerika, der weiteren Schicksale, Veränderungen, Lebensweise, Verwilderung, amerikanische Rassen.

Piètrement, C.-A., L'origine et l'évolution intellectuelle du chien d'arrêt. — Bull. Soc. d'Anthropol. de Paris 3. S., T. 11, p. 320—365 (Discussion 365—373).

Verf. leitet die heutigen Vorstehhunde, welche sich unter einander nach ihm nur durch die Behaarung unterscheiden, von den Jagdhunden ab, welche um das 15. Jahrhundert zur Falkenjagd gebraucht wurden.

Placzek, B., Wiesel und Katze, ein Beitrag zur Geschichte der Haustiere. — Verh. naturhist. Ver. Brünn. XXVI, p. 124—191.

Sehr eingehende Arbeit, hauptsächlich historischen Inhaltes. Die modernere Verhältnisse betreffenden Angaben, insbesondere die Angaben über Haus- und Wildkatze, entsprechen nicht ganz dem jetzigen Stande der Forschung.

Sanders, J. H., Die Pferdezucht unter Anwendung der allgemeinen Vererbungsgesetze auf die praktische Züchtung. Breslau 1888.

Schlotfeld, E., Jagd-, Hof- und Schäferhunde. Mit 21 Abbildgn. Berlin 1888.

Behandelt die zur Jagd-, zur Bewachung der Heerden, des Hauses und Hofes verwendeten Hunderassen, sowie die Krankheiten des Hundes. Das Werk bildet einen Band der Thaer-Bibliothek.

Schulze, Bernh., Die Ernährung der landwirtschaftlichen Nutztiere übersichtlich dargestellt und durch zahlreiche Beispiele von Futterationen erläutert. Breslau 1888.

Derselbe, Ratgeber bei der Fütterung der landwirtschaftlichen Nutztiere. Breslau 1888.

Southwell, Th., Notes on the Seal and Whale Fishery of 1887, — Zoologist III. Ser. Vol. XII, p. 121—128.

Cocks, A. H., The Finwhale Fishery off the Lapland Coast. — Zoologist III. Series Vol. XII, p. 201—208.

Spigardi, P., Studi sulle razze degli animali domestici della valle del Taro, sotto il rapporto zoologico, zootecnico ed industriale. Borgotaro 1887!

Behandelt Pferde, Rinder, Schafe und Schweine.

Werner, Die Rindviehschläge der Schweiz und die fünfte schweizerische landwirtschaftliche Ausstellung zu Neuenburg. — Thiel's Landw. Jahrb. XVII, p. 177—237.

Geographische Verbreitung und Faunen.

Allgemeines. Balkwill, F. H., On the geographical distribution of Seals. — Zoologist, III. Series Vol. XII p. 401—411.

Allgemeines über die Pinnipedia, Angaben über Verbreitung, Bemerkungen über Lebensweise etc.

Vergl. auch Jentink unter Syst., Allgem.

Rodler, A., Verbreitung und Geschichte der Seesäugetiere. Wien 1888.

Verf. bespricht in grossen Zügen die Stammesgeschichte der drei Gruppen von Seesäugetieren (Pinnipedia, Sirenen, Wale), sowie ihre einstige und jetzige Verbreitung, ohne jedoch auf die Systematik oder auf einzelne Gattungen und Arten einzugehen.

True, F. W., Guide to a Collection illustrating the Families of Mammals in the Ohio Valley Exposition, 1888. — Proc. U. S. Nat. Mus. Vol. XI, Appendix, p. 1—26.

Tyrell, J. B., Catalogue of the Mammalia of Canada, exclusive the Cetacea. — Proc. Canad. Instit. Vol. XXIV, p. 66—91.

A. Winchell giebt eine oberflächliche Uebersicht über die gelegentlich geologischer Untersuchungen im nördlichen Minnesota beobachteten Säugetiere (und andere Vertebr.). — Geol. and Nat. Hist. Survey of Minnesota 1888 p. 138.

Mustela Pennanti führt die Bezeichnung „fisher“.

Oestliche gemässigte Region. Bailey berichtet über die Strandung eines *Hyperoodon rostratus* bei Flamborough. — Naturalist 1888 p. 114.

Balkwill, F. H., beschreibt und bildet ab ein bei den Scilly-Inseln gefangenes Expl. von *Balaenoptera rostrata*. — Annual Rep. and Trans. Plym. Inst. X, p. 120—122.

Bielz, E. A., Die Fauna der Wirbeltiere Siebenbürgens — Verh. u. Mittlg. siebenbürg. Ver. f. Naturw. Bd. XXXVIII p. 15—120.

Einschliesslich der Haustiere werden 75 Arten von Säugetieren aufgezählt.

Blagg, E. W. H., berichtet über *Vesp. Bechsteinii* und *V. mystacinus* in Hampshire und Staffordshire. — Zoologist, III. Ser. Vol. XII, p. 260.

Büchner Eug., *Mammalia Przewalskiana*. Wissenschaftliche Resultate der von N. M. Przewalski nach Central-Asien unternommenen Reisen. Zoologischer Teil. Bd. 1. Säugetiere, bearb. von Eug. Büchner. Liefg. 1. St. Petersburg 1888. Mit 5 Tfn.

Verf. bearbeitet die von Przewalski gesammelten Säugetiere in einem grossen, in russischer und deutscher Sprache gedruckten Werk mit zahlreichen hervorragend schönen Farbentafeln, sowie photographischen Abbildungen. In Liefg. 1 werden behandelt: *Pteromys volans* (L.), *Tamias Pallasi* Baird, *Spermoph. erythrogenys* Brandt, *Sp. alaskanicus* Büchner, *Sp. monogolicus* Milne Edw., *Sp. obscurus* Büchner, *Sp. Eversmanni* Brandt, *Arctomys himalayanus* Hodgs., *A. robustus* Milne Edw., *A. sp.* und *A. dichrous* Anderson. Vergl. an den betr. Stellen unter Systematik!

Carlini, A. de, *Vertebrati della Valtellina*. — Ann. Soc. Ital. XXXI, p. 17—90.

Gadeau de Kerville, H., *Faune de la Normandie*. I. Mammifères. Paris 1888. Exstr. du Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen 1887, p. 147—246.

Harting, J. E., *The Whiskered Bat, Vespertilio mystacinus*. — Zoologist, III. Series Vol. XII p. 161—166. Mit 1 Tfl.

Enthält hauptsächlich Mitteilungen über das Vorkommen in Grossbritannien.

Huth, E., *Beiträge zur Kenntniss der märkischen Fauna*. 1. Die wildlebenden Säugetiere. — Sammlg. naturwiss. Vortr. herausgeg. von E. Huth. 2. Bd. 5. Hft. Berlin 1888.

Laver, H., berichtet über ein am Fluss Crouch in Essex gestrandetes Exemplar von *Grampus griseus*. — Zoologist, III. Ser. Vol. XII, p. 260—261.

Monaco, Albert Prince de, *Sur un Cachalot des Açores*. — Comptes rend. hebd. Acad. des sciences, T. CVII, p. 923—926. Mit 2 Abbildgn.

Kurze Mitteilungen über einen bei den Azoren gestrandeten weiblichen Potwal, nebst 2 nach Photographien hergestellten Ansichten des Kopfes.

Pouchet et Beauregard, *Sur la présence de deux Baleines franches dans les eaux d'Alger*. — Comptes rend. hebd. Acad. des sciences, T. CVI, p. 875—876.

Verf. berichten über zwei an der Küste von Algier beobachtete Exemplare von *Balaena biscayensis*.

Seefeld, A., macht Mitteilungen über ein bei Wladiwostock gefangenes Expl. von *F. tigris*. — Zool. Garten Jahrg. XXIX, p. 28.

Service, R., constatirt einen Fall des Vorkommens von *Delphinus tursio* im Solway Firth. — Zoologist, III. Series Vol. XII p. 346—347.

Simroth, H., *Zur Kenntniss der Azorenfauna*. — Arch. f. Nat. 1888 I, p. 179—234.

Säugetiere incl. Haustiere werden p. 180—184 erwähnt.

Southwell, T., berichtet über das Vorkommen von *Hyperoodon*

rostr. an der Küste von Norfolk. (Zoologist, III. Series Vol. XII, p. 387).

Ueber das Vorkommen von *Arvicola glareolus* in Großbritannien wird berichtet im Zoologist, III. Series, Vol. XII, p. 23—24, p. 65—66, p. 105, p. 298, p. 346.

Aethiopische Region. Giglioli, E. H., Note intorno agli animali vertebrati raccolti dal Conte Augusto Boutourline e dal Dr. Leopold Traversi ad Assab e nello Scioa negli anni 1884—87. Ann. Mus. Civ. di St. nat. Genova S. 2. Vol. VI, p. 1—73.

Behandelt werden 5 Affen, 8 Raubtiere, 6 Artiodact., 2 Hyracoidea 6 Nager, 1 Fledermaus. Eingehende Notizen bei *Colobus guereza Rüpp.* (Die von Thomas 1885 geschaffene Subspez. „caudatus“ nicht aufrecht zu halten), *Cercopith. albigularis Sykes* (Verbreitung); ferner bei *Canis variegatus Cretsch.*, *Ictonyx zorilla (Thunb.)*, *Hyrax scioanus Giglioli*.

Vergl. auch Jentink unter Syst., Allgem.

Thomas, Oldfield, On a collection of Mammals obtained by Emin Pasha in Equatorial Africa and presented by him to the Natural History Museum. — Proc. Zool. Soc. London 1888 p. 3—17. Mit 2 color. Tfn.

Verf. behandelt 39 Arten und zwar: Primates 3, Carniv. 8, Insectiv. 1, Chiropt. 3, Ungul. 1, Edent. 1, Rod. 22. Die Exemplare sind gesammelt in Monbutu im Congobecken; alle tragen einen spezifisch westafrikan. Charakter. Die Wasserscheide zwischen Congo und Nil bildet eine scharf abschneidende Grenze zwischen der westafrikanischen Waldfauna und dem Gebiet des oberen Nil, und zwar so scharf, wie kaum je 2 Faunen getrennt sind. 2 neue Arten werden beschrieben und auf farbigen Tafeln abgebildet: *Anomalurus pusillus* sp. n. und *Dendrohyrax Emini* (Diagnosen beider Arten in Ann. Mag. Nat. Hist. 1887; vergl. Bericht f. 1887 p. 72 u. 78).

Malayische Region. Blanford, W. T., The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Part I. Mammalia. London 1888.

Behandelt Primates, wozu auch die Lemuroidea gerechnet werden, die Carnivora und Insectivora einschliesslich der Dermoptera. Abbild. von Schädeln, Gebissen und ganzen Tieren.

Lister, J. J., On the Natural History of Christmas Island, in the Indian Ocean. — Proc. Zool. Soc. London 1888 p. 512—591.

Enthält u. a. eine kurze Aufzählung der Säugetiere, welche eingehender von O. Thomas behandelt werden. Vergl. u.

Steere, J. B., A month in Paláwan. — Am. Nat. XXII, p. 142—145.

Verf. weist nach, dass die Insel Palawan zoologisch sich näher an Borneo anschliesst als an die andern Philippinen, und stützt sich dabei besonders auf die Säugetierfauna. Anwesenheit von *Manis*, *Arctictis* etc., Fehlen von Hirschen, *Galeopithecus*.

Thomas, Oldfield, Diagnoses of four new Mammals from

the Malayan Region. — Ann. Mag. Nat. Hist. 6. Ser. Vol. II p. 407 bis 409.

Vergl. unter System. *Hylomys suillus dorsalis* var. nov., *Sciurus concinnus* sp. n., *Mus alticola* sp. n., *M. infraluteus* sp. n.

Derselbe, On the Mammals of Christmas Islands. — Proc. Zool. Soc. London. 1888 p. 532—534.

Behandelt werden: *Crocidura fuliginosa* var. *trichura* Dobs. var. nov., welche durch einen längeren, mit langen, dünnen Haaren besetzten Schwanz von der typischen *Croc. fulig.* abweicht; ferner *Pteropus natalis* Thos., *Mus Macleari* Thos. und *M. nativitatis* sp. n. Letztere Art ist ausgezeichnet durch ihre Grösse, kleinen, feinen Kopf, kurzen, einfarbigen Schwanz, grosse Hände und Füsse, mächtige Grabkrallen. Kopf und Körper bei den beiden untersuchten Expl. 254 resp. 264 mm, Schwanz 176 resp. 175 mm. Das Vorkommen von 2 Rattenarten auf einer kleinen Insel mit nur ganz wenigen Säugern ist bemerkenswert.

Australische Region. Campbell, A. J., Fauna of Kings Islands. — Mammalia. — Victorian Naturalist, Vol. IV, p. 135—136.

Ramsay, E. P., Notes on the Fauna of the Bellenden-Ker Ranges. — Proc. Linnean Soc. N. S. Wales. II. Ser. Vol. III, p. 1295—1299.

Verf. führt folgende Arten von den Bellenden-Ker Ranges von Queensland an; 1) *Hypsiprymnodon moschatus* Ramsay, von den dortigen Ansiedlern „Musk Rat“ genannt; selten. 2) *Dasyurus gracilis* n. sp. Zahnf. i. $\frac{4}{3}$ c $\frac{1}{1}$ pm $\frac{2}{2}$ m $\frac{4}{4}$, die typische Formel der Gattg. *Dasyurus*. Totallänge etwa 23 engl. Zoll, wovon 10 auf den mit Endquaste versehenen Schwanz kommen. Farbe tief dunkelbraun mit weissen Flecken. Vielleicht ein nördlicher Vertreter des *Das. maculatus* von N. Südwales. 3) *Phalangista johnstoni* sp. n. Beschreibung und Maasse des Schädels. Farbe schön kastanienbraun mit dunklerer Schattirung längs des Rückens und schwarzem Schwanz, welcher auf der Unterseite an der äussersten Spitze gänzlich nackt ist. 4) *Phal. lemuroides* Collett; selten. 5) *Ph. archeri* Collett; häufig. 6. *Phal. sp. juv.* (entweder *Phal. cookii* oder *Phal. herbertensis* Collett.).

Thomas, Oldfield, The Mammals of the Solomons Islands, based on the Collections made by Mr. C. M. Woodford during his Second Expedition to the Archipelago. — Proc. Zool. Soc. London 1888 p. 470—484. Mit 3 Tfn.

Als neu beschrieben wird *Pteropus coronatus* sp. n. Diese Art ähnelt *Pt. ocularis* Pet., hat aber einen viel längeren Oberarm (156 mm gegen 137 mm) und viel stärkeres Gebiss. Hab. Mioko (Insel der Herzog-von-York-Gruppe). Abbildg. der Zahnreihen. Im Uebrigen werden 17 Chiropt., 4 Rod. und 1 Marsup. behandelt. Genauere Angaben über *Pteropus Woodfordi* Thos., *Pteralopex atrata*

Thos., *Anthops ornatus Thos.*, *Mus imperator Thos.*, *M. rex Thos.*, *M. praetor Thos.* (Vergl. unten)

Derselbe, Diagnoses of six new Mammals from the Solomon Islands. — Ann. Mag. Nat. Hist. 6. Ser. Vol. I, p. 155—158.

Vergl. unter System. *Pteralopex atrata n. g. n. sp.*, *Pteropus Woodfordi sp. n.*, *Anthops ornatus g. n. sp. n.*, *Mus imperator sp. n.*, *M. rex sp. n.*, *M. praetor sp. n.*

Westliche gemässigte Region. Evermann, B. W., weist das Vorkommen von *Condylura cristata L.* in Indiana nach. (Am. Nat. XXII, p. 359.)

Vergl. auch Jordan unter Allgem. p. 2.

Langkavel, B., Nordamerikanische Wölfe. — Zool. Garten Jahrg. XXIX, p. 364—373.

Genaue Zusammenstellung der Verbreitung von *Canis latrans* und *C. occidentalis* nebst ihren Varietäten.

Merriam, C. H., Remarks on the Fauna of the Great Smoky Mountains, with Description of a new species of Red-Backed Mouse (*Eutamias Carolinensis*). — Americ. Journ. of Science. III. S., Vol. XXXVI, p. 458—460.

Kurze Notizen über die Fauna der höheren Teile der südlichen Alleghanies. Beschreibung einer neuen Mäuse-Art, *Eutamias Carolinensis sp. nov.* Grösser als alle andern Arten der Gattung, Totallänge 164 mm, Kopf und Rumpf 111 mm. Der kastanienbraune Rückenstreif sehr breit, fast unmerklich in die rötlich gelbe Farbe der Seiten übergehend (bei allen andern Arten scharf begrenzt).

Thomas, Oldfield, On the Small Mammals of Duval County, South Texas. — Proc. Zool. Soc. London 1888 p. 443—450.

Verf. führt 17 Arten an, nämlich Insectivora 4, Chiroptera 3, Rodentia 10. Bei den meisten Notizen über Vorkommen etc., sowie Maasse; bei den selteneren Arten ausführliche Angaben und Beschreibungen, so besonders bei *Cricetus (Vesperimus) Tylori Thos.* (Vergl. Ber. f. 1887, p. 74). Der Gattungsname *Hesperomys* ist ersetzt durch *Cricetus* (resp. Subgenus-Bezeichnungen). Vergl. hierzu Thomas unter System., Muridae.

Südamerikanische Region. Armas, J. A. de, La Zoologia de Colon y de los Primeros Exploradores de America. Havanna 1888. 8°.

Behandelt die Fauna von Colon in Uruguay, p. 14 — 100 die Säugetiere.

Branner, John C., Notes on the Fauna of the islands of Fernando de Noronha. — Am. Nat. XXII, p. 861—871.

Enthält Mitteilungen über massenhaftes Auftreten von Ratten und Mäusen, ohne Angabe der Arten.

Burmeister, C. V., Relacion de un Viaje a la Gubernacion del Chubut. — An. Mus. Buenos Aires Vol. III p. 175—252.

Enthält eine Liste patagonischer Säugetiere.

Nach H. W. Feilden kommt der Damhirsch in etwa 500 Exemplaren auf Barbados vor, wo er von England aus eingeführt wurde. (Zoologist III. Series Vol. XII, p. 386—387).

Thomas, Oldfield, List of Mammals obtained by Mr. G. F. Gaumer on Cozumel and Ruatan Islands, Gulf of Honduras. — Proc. Zool. Soc. London 1888 p. 129.

Aufzählung von 5 resp. 6 Arten ohne weitere Angaben.

Arktische Region. Brauer, Aug., Die arktische Subregion. Ein Beitrag zur geographischen Verbreitung der Tiere. Mit 1 Karte. — Zool. Jahrb. III. p. 189—308.

Im speziellen Teil schildert Verf. auf Grund sorgfältiger Litteraturstudien die Verbreitung folgender Arten: *Rangif. tarand.*, *Ovib. mosch.*, *Lepus variab.*, *Myodes obensis* und *M. torquat.*, *U. maritimus*, *Canis lag.*, *Gulo bor.*, *Must. ermin.*, *C. lupus*. Als dann folgen allgemeine Erörterungen über die Fauna der subarktischen Region: Abhängigkeit der Tierarten von einander, sowie von der Beschaffenheit des Gebietes, Ursachen und Hindernisse der Verbreitung der Tiere, Anpassung der Tiere an das Klima (dichter Pelz, rasch vor sich gehender Wechsel von Winter- und Sommerpelz bei gew. Arten, etc.) Bei dem Kapitel „Wanderungen“ werden besonders das Rentier und der Lemming genauer behandelt und es wird betreffs der viel genannten Lemmingswanderzüge wahrscheinlich gemacht, dass dieselben grossenteils in das Reich der Fabel gehören und nur von höchst untergeordneter Bedeutung sind; gerade aus den letzten Jahrzehnten fehlen jegliche Nachrichten.

Hinsichtlich der weissen Farbe der weissen arktischen Tiere vertritt Verf. den Standpunkt, dass dieselbe auf Anpassung beruhe, also erworben ist. Im Schlusskapitel erörtert Verf. die Begrenzung der arktischen Subregion, wobei er sich im Allgemeinen an Wagner anschliesst (zwischen Südgrenze des Eisfuchses und des Rentiers). Das geschilderte Gebiet gehört als Subregion zur paläarktischen Region.

Rae J., Notes on some of the Birds and Mammals of the Hudson's Bay Company's Territory, and of the Arctic Coast of America. — Journ. Linn. Soc. London Vol. XX, p. 136—145.

Enthält biologische Notizen über *Lepus americanus* (periodisches Wachsen und Abnehmen der Individuenzahl), *Fiber zibethicus* (besondere Baue), *Myodes hudsonicus* (Wanderungen etc.) *Lepus glacialis* (Gewohnheiten).

Fossile Säugetiere.

Vergl. Guida . . . unter Allgem.

Almera et Bofill, Descubrimiento de grandes Mamíferos fosiles en Cataluña. — Cronica científica de Barcelona. Año X. Nr. 220. (Jan. 1887!)

Bertkau, Ph., Fund des Höhlenbären unweit Stromberg bei Bingen. — Verh. nat. Ver. d. preuss. Rheinlande . . . Folge 5, Jahrg. 4. Corr. Bl. p. 159 bis 160. 1887

Boule, M., L'Elasmotherium. — Le Naturaliste 1888, p. 139–142. Mit Abbildg.

Populärer Aufsatz über das E., mit einer restaurirten Abbildung.

Bouvier, E. S., Nouveaux Mammifères fossiles de Sansan et du Quercy. — Ebenda, p. 149–150, p. 168–169.

Behandelt Filhol's Arbeiten über die genannten Lokalitäten.

Brown, J. Allen, Discovery of *Elephas primigenius* associated with Flint Implements at Southall. — The Geol. Magazine, New Series, Decade III, Vol. V, p. 317–319.

Buchenau, F., Mammutstosszahn aus der Weser bei Nienburg. — Abh. herausg. v. nat. Ver. Bremen Bd. X, p. 159–160.

Burmeister, H., Ein vollständiger Schädel des *Megatherium*. — Sitzungsber. Kgl. Preuss. Akad. Wissensch. Berlin. Jahrg. 1888, p. 1291–1295.

Verf. constatirt an einem von ihm restaurirten *Megatherium*-Schädel einige bisher unbekannt gebliebene Eigentümlichkeiten. Am oberen Endrande der Zwischenkiefer befindet sich ein 4 Zoll hoher, kammförmiger Ansatz, der als Verknöcherung des Nasenknorpels anzusehen ist. Ferner findet sich vor den Nasenbeinen eine einfache Knochenplatte, welche, in der Jugend offenbar ohne Verbindung mit den Nasalien, im Alter fest mit diesen verwächst. Die Textur und Oberfläche dieser Knochenplatte zeigt, dass sie nicht eine Verknöcherung des Nasenknorpels ist. Sie ist etwa 12 cm lang, zunächst parallelrandig, etwa 7 cm breit. Auf der Hälfte ihrer Länge wird durch einen tiefen Einschnitt in jedem Rand ein vorderes herzförmiges Stück abgeschnürt, welches nicht wie der hintere Teil der Platte vom verknöcherten Nasenseptum gestützt wird. Im Uebrigen zeigt der Schädel noch verschiedene geringere Abweichungen von den von Owen u. A. abgebildeten.

Derselbe, Bericht über *Mastodon Antium*. — Ebenda, p. 717–729.

Verf. erörtert zunächst die an den Unterkiefern zu Tage tretenden Unterschiede zwischen *Mastodon Humboldtii* und *M. Antium*: „*M. Humboldtii* hat eine längere Zahnstrecke, aber eine kürzere Kinnspitze als *M. Antium* und letztere Art in ihr eine viel breitere Zungenfurche.“ Alsdann folgt auf Grund neuen Materials des National-Museums zu Buenos Aires eine eingehendere Beschreibung des Zahnsystems. Die Stosszähne unterscheiden sich von denen der Gattg. *Elephas* durch die Anwesenheit einer Schmelzbinde auf der äusseren Oberfläche. Diese Schmelzbinde oder Leiste ist bei *M. ohioticum* und *M. Humboldtii* ziemlich versteckt, bei *M. Antium* und *M. angustidens* sehr deutlich. Bei jungen Tieren von *M. Antium* liegt sie auf der Innenseite des Zahnes, rückt aber allmählich, indem sie beim Wachsen des Zahnes die Drehung desselben mitmacht, an die Ober- und dann an die Aussenseite. Vom Zahnbein hebt sie sich durch eine deutliche Furche scharf ab. Die Krümmung der Stosszähne ist bei *M. Antium* und *M. Humboldtii* ganz verschieden, bei ersterer Art etwas schraubenförmig, bei letzterer in einer Ebene schwach gekrümmt oder selbst gerade. Eine Schmelzbinde zeigt auch *M. Humb.* Zwei grosse Höhlungen im Unterkiefer eines jungen Expl. von *M. Antium* deutet Verf. als Alveolen unterer Stosszähne. Die Backenzähne unterscheiden sich von denen des *M. Humb.* durch geringere Grösse und dunklere, abweichende Färbung. Die Anzahl der Querjochs ist an Zähnen gleichen Alters bei den Arten dieselbe. Die von Gervais gemachte Beobachtung, dass die abgekauten grossen Höcker jedes Querjochs bei

M. Antium nur eine, die von *M. Humb.* dagegen zwei Falten an jeder Seite im Schmelzüberzuge haben, ist nicht immer zutreffend. Die Zahnwurzeln, theoretisch so viele wie die Kronenhöcker, verwachsen oft mit einander, bei alten Zähnen oft zu einem vorderen und einem hinteren Wurzelstock. Schliesslich giebt Verf. Form, Grösse und Bildung jeder der 6 Backenz. von *M. Antium* an, sowie endlich noch einige Mitteilungen über den Schädel des Tieres nebst Maassen.

Capellini, Giov., Sui resti di Mastodon avernensis recentemente scoperti a Spoleto, Pontremoli e Castrocaro. — Mem. R. Accad. Sc. Istit. di Bologna S. 4. T. IX p. 251–258. Mit 2 Tfn.

Verf. beschreibt und bildet ab einen in den Ligniten von Spoleto gefundenen linksseitigen sechsten oberen Molaren eines Mastodon, den er *Mast. avern.* zuschreibt; ebenso den entsprechenden ersten Zahn, welcher bei Castrocaro gefunden wurde. Endlich wird ein bei Pontremoli ausgegrabener Zahn nebst einem rechten Cond. occipit. beschrieben.

Derselbe bestätigt die Existenz einer durch Kleinheit unterschiedenen Rasse des *Ursus spelaeus*, deren Reste er in der Höhle von Cassana in Ligurien vor längerer Zeit fand (Bull. Soc. géol. de France, 3. S., T. XVII p. 21–22).

Derselbe, Sur un petit ours de la grotte de Cassana. — Matériaux pour l'histoire de l'homme. Vol. XXII. (S. III. T. V.) p. 305.

Ciofalvo, S., und Ant. Battaglia, Sull' Ippopotamus Pentlandi delle contrade d'Imera. — Termini Imeresse, fortelli Amore. 1888. Mit 1 Tfl.

Oestlich von Palermo wurden zahlreiche Reste von *Hipp. Pentlandi* in allen Altersstufen gefunden. Die jugendlichen Expl. zeigen deutlich, dass *Hipp. juvenis* nur ein junger *Hipp. Pentl.* ist.

Clerici, E., Sopra i resti di Castore finora rinvenuti nei dintorni di Roma. — Boll. Comit. geol. d'Italia 1887 p. 278–284. Mit 1 Tfl.

Verf. beschreibt Biberknochen, welche neben Resten anderer Säugetiere in einer Höhle des Monte Sacro bei Rom gefunden wurden, und giebt eine Uebersicht der bisher bekannten Funde von Biberresten.

Derselbe, Sopra alcune specie di Felini della Caverna al Monte della Gioie presso Roma. — Boll. R. Comit. geol. d'Italia (2) IX, p. 149–167. Mit 1 Tafel.

Beschreibung von Resten (Unterk.) zweier Feliden, welche auf *F. leo* und *F. catus* gedeutet werden.

Cope, E. D., On two new Species of three toed Horses from the Upper Miocene, with Notes on the Fauna of the Ticholeptusbed. — Proc. Americ. Philos. Soc. 1887 p. ?

Derselbe, The Marsupial Genus Chirox. — Amer. Naturalist 1887, p. 566–567. Mit 1 Holzschn.

Verf. beschreibt die oberen Prämolaren und Molaren.

Derselbe, The Mesozoic and Caenozoic Realms of the Interior of North America. — Americ. Naturalist. 1887 p. 445–462.

Behandelt die gesamten Wirbeltiere.

Derselbe, giebt eine kurze Beschreibung eines Segmentes vom Carapax eines im südlichen Texas gefundenen Glyptodon, welches er als neue Art ansieht und *Gl. petaliferus* benennt. (Am. Nat. XXII p. 345–346).

Derselbe, Synopsis of the Vertebrate Fauna of the Puerco Series. — Trans. Americ. Philos. Soc. Vol. XVI, p. 298–361. Mit 2 Tfn.

Verf. giebt eine revidirte Liste der Vertebraten der Puerco Beds, unter denen sich 91 Säugetiere befinden. Neu beschrieben werden von Creodonten: *Onychodectes tisonensis* g. nov. sp. nov., *Mioclaenus pentacus* sp. nov., *M. gaudrianus* sp. nov., *M. lydekkerianus* sp. nov., *M. filholianus* sp. nov., *M. flowerianus* sp. nov., *M. zittelianus* sp. nov., *M. turgidunculus* sp. nov., *Chriacus priscus* sp. nov., *Chr. schlosserianus* sp. nov., *Chr. rütimeyerianus* sp. nov., *Chr. stenops* sp. nov., *Chr. inversus* sp. nov., *Triisodon biculminatus* sp. nov.; von Condylarthren *Haploconus corniculatus* sp. nov., *Periptychus brabensis* sp. nov.

Derselbe, On the Mechanical Origin of the Teeth of the Amblypoda. — Proc. Americ. Phil. Soc. XXV, p. 80–88. Mit Abbildgn.

Derselbe, On the Dicotylinae of the John Day Miocen of North America. — Ebenda, p. 62–79.

Verf. untersucht die Beziehungen der z. T. schon früher beschriebenen miocänen Dicotylinen zu einander und zu den lebenden Schweinen. Er behandelt *Chaenohyus decedens* Cope, *Bothrolabis subaequans* Cope, *B. pristinus* Leidy, *B. trichaenus* Cope, *B. rostratus* Cope sp. nov. Das Genus *Bothrolabis* ist neu aufgestellt; es umfasst früher zu *Palaeochoerus* und *Thinohyus* gezählte Formen.

Dawkins, W. Boyd, On *Ailurus anglicus*, a new Carnivore from the Red Crag. — Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. 44. p. 228–230. Mit 1 Tfl.

Verf. beschreibt und bildet ab ein Stück einer rechten Unterkieferhälfte eines Carnivoren, welcher auffallend mit *Ailurus* übereinstimmt und der daher als *Ailurus anglicus* bezeichnet wird. In der sich anschliessenden Diskussion p. 231 betont Seeley, dass Vorsicht bei der generischen Bestimmung am Platze sei, da der Molar gewisse Besonderheiten aufweise.

Depéret, Sur la présence d'un Macaque fossile dans le terrain pliocène moyen de Perpignan. — Bull. Soc. d'Anthropol. de Lyon. T. VI, p. 40–43. 1887!

Filhol, Description d'une nouvelle espèce d'*Adapis*. — Bull. Soc. Philomat. 7. S., T. 12, p. 10–12.

Verf. beschreibt ein aus den Phosphoriten von Quercy stammendes Unterkieferfragment einer *Adapis*-Art, die er als *A. angustidens* bezeichnet. Dieselbe ist ausgezeichnet durch die sehr bedeutende Grösse des 3. Prämol., durch die Reduction der beiden ersten Molaren und durch die Bildung der übrigen.

Derselbe, Description d'une nouvelle espèce d'*Amphitragulus*. — Ebenda p. 12–14.

Verf. beschreibt als *Amphitragulus Quercyi* n. sp. ein in den Phosphoriten von Quercy gefundenes Unterkieferstück mit den 3 hintersten Prämol. und den 3 Molaren.

Derselbe beschreibt ebenda p. 14–16 ein weiteres Unterkieferstück von dem gleichen Fundort wie vorher unter dem Namen *Amphitragulus crassus* n. sp. Dasselbe ist ausgezeichnet durch die im Verhältnis zum Kieferknochen auffallend starken, besonders dicken Zähne.

Derselbe, Description d'une nouvelle espèce d'*Hyracotherium*. — Ebenda p. 16–17.

Es wird ein Oberkieferstück mit dem letzten und dem vorletzten Prämolaren, gefunden in den Phosphoriten von Quercy, beschrieben und mit dem Namen *Hyracotherium Cayluxi* n. sp. belegt.

Derselbe, Description d'un genre nouveau de Ruminant. — Ebenda p. 17—18.

Verf. beschreibt ein Unterkieferstück eines Wiederkäuers aus den Phosphoriten von Quercy. Dasselbe ist bemerkenswert durch die Struktur des 4. Prämol., welcher aus zwei Abteilungen besteht, einer vorderen mit einem zweispitzigen Höcker und einer hinteren, die eine Art von Talon bildet und weit einfacher gebaut ist als die complizirtere vordere Hälfte des Zahnes. Verf. bildet eine neue Gattung *Choilodon* mit der Art *Ch. elegans*.

Derselbe, Sur un nouveau genre d'Insectivore. — Ebenda p. 24—25.

Verf. beschreibt als *Lantanotherium sansaniensis* n. g., n. sp. Unterkiefer von Sansan, welche im Allgem. denen von *Cladobates* sehr nahe stehen, jedoch durch die Bildung der drei letzten Backenzähne sich von diesem unterscheiden.

Derselbe, Sur une nouvelle espèce de Mustela. — Ebenda p. 25—30.

Verf. beschreibt als *Mustela Larteti* ein linkes Unterkieferfragment mit der Alveole des Canins und des Höckerzahns und mit dem 3. Prämol. und dem Reisszahn.

Derselbe, Description d'un nouveau genre de Ruminant. — Ebenda p. 30—32.

Verf. beschreibt als *Platuprotopus sansaniensis* n. g. n. sp. ein Unterkieferfragment, welches durch die enorme Entwicklung seiner hinteren Partie im Vergleich zu der verjüngten vorderen, sowie durch die Struktur des dritten Lappens des letzten Molaren von den entsprechenden Teilen aller übrigen Wiederkäuer abweicht. Die übrigen Zähne ähneln denen von *Dicroceras*.

Derselbe, Description d'une nouvelle espèce de Lophiodon (*Loph. leptorhynchus*). — Ebenda p. 33—34.

Die Art unterscheidet sich von den übrigen durch die Länge und geringere Höhe der Unterkiefersymphyse, sowie durch die Reduktion des vorderen Querjoches der Prämol.

Derselbe, Observations concernant la faune des Mammifères fossiles d'Argenton (Indre). — Ebenda p. 41—49.

Verf. constatirt das Vorkommen von *Hyrachius* in den Schichten von Argenton. Ein Teil der von Cuvier, Blainville u. A. *Lophiodon* zugeschriebenen Reste (*Loph. minus et minimus*) gehört zu *Hyr. intermedius* Fülh. Ferner wurden gefunden *Anchilophus Desmaresti*, *Dichobune* sp., *Amphimeryx*, *Pachynolophus* (*argentonicus* n. sp. und *isselanus*) und *Hyracotherium argentonicum* n. sp.

Derselbe, Description d'un nouveau genre de Mammifère fossile. — Ebenda p. 55—58.

Es wird ein Oberkieferfragment eines den Tapiren sehr nahe stehenden Tieres beschrieben, welches in den mit dem oberen Pariser Grobkalk gleichaltrigen Schichten von Buschwiller (Bas-Rhin) gefunden wurde. Es unterscheidet sich in gleichem Maasse von *Lophiodon* wie von *Hyrachius*, zeigt aber sehr nahe Beziehungen zu den Tapiren, die hiernach ungefähr schon gleichzeitig mit *Loph.* u. *Hyr.* gelebt hätten. Verf. schlägt den Namen *Palaeotapirus Douvillei* für das neue Fossil vor.

Derselbe, Description d'un nouveau genre de Mammifère trouvé à Cesseras (Hérault). — Ebenda p. 58—59.

Cesserassictis antiquus n. g. n. sp. ist eine neue Pachydermenform, welche sich durch die Höcker ihren Molaren an *Lophiodon*, durch die Einfachheit des letzten

Zahnes an *Hyrachius* anschliesst, jedoch von beiden durch die Bildung der letzten Prämolaren gänzlich abweicht.

Derselbe, Caractères de la face du *Machairodus bidentatus*. — Ebenda p. 129—134.

Verf. beschreibt den bisher noch nicht bekannten Gesichtsteil eines Schädels von *Mach. bident.* aus den Phosphoriten von Quercy. Bemerkenswerth ist die Bildung des oberen Reisszahnes. Der kleine Höcker an der Basis des vorderen Lappens ist bedeutend schwächer als bei den recenten Katzen. Der zweite Lappen bildete einen ziemlich langen Talon, an der Innenseite des vorderen fehlt der Innenhöcker. Der knöcherne Gaumen zeigt ebenfalls Besonderheiten. Auffallend ist ferner die Anwesenheit eines Alisphenoidalkanals, welcher den Katzen fehlt, dagegen den Hunden zukommt.

Derselbe, Description d'un nouveau genre de Pachyderme provenant des dépôts de Phosphate de chaux de Quercy. — Ebenda p. 143—147.

Uphelognathos Quercyi unterscheidet sich von *Anoplotherium* und *Diplobune* durch starkes Atrophiren der Nebenspitzen an den Molaren, wogegen die Hauptspitzen in eigenartiger Weise entwickelt sind.

Fisher, O., On the Occurrence of *Elephas meridionalis* at Dewlish, Dorset. — Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. 44, p. 818—824. Mit 3 Holzschn.

Gaudry, A., La grotte de Montgaudier. — Matériaux pour l'hist. prim. l'homme 1887, p. 57—61.

Neben Artefakten fanden sich zahlreiche Reste diluvialer Säger.

Derselbe, Les vertébrés fossiles des environs d'Autun. — Mém. Soc. d'hist. nat. d'Autun T. I, p. 1—90. Mit 11 Tfn.

Derselbe, Sur les dimensions gigantesques des quelques Mammifères fossiles. — Comptes rend. hebdomad. de l'Acad. des sciences de Paris, T. CVII, S. 309—311.

Mittheilungen über die Grösse von *Dinotherium*, *Mastodon* und von fossilen *Elephas*-Arten.

Gaudry, Albert, et Boule, Marcelin, L'*Elasmotherium*. — Mat. pour l'hist. des temps quat. Vol. III p. 83—104. Mit 4 Tfn.

Historischer Ueberblick, Vergleich mit *Rhinoceros*, Beschreibung von Schädel und Gebiss, phylogenetische Betrachtungen über die prismatischen Herbivorenzähne etc.

Hamy, T., Notice sur les fouilles exécutées dans le lit de Liane en 1887 pour l'établissement du nouveau viaduc du chemin de fer. — Revue d'Anthropol. 1888 p. 257—271.

Neben Menschenresten und Artefakten wurden Knochen von Haustieren und vom Wolf gefunden, z. T. aus historischer Zeit, z. T. älter.

Hardmann, Edw. F., On the Discovery of *Diprotodon australis* in tropical Western Australia, Kimberley District. — Rep. Brit. Assoc. Advancement of Science, 1887, p. 671—672.

Hicks, Henry, The Fauna of the Ffynnon Bueno Caves and of the Norfolk forestbed. — The Geol. Mag. 1887, p. 105—107.

Hofmann, A., Beiträge zur Kenntniss der Säugetiere aus den Miocän-schichten von Vordersdorf bei Wies in Steiermark. — Jahrb. k. k. geol. Reichsanst. Bd. 38, p. 77—82. Mit 1 Tfl.

Es werden behandelt: *Lutra Valetoni* Geoffr., *Mastod. angustidens* Cuv., *Palaeomeryx eminens* H. v. M., *Amphitragulus Boulangeri*, *Hyaemoschus crassus* Lart. und *Rhinoceros* sp.

Derselbe, Beiträge zur Säugetierfauna der Braunkohle des Lebitschberges bei Gamlitz in Steiermark. — Ebenda p. 547—561. Mit 3 Tfn.

Verf. beschreibt Reste von *Mustela Gamlitzensis* H. v. M., *Antilope cristata* Biederm., *Palaeomeryx Bojani* H. v. M., *Pal. furcatus* Hensel, *Hyaemoschus crassus* Lart., *Hyaem. sp.*, *Hyotherium Soemmeringi* H. v. M. Abgebildet werden Zähne und Gebisse der genannten Arten, sowie die Hornzapfen der Antilope.

Holder, J. B., Le Mastodonte américain. — Le Monde de la Science et de l'industrie. 1888 Nr. 7.

Jaccard, A., Sur les animaux vertébrés fossiles de l'étage oeningien du Locle. — Bull. Soc. Neuchatel. Vol. XVI p. 52—57.

Keilhack, K., Ueber einen Damhirsch aus dem deutschen Diluvium. — Jahrb. Kgl. Preuss. geol. Landesanst. u. Bergakad. für 1887, p. 283—290. Mit 1 Tfl. Berlin 1888.

In den unterdiluvialen Süßwasserkalken von Belzig in der Mark wurde ein vollständiges Damhirsch-Geweih gefunden, ein unwiderleglicher Beweis für das Vorkommen von *C. dama* im deutschen Diluvium. Das Geweih weicht von dem der jetzigen deutschen Damhirsche ziemlich ab, steht dagegen denen der südeuropäischen völlig freilebenden sehr nahe.

Koken, E., Eleutherocercus, ein neuer vorweltlicher Glyptodont aus Uruguay. — Abhandl. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin 1888. Mit 2 Tfn.

Verf. beschreibt den durch Verschmelzung der ringförmig angeordneten Knochenplatten des Schwanzendes gebildeten Schwanztubus eines von den bisher beschriebenen abweichenden Glyptodonten, und giebt eine kritische Uebersicht der bisherigen Funde und ihrer Erläuterungen.

Derselbe, Ueber die miocänen Säugetier-Reste von Kieferstädtl in Oberschlesien und über *Hyaenarctos minutus* Schlosser. — Sitzungsber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1888 p. 44—49. Mit 2 Fig.

Nach allgemeineren Bemerkungen beschreibt Verf. ausführlich zwei obere Molaren (m^1 und m^2) und die beiden unteren Caninen eines kleinen *Hyaenarctos*, den Schlosser „*minutus*“ benannte. Bei der Frage, ob die Gattg. *H.* näher zu den Ursiden oder zu den Caniden zu stellen sei, neigt sich Verf. der letzteren Ansicht zu.

Ladrière, Découverte d'un silex taillé et d'une défense de Mammoth à Vitry-en-Artois. — Comptes rend. hebd. Acad. des sciences. T. CVI, p. 513—514.

Vorwiegend geologischen Inhalts.

Lemoine, V., Sur quelques Mammifères carnassiers recueillis dans l'éocène inférieur des environs de Reims. — Ebenda, p. 511—512.

Kurze Notizen über 5 Carnivorentypen. Eine *Dissacus* Cope ähnlich; die zweite ähnlich, doch kleiner; die dritte *Provirerra* sehr nahe stehend; die vierte, als *Tricuspidodon* bezeichnet, erinnert an *Spalacotherium*; für die fünfte wird der Name *Procynictis* vorgeschlagen, sie schliesst sich *Amblotherium* und *Peramus* an.

Lumplugh, Y. W., Mammaliferous Gravel at Elloughton in the Humber Valley. — Nature Vol. 36 p. 153 (1887!).

Verf. fand in einer Sandschicht einen Mammuthstossezahn und einige Knochen; von ersteren nimmt er an, dass derselbe im Eise eingefroren transportirt worden sei.

Lydekker, R., Note on the Nomenclature of three Genera of Fossil Mammalia. — Ann. Mag. Nat. Hist. 6 Ser. Vol. I. p. 384.

Verf. bemerkt, dass in seinem Cat. Foss. Mam. . . . statt *Aelurogale* der Gattungsname *Aelurictis*, statt *Stylodon Stylacodon* stehen müsste. Schlosser's Vorschlag, statt *Aeluropsis Haplogale* zu sagen, wird nicht angenommen.

Major, Forsyth, Faune Mammalogiche dell' isole di Kos e di Samos. — Proc. verb. Soc. Toscan. Sc. nat. 1888, p. 272—275.

Vergl. unten.

Derselbe, Sur un gisement d'ossements fossiles dans l'île de Samos, contemporains de l'âge de Pikermi. — Comptes rend. hebd. Acad. des sciences T. CVII. p. 1178—1181.

Verf. fand auf Samos eine interessante fossile Fauna von etwa 40 Arten von Säugetieren (nebst 1 Vogel, Struthio). Viele der Säugetiere stimmen mit entsprechenden Arten von Pikermi überein. Neu sind etwa 6 Antilopen von afrikanischem Typus, ferner *Orycteropus Gaudryi* Major und *Palaeomanis Neas Major*, die ersten fossilen Edentaten der alten Welt. *O. Gaudryi* ist kleiner als die jetzigen Erdferkel, weicht im Schädelbau wenig ab, hat aber verhältnismässig längere 1. u. 5. Metatarsalia, so dass vielleicht eine Reduktion der Finger bei der genannten Gattung vor sich geht. Der unvollständige Schädel von *Pal. Neas* ist etwa 3 Mal so gross wie der von *Manis gigantea* und zeigt verschiedene Differenzen, welche eine generische Trennung erheischen. *Samotherium Boissieri* Major, ein giraffenartiger Wiederkäufer, in etwa 12 Individuen vertreten, trägt nur im männlichen Geschlecht Hörner, welche direkt über den Augenhöhlen sich erheben. Das unpaare Horn der recenten Giraffe fehlt bei *Sam. B.* gänzlich; der Hals ist kürzer als die Beine.

Bemerkungen hierzu (Bestätigung der Annahme einer Landverbindung zwischen Griechenland und Asien) von Gaudry ebenda p. 1181—1182.

Makowsky, A., Der Löss von Brünn und seine Einschlüsse an diluvialen Tieren und Menschen. — Verh. naturf. Ver. Brünn XXIV, p. 207—243. Mit 7 Tfn.

Von Säugetieren werden behandelt: *Elephas primigenius*, *Rhinoceros antiquitatis* (*tichorhinus*), *Equus caballus*, *Bison priscus*, *Alces machlis* (*palmatus*), *Cervus* (*Megaceros*) *giganteus* (*hibernicus*), *C. elephas*, *Capreolus capraea*, *Ursus spelaeus*, *Hyaena striata* (*prisca*), *Canis* (*Lupus*) *spelaeus*, *Canis* (*Vulpes*) *lagopus*, *Meles taxus*, *Castor fiber*.

Marsh, O. C., Notice of a new fossil Sirenian from California (*Desmostylus hesperus* n. g. n. sp.). — Americ. Journ. Science III. S. Vol. 35, p. 94—96. Mit 3 Abbildgn.

Sehr sonderbare Zähne aus dem Plicän von Californien werden einer mit *Metaxytherium* und *Halicore* verwandten Sirenenart zugeschrieben.

Martin, K., Neue Wirbeltierreste vom Pati-Ajam auf Java. — Samml. Geol. Mus. Leiden. Vol. IV, p. 87—116. Mit 2 Tfn.

Nehring, A., Ueber die Diluvialfaunen von Westeregeln und Thiede. — Sitzungsber. Ges. natur. Fr. Berlin 1888, p. 39—44.

Verf. wendet sich gegen die von Pohlig und Wolle mann im Sitzungsber. Niederrhein. Gesellsch. vom 5. Dez. 1887 gemachten Bemerkungen über die Diluvialfauna von Thiede und Westeregeln.

Derselbe, Vorläufige Entgegnung auf Wolle mann's Abhandlung über die Diluvialsteppe. — Ebenda p. 155—166.

Zurückweisung der Wolle mann'schen Einwände gegen die Annahme einer Steppenzeit für Mitteleuropa.

Derselbe, Ueber das Skelet eines weiblichen *Bos primigenius* aus einem Torfmoore der Provinz Brandenburg. — Ebenda p. 54—62. Mit 1 Holzschn.

Beschreibung eines bei Gühlen am Schwielochsee in der Niederlausitz gefundenen, fast vollständigen Skelettes eines *B. primig.* ♀, nebst vergleichenden Maasstabellen. Abbild. des Schädels.

Derselbe, Ueber das Vorkommen von *Arvicola oeconomus* Pall. sp. im Diluvium von Thiede und Westeregeln. — Ebenda p. 80—85.

Die vom Verf. früher als *Arvicola ratticeps* Keys. und Blas. bestimmten Reste dürften besser auf *Arvic. oeconomus* Pall. bezogen werden. Im Anschluss hieran bemerkt Verf., dass er *Myodes lemmus* und *M. schisticolor* nur für „Abzweigungen“ von *M. obensis* hält. Stellt man *M. lem.* und *M. schist.* als selbständige Arten auf, so müsste man *M. torquatus* generisch von jenen trennen als *Miothermus torquatus* Hensel.

Derselbe, Ueber das Urrind (*Bos primigenius* Bojan.) — Deutsche landw. Presse. XV. Jahrg. Nr. 61 und 62. Mit 4 Holzschn.

Beschreibung eines in der Niederlausitz gefundenen Skelettes (vergl. oben) nebst Erörterung der Beziehungen des *B. primig.* zu den Rassen des Hausrindes.

Derselbe, Ueber *Bos primigenius*, insbesondere über seine Coexistenz mit dem Menschen. — Verh. Berlin. anthropol. Ges. 1888 p. 222—231. Mit 3 Holzschn.

Angaben über ein Skelett von *B. primig.* aus der Niederlausitz (vergl. oben), sowie Mitteilungen über einen starke Spuren von Bearbeitung zeigenden Metatarsus derselben Rinderart, welcher zusammen mit Thongefässen aus dem frühen Mittelalter, Haustierresten etc. gefunden wurde und daher einen Beweis für das Vorkommen des *B. primig.* in historischer Zeit liefert.

Derselbe, Ueber vereinzelt gefundene Hornkerne des *Bos primigenius*. — Verh. Berlin. anthropol. Ges. 1888 p. 341—343.

Osborn, H. F., The structure and classification of the mesozoic Mammalia. — Journal Acad. Nat. Sc. Philadelphia Vol. IX p. 186—265. Mit 2 Tfn. und 30 Holzschn.

Verf. erörtert eingehend den Bau und die Verwandtschaftsbeziehungen der mesozoischen Säugetiere und gelangt zu folgenden System.

A. Erste Gruppe.

Subord. Multituberculata.

Fam. Plagiolanlidae: *Microlestes*, *Plagiolaux*, *Ctenacodon*, *Ptilodus*, *Neoplagiolaux*, *Meniscoessus* und vielleicht *Thylacoleo*

Fam. Bolodontidae: *Bolodon*, *Allodon* und vielleicht *Chirox*.

Fam. Tritylodontidae: *Tritylodon*, *Triglyphus*.

Fam. Polymastodontidae: *Polymastodon*.

Incertae sedis: *Stereognathus*.

B. Zweite Gruppe.

Ordnung Protodonta.

Fam. Dromotheriidae: *Dromotherium*, *Microconodon*.

Subord. Prodidelphia.

Fam. Triconodontidae: *Amphilestes*, *Amphitylus*, *Triconodon*, *Priacodon*, *Phascolotherium*, *Tinodon*, *Spalacotherium*, *Menacodon*.Fam. Amphitheriidae: *Amphitherium*, *Dicrocynodon*, *Docodon*, *Enneodon*, *Peramus*.Fam. Peralestidae: *Peralestes*, *Peraspalax*, *Paurodon*.Fam. Kurtodontidae: *Kurtodon*.

Subord. Insectivora primitiva.

Fam. Amblotheriidae: *Amblotherium*, *Achyrodon*.Fam. Stylacodontidae: *Stylacodon*, *Phascolestes*, *Dryolestes*, *Asthenodon*.Incertae sedis: *Laodon*.

Derselbe, Additional observations upon the structure and classification of the mesozoic mammalia. — Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1888 p. 292 — 301. Mit Holzschn.

Bemerkungen über *Amphilestes* (Zahl der Zähne), *Phascolotherium* (Form der Zähne), *Amphitylus* (Gebiss). *Peramus*, *Leptocladus dubius* und *Spalacotherium minus* fallen zusammen und bilden nur 1 Genus. Am 1. und 2. Molar von *Amphitherium* wurde ein kleiner Aussenhöcker entdeckt, wodurch eine Annäherung an *Peramus* zu Stande kommt. An den oberen Molaren von *Peralestes* fand Verf. einen niedrigen, den antero-internen mit dem antero-externen Höcker verbindenden Kamm; *Per.* ist daher mit *Spalacotherium* zu vereinigen. Endlich ist es wahrscheinlich, dass aus *Peraspalax*, *Amblotherium*, *Achyrodon*, *Phascolestes*, *Stylodon* und *Kurtodon* nur zwei oder drei Genera gebildet werden müssen.

Derselbe untersucht die Mylohyoidgrube bei den mesozoischen und recenten Säugetieren und kommt zu dem Schluss, dass auf ihr Fehlen oder Vorhandensein kein grosser systematischer Wert zu legen ist. (Am. Nat. XXII, p. 75—76).

Pavlow, Marie, Etudes sur l'histoire paléontologique des Ongulés. II. Le développement des Equidés. — Bull. Soc. Imp. des Natur. de Moscou 1888, p. 33—80. Mit 2 Tfn.

Nach einer historischen Einleitung (bei Cuvier beginnend) entwickelt Verf. ihre Ansichten, nach denen die Vorfahren des Pferdes folgende Reihe bilden: (Phenacodus) *Hyracotherium*, *Pachynolophus*, *Anchilophus*, *Anchitherium*, *Protohippus*, *Hippidium*, *Equus*. *Hipparion* bildet einen Seitenastläufer der Pferdereihe.

Es folgt dann der III. Abschnitt, welcher Rhinocerotidae und Tapiridae behandelt. *Systemodon* dürfte den gemeinsamen Ausgangspunkt darstellen, auf welchen *Hyrachyus* folgt. Von *H. eximius* gehen vielleicht die Tapire, von *H. agrestis* die Rhinoceroten aus; die Aceratherien sind eine Nebenreihe.

Piedbeouf, L., Découverte d'un *Ursus spelaeus* dans une caverne du calcaire eifilien à Néanderthal. — Annales Soc. Géol. Belgique. Tome XV. 1888. p. XCIV—XCVI.

Piette Ed., Equidés de la période quaternaire. — Matériaux pour l'hist. prim. de l'homme 1887, p. 359—366. Mit Holzschn.

Verf. beschreibt die Equiden, welche aus menschlichen Artefakten der Quaternärzeit zu erkennen sind. Man kann Hemionus, Zebra und echte Pferde unterscheiden; letztere haben alle eine aufrecht stehende Mähne.

Pohlig, Hans, Dentition und Kranologie des *Elephas antiquus* Falc. mit Beiträgen über *Elephas primigenius* Blum. und *Elephas meridionalis* Nesti. Erster Abschnitt. Mit 10 Tfln. und 110 Textfig. — Nova Acta Leop. Carol. Bd. 53 Nr. 1. (p. 1—280).

Vorf. giebt in der umfangreichen Arbeit eine eingehende Beschreibung des *E. antiquus* und eine Vergleichung desselben mit *E. meridionalis* und *E. primigenius*, unter Berücksichtigung der odontologischen und kranologischen, sowie der sonstigen osteologischen Verhältnisse, auf Grund der Untersuchung eines ausserordentlich reichen Materials zahlreicher deutscher und ausländischer Museen. Der erste Abschnitt behandelt nach einleitenden Bemerkungen die Dentition (p. 39—259) in eingehendster Weise: „Der wesentliche Fortschritt und der leitende Gesichtspunkt des vorliegenden odontographischen Theiles liegt in der Betonung der allgemeineren Verhältnisse der Kronenform und der Dimensionen, gegenüber der mehr einseitig nach den Lamellenformeln schematisirenden englischen Richtung.“ Die Resultate der Untersuchung werden in einer vergleichenden Tabelle über die Dentition der drei bekannten fossilen Elephanten Europas zusammengefasst. Weiter ergibt sich aus den Gebissverhältnissen folgendes: 1) die Aufstellung von vier distincten selbständigen Molarenformen: *E. trogontherii*, *E. Leith-Adamsi* oder Zwergmammuth, (*E. prisca* (von Goldf). und *E. Falconeri* (non Busk.)), — von welchen die erstgenannte in der Lamellenformel dem *E. antiquus*, in Abrasionsformen, Kronenform und sonstigem *E. meridionalis* und *E. primigenius* am meisten ähnlich ist, und sonach zwischen den beiden letzteren Arten eine direkte Brücke zu bilden scheint; diese Molarenform ist in Deutschland geologisch etwas älter als *E. antiquus* und in der Lagerstätte von letzterem scharf geschieden. 2) Die von Falconer und L. Adams proponirte Annahme eines „Präantepänultimus“ oder 4 M. M. in der Milchmolarenserie der Proboscidi ist unbegründet. 3) Auf die Dentition lässt sich eine spezifische Abtrennung der sivalischen, von Falconer als *E. hysudricus* bezeichneten Molaren von *E. meridionalis* nicht begründen. 4) In den 3 von Falconer und Busk für die Malteser Elefantenreste vorgeschlagenen Arten hat man, da dieselben nur in den Dimensionen, nicht aber in der Form unter einander und von *E. antiquus* typus abweichen, nichts Anderes zu suchen, als 3 verschiedene Degenerationsstadien einer offenbar durch insulare Abschliessung entstandenen, allmählich immer mehr reducirten Ponyrasse des Urelefanten, für welche die Bezeichnung „*E. (antiquus) Melitae* Falc.“ zu wählen wäre. 5) Ebenso hat eine Diminutivrasse des Mammuths, *E. (primigenius) Leith-Adamsi*, existirt, allerdings weniger reduziert als jene des *E. antiquus* von Malta.

Derselbe, Jugendlischer Stosszahn von *Elephas primigenius*. — Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinlande etc. . . Folge 5, Bd. 4 p. 254.

Derselbe macht eine kurze Mitteilung über einen fossilen Elefantenmolaren von Sevilla, den er zu der von ihm festgestellten Rasse *E. (meridionalis) trogontherii* stellt. — Sitzungsber. niederrhein. Gesellsch. f. Nat. und Heilk. Bonn 1888 p. 19.

Derselbe beschreibt ebenda p. 20 ein Stück eines in Deutschland gefundenen diluvialen *Oribos moschatus*.

Derselbe bespricht ebenda p. 20 sicilianische Elefantenmolaren und constatirt das Vorkommen einer zweiten mediterran-insularen Zwergelefantenrasse, *Elephas (priscus) Falconeri Pohl. (non Buxt.)*.

Derselbe macht ebenda p. 56 Bemerkungen über einen dem Breslauer Museum gehörigen, angeblich aus Mexiko stammenden fossilen Elefantenmolaren.

Probst, J., Ueber die Ohrenknochen fossiler Cetodonten aus der Molasse von Baltringen. O. A. Laupheim. — Jahresh. Ver. f. vaterländ. Naturk. Württemberg. Jahrg. 44, p. 46—64. Mit 2 Tfn.

Rivière, Emile, Sur la Station quaternaire de la Quina (Charente). — Mat. pour l'hist. primit. de l'homme. Vol. XXII, p. 145—147.

Zahlreiche Säugetierreste (Bär, Dachs, Schakal, Fuchs, Wildkatze, Pferd, Ren, Edelhirsch, Reh, Ziege, Urrind).

Derselbe, La Grotte de St. Martin (Alpes maritimes). — Ebenda p. 145—147.

Derselbe, Grottes dites les Baumas des Bails (Alpes maritimes). — Ebenda p. 218.

Derselbe, Sur la Faune et les ossements humains des Baumas de Bails et de la Grotte St. Martin (Alpes Maritimes). — Ebenda p. 556—558.

Derselbe, Etude sur les Vertébrés fossiles d'Issel (Aude). — Mém. Soc. géol. de France. XIII. S., T. V. Mit 21 Tfn.

Eingehende Beschreibung und Abbildung der in Frankreich gefundenen Reste von *Lophiodon* und *Pachynolophus*.

Rodler, A., Ueber Urmiatherium nov. gen. — Anz. k. Akad. d. Wiss. Wien. 1888, Nr. 12.

Vorläufige Mitteilung über ein in der Gegend des Urmiasees in Persien gefundenes, durch eine ganz singuläre Occipitalpartie ausgezeichnetes fossiles Säugetier.

Römer, F., berichtet kurz über das Vorkommen von *Rhinoceros tichorhinus* in der Nähe von Trebnitz in Schlesien

Rütimeyer giebt kurze Mitteilungen über die Funde von Egerkingen. — Arch. des sciences phys. et nat. Période III. T. 20. p. 341—343.

Vergl. auch Rütimeyer unter Phylogenie, S. 49.

Derselbe, Zur Frage über das Torfschwein und das Torfrind. — Verh. Berliner anthropol. Gesellsch. 1888, p. 550—556.

Verf. wendet sich gegen die Ansicht Nehring's, dass das Torfschwein eine verkümmerte, domestizierte Form des Wildschweins sei. Ferner betont er, dass *Bos primigenius* nicht der Stammvater der Brachyceros-Rassen sein könne.


Schaaffhausen macht kurze Bemerkungen über Schädelfragmente vom Riesenhirsch. — Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinlande . . . 45. Jahrg. p. 86 (Korr. Bl.)

Derselbe spricht etwas ausführlicher über *C. megaceros* ebenda p. 4—6 (Sitzungsber.)

Schlosser, M., Die Affen, Lemuren, Chiropteren, Insectivoren, Marsupialier, Creodonten und Carnivoren des europäischen Tertiärs. Theil II. Carnivora. — Beitr. Pal. Oestr.-Ung. u. d. Orients. Bd. VII p. 1—164. 4 Tfn.

Fortsetzung der im vorigen Bericht (p. 37—39) citirten umfassenden Arbeit. In dem einleitenden Teil äussert sich Verf. über die Systematik der Carnivoren. Er verwirft die Cope'schen Hypomycteri und Epimycteri, obgleich sie scheinbar

durch die Einteilung Lydekker's in Arctoidea und Ailuroides eine Bestätigung erfahren. Allein auch diese Gruppierung ist nach Schl. ungenügend begründet. Besser lassen sich die verwandtschaftlichen Verhältnisse in folgendem Schema veranschaulichen:



* $\frac{1}{2}$ und selbst $\frac{1}{2}$ M, nur mehr einer als Reisszahn entwickelt, obere M trituberculär.

** Noch placental, aber mit gleichartigen und gleich grossen M versehen, $\frac{1}{2}$ J, also Creodonten.

*** Eplacentalier mit mindestens $\frac{1}{2}$ Pr $\frac{1}{2}$ M und $\frac{1}{2}$ oder $\frac{1}{2}$ J.

Es folgt dann eine genaue Untersuchung der einzelnen Familien, zunächst der Caniden und Ursiden, sodann der Musteliden. Alle bisher aus dem europäischen Tertiär beschriebenen Arten werden behandelt und bezüglich ihrer Stellung und Verwandtschaft untersucht, soweit genügende Reste bekannt sind.

Unter den Caniden wird neu aufgestellt die Gattg. *Pachycynodon*, welche von *Cynodictis* abgetrennt wird auf Grund von Gebissdetails. 2 Arten, *P. crassirostris* Filh. sp. und *P. Filholi* n. sp. (Abbildg.). *Cynodictis leptorhynchus* wird zur Gattg. *Cynodon* gezogen, welche übrigens von zweifelhaftem Wert ist. — Unter den Amphicyoniden wird *Pseudamphicyon lupinus* als neue Art beschrieben. Ein weiteres Stadium auf dem Wege von den Hunden zu den Bären bildet die Gattg. *Dinocyon*, unter welcher eine Anzahl bisher in anderen Gattungen untergebrachter Arten vereinigt wird. Dann folgt *Hyaenarctos*, *Ursus*, *Cephalogale*, *Simocyon*. — Die Musteliden werden um ein neues Genus *Plesiocyon* bereichert, welches durch $\frac{1}{2}$ M ausgezeichnet ist, die einzige Mustelidenform mit dieser Zahl von M. Der Filhol'sche *Cynodictis dubius* wird als *Plesiocyon typicus* n. sp. hierher gezogen. Ferner ist neu *Plesictis pygmaeus*, der sich ausschliesslich durch geringere Grösse von *Pl. robustus* Filh. unterscheidet (!), und *Palaeoprionodon minutus*, ebenfalls nur auf Grössenunterschiede begründet. Die beiden von Filhol aufgestellten Arten von *Pseudailurus* sind nach Schl. nicht nur in verschiedene Genera, sondern sogar in verschiedene Familien zu stellen. Während *Ps. intermedius* zur Gruppe der Viverra-Musteliden gehört, ist *Ps. Edwardsi* eine echte Katze. Für ersteren wird der Gattungsname *Stenogale* vorgeschlagen. Ferner soll *Proailurus* in *Haplogale* n. g. umgewandelt werden. In der Gattg. *Stenogale* wird eine neue Form als *St. aurelianensis* beschrieben. Unterkiefer, deren M_1 demjenigen von *Palaeoprionodon*, M_2 dem von *Palaeogale* gleicht, werden als *Pseudictis* nov. gen. beschrieben, mit *Ps. guntianus* n. sp. und einer unbenannten

Art. Unter *Palaeogale H. v. M.* ist *P. Gervaisi n. sp.* zu bemerken. Unter *Proailurus Filh.* werden nur *P. lemanensis Filh.* und *P. Julieni Filh.* belassen.

Derselbe, Ueber Höhlenfunde von Feldmühle bei Eichstädt. — Correspondenzbl. Deutsch. Gesellsch. f. Anthropol., Ethnol. u. Urgesch. 1888 p. 10.

Seeley, H. G., (Researches on the Structure, Organization and Classification of the Fossil Reptilia.) — III. On Parts of the Skeleton of a Mammal from Triassic Rocks of Klipfontein, Fraserberg, South Africa (*Theriodesmus phylarchus*, Seeley). — Philos. Trans. CXXXIX p. 141—155. Mit 1 Tfl. und mehreren Holzschn.

Verf. beschreibt Humerus, Ulna, Radius, Carpus, Metacarpus, Phalangen Tibia, Fibula und Schwanzwirbel eines Wirbeltiers, welches als Säuger anzusehn ist, sich aber von allen anderen durch Besonderheiten der Organisation unterscheidet. *Theriodesmus phylarchus* war stärker als eine Fischotter. Der Humerus deutet auf ein fleischfressendes, vielleicht Beutel-Tier, Ulna und Radius im Allgem. u. im proximalen Ende auf Carnivora u. Lemuroidea, am distalen Ende jedoch auf Rodentia und Monotremata. Abgesehen von 3 Centralen ist der Carpus raubtierartig. Verf. meint, *Ther. phyl.* sei zu den Bunotheria zu stellen, wenn auch zu einer neuen Ordnung derselben, höher als die Creodonten. Vielleicht haben sich die höheren Placentaler von dieser neuen Ordnung abgezweigt.

Studer, Th., Ueber Säugetierreste aus glacialen Ablagerungen des bernischen Mittellandes. — Mittlg. Naturf. Ges. Bern 1888 (S. Abdr.)

Kurze Aufzählung der Arten mit etwas eingehenderen Mitteilungen über *Rhin. tichorh.* und *Rang. tarand.* aus dem berner Mittelland.

Derselbe, Ueber die Arctomysreste aus dem Diluvium der Umgegend von Bern. — Mittlg. Naturf. Ges. Bern 1888. (S. Abdr.)

Verf. schreibt die Reste der *A. marmotta* zu, doch zeigen dieselben einige Abweichungen von der lebenden Art, so dass die Bezeichnung *A. marm. var. primigenia* Kaup angemessen erscheint. Zum Schluss Bemerkungen über die Abnahme der Körpergrösse bei Säugetieren von der Diluvialzeit bis zur Gegenwart.

Teller, F., Ein pliocäner Tapir aus Steiermark. — Jahrb. k. geol. Reichsanst. Bd. 38, p. 729—772. Mit 2 Tfln.

Eingehende Beschreibung eines Tapirskelletes aus dem Hangenden des Lignites von Schönstein. Dasselbe wird mit *Tap. hungaricus H. v. M.* identifiziert.

Vacek, M., Ueber neue Funde von Säugetierresten aus dem Wies-Eibiswalder Kohlenrevier. — Verh. geol. Reichsanst. 1888, p. 306—313.

Verf. bespricht Reste von *Rhinoceros sansaniensis Lartet*, *Hyotherium Soemmeringi H. v. Mey.* und *Viverra miocenica Peters*; im Anschluss hieran noch bei Vordersdorf (bei Wies) gefundene Fragmente von *Mastodon angustidens Cuv.*

De Vis, C. V., On an extinct genus of the Marsupials allied to *Hypsiprymnodon*. — Proc. Linnean Soc. N. S. Wales. II. Ser. Vol. III, p. 5—8. Mit 1 Tfl.

Verf. beschreibt und bildet ab die linke Unterkieferhälfte eines fossilen Marsupialiers, welcher Beziehungen zu *Hypsiprymnodon*, in etwas geringerem Grade auch zu *Hypsiprymnus* und *Phalangista* zeigt. Als Name wird *Triclis oscillans* vorgeschlagen.

Weithofer, A., Ueber ein Vorkommen von Eselsresten in der Höhle Pytina jama bei Gabrowitza nächst Prosecco im Küstenlande. — Ann. k. k. Hofmus. Bd. III, p. 7—14. Mit 1 Tfl.

Verf. beschreibt ein Schulterblatt und ein Metacarpale nebst den zugehörigen Phalangen eines Esels, den er zu den asiatischen Formen rechnet, da die afrikanischen durchweg grösser seien. Auch sind diluviale Eselreste (über die eine Uebersicht gegeben wird), stets mit nordischen und asiatischen Tieren zusammen gefunden worden.

Derselbe, Beiträge zur Kenntniss der Fauna von Pikermi bei Athen. — Beitr. z. Pal. Oestr. Ung. u. d. Orients. Bd. VI, Hft. 3. Mit 10 Tfn.

Verf. bearbeitete neues Material von Pikermi, wobei eine Anzahl neuer Arten sich ergaben. *Mustela palaeattica* n. sp., stärker als der Edelmarder, mit auffallend breitem oberem Molar und sehr starker Entwicklung des hinteren Anhangs des unteren Reisszahnes und des unteren Molaren. *Machairodus Schlosseri* n. sp. unterscheidet sich durch die Zähne des Unterkiefers hinlänglich von den bisher beschriebenen Arten, um als neu gelten zu können. *Felis leiodon* n. sp. nähert sich durch den schlanken glatten Eckzahn und durch die ziemlich deutliche Kinnleiste dem *Machairodus*, steht aber in der allgemeinen Form des Kiefers und in dem kurzen Diastema der Gattg. *Felis* nahe. Grösse des Jaguars. *Camelopardalis parva* n. sp., ähnelt im Gebiss sehr der recenten Giraffe, unterscheidet sich aber durch gewisse Eigentümlichkeiten und durch die geringe Grösse von allen bekannten Formen. *Helicoceras rotundicorne* n. g. n. sp. ist auf 2 Paare gazellenartiger Hornzapfen mit minimalen Schädelfragmenten gegründet. Ausser den eben genannten neuen werden noch folgende Arten behandelt: *Hyaenarctos atticus* Dames M. S., *Machairodus leoninus* Wagn., *Felis* sp. non det., *Dinotherium* (?), *Hipparion gracile* Kaup. (eingehende Erörterung über das Gebiss, die Fussknochen, das Verhältniss zu den übrigen Equiden), *Rhinoceros*, *Protragelaphus Skonzesi* Dames, sowie einige andere Wirbeltiere.

Derselbe beschreibt *Antilope gracillima* n. sp. in Boll. R. Comit. Geol. d'Italia (2) Vol. IX p. 366.

Wilckens, M., Alcuni osservazione sulla Fauna degli Ligniti di Casteane e die Montebamboli (Toscana). — Boll. R. Comit. geol. 2. S. Vol. IX, p. 263 bis 368.

Woldrich, J. N., Beziehungen der diluvialen europäisch-nordasiatischen Säugetierfauna zum Menschen. — Mittlg. der Anthropol. Gesellsch. Wien, Sitzungsber. Nr. 3, 1888, p. 52—53.

Wollemann, A., Ueber die Diluvialsteppe. — Verh. naturhist. Ver. preuss. Rheinlande . . . 45. Jahrg. p. 239—191 (Verhdl.).

Verf. polemisiert gegen die Nehring'sche Steppentheorie und berührt dabei auch die Säugetiere. Ansichten, wie diejenige, dass die grösseren Diluvialtiere Waldbewohner gewesen sein müssen, oder dass die Vorfahren gewisser extremer Steppentiere der Jetztzeit ihre Lebensweise geändert und früher [Waldbewohner gewesen sind, dürften auf Widerspruch stossen.

Woodman beschreibt einen Backenzahn von *Elephas americanus* in Trans. N. York Acad. Sc. Vol. VI, p. 59.

Woodward, A. Smith, Notes on some Vertebrate Fossils from the Province of Bahia, Brazil, collected by Joseph Mawson Esq. — Ann. Mag. Nat. Hist. 6. Ser. Vol. II, p. 132 ff.

Säugetiere nur vertreten durch ein linkes Scaphoid, welches von einem *Megatherium* zu stammen scheint.

Systematik.

Allgemeines. Vergl. Jentink unter Allgem., ebenda Jordan.

Jentink, F. A., Zoological researches in Liberia. A list of Mammals, collected by J. Büttikofer, C. F. Sala and F. X. Stampfli. — Notes Leyden Mus. X. p. 1–58. Mit 4 Tfln.

Angeführt werden 90 Arten, davon Simiae 13, Carniv. 11, Rumin. 11, Pachyderm. 5, Siren. 1, Rod. 23, Insectiv. 4, Chiropt. 17, Bruta 3. Bei den meisten Arten Notizen über Vorkommen und Lebensweise (z. T. sehr bemerkenswert), sowie bei den seltneren Angaben über Grösse, Farbe, Osteologie etc. Neu sind folgende Arten:

Cercopithecus stampflii: Hairs of forehead, cheeks, back, sides of back and basal half of tail of a more or less rufous-green tinge, each hair ringed with black and rufous-yellow; crown of head, nape of neck, legs and terminal half of tail black; a ditto coloured patch on the middle of the lower lip; chin, breast, fore-most part of belly and upper part of inside of fore-legs white. — Length of the type-specimen, an adult male: head and body 638 mm, tail 980 mm, hind foot 160 mm.

Graphiurus nagtglasii n. sp.: All the hairs are of a slaty black, on the head, upperparts and sides of the body and outsides of legs tipped with reddish brown, on the underparts of head and body and inside of legs tipped with white. The distichous tail very hairy; hairs somewhat longer towards its tip, they are of a liver-color with shining tips. Hands and feet white; whiskers numerous, black and long. A more or less dark reddish coloured line from mouth round eyes. Length of head and body: 165 mm, of tail with hairy tip: 120 mm, of hind foot 30 mm, of ear 15 mm.

Claviglis crassicaudatus n. g. et n. sp.: Upperparts ashy brown, underparts white with a reddish-brown shade: the basal part of the hairs is slaty black coloured; a black stripe from nose to and round eyes. The tail is club-shaped: at the base of the tail are the hairs very short, abruptly they are followed by very long hairs to its tip, forming a broad club; the hairs round the base of the tail and above are coloured like the back, underparts for the rest and tip of tail black. Whiskers black, whitish towards their tips. Length of head and body 100 mm, of tail with tuft 50 mm, of hind foot 15 mm, of ear 7 mm. . . . *Claviglis* is a genus-name for Myoxine species which are characterized by a club-shaped, not distichous tail.

Crociodura büttikoferi n. sp.: Differs from *schweitzeri* (Peters. Ref.) by its much shorter tail, by having the upperparts of the body brownish black coloured and the underparts with silverly tips to the slaty hairs, finally by having a denticulation on the first lower incisors. Like in *schweitzeri* all the teeth are white. — Head and body 76 mm, tail 40 mm, hind foot 15 mm, ear 7,5 mm.

Crociodura stampflii n. sp.: Distinguished from the other species by the nearly uniform color of upper- and lowerparts of head and body, a color exactly like that of young specimens of *Mus rattus*; the upperparts have a slightly darker tinge; with that color contrasts the color of tail and extremities which parts have a whitish tinge and are clothed with widely spread short and blackish

hairs, the basal half of the tail is furnished with some elongated and lighter colored hairs.

Pachyura megakura n. sp.: All the hairs have slaty black bases; upperparts of head and body of a beautiful light chocolate-brown, lower parts pure white, feet and tail with short brownish red hairs. Head and body of the type in spirits: 62 mm, tail 75 mm, hind foot 15 mm, ear 8,5 mm.

Epomophorus veldkampii n. sp. „It is of the size of *Epomophorus pusillus* and is very difficult to distinguish externally from this species, but the palate ridges are so different from the peculiar Y shaped groove in *Ep. pusillus*, that it can never be confounded with this species.“

Vesperugo stampflii n. sp.: „The smallest *Vesperugo* - species hitherto recorded“. „Fur above black with brownish red tips, beneath black with light brown tips. Ears and membranes black.“ Measurements of the adult male, in alcohol: Length of head and body 38 mm, tail 24 mm, ear 9 mm etc.

Die Tafeln stellen dar: *Terpone**) *longiceps* Gray, Hörner; *Cephalophus doria* Ogilby, ganze Expl. (farbig) und Schädel; *Hyrax* (*Dendrohyrax*) *stampflii* Jentink, ganzes Tier.

Lankester, E. R., „Zoology“ in Encyclopaedia Britannica 9 th. ed. Vol. XXIV p. 799—820.

Enthält folgende Uebersicht über die Ordnungen der Säugetiere:

Grade 1. Monotrema.

„ 2. Ditrema.

Branch a. Marsupialia.

Orders. — 1. Baryopoda; 2. Rhizophaga; 3. Macropoda; 4. Carpophaga; 5. Pedimana; 6. Cantharophaga; 7. Edentula.

Branch b. Placentalia.

Sub-branch a. Typidentata.

Orders. — 1. Proinsectivora; 2. Insectivora; 3. Carnivora; 4. Ungulata; 5. Amblypoda; 6. Sirenia; 7. Toxodontia; 8. Rodentia; 9. Proboscidea; 10. Hyracoidea; 11. Chiroptera; 12. Prosimiae; 13. Simiae.

Sub-branch b. Edentata.

Orders. — 1. Bradypoda; 2. Effodientia.

Simiae.

Vergl. Beavor and Horsley unter Anat. und Phys., Nervensyst.; Broca ebenda; Hervé ebenda; Blanford unter geogr. Verbr., malay. Reg.; Krause unter Anat. u. Phys., Haut; Landois unter Biol., Gefangensch.; Rojecki unter Anat. u. Phys., Gefäßsystem; Schäfer unter Anat. u. Phys., Nervensystem; Sibley unter Anat. u. Phys., Geschlechtsorg.

Anthropomorphae. Gibbon, s. Krause unter Anat. u. Phys., Haut. Anthropoiden, Rückenmark, s. H. Virchow unter Anat. u. Phys., Nervensyst. Gorilla, Schädel, s. Hervé unter Anat. u. Phys., Osteol. Krause unter Anat. u. Phys., Haut.

Chimpanse, Sacrum, s. Chudzinski ebenda.

Orang, Haut, s. Krause unter Anat. u. Phys., Haut.

*) Gray schreibt Terphone (Handlist of Ed. etc. 1873). Ref.

Cercopithecidae. *Macacus sinicus* Nerven s. Beavor and Horsley unter Anat. u. Phys., Nervensystem.

Macacus rhesus vergl. Krause unter Anat. u. Phys., Haut.

Colobus guereza s. Giglioli unter äthiop. Reg.

Cercopithecus albigularis ebenda.

C. stampflii s. Jentink unter Syst., Allgem.

Cynocephalus pluto s. Krause unter Anat. u. Phys., Haut.

Cyn. sp., ebenda.

Fossile Affen s. Depéret unter foss. Säuget.

Prosimii.

Allgemeines s. Blanford unter malay. Reg., Turner unter Anat. und Phys., Geschlechtsorg.

Lemur xanthomystax ebenda.

L. rufipes ebenda.

Propithecus diadema ebenda.

Indris brevicaudatus ebenda.

Stenops gracilis s. Krause unter Anat. u. Phys., Haut.

Caenopithecus lemuroides s. Rüttimeyer unter Phylogenie.

Adapis Duvernoyi ebenda.

A. angustidens s. Filhol unter foss. Säugetiere.

Dermoptera.

Vergl. Blanford unter Geogr. Verbr., malay. Reg.

Chiroptera.

Allgemeines. Vergl. Jentink unter Allgem., Jordan ebenda.

Blanford, W. T. Notes on Indian Chiroptera — Journal Asiat. Soc. Bengal. Vol. LVII, p. 260 – 272.

Verf. giebt kurze Bemerkungen über Synonymie und dergl. von folgenden Arten indischer Fledermäuse: *Rhinolophus affinis*, *Rh. Petersi*, *Rh. minor*, *Rh. tragatus*, *Hipposiderus diadema*, *H. bicolor*, *Coelops Frithi*, *Megaderma spasma*, *Nyctophilus Geoffroyi*, *Vesperugo nasutus*, *V. imbricatus*, *V. mordax*, *V. ceylonicus*, *V. abramus*, *V. pipistrellus*, *V. Kuhli*, *Scotophilus Kuhli*, *S. ornatus*, *Harpyiocephalus leucogaster*, *Vespertilio Hasselti*, *V. longipes*, *V. megalopus*, *Myotis Beldmorei* Blyth, *Vespertilio Dobsoni*, *Kerivoula Hardwickii*, *K. papillosa*, *Miniopterus Schreibersi*. Zum Schluss folgt eine Liste mit Berichtigungen der in Jerdon's Mammals of India falsch gebrauchten Namen für Chiropteren (66 Arten).

Pteropodidae. *Pteropus coronatus* sp. n., s. Thomas unter austral. Reg.

Pt. Woodfordi sp. n. wird beschrieben von Thomas in Ann. Mag. Nat. Hist. 6. Ser. Vol. I. p. 155 – 158. Die Art steht *Pt. mollossinus* Tem. sehr nahe, weicht aber durch Färbungsunterschiede und schwächere Bezeichnung ab. Vergl. ferner Thomas unter austral. Reg.

Pteropus natalis vergl. Thomas ebenda.

Pteralopex gen. n. s. Thomas ebenda. Die Gattung steht *Pteropus* nahe unterscheidet sich jedoch durch das sehr vielspitzige Gebiss. Besonders sind die oberen Eckzähne vierspitzig; die unteren sind unverhältnissmässig klein. Die einzige bis jetzt bekannte Art ist *Pt. atrata*. Sie ist tief schwarz, nur an

der Unterseite der Flughäute unregelmässig weiss gesprenkelt. Kopf und Körper zusammen 240 mm lang, Basallänge des Schädels 63 mm.

Epomophorus veldkampii n. sp. s. Jentink unter System., Allgem.

Rhinolophidae. *Anthops g. n.* wird beschrieben von Thomas in Ann. Mag. Nat. Hist. 6. Ser. Vol. I. p. 155—158.

Die Gattg. schliesst sich an *Hipposiderus* an, unterscheidet sich aber von dieser durch den rudimentären, in der Interfemoralthaut verborgenen Schwanz, welcher demjenigen von *Coelops* gleicht. Nasenaufsatz sehr complicirt gebaut. Einzige bekannte Art *A. ornatus* mit langem, weichem Pelz, graubräunlich melirt. Kopf und Körper des typ. Expl. 51 mm, Ohr 17 mm, Oberarm 51 mm. Heimat Salomons-Inseln.

Nyctophilus microtis n. sp. wird beschrieben von Thomas in Ann. Mag. Nat. Hist. 6. Ser. Vol. II, p. 226.

Steht *N. timorensis* sehr nahe, ist aber abweichend durch kleinere, anders geformte Ohren, welche angelegt nicht über die Schnauzenspitze hinausragen. Heimat Sogere, Südost-Neuguinea.

Vespertilionidae. *Vespertilio murinus*, Placenta, s. van Beneden unter Anat. u. Phys., Geschlechtsorg.

Ferner Frommel unter Ontog. (Myotis m.)

V. Bechsteinii s. Blag. g unter geogr. Verbr., östl. gem. Reg

V. mystacinus ebenda; s. ferner Harting daselbst.

V. subulatus s. Tuckermann unter Anat. u. Phys., Allgem.

V. ciliolabrum n. sp. wird beschrieben von Merriam, C. Hart, in Proc. Biol. Soc. Washington IV, p. 1—4.

Vesperugo stampflii n. sp. vergl. Jentink unter Syst., Allgem.

Insectivora.

Allgemeines. Vergl. Jentink unter Allgem.; Jordan ebenda.

Talpidae. *Talpa europaea* s. Southwell unter Biol., Allgem., ferner Watson unter Biol., Färbg.

Condylura cristata s. Evermann unter westl. gem. Reg.

Erinaceidae. *Erinaceus europaeus* s. Mazzarelli unter Anat. u. Phys., Osteol.; ferner Hubrecht unter Ontog., Keibel ebenda.

Soricidae. Dobson, G. E., Description of two new Species of Indian Soricidae. — Ann. Mag. Nat. Hist. 6. Ser. Vol. I. p. 427—429.

Crocidura leucogenys sp. n. Der kurze Pelz oben hell zimmtbraun mit rötlichem, grau gemischtem Schimmer; Kopfseiten zwischen Mundwinkel und Ohr, Kinn und ein Teil der Brust schmutzig weiss; übrige Unterseite granlich. Schädel und Gebiss sehr ähnlich wie bei *C. murina*, aber viel kleiner. Seitendrüsen sehr gross. Kopf und Körper (typ. Expl.) 75 mm, Schwanz 47 mm. Hab. Indien.

Crocidura Dayi sp. n. ist kleiner als *C. rubicunda*, hat aber einen längeren Schwanz und ebenso grosse Füße. Pelz dunkelbraun, unten etwas heller. Keine Seitendrüse. Schädel kleiner als der von *C. rubic.*, im Gebiss verschiedene Abweichungen. Hab. Präsidentschaft Madras.

Jentink, F. A., On the Shrews from the Malayan Archipelago. — Notes Leyden Mus. X p. 161—167.

Verf. giebt eine Uebersicht über die Spitzmäuse des Malayischen Archipels und beschreibt *Crocidura tenuis* S. Müller, sowie 6 neue Arten.

Crocidura macklotii n. sp.: Base of the hairs mouse-color, upperparts and lowerparts of head and body of a light shining brown. Tail hairy, scales invisible; tail and upperparts of feet brown. Muzzle swollen. Hab. Timor.

Croc. brunnea n. sp.: Base of hairs black, upperparts reddish brown, lower parts somewhat lighter colored. Tail with very short brown hairs, scales visible; basal part of tail with a few longer hairs. Muzzle pointed. Hab. Java and Sumatra.

Croc. neglecta n. sp.: Base of hairs black; hairs of upperparts tipped with brownish red, underparts somewhat yellower. Tail and feet very hairy, brownish red; scales of tail entirely covered by the hairs: a few long fine hairs on the basal part of the tail. Tail much shorter than in the other species. Muzzle pointed. Hab. Sumatra.

Croc? vosmaeri n. sp.: Upperparts of a beautiful velvet brownish black; lowerparts of the same color, but the tips of the hairs have a lighter tinge. Tail and feet thickly covered with hairs colored like those of the back: basal part of the tail with a few longer fine hairs. Muzzle swollen. Hab. Banka.

Pachyura muelleri n. sp.: Base of the hairs mouse-color, upperparts light brown, underparts yellowish tipped. Scales of tail visible; a few short hairs are widely set on the tail, the basal half with several very long hairs. Muzzle swollen. Hab. Timor.

Pachyura unicolor n. sp.: All the hairs of a uniform bluish black color with a soft brownish tinge along the back. Tail with very few hairs, no elongated ones. Muzzle pointed. Hab. Ternate.

Zum Schluss Maassstabelle; bei jeder Beschreibung Angaben über d. Gebiss.

Crocidura fuliginosa var. *trichiura* s. Thomas unter malay. Reg.

Croc. battikoferi n. sp. s. Jentink unter Syst., Allgem.

Croc. stampflii n. sp. ebenda.

Pachyura megalura n. sp. ebenda.

Tupajidae. *Hylomys suillus dorsalis* var. nov. ist ausgezeichnet durch ein mehr oder minder deutliches, schwarzes Band, welches von der Stirn über den Hals bis zur Mitte des Rückens verläuft. (Thomas, Oldfield, Diagnoses of four new Mammals from the Malayan Region, in Ann. Mag. Hist. 6 Ser. Vol. II, p. 408—409.)

Fossile Insektivoren. *Lantanotherium sansaniense* n. sp. s. Filhol unter foss. Säuget.

Rodentia.

Allgemeines. Vergl. Cope unter Entw. Ferner Lataste unter Anat. u. Phys. Geschlechtsorg., Moreau ebenda, Ranvier unter Anat. u. Phys., Verdauungsorg. ferner Jentink unter Allgem., Jordan ebenda.

Sciuridae. *Sciurus concinnus* sp. n. gehört nach Oldfield Thomas (Ann. Mag. Nat. Hist. 6 Ser. Vol. II, p. 407—409.) zu der Gruppe kleiner malayischer Eichhörnchen, welcher ausser der genannten noch die Arten *S. melanotis* Müll. et Schleg., *S. Whiteheadi* Thom. und *S. exilis* Müll. umschliesst. Von der ersten dieser drei Arten unterscheidet sich *S. concinnus* durch den einfarbigen Kopf und den rostroten Rücken, von der zweiten durch den Mangel der Ohren-

pinself, von der dritten durch abweichende Färbung, ovalen statt runden hinteren Sohlenwulst, längeren Schwanz u. s. w., von allen durch den Mangel des kleinen vorderen Stütz Zahns im Oberkiefer. Vaterland: Isabella, Basilan, Philippinen.

Sciuropterus, s. Watson unter Biol., Färbg.

Pteromys volans (L), Mitteilungen giebt Büchner in *Mammalia Przewalskiana*. Zool. Teil. Bd. I, Liefg. 1.

Thomas, Oldfield, On *Eupetaurus*, a new form of Flying Squirrel from Kashmir. — *Journal Asiat. Soc. Bengal* Vol. LVII, p. 256—260. Mit 1 Farbentf. und 1 Tfl. Schädelabbildgn.

Eupetaurus ist ein neues Genus, welches äusserlich *Pteromys* nahe steht, aber von allen andern Sciuriden durch die hypsodonte Bezahnung scharf geschieden. *Eup. cinereus* n. sp. übertrifft an Grösse die grössten *Pteromys*-Arten, ist graulichbraun melirt und hat einen langen, cylindrischen, sehr buschigen Schwanz. Heimat: Gilgit in Kaschmir.

Tamias Pallasi Baird s. Büchner, *Mammalia Przewalskiana* Lfg. 1, p. 5ff.

Spermophilus erythrogenys Brandt s. ebenda p. 8; mit Abbild. (farbig).

Sp. alaschanicus sp. n., s. ebenda p. 11—13; mit Abbildung (farbig).

Diese Art ist *Sp. mugosaricus* (Lichtst.) sehr ähnlich, aber durch behaarte Sohlen der Hinterfüsse, längeren Schwanz und Fehlen scharf begrenzter Flecke auf der Oberseite des Körpers verschieden. Das einzige Expl. wurde im südlichen Ala-schan erbeutet.

Sp. mongolicus Milne Edw. s. ebenda p. 13—17.

Sp. obscurus sp. n. s. ebenda p. 17—21. Mit Abbildgn. Die Art steht zwischen *Sp. mongolicus* Milne Edw. und *Sp. dauricus* Brandt einerseits und *Sp. alaschanicus* Büchner andererseits. Von den ersten beiden Arten ist sie sofort durch die dunkle Färbung der Oberseite zu unterscheiden, von *Sp. alasch.* durch Länge und Färbung des Schwanzes. Wie bei den drei genannten Arten ist die Sohle des Hinterfusses dicht behaart. Der Schädel ist, abgesehen von der geringeren Grösse, demjenigen von *Sp. Eversmanni* sehr ähnlich. Vaterland: das hohe Steppenplateau nördlich vom Flusse Tscha-gryn-gol.

Sp. Eversmanni Brandt s. ebenda p. 21—25.

Arctomys himalayanus Hodg. s. ebenda p. 25—31.

A. robustus Milne Edw. s. ebenda p. 31—39.

A. dichrous Anderson s. ebenda p. 40—48. Mit Farbentafel u. Lichtdr.

Arctomys sp. kurze Notizen über eine Marmeltier-Art aus der nördlichen Gobi s. ebenda p. 39—40.

Arctomys fossil s. Studer unter foss. Säuget.

Marmeltier, s. ferner Dubois unter Anat. u. Phys., Respir.

Cynomys ludovicianus s. Haacke unter Biol., Gefangensch.

Anomaluridae. *Anomalurus pusillus* s. Thomas unter Geogr. Verbr., äthiop. Reg.

Anomalurus chrysophaenus sp. nov steht im Allgem. *A. Pelii* Tem. nahe, unterscheidet sich aber durch den viel kürzeren Schwanz, kürzere Behaarung und abweichende Färbung. Totallänge 0,54 m, Schwanz 0,11 m. Hab. Landana, Westafrika, 3° 12' s. Br. Vergl. Dubois. A., Description d'un Rongeur nouveau du genre *Anomalurus*. — *Bull. Soc. Zool. de France* XIII. p. 23—24.

Myoxidae. *Clavigilis crassicaudatus* n. gen. n. sp. vergl. Jentink unter System., Allgem.

Graphiurus nagtglasi n. sp. s. ebenda.

Myoxus glis s. Coester unter Biol., Gefangensch.

Muscardinus avellanarius s. Müller unter Biol., Schlaf.

Castoridae. *Castor fiber* s. Geoffroy St. Hilaire unter Biologie Allgem.

Muridae. *Cricetus (Vesperimus) Taylors* s. Thomas unter westl. gem. Region.

Thomas, Oldfield, On a new and interesting Annectant Genus of Muridae with Remarks on the Relations of the Old- and New-World Members of the Family. — Proc. Zool. Soc. London 1888 p. 130—135. Mit 1 Tfl.

Verf. beschreibt *Deomys ferrugineus* g. n. sp. n. als eigentümliche Zwischenform zwischen Hamstern und eigentlichen Mäusen. Besonders auffallend ist im Gebiss der erste obere Backenz.; er ist siebenhöckerig; die Höcker sind nach dem Schema 2—3—2 angeordnet. Die übrigen Zähne sind denen von *Mus* ähnlich, doch sind alle Höcker oben und unten ausserordentlich hoch und scharf von einander geschieden. Der Schädel ist sehr lang gestreckt, besonders im Schnauzenteil; das Infraorbitalloch ist dreieckig, Körperform mäuseartig. Farbe rötlich fahl, auf dem Rücken mit Schwarz gemischt, an Wangen, Schultern, Seiten und Hüften rein rötlich. Augen undeutlich schwarz umrandet. Kopf und Körper 125 mm, Schwanz (lädirt) 172 mm. Basallänge des Schädels 29,0 mm; grösste Breite 16,0 mm; Länge der oberen Backenzahnreihe 5,6 mm, der unteren ebenso. Hab. Unteres Congogebiet.

Wegen der eigentümlichen Bezahnung bildet *Deomys* nach Verf. eine eigene Gruppe *Deomyes* zwischen *Mures* und *Criceti*; sie führt auch phylogenetisch von den primitiveren Hamstern zu den höher spezialisirten Mäusen.

Zum Schluss sucht Verf. nachzuweisen, dass die vermeintlichen generischen Unterschiede zwischen *Cricetus* und *Hesperomys* hinfällig sind und dass es angemessen wäre, die beiden Gruppen unter *Cricetus* zusammenzufassen. Nach dem Prioritätsgesetz ist ohnehin der Name *Hesperomys* zu verwerfen.

Mus musculus s. Cockerell unter Biol., Feinde.

Ratten s. Gros ebenda.

Mus imperator sp. n. wird beschrieben von Oldfield Thomas (Ann. Mag. Nat. Hist. 6. Ser. Vol. I, p. 155—158). Ausgezeichnet durch die Körpergrösse von 340—350 mm, wozu ein kurzer Schwanz von 250—258 mm kommt. Die Ohren reichen nicht zum Auge; Fussballen wenig vorragend. Schwanz nackt, nicht auffallend rauh.

M. rex sp. n. s. ebenda. Schliesst sich der vorigen Art eng an, ist aber kleiner und hat einen viel längeren Schwanz, welcher ausserordentlich rauh ist. Kopf und Körper 270—290 mm, Schwanz 285—296 mm.

M. praetor sp. n. s. ebenda. Aehnelt im Allgem. sehr der *Mus terrae-reginae* Alst., von der sie aber durch kürzere Hinterfüsse, kürzeren Schwanz und 2 Paare von Brustzitzen (anstatt 1) abweicht. Kopf und Körper 168—188 mm, Schwanz 118—134 mm, Hinterfuss 33,5—35,5 m.

M. alticola sp. n. schliesst sich an *M. niveiventer* Hodg. aus Nepal an, unterscheidet sich aber von dieser Art durch einfarbigen Rücken, allmählichen Uebergang zwischen der Färbung der Ober- und Unterseite und durch bedeutendere Grösse. Hab. Kina Balu, Nord-Borneo. (Thomas, Oldfield in: Ann. Mag. Nat. Hist. 6. Ser. Vol. II. p. 407—409).

M. infraluteus sp. n. s. ebenda. Lebt in derselben Gegend wie die vorige Art, zeichnet sich durch die Dimensionen aus: Kopf und Rumpf 285 mm, Schwanz ohne äusserste Spitze 235 mm. Dunkel graubraun, Unterseite schmutzig gelbbraun, Hände und Füsse braun. Schwanz dünn behaart, schwarzbraun oder schwarz. Gebiss sehr kräftig.

M. nativitatis sp. n. s. Thomas, Oldfield, unter Malayische Reg.

M. Macleori Thos. ebenda.

M. Burtoni n. sp. wird beschrieben von Ramsay in Proc. Lin. Soc. N. S. Wales II. Ser. Vol. II p. 551—553 (1887! Im vorigen Bericht versehentlich unter Marsup. geraten).

Thomas, Oldfield, Description of a new Genus and Species of Rat from New Guinea. — Proc. Zool. Soc. London 1888 p. 237—240. Mit 2 Holzschn.

Chiruromys g. n. aus Neuguinea ist ausgezeichnet durch einen Greifschwanz mit aufwärts gekrümmtem Ende und ein hoch specialisirtes Gebiss. Aeusserlich mäuseartig. *Chir. Forbesi* sp. n. ist im Allgem. *Uromys cervinipes* Gould sehr ähnlich, aber durch die oben angegebenen Merkmale unterschieden. Kopf und Körper (typ. Expl.) 156 mm, Schwanz 222 mm; Basallänge des Schädels 34 mm, Länge der Backenzahnreihe 5,5 mm.

Merriam, C. Hart, beschreibt *Eutamias Dawsoni* sp. nov., eine rottrückige Maus von Finlayson River in Canada. Die Art steht zwischen *E. rutilus* und *E. Gapperi*. (Am. Nat. XXII. p. 649—651.) Mit Abbildg. der Backenzähne.

Eutamias carolinensis sp. n. s. Merriam unter westl. gem. Reg.

Derselbe, Description of a new Prairie Meadow Mouse (*Arvicola austerus minor*) from Dakota and Minnesota. — Am. Nat. XXII. p. 598—601. Mit Abbildg. (Schädel).

„Description of Type. — Similar to *Arvicola austerus*, but much smaller; length from end of nose to tip of tail vertebrae (measured in the flesh) 133 mm; tail vertebrae 36 mm; hind foot 16,5 mm; ears rather prominent, slightly overtopping the fur.“

Derselbe, Description of a new species of Field Mouse (*Arvicola pallidus*) from Dakota. — Am. Nat. XXII. p. 702—705. Mit Abbildg. Schädel.

Die Art unterscheidet sich von allen Verwandten durch äusserst blasse Färbung und auffallend kurzen Schwanz. Nach Schädel- und Zahnbildung gehört sie zum Subgen. *Chilotus* Baird. Biologische Notizen; Maassstabelle.

Derselbe, Description of a new species of Meadow Mouse from the Black Hills of Dakota. — Am. Nat. XXII. p. 934—935. Mit Abbildg. der Backenz.

Arvicola (Myonomes) longicaudus sp. nov. ähnelt in Grösse und Färbung *A. riparius*, hat aber viel längeren Schwanz und längere Ohren. Die Bildung des letzten oberen Molars weist auf das subgen. *Myonomes* hin, der mittlere ob. M. zeigt einige Abweichungen, ebenso die unteren M.

Arvicola amphibius s. Biehringer unter Ontogen.

A. glareolus s. unter östl. gem. Reg.

A. oeconomus s. Nehring unter foss. Säuget.

Myodes hudsonicus s. Rae unter arkt. Reg.

Fiber zibethicus ebenda; vergl. ferner Spoon unter Anat. u. Phys., Respir. und Tuckermann unter Anat. u. Phys., Verdauungsorg.

Otodontidae. Thomas, Oldfield, On a new Species of *Loncheres* from British Guiana. — Ann. Mag. Nat. Hist. 6. Ser. Vol. II. p. 326.

Loncheres guianae sp. n. unterscheidet sich von allen anderen Arten durch eigentümliche Färbung, worin sie nur Wagner's „*Isotrix*“ *pagurus* nahe steht. Von dieser Art ist sie jedoch durch das Stachelkleid verschieden, welches bei *I. pag.* völlig fehlt.

Hystriichidae. *Erethizon epixanthus* s. Windle unter Anat. u. Phys. Muskelsyst.

Caviidae. *Cavia cobaya* s. Carius unter Ontog., Keibel ebenda. Nehring unter Phylog.

Leporidae. *Lepus timidus* s. Ranvier unter Anat. u. Phys., Muskelsyst. ferner Shufeldt unter Biol. Beweg., Eckstein unter Biol., Färbg.

L. americanus s. Rae unter arkt. Reg.

L. glacialis ebenda.

L. cuniculus s. Carius unter Ontog., Giacomini, Martin, Masius ebenda, Méguin unter Biol., Krankh., Schweizer ebenda, Vassaux unter Ontog., H. Virchow unter Anat. u. Phys., Nervens., Woodward unter Anat. u. Phys., Geschlechtsorg.

Leporiden s. Huet unter Entwickl., Bastarde.

Carnivora.

Allgemeines. Verg. Allen unter Anat. u. Phys., Skelet, Batelli ebenda, Haut, H. Virchow ebenda, Gefäßsyst.

Ursidae. *Ursus maritimus* s. Kelley unter Anat. u. Phys., Muskelsyst.

Procyon cancrivorus s. Windle ebenda.

Fossile Ursiden: *Ursus* s. Schlosser unter foss. Säuget.

Ursus spelaeus s. Bertkau, Capellini, Piedboeuf ebenda.

Cephalogale ebenda.

Simocyon ebenda.

Hyaenarctos minutus s. Koken unter foss. Säuget., ferner Schlosser ebenda.

H. atticus s. Weithofer ebenda.

Ailurus anglicus s. Dawkins ebenda.

Mustelidae. *Mustela martes* und *M. foina* s. Wiepken unter Biol., Färbg.

Putorius vison s. Tuckermann unter Anat. u. Phys., Verdauungsorg.

Foetorius vulgaris s. Aplin unter Biol., Färbg.

Ichonyx zorilla s. Giglioli unter äthiop. Reg.

Lutra vulgaris s. Southwell unter Biol., Brunst.

Meles taxus s. Harting unter Biol., Allgem.

Fossile Musteliden: *Mustela palaeattica* s. Weithofer unter foss. Säuget.

M. Lartetii s. Filhol ebenda.

M. gamlitzensis s. Hofmann ebenda.

Lutra Valetoni desgl.

Plesiocyon typicus n. gen. n. sp. s. Schlosser unter foss. Säuget.

Plesiictis pygmaeus n. sp. desgl.

Palaeoprionodon minutus n. sp. desgl.

Stenogale aurelianensis n. sp. (n. gen.) desgl.

Pseudictis guntianus n. gen. n. sp. desgl.

Palaeogale Gervaisi n. sp. desgl.

Viverridae. *Manguste* s. Gros unter Biol., Feinde.

Viverra zibethica s. Vacek unter foss. Säuget.

Canidae. *Canis jubatus* s. Nehring unter Anat. u. Phys., Skelet.

C. variegatus s. Giglioli unter äthiop. Reg.

C. occidentalis und *C. latrans* s. Zipperlen unter Biol., Färbg., ferner Langkavel unter westl. gem. Reg.

C. lupus s. unter Biol., Allgem., ferner Gronen unter Biol., Nutzen etc.

Caniden im Londoner Zool. Garten s. Selater unter Biol., Gefangensch.

Hanshund s. Dalziel, Landrin, Lesèble, Lie, Pietrement und Schlotfeldt unter Landwirtsch. etc.

Ferner Bonnet unter Ontog., Mall ebenda; Tizzoni unter Anat. u. Phys., Exkret.; Variot unter Anat. u. Phys., Haut; Vitzeu unter Anat. u. Phys., Nervensyst.

Fossile Caniden: *Pachycynodon crassirostris* s. Schlosser unter foss. Säuget. *P. Filholi* n. sp. ebenda.

Cynodictis leptorhynchus ebenda.

Pseudamphicyon lupinus n. sp. ebenda.

Dinocyon ebenda.

Hyaenidae. *Hyaena crocuta* s. Chapman unter Anat. und Phys., Geschlechtsorg.

H. striata s. Young. u. Robinson unter Anat. u. Phys., Allgem.

Felidae. *Felis domestica* s. Gottheil unter Biol., Krankh.; ferner von Monakow unter Anat. u. Phys., Nervensyst. Parker unter Biol., Allgem., Placzek unter Landwirtsch. etc. Stowell ebenda.

Felis leo, Rhachitis bei Jungen, s. Koerner unter Biol., Krankh.

F. pardus s. Menges unter Biol., Allgem.

F. tigris s. Inverarity ebenda. Ferner Seefeld unter östl. gem. Reg.

Nehring, A., Ueber Haus- und Wildkatzen. — Humboldt 7. Jahrg. p. 139 — 141. Mit 1 Abbildg.

Verf. betont die Abstammung der Hauskatze von mehreren Stammarten, von denen besonders in Betracht kämen: *F. maniculata*, *F. caligata*, *F. caffra*. Bezüglich der Unterschiede zwischen Haus- und Wildkatze ist zu bemerken, dass bei typischen Exemplaren der letzteren unten an der Sohle sich nur ein rundlicher schwarzer Fleck findet, während bei wildfarbigen Hauskatzen (und bei den genannten wilden Arten) die ganze Sohle bis zum Fersenbein hinauf schwarz gefärbt ist.

Fossile Feliden: *Felis leiodon* s. Weithofer unter foss. Säuget.

Machairodus bidentatus s. Filhol ebenda.

M. Schlosseri s. Weithofer ebenda.

M. leoninus derselbe ebenda.

Pinnipedia.

Allgemeines. Vergl. Balkwill unter geogr. Verbr., Allgem.

Ferner Harrison, A. J., Remarks about Seals. — Proc. Bristol Nat. Soc. (2) Vol. X, p. 290—297; Jordan unter Allgem., Lebouq unter Anat. u. Phys., Skelet.

Philippi, R. A., Berechtigung der Synonymie von *Otaria philippii* Peters. — Arch. f. Naturgesch. 1887, p. 116—118.

Burmeister's Angaben über die Synonymie der genannten Arten werden verbessert.

Derselbe macht Bemerkungen zu Burmeister's Angaben über den See-Elefanten und über die Synonymie von *Otaria philippii*, „welche eine selbstständige Art ist, die gar keine Synonymie hat.“ (Zool. Garten Jahrg. XXIX p. 310 - 313).

Derselbe, Kurze Mitteilung zum Vorkommen des See-Elefanten, in Zool. Garten Jahrg. XXIX. p. 345.

Halichoerus grypus s. Nehring unter Biol., Gefangensch.

Turner, W., Report on the Seals collected during the Voyage of H. M. S. Challenger in the Years 1873—76. — Report Voyage Challenger. Zoology Vol. XXVI, P. II. 240 S. nebst 10 Tfn.

Eine sehr wichtige und eingehende Arbeit. Der 1. Teil derselben enthält Beschreibungen der während der Challenger-Expedition gesammelten Genera und Species, nämlich von *Macrorhinus leoninus*, *Leptonychotes weddelli*, *Otaria jubata*, *Arctocephalus gazella* (nur Schädel). *A. australis*, *A. sp. incerta* von Juan Fernandez. Die Tafeln geben die vordere Körperhälfte und die Hinterextremitäten, ferner mehrere Schädel und Skeletteile von *Macrorh. leon*; Schädel und Skeletteile von *Lept. weddelli*; Schädel der *Arctoceph.*-Arten; Skeletteile von *Arctoceph. australis*. — Der 2. Teil bringt eine Classification der Pinnipedier, bei welcher neben den herkömmlichen eine Reihe neuer, vom Verf. aufgefundener anatomischer Charaktere verwendet werden. Die Gattungen und Arten werden in folgender Weise angeordnet.

Phocidae.

Phocinae.

Phoca vitulina L., Common Harbour Seal.

» *groenlandica* Fabr., Harp Seal.

» *hispida* Schreb., Ringed S. or Floe-Rat.

» *barbata* Fabc., Bearded S.

Halichoerus grypus (Fabr.), Grey S.

Ogmorhininae.

Ogmorhinus leptonyx (Blainv.) Leopard S.

» *carcinophagus* (Hombron and Jacquinot), Crab-eating or Saw-toothed S.

Leptonychotes weddelli (Lesson) Weddell's S.

Ommatophoca rossi Gray, Ross's S.

Monachus monachus (Hermann), Monk S.

Cystophorinae.

Cystophora cristata (Erxleb.) Crested S.

Macrorhinus leoninus (L.) Elephant S.

Trichechidae.

Trichechus (Odobaeus) *rosmarus* L., Morse, Walrus or Sea Horse.

Otariidae.

Otaria jubata (Forster), Southern Sea Lion.

Eumetopias stelleri (Lesson), Steller's Seal or Sea Lion.

» *californianus* (Lesson), Californ. Sea Lion.

» *hookeri* Gray, The Auckland Island Hair-Seal.

Eumetopias cinereus (Péron), Grey Sea Lion of New Zealand and Australia.

Arctocephalus australis (Zimmerm.), South American Fur-Seal.

„ *gazella* (Peters), Kerguelen Island Fur-S.

„ *pusillus* (Schreb.), Fur-S. of Cape of Good Hope and of Crozet Islands.

„ *ursinus* (Linn.), Fur-S. of North Pacific.

„ *forsteri* (Lesson), F.-S. of New Zealand and Australia.

„ *philippii* (Peters), F.-S. of Juan Fernandez.

Der 3. Teil enthält eine eingehende Beschreibung des Gehirns vom See-Elefanten und vom Walross, sowie eine Vergleichung der Hirnwindungen der Seehunde und Walrosse mit denjenigen der Carnivoren, der Affen und des Menschen (dieser Abschnitt abgedruckt in Journ. Anat. Phys. N. S. Vol II, p. 300—303). Zu diesem Teil 3 Tafeln. Der 4. Teil behandelt kurz die Eingeweide des See-Elefanten. Ein Appendix bringt eine eingehende Abhandlung von Wm. C. Strettel Miller über die Myologie der Pinnipedier.

Hyracoidea.

Langkavel, B., *Hyrax*. — Zool. Jahrb. III. p. 336—347.

Verf. stellt die bisher bekannten Angaben über die Verbreitung der Hyrax-Arten zusammen, fügt Bemerkungen biologischen Inhaltes hinzu und giebt eine Zusammenstellung der verschiedenen Namen der Tiere. Sodann Beschreibung von *H. syr.*, *H. cap.*, *H. abessin.*, und *H. arbor.*, nebst osteologischen Mitteilungen.

H. scioanus s. Giglioli unter äthiop. Reg.

Dendrohyrax Emini s. Thomas ebenda.

D. stampflii s. Jentink unter System., Allgem.

Ungulata.

Vergl. Pawlow unter foss. Säuget.

Proboscidea.

Allgemeines. Vergl. Weithofer unter Anat. u. Phys., Skelet; Gaudry unter foss. Säuget.

Elefant, Ohr, s. Buck unter Anat. u. Phys., Sinnesorg.

„ Stosszahn, s. Loder unter Anat. u. Phys., Verdauungsorg.

„ Krankheit s. Galippe unter Biol., Krankh.

Elephas primigenius s. Brown unter foss. Säuget., Buchenau ebenda, Ladrière ebenda, Pohlig ebenda.

E. meridionalis s. Fischer unter foss. Säuget., Pohlig ebenda.

E. antiquus s. Pohlig unter foss. Säuget.

E. trogontherii ebenda.

E. (priscus) Falconeri ebenda.

E. americanus s. Woodman ebenda.

Mastodon s. Gaudry unter foss. Säuget., Holder ebenda.

M. Antium s. Burmeister ebenda.

M. avernensis s. Capellini ebenda.

M. angustidens s. Hofmann unter foss. Säuget., Vaceck ebenda.

Amblypoda.

Vergl. Cope unter foss. Säuget.

Pertissodactyla.

Tapiridae. *Tapirus hungaricus* s. Teller unter foss. Säuget.

Palaeotapirus Douvillei n. g. n. sp. s. Filhol ebenda.

Lophiodontidae. Vergl. Filhol unter foss. Säuget.

Lophiodon leptorhynchus n. sp. ebenda.

Hyracotherium Cayluxi n. sp. s. Filhol unter foss. Säuget.

H. argentonicum n. sp. ebenda.

Pachynolophus argentonicus n. sp. ebenda.

P. isselanus ebenda.

Hyrachyus intermedius n. sp. s. Filhol unter foss. Säuget.

Cesserassictis antiquus n. g. n. sp. ebenda.

Equidae. Bastarde s. Jenner Weir unter Entw., Bast.

Pferd, s. Albrecht unter Anat. u. Phys., Allgem.

„ s. Burcke unter Biol., Krankh.

„ Haarfarbe, s. Crampe unter Entw., Allgem.

„ Geschlechtsverhältniss, s. Düsing unter Anat. u. Phys., Geschlechtsorg.

„ s. Kaufmann ebenda, Verdauungsorg.

„ Hautsekret, s. Leclerc ebenda, Haut.

„ Anatomie s. Mc. Bride ebenda, Allgem.; vergl. ebenda Ellenberger, ferner M'Fadyean.

„ s. Müller unter Anat. u. Phys., Allgem.

„ Histologie der Haut, s. Smith ebenda, Haut.

„ s. Lee unter Biol., Krankh.

„ modernes, s. Gueruzey unter Landwirtsch. etc.

„ Domestikation, Ursprung s. Huidekoper ebenda.

„ Beziehung zur Landw. s. Lavalard ebenda.

„ Geschichte in Amerika, s. d'Orcet ebenda.

„ s. Tourneux unter Ontogen.

„ Darm, s. Walley unter Biol., Krankh.

„ Gebiss, s. Wilckens unter Anat. u. Phys., Verdauungsorg.

„ Haarfarbe s. denselben unter Entwickl., Allgem.

Maultier s. Sanson unter Verdauungsorg.

Hipparion gracile s. Weithofer unter foss. Säuget.

Rhinocerotidae. *Rhinoceros* sp. foss. s. Hofmann unter foss. Säuget.

Rh. tichorhinus s. Römer ebenda, Studer ebenda.

Rh. sansaniensis s. Vacek ebenda.

Elasmotherium sibiricum s. Gaudry, A., et Boule, M., ebenda, ferner Boule ebenda.

Artiodactyla.

Allgemeines. Vergl. Bonnet unter Ontog., Brandt unter Anat. u. Phys., Skelet.

Flower, Horns and Antlers. — Trans. Middlesex Nat. Hist. and Science Soc. 1887—88 p. 21—27. Mit Abbildgn.

Cope E. D., The Artiodactyla. — Am. Nat. XII. p. 1079—1095. 1. Teil; mit Holzschn.

Giebt in einer Umarbeitung des in den Proc. Am. Philos. Soc. 1887 erschienenen Aufsatzes eine Synopsis der Familien, an welche sich bei jeder einzelnen foss. und rec. Familie eine Erörterung der Phylogenie schliesst.

Huet, Liste des Espèces connues et décrites jusqu'à ce jour dans les Familles des Cervidés, Cervulidés, Tragulidés et Moschidés. — Bull. Soc. Nat. d'Acclimat. de France. 4. Sér. T. V. p. 274—284; 497—508; 545—555; 721—737;

Verf. giebt in geographischer Anordnung eine Uebersicht über die angeführten Wiederkäuer; kurze Beschreibungen nebst einigen Abbildungen von Tieren und Geweihen, welche letzteren z. T. recht mangelhaft sind.

Hippopotamidae. *Hippopotamus Pentelici* s. Ciofalvo u. Battaglio unter foss. Säuget.

Suidae. *Sus scrofa fer.* Altersbestimmung s. Nehring unter Anat. u. Phys., Allgem.

Gebissentwicklung, derselbe unter Ontog.

Wilde Schweine-Arten, Eckz. s. Nehring unter Verdauungsorg.

Schwein, Geschmacksorg., s. Tuckermann unter Anat. u. Phys., Verdauungsorg.

Ursprung, s. Sanson unter Phylog.

Vergl. ferner Rietsch u. Martinand unter Biol., Krankh., Cornil et Chantemesse ebenda, Salmon ebenda, Lutze ebenda.

Sus palustris s. Nehring unter Anat. u. Phys., Verdauungsorg.

Hyotherium Soemmeringi s. Hofmann unter foss. Säuget., Vacek ebenda.

Heude, Père, Eine Arbeit über Schweine (Titel dem Ref. unbekannt)

— Mémoires concernant l'hist. nat. de l'Empire chinois 1888.

Verf. unterscheidet in Ostasien 11 verschiedene neue Arten der Gattung *Sus*, nämlich *Sus ussuricus*, *dicrurus*, *taininensis*, *calamianensis*, *cebifrons*, *minutus*, *effrenus*, *conchyoporius*, *jalaensis*, *microtis*, *frenatus* — ein Seitenstück zu den 37 Hirschen desselben Verf.

Camelidae. Vacat.

Tragulidae. Vergl. oben Huet.

Hyaemoschus crassus s. Hofmann unter fossil. Säuget.

Cervidae. Roger, Ueber die Hirsche. — Ber. naturw. Ver. Regensburg f. d. Jahre 1886—87. Heft I. p. 51—93. (Erschienen 1888.)

Systematische Stellung der Cerviden, zu denen auch die Giraffen gezählt werden, Gruppierung derselben, Uebersicht über die Gattungen, Verbreitung, Stammesgeschichte. Einige Unrichtigkeiten, so z. B., dass die Endenzahl des neuen Geweihes stets eins mehr betrage als des vorhergehenden (man denke an *Coassus*, *Furcifer*, *Blastocerus*, *Axis*, *Rusa*!), ferner dass die Jungen ein weiss geflecktes Haarkleid haben (nicht alle! Ref.), dass *Blastocerus* in der Regel ein Gabelgeweih habe (erwachsene sind durchweg Sechsender. Ref.)

Vergl. ferner Huet unter Artiodact., Allgem.

Cervus capreolus s. Scheinpflug unter Biol., Färbg.

C. megaceros s. Schaaffhausen unter foss. Säuget.

C. dama s. Keilhack ebenda, ferner Feilden unter südam. Reg.

C. mexicanus s. Boulart unter Anat. u. Phys., Geschlechtsorg.

Sambur s. Gilbert, R., in Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. IX, p. 224—232.

Rangifer tarandus s. Studer unter foss. Säuget.

Heude, P., Problema Philippinense seu cervinorum craniorum in Philippin. insulis hucusque detectorum (100) praeviae icones. 11 tabb. cum interpret. et indice. Zi-ka-wei 1887 (!).

Palaeomeryx eminens s. Hofmann unter foss. Säuget.

P. Bojani ebenda.

P. furcatus ebenda.

Amphitragulus Boulangeri ebenda.

A. Quercyi s. Filhol ebenda.

A. crassus ebenda.

Choiodon elegans ebenda.

Platuprosopos sansaniensis ebenda.

Camelopardalidae. *Camelopardalis parva* s. Weithofer unter foss. Säuget.

Samotherium Boissieri s. Mayor, Forsyth, ebenda.

Urmitherium s. Rodler ebenda.

Cavicornia. Rind, vergl. Hittcher unter Anat. u. Phys., Skelet, Moussu unter Anat. u. Phys. Nervens.; Auld unter Phylog., Babes unter Biol., Krankh., Windle ebenda, Müller ebenda, Kaiser unter Landw. etc., v. Middendorff ebenda, Auld, Werner ebenda, Eckmeyer unter Biol., Krankh., Ehlers ebenda.

Niaterind s. Dareste unter Entwickl. Allgem.

Franqueiro-Rasse s. Nehring unter Landw. etc.

Parkrind s. Auld ebenda.

Bos primigenius s. Nehring unter foss. Säuget.

Poëphagus grunniens s. Nehring unter Landw.

Steere, J. B., berichtet brieflich über den „Tamaron“ von Mindoro. Aeussere Beschreibung, Lebensweise. — Proc. Zool. Soc. London 1888 p. 413—415.

Pechuel-Loesche, Afrikanische Büffel. — Zool. Jahrb. III. p. 705—723. Mit 2 Tfn.

Verf. teilt die afrikan. Büffel in 2 Gruppen: A. Schwarze Büffel, B. Rote B. Erstere gruppieren sich um *B. caffer*, letztere um *B. pumilus Turton*. Die schw. B. finden sich im südlichen, östlichen und nordöstl. Afrika, die roten im westlichen. Neben *B. caffer* kommt wohl noch eine etwas abweichende Art vor, die Blyth als *B. caffer var. aequinoctialis*, Gray als *B. centralis* bezeichnete. Ob unter den viel kleineren roten Büffeln mehrere Arten zu trennen sind, ist noch unentschieden; die Gehörne zeigen mehrfache Differenzen. Uebrigens hat *B. pumilus Turton* die Priorität vor *B. brachycerus Gray*. Erwähnt wird ferner ein „Zwergbüffel“, angeblich kleiner als die Anoa und ein „grauer Büffel“. Ueber beide fehlt es noch an genügender Kenntniss. Zum Schluss berichtet Verf. über schlapphörnige Rinder, deren Hörner beweglich in der Haut stecken und herabhängen; sie kommen im Hererolande und nach Haacke auf Mauritius vor.

Ovibos moschatus s. Pohlig unter foss. Säuget.

Ovis aries vergl. Nicolas u. Prenant unter Biol., Krankh., Nocard ebenda, Tournoux unter Ontog.

Schaf. u. Ziegen - Bastarde s. Weir unter Entw. Bast.; vergl. ferner Railliet unter Biol. Feinde.

Reichenow, A., veröffentlicht eine vorläufige Notiz über eine neue Wildziege *Capra dorcas n. sp.* von der Insel Joura. — Zool. Garten Jahrg. XXIX, p. 29—30.

Derselbe, Die Wildziege der Insel Joura. — Zool. Jahrb. III. p. 591—596, Mit 1 farb. Tafel.

Verf. beschreibt als *Capra dorcas n. sp.* eine in den Besitz des Berliner Zool. Gartens gelangte Ziege von der Insel Joura nördl. von Euböa. Das Tier unterscheidet sich von *C. aegagrus* durch die Hörner, die Behaarung und die Farbe, sowie durch die Körperform.

Ziege, s. Alsberg unter Biol. Allgem., Fankhauser unter Landw. etc.

Terpone longiceps s. Jentink unter System., Allgem.

Cephalophus doriae ebenda.

Gnu s. Huet unter Biol., Gefangensch.

Antilope cristata s. Hofmann unter foss. Säuget.

Antilope gracillima s. Weithofer ebenda.

Helicoceros rotundicorne ebenda.

Protragelaphus Skonzesi ebenda.

Stricker, W., Sprachwissenschaft und Naturwissenschaft. — Zool. Garten Jahrg. XXIX p. 23—26.

Behandelt wird in etymologischer Hinsicht die Gemse.

Anoplotheriidae. *Uphelognatus Quercyi n. g. n. sp.* s. Filhol unter foss. Säuget.

Cetacea.

Allgemeines. Vergl. Bolau unter Allgem., Lebonq., Kükenthal unter Anat. u. Phys., Skelet., Lütken unter Biol., Allgem., Rodler unter Farnen, Allgem.

Delphinidae. Lütken, Chr., Critical studies upon some Odontoceti of the Genera Tursiops, Orca, and Lagenorhynchus. — Ann Mag. Nat. Hist. 6. Ser. Vol. II, p. 179—186.

Uebersetzung aus dem Dänischen. Vergl. Bericht für 1887 p. 84.

Tursiops tursio s. van Bambeke unter Anat. u. Phys., Haut; ferner Service unter östl. gem. Reg.

Globiocephalus melas s. Fjellstrup unter Anat. u. Phys., Haut.

Grampus griseus s. Laver unter östl. gem. Reg.

Rachianectes glaucus s. Caton unter Biol. Allgem.

Hyperoodontidae. *Hyperoodon rostratus* s. Southwell unter östl. gem. Reg.; ferner Bailey ebenda.

Physeteridae. Pouchet, G., Note accompagnant la présentation de photographies de cachalot. — Comptes rend. hebd. Soc. Biol. 8. S. T. V. p. 558 — 559.

Bemerkungen über die Form der Schnauze etc.

Cachelot s. ferner Pouchet unter Ontogenie und unter Biol., Krankh., Monaco unter östl. gem. Reg.

Balaenopteridae. Ueber ein im Medway-Flusse nahe der Küste von Essex gestrandetes Exemplar von *Balaenoptera borealis* Lesson wird berichtet

im Zoologist III. Series Vol. XII. p. 466—468. — Beschreibung, Maasse, Bemerkungen über einige andere Wale.

Balaenoptera rostrata s. Balkewill unter östl. gem. Reg.

Megaptera longimana s. Struthers unter Anat. u. Phys., Allgem.

Balaenidae. *Balaena biscayensis* s. Pouchet und Beauregard unter östl. gem. Reg.

Walfischerei s. Southwell unter Landwirtsch. etc. Cockes ebenda.

Srenia.

Desmostylus hesperus s. Marsh unter foss. Säuget.

Edentata.

Orycteropodidae. *Orycteropus Gaudryi* s. Major unter foss. Säuget.

Manidae. *Palaeomanis Neas* s. ebenda.

Bradypodidae. Langkavel, B., Aphorismen über Faultiere. — Zool. Garten Jahrg. XXIX, p. 18·23.

Mitteilungen osteologischen Inhalts, besonders über die Halswirbel, z. T. nach handschriftlichen Notizen R. Hensel's.

Megatheriidae. *Megatherium* s. Burmeister unter foss. Säuget., Woodward ebenda.

Glyptodontidae. *Glyptodon petaliferus* s. Cope unter foss. Säuget.

Eleutherocercus setifer n. g. n. sp s. Koken ebenda.

Marsupialia.

Allgemeines. S. Lendenfeld unter Biol., Allgem., Ramsay unter austral. Reg.

Thomas, Oldfield, Catalogue of the Marsupialia and Monotremata in the Collection of the British Museum (Natural History). London 1888. Mit 28 Tfn.

Das vorliegende Werk ist seit 1843 der erste Catalog der Beuteltiere des Britischen Museums. Seitdem verdreifachte sich fast die Zahl der Exemplare. Der „Catalogue . . .“ enthält die Beschreibungen aller bekannten Arten, eine genaue Synonymie jeder Art, sowie eine Liste der im Brit. Mus. vorhandenen Exemplare. Ausser den Beuteltieren werden auch die Monotremen behandelt. Bei jeder Familie und Gattung giebt Verf. eine Uebersichtstabelle auf Grund der äusseren und eine zweite nach den Schädel- und Gebiss-Charakteren; ebenso findet man bei jeder Art neben dem Aeusseren des Tieres (Farbe, Grösse etc.) Schädel und Gebiss genau beschrieben. Das reichhaltige, dem Verf. zu Gebote stehende Material hat z. T. überraschende Resultate ergeben. So werden z. B. *Didelphis cancrivora* Gmel., und *Did. Azarae* Temm. als eine Art (*Did. Az.* als Subspec.) unter *Did. marsupialis* L. zusammengefasst, da sich zwischen allen Uebergänge finden, welche die Aufrechterhaltung der bisherigen „Arten“ unmöglich machen. Die systematische Einteilung ist in ihren Hauptzügen folgende:

Ordnung Marsupialia.

Subord. I. Diprotodontia.

Fam. I. Macropodidae.

Subf. I. Macropodinae.

1. *Macropus Shaw*, 23 Arten nebst 4 U.-A.
2. *Petrogale Gray*, 6 Arten.
3. *Onychogale Gray*, 3 Arten,
4. *Lagorchestes Gould*, 3 Arten.
5. *Dorcopsis Schleg. u. Müll.*, 3 Arten.
6. *Dendrolagus Schleg. u. Müll.*, 4 Arten.
7. *Lagostrophus Thos.*, 1 Art.

Subf. II. Potoroinae.

8. *Aepyprymnus Garrod*, 1 Art.
9. *Bettongia Gray*, 4 Arten.
10. *Caloprymnus Thos.*, 1 Art.
11. *Potorous Desm.*, 3 Arten.

Subf. III. Hypsiprymnodontinae.

12. *Hypsiprymnodon Rams.*, 1 Art.

Fam. II. Phalangeridae.

Subf. I. Tarsipedinae.

1. *Tarsipes Gerv. u. Verr.*, 1 Art.

Subf. II. Phalangerinae.

2. *Acrobates Desm.*, 1 Art.
3. *Distoechurus Peters*, 1 Art.
4. *Dromicia Gray*, 4 Arten.
5. *Gymnobelideus Mc Coy*, 1 Art.
6. *Petaurus Shaw*, 3 Arten, 1 U.-A.
7. *Dactylopsila Gray*, 1 Art.
8. *Petauroides Thos.*, 1 Art mit 2 U.-A.
9. *Pseudochirus Ogilb.*, 10 Arten.
10. *Trichosurus Less.*, 2 Arten, 1 U.-A.
11. *Phalanger Storr.*, 5 Arten, 1 U.-A.

Subf. III. Phascolarctinae.

12. *Phascolarctus Blainv.*, 1 Art.

Fam. III. Phascolomyidae.

1. *Phascalomys E. Geoff.*, 3 Arten.

Subord. II. Polyprotodontia.

Fam. IV. Peramelidae.

1. *Peragale Gray*, 2 Arten.
2. *Perameles E. Geoff.*, 11 Arten, 1 U.-A.
3. *Choeropus Ogilb.*, 1 Art.

Fam. V. Dasyuridae.

Subf. I. Dasyurinae.

1. *Thylacinus Temm.*, 1 Art.
2. *Sarcophilus F. Cuv.*, 1 Art.
3. *Dasyurus E. Geoff.*, 5 Arten.
4. *Phascologale Temm.*, 13 Arten, 1 U.-A.

5. *Sminthopsis* Thos., 4 Arten.

6. *Antechinomys* Krefft, 1 Art.

Subf. II. Myrmecobiinae.

7. *Myrmecobius* Waterh., 1 Art.

Fam. VI. Didelphyidae.

1. *Didelphys* Linn., 23 Arten. 1 U.-A.

2. *Chironectes* Ill., 1 Art.

Ord. Monotremata.

Fam. I. Echidnidae.

1. *Echidna* G. Cuv., 1 Art, 2 U.-A.

2. *Proechidna* Gerv., 1 Art.

Fam. II. Ornithorhynchidae.

1. *Ornithorhynchus* Blumenb.

Vergl. ferner Osborn unter foss. Säuget.

Macropodidae. *Trichis oscillans* s. de Vis unter foss. Säuget.

Vergl. ferner Lendenfeld unter Biol., Allgm.

Hypsiprymnodontidae. *Hypsiprymnodon moschatus* s. Ramsay unter australische Reg.

Phalangistidae. *Phalangista johnstoni* n. sp. s. Ramsay ebenda, *Ph. lemuroides* ebenda, *Ph. archeri* ebenda.

Dromicia lepida n. sp. wird beschrieben in Thomas, Cat. Marsup. p. 142.

Phalanger orientalis n. sp., ebenda p. 204.

Petaurus breviceps var. *papuanus* n. var. ebenda p. 158.

Pseudochirus occidentalis n. sp. ebenda p. 174.

Phascologyidae. Vergl. Lendenfeld unter Biol. Allgem.

Phascolarctidae. *Phascolarctos cinereus* s. Gruber unter Anat. u. Phys., Muskelsyst.

Peramelidae. *Peragale leucura* wird abgebildet (farbig) in Thomas, Cat. Marsup. Tfl. 2.

Didelphyidae. Vergl. Osborn unter Ontog.

Thomas, Oldfield, Diagnoses of four new Species of Didelphys. — Lnn. Mag. Nat. Hist. 6. Ser. Vol. I p. 158–159

Didelphys (Micoureus) lepida sp. n. unterscheidet sich von *D. murina* L. durch die viel geringere Grösse und kürzere Ohren, welche angelegt kaum die Mitte des Auges erreichen. Kopf und Körper 105 mm. Hab. Peru.

D. (Peramys) scalops sp. n. hat die Grösse von *D. brevicaudata* Erxl. Kopf, Rumpf und Schwanz sind schön rostrot, Vorderrücken, Schultern und Bauch olivengrünlich melirt. Zähne sehr klein. Hab. Brasilien.

D. (Peramys) Iheringii sp. n. gleicht in Farbe und Proportionen genau *D. americana* Müll. (= *tristriata* auct.), ist aber nur halb so gross. Hab. Rio Grande do Sul.

D. (Peramys) Henselii sp. n. ist nach dem Verf. die von Hensel beschriebene, aber nicht benannte intermediäre Art. Farbe auf der Oberseite dunkel grau melirt, tief rostrot an den Seiten und am Bauch. Hab. Rio Grande do Sul.

D. dimidiata s. Beddard unter Anat. u. Phys. Drüsen.

Monotremata.

Allgemeines. Vergl. Thomas, Cat. Marsup. Monotr. Brit. Mus.

Ferner Cope unter Anat. u. Phys., Verdauungsorg.

Ornithorhynchidae. *Ornithorhynchus paradoxus* s. Poulton unter Anat. u. Phys. Verdauungsorg.

Vergl. auch Lendenfeld unter Biol., Allgem.

Echidnidae. Weber, Max, Een nieuwe Soort van Proechidna. — Bijdr. tot de Dierk., 1888 Feest Nummer. Art. 5, pl. I.

Verf. beschreibt ein Exemplar von *Proechidna* mit fünf vorderen und vier hinteren Krallen, welches er für eine neue Art hält. Oldf. Thomas ist jedoch der Ansicht, dass es sich um ein abnormes Individuum von *Proechidna bruijnii* Pt. u. Doria handle, welches auf atavistischem Wege die sonst für die Gattung typische Zahl der Zehen resp. Krallen (rudimentär sind 1. u. 5. Zehe unter der Haut auch bei typischen Expl. vorhanden) überschritten hat. (Cat. Marsup. Monotr. p. 383).

Bericht

über

die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel
während des Jahres 1888.

Von

Ant. Reichenow.

I. Geschichte, Litteratur, Museologie, Taxidermie.

J. A. Allen, Visitors Guide to the Collection of Birds in the American Museum of Natural History. New York 1888. 8°.

American Museum of Natural History of New York City. Bericht über die Sammlung von E. A. Mearns; Auk 5. p. 222—223.

American Ornithologist's Union. — Statuten der Gesellschaft und Mitgliederverzeichniss; Auk 5. No. 2 Anhang. — Bericht über die fünfte Versammlung der Gesellschaft; Auk 5. p. 95—100.

Sp. F. Baird. — Proceedings at a Meeting commemorative of the Life and Scientific Work of Sp. F. Baird; held Jan. 11 1888, under the joint auspices of the Anthropol., Biolog. and Philos. Societies of Washington. 8° Washington 1888. — s. auch R. Ridgway.

Ch. W. Beckham †; Auk 5. p. 445—446.

H. v. Berlepsch, über Arten des United States National Museum, s. unten unter Südamerika.

M. N. Bogdanow — Todesanzeige; Ibis (5) 6. p. 381, s. auch Auk 5. p. 333—334.

L. Bonaparte, s. T. Salvadori.

M. Bräss, Ornithologisches aus alter Zeit; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 301—305, 335—338.

British Ornithologist's Union: Anniversary Meeting; Ibis (5) 6. p. 496—497.

A. Carrucco Guida del Museo dei Zoologia della Univ. di Roma. Fauna locale specie animali della provincia di Roma esistenti nella nuova collezione. Aves; Boll. Mus. Zool. Roma 1. p. 19—33.

R. Eder theilt Stellen aus alter Litteratur über den Auerhahn mit; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 31—33, 50—51.

A. H. Evans hat den Bericht über die Fortschritte in der Ornithologie während des Jahres 1887 geliefert in: Zoological Record for 1887. Ed. by F. E. Beddard. London 1888.

Ph. H. Gosse †; Auk 5. p. 446.

C. Grevé, Zoologischer Aberglauben in Russland; Zool. Gart. 29. p. 273—277.

F. P. Hardy führt Nachrichten älterer Reisenden über Alca impennis an; Auk 5 p. 380—384.

G. Hartlaub, s. G. Neumayer.

R. O. Karlsberger †; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 165.

F. Kriso, das Präpariren und Conserviren der Vögel und ihrer Eier. Nach der Methode des Pastor Blasius Hanf; Mitth. Nat. Ver. Steiermark 1888. Ber. p. 93—102.

E. Lear — Todesanzeige; Ibis (5) 6. p. 286.

L. v. Lorenz, s. A. v. Pelzeln.

E. A. Mearns, s. oben American Museum.

G. Neumayer, Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen (Vögel von G. Hartlaub). 2. Aufl. Berlin 1888.

A. v. Pelzeln und L. v. Lorenz besprechen die Typen der ornithologischen Sammlung des K. K. naturhistorischen Hofmuseums in Wien, Theil 4. (Schluss); Ann. k. k. naturhist. Hofmus. Wien 1888 p. 37—62.

J. Pietsch, Herleitung und Aussprache der wissenschaftlichen Namen in dem E. F. v. Homeyer'schen Verzeichniss der Vögel Deutschlands. Wien 1888. 8° 57 p.

Derselbe, die Vögel Taurus und Anthus des Plinius Secundus; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 248—250.

H. Pryer — Todesanzeige; Ibis (5) 6. p. 381, s. auch Auk 5. p. 332—333.

O. Reiser, Katalog des bosnisch-herzegovinischen Landesmuseums in Sarajevo. 2. Vögel. p. 80—91. Quarto.

R. Ridgway liefert eine Erinnerungsschrift für Spencer Fullerton Baird; Auk 5. p. 1—14.

C. B. H. v. Rosenberg †; Zool. Gart. 29. p. 352.

T. Salvadori giebt die Daten der Publication von Bonaparte's Iconografia della Fauna Italia an und liefert einen Index der in diesem Werke abgebildeten Arten; Boll. Mus. Zool. ed Anat. comp. R. Un. Torino 1888 3. p. 1—25. s. auch: Ibis (5) 6. p. 320—325.

Ernst Schauer †; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 455.

R. B. Sharpe berichtet über die Vogelsammlung des British Museum. Die Sammlung umfasst 200000 Exemplare und wird mit den bereits in Aussicht stehenden Vermehrungen demnächst auf 250000 kommen; Auk. 5. p. 124—125.

H. Stevenson — Todesanzeige; Ibis (5) 6. p. 498, s. auch Zoologist (3.) 12. p. 345—346.

J. Talsky berichtet über die ornithologische Sammlung des Landesmuseums in Klagenfurt; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 6—7.

Derselbe berichtet über die ornithologische Sammlung des steiermärkisch-landschaftlichen Joanneums in Graz; ebenda p. 64—65.

Turati-Sammlung im Museum in Mailand — Notiz über den Umfang derselben; Ibis (5) 6. p. 150.

Ein Ei von *Alca impennis* wurde auf einer Auction in London am 13. December 1887 für 3360 Mark verkauft, ein anderes am 12. März 1888 für 4600 Mark; Zoologist (3.) 12 p. 28 u. 143; Ibis (5) 6. p. 152.

Verzeichniss sämtlicher Schriften über Geflügelzucht, Stuben-, Zier- und Singvögel, Nutzen und Schaden der Vögel, Vogelschutz, Naturgeschichte der Vögel und ihrer Eier, Kaninchenzucht, welche in den Jahren 1850—1888 im deutschen Buchhandel erschienen sind. Leipzig, Gracklauer. 1888. 12° 36 p.

II. Anatomie. Embryologie.

A. Batelli e E. Giacomini, Sulle glandule salivari degli uccelli; Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa Proc. verb. Vol. 6, p. 106—110.

J. Beard, Morphological Studies. II. The Development of the Peripheral Nervous System of Vertebrates (Pt.) Elasmobranchii and Aves; Qu. Journ. Micr. Sc. London 1888 p. 153—227. T. 16—21.

F. E. Beddard theilt Untersuchungen über die Respirationsorgane von *Fratercula* und *Spheniscus* mit; Proc. Z. S. London p. 252—255.

Derselbe beschreibt einige innere Organe von *Balaeniceps rex*, danach scheint die Form zunächst an die Reiher sich anzuschliessen; Proc. Z. S. London p. 284—290. Mit Holzsehn.

Derselbe erörtert die Anatomie der *Strigidae*, wonach systematisch zwei Gruppen, *Striginae* und *Buboninae* unterschieden werden müssen; Ibis (5) 6. p. 335—344.

J. Bellonci, Ueber die centrale Endigung des Nervus opticus bei den Vertebraten; Zeitschr. Wiss. Zool. 47. p. 1—46, T. 1—8.

J. F. van Bemmelen, über einen *Rhea*-Embryo; Tijdschr. Nederl. Dierk. Ver. (2.) D. 1. Afl. 3—4 Versl. p. 205—206.

A. v. Beneden, s. G. Corin.

F. Bignon fand cervico-cephaline Luftsäcke bei den Papageien; Bull. Soc. Zool. France 13. p. 180—181.

Derselbe, Recherches sur les rapports du Système pneumatique de la tête des Oiseaux avec le système dépendant de l'appareil pulmonaire; Compt. Rend. Soc. Biol. Paris 1888 p. 357—360.

H. G. Bronn, Klassen und Ordnungen des Thierreichs. 6. Bd. 4. Abth. Vögel, von H. Gadow. Lief. 18—22 erschienen (Gehirnnerven, Rückenmarksnerven, Sehorgan, Geruchsorgan, Diffuse Sinnesorgane, Integument).

G. Brook, Note on the Epiblastic Origin of the Segmental Duct in Teleostean Fishes and in Birds; Proc. Soc. Edinb. 14. p. 368—370.

G. Buchet, Première note sur l'appareil tenseur de la membrane antérieure de l'aile des Oiseaux; Compt. Rend. Soc. Biol. 1888 p. 328—332.

R. Burckhardt, Doppelanlage des Primitivstreifens bei einem Hühnerei; Arch. Anat. Phys. 1888 Anat. Th. p. 431—432.

A. Cazin, Structure et le mécanisme du gésier Oiseaux; Bull. Soc. Philom. (7.) 12. p. 19—22.

Derselbe, Recherches anatomiques, histologiques et embryologiques sur l'appareil gastrique des Oiseaux, Av. 5 pl. Paris 1888. 8°.

E. D. Cope theilt Untersuchungen über das Gewicht des Gehirns im Verhältniss zum Körpergewicht bei verschiedenen Vogelarten mit; Amer. Nat. 22. p. 537—539.

G. Corin u. A. v. Beneden, Recherches sur la régulation de la température chez les Pigeons privés d'hémisphères cérébeaux; Archives de Biologie. Gent 1888 p. 265—276.

E. Coues, über die Nomenclatur der Muskeln am Vogelflügel; Auk 5. p. 435—437.

A. Dogiel, über die nervösen Elemente in der Netzhaut der Amphibien und Vögel; Anat. Anz. 3. p. 342—347.

E. Fatzacappa, Genesi della cellula specifica e intima struttura del sistema centrale nervoso degli uccelli; Boll. Soc. Nat. Napoli (1.) 2. Ann. 2. Fasc. 2 p. 185—193.

G. J. Fischer berichtet über Polydactylie bei Vögeln; Auk 5. p. 218—219.

M. Fürbringer, Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der Vögel, zugleich ein Beitrag zur Anatomie der Stütz- und Bewegungsorgane. Amsterdam u. Jena 1888. 2. Theil. Gross 4°. (Bijdragen tot de Dierkunde Afl. 15. 1 u. 2). — In dem ersten Theil dieses umfassenden Werkes giebt Verf. eine Beschreibung der Sceletttheile sowie Nerven und Muskeln der Schulter und des Oberarms und deren Entwicklung. In dem zweiten Theile wird der taxonomische Werth der einzelnen Organe des Vogelkörpers einer eingehenden Prüfung unterzogen; sodann werden die einzelnen Familien unter Berücksichtigung der bisherigen diesbezüglichen systematischen Arbeiten und Abwägung der bestimmenden Charaktere in Hinsicht auf ihre Stellung in einem natürlichen System besprochen; und auf Grund dieser Darstellungen wird ein Vogelsystem entworfen, welches auf den beigegebenen Tafeln in Form eines Stammbaums

in vertikaler Ansicht und horizontaler Projection dargestellt ist. Am Schlusse des Bandes ist eine umfassende Litteraturübersicht gegeben. — [Referent beschränkt sich auf die vorstehende kurze Notiz, da für ein nur einigermaßen eingehendes Referat der verfügbare Raum dieses Jahresberichtes nicht ausreicht, zudem jeder systematisch arbeitende Ornithologe dieses bedeutsame Werk, welches eine erstaunliche Fülle von Material verarbeitet, zahlreiche neue Gesichtspunkte für die Systematik der Vögel eröffnet und die vielseitigste Anregung bietet, studieren muss.] Einen Auszug giebt: H. Gadow, *Nature* 38. p. 150—152, 177—181.

H. Gadow, s. H. G. Bronn u. M. Fürbringer.

F. R. Gasch, Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Herzens der Vögel und Reptilien; *Arch. Naturg.* 1888 p. 119—152 T. 11—12.

E. Gaupp, Anatomische Untersuchungen über die Nervenversorgung der Mund- und Nasenhöhlendrüsen der Wirbelthiere; *Morphol. Jahrb.* 14. p. 436—489. T. 19.

J. A. Jeffries, Note on the Epidermal System of Birds; *Proc. Boston Soc.* 23. p. 358—360.

F. Koenike berichtet über einen Tausendfuss im Hühnerei; *Abh. nat. Ver. Bremen* 10. p. 294.

E. Lahousse, Recherches sur l'ontogenèse du cervelet; *Arch. Biol.* T. 8. Fasc. 1. p. 43—110.

L. Liebermann, Embryochemische Untersuchungen. I. Weniger bekannte Bestandtheile des Hühnereies. Fett der Hühnereier. Über Nuclein. II. Stoffwechsel des bebrüteten Eies bis zur völligen Entwicklung des Hühnchens. III. Arbeiten zur speciellen Chemie des Embryonalleibes; *Math. Nath. Ber. Ungarn (Budapest)* 1887—88 p. 224—295.

Derselbe, Embryochemische Untersuchungen; *Pflüg. Arch. ges. Phys.* 43. p. 71—151. — Auszug in: *Naturf.* 21. p. 221—222.

E. Linton fand *Distomum ovatum* in einem Hühnerei; *Amer. Nat.* 22. p. 74.

F. A. Lucas bespricht osteologische Unterschiede der *Turdinae*, *Miminae* und *Troglodytinae* und hebt besonders die Verschiedenheiten zwischen den letzteren beiden Gruppen hervor; *Proc. U. St. N. M.* 11. p. 173—180. Taf. 37.

Derselbe bespricht annormale Rippenzahl bei Vögeln; *Auk* 5. p. 329—330.

J. Y. Mackay, The Development of the Branchial Arterial Arches in Birds, with special reference to the origin of the Subclavians and Carotids; *Philos. Trans. London* 179. (B) p. 111—139 T. 22—25.

F. C. Mall, The First Branchial Cleft of the Chick; *Johns Hopkins Univ. Circulars* 7. 63. p. 38.

Derselbe, Development of the Eustachian Tube, Middle Ear, Tympanic Membrane and Meatus of the Chick; Stud. Biol. Labor. J. Hopkins Univ. 4. p. 185—192. T. 18—19.

R. Marage, Contribution à l'anatomie descriptive du sympathique thoracique et abdominal chez les Oiseaux. Thèse. Paris, Davy 1888. 8°, 69 p.

A. Marcacci, De quelques anomalies obtenues dans les oeufs de poule en les soumettant au mouvement; Archiv Ital. Biol. 9. p. 58.

G. F. Mazzarelli, Su di alcune gravi anomalie anatomofisiologiche, riscontratesi in un piccione domestico; Boll. Soc. Nat. Napoli 1888 p. 20—24.

E. Mehnert, Untersuchungen über das os pelvis der Vögel; Sitzungsab. Naturf. Ges. Dorpat 8. p. 212—213.

A. B. Meyer, Abbildungen von Vogelskeletten. Bd. I mit 121 Tafeln in Lichtdruck. Dresden 1879—1888.

T. J. Parker, Preliminary note on the development of the skeleton of the Apteryx; Proc. R. Soc. London 43 p. 391—397 6 Fig.

Derselbe, second preliminary note on the development of Apteryx; ebenda p. 482—487 8 Fig.

W. K. Parker, On the Structure and Development of the Wing in the Common Fowl; Philos. Trans. London 179. (B) p. 385—398. T. 62—65.

Derselbe, On the secondary Carpals, Metacarpals and Digital Rays in the Wings of existing Carinate Birds; Proc. R. Soc. London 43. p. 322—325.

Derselbe, On Remnants or Vestiges of Amphibian and Reptilian Structures found in the Skull of Birds, both Carinatae and Ratitae; ebenda p. 397—402.

Derselbe, On the Vertebral Chain in Birds; ebenda p. 465—482.

Derselbe hält die Watvögel mit gestrecktem Gesichtstheil des Schädels für die älteren, entgegengesetzt bei den Kolibris; Ibis p. 217.

E. Retterer, Des Phanères chez les Vertébrés et de leur Tissus Producteurs; Bibl. de l'école des hautes études (Paris) 33. (1887).

R. W. Shufeldt beschreibt die nordamerikanischen *Lamellirostres* in osteologischer Beziehung; Proc. U. St. N. M. 11. p. 215—251.

Derselbe bespricht die Osteologie der *Tubinares* und *Steganopodes*; ebenda p. 253—315.

Derselbe beschreibt das Skelet von *Alca torda* und zieht die osteologischen Verhältnisse anderer Wasservögel zum Vergleich heran; Journ. Anat. Phys. London 23 p. 1—39.

Derselbe, über die Beziehungen von *Aphriza virgata* zu anderen Vogelformen; Journ. Morph. Boston 2 p. 311—340 T. 25.

Derselbe, Osteologische Notiz über *Lunda cirrhata* und *Corvus sinuatus*; Auk 5. p. 328—329.

Derselbe, Bemerkungen über das Sternum einiger Scolopaciden; ebenda p. 330—332.

Derselbe über die Osteologie von *Habia melanocephala* mit Vergleichen der Skelette verschiedener Finken und Tangaren, ebenda p. 438—444.

Derselbe beschreibt das Skelet von *Porzana carolina*; Journ. Comp. Medic. Surg. July 1888.

Derselbe liefert eine eingehende Beschreibung des Skelets von *Gallus bankiva*; Journ. Comp. Med. Surg. Philadelphia 9. p. 343—376.

Derselbe behandelt die Osteologie von *Sturnella* nebst Vergleichen der osteologischen Verhältnisse der *Icteridae* und *Corvidae*; Journ. Anat. Phys. 21. p. 309—350 T. 14—15.

L. Stejneger über Shufeldt's „Dermo - tensor patagii“ (propatagialis cucullaris); Auk 5. p. 120—123.

G. A. Stockwell; Physiological relations of gular vocalization in Grouse; Journ. Comp. Med. and Surg. 9. p. 127—135.

H. Teuscher, Einige Beobachtungen am lebenden Hühnerembryo; Fortschr. Med. p. 1—5.

H. Virchow, Ueber die physikalisch zu erklärenden Erscheinungen, welche am Dotter des Hühnereies bei der mikroskopischen Untersuchung sichtbar werden; Sitz. Ak. Wiss. Berlin 37 p. 977—981.

M. L. Walker, On the Form of the Quadrate Bone in Birds; Studies from Mus. Zool. Univ. Coll. Dundee 1. No. 1. p. 1—18.

K. F. Wenckebach, De ontwikkeling en de bouw de Bursa Fabricii. Met. 4 pl.; Tijdschr. Nederl. Dierk. Ver. (2.) 2. p. 19—138. Sep. Leiden (Brill) 1888. Deutscher Auszug: Tijdschr. etc. p. 139—142.

C. G. Young beschreibt *Opisthocomus cristatus* äusserlich und anatomisch und giebt einige biologische Notizen über die Art. An Daumen und Mittelfinger befindet sich eine Krallen. Die Jungen kriechen mit Zuhilfenahme ihrer Flügel, indem sie die beiden Finger zum Festhalten und Anklammern gebrauchen (hierzu Figur); Notes Leyden Mus. 10. p. 169—173, T. 8.

J. Zumstein, Ueber das Mesoderm der Vogelkeimscheibe, Inaug. Diss. Bern 1887. 8°, 56 p.

III. Hautbedeckung, Pterylographie, Flugvermögen.

J. A. Allen, On the Structure of Birds in Relation to Flight with Special-Reference to Recent Alleged Discoveries in the Mechanism of the wing; Trans. N. Y. Acad. Sc. 1888 p. 89—100.

E. C., On Emargination of the Primaries [Referat]; Auk 5. p. 418—421.

Davies Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Feder; *Morphol. Jahrb.* 14. 1888 p. 369—371. — Die Dune stellt ein Horngebilde vor, welches sich räumlich und seitlich vor der Federanlage bildet, aber mit dieser sowohl durch die gemeinsame Papille als auch durch gemeinsame Strahlen zusammenhängt.

H. Gadow bespricht die Zahl der Schwingen der verschiedenen Vogelordnungen und Familien und erörtert hypothetisch die phylogenetische Entwicklung derselben; *Proc. Z. S. London* p. 655—667.

J. H. Gurney jun. führt Beispiele auf, in welchen weibliche Vögel das Gefieder der Männchen trugen; *Ibis* (5) 6. p. 226—230.

V. Häcker hat die Veränderungen in der Zeichnung der Feder bei fortschreitender Entwicklung der letzteren insonderheit bei Drosselvögeln untersucht und gefunden, dass dieselben nach einem bestimmten Princip vor sich gehen. Mit erläuternden Abbildungen; *Zool. Jahrb.* 3. p. 309—316 T. 8.

J. B. Holder, *Discussion of the Mechanics of Bird Flight*; *Trans. N. Y. Acad. Sc.* 1888. p. 80—87.

L. Kerschner, Ueber die Zeichnung der Vogelfedern. Eine Erwiderung auf Prof. Th. Eimers gleichnamigen Aufsatz; *Humboldt* 7. p. 50—54.

H. Landois weist darauf hin, dass die Erstlingsdunen der Vögel nur Strahlenspitzen der ersten Deckfedern sind; *Zool. Anz.* 11. p. 703.

F. A. Lucas, *The Flight of Birds*; *Science* 11. p. 58—59.

E. J. Marey, Valeurs relatives des deux composantes de la force déployée dans le coup d'aile de l'oiseau, déduites de la direction et de l'insertion des fibre du muscle grand pectoral; *Compt. Rend.* 107. 1888. p. 549—551.

Derselbe, Le problème mécanique du vol; *Revue de Paris* 42. p. 289—300. Fig. 43—58.

J. S. Newberry, *The Flight of Birds*; *Science* 1888. p. 9—10.

W. K. Parker beschreibt die Krallen an den Flügeln (Daumen oder Mittelfinger) der Ratiten; *Ibis* (5) 6. p. 124—128.

E. Regalia führt diejenigen italienischen Vogelarten auf, welche nach des Verf. Untersuchungen eine Kralle am Daumen oder an Daumen und Zeigefinger besitzen; *Proc. verb. Soc. Toscana Sc. Nat.* 6. Maggio 1888. p. 86—94.

R. W. Shufeldt behandelt die Pterylose einiger Spechte; *Auk* 5. p. 212—218. Mit Holzschnitten.

W. P. Trowbridge, *The Flight of Birds*; *Science* 1888. p. 16.

Derselbe, *The Mechanism of the Flight in Soaring Birds*; *Trans. N. York Ac. Sc.* 7. p. 75—78.

Vgl. auch G. Buchet oben S. 105.

IV. Mauser, Abänderungen, Bastarde.

Mauser: B. Altum bespricht die Mauser und Federkleider einiger Vogelarten, besonders die mehrfache Mauser junger Hühner-vögel; Journ. Ornith. 36. p. 109—111.

C. R. Gawen widerlegt die Ansicht, dass die Gesichtsfedern bei jungen Saatkrähen mit der ersten Mauser ausfallen; Zoologist (3.) 12. p. 224—225, s. auch M. Christy, ebenda p. 302.

E. Rüdiger, über Mauser und Verfärbung des Papstfink; Zool. Gart. 29. p. 315—316.

S. auch W. H. St. Quintin, weiter unten unter Einbürgerung etc.

Abänderungen, Missbildungen: S. Bonjour bespricht Varietäten einiger europäischen Vogelarten; Bull. Soc. Zool. France 13. p. 193—199.

A. W. Butler, über Fälle von Albinismus; Journ. Cincinnati Soc. N. H. 1888 p. 214—216.

K. W. v. Dalla Torre, über schwarzkehlige [Kinn Ref.] Abweichung der *Fringilla montifringilla* in Tirol; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 106—107.

C. Dury, Die Albinos der „Cuvier Club Collection“; Journ. Cincinnati Soc. N. H. 1888 p. 216, 217.

K. Eckstein beschreibt einige Drosselvarietäten der Eberswalder Sammlung; Zool. Gart. 29. p. 30—31.

A. Girtanner berichtet über eine Farbenabweichung der *Tichodroma muraria*; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 46.

Ch. van Kempen zählt eine Anzahl von Farbenvarietäten europäischer Arten auf; Bull. Soc. Zool. France 13. p. 104—108.

F. v. Krauss beschreibt bräunlichgraue Abänderung des *Corvus corone*; Jahresb. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. 44. p. 305.

J. H. Reed beschreibt einen Albino von *Dendroica striata*; Auk 5. p. 432.

W. Robinson bespricht einige Albinos des United States National Museum; Proc. U. St. N. Mus. 11. p. 413—416.

H. Schalow berichtet über eine semmelgelbe Abart von *Scelopax rusticula*; Journ. Ornith. 36. p. 102.

W. Stone beschreibt eine Ausartung der Scharlachtangare; Auk 5. p. 322.

P. M. Thorne beschreibt eine Spielart von *Xanthocephalus xanthocephalus*; Auk 5. p. 112.

St. v. Washington berichtet über Farbenabweichungen von *Lycos monedula*, *Garrulus glandarius* und *Nucifraga caryocatactes* (rostfarbene Tropfenflecke am Schnabel und Vorderhals, vermuthlich durch Genuss von Haselnüssen hervorgerufen); Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 47—48, 61—62.

Abänderungen verschiedener Arten sind beschrieben in: Zoologist (3.) 12. p. 68, 108, 185, 352.

Bastarde: A. Pichler beschreibt einen Bastard von *Anas boschas domestica* ♂ u. *Cairina moschata* ♀; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 84—86.

E. Rüdiger, über Kanarien-Buchfink-Bastarde; Zool. Gart. 29. p. 304—306.

A. Suchetet, Note sur les hybrides des anatidés. Rouen 1888.

Derselbe, L'hybridité dans la nature; Revue quest. scient. Juli 1888.

V. v. Tschusi-Schmidhoffen beschreibt einen Rakelhahn, welchen Verf. für ein Kreuzungsprodukt von *Tetrao tetrix* ♂ und (*T. tetrix* ♂ × *T. urogallus* ♀) ♀ hält; Ornith. 4. p. 517—526. T. 2.

S. auch J. H. Gurney jun. oben S. 109.

V. Palaeontologie.

E. Schäff berichtet über die Arbeit O. Winges „Vögel aus den Knochenhöhlen in Brasilien“ [vergl. Bericht 1887 S. 97]; Journ. Ornith. 36. p. 5—8.

C. W. de Vis beschreibt neue fossile Arten aus dem Post-Tertiär von Queensland: *Nyroca robusta*, *Anas elapsa*, *Dendrocygna validipennis*, *Porphyrio* (?) *reperta*, *Gallinula strenuipes*, *Fulica prior*, *Plotus parvus*, *Xenorhynchus nanus*, *Otis*?, *Dromaeus patricius*; Proc. Lin. Soc. N.-S.-Wales (2.) 3. p. 1277—1294 T. 33—36.

VI. Geographische Verbreitung, Wanderung, Faunistik.

Allgemeines.

A. Brauer, Die arktische Subregion. Ein Beitrag zur geographischen Verbreitung der Tiere; Zool. Jahrb. 3. p. 189—308 T. 7. — Tritt auf Grund der Verbreitung der Säugetiere für die Sonderung einer arktischen Zone ein.

F. M. Chapman berichtet über Beobachtungen des Nachtzuges der Vögel vermittelt eines Telescops; Auk 5. p. 37—39.

C. L. Edward, über Winter-Rastplätze der Krähen; Zoologist (3.) 12. p. 292—297, 334—345 aus: Amer. Journ. Psychol. 1888 p. 436—459.

F. C. Keller, Der Zug der Vögel. Biologische Skizze; Jahrb. naturh. Landesmus. von Kärnten 19. Hft. 36 Jahrg. p. 121—138.

A. Reichenow, Die Begrenzung zoogeographischer Regionen vom ornithologischen Standpunkt; Zool. Jahrb. 3. p. 671—704. — Auf Grund der in der Arbeit dargelegten Untersuchungen unter-

scheidet Verf. 6 Tierzonen: 1. Arktische Zone, umfassend die Nordpolargebiete südwärts bis zur Grenze des Baumwuchses, mit welcher ungefähr die Nordgrenze der Verbreitung der Gattung *Tetrao* zusammenfällt. — 2. Westliche Zone, umfassend ganz Amerika von der Nordgrenze des Baumwuchses bis zum Kap Horn und Falklandsinseln, nebst zugehörigen Inselgruppen. Zerfällt in: a) Westlich-gemässigte Region, Nordamerika bis Nordmexico (Wendekreis des Krebses), ganz Kalifornien eingeschlossen, Südspitze von Florida aber, etwa vom 28. Breitengrade an, ausgeschlossen. b) Südamerikanische Region, Mittel- und Südamerika, Westindien, Südspitze von Florida, Falklands Inseln, Galapagos, Tristan d'Acunha etc. — 3. Oestliche Zone, umfassend ganz Europa und Asien von der Grenze des Baumwuchses südwärts, einschliesslich Philippinen und Sundainseln ausser Celebes, Lombock, Sumbawa und den östlich davon gelegenen kleinen Sundainseln, ferner umfassend Afrika nebst den westafrikanischen Inseln und St. Helena, Kapverden, Azoren, im Norden auch Island. Zerfällt in: a) Oestlich-gemässigte Region. Europa von der Baumgrenze südwärts nebst Island, Azoren, Kanaren, Kapverden, Nordafrika südwärts bis an das Senegalgebiet, weiter östlich bis zum 15. Grad, Arabien mit Ausnahme des südlichen Küstensaumes; Asien von der Grenze des Baumwuchses südlich bis zu den Bergketten südlich des Yangtsekiang, dem Himalaya und den das Thal des Sind im Westen begrenzenden Gebirgszügen, ferner die Japanischen Inseln. b) Aethiopische Region. Afrika vom Senegal bez. dem 15. Breitengrad (im Osten) südwärts, die Südküste von Arabien, Sokotra, Sansibar, die westafrikanischen Inseln, St. Helena. c) Malayische Region. Indien und Süd-China, Sundainseln ostwärts bis Borneo, Java, Formosa, Philippinen, Chagos-Inseln. — 4. Südliche Zone, umfassend Australien nebst den papuasischen und polynesischen Inseln, Neu-Seeland, Auckland- und Macquarie-Inseln, die östlichen malayischen Inseln westlich bis einschliesslich Celebes und Lombock. Zerfällt in: a) Australische Region. Australien, die papuasischen und polynesischen Inseln. b) Neuseeländische Region. Neu-Seeland nebst Chatam-, Auckland-, Campbell-, Macquarie-Inseln, Norfolk und Lord-Howe. — 5. Madagassische Zone, umfassend Madagaskar, Maskarenen, Comoren und Seychellen. 6. Antarktische Zone, umfassend die südpolaren Inseln: Süd-Georgien, Prinz Edwards-, Crozet-, Kerguelen, Macdonald-Inseln, St. Paul, N. Amsterdam etc.

R. B. Sharpe, *Birds in Nature*. With 39 col. pl. and other illustr. by P. Robert. London, Low 1888. 4°.

H. B. Tristram setzt seine Erörterungen über den polaren Ursprung des Vogellebens, in Bezug auf die Verbreitung und Wanderung betrachtet, fort [vergl. Bericht 1887 S. 97]; *Ibis* (5) 6. p. 204—216.

Oestliche gemässigte Region.

Europa: R. Blasius giebt eine Skizze des Wanderzuges der Steppenhühner (*Syrnhaptes paradoxus*) durch Europa i. J. 1888; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 373—377. Mit Abbildung. — s. auch Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 86—87.

L. Holtz berichtet über die Einwanderung der Steppenhühner in Europa im Jahre 1863 und 1888, über deren Lebensweise in Freiheit und Gefangenschaft: „Ueber das Steppenhuhn“ (Greifswald, Bamberg 1888).

E. Noll, über Auftreten von *Syrnhaptes paradoxus* ausserhalb Deutschlands; Zool. Garten 29. p. 233—237.

P. C. Reimers, O. E. Eiffe und A. Senoner berichten über Auftreten von *Syrnhaptes paradoxus* in Europa; Zool. Gart. 29. p. 315.

A. B. Meyer u. F. Helm, über *Syrnhaptes paradoxus*, s. unten S. 114.

W. B. Tegetmeier, Pallas's Sand Grouse (*Syrnhaptes paradoxus*), its history, habits, food and migrations, with hints as to its utility, and a plea for its preservation. With a coloured plate and three woodcuts. 8°. 24 p. London: Horace Cox. 1888.

V. v. Tschusi zu Schmidhoffen, Die Verbreitung und der Zug des Tannenhebers (*Nucifraga caryocatactes*) mit besonderer Berücksichtigung seines Auftretens im Herbst und Winter 1885 und Bemerkungen über seine beiden Varietäten; Ver. Zool. Bot. Ges. Wien 1888 p. 407—506. Mit Tafel.

B. Vian, Monographie des Poussins des oiseaux d'Europe qui naissent vêtus de duvet; Mem. Soc. Zool. France 1. 1888 p. 52—115.

Deutschland: E. Baldamus zählt die in Coburg vorkommenden Vogelarten auf nebst Angaben über Zug und Brutzeit; Erster Bericht d. Thier- u. Pflanzenschutz-Ver. f. d. Herzogth. Coburg 1888 p. 58—69.

H. v. Basedow theilt Beobachtungen aus Thüringen mit; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 65—66.

R. Blasius u. Gen. liefern den 11. Jahresbericht (1886) des Ausschusses für Beobachtungsstationen der Vögel Deutschlands. [Hervorzuheben ist, dass nach Matschie mehrere *Chrysomitris carinella* bei Andreasberg a. Harz gefangen wurden. *Ardea purpurea* ist in Bayern und Oldenburg beobachtet. *Totanus glottis* soll am 23. August am Lech geschossen worden sein. Dass *Pyrrhula rubicilla* Pall. in Hannover Standvogel sei, ist offenbar irrthümlich.]; Journ. Ornith. 36. p. 313—571.

C. Bolle, über *Haematopus ostrilegus* und *Aquila fulva* in der Mark Brandenburg; Journ. Ornith. 36. p. 113 u. 114.

H. Bünker berichtet über Auftreten von *Nucifraga macro-rhyncha* bei Berlin; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 453.

Derselbe, s. O. v. Riesenthal.

L. Buxbaum berichtet über den Zug der Kraniche bei Raunheim a. M. im Frühjahr 1888; Mntsch. Schutze Vogelw. 13. p. 152—154.

J. Cordeaux, über Erscheinen von *Syrnhaptes paradoxus* auf Helgoland; Naturalist 1888 p. 197—198.

Derselbe liefert Notizen über die Vogelfauna von Helgoland; Naturalist 1888 p. 1—12.

G. Clodius berichtet über Erscheinen von *Loxia curvirostra* und *Nucifraga macrorhyncha* in Mecklenburg. Herbst 1888; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 381—382.

Derselbe berichtet über eine Sammlung mecklenburgischer Vögel; Arch. Ver. Mecklenb. 42. p. 107—118. — S. auch J. F. Soldat, ebenda p. 184.

J. G. Fleig, über zahlreiches Erscheinen von *Loxia curvirostra* im Schwarzwald; ebenda p. 394.

R. Fresenius, über zahlreiches Erscheinen von *Loxia curvirostra* im Harz; ebenda p. 286—287.

Ch. Grad, Notice sur la Canardière de Guémar et les oiseaux aquatiques d'Alsace; Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar 1886/1888 p. 343—356.

F. Helm, s. A. B. Meyer.

H. Hiller, über Auftreten des Tannenhehers bei Badersleben; Prov. Sachsen; ebenda p. 383—384 u. 454.

A. v. Homeyer berichtet über zwei Brutplätze der *Muscicapa parva* bei Greifswald; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 48—50.

K. Junghans, über zahlreiches Auftreten von *Loxia curvirostra* bei Kassel; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 407—408.

K. Knauth liefert eine Uebersicht der auf dem Zobten (Schlesien) vorkommenden Arten nebst Bemerkungen über Lebensweise. Auch *Panurus biarmicus* als einmal beobachtet aufgeführt; Journ. Ornith. 36. p. 9—38.

Kühne, über Brüten von *Limosa melanura* bei Anklam; Journ. Ornith. 36. p. 103.

F. Kumpf, Notizen von Angermund, Rheinpreussen; Mitth. Orn. Wien 12 p. 107—108.

F. Lindner, Die zweite Einwanderung des Steppenuhns in Deutschland; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 172—178, 298—299.

J. A. Link führt 181 Arten als Bewohner der Hassberge (Franken) auf; Ber. naturf. Ges. Bamberg 14. p. 1—33.

Derselbe vermutet, dass *Nucifraga caryocatactes* im Frankenwalde brüte; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 22—23.

F. Menzel, H. Schacht, F. Lindner, E. Zech u. Köpert berichten über Erscheinen des Tannenhehers in Deutschland; ebenda p. 393—394.

A. B. Meyer u. F. Helm. III. Jahresbericht (1887) der ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen. Nebst

einem Anhang über das Vorkommen des Steppenuhns in Europa im Jahre 1888. Berlin (Friedländer) 1888.

J. Michel berichtet über *Colymbus septentrionalis*, *C. arcticus* und *Mergus merganser* im Iser- und Lausitzergebirge; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 169—170.

Derselbe, über Auftreten des Tannenhehers im Isergebirge 1888; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 171—172.

E. Noll berichtet über die Lumm-Kolonie auf Helgoland; Zool. Gart. 29. p. 257—265.

H. Panzner theilt Beobachtungen aus Oberschlesien (1887) mit; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 29—31, 52—54.

E. Pfannenschmid, über Wanderung des Steppenuhns durch Ostfriesland; Monatsschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 296—297.

J. Pietsch, über *Syrnhaptes paradoxus* in Deutschland; ebenda p. 178—183.

Derselbe, über Erscheinen von *Nucifraga macrorhyncha* im Herbst 1888 in Deutschland; ebenda p. 368—369, 384—385.

W. v. Reichenau führt 199 Arten aus der Umgegend von Mainz auf; Orn. 4. p. 647—666.

Derselbe, Die Verschiebungen der Frühlingsperioden und die Ankunft der Zugvögel am Mittelrhein; Humboldt 7. p. 459—463.

A. Reichenow, über Auftreten der Steppenhühner in Deutschland; Journ. Ornith. 36; p. 119—120, 307.

O. v. Riesenenthal, Die Orn. des Berliner Thiergartens; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 93—96. S. auch H. Bünger, ebenda p. 315—319 u. E. Schöff, ebenda p. 468.

C. Sachse, *Loxia curvirostra* im Westerwald; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 455.

E. Schöff berichtet über den Wanderzug des Steppenhuhnes im Jahre 1888; Zool. Gart. 29. p. 168—177. — Siehe auch O. v. Riesenenthal.

H. Schalow berichtet über *Limosa melanura* in der Mark Brandenburg; Journ. Ornith. 36. p. 102.

Derselbe berichtet über *Larus minutus*, *Buteo tachardus*, *Haematopus ostrilegus* und *Bernicla brenta* in der Mark Brandenburg; ebenda p. 111—112.

W. Seemann führt die Vogelarten der Umgegend von Osnabrück auf; Jahresh. naturw. Ver. Osnabrück 1885—88 p. 77—117.

J. F. Soldat, s. G. Clodius.

H. Stoot berichtet über Auftreten von *Loxia curvirostra* und *Nucifraga macrorhyncha* bei Salzgitter; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 370 u. 454.

C. Struck berichtet über Erscheinen von *Syrnhaptes paradoxus* in Mecklenburg; Arch. Ver. Fr. Naturg. Mecklenburg 42. p. 175—184.

R. Tancre, über Auftreten von *Syrnhaptes paradoxus* bei Anklam; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 108—109.

A. Walter, Sprosser und Nachtigal bei Reiersdorf (Pommern) brütend; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 359.

P. Wessner giebt einige Notizen über die Vogelwelt der Umgegend von Jena; ebenda p. 45—49.

E. Ziemer, *Syrnhaptes paradoxus* in Pommern; ebenda p. 231—236.

Derselbe, über *Totanus ochropus*, *Carpodacus erythrinus* und *Nucifraga macrorhyncha* in Pommern; ebenda p. 20—22.

Oesterreich-Ungarn: F. S. Bauer, über *Falco lanarius* in Mittel-Steiermark; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 62.

S. Brusina, Die croatisch-serbischen Vögel mit Berücksichtigung des gesammten slavischen Südens. Vorbereitung für eine croatisch-serbische Ornithologie. Belgrad 1888. [In kroatischer Sprache.] Enthält einleitende Bemerkungen und eine Uebersicht der einschlägigen Litteratur.

Derselbe berichtet über *Syrnhaptes paradoxus*, *Fratricula arctica* und *Alca torda* in Kroatien; Soc. Hist. Nat. Croat. 3. Agram 1888.

V. Capek, Normal-Tage der Ankunft der Zugvögel in Oslawan in Mähren; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 111.

St. Chernel von Chernelhaza berichtet über seltene Durchzügler und Wintergäste in Ungarn; ebenda p. 8—9.

Derselbe berichtet über Erscheinen von *Syrnhaptes paradoxus* in Ungarn 1888; ebenda p. 157—158.

K. v. Dalla-Torre, s. V. v. Tschusi.

R. Eder liefert einen Nachtrag zu seiner Uebersicht der bei Friedland in Böhmen vorkommenden Arten; ebenda p. 68—69, 81—82, 115—116. Vergl. Ber. 1887 S. 100.

B. Hanf berichtet über das Vogelleben auf dem Furtteiche 1887; Mitth. Naturw. Ver. Steiermark 1887 p. 101—116.

A. Hauptvogel theilt Beobachtungen von Aussig in Böhmen mit; Mitth. Orn. Ver. Wien 11. p. 110.

E. Hodek Sen., Aus Niederösterreich zwischen der Ybbs und Donau; ebenda p. 82—84, 96—100.

E. Hodek jun. erhielt *Cygnus minor* am 29. October 88 von Wittingau; ebenda p. 177.

H. v. Kadich giebt einige Berichtigungen zu seinen Mittheilungen über die Vögel der Herzegowina [vergl. Ber. 1887 S. 101]; ebenda p. 18—19.

R. O. Karlsberger beobachtete *Colymbus septentrionalis* im November auf der Donau bei Linz; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 5—6.

Derselbe liefert Notizen aus Oberösterreich; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 74—76, 116—118.

Derselbe, *Syrnhaptes paradoxus* in Ober-Oesterreich; ebenda p. 250.

Derselbe, Vulgärnamen der Vögel Oberösterreichs; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 27—28, 54, 66—67.

G. Kolombatovic theilt Beobachtungen aus Dalmatien mit; ebenda p. 50.

L. v. Lorenz berichtet über *Picus lilfordi* in Bosnien; Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 38. p. 19.

A. v. Mojsisovics, Zoogeographische Notizen über Süd-Ungarn aus den Jahren 1886—88. Zugleich ein dritter Nachtrag zur Fauna von Bellye und Darda; Mitth. Nat. Ver. Steiermark. Graz 1888. — Das Verzeichniss der für die Umgebung des Drau-Eckes nachgewiesenen Vögel zählt 243 Arten auf.

H. Panzner, *Nucifraga caryocatactes* im böhmischen Mittelgebirge; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 140. S. auch W. Peiter, ebenda p. 120—121.

O. Reiser liefert eine Liste der für Bosnien und die Herzegowina nachgewiesenen Arten; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 35.

Derselbe theilt Beobachtungen über einige Vögel Bosniens mit, besonders über Verbreitung und Lebensweise. Hervorzuheben sind: *Picus leuconotus lilfordi*, *Picus tridactylus alpinus*, *Parus borealis alpestris*, *Parus lugubris*, *Schoenicola intermedia*; Journ. Ornith. 36. p. 38—58.

Derselbe, über *Anthus cervinus* bei Sarajevo; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 116—117.

B. Schiavuzzi, Materiali per un' avifauna del Litorale austro-ungarico; Boll. Soc. Adriatica Sc. Nat. (Trieste) 10. 1887. p. 154—183.

W. Schier, Die Verbreitung der mövenartigen Vögel in Böhmen; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 9—10.

Derselbe, Verbreitung der Dickschnäbler (Finkenvögel) in Böhmen; ebenda p. 124—125.

R. Schlegel, Ornithologische Mittheilungen aus dem Ober-Erzgebirge; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 323 326.

J. Talsky, Reiseerinnerungen aus Steiermark und Kärnten; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 77—78, 100—106.

Derselbe, über *Syrnhaptes paradoxus* und *Nucifraga* in Mähren 1888; ebenda p. 170—171.

V. v. Tschusi-Schmidhoffen berichtet über seltene Arten in Salzburg 1887; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 10—11.

Derselbe berichtet über das Auftreten seltener Vogelarten in Oesterreich-Ungarn; ebenda p. 63—64, 78—81.

Derselbe referirt über die ornithologische Litteratur Oesterreich-Ungarns im Jahre 1887; ebenda p. 111—115.

Derselbe, über den Herbstzug des Tannenhehers 1888; ebenda p. 142.

Derselbe, über zahlreiches Erscheinen von *Loxia curvirostra* in Salzburg; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 368.

V. v. Tschusi-Schmidhoffen und K. v. Dalla-Torre, 4. Jahr.-Bericht (1885) des Comités für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn; Orn. 4. p. 1–272, 321 u. f.

Dieselben, 5. Bericht 1886; ebenda Supplementheft. 346 p.

St. F. v. Washington berichtet über Vorkommen von *Pelecanus sharpei* in Oesterreich-Ungarn; Ann. naturh. Hofmus. Wien 3. p. 63–72 u. sep. Hölder, Wien 1888.

J. Zelisko, Verzeichnis der bisher in österr. Schlesien beobachteten Vögel. Ein Beitrag zur Kenntnis der heimatischen Vogelfauna. Teschen, Feitzinger 1888. 8°. 13 p.

Schweiz: A. Girtanner behandelt in einer eingehenden Monographie die verschiedenen Entwicklungsstadien, Lebensweise und Verbreitung des Bartgeiers. In der Schweiz scheint der Vogel nunmehr, (1887) ausgestorben zu sein; Der Weidmann 19. No. 33, 35 u. 36.

V. v. Tschusi, *Phyllopneuste bonellii* in der Schweiz; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 306.

Russland: V. Bianchi liefert Notizen über Vorkommen, Brutzeit, Lebensweise der von ihm im Sommer 1884 bei Uschaki, Gouv. Nowgorod beobachteten Vögel; Beitr. Kenntn. Russ. Reiches (3.) 4. p. 189–275.

C. Grevé theilt einige Beobachtungen über die Vogelwelt der Umgegend Moskaus mit; Zool. Gart. 29. p. 343–344.

E. v. Middendorff, 2. Ornithologischer Jahresbericht (1886) aus den Russischen Ostsee-Provinzen; Orn. 4. p. 273–367.

G. Sundmann, Finska Fogelägg. Helsingfors. — Heft 8 u. 9 erschienen.

L. Taczanowski liefert eine Uebersicht der während eines Zeitraumes von 50 Jahren in Polen beobachteten Vogelarten (303); ebenda p. 441–516.

A. v. Wulf, Angabe, wann in Schloss Leunewaden (Livland) die Zugvögel im Frühjahr 1887 zuerst gesehen wurden; Correspond. Natur. Ver. Riga 30. p. 56–57.

N. Zarudnoi liefert Notizen über die Vogelfauna des Orenburger Districts. *Hypolais icterina mollesoni* n. subsp.; Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 1888 p. 658–681. [In russischer Sprache.]

Dänemark: J. Collin, Bidrag till Kundskaen om Danmarks Fuglefauna. Kjobenhavn. 1888. 8° 120 p.

O. Winge liefert den 4. Jahresbericht der Ornithologischen Beobachtungsstationen in Dänemark (1886); Orn. 4. p. 369–444 Mit einer Uebersichtskarte der Beobachtungsstationen.

Scandinavien: G. O. Börjesson, Sällskapet Småfoglarnas Vänner. Göteborg 1888.

L. Stejneger beschreibt *Parus colleti* n. sp. von West-Norwegen; Proc. U. St. N. M. 11. p. 71–76.

Derselbe weist darauf hin, dass die skandinavische Haubenmeise (*P. cristatus* L.) von der mitteleuropäischen (*P. mitratus* Brehm) sich subspezifisch unterscheidet; ebenda p. 113—114.

C. R. Sundström, Mittheilungen des Ornithologischen Komitees der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften. 1.; Bih. Sv. Akad. Handl. 13. No. 3. [Liste der schwedischen Vögel mit deutschen und wissenschaftlichen Namen].

England: O. V. Aplin, Notizen von Norfolk; Zoologist (3.) 12. p. 131—135.

J. Backhouse giebt einige Beiträge zur Vogelfauna von Upper Teesdale; Naturalist 1888 p. 79—80.

W. E. Beckwith, Notes on Shropshire Birds; Trans. Shropshire Soc. 11. p. 223—238, 387—402.

C. Brazenor berichtet über Nisten von *Linota cannabina* im October in Brighton (England); Zoologist (3.) 12. p. 105.

T. E. Buckley s. Harvie-Brown.

H. G. Bull, Notes on the Birds of Herefordshire: contributed by Members of the Woolhope Club. 8° 274 p. London: Hamilton, Adams & Co Hereford: Jakeman & Carver.

J. W. P. Campbell-Orde berichtet über *Syrnhaptes paradoxus* auf den äusseren Hebriden; Ibis (5.) 6. p. 492—493.

J. Cordeaux liefert Notizen zur Vogelfauna von North Lincolnshire; Zoologist (3.) 12. p. 59—63, 242—247.

C. Dixon, Our Rarer Birds: being Studies in Ornithology and Oology. London 1888. 8° 373 p.

H. M. Drummond-Hay berichtet über eine am 28. Dec. 1887 in Schottland erlegte *Saxicola deserti*; Proc. Z. S. London p. 140 u. Ibis (5.) 6. p. 283—285.

Derselbe, Additional Notes on the Report of the Ornithology of the East of Scotland, from Fife to Aberdeen inclusive (1885); Scot. Nat. 1888 p. 345—350.

Derselbe, Notes on some Rare Perthshire Birds lately placed in the Museum; Trans. Perthsh. Soc. 1. p. 1—15.

E. Ellison berichtet über den Herbstzug der Vögel in Irland; Zoologist (3.) 12. p. 16—19.

H. W. Feilden berichtet über Erlegen von *Sterna caspia* auf den Faeroer-Inseln; ebenda p. 108.

T. E. Gunn, Ornithologische Notizen aus Norfolk und Suffolk; ebenda p. 281—289.

J. H. Gurney jun. theilt Beobachtungen aus Norfolk mit; ebenda p. 81—86.

Derselbe giebt Notizen von St. Leonards; ebenda p. 332—333.

J. A. Harvie-Brown, and T. E. Buckley, A Vertebrate Fauna of the outer Hebrides. Edinburgh 1888. 8°. 279 p. 6 pl., 6 maps, 4 cuts.

J. A. Harvie-Brown, J. Cordeaux, R. M. Barrington, A. G. More u. W. Eagle Clarke, Ninth Report on the Migration of Birds in the Spring and Autumn. Edinburgh 1888.

L. H. Irby, British Birds: Key List. London, Porter 1888. Eine Aufzählung der britischen Vögel mit kurzen Characteren 58 p.

Lilford, Coloured Figures of the Birds of the British Islands. London. Th. 6 bis 9 erschienen.

Derselbe liefert Notizen von Northhamptonshire; Zoologist (3.) 12. p. 456—466 u. Journ. Northh. Sc. 5. p. 41—53.

J. E. Littleboy liefert Notizen von Hertfordshire, gesammelt 1887; Trans. Hertf. Soc. 1888 p. 76—88.

H. A. Macpherson, Report on Pallas' Sand Grouse in the North-West of England; Trans. Cumberl. and Westmorel. Assoc. Adv. Lit. and Sc. No. 13 1888 p. 59—75.

Derselbe berichtet über ein am 11. Nov. 1887 in Cumberland erlegtes Stück der *Saxicola isabellina*; Ibis (5) 6. p. 149—150.

Derselbe liefert Notizen zur Avifauna von Cumberland; Zoologist (3.) 12. p. 328—331.

A. H. und H. A. Macpherson besprechen die Vogelwelt der Insel Eigg; ebenda p. 412—419.

J. C. Mansel-Pleydell, The Birds of Dorsetshire, a Contribution to the Natural History of the County. London and Dorchester 1888. 8°.

M. A. Mathew, Zusätze zu C. Smith's Liste der Vögel von Somersetshire; Zoologist (3.) 12. p. 219—221.

F. S. Mitchell berichtet über *Vanellus gregarius* in Lancashire; ebenda p. 389.

T. H. Nelson liefert Notizen von Redcar; ebenda p. 135—138.

A. Newton berichtet über ein Exemplar von *Procellaria bulweri*, welches in Yorkshire am 8. Mai 1837 bei Tanfield tot gefunden wurde; ebenda p. 230—231.

F. H. Parrott berichtet über Nisten von Staren im November in Aylesbury (England); ebenda p. 33.

H. Peek, A Collection of British Birds at Rousdon. London 1888. 4°. 27 p. 6 T.

E. C. Phillips schildert einen Besuch des Vogelberges (Kormoran-Kolonie) bei Towyn, North Wales (England); Zoologist (3.) 12. p. 380—382.

H. Raeburn, The Summer Birds of Shetland, with Notes on their distribution, Nesting and Numbers; Proc. Phys. Soc. Edinb. 1887—88 p. 542—562.

H. Saunders, An Illustrated Manual of British Birds. London. 8°. — Th. 1—9 erschienen.

Derselbe berichtet über eine im December 1879 in England erlegte *Querquedula carolinensis*; Proc. Z. S. London p. 469.

H. Seebohm berichtet über ein vor 25 Jahren in England erlegtes Stück des *Vanellus gregarius*; ebenda p. 416.

C. Smith liefert Nachträge zu seiner Liste der Vögel von Somersetshire; Zoologist (3.) 12. p. 174—176.

J. Swinburne, An Ornithological Visit to the Ascrib Islands, Loch Snizort, Skye; Proc. Phys. Soc. Edinb. 1887—88 p. 402—407.

R. Warren theilt Notizen aus Mayo und Sligo mit; Zoologist (3.) 12. p. 289—292.

Notizen über lokales Vorkommen verschiedener Vogelarten in England finden sich in: Zoologist (3.) 12. p. 27, 31—33, 66—68, 105—108, 143—148, 185—189, 225—235, 267—270, 302—310, 348—352, 390—394, 425—432.

Ueber das Erscheinen von *Syrrhaptes paradoxus* in England siehe: Zoologist (3.) 12. p. 233—235, 261—267, 298—301, 347—348, 388 (Nisten), 419—423, 425, 442—456, 468—469.

Niederlande: H. Albarda, Ornithologie van Nederland. Waarnemingen in 1886; Tijdschr. Nederl. Dierk. Ver. (2.) 2. p. 10—17.

H. Koller, Naamlijst van in Nederland in den vrijen natuurstaat waargenomen Vogels; Bijdr. t. d. Dierkunde. Feest-numm. Amsterdam 1888.

H. v. Rosenberg, Das Sandhuhn in Holland; Mitth. Orn. Ver. Wien 1888 p. 150.

Belgien: A. Dubois, Compte rendu des observations ornithologiques faites en Belgique pendant l'année 1886; Bull. Mus. Roy. d'hist. nat. Belgique 5. p. 99—158.

Frankreich: L. Bureau, über Wanderung der Steppenländer durch das westliche Frankreich; Mém. Soc. Zool. France I. 1888 p. 245—252.

L. Ducloy, *Syrrhaptes paradoxus* in Frankreich; Bull. Soc. Acclim. France 1888 p. 665.

Ch. van Kempen berichtet über Erscheinen des *Syrrhaptes paradoxus* im Norden Frankreichs; Bull. Soc. Zool. France 13. p. 145—146.

L. Magaud d'Aubusson, über *Bombus garrula* im Dep. de la Somme; Bull. Soc. Acclim. France (4.) 5. p. 945—949.

Derselbe bespricht die in Frankreich vorkommenden Seeschwalben; Naturaliste 10. p. 224—226.

L. Olphe-Galliard, Contributions à la Faune Ornithologique de l'Europe Occidentale. Bordeaux. Berlin. — Erschienen Th. 23 *Tenuirostres*, 24 *Scansores*, 25 *Syndactyli*, 3 u. 4 *Fuligulinae*, *Anatinae*.

J. Vian, über *Syrrhaptes paradoxus* in Frankreich; Bull. Soc. Zool. France 13. p. 154—156.

Italien: A. de Carlini liefert Notizen über die Vögel des Ober Engadin von Trent bis Brescia; Atti Soc. Italiana Sc. nat. Milano 31. p. 35—80.

P. Döderlein, über eine *Sula bassana* bei Palermo; Natur. Sicil. Ann. 2 No. 6 p. 138—140.

Derselbe, über *Turdus torquatus* in Sicilien; ebenda No. 10. p. 217—220.

Siehe auch A. Carruccio oben S. 102.

M. Faustino berichtet über *Uria troila* in Italien; Spallanzani, Rivista Sc. med. e natur. Fasc. 7—8, anno 15 Ser. 2 1886.

E. H. Giglioli u. A. Manzella, Iconografia dell' Avifauna Italica, ovvero tavole illustrati le specie di uccelli che trovansi in Italia con brevi descrizioni e note. Toscana 1888. Th. 38—43.

C. Lepori erwähnt *Pernis apivorus* für Sardinien; Atti Soc. Med. Mem. (3.) 7. p. 73—80.

A. Manzella s. E. H. Giglioli.

F. Minà-Palumbo, über *Turdus torquatus* in Sicilien; Naturl. Sicil. Ann. 2. No. 8 p. 175—177.

A. P. Ninni, Sul passaggio straordinario della *Querquedula circia* avvenuto in Marzo 1886 nell' Estuario Veneto; Soc. Ital. Sc. Nat. Vol. 30 Fasc. 1. 12. p. 97—98.

L. Picaglia, Elenco degli Uccelli del Modenese; Atti Soc. Nat. Mod. (3.) 7. p. 145—211.

Derselbe berichtet über *Syrnhaptes paradoxus* in Italien; ebenda p. 119—121.

T. Salvadori über das Auftreten von *Syrnhaptes paradoxus* in Italien 1888; Boll. Mus. Zool. Anat. Torino Vol. 3 No. 47 u. 52.

Derselbe berichtet über eine am 15. Nov. 1887 in Italien erlegte *Aegialitis asiatica* (Pall.); Atti R. Acc. Sc. Torino 23. p. 44.

A. Senoner, *Somateria spectabilis* am 2. August bei Venedig erlegt, Zool. Gart. 29. p. 345.

G. Whitaker, Sulla migrazione degli Uccelli specialmente in Sicilia; Natural. Sicil. Ann. 1. No. 6. 121—127.

Pyrenäische Halbinsel: J. Arévalo y Baca, Aves de Espana; Memorias de la real acad. cienc. exact., físic. y nat. Madrid Tom. 11. 1887. — Zählt 315 Arten für Spanien auf.

A. Chapman theilt die während eines Winters in Spanien gesammelten Beobachtungen mit; Ibis (5) 6. p. 444—461.

Lilford berichtet über *Aquila rapax* in Süd-Spanien; Proc. Z. S. London p. 248.

Siehe auch H. R. Rabbets unter Westl. gemäss. Region.

Kanaren u. Azoren: S. G. Reid liefert den Schluss seines Artikels über das Vogelleben Teneriffas; Ibis (5) 6. p. 73—83 [vergl. Ber. 1887 S. 108].

H. Simroth führt 92 Arten für die Azoren an, auf Grund der im Museum zu Ponta Delgada, S. Miguel, vorhandenen Stücke; Archiv. f. Naturg. 1888 p. 179—201.

Mittelmeer-Inseln: F. H. Guillemard theilt die Beobachtungen mit, welche er während eines Aufenthaltes auf Cyprien 1887 gesammelt; Ibis (5) 6. p. 94—124.

Nord-Afrika: L. Bureau berichtet über den Zug der Wandervögel durch Algier; Compt. Rend. Ass. Franc. Sc. 1888 p. 195.

A. Kaiser giebt Notizen über die Vogelwelt Aegyptens; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 273—276.

Derselbe giebt einige Notizen über die Vögel der aegyptischen Wüstengegenden; ebenda p. 411—418.

A. Koenig liefert eine Avifauna von Tunis. 200 Arten sind in Bezug auf Verbreitung und Lebensweise besprochen; bei einzelnen Beschreibung und Masse. Neu beschrieben: *Alaemon margaritae*. Die in dem Katalog von Loche für Algier aufgeführten Arten sind zum Vergleiche nebenher angegeben. Eine Charakteristik des Landes und seiner Vogelfauna im allgemeinen ist dem speciellen Theile vorausgeschickt; Journ. Ornith. 36. p. 121—298.

Sibirien: F. Dörries bespricht 133 Arten von Ostsibirien, besonders Beobachtungen über Lebensweise (Mitth. von Th. Noack); Journ. Ornith. 36. p. 58—97.

Südwest-Asien: H. E. Dresser bespricht *Lanius raddei* n. sp. von Transcaspien; Proc. Z. S. London p. 291.

Th. Lorenz beschreibt *Phasianus persicus talischensis* u. *colchicus septentrionalis* aus dem Gebiet des Kaspischen Meeres; Journ. Ornith. 36. p. 571—572.

M. A. Menzbier, Ornithologie du Turkestan et des pays adjacents. Lief. 1. Moscou 1888. — Enthält die *Vulturidae*, *Gypaëtidae* u. *Falconidae*. Abgebildet: *Astur cenchroides*, *Hierofalco hendersoni*, *Falco babylonicus*, *Cyanistes flavipectus*.

Th. Pleske führt nach den Sammlungen V. Russow's 419 Arten für Turkestan auf, mit kritischen Bemerkungen über einzelne Arten; Mém. Acad. Sc. St. Pétersbourg. 7. Ser. Tome 36. No. 3 1888.

Mandschurisches Gebiet: H. Seebohm berichtet über eine neue Sammlung von den Lutschu-Inseln (vergl. Bericht 1887 S. 109); Ibis (5) 6. p. 232—236.

L. Stejneger giebt an, dass der in Japan heimische Nussheher der *N. caryocatactes macrohyncha* sei und hält letztere für die östliche Form; Proc. U. St. Nat. Mus. 11. p. 425—432. [Vergl. auch H. Seebohm unter *Nucifraga* im system. Theil.]

Derselbe bespricht *Troglodytes fumigatus* Tem. von Japan und *T. fumigatus kurilensis* n. subsp. von den Kurilen; Proc. U. St. N. Mus. 11. p. 547—548.

L. Taczanowski beschreibt *Emberiza jankowskii* n. sp. von Sidemi, Grenze von Corea und der Chines. Mantschurei; Ibis (5) 6. p. 317—319.

Derselbe liefert einen Nachtrag zu seinem Bericht über die Sammlungen J. Kalinowski's von Korea [vergl. Bericht 1887 S. 109]. Neu beschrieben: *Haliaetus branickii*; Proc. Z. S. London p. 450—469.

Mongolisches Gebiet: Th. Pleske beschreibt *Phasianus tarimensis* Przw. n. sp. von Central-Asien; Proc. Z. S. London p. 415. [vergl. Journ. Ornith. 1886 S. 528].

Aethiopische Region.

G. E. Shelley liefert eine Uebersicht der afrikanischen Bucerotiden. Vergl. unter Systematik, Bucerotidae.

Nordost-Afrika: E. H. Giglioli beschreibt Vogelsammlungen von Assab und Schoa, NO.-Afrika, neu: *Poliospiza isabellina* u. *Bradyornis traversi* [vergl. daselbst]; Ann. Mus. Civ. Genova (2.) 6. (26.) p. 27—65.

T. Salvadori beschreibt eine von V. Ragazzi in Schoa zusammen gebrachte Sammlung, 276 Arten, darunter neu: *Cypselus shelleyi* u. *myoptilus*, *Eleocerthia ragazzi*, *Chalcomitra scioana*, *Cisticola cinereola*, *Fringillaria poliopleura*, *Serinus flavigula* u. *reichenowi*, *Estrela nigrimentum*, *Urobrachia traversi*; Ann. Mus. Civ. Genova (2.) 6. p. 185—326.

Derselbeführt 11 weitere Arten für Schoa auf, darunter *Francolinus spilogaster* und *castaneicollis* nn. spsp.; ebenda 26. p. 525—544.

G. E. Shelley berichtet über eine Vogelsammlung Emin Paschas von Aequatorial-Afrika, 179 Arten, darunter neu: *Spermospiza ruficapilla*, *Ploceus castanops*, *Indicator emini*; Proc. Z. S. London p. 17—50.

Ost-Afrika: G. E. Shelley berichtet über eine Vogelsammlung F. J. Jackson's aus der Kilimandjaro-Gegend und von Lamu, 31 und 99 Arten, darunter *Ploceus jacksoni* n. sp.; Ibis (5) 6. p. 287—307. [s. auch vorher unter Nordost-Afrika].

H. B. Tristram giebt einige Notizen über Vögel von Newala nördlich des Rovuma-Flusses (Ost-Afrika); ebenda p. 265—266.

Süd-Afrika E. W. Clifton führt die von ihm in Keiskama Hoek, bei King William's Town, Kapland, beobachteten Arten (73) auf; Ornith. 4. p. 147—154.

West-Afrika: J. Büttikofer liefert eine Uebersicht der von ihm und F. X. Stampfli 1886—1887 in Liberia gesammelten 151 Arten. Die Gesamtzahl der bis jetzt von Liberia bekannten Arten beträgt 231; Notes Leyden Mus. 10. p. 59—106, T. 5 (Karte).

Derselbe bespricht eine von J. v. d. Kellen am Kongo und in Südwest-Afrika (oberer Kunene, Kubango-, und Umbellafuss) zusammen gebrachte Sammlung. Als neu wird beschrieben: *Neocichla kelleni* und *Plocepasser rufoscapulatus*; ebenda p. 209.

R. B. Sharpe beschreibt *Accipiter büttikoferi* n. sp. von Liberia; ebenda p. 199—200.

J. A. de Sousa bespricht 49 von Anchieta in Angola gesammelte Arten; Journ. Sc. Math. Phys. Nat. Lisboa No. 48, 1888 p. 216—228.

Derselbe beschreibt *Monticola angolensis* von Angola; ebenda p. 233—235.

Westafrikanische Inseln: B. du Bocage beschreibt *Phaeospiza thomensis* n. g. et sp. von St. Thomé und zählt 10 weitere Arten von der Insel auf; Journ. Sc. Math. Phys. Nat. Lisboa No. 47 1888 p. 148—150.

Derselbe bespricht 12 Arten von St. Thomé; ebenda No. 48 p. 211—215.

Derselbe beschreibt *Scops scapulatus*, *Amblyospiza concolor* und *Columba arquatrix* var. *thomensis* von St. Thomé; ebenda No. 48 1888 p. 231—232.

J. A. de Sousa führt 24 auf der Insel St. Thomé vorkommende Arten auf, welche im Lissaboner Museum sich befinden, und erwähnt fernere auf der Insel seither beobachtete Species. Neu ist beschrieben: *Estrela thomensis*; ebenda No. 47 1888 p. 151—159.

Madagassische Region.

A. Milne Edwards et E. Oustalet, Études sur les mammifères et les oiseaux des îles Comores; Nouv. Arch. Mus. (2.) 10. 1887—88 p. 226—297. — 79 Arten sind aufgezählt. Ein Schlusswort behandelt die Verteilung der Arten auf die einzelnen Inseln, welche auch tabellarisch dargestellt ist. Nur *Merops madagascariensis* bewohnt sämtliche Inseln des Archipels. Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass die von den Verfassern als *Cinnyris notata* aufgeführte Nectarinie vom Referenten als *C. möbi* artlich gesondert ist. S. vorj. Bericht S. 137. — Abgebildet sind: *Cinnyris humbloti* T. 4, *Zosterops kirki* u. *mouroniensis* T. 5, *Hypsipetes parvirostris* u. *Turdus comorensis* T. 6, *Graucalus sulphureus* u. *cucullatus* T. 7, *Terpsiphone comorensis* u. *Humblotia flavivirostris* T. 8, *Ploceus* (*Foudia*) *consobrina* T. 9.

E. Newton giebt eine Liste der Vögel der Maskarenen und Seychellen; Trans. Norfolk Norwich Nat. Soc. 4. p. 548—554.

Malayische Region.

Vorder-Indien: E. F. Becher liefert Notizen über die Vogelfauna Indiens; Journ. Bomb. N. H. Soc. 3. p. 114—117, 134—137.

S. Bligh berichtet über *Hirundo rustica* und *Motacilla melanope* auf Ceylon; Ibis (5) 6. p. 316—317.

W. Cordeaux liefert Notizen über die Vögel von Caschmir und dem Dras-District; ebenda p. 218—226.

W. Davison berichtet über einige Arten in Travancore: ebenda p. 146—147.

J. A. Murray, The Avifauna of British India and its dependencies. Systematic account with descriptions of all the known species of Birds inhabiting British India, their habits, nidification etc. (in 2 vols.) Vol. 1 (3 pt.), II. P. 1, Bombay 1887, 1888. Roy. 8°.

Hinter-Indien: A. O. Hume, *The Birds of Manipur, Assam, Sylhet and Cachar*; *Stray Feath.* 11. p. 1—353.

E. W. Oates führt 34 Arten von Bhamo, Ober-Birma, auf, darunter *Acridotheres albocinctus*, welcher abgebildet wird; *Ibis* (5) 6. p. 70—73 T. 1.

Sunda-Inseln: W. Blasius bespricht die Vogelfauna von Palawan nach den Ergebnissen der von Herrn und Frau Dr. Platen bei Puerto-Princesa im Sommer 1887 ausgeführten Forschungen. 138 Arten sind für die Insel nachgewiesen. Neu *Carpophaga aenea* var. *palawanensis* u. *Turnix haynaldi*; *Ornis* 4, p. 301—320, s. auch *Ibis* (5) 6. p. 372—375 und ferner unter Philippinen.

A. Everett liefert einige Notizen über den faunistischen Charakter der Mantanani-Inseln, welcher sich an diejenigen von Palawan anschliesst; *Ibis* (5) 6. p. 282—283.

W. R. Ogilvie Grant beschreibt *Carpophaga everetti* n. sp. und *Treron nasica* Schl. von Nordwest-Borneo; *Ann. Mag. N. H.* (6.) 2. p. 351—352.

Platen, s. W. Blasius.

R. B. Sharpe beschreibt eine Sammlung. L. Wray's von Perak (Malacca), darunter neu: *Pericrocotus croceus* u. *wrayi*, *Muscicapula westermanni*, *Cryptolopha davisoni*, *Gampsorhynchus saturator*, *Melanocichla peninsularis*, *Siva sordidior*, *Cutia cerviniscrissa* u. *Chrysophlegma wrayi*; *Proc. Z. S. London* p. 268—281.

Derselbe beschreibt neue Arten vom Kina-Balu, Nord-Borneo (Sammlung von J. Whitehead): *Cissa jefferyi*, *Rhinomyias gularis*, *Merula seebom*, *Cettia oreophila*, *Oreotistes leucops*, *Alcotops calvus*, *Brachypteryx erythrogyna*, *Androphilus accentor*, *Corythocichla crassa*, *Chlorocharis emiliae*, *Megalaema pulcherrima*, *Harpactes whiteheadi*; *Ibis* (5) 6. p. 383—396.

Derselbe beschreibt folgende, von J. Whitehead auf dem Kina-Balu gesammelte neue Arten: *Scops luciae*, *Geocichla aurata*, *Orthonocichla whiteheadi*, *Phyllergates cinereicollis*, *Garrulax schistochlamys*, *Turdinulus exsul*, *Zosterops clara*, *Dendrophila corallipes*; *Ibis* (5) 6. p. 478—479.

Derselbe bespricht eine von J. Whitehead auf Palawan zusammengebrachte Sammlung von 129 Arten, darunter neu: *Priorniturus cyaneiceps*, *Baza leucopias*, *Syrnium whiteheadi*, *Scops fuliginosa*, *Hyloterpe whiteheadi*, *Siphia erithacus*, *Jole striaticeps*, *Priornochilus johannae*, [vergl. W. Blasius, vorher]; *Ibis* (5) 6. p. 193—204.

J. B. Steere weist nach, dass Palawan in faunistischer Beziehung Borneo näher steht als den Philippinen; *Amer. Nat.* 22. p. 142—145. — Trotzdem nimmt Prof. Steere (*Nature* 1888, p. 37 bis 38) an, dass der Grundcharacter der Fauna derjenige der Philippinen sei. Verf. teilt die Philippinen-Provinz in 6 Unterprovinzen, deren westlichste die Inseln Balabac, Palawan und vielleicht Calamianes umfasst.

J. Whitehead, s. R. B. Sharpe.

L. Wray, s. R. B. Sharpe.

Vergl. ferner J. Lister unter Neu-Guinea.

Philippinen: W. Blasius beschreibt neue Arten von Gross-Sangir und Palawan: *Ninox macroptera*, *Chalcophaps indica* var. *sanghirensis*, *Zosterops nehrkorni*, *Criniger platenae*, *Prionochilus plateni*, *Prioniturus platenae*, *Syrnium wiepkeni*, *Siphia ramsayi*, *Siphia platenae*, *Hyloterpe plateni*, Braunsch. Anzeigen 1888 No. 9 11. Jan., No. 37, 12. Febr. und No. 52, 1. März.

Derselbe führt 71 Arten von Gross-Sangir auf; Synonymie und kritische Bemerkungen über die einzelnen Species sowie eine Uebersicht über die bisherige ornithologische Durchforschung der Sangir-Inseln nebst einem Anhang: Vögel von Siao. Neu: *Eudynamis mindanensis* var. *sanghirensis*; Ornith. 4. p. 527—646 T. 3 u. 4.

S. auch oben W. Blasius unter Sunda-Inseln.

J. H. Gurney erhielt *Polioaetus ichthyaetus* (Horsf.) von den Philippinen; Ibis (5) 6. p. 145.

S. ferner: Everett und Steere unter Sunda-Inseln.

Neu Guinea, Molucken: J. Cabanis beschreibt *Paradisaea guilielmi* n. sp. u. *P. augustae-victoriae* n. sp. von Kaiser Wilhelmsland (Neu Guinea); Journ. Ornith. 36. p. 119.

J. Lister schildert die Christmas-Insel im Indischen Ocean und deren Vogelleben. 7 Landvogelarten bewohnen die Insel, alle sind derselben eigenthümlich: *Merula erythropleura* Sharpe, *Zosterops natalis* n. sp., *Collocalia natalis* n. sp., *Carpophaga whartoni* Sharpe, *Chalcophaps natalis* n. sp., *Urospizias natalis* n. sp., *Ninox natalis* n. sp., der Character der Vogelfauna ist austro-malayisch; Proc. Z. S. London p. 512—531.

W. R. Ogilvie-Grant bespricht eine zweite von C. M. Woodford auf den Salomons-Inseln zusammengebrachte Sammlung, 66 Arten, darunter 11 neue: *Nasiterna aolae*, *Myzomela sharpei*, *Phlogoenas solomonensis*, *Ardeiralla woodfordi*, *Nycticorax mandibularis*, die übrigen von R. B. Sharpe (s. d.) beschrieben; Proc. Z. S. London p. 185—204.

R. B. Sharpe beschreibt *Astur holomelas*, *shebae* u. *woodfordi*, *Ninox granti*, *Graucalus holopolius*, *Edoliisoma erythropygium*, *Pomarea erythrosticta* von Guadalcanar (Salomon-Inseln); Proc. Z. S. London p. 182—185.

C. M. Woodford, s. Ogilvie-Grant und Sharpe.

Australien: K. Broadbent, Birds of the Central Part of Queensland; Proc. Soc. Queensl. 5. p. 14—31.

A. J. Champbell berichtet über eine Expedition nach King Island; Vict. Natur. 5 p. 129—164.

Derselbe giebt Bemerkungen zu E. P. Ramsay's Liste australischer Vögel; ebenda p. 78—85. — s. auch unter „Nisten u. Eier“.

Th. Carter giebt einige Notizen über das Vogelleben in West-Australien; *Zoologist* (3.) 12. p. 28—30, 191—194.

C. Frensh, Notes on the Zoology of Lake Albacutya District; *Victor. Nat.* 5. p. 35—42.

J. Gould, Birds of New Guinea. London. — Th. 24 u. 25 erschienen. Enthaltend: *Lophorina minor*, *Podargus ocellatus*, *Tanyptera microrhyncha*, *Charmosyna stellae*, *Lorius flavo-palliat*, *Microdynamis parva*, *Lycocorax obiensis*, *Ephthianura crocea*, *Donacicola hunsteini*, *Melidectes emilii*, *Geocichla schistacea*, *Gymnocrex plumbeiventris*, *Aeluroedus melanocephalus*; *Harpyopsis novae guineae*, *Baza gurneyi*, *Lorius tibialis*, *Nesocentor milo*, *Rectes aruensis*, *Janthoenas albigularis*, *Carpophaga subflavescens* u. *van-wyckii*, *Piezorhynchus axillaris* u. *medius*.

A. J. North führt die bei Cumberland, N. S.-Wales, vorkommenden Vogelarten auf; *Proc. L. S. NS. Wales* (2.) 3. p. 1773—1780.

E. P. Ramsay, Tabular List of all the Australian Birds at present known to the author, showing the distribution of the species over the continent of Australia and adjacent islands. Sydney 1888. — Zählt 761 Arten auf. Neu beschrieben: *Philemon occidentalis*, *Pachycephala occidentalis*, *Platycercus pennanti* var. *nigrescens*, *Ninox albaria*, *Oedicnemus longipes*. Am Schlusse eine Liste der Vögel von Lord Howe und Norfolk.

Derselbe beschreibt *Philemon occidentalis* von Nordwest-Australien; *Proc. Lin. Soc. N. S. Wales* (2.) 2. p. 676.

Polynesien: E. L. Layard liefert einige Notizen von Neu-Caledonien; *Ibis* (5) 6. p. 491—492.

E. P. Ramsay beschreibt *Piezorhynchus sericeus* n. sp. von den Neu-Hebriden; *Proc. L. S. N. S. Wales* (2.) 3. p. 1293—1294.

L. Stejneger liefert einen fernerer Beitrag zur Vogelfauna von Hawai [vergl. Ber. 1887 S. 115]. Neu: *Puffinus knudseni*; *Proc. U. St. N. M.* 11. p. 93—103.

S. B. Wilson beschreibt *Chloridops kona* n. sp. von Hawai; *Proc. Z. S. London* p. 218.

Neuseeländische Region.

W. L. Buller, A History of the Birds of New Zealand. Second Edition. London 1888. 2 Teile mit zahlreichen Tafeln. [Das fertige Werk trägt auf dem Titel die Jahreszahl 1888. Die Angabe im Bericht 1887 S. 115 ist dementsprechend zu berichtigen. Ref.]

Derselbe, A Classified List of Mr. S. W. Silver's Collection of New Zealand Birds, with short descriptive Notes. London 1888. 8° 96 p.

O. Finsch berichtet über einige Arten von den Snares-Inseln bei Neu-Seeland; *Ibis* (5) 6. 307—309.

T. W. Kirk giebt Notizen über einige Arten Neu-Seelands, Eingeborennamen, Neigung zur Abänderung, Vorkommen australischer

Arten (*Lobivanellus personatus* *L. lobatus* nach Buller, Ibis (5) 6. p. 283, *Hirundo nigricans*, *Platalea regia*, *Eurystomus pacificus*, *Charadrius ruficapillus*) auf Neuseeland; Ibis (5) 6, p. 42—46. — S. auch Trans. N. Zeal. Hist. 20, p. 29—31.

E. P. Ramsay, beschreibt *Gerygone thorpei* von Lord Howe's Insel; Proc. Lin. Soc. N. S. Wales (2.) 2 p. 677.

Westliche gemässigte Region.

A List of birds taken by steamer Albatross ou the Bahama Islands during March and April 1886; Un. St. Comm. of Fish and Fisheries Pt. 14, p. 673—677.

J. A. Allen beschreibt *Ammodramus maritimus peninsulæ* n. subsp. von Südwest-Florida u. *A. m. sennetti* n. subsp. von der Golfküste von Texas; Auk 5. p. 284—287.

Derselbe referirt über kleinere ornithologische Arbeiten, die nordamerikanische Ornith. betreffend; ebenda p. 312—317. — S. auch W. E. D. Scott.

W. Brewster beschreibt *Ardea virescens frazari* n. subsp. von Unter-Californien, *Ardea bahamensis* n. sp. von den Bahamas, *Haematopus frazari* n. sp. u. *Columba fasciata vioscae* n. subsp. von Unter-Californien, *Megascops aspersus* n. sp., *M. vinaceus* n. sp., *Otophanes mcleodii* n. g. et sp., *Icterus wagleri castaneopectus* n. subsp., *Aimophila mcleodii* n. sp., *Aimophila cahooni* n. sp. und *Troglodytes cahooni* n. sp. von Mexico, *Empidonax cineritius* n. sp. von Unter-Californien; Auk 5. p. 82—85.

Derselbe zählt die Brutvögel von Winchendon, Worcester County, Massachusetts, auf; ebenda p. 386—393.

S. auch J. C. Merrill, ferner W. Brewster unter Mittel-Amerika.

M. Chamberlain, A Systematic Table of Canadian Birds. St. John, N. B. 1888. Fol. 14 p.

F. M. Chapman giebt eine Liste derjenigen Arten, welche zur nordamerikanischen Fauna hinzugekommen oder deren Namen seit Erscheinen der „Check-List“ verändert worden sind; Auk 5. p. 393 bis 402.

Derselbe liefert eine Liste der Vögel von Gainesville, Florida; ebenda p. 267—277.

W. Cooke, Report on Bird Migration in the Mississippi Valley in the years 1884 and 1885. Edited and revised by C. H. Merriam; U. S. Dep. Agricult. Div. Econ. Ornith. Bulletin 2 Washington 1888.

Ch. B. Cory berichtet über Vorkommen von *Falco tinnunculus* in Massachusetts; Auk 5. p. 110.

E. Coues beschreibt *Chordeiles chapmani* Senn. n. sp. von Florida; ebenda p. 37.

A. Downs, Birds of Nova Scotia; Proc. N. Scot. Inst. 7. p. 142—178.

W. Dutcher bespricht die Vögel von Long Island, N. Y.; Auk 5. p. 169—183.

B. W. Evermann bespricht die Vögel von Carroll County, Indiana; ebenda p. 344—351.

W. Faxon und J. A. Allen zählen die bei Holderness, Bethlehem, und Franconia, N. H., vorkommenden Sommervögel auf; ebenda p. 149—155.

N. S. Goss beschreibt *Sula gossi* Ridgw. Ms. n. sp. und *Sula brewsteri* n. sp. von der Insel San Pedro Martir im Golf von Californien; ebenda p. 240—244.

Derselbe, Additions to the Catalogue of Kansas Birds; Trans. Kansas Acad. 10. p. 28—31, 77—80.

J. A. Jeffries beschreibt *Trochilus violajugulum* n. sp. von Californien; Auk 5. p. 168—169.

A. H. Jennings, List of Birds observed at New Providence, Bahama Island, March-June 1887, Johns Hopkins Univ. Circulars, Baltimore 17. p. 39.

D. S. Jordan, A Manual of the Vertebrate Animals of the Northern United States. Fifth Edition. Chicago 1888. — S. 212—313. Vögel.

A. Koch schildert einen Jagdausflug nach Minesota; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 93—96.

Derselbe schildert einen mehrmonatlichen Aufenthalt in West-Florida; ebenda p. 1—4, 25—26.

F. A. Lucas schildert die Vogelklippen am Golf von St. Lawrence; Auk 5. p. 129—135.

J. C. Merrill bespricht die Vögel von Fort Klamath, Oregon. Mit Bemerkungen von W. Brewster; ebenda p. 139—146, 251—262, 357—366.

G. S. Miller jr. beschreibt *Poocaetes gramineus affinis* n. subsp. von Oregon; ebenda p. 404—405.

H. Nehrling, Nordamerikas gefiederte Gartenbewohner; Mnt-schr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 159 166, 183—190.

H. R. Rabbets berichtet, dass in der Biscaya-Bay 47° 22' N. L., 18° 50' W., ein *Siurus noveboracensis* an Bord seines Schiffes flog; Ibis (5) 6. p. 494—495.

Ch. W. Richmond giebt eine Liste der Brutvögel vom Columbia; Auk 5. p. 18—25.

R. Ridgway beschreibt *Accipiter velox rufilatus* n. subsp. vom westlichen Nordamerika; Proc. U. St. N. M. 11. p. 92.

W. E. D. Scott setzt seine Bemerkungen über die Vogelfauna von Pinal County, nebst Notizen über einige Vögel von Pima und Gila Counties (Arizona) fort. Mit Noten von J. A. Allen; Auk 5. p. 29—36, 159—168, [vergl. Ber. 1887 S. 120].

Derselbe liefert Ergänzungen zur Vogelfauna der Golfküste von Florida und beschreibt *Cistothorus marianae* n. sp.; ebenda p. 183—188.

Derselbe theilt Beobachtungen von der Golfküste Floridas mit; ebenda p. 373—379.

G. B. Sennett beschreibt *Peucaea ruficeps scottii* n. subsp., *Psaltiriparus lloydi* n. sp., *Nyctidromus albicollis merrilli* n. subsp. u. *Parus carolinensis agilis* n. subsp. vom westlichen Nord-Amerika; Auk 5. p. 40—46.

Derselbe beschreibt *Rallus longirostris scottii* n. subsp. von der Westküste Floridas; ebenda p. 305—306.

H. M. Smith und W. Palmer geben einige Notizen zur Avifauna von Washington und Umgegend; ebenda p. 147—148.

R. S. Williams schildert das Vogelleben am oberen Missouri; ebenda p. 14—18.

Notizen über Verbreitung verschiedener Arten in den Vereinigten Staaten; Auk 5. p. 107—119., 201—212, 318—328, 424—432.

Südamerikanische Region.

H. v. Berlepsch beschreibt neue Arten und Unterarten der Südamerikanischen Region; Auk 5. p. 449—460.

Derselbe bespricht einige südamerikanische Arten des United States National-Museums; Proc. U. St. Nat. Mus. 11. p. 559—566.

Mittel-Amerika: W. Brewster beschreibt *Glaucidium gnoma hoskinsii* n. subsp. von Unter-Californien, *Mitrephanes phaeocercus tenuirostris* n. subsp. und *Dendroica aestiva sonorana* n. subsp. von West-Mexico; Auk 5. p. 136—139.

A. W. Butler beschreibt *Ammodramus sandwichensis brunnescens* n. subsp. von Mexico; ebenda p. 264—266.

G. F. Gaumer, s. O. Salvin.

R. Ridgway beschreibt *Tityra personata griseiceps* n. subsp. von West-Mexico; ebenda p. 263.

Derselbe bespricht einige Costa Rica-Vögel und beschreibt folgende neue Arten: *Zeledonia* n. g. *coronata*, *Microcerculus orpheus*, *Geothlypis caninucha icterotis*, *Xiphocolaptes emigrans costaricensis*, *Picolaptes gracilis*, *Sclerurus canigularis*, *Picumnus flavotinctus*, *Dendroornis punctigula*, *Dendrocolaptes variegatus*; Proc. U. St. N. Mus. 11. p. 537—546.

F. D. Godman u. O. Salvin, *Biologia Centrali-Americana*. Erschien: Bd. 2 p. 1—40., T. 36. — Behandelt: *Oxyrhamphidae* u. *Tyrannidae* (*Myiopagis* n. g.), abgebildet: *Tyrannulus semiflavus*, *Leptotriccus superciliaris* u. *Elainea arenarum*.

A. L. Herrera, *Apuntes de Ornitologia. La Migracion en el Valle de Mexico*; Naturaleza (Mexico) (2.) 1. p. 165—189.

O. Salvin bespricht eine Sammlung G. F. Gaumer's von den Inseln an der Küste Yucatans und in der Bai von Honduras, darunter *Phoenicothera insularis* n. sp.; Ibis (5) 6. p. 241–265.

J. C. Zeledon liefert ein Verzeichniss der Vögel von Costa Rica (708 Arten, mit Aufzählung der im National-Museum von San José befindlichen Exemplare; Anales del Museo Nacional Tomo I Parte II, 1887, p. 103–133.

Derselbe beschreibt *Aramides plumbeicollis* n. sp. von Costa Rica; Anales Mus. Nacion. 1888 p. 3–4.

Columbisches Gebiet: J. A. Allen beschreibt *Tityra nigriceps* n. sp. von Ecuador; Auk 5. p. 287–288.

H. v. Berlepsch beschreibt *Buarremon simplex* n. sp. und *Myrmeciza boucardi* n. sp. von Bogota; Ibis (5) 6. p. 128–130.

D. G. Elliot beschreibt *Agyrtria alleni* n. sp. von Bolivien; Auk 5. p. 263–264.

R. A. Philippi führt 80 Arten auf, welche von F. Philippi und K. Rahmer in der Wüste Atakama beobachtet wurden; Ornith. 4. p. 155–160.

R. Ridgway beschreibt *Columbia guayaquilensis* n. sp. von Guayaquil, Ecuador; Proc. U. St. N. M. 11. p. 112.

Guiana, Nord-Brasilien: G. N. Lawrence beschreibt *Troglodytes tobagensis* n. sp. von Tobago; Auk 5. p. 404.

Süd-Brasilien, Argentinien: H. N. Ridley, A Visit to Fernando do Noronha; Zoologist 1888, p. 41–49.

R. B. Sharpe beschreibt *Elainea ridleyana* n. sp. von der Insel Fernando Noronha; Proc. Z. S. London p. 107.

P. L. Selater, Argentine Ornithology. A descriptive catalogue of the birds of the Argentine Republic. With notes on their habits by W. H. Hudson. London 1888. Vol. I. Der vorliegende erste Teil umfasst die Sing- und Schreivögel und behandelt 229 Arten. Mit 10 Tafeln.

F. Withington bespricht 92 Arten von Lomas de Zamora, Buenos Aires (mit Noten von P. L. Selater); Ibis (5) 6. p. 461 bis 473.

Patagonien: C. V. Burmeister, Relacion di un viaje à la gobernacion del Chubut, Ayudante del Museo Nacional. Apéndice. Algunas noticias sobre la Fauna de la Patagonia; Anales Mus. Nac. Buenos Ayres Entr. décimaquinta. 1888. — Zählt 190 Arten für Patagonien und die Falklands-Inseln auf.

Westindien: Ch. B. Cory setzt seine Uebersicht der Vögel Westindiens, einschliesslich Bahamainseln, grosse und kleine Antillen, doch unter Ausschluss von Tobago und Trinidad, fort; Auk 5. p. 48 bis 82, 155–159 [vergl. Ber. 1887, S. 180].

Derselbe beschreibt *Margarops montanus rufus* n. subsp. von Dominica und *Elainea barbadensis* n. sp. von Barbadoes, West-Indien; Auk 5. p. 47.

Derselbe beschreibt *Myiarchus berlepschii* n. sp. von St. Kitts, West-Indien; ebenda p. 266.

H. W. Feilden berichtet über einen *Vanellus cristatus*, welcher 1886 auf Barbados (Westindien) erlegt wurde; Zoologist (3.) 12. p. 301.

D. Sharp, Zoological Bibliography of the Lesser Antilles, Caribbee Islands, or Windward and Leeward Islands, West Indies (Tobago eingeschlossen); Rep. Brit. Assoc. 1888, p. 438—464.

Thiselton Dyer, Newton, Flower, Carruthers und Slater, Report of the Committee appointed for the purpose of reporting on the present state of our knowledge of the Zoology and Botany of the West India Islands and taking steps to investigate ascertained deficiencies in the Fauna and Flora; Rep. Brit. Assoc. 1888 p. 437—464.

Arktische Region.

H. Seebohm giebt eine Liste der von Dr. Bunge auf der Liakoff-Insel [vergl. Bericht 1887 S. 124] beobachteten Arten; Ibis (5) 6. p. 344—351.

Antarktische Region.

J. Cabanis beschreibt *Querquedula antarctica* n. sp. von Süd-Georgien; Journ. Ornith. 36. p. 118.

VII. Lebensweise.

Lebensweise im Allgemeinen. C. K. Averill, Biologisches über *Sitta canadensis*; Auk 5. p. 118.

R. M. Barrington und H. A. Macpherson schildern die Lebensweise des *Puffinus anglorum*; Zoologist (3.) 12. p. 367—368 und 372—375.

H. v. Basedow, Psychologische Bilder aus der Vogelwelt; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 4—5.

Ch. E. Bendire beschreibt Lebensweise, Nistweise und Eier der *Sphyrapicus*-Arten; Auk 5. p. 225—240.

Derselbe schildert die Lebensweise von *Glaucidium gnoma*, *californicum* und *phalaenoides*; ebenda p. 366—372.

W. Beste teilt Beobachtungen über Vorkommen und Lebensweise einiger Arten aus der Kapkolonie mit. *Ciconia alba* hält sich vom November bis April daselbst auf und stellt den Wanderheuschrecken nach; Ornith. 4. p. 667—670.

V. Bianchi s. oben S. 118.

Emin schildert die Lebensweise, Nest u. Eier von *Amblyospiza melanotis* Heugl. (mitgeteilt von G. Hartlaub); Journ. Ornith. 36. p. 1—4.

A. Göring giebt einige biologische Notizen über *Harpya destructor*; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 44—46. Mit Holzschn.

A. Girtanner über die Lebensweise des Bartgeiers, s. oben S. 118.

N. S. Goss beschreibt das Fischen der Pelikane (*P. erythrorhynchus*); Auk 5. p. 25—27.

G. Hartlaub, s. Emin.

F. Holle, Das Seelenleben der Vögel. Altona 1888.

L. Holtz, Ueber das Steppenhuhn, *Syrhaptus paradoxus*, und dessen Einwanderung in Europa. Greifswald 1888. 8° 31 p. [Auch über Lebensweise].

R. O. Karlsberger, Eine Rauchschnalze als Pflegemutter von jungen Hausrotschwänzchen; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 54—55.

A. Kerner v. Marilaun, Ueber die Verbreitung von Quarzgeschiebe durch wilde Hühnervögel; Stzb. Ak. Wiss. Wien Math. Nat. Cl. 97. 1. Abth.

A. König liefert zahlreiche Notizen über die Lebensweise der Vögel in Tunis, insbesondere über *Phoenicopterus*; Journ. Ornith. 36. p. 121—298.

T. G. Laidlaw sah einen *Charadrius auratus* sein Junges in den Zehen tragend davonfliegen; Zoologist (3.) 12. p. 301.

K. Th. Liebe schildert die Lebensweise des Fluss- und Sandregenpfeifers (*Charadrius curonicus* u. *hiaticola*) in Freiheit und Gefangenschaft; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 59—68 u. 91—93. Mit Tafeln.

F. Lindner schildert die Lebensweise der Strandläufer (*Tringa*); ebenda p. 461—466. Mit Abbild. v. *T. minuta* u. *temmincki*.

A. Ludwig, Das Birkwild etc. s. unter Jagd, Schutz etc.

H. Nehrling schildert die Lebensweise von *Petrochelidon lunifrons*; Zool. Gart. 29. p. 214—220.

A. C. Oudemans, Eine Möve als Krankenwärterin; Zool. Gart. 29. p. 243—244.

Schäff berichtet über einen Wasserläufer (*Totanus calidris*), welcher an einem Bein von einer grossen Anodonta festgehalten wird; Stzb. Ges. Nat. Fr. Berlin 1888 p. 121—122.

Gr. Stamati, Ueber das Vorhandensein einer Umhüllung an den Extremitäten der Vögel; Bull. Soc. Zool. France 13. p. 187—188.

A. Walter, Das Vogelgemüth; Mntschr. Schutze Vogelw. 13. p. 142—149.

Derselbe, Ueber Zerstören der Nester kleiner Vögel durch Heher und Dohlen; ebenda p. 49—52.

A. T. Wayne beschreibt Lebensweise, Nest und Eier von *Jonornis martinica*; Auk 5. p. 109—110.

J. Whitehead theilt biologische Notizen über *Eudynamis orientalis*, *Megapodius cumingi* und *Plotus melanogaster* mit; Ibis (5) 6. p. 409—413.

C. G. Young, Biologisches über *Opisthocomus cristatus*; Notes Leyden Mus. 10. p. 169—173.

E. Ziemer teilt seine Beobachtungen über das Meckern der Bekassine mit; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 35—43.

Stimme: A. v. Homeyer beschreibt den Gesang von *Muscicapa parva*; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 48—50.

S. auch vorher E. Ziemer.

Sinne: L. Hopkins führt Beispiele für den Geruchssinn der Raubvögel an; Auk 5. p. 248—251.

Nisten, Eier: H. E. Barnes beschreibt Nester und Eier indischer Vogelarten (*Dendrochelidon coronata*, *Elanus caeruleus*, *Spilornis melanotis* u. a.); Journ. Bombay N. H. Soc. 3. p. 43—48, 205—224.

Ch. E. Bendire beschreibt Nest und Eier von *Peucaea aestivalis bachmani* Aud.; Auk 5. p. 351—356.

Derselbe beschreibt die Eier von *Gavia alba*; ebenda p. 202. — S. auch oben S. 133.

H. Benson fand *Sitta caesia* wie Erdschwalben am Abhang eines Sandhügels nistend; Zoologist (3.) 12. p. 309—310.

H. A. Blake beschreibt die Nistweise von *Phoenicopterus ruber* auf den Bahamas; Ibis (5) 6. p. 150—152.

R. Bos, Aenderungen im Nestbau der Vögel in baumlosen Gegenden; Biol. Centralbl. 8. p. 320.

W. Brewster beschreibt Nest und Eier von *Regulus satrapa*; Auk 5. p. 337—344.

W. E. Bryant, Birds and Eggs from the Farallon Islands; Bull. Cal. Ac. Sc. (2.) 1. p. 25—50.

E. A. Butler fand eine Hohltaube auf 3 Eiern brütend; Zoologist (3.) 12. p. 393.

A. J. Campbell, Oology of Australian Birds; Victorian Naturalist (Melbourne) 4. p. 182—188.

R. Collet beschreibt Nistweise, Nest, Eier und Dunenjunge von *Larus eburneus*; Ibis (5) 6. p. 440—443, T. 13.

E. B. Coues beschreibt die Nistweise von *Dendroica discolor*; Auk 5. p. 405—408.

M. Christy, Birds-Nesting and Bird-Skinning: a complete description of the Nests and Eggs of Birds which breed in Britain. Second Edition. Revised and rewritten, with Direction for their Collection and Preservation; and a Chapter on Bird-Skinning. London 1888, 8° 138 p.

D. Daly berichtet über die Höhlen Nord Borneos, welche die essbaren Vogelnester (der *Collocalia fuciphaga*) liefern; als Bestandtheil der Nester nimmt Verf. ausschliesslich den Speichel der Vögel an; Proc. Z. S. p. 108—116.

J. L. Davison beschreibt Nistweise und Eier von *Dendroica caerulea*; Auk 5. p. 430—431.

C. Dixon, s. oben S. 119.

Emin, s. vorher S. 133.

R. D. Fitzgerald beschreibt die Nistweise und Eier von *Sphecotheres maxillaris* und *Campephaga leucomelaena*; Proc. Lin. Soc. N. S. Wales (2.) 2. p. 970—971.

M. H. Gormley beschreibt Nest und Eier von *Cypseloides niger*; Auk 5. p. 424—425.

N. S. Goss beschreibt Nistweise und Eier von *Gymnostinops montezumae*; Auk 5. p. 27—29.

Derselbe beschreibt die Eier von *Sula brewsteri* und *Phaëton aethereus*; ebenda p. 243—244.

d'Hamonville beschreibt die vier im Pariser Museum befindlichen Eier von *Alca impennis*. Mit Abbildung; Mem. Soc. Zool. France 1. p. 224—227, T. 5—6.

H. W. Hunt, The Coloration of Birds Eggs; Victor. Natur. 4. p. 189—195.

G. Hurst beschreibt ein vermutlich dem *Cacomantis insperatus* gehöriges Ei, welches in einem Neste von *Malurus cyaneus* gefunden wurde; Proc. L. S. N. S. Wales (2.) 3. 421—422.

F. Kutter, Ueber die wissenschaftliche Bedeutung der Oologie; Bericht naturw. Ver. Cassel 1886—88 p. 67—85.

A. Müller will Selbstbrüten des Kukuks beobachtet haben; Zool. Gart 29. p. 193—201.

Mützel sah aus weissem Kreideschlamm gefertigte Schwalbennester auf Rügen; Journ. Ornith. 36. p. 100.

A. J. North beschreibt Nester und Eier von *Eopsaltria capito*, *Stictoptera annulosa*, *Aeluroedus maculosus*, *Phaps histrionica* und *Alcyone pulchra*, *Rhipidura preissi*, *Malurus pulcherrimus*; Proc. L. S. N. S. Wales (2.) 3. p. 146—149 und 269—270, 414—415.

Derselbe beschreibt Nistweise und Eier von *Platycercus barnardi*, *Psephotus haematogaster*, *Trichoglossus chlorolepidotus*, *Xenorhynchus australis*; ebenda (2.) 2. 986—988.

E. C. Phillips schildert einen Besuch des Vogelberges (Kormoran-Kolonie) bei Towyn, North Wales (England); Zoologist (3.) 12. p. 380—382.

W. W. Price beschreibt Nistweise und Eier von *Cardellina rubrifrons*; Auk 5. p. 385—386.

H. Pryer findet seine frühere Angabe bestätigt, dass die essbaren Schwalbennester vorzugsweise aus dem Stoff einer Alge, vermischt mit dem Speichel der Vögel, bestehen; Auk 5. p. 335.

E. P. Ramsay beschreibt die Eier von *Onychoprion fuliginosa*, *Anous cinereus* und *Sula cyanops*; Proc. Lin. Soc. N. S. Wales (2.) 2. p. 678—679.

X. Raspail beschreibt ein rothbraun und schwärzlich geflecktes Ei von *Upupa epops*; Bull. Soc. Zool. France 13. p. 81—82.

Derselbe, sur le nid de la pie et la destruction des ses oeufs par la corneille; ebenda p. 126—129.

G. Rooper fand ein Nest von *Cinclus aquaticus* in einem Baume; Zoologist (3.) 12. p. 309—310, s. auch H. A. Macpherson, ebenda p. 351—352 u. J. Whitaker ebenda p. 392.

H. Schalow referirt über die Nistweise von *Phoenicopterus ruber* nach H. A. Blake; Journ. Ornith. 36. p. 302.

G. Sundman, Finnische Vögeleier, s. oben S. 118.

L. Taczanowski beschreibt Nest und Eier von *Halcyon pileatus*; Proc. Z. S. London 1888 p. 462—463.

A. Walter fand ein Nest von *Certhia familiaris* in einem Wachholderstrauch und theilt andere biologische Beobachtungen über Zaunkönig u. Kukuk mit; Journ. Ornith. 36, p. 100—101 u. Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 29.

Derselbe, Sonderbare Nistplätze und Nistweisen; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 194—214.

A. T. Wayne, s. vorher S. 134.

R. S. Williams beschreibt Eier von *Parus gambeli*; Auk 5. p. 118.

C. M. Woodford berichtet über die Art, wie *Megapodius brenchleyi* seine Eier behufs deren Entwicklung verscharrt; Proc. Z. S. London p. 249—250, — s. auch Whitehead vorher S. 135.

Notiz über Brüten des *Eudypetes chrysocome* auf den Falklandsinseln; Zool. Gart. 29, p. 223—224.

Ueber ein in London verkauft Ei von *Alca impennis* vergl. oben S. 104.

Nahrung: K. W. v. Dalla-Torre, Untersuchungen über den Mageninhalt verschiedener Vögel; Biol. Centralbl 8. p. 473—480.

Derselbe, Weitere Untersuchungen über die Nahrung des Tannenhebers; ebenda 7. p. 695—699.

A. K. Fisher berichtet auf Grund zahlreicher Untersuchungen über die Nahrung der Tagraubvögel und Eulen; Ann. Rep. of the Depart. of Agricult. 1887 Washington. Report of the Ornithologist p. 402—422.

F. Lataste theilt Untersuchungen über Eulengewölle mit; Compt. Rend. Ass. Fr. 1888 p. 194; Ann. Mus. Genov. 26. p. 471—518.

VIII. Jagd, Schutz, Pflege, Hausgeflügel.

Vogelschutz, Jagd, Fang: B. Altum, Ueber den wirthschaftlichen Werth der Krähen und Bussarde; Zeitschr. Forst- und Jagdwesen 5. Heft Mai 1888.

Beyer, Einbürgerung von Nachtigallen bei Greiz; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 159.

B. Borggreve, Die Vogelschutzfrage. Leipzig 1888 (Voigt).

Derselbe, Ueber die Entstehung, die Bedeutung und den vorläufigen reichsgesetzlichen Abschluss der sogen. Vogelschutzfrage; Humboldt 7. p. 237—243.

R. Dännin, Ueber Züchtung von Rephühnern zum Zwecke der Wiederbevölkerung der Jagdreviere mit denselben; Bull. Soc. Acclim. France (4.) 5. p. 165—173.

G. Duclos, Ueber Züchtung von Rephühnern zum Zwecke der Bevölkerung der Jagdreviere; ebenda p. 343—346.

H. Gadeau de Kerville, Faut-il détruire nos Rapaces Nocturnes?; Bull. Soc. Rouen 1888 p. 247—260.

F. Grässner, Der Spatz ein Bienenfeind; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 289—290 u. 454.

Derselbe, Die Böhämmerjagd [*Fringilla montifringilla*] in Bergzabern; ebenda p. 330—333.

A. v. Krüdener, Zur Naturgeschichte des Birkwildes. Ein Beitrag zur Jagdzoologie; Jagd-Zeitung No. 17 u. 18 Wien 1888 u. sep. Wien, Wallishausser. 8°. 16 p.

K. Th. Liebe, Zum Vogelschutz; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 6—8.

A. Ludwig, Das Birkwild, dessen Naturgeschichte, Jagd und Hege. Wien, Gerold 1889. — Behandelt die Eigenschaften, Hege und Jagd des Birkwildes sowie Pflege in Gefangenschaft.

T. J. Mann, Modern Falconry; Essex Naturalist 1888 p. 209 bis 217.

L. Magaud d'Aubusson über den Nutzen der Stare; Bull. Soc. Acclim. France (4.) 5. p. 1146—1152.

A. Le Messurier, Game, Shore and Water Birds of India. Calcutta u. London 1888. 8°. 153 p., 121 Illustr.

H. Newekowski, Zum Schutze der Lachmöwe; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 172—173.

J. Rangei berichtet über den Stand der Fasanenjagden in Italien; Bull. Soc. Acclim. France (4.) 5. p. 930—933.

F. Rudow, Ueber Schädlichkeit der Dohlen; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 126—127.

H. Simroth, Ueber die Behandlung der Vögel bei den Portugiesen; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 236—242.

C. H. Thompson, Indian Hawks and Hawking; Essex Natural. 1888 p. 217—221.

A. Walter, Wenig beachtete Vogelfeinde; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 106—112.

Ueber das Fangen von Raubvögeln; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 12—14.

Deutsches Reichsgesetz betreffend den Schutz von Vögeln, vom 22. März 1888; Zool. Gart. 29. p. 182—184, Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 54—55, 69—70, Mntschr. Schutze Vogelw. 13. p. 137—140.

Vogelschutzgesetz für Niederösterreich; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 37—38.

Einbürgerung, Pflege, Zucht: H. D. Astley schildert die Lebensweise von *Turdus cyaneus* und Betragen in Gefangenschaft; Zoologist (3.) 12. p. 353—355.

Derselbe, über Regenpfeifer in Gefangenschaft; ebenda p. 145 bis 146.

H. v. Basedow berichtet über Züchtung von *Sitta caesia* in Gefangenschaft; Zool. Gart. 29. p. 119—122.

Beyer, s. vorher S. 137.

G. v. Bikkessy, Der Grünling in Gefangenschaft; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 16—17.

F. E. Blaauw theilt Beobachtungen und Resultate aus der Tierpflege mit und zwar über *Rhea americana*, *Rhea darwini*, *Bernicla magellanica* und *rubidiceps*; Zool. Gart. 29. p. 68—71, 130—132.

H. Bolau beschreibt das neue Vogelhaus im zoologischen Garten zu Hamburg; Zool. Gart. 29. p. 161—168.

Derselbe berichtet über Erwerbungen und Züchtungen des zoologischen Gartens in Hamburg; ebenda p. 316—317.

M. Bräss berichtet über die Vogelwelt des zoologischen Gartens in Dresden; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 437—453.

Mq. de Brisay, Aviculture. Colombes exotiques: description, entretien, élevage. Vichy, Wallon 1888. 16°. 355 p.

Cornil u. Toupet beschreiben eine neue Krankheit der Hausenten (Enten-Cholera); Bull. Soc. Acclim. France (4.) 5. p. 625—640.

R. Dannin, s. vorher S. 138.

A. Delaurier berichtet über Zucht von *Ortalia aracuan* u. a.; Bull. Soc. Acclim. France (4.) 5. p. 1137—1145.

Destrée, Sur la maladie du perroquet gris; Bull. Soc. Belg. Microsc. Bruxelles 14. p. 159—162.

G. Duclos, s. vorher S. 138.

A. Frenzel, *Goniaphea nigra*, *Bolborhynchus lineolatus* *Psittacula pullaria* und *Goniaphea cyanea* in Gefangenschaft; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 220—222, 359—367.

E. Godry berichtet über Züchtung von Tragopan-Fasanen u. a.; Bull. Soc. Acclim. France (4.) 5. p. 49—57.

Derselbe berichtet über Zucht von Polyplectron-Fasanen; ebenda p. 983—989.

C. Grevé berichtet über den Vogelbestand des Zoologischen Gartens in Moskau; Zool. Gart. 29. p. 292—300.

Derselbe, Der Vogelmarkt in Moskau; ebenda p. 151—155.

R. Hubbard, Ornamental Waterfowl: a practical Manual on the acclimatization of the Swimming Birds, with description of a hundred and thirty species. London u. Walsall. 1888. 16°. 209 p.

Huet berichtet über Erwerbungen und Züchtungen der Menagerie des Museum d'histoire naturelle in Paris; Bull. Soc. Acclim. France (4.) 5. p. 97—100, 866—868.

C. Ilse, Züchtung von Dompfaffen in Gefangenschaft; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 277—279.

K. Knauer, Das Kaspische Königshuhn (*Megaloperdix caspia*) in Gefangenschaft; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 15—16.

E. Leroy beschreibt ein für die Pflege und Zucht der verschiedensten Vogelarten dienendes Vogelhaus; Bull. Soc. Acclim. France (4.) 5. p. 1089—1093.

P. Leverkühn, Sections- und Krankheitsberichte; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 432—437.

Liebe, über Einbürgerung von *Cardinalis virginianus* in der Freiheit in Ostthüringen; Zool. Gart. 29. p. 318.

A. de Montlezun setzt seine Uebersicht der Entenvögel fort [vergl. Bericht 1887 s. 132] und behandelt *Cereopsis*, *Plectropterus*, *Sarcidiornis*, *Chenalopez*, *Anseranas*; Bull. Soc. Acclim. France (4.) 5. p. 830—844, 1014—1027.

F. Nagel, *Chloëbia mirabilis* in Gefangenschaft; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 98—100.

A. Newton berichtet über eine Brut zahmer Höckerschwäne, in welcher drei Junge die gewöhnliche Farbe hatten, vier dagegen weiss waren; Zoologist (3.) 12. p. 470.

A. u. G. Ortleb, Der Vogelfreund und Geflügelzüchter. Anleitung zur Pflege und Züchtung der beliebtesten und bekanntesten Stuben- und Hausvögel nebst Angabe der einfachsten Fangmethoden. Mit 52 Orig. Abbild. F. Bartholomäus, Erfurt.

J. v. Pleyel, Die Eingewöhnung und Pflege unserer einheimischen Sing- und Stubenvögel. 8^o Wien, Pest, Leipzig (A. Hartleben).

A. Porte berichtet über Erwerbungen und Züchtungen des Jardin d'Acclimatation in Paris; Bull. Soc. Acclim. France (4.) 5. p. 24—28, 78—81, 133—137, 191—195, 242—247, 305—308, 360—364, 406—409, 482—488, 595—599, 703—708, 805—809, 894—897, 999—1000, 1081, 1128, 1162—1163.

W. H. St. Quintin schildert das Betragen gefangener Eiderenten und deren Mauser; Zoologist (3.) 12. p. 26—27.

H. J. Roddy berichtet über einige Raubvogelarten in Gefangenschaft; Auk 5. p. 244—248.

G. Rogeron berichtet über Pflege von Magellangänsen in Gefangenschaft; Bull. Soc. Acclim. France (4.) 5. p. 12—21, 101—111.

Derselbe, Ueber Enten-Züchtungen; ebenda p. 918—923.

Roth, Ueber Erkrankung von Schwimmvögeln in Gefangenschaft an Dünndarmentzündung, verursacht durch Hakenwürmer (*Echinorhynchus polymorphus*); Zool. Gart. 29. p. 222.

E. Rüdiger berichtet über Betragen des Paradiessittichs (*Euphema pulcherrima*) in Gefangenschaft; Zool. Gart. 29. p. 57—59.

Derselbe, Ueber *Coccothraustes vulgaris* in Gefangenschaft; ebenda p. 87—89.

Derselbe, Der Grünling als Käfigbild; ebenda p. 155—156.

Derselbe, Nützlichkeit überzähliger Wellensittichmännchen bei der Zucht; ebenda p. 208—210.

Derselbe, Ungewöhnliche Ueberwinterung verschiedener Sitticharten und anderer Exoten; ebenda p. 341—342.

E. Schäff, Was haben wir von der Einbürgerung der Steppenhühner zu erwarten?; ebenda p. 353—359.

F. Schlag, Der Dompfaff. 2. verb. Auflage. Creutz, Magdeburg. 1888.

F. Schmidt, Ueber Brüten von *Strix scops* in Gefangenschaft; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 117.

G. Scheidemantel, Mästung der Drosseln bei den alten Römern; Mntschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 419—423.

O. Schneider berichtet über den Tierbestand des zoologischen Gartens in Strassburg; Zool. Gart. 29. p. 280—281.

P. L. Sclater berichtet über Zuwachs der Menagerie der Zoolog. Ges. in London: *Eudypes chrysocome* u. *Spizaetus nipalensis*; Proc. Z. S. London p. 265.

Derselbe liefert ein Verzeichniss des Zuwachses der Menagerie der Zoolog. Gesellsch. in London während 1888; ebenda p. 668—686.

K. N. Swierstra, Systemat. naamlijst van gewervelde Dieren; voor de Diergaarde levend ingekomen van 1 Mei 1838 tot 30 April 1888; Bijdr. Dierk. (Amsterdam) 1888 No. 3.

Wurm berichtet über die Wiederbesiedelung Schottlands mit Auerwild; Zool. Gart. 29 p. 33—42.

Ueber eine Anzahl von Vögel, welche seit 25 Jahren im zoologischen Garten in Hamburg leben, wird berichtet: ebenda p. 254.

Straussenzucht in Californien. Mit Holzschnitt; Bull. Soc. Acclim. France (4.) 5. p. 994—998.

Den Zwecken der Vogelpflege, Vogel- und Geflügelzucht dienen noch u. a. folgende Blätter:

Geflügelbörse. Wochenblatt für Geflügel-, Singvögel- und Kaninchenzucht, Briefftauben-, Hunde und Jagdsport. Red. R. Freese. Leipzig.

Geflügelmarkt. Organ für zool. Gärten, Thierhändler, Thierschausteller, Geflügel- und Vogelzüchter. Red. A. Richter. Leipzig.

Die Gefiederte Welt. Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler. Herausg. R. Russ. Berlin.

Thierbörse, Centralblatt f. Vermittelung des Kaufs-, Verkaufs- und Tauschgeschäfts unter Thierhändlern etc. Red. Dr. Langmann. Berlin.

Hausgeflügel, Briefftauben: H. Brézol, Rationelle Ernährung der Haushühner; Bull. Soc. Acclim. France (4.) 5. p. 942—943.

J. Bungartz, Kalender für Hunde-, Kaninchen-, Geflügel- und Singvögel-Liebhaber und Züchter. Augsburg, Reichel 1888.

Derselbe, Modell-Brieftauben-Album. Mit einem Vorwort von J. C. Hösch. M. 10 Taf. Leipzig, Twietmeyer 1888. Fol.

C. Cornevin, Essai sur les moyens de connaître l'age des Oiseaux de basse-cour; Journ. Anat. Phys. 24. p. 400—412.

R. Eder berichtet über Brieftaubenabrichtung zum Hin- und Rückflug; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 17.

M. Fries, Die Geflügelzucht. Stuttgart 1888. M. 20 Tafeln.

G. de Guérard, Eine militärische Brieftaubenstation auf dem Meere; Bull. Soc. Acclim. France (4.) 5. p. 309—310.

J. A. Harting berichtet über Taubendressur in Persien und Indien; Zoologist (3.) 12. p. 167—174, 209—219, 252—258.

F. Knauer, Die wichtigsten Racen des Haushuhnes in flüchtiger Rundschau; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 38—39.

Fr. Maar, Illustriertes Muster-Enten-Buch. Enthaltend das gesammte der Zucht und Pflege der domestizirten und der zur Domestication geeigneten wilden Entenarten. Mit c. 40 Taf. Hamburg, Richter 1888. 4^o. Lief. 11—13.

B. A. Mumb, Ueber Orientirungssinn der Brieftauben und einige Einrichtungen der Station in Tönnring; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 72.

E. Noll, Der zweifarbige Speckkäfer, *Dermestes bicolor*, als Feind der jungen Haustauben; Zool. Gart. 29. p. 307—309.

A. u. G. Ortleb, s. vorher S. 140.

L. Pribyl, Bemerkungen über einige Hühnerrassen; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 70—71.

E. Rey, Ueber den Luftröhrenwurm des Haus-Geflügels; Mntsch. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 166.

F. Routilliet, Anleitung zur rationellen und gewinnbringenden Hühnerzucht. Praktische Rathschläge für die Anzucht, Aufzucht und Mästung etc. 2. Auflage. Leipzig, Voigt 1888. 8^o. 44 p.

H. H. Scott, Bird Pests of the Farm; Zoologist (3.) 12. p. 375—379.

W. K. Sibley, Tuberculosis in Fowls; Trans. Pathol. Soc. London 1888.

Fr. v. Ulm-Erbach beschreibt einige Hühnerrassen; Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 89—90.

Dieselbe, Zur Verbesserung der Hühnerzucht auf dem Lande; ebenda p. 162—164.

IX. Systematik.

Vergl. M. Fürbringer oben S. 105 u. F. Kutter S. 136.

H. Seebohm bildet auf Grund osteologischer Merkmale eine Ordnung, welche die folgenden Gruppen als Unterordnungen umfasst: *Crypturi*, *Gallinae*, *Pterocletes*, *Columbae*, *Hemipodii*, *Grallae*, *Tubinares*, *Gavio-Limicolae*, *Colymbo-Podicipes*, *Impennes*; Ibis (5) 6. p. 415–435.

Familie Sylviidae.

Vergl. F. A. Lucas oben S. 106.

Acanthornis, *Acanthiza* und *Sericornis*, Unterschiede der drei Gattungen; W. V. Legge, Ibis (5) 6. p. 93–94.

Cettia oreophila n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo, nahe *C. fortipes*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 388.

Cinclus schulzi abgebildet; P. L. Selater. Argent. Orn. 1. T. 2.

Ephthianura crocea abgebildet; Gould, New Guinea 24.

Geocichla aurata n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo, ähnlich *G. citrina*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 478. — *G. schistacea* abgeh. Gould, New Guinea 24.

Hypolais icterina mollessoni n. subsp. von Orenburg; N. Zarudnoi, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 1888 p. 675–676.

Icoturus, s. unter Timeliidae.

Merula seebohmi n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo, sehr ähnlich *M. javanica*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 386. — *M. torquata orientalis* n. subsp. vom Kaukasus und Persien, Charaktere von *M. torquata* und *M. torquata alpestris*; H. Seebohm, Ibis (5) 6. p. 309–312.

Monticola angolensis n. sp. von Angola; J. A. de Sousa, Journ. Sc. Math. Phys. Nat. Lisboa No. 48. 1888 p. 233–235.

Phyllopneuste bonellii wurde von C. v. Balenstein unter dem Namen *Sylvia albicans* in „Neu-Alpina“ 2. Bd. p. 87 1827 kenntlich beschrieben und für die Schweiz nachgewiesen; V. v. Tschusi, Mtschr. Ver. Schutze Vogelw. 13 p. 306.

Turdus comorensis abgebildet; Nouv. Arch. Mus. (2.) 10. T. 6.

Zeledonia n. g.: Somewhat like *Catharus*, but wing still more rounded (primaries very little longer than secondaries), first quill about four-fifths as long as second, tail very short (much shorter than tarsus and middle toe together), rectal bristles very weak, and loreal feathers well developed and closely appressed. Coloration (of type): Dark olive-green above, deep slate-gray beneath, the crown brownish orange, with a black stripe along each side. Typus: *Z. coronatu* n. sp. von Costa Rica; R. Ridgway, Proc. U. St. Nat. Mus. 11. p. 537–538.

Familie Timeliidae.

Allocotops n. g. Timeliidarum. Simile generi *Melanocichla* dicto, sed pileo et genis nudis facile distinguendum. Typus: *A. calvus* n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 389.

Androphilus n. g. Timeliidarum. Simile generi *Elaphrornis* dicto, sed plumulis nuchalibus absentibus distinguendum. Typus: *A. accentor* n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 390.

Brachypteryx erythrogyna n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo, ähnlich *B. curalis*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 389 T. 10.

Campylorhynchus curvirostris n. sp. von Neu-Granada; R. Ridgway, Proc. Bost. Soc. 23. p. 385. — *C. zonatus costaricensis* n. subsp.; H. v. Berlepsch, Auk 5. p. 449.

Chlorocharis n. g. Timeliidarum. Simile generi *Cyanoderma* dicto, sed cauda magis quadrata nec rotundata. Typus: *Ch. emiliae* n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 392 T. 11.

Cisticola cinereola n. sp. von Schoa; T. Salvadori, Ann. Mus. Civ. Genova (2) 6. p. 254.

Cistothorus marianae n. sp. von Hillsboro Courty, Florida, ähnlich *C. palustris*; W. E. D. Scott, Auk 5. p. 188.

Corythocichla crassa n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo, ähnlich *C. epilepidota*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 391.

Cutia cervinocrissa n. sp. von Perak, Malacca, nahe *C. nipalensis*; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 276.

Ephthianura crocea s. unter Sylviidae.

Gampsorhynchus saturator n. sp. von Perak, Malacca, nahe *G. torquatus* Hume; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 273.

Garrulax schistochlamys n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo, ähnlich *G. palliatus*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 479.

Icoturus Stejn. nicht zu den Timeliidae zu rechnen, sondern zu den Turdidae; nach H. Seebohm, Ibis 6. p. 233.

Margarops montanus rufus n. subsp. von Dominica, West-Indien; Ch. B. Cory, Auk 5. p. 47.

Melanocichla peninsularis n. sp. von Perak, Malacca, nahe *M. lugubris*; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 274.

Microcerculus orpheus n. sp. von Costa Rica, ähnlich *M. philomela* (Salv.); R. Ridgway, Proc. U. St. N. Mus. 11. p. 539.

Miminae, s. F. A. Lucas, oben S. 106.

Mimus triurus abgebildet; P. L. Sclater, Argent. Orn. 1. T. 1.

Neocichla kelleni n. sp. vom Umbella Fluss, Südwest-Afrika; J. Büttikofer, Notes Leyden Mus. 10. p. 229 T. 9 F. 1. [Ist Jugendkleid von *N. gutturalis* Ref.]

Orthnocichla whiteheadi n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 478.

Phyllergates cinereicollis n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo, ähnlich *Ph. cucullatus*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 479.

Siva sordidior n. sp. von Perak, Malacca, nahe *S. sordida* Hume; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 276.

Stiphornis alboterminata Rehw. nach Büttikofer ♀ von *Antheptes rectirostris*; Notes Leyden Mus. 10 p. 212. [Referent kann dieser Ansicht nicht beipflichten.]

Troglodytes cahooni n. sp. von Sonora, Mexico, nahe *T. brunneicollis*; W. Brewster, Auk 5. p. 94. — *T. fumigatus kurilensis* n. subsp. von den Kurilen; L. Stejneger, Proc. U. St. Nat. Mus. 11 p. 548. — *T. tobagensis* n. sp. von Tobago, nahe *T. striatulus*; G. N. Lawrence, Auk 5. p. 404.

Troglodytinae, s. F. A. Lucas oben S. 106. — Ueber einige Typen der Lafresnaye collection berichtet R. Ridgway, Proc. Boston Soc. N. H. 23. p. 383—388.

Turdinulus exsul n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo, ähnlich *T. roberti*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 479.

Familie Paridae.

Cyanistes flavipectus abgebildet; A. Menzbier, Turkestan T. 10.

Panurus biarmicus, am 1. April am Zobten in Schlesien beobachtet; K. Knauth, Journ. Ornith. 36. p. 35.

Parus borealis, *palustris* und *P. colleti* n. sp. von West-Norwegen beschrieben; L. Stejneger, Proc. U. St. N. M. 11. p. 71—76. — *P. carolinensis agilis* n. subsp. von Texas; G. B. Sennett, Auk 5. p. 46. — *P. cypristes* abgebildet; Ibis (5) 6. T. 2. — *P. mitratus* Brehm 1831 von Mittel-Europa subspezifisch unterschieden von *P. cristatus* L. von Scandinavien; L. Stejneger, Proc. U. St. N. M. 11. p. 113—114.

Psaltiriparus Lloyd n. sp. von West-Texas; G. B. Sennett, Auk 5. p. 43.

Familie Certhiidae.

Certhia mexicana albens n. subsp. von N.W.-Mexico; H. v. Berlepsch, Auk 5. p. 450.

Dendrophila corallipes n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo, ähnlich *D. frontalis*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 479.

Familie Dacnidae.

Prionochilus plateni n. sp. von Palawan, ähnlich *P. xanthopygius* Salvad.; W. Blasius, Braunsch. Anzeigen 1888, No. 37, 12. Febr., p. 335. — *P. johannae* n. sp. von Palawan; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 201 T. 4. [Identisch mit *P. plateni*.]

Familie Nectariniidae.

Halcomitra scioana n. sp. von Schoa, nahe *Ch. cruentata*; T. Salvadori, Ann. Mus. Civ. Genova (2) 6. p. 247.

Cinnyris humbloti abgebildet; Nouv. Arch. Mus. (2) 10. T. 4.

Eleocerthia ragazzi n. sp. von Schoa, nahe *E. obscura*; T. Salvadori, Ann. Mus. Civ. Genova (2) 6. p. 247.

Familie Meliphagidae.

Anthornis melanura abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 1.

Melidectes emilii abgebildet; Gould, New Guinea 24.

Myzomela sharpei n. sp. von Guadalcanar, Salomonsinseln; Ogilvie-Grant, Proc. Z. S. London, p. 197, T. 10.

Philemon occidentalis n. sp. von N.W.-Australien, nahe *P. sordidus*; G. P. Ramsay, Proc. Lin. Soc. NS. Wales (2) 2. p. 676.

Pogonornis cincta abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 1.

Prothemadera novae zealandiae abgebildet; ebenda.

Zosterops caeruleus abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 1. — *Z. clara* n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo; ähnlich *Z. atrifrons*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 479. — *Z. kirki* u. *mouroniensis* abgebildet; Nouv. Arch. Mus. (2) 10. T. 5. — *Z. natalis* n. sp. von Christmas-Insel (Indisch. Ocean), nahe *Z. my-*

soriensis Meyer; J. Lister, Proc. Z. S. London p. 518, T. 27. — *Z. nehrkorni* n. sp. von Gross-Sangir, nahe *Z. chrysolaema* Salvad.; W. Blasius, Braunschweig Anzeigen No. 9, 11. Jan. 1888, p. 86; abgebildet Ornith. 4. T. 4. — *Z. newtoni*. verschieden von *borbonica*; A. u. S. Newton, Ibis (5) 6. p. 475. — *Z. pradermissa* identisch mit *Z. anjauanensis*; A. u. E. Newton, Ibis (5) 6. p. 474—475.

Familie Pycnonotidae.

Criniger platenae n. sp. von Gross-Sangir, nahe *C. aureus* Walden; W. Blasius, Braunschweig. Anzeigen No. 9, 11. Jan. 1888, p. 86; abgebildet Ornith. 4. T. 4.

Hypsipetes parvirostris abgebildet; Nouv. Arch. Mus. (2) 10. T. 6.

Hypsipetes pryeri Stejn. identisch mit *Oriolus squamiceps* Kittl.; nach H. Seebohm, Ibis (5) 6. p. 233.

Jole striaticeps n. sp. von Palawan, ähnlich *J. viridescens*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 200.

Oreoctistes n. g. Pycnonotidarum. Simile generi *Kelaartia* dicto, sed rostro brevior et crassior, cauda magis rotundata, et fasciis auricularibus absentibus distinguendum. Typus: *O. leucops* n. sp. vom Kina Balu, Nord-Borneo, R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 388, T. 9.

Familie Alaudidae.

E. Cones begreift die Familie unter dem Namen *Corydomorphae* als Superfamilie; Auk 5. p. 207.

Alaemon margaritae n. sp. von Tunis, nahe *A. duponti*; A. König, Journ. Ornith. 36. p. 230—232, T. 2.

Familie Mniotiltidae.

Basileuterus godmani n. sp. von Veragua, nahe *B. culicivorus*; H. v. Berlepsch, Auk 5. p. 450.

Dendroica aestiva sonorana n. subsp. von Süd Arizona, West Texas und Sonora, Mexico; W. Brewster, Auk 5. p. 137.

Geothlypis caninucha icterotis n. subsp. von Costa Rica; R. Ridgway, Proc. U. St. N. Mus. II. p. 539.

Familie Tanagridae.

Vergl. R. W. Shufeldt oben S. 108.

Buarremon simplex n. sp. von Bogota, sehr ähnlich *B. elaeoprorus*; H. v. Berlepsch, Ibis (5) 6. p. 128.

Eucometis cristata affinis n. subsp. von Venezuela, *E. spodocephala pallida* n. subsp. von Yucatan und *E. spodocephala stictothorax* n. subsp. von Veragua; H. v. Berlepsch, Auk 5. p. 451.

Phoenicotheraps insularis n. sp. von den Inseln Meco und Mgeres bei Yucatan, nahe *P. salvini*; O. Salvin, Ibis (5) 6. p. 259.

Stephanophorus leucocephalus abgebildet; P. L. Selater, Argent. 1. T. 4.

Familie Fringillidae.

Vergl. R. W. Shufeldt oben S. 108 und E. Bartlett unter Ploceidae.

R. B. Sharpe, Catalogue of the Birds in the British Museum Vol. XII. *Fringillidae*. London 1888. — Verf. unterscheidet nach der Form des Schädels

und Schnabels 3 Unterfamilien; *Coccothraustinae*, *Frigillinae* und *Emberisinae*, umfassend 99 Gattungen und 559 Arten.

Acanthidops bairdi, Beschreibung des alten ♂; R. Ridgway, Proc. U. St. N. M. 11. p. 196.

Aimophila cahooni n. sp. von Sonora, Mexico, nahe *A. sumichrasti*; W. Brewster, Auk 5. p. 93. — *A. mcleodii* n. sp. von Chihuahua, Mexico, nahe *A. rufescens*; ebenda p. 92.

Amazospiza aequatorialis n. sp. von Ecuador, ähnlich *A. concolor*; R. B. Sharpe, Cat. Brit. Mus. 12. p. 157. — *A. axillaris* n. sp. von Brasilien; ebenda.

Ammodramus maritimus peninsulae n. subsp. von Südwest-Florida und *A. m. sennetti* n. subsp. von der Golfküste von Texas; J. A. Allen, Auk 5. p. 284 u. 286. — *A. sandwichensis brunneescens* n. subsp. von Mexico; A. W. Butler, Auk 5. p. 265.

Carpodacus ambiguus ♂, ♀ abgebildet; R. B. Sharpe, Cat. Brit. Mus. 12. T. 10. — *C. roseipectus* n. sp. von Süd-Mexico; R. B. Sharpe, ebenda p. 424.

Chloridops n. g. Fringillidarum; Bill short and very thick, with culmen and gonys much arched; maxilla and mandible nearly equal in height, tomia of the former doubly sinuated and overhanging those of the latter, which are inflected. Nostrils basal, supernal, nearly covered by the frontal feathers, and be set with a few hairs. Wings moderate, first primary wanting, fourth slightly longer than third and fifth, which again exceed the second and sixth. Tail short, slightly forked, rectrices acuminate. Feet moderate. Typus: *Ch. kona* n. sp. von Kona auf Hawai, von dem allgemeinen Aussehen des *Fringilla chloris* L.; Proc. Z. S. London p. 218.

Chrysomitris boliviana n. sp. von Bolivien, ähnlich *Ch. icterica*; R. B. Sharpe, Cat. Brit. Mus. 12. p. 220. — *Ch. longirostris* n. sp. von Guiana, ähnlich *Ch. icterica*; ebenda p. 220. — *Ch. sclateri* n. sp. von Ecuador; ebenda. — *Ch. stejnegeri* n. sp. von Bolivien, ähnlich *Ch. xanthogaster*; ebenda p. 210. — *Ch. thibetana* abgebildet; ebenda T. 3.

Coccothraustes humii abgebildet; R. B. Sharpe, ebenda T. 1.

Orithagra burtoni, *crococygia* und *leucoptera* abgebildet; R. B. Sharpe, ebenda T. 7–9.

Emberiza godlewskii abgebildet; R. B. Sharpe, ebenda T. 12. — *E. jankowskii* n. sp. von Sidemi, Grenze von Corea und der Mantschurei, ähnlich *E. cioides*; L. Taczanowski, Ibis (5) 6. p. 317. T. 8.

Euethia canora in Florida; C. H. Merriam, Auk 5. p. 322.

Fringilla maderensis n. sp. von Madeira, nahe *moreleti*; R. B. Sharpe, Cat. Brit. M. 12. p. 175. — *F. montifringilla* var. *atroregularis* in Tirol; K. W. von Dalla Torre, Mitth. Orn. Ver. Wien 12. p. 106–107.

Fringillaria poliopleura n. sp. von Schoa, nahe *F. flavigaster*; T. Salvadori, Ann. Mus. Civ. Genova (2) 6. p. 269.

Geospiza difficilis n. sp. von den Galapagos-Inseln, nahe *G. fortis*; R. B. Sharpe, Cat. Brit. Mus. 12. p. 12.

Guiraca argentina n. sp. von Argentinien, nahe *G. cyanea*; R. B. Sharpe, ebenda p. 73.

Loxia curvirostra, Zug in Deutschland und Oesterreich. 1888: s. G. Clodius oben S. 114, J. G. Fleig S. 114, R. Fresenius S. 114, K. Junghans S. 114, C. Sachse S. 115, H. Stoot S. 115, V. v. Tschusi S. 117.

Montifringilla blanfordi abgebildet; R. B. Sharpe, Cat. Brit. Mus. 12. T. 4.
Paroaria capitata, cervicalis, cucullata, dominicana, gularis, nigrigenis,
 Köpfe abgebildet; R. B. Sharpe, Cat. Brit. Mus. 12. T. 16.

Passer griseigularis n. sp. von Candahar; R. B. Sharpe, Cat. Brit. Mus. 12. p. 313. — *P. pyrrhonotus* abgebildet; ebenda T. 5. — *P. yatii* sp. n. von West-Afganistan, nahe *P. moabiticus*; ebenda p. 322.

Peucaea homochlamys n. sp. von Süd-Neu-Mexico und Arizona, ähnlich *P. ruficeps*; R. B. Sharpe, ebenda p. 713. — *P. ruficeps* Cass., *boucardi* (Scl.) und *scottii* n. subsp. von Arizona, Neu-Mexico und West-Texas characterisirt; G. B. Sennett; Auk 5. p. 40–42.

Phaeospiza thomensis n. g. et sp. von St. Thomé; B. du Bocage, Journ. Sc. Math. Phys. Nat. Lisboa No. 47 1888 p. 148–149. — *Ph. thomensis* identisch mit *Ligurnus rufobrunneus* Gray und *Buserinus rufilatus* Hartl.; ebenda p. 192.

Phrygilus punensis n. sp. von Peru, ähnlich *P. caniceps*; R. B. Sharpe, l. c. p. 785. — *P. saturatus* n. sp. von Bolivia und West-Peru, nahe *P. punensis*; ebenda.

Polioespiza isabellina vermuthlich n. sp. von Schoa; E. H. Giglioli, Ann. Mus. Civ. Genova ser. (2) 6. p. 33. — Identisch mit *P. tristriata*; T. Salvadori, ebenda p. 188. — *P. rufibrunnea* abgebildet; R. B. Sharpe, l. c. T. 6.

Pooecetes gramineus affinis n. subsp. von Oregon; G. S. Miller jr., Auk 5. p. 404–405.

Poospiza boliviana n. sp. von Bolivia, nahe *P. thoracica*; R. B. Sharpe, l. c. p. 634 T. 14.

Porphyrospiza pulchra nom. nov. pro *Cyanospiza cyanella* Pelz. u. a.; R. B. Sharpe, Cat. Brit. Mus. 12. p. 625.

Pseudochloris n. g. Typus: *Emberiza lutea* d'Orb et Lafr.; R. B. Sharpe, Cat. Brit. Mus. 12. p. 774. — *P. mendozae* n. sp. von Argentinien, ähnlich *P. aureiventris*; ebenda p. 778.

Pyrrhopiza humii n. sp. vom N.W.-Himalaya, ähnlich *P. punicea*; R. B. Sharpe, l. c. p. 433.

Pyrrhula kurilensis abgebildet; R. B. Sharpe, l. c. T. 11.

Rhodospingus n. g. Typus: *Tiaris cruenta* Less.; R. B. Sharpe, Cat. Brit. Mus. 12. p. 808. — *Rh. cruentus* abgeb.; ebenda T. 15. — *Rh. mentalis* n. sp. von der Insel Puna im Golf von Guayaquil, ähnlich *R. cruentus*; ebenda p. 809. T. 15.

Rhodospiza n. g. Typus: *Fringilla obsoleta* Licht.; R. B. Sharpe, Cat. Brit. Mus. 12. p. 282.

Saltatricula multicolor abgebildet; P. L. Sclater, Argent. 1. T. 5.

Schistospiza n. g. Typus: *Emberiza griseocristata* d'Orb. et Lafr.; R. B. Sharpe, Cat. Brit. Mus. 12. p. 806.

Serinus flavigula n. sp. von Schoa, nahe *S. xanthopygius*; T. Salvadori, Ann. Mus. Civ. Genova (2) 6. p. 272. — *S. reichenowi* n. sp. nahe *S. xanthopygius*; ebenda.

Spermophila whiteleyana n. sp. von Guiana, nahe *S. plumbea*; R. B. Sharpe, Cat. Brit. Mus. 12. p. 98. — *S. colombiana* n. sp. von Columbia; ebenda p. 99. — *S. polionota* n. sp. von Brasilien, ähnlich *S. cucullata*; ebenda p. 118. — *S. albitorquis* n. sp. von Mexico, nahe *S. torquella*; ebenda p. 120. — *S. amazonica* n. sp. vom Amazonenstrom, nahe *S. lineola*; ebenda p. 132. — *S. trinitatis* n. sp. von Trinidad, nahe *S. lineola*; ebenda p. 132. — *S. palustris* abgebildet; ebenda T. 2.

Spizella arenacea, Beschreibung des Brutkleides; C. H. Merriam, Auk 5. p. 402—403.

Sycalis jamaicae n. sp. von Jamaica, nahe *S. flaveola*; R. B. Sharpe, Cat. Brit. Mus. 12. p. 379. — *S. taczanowskii* n. sp. von Peru und Ecuador, ebenda p. 385.

Zonotrichia whitii n. sp. von Argentinien; R. B. Sharpe, Cat. Brit. Mus. 12. p. 608. T. 13.

Familie Ploceidae.

E. Bartlett, A Monograph of the Weaver-Birds, Ploceidae, and arboreal and terrestrial Finches, Fringillidae. Maidstone. — Erschien: Pt. 1. enthaltend Abbildungen, Beschreibungen etc. von *Tector dinemelli* u. *böhmi*, *Chrysomitris atrata*, *Paroaria cucullata*, *Pyrrhula nipalensis*, *Munia oryzivora*. Part. 2: *Cardinalis virginianus*, *Chrysomitris uropygialis*, *Passer domesticus*, *Tector panicivora* und *albirostris*.

Amblyospiza comolor n. sp. von St. Thomé; B. du Bocage, Journ. Sc. Math. Phys. Nat. Lisboa No. 48 1888 p. 229—230. — *A. melanotis* Heugl.; Lebensweise, Nest, Eier u. Masse des Vogels; G. Hartlaub (nach Emin Pascha); Journ. Ornith. 36. p. 1—4.

Donacicola hunsteini abgebildet; Gould, New Guinea 24.

Estrela nigrimentum n. sp. von Schoa, nahe *E. charmosyna*; T. Salvadori, Ann. Mus. Civ. Genova (2) 6. p. 281. — *E. thomensis* n. sp. von der Insel St. Thomé (West-Afrika); J. A. de Sousa, Journ. Sc. Math. Phys. Nat. Lisboa No. 47 p. 155.

Philetaerus cabanisi (*Nigrita cabanisi*) abgebildet; Ibis (5) 6. T. 6.

Plocepasser rufoscapulatus n. sp. vom Kasingafluss, Südwest-Afrika; J. Büttikofer, Notes Leyden Mus. 10. p. 238 T. 9 F. 2.

Ploceus castanops n. sp. von Aequatorial-Afrika, nahe *Pl. xanthoptera*; G. E. Shelley, Proc. Z. S. London p. 35. — *P. jacksoni* n. sp. aus der Gegend des Kilimandjaro, sehr nahe *P. dimidiatus*; G. E. Shelley, Ibis (5) 6. p. 293 T. 7. — *P. (Foudia) madagascariensis* abgebildet; Nouv. Arch. Mus. 2. 10. T. 9.

Spermospiza ruficapilla n. sp. von Aequatorial-Afrika; G. E. Shelley, Proc. Z. S. London p. 30.

Urobrachia traversii n. sp. von Schoa, nahe *U. phoenicea*; T. Salvadori, Ann. Mus. Civ. Genova (2) 6. p. 287.

Familie Icteridae.

Vergl. R. W. Shufeldt oben S. 108.

Icterus gularis yucatanensis n. subsp.; H. v. Berlepsch, Auk 5 p. 454. — *I. wagleri castaneopectus* n. subsp. von Mexico; W. Brewster, Auk 5. p. 91.

Molothrus badius u. *rufo-axillaris* abgebildet; P. L. Sclater, Argent. Orn. 1. T. 6.

Familie Sturnidae.

Acridotheres albocinctus abgebildet; Ibis (5) 6. T. 1.

Poliopsar n. g. Anterior plumelets of the forehead continued over the nasal membrane and bill much more acute and narrow [than in gen. Sturnus]. Hierzu die Arten: *sericeus* Gm., *cineraceus* Tem., *burmanicus* Jerd., *leucocephalus* Gigl. et Salv., *andamanensis* Beav., *erythropygius* Blyth., *malabaricus* Gm., *nemorica* Jerd., *blythi* Jerd., *cambodianus* n. sp. von Cambodscha, ähnlich *P.*

leucocephalus und *colletti* n. sp., ähnlich *P. cineraceus*, Vorkommen unbekannt; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 476—477.

Sturnus: Uebersicht der Arten dieser Gattung und deren Unterscheidungsmerkmale, neu: *St. mensibieri* von Süd- und Südwest-Asien, ähnlich *St. vulgaris*, und *St. porphyronotus* von Afganistan, ähnlich *St. purpurascens*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 438—440.

Familie Paradiseidae.

Aethroedus melanocephalus abgebildet; Gould, New Guinea 24.

Lophorina minor abgebildet; ebenda 24.

Paradisea guilielmi n. sp. u. *P. augustae-victoriae* n. sp. von Kaiser-Wilhelmsland (Neu Guinea); J. Cabanis, Journ. Ornith. 36. p. 119.

Familie Corvidae.

Vergl. R. W. Shufeldt oben S. 108.

Cissa jefferyi n. sp. vom Kina Balu, Nord Borneo, nahe *C. minor*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 383—385.

Lycocorax obiensis abgebildet; Gould, New Guinea 24.

Nucifraga caryocatactes. V. v. Tschusi bespricht die Verbreitung und den Zug des Tannenhebers mit besonderer Berücksichtigung seines Auftretens im Herbst und Winter 1885 und Bemerkungen über seine beiden Varietäten; Verhandl. Zool. Bot. Ges. Wien 38. 1888 p. 407—506. Mit Tafel. — Ueber den Zug im Jahre 1888 s. V. v. Tschusi oben S. 117, H. Bünger S. 113, G. Clodius S. 114, H. Hiller S. 114, J. A. Link S. 114, J. Michel S. 115, H. Panzner S. 117, Pietsch S. 115, H. Stoot S. 115, E. Ziemer S. 116, ferner F. Knauer, Mitth. O. Ver. Wien 12. p. 142, 158—159. — H. Seebohm ist der Ansicht, dass nicht eine westliche und östliche Form des Nusshebers zu unterscheiden sei, sondern eine arktische und eine gemässigte; der in Japan heimische Nussheber sei identisch mit dem europäischen; Ibis (5) 6. p. 236—241. — *Nucifraga caryocatactes macrorhyncha* die in Japan heimische Form; L. Stejneger, Proc. U. St. Nat. Mus. 11. p. 425—432.

Familie Laniidae.

Colluricincla sibila n. sp. von Nord-Queensland, nahe *C. rufiventris*; C. W. de Vis, Proc. Soc. Queensl. 5. p. 161.

Cyclorhis, kritische Bemerkungen über die Arten der Gattung, 11 Species und 3 Subspecies werden unterschieden; Schlüssel zur Bestimmung derselben; H. v. Berlepsch, Ibis (5) 6. p. 83—92. — *C. altirostris* und *ochrocephala* abgebildet; P. L. Sclater, Argent. Orn. 1. T. 3.

Hyloterpe platani n. sp. von Palawan, nahe *H. grisola*; W. Blasius, Braunschw. Anzeigen 1888 No. 52 1. März p. 467 u. Mitth. Orn. Ver. Wien 12 p. 75. — *H. whiteheadi* n. sp. von Palawan; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 198. [Identisch mit *H. platani*.]

Lanius raddei n. sp. von Transcaspien, am nächsten *L. vittatus*; H. E. Dresser, Proc. Z. S. London p. 291. — *L. rutilans* Tem. abgebildet; Journ. Ornith. 36. T. 3.

Pachycephala occidentalis n. sp. von West-Australien, nahe *P. gutturalis*; E. P. Ramsay, Tab. List. Austr. Bird p. 32.

Pterythrius cameranoi verglichen mit *Pt. aeralatus*; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 277.

Rectes. Critische Bemerkungen über die Arten der Gattung, neu: *R. meridionalis* von den Astrolab-Bergen, Neu Guinea, ähnlich *R. uropygialis*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 435–437. -- *R. aruensis* abgebildet; Gould, New Guinea 25.

Vireo cinereus identisch mit *V. magister*; O. Salvin, Ibis 6. p. 254.

Familie Campophagidae.

Edolisoma erythropygium n. sp. von Guadalcanar, Salomon-Inseln, nahe *E. remotum*; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 184.

Graucalus holopolius n. sp. von Guadalcanar, nahe *G. pusillus*; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 184. — *G. (Ceblepyris) sulphureus* u. *cucullatus* abgebildet; Nouv. Arch. Mus. (2) 10. T. 7.

Pericrocotus croceus n. sp. und *P. wrayi* n. sp. von Perak, Malacca; *P. rubrolimbatus* Salvad. identisch mit *P. solaris* und *P. pulcherrimus* Salvad. identisch mit *P. neglectus* Hume; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 269. — *P. wrayi* abgebildet; T. 15.

Familie Muscicapidae.

Bradyornis traversi vermuthlich n. sp. von Schoa; E. H. Giglioli, Ann. Mus. Civ. Genova (2) 6. p. 44. — Identisch mit *Lioptilus chocolatinus*; T. Salvadori, ebenda p. 188.

Cryptolopha davisoni n. sp. von Perak, Malacca, nahe *C. montis*; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 271.

Digenea leucops n. sp. von Indien u. *D. malayana* n. sp. von Perak, Unterschiede dieser und der Arten: *submoniliger*, *albifrons* und *solitaria*; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 246–247.

Gerygone flaviventris abgebildet; W. Buller, New Zeal. Vol 1 p. 126. — *thorpei* n. sp. von Lord Howe-Insel; E. P. Ramsay, Proc. Linn. Soc. NS. Wales 2 (1887) p. 677.

Humblotia flavirostris abgebildet; Nouv. Arch. Mus. 2. 10. T. 8.

Monarcha castaneiventris (Verr.) auf Guadalcanar, *M. rufocastanea* Rams. auf San Christoval und *M. erythrosticta* Sh. auf Fauro (Salomonsinseln); Ogilvie-Grant, Proc. Z. S. London p. 195.

Muscicapula westermanni n. sp. von Perak, Malacca; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 270.

Philetonoma intermedium Hume identisch mit *P. pyrrhopterum* (Tem.); R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 271.

Piezorhynchus sericeus n. sp. von den Neu-Hebriden, nahe *P. verticalis*; E. P. Ramsay, Proc. L. S. NS. Wales (2) 3 p. 1293. — *P. axillaris* u. *medius* abgebildet; Gould New-Guinea 25.

Pomarea erythrosticta n. sp. von Fauro, Salomon-Inseln, nahe *P. castaneiventris*; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 185.

Rhinomyias gularis n. sp. vom Kina Balu, Nord-Borneo, nahe *R. pectoralis*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6 p. 385.

Siphia platenae n. sp. und *S. ramsayi* n. sp. von Palawan; W. Blasius, Braunsch. Anzeigen 1888 No. 52 1. März p. 467 und Mitth. Orn. Ver. Wien 12 p. 75 u. 74. — *S. erithacus* n. sp. von Palawan; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6 p. 199 T. 4 [identisch mit *S. platenae*].

Terpsiphone comorensis abgebildet; Nouv. Arch. Mus. (2) 10 T. 8.

Familie Hirundinidae.

R. B. Sharpe und C. W. Wyatt, A Monograph of the Hirundinidae or Familie of Swallows. London. — Theil 7—8 erschienen, nebst einer Karte der Verbreitung der *Psalidoprocne*-Arten. Behandelt sind: *Psalidoprocne petiti*, *albiceps*, *fuliginosa*, *nitens*, *Chelidon lagopus*, *Hirundo sclateri*, *G. smithii*, *Atticora melano-leuca*, *A. fucata*, *Pterochelidon swainsoni*, *P. fluvicola*, *Stelgidopteryx ruficollis*.

Familie Eriodoridae.

P. L. Sclater, Catalogue of the Birds in the British Museum. Vol. 14 London 1888. — Enthält die: *Tyrannidae* mit 4 Unterfamilien: *Taeniopterinae*, *Platyrrhynchinae*, *Elaineinae* und *Tyranninae*, 78 Gattungen und 412 Arten, die *Oxyrrhynchidae* (3 Arten, 1 Gattung), die *Pipridae* mit 2 Unterfamilien: *Piprinae* und *Ptilochlorinae* (19 Gattungen und 70 Arten), die *Cotingidae* mit 6 Unterfamilien: *Tityrinae*, *Lipauginae*, *Attilinae*, *Rupicolinae*, *Cotinginae* und *Gymnoderinae* (29 Gattungen und 110 Arten), die *Phytotomidae* (1 Gattung, 4 Arten), die *Philepittidae* (1 Gattung, 2 Arten), die *Pittidae* (4 Gattungen, 50 Arten), die *Xenicidae* (2 Gattungen, 3 Arten), die *Eurylaemidae* mit 2 Unterfamilien: *Calypptomeninae* und *Eurylaeminae* (7 Gattungen und 11 Arten).

Acanthidositta chloris abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 1.

Coracopitta g. n. Typus: *Pitta lugubris* Rosenb.; P. L. Sclater, Cat. Brit. Mus. 14 p. 449.

Dichrozona im Bericht 1887 s. 145 verstellt, gehört unter Familie Eriodoridae.

Myrmeciza boucardi n. sp. von Bogota, ähnlich *M. longipes*; H. v. Berlepsch, Ibis (5) 6 p. 129.

Phlogopsis im Bericht 1887 s. 145 verstellt, gehört unter Familie Eriodoridae. *Rhegmatorhina* desgl.

Xenicus gilviventris u. *longipes* abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 1.

Familie Anabatidae.

Dendrocolaptes variegatus n. sp. von Costa Rica, ähnlich *D. puncticollis* Scl.; R. Ridgway, Proc. U. St. N. Mus. 11. p. 546.

Dendroornis punctigula n. sp. von Costa Rica, ähnlich *D. triangularis* (Lafr.); R. Ridgway, Proc. U. St. N. Mus. 11 p. 544.

Drymornis bridgesi abgebildet; P. L. Sclater, Argent. Orn. 1 T. 10.

Furnarius cristatus n. sp. von Cordoba, Argentinien, verschieden von *F. tricolor* von Bolivien; H. Burmeister, Ibis (5) 6 p. 495.

Homorus lophotes abgebildet; P. L. Sclater, Argent. Orn. 1 T. 9.

Phacellodomus straticollis (d'Orb. et Lafr.), nicht *P. ruber* d'Orb. in Argentinien; P. L. Sclater, Ibis (5) 6 p. 467.

Picilaptes gracilis n. sp. von Costa Rica, ähnlich *P. lacrymiger* Bp.; R. Ridgway, Proc. U. St. Nat. Mus. 11 p. 542.

Sclerurus canicularis n. sp. von Costa Rica, ähnlich *S. albogularis* Sws.; R. Ridgway, Proc. U. St. Nat. Mus. 11 p. 542.

Synallaxis coryi n. sp. von Venezuela, nahe *S. fuliginosa* Lafr.; H. v. Berlepsch, Auk 5 p. 458.

Xiphocolaptes migrans costaricensis n. subsp. von Costa Rica; R. Ridgway, Proc. U. St. Nat. Mus. 11 p. 541.

Familie Tyrannidae.

Vergl. P. L. Sclater, Cat. Brit. Mus. 14 unter Eriodoridae.

Agriornis pollens, insolens und *solitaria* abgebildet; P. L. Sclater, Cat. Brit. Mus. 14 T. 1—3.

Caenotriccus n. g. Typus: *Muscicapa (Todirostrum) ruficeps* Lafr.; P. L. Sclater, ebenda p. 86.

Camptostoma flaviventre Scl. Salv., identisch mit *Ornithion pusillum* (Cab. Heine); Godman u. Salvin, Centr. Amer. Avers. 2 p. 30—31.

Ceratopipra iracunda abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 19.

Chloropipo holochlora n. sp. von Columbia und Amazonia, nahe *Ch. uniformis*; P. L. Sclater, Cat. Brit. Mus. 14 p. 287.

Cnipodectes subbrunneus abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 16.

Elainea barbadensis n. sp. von Barbadoes, West-Indien, nahe *E. martinica*; Ch. B. Cory, Auk 5 p. 47. — *E. olivina* abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 12. — *E. arenarum* abgebildet; Godman u. Salvin, Centr. Amer. T. 36. — *E. ridleyana* n. sp. von der Insel Fernando Noronha, nahe *E. pagana*; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 107.

Empidochanes salvini n. sp. von Venezuela und Brit. Guiana, nahe *E. poecilurus*; P. L. Sclater, Cat. Brit. Mus. 14 p. 218.

Empidonax cineritius n. sp. von Unter Californien, nahe *E. difficilis*; W. Brewster, Auk 5 p. 90.

Euscarthmus impiger u. *russatus* abgebildet; P. L. Sclater, l. c. T. 9.

Heterocercus aurantiivertex abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 23.

Heteropelma flavicapillum, igniceps und *wallacii* abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 22, 21 u. 20.

Leptopogon erythrops abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 10.

Leptotriccus supercilii abgebildet; Godman u. Salvin, Centr. Amer. T. 36.

Mitrephanes phaeocercus tenuirostris n. subsp. von Sonora, West. Mexico; W. Brewster, Auk 5 p. 137.

Muscivora occidentalis abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 15.

Myiarchus berlepschii n. sp. von St. Kitts, West-Indien, ähnlich *M. oberi*; Ch. B. Cory, Auk 5 p. 266.

Myiobius flavicans u. *roraimae* abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 17 u. 18. — *M. ridgwayi* n. sp. von Rio Janeiro, nahe *M. xanthopygus*; H. v. Berlepsch, Auk 5 p. 457.

Myiopagis n. g. Typus: *Elainea placens* Scl.; Godman und Salvin, Centr. Amer. Aves. 2 p. 26.

Ochthodiaeta fusco-rufus abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 5.

Ochthoeca leucometopa, citrinifrons und *pulchella* abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 6—7.

Ochthornis g. n. Typus: *Elainea littoralis* Pelz.; P. L. Sclater, Cat. Brit. Mus. 14 p. 31.

Platyrrhynchus flavigularis u. *albigularis* abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 8.

Rhynchocyclus fulvipectus abgebildet; ebenda T. 13.

Sirystes albocinereus abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 14.

Sublegatus glaber Scl. Salv. identisch mit *Elainea arenarum* Salv.; Godman und Salvin, Centr. Amer. Aves 2 p. 37.

Taenioptera holospodia abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 4. — *T. rubetra* abgebildet; P. L. Sclater, Argent. Orn. 1 T. 7.

Tyranniscus cinereiceps und *gracilipes* abgebildet; P. L. Sclater, Cat. Brit. Mus. 14 T. 11.

Tyrannulus semiflavus abgebildet; Godman u. Salvin, Centr. Amer. T. 36.

Familie Ampelidae.

Vergl. P. L. Sclater unter Eriodoridae.

Hadrostomus homochrous abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 24

Jodopleura leucopygia abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 26.

Pachyramphus spodiurus abgebildet; P. L. Sclater l. c. T. 25.

Phytotoma rutila abgebildet; P. L. Sclater, Argent. Orn. 1 T. 8.

Tityra nigriceps n. sp. von Ecuador, ähnlich *T. personata*; J. A. Allen, Auk 5 p. 287. — *T. personata griseiceps* n. subsp. von West-Mexico; R. Ridgway, Auk 5 p. 263.

Familie Trochilidae.

Agyrtia allenii n. sp. von Yungas, Bolivien, ähnlich *Thaumantias caeruleiceps* Gould; G. Elliot, Auk 5 p. 263.

Trochilus violajugulum n. sp. von Santa Barbara, Cal., ähnlich *T. anna*, J. A. Jeffries, Auk 5 p. 168–169.

Uranomitra ellioti Berlp. identisch mit *U. quadricolor* (Vieill.); H. v. Berlepsch, Proc. U. St. Nat. Mus. 11. p. 561.

Familie Micropodidae.

Collocalia natalis n. sp. von Christmas-Insel (Indischer Ocean), nahe *C. neglecta* Gray; J. Lister, Proc. Z. S. London p. 520.

Cypselus shelleysii n. sp. von Schoa, nahe *C. apus*; T. Salvadori, Ann. Mus. Civ. Genova (2) 6 p. 227. — *C. myoptilus* n. sp. von Schoa; ebenda p. 228.

Familie Caprimulgidae.

Chordeiles chapmani n. sp. von Florida, Charaktere der drei Arten *popetue*, *sennettii* und *henryi*; E. Cones, Auk 5 p. 37.

Nyctidromus, Dichromatie in der Gattung; G. B. Sennett, Auk 5 p. 205. — *N. albicollis merrilli* n. subsp. von Süd-Texas; G. B. Sennett, Auk 5 p. 44.

Otophanes n. g.: Bill long, narrow, slender, with tubular nostrils opening forward and outward, not upward; the gape with long, stiff, naked bristles curving downward and inward, meeting and overlapping under the chin; tarsus naked, about equal to middle toe; tail long and slightly rounded, wing comparatively short and rounded, the second and third quills equal and longest, the fourth slightly shorter, the first and fifth decidedly shorter than the fourth and equal. Plumage peculiarly soft and velvety; eyes bordered in front and above by semi-circlets of radiating feathers, the tips directed upward and outward forming distinct superciliary ruffs or shields which extend from the gape along the sides of the crown to the occiput where they terminate in tufts of elongated feathers, erectile in life and precisely similar in form and position to the ear tufts of Megascops. The genus nearest allies *Antrostomus* and *Phalaenoptilus*. Typus: *O. mcleodii* n. sp. von Mexico; W. Brewster, Auk 5 p. 88–90.

Familie Coraciidae.

Vergl. P. L. Sclater, Cat. Brit. Mus. 14, unter Eriodoridae.

Calypptomena whiteheadi abgebildet, Beschreibung des jungen ♀; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6 p. 231 T. 5.

Podargus ocellatus abgebildet; Gould, New-Guinea 24.

Familie Alcedinidae.

Halcyon vagans abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 1.

Tamysiptera microrhyncha abgebildet; Gould, New-Guinea 24.

Familie Bucerotidae.

G. E. Shelley liefert eine Uebersicht der afrikanischen Bucerotiden, Synonymie, Vorkommen, Schlüssel zum Bestimmen der Arten. Es werden die Gattungen *Bucorvus*, *Ceratogymna*, *Buceros*, *Lophoceros* und *Berenicornis* mit 30 Arten unterschieden; Ibis (5) 6 p. 47—70.

Lophoceros damarensis n. sp. von Damaraland, nahe *L. erythrorhynchus*; ebenda p. 66.

Familie Picidae.

Siehe R. W. Shufeldt oben S. 109.

Chloropicus mentalis u. *miniatus* in die Gattung *Chrysophlegma* zu stellen; E. Hargitt, Ibis (5) 6 p. 2.

Chrysophlegma urayi n. sp. von Perak, Malacca, nahe *Ch. flavinucha*; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 279.

Gecinus, E. Hargitt liefert eine Uebersicht der Gattung; ausführliche Synonymie, Beschreibung und eingehende Besprechung der Verbreitung der Arten. 16 Species werden unterschieden; *viridicanus* M. W., *jessoensis* u. *perpallidus* Stejn. werden mit *G. canus* vereinigt; Ibis (5) 6 p. 1—42, 153—193.

Picoides albidior Stejn. von Kamtschatka, Diagnose und Synonymie; Proc. U. St. N. M. 11 p. 168.

Picumnus flavotinctus n. sp. von Costa Rica, ähnlich *P. olivaceus* Lafr.; R. Ridgway, Proc. U. St. N. Mus. 11 p. 543.

Familie Capitonidae.

Megalaema pulcherrima n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6. p. 393 T. 11.

Familie Trogonidae.

Harpactes whiteheadi n. sp. vom Kina-Balu, Nord-Borneo; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6 p. 395 T. 12.

Familie Indicatoridae.

Indicator emini n. sp. von Acquatorial-Afrika; G. E. Shelley, Proc. Z. S. London p. 43 T. 3.

Familie Cuculidae.

Chrysococcyx lucidus abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 1.

Coccyzus: Geographische Verbreitung der (7) Arten, neu: *C. caroli* von Gabun, nahe *C. jacobinus*; G. C. Norman, Ibis (5) 6 p. 396—409.

Eudynamis mindanensis var. *sanghirensis* n. subsp. von Sangir; W. Blasius, Ornith 4 p. 566. — *E. orientalis*, Jugendkleid; J. Whitehead, Ibis (5) 6 p. 410. — *E. taitensis* abgebildet; W. Buller, New-Zeal. Vol. 1.

Microdynamis parva abgebildet; Gould, New-Guinea 24.

Nesocentor milo desgl.

Ordnung Psittaci.

Vergl. F. Bignon oben S. 104.

Charmosyna stellae abgebildet; Gould, New-Guinea 24.

Lorius flavo-palliatatus desgl. — *L. tibialis* desgl. 25.

Nasiterna aolae n. sp. von Guadalcanar, Salomonsinseln, nahe *N. finschi*; Ogilvie-Grant, Proc. Z. S. London p. 189, T. 10.

Nestor meridionalis u. *notabilis* abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 1.

Platycercus auriceps, *novae zealandiae* und *alpinus* abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 1. — *P. pennanti* var. *nigrescens* n. subsp. von Queensland; E. P. Ramsay, Tab. List. Austr. Birds p. 34.

Prioniturus platenae n. sp. von Palawan, ähnlich *P. discurus* Vieill.; W. Blasius, Braunschw. Anzeigen 1888 No. 37 12. Febr. p. 335. — *P. cyaneiceps* n. sp. von Palawan [identisch mit *P. platenae*]; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6 p. 194.

Psittacula: Bemerkungen zu R. Ridgway's Monographie der Gattung [vergl. Ber. 1887 p. 150]; G. Hartlaub, Ibis (5) 6 p. 493. — *P. spengeli* Hartl. vielleicht identisch mit *P. exquisita* Ridgw. und *P. cyanochlora* Natt. Mns., Hartl. mit *P. deliciosa* Ridgw.; R. Ridgway, Auk 5 p. 460–462.

Stringops habroptilus abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 1.

Familie Strigidae.

Vergl. F. E. Beddard oben S. 104.

Glaucidium gnoma hoskinsii n. subsp. von Unter-Californien; W. Brewster, Auk 5 p. 136.

Megascops aspersus n. sp. von Chihuahua, Mexico, nahe *Scops barbarus* Sc.; W. Brewster, Auk 5 p. 87. — *M. vinaceus* n. sp. von Chihuahua, Mexico, nahe *M. cooperi*; ebenda p. 88.

Ninox albaria n. sp. von Lord-Howe-Insel, nahe *N. novae-zealandiae*; E. P. Ramsay, Tab. List Austr. Birds p. 36. — *N. granti* n. sp. von Guadalcanar, Salomon-Inseln, nahe *N. punctulata*; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 183. — *N. macroptera* n. sp. von Gross Sanghir; W. Blasius, Braunschw. Anzeigen No. 9 11. Jan. 1888 p. 86. — *N. natalis* n. sp. von Christmas-Insel (Indischer Ocean), nahe *N. forbesi* Sc.; J. Lister, Proc. Z. S. London p. 527.

Sceloglaux novae zealandiae abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 1.

Scops fuliginosa n. sp. von Palawan, ähnlich *S. umbratilis*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6 p. 197. — *S. luciae* n. sp. vom Kina Balu, Nord-Borneo, ähnlich *S. rufescens*; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6 p. 478. — *S. obsoletus* Cab. identisch mit *S. brucei* (Hume); J. H. Gurney, Ibis (5) 6 p. 145. — *S. scapulatus* n. sp. von St. Thomé, kleiner als *S. capensis*, ähnlich *S. rutillus*; B. du Bocage, Journ. Sc. Math. Phys. Nat. Lisboa No. 48 1888 p. 229.

Spiloglaux novae zealandiae abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 1.

Syrnium wiepkeni n. sp. von Palawan, nahe *S. seloputa*; W. Blasius, Braunsch. Anzeigen 1888 No. 52 1. März p. 467 und Mitth. Orn. Ver. Wien 12 p. 74. — *S. whiteheadi* n. sp. von Palawan, R. B. Sharpe, Ibis (5) 6 p. 196 T. 3 [identisch mit *S. wiepkeni*].

Familie Falconidae.

Accipiter bittikoferi n. sp. von Liberia, nahe *A. hartlaubi*; R. B. Sharpe, Notes Leyden Mus. 10 p. 199–200. — *A. velox rufilatus* n. sp. vom westlichen Nordamerika und *A. cooperi mexicanus* Sws. beschrieben; R. Ridgway, Proc. U. St. N. M. 11 p. 92.

Aquila rapax in Süd-Spanien; Lilford, Proc. Z. S. London p. 248.

Astur cenchroides abgebildet; M. Menzbier, Orn. Turkestan Lf. 1 T. 3. — *A. holomelas* n. sp. (vielleicht Melanismus des folgenden), *A. woodfordi* n. sp. und *A. shebae* n. sp., ähnlich *A. dampieri*, alle drei von Guadalcanar, Salomon-Inseln; R. B. Sharpe, Proc. Z. S. London p. 182–183.

Baza leucopias n. sp. von Palawan, ähnlich *B. sumatrensis* jr.; R. B. Sharpe, Ibis (5) 6 p. 195. — *B. gurneyi* abgebildet; Gould, New-Guinea 25.

Circus gouldi abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 1.

Falco babylonicus abgebildet; M. Menzbier, Orn. Turkestan L. 1 T. 7. — *F. tinnunculus* in Massachusetts erlegt; Ch. B. Cory, Auk 5 p. 110 u. 205.

Gypaetus barbatus, s. Girtanner oben S. 118.

Haliaeetus branickii n. sp. von Korea, nahe *H. pelagicus* (Pall.); L. Taczanowski, Proc. Z. S. London p. 451.

Harpyopsis novae guineae abgebildet; Gould, New-Guinea 25.

Helotarsus leuconotus hält H. B. Tristram nur für den älteren Vogel von *H. ecaudatus*; Ibis (5) 6 p. 266.

Hieracidea novae zealandiae abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 1.

Hierofalco hendersoni abgebildet; M. Menzbier, Orn. Turkestan Lf. 1 T. 6.

Urospizias natalis n. sp. von Christmas-Insel (Indischer Ocean), nahe *U. griseigularis*; J. Lister, Proc. Z. S. London p. 523.

Familie Tetraonidae.

P. de la Llave soll neue Tetraoniden von Mexico beschrieben haben (*T. marmorata*, *cristata* u. *guttata*); La Naturaleza (Mexico) J. 1885–86 [vom Ref. nicht gesehen].

Tetrao medius ♂ × (*Tetrao tetrax* ♂ × *T. urogallus* ♀) beschrieben und abgebildet; V. v. Tschusi, Ornith. 4 p. 517–526 T. 2. — *T. urogallus*, über die Zahl der Schwanzfedern; O. v. Löwis, Zool. Gart. 29 p. 156–157.

Familie Perdiciidae.

Coturnix novae zealandiae abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 1.

Francolinus spilogaster n. sp. von Harar, Ost-Afrika und *F. castaneicollis* n. sp. von Schoa; T. Salvadori, Ann. Mus. Civ. Genova (2) 6 p. 541 u. 542.

Familie Phasianidae.

Vergl. R. W. Shufeldt oben S. 108.

Lobiphasis buhoeri, Verbreitung und Lebensweise; W. H. Treacher, Ibis (5) 6 p. 413–415.

Phasianus insignis und *satchenensis* identisch mit *Ph. shawi*; H. Seebohm, Proc. Z. S. London p. 415. — *Ph. persicus talischensis* n. subsp. von Lenkoran und *Ph. colchicus septentrionalis* u. subsp. von der Nordseite des Kaukasus zwischen schwarzem und kaspischem Meer; Th. Lorenz, Journ. Ornith. 36 p. 571–572. — *Ph. tarimensis* Przw. n. sp. von Tarim, Lob-Nor (Central-Asien), nahe *P. shawi*; Th. Pleske, Proc. Z. S. London p. 415. — *Ph. torquatus* und Verwandte: *Ph. versicolor*, *formosanus*, *decollatus*, *strauchi*, *vlangali*, *degans*; Unterschiede dieser Arten; H. Seebohm, Ibis (5) 6 p. 312–316.

Familie Opisthocomidae.

Vergl. C. G. Young oben S. 108 u. S. 135

Ordnung Gyranthes.

Carpophaga aenea var. *palawanensis* n. subsp. von Palawan; W. Blasius, Ornith. 4. p. 316. — *C. everetti* n. sp. von Nordwest-Borneo, nahe *C. pickeringi*; W. R. Ogilvie-Grant, Ann. Mag. N. H. (6.) 2 p. 351. — *C. novae zealandiae* abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 1. — *C. subflavescens* u. *C. van-wyckii* abgebildet; Gould, New Guinea 25.

Chalcophaps indica var. *sanghirensis* n. subsp. von Sangir; W. Blasius Braunschweig. Anzeigen No. 9 11. Jan. 1888 p. 86. — *Ch. natalis* n. sp. von Christmas-Insel (Indischer Ocean), zwischen *Ch. indica* u. *Ch. stephani*; J. Lister, Proc. Z. S. London p. 522.

Columba arquatrix var. *thomensis* n. subsp. von St. Thomé; B. du Bocage, Journ. Sc. Math. Phys. Nat. Lisboa No. 48 1888 p. 230–231. — *C. fasciata vioscae* n. subsp. von Unter-Californien; W. Brewster, Auk 5. p. 86. — *C. guayaquilensis* n. sp. von Guayaquil, Ecuador, nahe *C. albilinea* R. Ridgway, Proc. U. S. N. M. 11. p. 112.

Janthoenas albigularis abgebildet; Gould, New Guinea 25.

Macropygia sanghirensis abgebildet; Ornith. 4. T. 3.

Phlogoenas solomonensis n. sp. von Guadalcanar, Salomoninseln, nahe *P. johannae* Scf. von Neu Britannien; Ogilvie-Grant, Proc. Z. S. London p. 200.

Treron nasica, *griscicauda* und *nipalensis*, Unterschiede; W. R. Ogilvie-Grant, Ann. Mag. N. H. (6.) 2. p. 352. — *T. permagna* Stejn. hält H. Seebohm für nicht verschieden von *T. formosa* Swinh.; Ibis (5) 6. p. 235.

Familie Ardeidae.

Ardea bahamensis n. sp. von den Bahamainseln, nahe *A. virescens*; W. Brewster, Auk 5. p. 83. — *A. sacra* u. *egretta* abgebildet; B. New Zeal. Vol. 2. — *A. virescens frazani* n. subsp. von Unter-Californien; W. Brewster, Auk 5. p. 83

Ardeiralla woodfordi n. sp. Guadalcanar, Salomoninseln, nahe *A. flavicollis*; Ogilvie-Grant, Proc. Z. S. London p. 202.

Nycticorax mandibularis n. sp. von Guadalcanar, Salomoninseln, zwischen *N. manillensis* u. *caledonicus*; Ogilvie-Grant, Proc. Z. S. London p. 203.

Familie Balaenicipidae.

Vergl. F. E. Beddard oben S. 134.

Familie Ciconiidae.

Vergl. C. W. de Vis oben unter Palaeontologie.

Ciconia alba vom November bis April in der Kapkolonie; W. Beste Ornith. 4. p. 667.

Familie Ibisidae.

Ibis propinqua Swinh.; Identität mit *J. melanocephala* bestätigt; H. Seebohm, Ibis (5) 6. p. 473—474 [vergl. Reichenow, Journ. Ornith. 1877 p. 152].

Familie Pteroclididae.

Syrhaptus paradoxus, Auftreten 1888 in Europa: Vergl. R. Blasius oben S. 113, L. Holtz S. 113, A. B. Meyer und F. Helm S. 114, E. Noll, S. 113, P. C. Reimers, O. E. Eiffe, A. Senoner S. 113, W. B. Tegetmeier S. 113, ferner: Ibis (5.) 6. p. 375—378 u. 379. — Auftreten in Deutschland: J. Cordeaux S. 114, F. Lindner S. 114, F. Menzel u. A. S. 114, A. Reichenow S. 115, E. Schöff S. 115, C. Struck S. 115, E. Pfannenschmid S. 115, Pietsch S. 115, Tancré S. 115, E. Ziemer S. 116, ferner Monatsschr. Ver. Schutze Vogelw. 13. p. 170—172. — In Oesterreich-Ungarn: S. Brusina S. 116, v. Chernelhaza S. 116, J. Talsky S. 117. — In England: Zoologist (3.) 12. p. 233—235, 261—267, 298—301, 347—348, 388 (Nisten), 419—423, 425, 442 bis 456, 468—469. — S. auch: J. W. P. Campbell-Orde. S. 119. In Holland: H. v. Rosenberg S. 121. In Frankreich: Ch. v. Kempen S. 121, J. Vian S. 121, L. Bureau S. 121, L. Ducloy S. 121. — In Italien: L. Picaglia S. 122, Salvadori S. 122. — P. Leverkühn hat die Litteratur über die Wanderung der Steppenpöhner zusammengestellt; Monatsschr. Ver. Schutze Vogelw. 1888 p. 377—381.

Familie Turnicidae.

Turnix haynaldi n. sp. von Palawan, am nächsten *T. rufilata* Wall.; W. Blasius, Ornith. 4. p. 317.

Familie Parridae.

D. G. Elliot liefert eine Monographie der Familie Jacanidae. Gattg. *Jacana* mit den Arten *jacana*, *nigra*, und *spinosa*; *Metopidius* mit den Arten: *indicus*, *albinucha* und *africanus*; *Aphalus* g. n. für *Parra capensis* (Verf. hat übersehen, dass Cabanis für diese Art die Gattung *Microparra* aufgestellt hat), *Hydralector*, Art: *gallinaceus*; *Hydrophasianus*, Art: *chirurgus*; Ank 5. p. 288—305.

Familie Rallidae.

Vergl. R. W. Shufeldt oben S. 108, und C. W. de Vis unter Palaeontologie S. 111.

Aramides plumbeicollis n. sp. von Costa Rica; J. C. Zeledon, Anales Mus. Nacion. Costa Rica 1887 p. 131 u. 2. 1888 p. 3.

Gymnocrex plumbeiventris abgebildet; Gould, New Guinea 24.

Notornis mantelli abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 2.

Ocydromus greyi, *fuscus*, *australis* u. *brachypterus* abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 2.

Ortygometra tabuensis abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 2.

Porphyrio melanonotus abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 2.

Porzana spiloptera (Burm.) identisch mit *Rallus salinasi* Phil.; H. Burmeister, Ibis (5.) 6. p. 285.

Rallus longirostris scottii n. subsp. von der Westküste Floridas; G. B. Sennett, Auk 5. p. 305. — *R. philippensis* abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 2.

Familie Otididae.

Vergl. C. W. de Vis oben unter Palaeontologie S. 111.

Otis dybowskii, Beschreibung des ♀; L. Taczanowski, Proc. Z. S. London p. 456.

Familie Scolopacidae.

Vergl. R. W. Shufeldt oben S. 107.

H. Seebohm, The Geographical Distribution of the Family *Charadriidae* or the Plovers, Sandpipers, Snipes and their Allies. London, Sotheman & Co. [ohne Jahreszahl, 1888?] Quarto. — Behandelt in den Kapiteln 1—9 allgemeine Fragen der Klassifikation, geographischen Verbreitung, Wanderung, zoologische Regionen, Subspecies etc. Die arktische Zone wird als Verbreitungscentrum der Familie angesehen. In den folgenden Kapiteln 9—30 werden die einzelnen Gattungen und Arten charakterisirt nebst Angabe der Synonymie und Verbreitung. Verf. unterscheidet: *Charadriinae* mit den Gattungen: *Oedichenus*, *Charadrius*, *Lobivanellus*, *Vanellus*, *Cursorius* u. *Glareola* mit 110 Arten u. Unterarten; *Totaniinae* mit den Gattungen: *Himantopus*, *Haematopus*, *Ibidorhynchus*, *Numenius*, *Phalaropus*, *Totanus*, *Limosa* u. *Ereunetes*, mit 68 Arten u. Unterarten; *Scolopacinae* mit den Gattungen: *Streptopelia*, *Tringa*, *Plegadis*, *Rhynchaea*, *Scolopax*, mit 57 Arten und Unterarten. Mit zahlreichen Holzschnitten und colorirten Tafeln.

Gallinago pusilla abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 2.

Himantopus leucocephalus u. *novae zealandiae* abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 2. — *H. pectoralis* abgebildet; H. Seebohm, Charadr. T. 14.

Limosa novae zealandiae; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 2. *Plegadis mitchelli*, *cancellatus*, *leucopterus* abgebildet; H. Seebohm, Charadr. T. 16—18.

Recurvirostra novae hollandiae abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 2. *Rhynchaea semicollaris* abgebildet; H. Seebohm, Charadr. T. 19.

Symphemia semipalmata speculifera (Cuv.) für *S. s. inornata* Brewst.; J. A. Allen, Auk 5. p. 423—424.

Rostratula Vieill. 1816 älter als *Rhynchaea*; E. Coues, Auk 5. p. 204.

Scolopax frenata chilensis nom. nov. pro *Gallinago paraguayae* Vieill.; kommt nur westlich der Anden vor; H. Seebohm, Charadr. p. 496. —

S. rochusseni u. *saturata* abgebildet; ebenda T. 20—21.

Tringa ruficollis abgebildet; ebenda T. 15.

Familie Charadriidae.

Vergl. H. Seebohm unter Scolopacidae.

Anarhynchus frontalis abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 2.

Charadrius bicinctus und *obscurus* abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 2. — *Ch. rubecola*, *sociabilis*, *rufiventer*, *totanirostris*, *monachus*, *obscurus* . *tenellus* abgebildet; H. Seebohm, Charadr. T. 1—7.

Cursorius somalensis, *cinctus* u. *bitorquatus* abgebildet; H. Seebohm, Charadr. T. 11—13.

Glareola emini n. sp. von Aequatorial-Afrika, nahe *G. megapoda* Gray; G. E. Shelley, Proc. Z. S. London p. 49.

Haematopus frazari n. sp. von Unter Californien, nahe *H. palliatus*; W. Brewster, Auk 5. p. 84.

Lobivanellus albiceps u. *superciliosus* abgebildet; H. Seebohm, Charadr. T. 8—9.

Oedienemus longipes vermutlich n. sp. von N.W.-Australien; E. P. Ramsay, Tab. List Austr. B. p. 35.

Thinornis novae zealandiae abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 2.
Vanelhus cayanus abgebildet; H. Seebohm, Charadr. T. 10.

Ordnung Lamellirotres.

Vergl. R. W. Shufeldt oben S. 107.

Familie Cygnidae.

Cygnus dawidi u. *bewicki* abgebildet; Proc. Z. S. London 1887 T. 52.

Familie Anseridae.

Casarca variegata abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 2.

Familie Anatidae.

Vergl. C. W. de Vis unter Palaeontologie oben S. 111.

Anas chlorotis abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 2.

Fuligula novae zealandiae abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 2.

Hymenolaemus malacorrhynchus abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 2.

Nesonetta aucklandica abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 2.

Querquedula antarctica n. sp. von Süd-Georgien, sehr ähnlich. *Qu. eatoni*; J. Cabanis, Journ. Ornith. 36 p. 118 T. 1.

Rhynchaspis variegata abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 2.

Ordnung Steganopodes.

Vergl. R. W. Shufeldt oben S. 107.

Familie Phalacrocoracidae.

Vergl. C. W. de Vis oben S. 111 unter Palaeontologie.

Phalacrocorax varius, *imperialis*, *punctatus* und *featherstoni* abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 2.

Sula gossi Ridgw. Ms., n. sp. und *S. brewsteri* n. sp. von San Pedro Martir im Golf von Californien; N. S. Goss, Auk 5 p. 241 u. 242.

Familie Sternidae.

Sterna frontalis u. *antarctica* abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 2.

Familie Laridae.

Larus bulleri und *scopulinus* abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 2. —
L. brunneus, Nest, Eier und Dunenjunge beschrieben; R. Collett, Ibis (5) 6 p. 440—443 T. 13.

Familie Procellariidae.

Vergl. R. W. Shufeldt oben S. 107.

O. Salvin, kritische Bemerkungen über Arten der Gattungen *Puffinus* und *Oestrelata*; *Ibis* (5) 6 p. 351—360.

Aestrelata sandwichensis Ridgw. identisch mit *Ae. phaeopygia* Salv.; R. Ridgway, Proc. U. St. Nat. Mus. 11 p. 104.

Diomedea exulans abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 2.

Oceanodroma leucorhoa u. *macrodactyla* n. subsp. von Guadelupe Ins., Unter-Californien; W. E. Bryant, Bull., Calif. Ac. Sc. 2 p. 450—451.

Oestrelata affinis abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 2. — *Oe. heraldica* n. sp. von Chesterfield-Insel (W. Pacifik), ähnlich *Oe. mollis* (Gould) und *Oe. hypoleuca* n. sp. von der Krusenstern-Insel (Nord-Pacifik), ähnlich *Oe. torquata*; O. Salvin, *Ibis* (5) 6 p. 357 u. 359.

Puffinus bulleri n. sp. von Neu-Seeland; O. Salvin, *Ibis* (5) 6 p. 354 — abgebildet; W. Buller, B. New-Zeal. Vol. 2. — *P. cuneatus* n. sp. von den Krusenstern-Inseln, ähnlich *P. creatopus*; O. Salvin, *Ibis* (5) 6 p. 353. — *P. knudseni* n. sp. von Hawai (vielleicht identisch mit *P. cuneatus* Salv.); L. Stejneger, Proc. U. St. Nat. Mus. 11 p. 93.

Thyelodroma n. g. Typus: *Puffinus sphenurus*; L. Stejneger, ebenda p. 93 Note.

Familie Alcidae.

Vergl. R. W. Shufeldt oben S. 107 u. 108 und F. E. Beddard S. 104.

Alca impennis, Notizen über frühere Verbreitung; F. A. Lucas, *Auk* 5. p. 278—283. — *A. impennis*. s. F. P. Hardy, oben S. 102 u. S. 104.

Familie Spheniscidae.

Vergl. F. E. Beddard oben S. 104.

Aptenodytes forsteri, Monographie der Art, scheint nur den antarktischen Continent, Victoria-Land, zu bewohnen; P. L. Sclater, *Ibis* (5.) 6. p. 325 bis 334.

Eudyptes antipodum und *atratus* abgebildet; W. Buller B. New Zeal. Vol. 2.

Ordnung Brevipennes.

Vergl. C. W. de Vis oben unter Palaeontologie S. 111.

W. K. Parker bespricht das Vorkommen von Krallen an den Fingern der Ratitae; *Ibis* (5.) 6. p. 124—128. Mit Holzschnitten; vergl. auch oben S. 109.

Apteryx bulleri n. sp. von Nord-Insel; R. B. Sharpe, Trans. N. Z. Instit. 21. p. 224, abgebildet; W. Buller, B. New Zeal. Vol. 2. — *A. oweni* abgebildet; ebenda.

Dinornis elephantopus, *giganteus*, *maximus*, Abbildungen von Sceletteilen; W. Buller, B. New Zealand 1. u. 2.

Dromaeus patricius n. sp. foss. aus dem Posttertiär von Queensland; C. W. de Vis, Proc. L. Soc. N. S. Wales 3. p. 1290—1292 T. 36.

Bericht

über

die Leistungen in der Herpetologie während
des Jahres 1888.

Von

Dr. Oskar Boettger

in Frankfurt am Main.

Reptilia.

Literatur. Die Berichte über Vertebrata im „Zool. Jahres-Bericht für 1886 und 1887, herausgegeben von der Zool. Station in Neapel. Berlin, R. Friedländer & Sohn“ 170 und 182 pag. lieferten M. v. Davidoff & C. Emery; den Bericht für F. E. Beddard's Zoolog. Record for 1887. London, 8°: Bd. 24 des Record of Zoolog. Literature (Reptilia pag. 1—28, Batrachia pag. 28—34) erstattete wie seither G. A. Boulenger. Letzterer gibt darin zahlreiche synonymische Bemerkungen, die Ref. schon im vorjährigen Bericht benutzen konnte.

E. L. Trouessart stellt in seiner „Analyse des Travaux relatifs aux Vertébrés fossiles, publiés en 1885—87. Paris 1888, 8°. 126 pag.“ aus: *Annuaire Géol. Univ.* Bd. 3, 1887 die in den Jahren 1885—87 neu beschriebenen fossilen Reptilien und Batrachier zusammen.

P. P. C. Hoek. *Bibliographie der Fauna van Nederland.* Leiden 1888, 8°. 96 pag.

Geschichte, Sage. T. Salvadori gibt die Publicationsdaten von Bonaparte's „Iconografia della Fauna Italiana“ und eine Liste aller in den 30 Heften (1832—41) dieses Werkes abgebildeten Arten. Der alphabetische Index für die Reptilien und Batrachier findet sich auf pag. 18—21. *Boll. Mus. Zool. Anat. comp.* Torino Bd. 3, No. 48. 25 pag.

Mittheilungen über die Schlange im Mythos und Kultus der Völker macht M. Winternitz. *Mitth. Anthropol. Ges.* Wien Bd. 18, Heft 1. — Ref. in *Naturforscher* 21. Jahrg. pag. 316—318.

C. Grevé bringt kurze Notizen über Aberglauben der Russen, welcher sich an Kröten, Frösche und Ringelnatter anknüpft. *Zool. Garten* 29. Jahrg. pag. 277.

L. L. Frost theilt eine indianische Eidechsensage mit. Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 477—478.

Notizen über die Bis-Cobra, die Geschichte des Namens und die Giftigkeit, die man dieser Eidechse (*Eublepharis*) in Indien zuschreibt, bringt G. A. Da Gama. Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. Bd. 3, No. 3. — Ref. in Nature Bd. 38 pag. 624—625. — Vergl. auch unten unter Eublepharidae.

Museen. Ueber das neue Reptilienhaus im Hamburger Zool. Garten berichtet E. Friedel. Seine Einrichtung wird beschrieben und die Insassen erwähnt. Von Crocodiliern werden aufgezählt *Crocodilus vulgaris*, *Jacare latirostris* aus Argentinien und *Alligator lucius*; von Eidechsen sind *Varanus niloticus*, *Tejus teguexin*, *Iguana tuberculata* und *Cyclodus gigas*, von Schildkröten *Emys orbicularis*, *Chrysemys picta*, *Hydraspis wagleri*, *Cyclanosteus senegalensis*, *Sternotherus nigriscans* und *sinuatus*, *Testudo graeca*, *radiata*, *tabulata* und *Cinixys belliana*, von Schlangen *Boa constrictor*, *Morelia argus*, *Python molurus* und *sebae*, *Heterodon madagascariensis*, *Crotalus rhombifer*, *Vipera nasicornis* und *ammodytes* vertreten. Von Batrachiern ist bis jetzt nur *Ceratophrys ornata* vorhanden. Im Aquarium befanden sich ausserdem u. a. noch *Megalobatrachus maximus* und ein gelblich-weisser Axolotl-Blendling. Zool. Garten 29. Jahrg. pag. 46—49 und 52—53. — Ueber denselben Gegenstand macht auch H. Bolau Mittheilungen. Die Gesamtkosten des Gebäudes, das eingehend beschrieben und abgebildet wird, betrugen 17800 Mark. Sein Inhalt, der aufgezählt wird, besteht aus 105 Reptilien und 3 Batrachiern. Ebenda pag. 201—208, 3 Figg.

Von Kriechthieren erwähnt E. Friedel aus dem Kölner Zool. Garten nur *Alligator lucius* und *Chelydra serpentina*. Ebenda pag. 87.

Bei einem Besuche der Museen von Brüssel, Bonn, Berlin, Leipzig, Dresden, Prag, Wien, München, Stuttgart, Tübingen, Darmstadt, Strassburg, Paris und Boulogne hat A. Smith Woodward den Fossilresten von Wirbelthieren seine Aufmerksamkeit gewidmet und kurz darüber referiert. Von Reptilien und Batrachiern werden aus Brüssel erwähnt die Iguanodonten des Wealden und *Psephophorus rupeliensis*, von Bonn *Pterodactylus crassirostris* Goldf., von Berlin *Weissia bavarica* Branco, von Leipzig und Dresden die Sammlungen sächsischer, von Prag die böhmischer Stegocephalen und Reptilien des unteren Perm, von Wien der miocaene *Psephophorus polygonus* Seel. und die Reptilien der Gosaukreide, von München der *Compsognathus* Wagn. und zahlreiche Pterodactylen und Lacertilien, Ichthyosauren von Banz und *Lariosaurus* aus der italienischen Trias, von Stuttgart die Batrachier und Reptilien aus dem Keuper und der Lettenkohle Württembergs, *Belodon*, der Dinosaurier *Zanclodon*, *Aëtosaurus ferratus* und grosse Stegocephalen, sowie schöne Ichthyosauren aus dem Lias, von Tübingen *Zanclodon* und *Chelytherium obscurum* v. Mey. aus der Trias, Teleosauren und Ichthyosauren, sowie *Pterodactylus suevicus* und *Rhacheosaurus*, von Darmstadt die Crocodilreste von Messel und

namentlich ein vermuthlich zu *Rhamphosuchus* gehöriges Stück, von Strassburg eine schöne *Ichthyosaurus*-Flosse und von Paris u. a. die Reptilien und Batrachier aus dem Perm von Autun. Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 395—404.

Im Jahresbericht für 1887 macht Fr. von Hauer Mittheilungen über den Zuwachs der Sammlungen des Naturhist. Hofmuseums in Wien. Danach kamen in diesem Jahre hinzu 130 Arten von Kriechthieren in 341 Exemplaren, u. a. *Zamenis gemonensis* von Mehadia (Banat), *Ophisaurus apus* von Ragusa und *Liophis merremi* und *Diploglossus fasciatus* vom Corcovado bei Rio de Janeiro. Ann. Naturh. Hofmus. Wien Bd. 3.

A. M. Kulagin bringt Beschreibung und Listen der Reptil- und Batrachiersammlung des Museums der Ksl. Moskauer Universität. Nachr. (Iswest.) Ksl. Ges. Freunde Naturw., Anthr. u. Ethn. Moskau Bd. 56, Lief. 2, 4^o. 39 pag. (russ.)

Technische Hilfsmittel, Methoden. In „G. Neumayer's Anleitung zu wissenschaftl. Beobachtungen auf Reisen Bd. 2, Berlin, R. Oppenheim, 2. Aufl. 1888, 8^o“ behandelt A. Guenther auf pag. 405 bis 418 das Sammeln von Kriechthieren. Methylierter Spiritus sei nicht zu empfehlen. Durch faulende Exemplare könne der Inhalt einer ganzen sonst guten Kiste verdorben werden; bereits angefaulte Stücke eigneten sich nur noch zum Abbalgen oder zum Skelett. Als besonders sammelwerth werden bezeichnet die grossen Landschildkröten der Maskarenen, alle Trionychiden, *Sphargis*, zahlreiche Crocodiliden, *Hatteria*, *Heloderma*, *Trachycephalus*, *Oreocephalus*, *Metopoceros* und Seeschlangen. Die Rathschläge des Altmeisters der Herpetologie sind in hohem Grade beachtenswerth.

Die besten Methoden, Nervenendigungen für die mikroskopische Untersuchung mit Goldchlorid zu färben, stellt W. Kühne zusammen. Zeitschr. f. Biologie Bd. 23 (1887) pag. 1—148, Taf. A — Q. — Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. London pag. 673—674.

Werke allgemeineren Inhalts. Von „Bronn's Klassen und Ordnungen des Thierreichs Bd. 6, Abth. 3: Reptilien, bearbeitet von C. K. Hoffmann“, erschienen 1888 die Lieferungen 57—64 mit pag. 1825—1920 und Taf. 138—144. Sie enthalten den Schluss des biologischen Theiles und das Register zum dritten Abschnitt: Schlangen, sowie den Anfang der Entwicklungsgeschichte der Reptilien. Nach den nöthigen Literaturangaben folgen allgemeine Bemerkungen zur Entwicklungsgeschichte und sodann Abschnitte über Furchung, Anlage des Canalis neurentericus, Entwicklung des Mesoblasts und der Chorda dorsalis, über die ersten Leistungen der Keimblätter, über Canalis neurentericus und den Primitivstreif bei den Eidechsen und Schlangen, über Abschnürung und Krümmungen des Embryo, über die weiteren Leistungen der Keimblätter und über die Allantois. Die Tafeln 141—144 bringen durchweg Originalzeichnungen, welche jüngere Entwicklungsstadien von *Lacerta muralis* und *agilis* und von *Tropidonotus natrix* darstellen. Leipzig, C. F. Winter, 8^o.

Künstlerische lebenswahre Abbildungen u. a. von 10 Reptilien bringt „Der Zoologische Garten. Leipzig, J. J. Weber, 1888.“ Diese Tafeln in Folio sind von Specht, Mützel, Beckmann, Leutemann u. a. nach der Natur gezeichnet.

H. Lachmann. Das Terrarium, seine Einrichtung, Bepflanzung und Bevölkerung. Magdeburg, Creutz 1888, 8°. 8, 120 pag., Figg.

Allgemein Anatomisches. G. Rolleston. Forms of Animal Life. A Manual of Comparative Anatomy, with descriptions of selected types. 2nd. Edit., revised by W. H. Jackson. Oxford 1888, 8°. 938 pag., 14 Taf. Ein Handbuch der vergleichenden Anatomie wesentlich zum Gebrauch für Studierende.

In einer morphologischen Studie über den ehemaligen und den neueren Mund der Wirbelthiere bringt J. Beard weitere Beweise für die Ansicht, dass der jetzige Mund der Vertebraten eine verhältnissmässig neue Anpassung ist, und bemerkt, dass sich im Parietalauge der Reptilien und Batrachier und in den Rudimenten der Kiemen-sinnesorgane und der dazu gehörigen Ganglien bei den Reptilien Reste finden, welche die Existenz einer älteren Lageform der Mundöffnung wahrscheinlich machen. Verf. betrachtet die Hypophyse als dabei in erster Linie betheiligt. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 15—24 und Nature Bd. 37 pag. 224—227, Fig.

W. K. Parker macht in seiner Arbeit über Reste und Spuren von batrachier- und reptilartigem Bau bei den Vögeln eingehend auf das Jacobson'sche Organ und Reste einer Knorpelkapsel bei gewissen Reptilordnungen aufmerksam und bespricht den Palato-Pterygoidbogen und das Parasphenoid bei Batrachiern und Reptilien und das praenasale Rostrum bei Batrachiern und Ichthyopterygiern. Der Kopf der Vögel zeige Anklänge an den der Ichthyosaurien, Nacken und Gliedmassen an die der Plesiosaurier und die Extremitäten auch an die der Pterosaurier. Proc. Roy. Soc. London Bd. 43 pag. 397—402. — Ref. in Nature Bd. 37 pag. 501—502.

Integumentalgebilde. In einer Mittheilung „Altes und Neues über Zellen und Gewebe“ fasst Fr. Leydig seine früher gewonnenen Resultate über Schichtung des Protoplasmas zusammen. Er fand u. a. längsstreifige Sonderung des Protoplasmas in den Epidermiszellen von *Hyla arborea*, querstreifige in den Epithelzellen der Oberlippen-drüse der Schlangen und der Daumendrüse der Batrachier, durch die ganze Zelle radiärstreifige bei jungen Eierstockseiern von *Rana arvalis*, durch die Rindenschicht der Zelle radiärstreifige bei Eierstockseiern von Reptilien und netzartige Sonderung des Protoplasmas in Zellkernen und Blutkörperchen von *Molge* und Schleimzellen von *Anguis*. Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 255.

Nach G. Wolff haben alle Batrachierlarven — *Salamandra*, *Molge* — zweierlei Epidermis, flimmernde und nichtflimmernde. Bei allen ist eine ächte Cuticula vorhanden, die besonders bei *Salamandra atra* sehr deutlich ist. Nur die Epidermis der Perenni-branchiaten behält den Larvenzustand dauernd; bei den Batrachiern

mit Verwandlung ist die sich häutende Cornea die einzige Stelle, wo die Verhältnisse mit denen der Larve übereinstimmen. Auch bei den lungenathmenden Batrachiern fand Verf. eine Cuticula und ebenso bei Embryonen und bei erwachsenen Lacerten, bei den beiden letzteren auf der Epitrichialschicht. Bei Vögeln und Säugern konnte sie dagegen nicht nachgewiesen werden. Die Cuticula scheint eine wesentliche Bedingung für den Häutungsprozess zu sein; die Häutung ist eine nothgedrungene Anpassung an eine vorhandene Cuticula. Die Cuticula der Wirbelthierepidermis. Inaug.-Diss. Heidelberg 1888, 8°. 22 pag., 1 Taf. und Jena. Zeitschr. Naturw. Bd. 23 (1889) pag. 567—584, Taf. 28.

Mittheilungen über die verschiedenen Arten der Häutung im Allgemeinen und bei *Lacerta*, *Vipera* und *Megalobatrachus* im Speciellen macht M. Bartels. Er unterscheidet eine Desquamatio foliacea bei Eidechsen von der Desq. totalis bei gewissen Eidechsen und den Schlangen. Sitz.-Ber. Ges. Nat. Fr. Berlin pag. 67—69.

In seiner Arbeit über die „Pigmente der Hautdecke und der Iris“ beschreibt Fr. Leydig einen Blendling von *Coronella austriaca*, dem, im Leben durchaus hell rosenroth, alles dunkle Pigment fehlte; nur an der unteren Hälfte der Iris war eine schwache Spur von dunklem Pigment zu entdecken. Das mit der Lupe sichtbare weissliche „Pigment“ dieses Blendlings bestand, netzartig vertheilt, aus Guanin. Das Fehlen des dunklen, aber das Auftreten des Guaninpigmentes spricht dafür, dass letzteres in nothwendigerem Zusammenhang mit den Bedürfnissen des Lebens steht als ersteres. Weitere Mittheilungen pag. 247 beziehen sich auf Kalkablagerungen und harnsaure Concremente in der Haut von Reptilien und Batrachiern; pag. 252 auf das feinkörnige metallglänzende Pigment in der Iris von *Bufo* und *Bombinator*, auf das harnsäurehaltige Pigment in der Iris der Schlangen und auf den individuellen Wechsel von dessen Färbungsintensität. Endlich berichtet Verfasser zusammenfassend über das schwärzliche Pigment der Hautdecke, welches in Form verästigter Zellen auftritt, die auch pigmentlos vorkommen können, mit Bindehautzellen zusammenhängen und mit Endausläufern der Hautnerven zusammenfliessen. Auch über die Mechanik des Farbenwechsels der Haut wird pag. 255 Licht verbreitet und über die grössere Constanz der Frenalbinde und die Zwischenaugenbinde Mittheilung gemacht. Verh. Phys.-med. Ges. Würzburg N. F. Bd. 22 pag. 241—265. — Auch separ.: Würzburg 1888, 8°. 25 pag.

Skelettsystem. Ueber Reste oder Anklänge an reptilischen und amphibischen Bau im Schädel der Vögel vergl. W. K. Parker. Proc. Roy. Soc. London Bd. 43 p. 397—402.

Ueber die Veränderungen in der phylogenetischen Entwicklung des ersten und zweiten Visceralbogens, ihren Functionswechsel bei den verschiedenen Wirbelthierklassen und ihre Homologien mit den Gehörknochen macht H. Gadow Mittheilungen. Verf. nimmt sieben Stadien dieser Entwicklung an; auf dem dritten Stadium bleiben

stehen die Caudaten, auf dem vierten die Anuren; auf dem fünften, das in drei Unterabtheilungen zerfällt, stehen die Reptilien. Der ersten dieser Unterabtheilungen gehören die Geckoniden und die Rhynchocephalen an, der zweiten die übrigen Eidechsen, die Schildkröten, Crocodile und einzelne Schlangen, der dritten die übrigen Schlangen und die Chamaeleonten. Proc. Roy. Soc. London Bd. 44 p. 143—145 und Phil. Trans. Bd. 179B p. 451—485, Taf. 71—74.

In seiner Arbeit über die Anatomie der Stütz- und Bewegungsorgane der Vögel behandelt M. Fürbringer vergleichsweise auch den Brustgürtel und die Vorderextremität der Reptilien. Bijdr. Dierk. Amsterdam Bd. 15. 49, 1751 pag., 30 Taf.

A. Cuénod bespricht vergleichend die anatomischen und mechanischen Verhältnisse des Ellenbogengelenks auch bei den Reptilien und Batrachiern. Internat. Monatschr. Anat. Phys. Bd. 5 pag. 385—430, Taf. 25—27.

Ueber Reste oder Anklänge an reptilischen Bau in der Hand der Säugethiere macht H. G. Seeley bei Gelegenheit seiner Beschreibung des triassischen Säugers *Theriodesmus* Mittheilungen. Proc. Roy. Soc. London Bd. 43 p. 172.

In einem Vortrag über Handskelett und Hyperdactylie behandelt J. Kollmann eingehend auch die Organisation der Hand der Kriechthiere. Hyperdactylie sei atavistisch, nicht pathologisch; bei dem Uebergange der Fischflosse in die Batrachierhand seien einige Strahlen als Rudimente in letztere aufgenommen und von dort in die Hand der Reptilien und der höheren Wirbelthiere vererbt worden. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. p. 515—529, Taf. 2, Fig. 5 und (mit Nachtrag) Verh. Nat. Ges. Basel Bd. 8 p. 604—634. — Discussion dieses Gegenstandes von Bardeleben, Fürbringer, Leboucq u. a. vergl. Anat. Anzeiger l. c. p. 529—530. — Auch H. Leboucq berührt in seiner Notiz über das Fingerskelett der Pinnipedier und der Cetaceen die analogen Verhältnisse bei *Ichthyosaurus cornalianus* und bei den Batrachiern. Ebenda p. 530—534.

Muskelsystem. In seiner grossen Arbeit über die Anatomie der Stütz- und Bewegungsorgane der Vögel bespricht M. Fürbringer vergleichsweise auch die Muskulatur der Schulter und des Oberarms bei Crocodiliern, Lacertiliern, Rhipitoglossen, Cheloniern und Batrachiern. Bijdr. Dierk. Amsterdam Bd. 15. 49, 1751 pag., 30 Taf.

A. van Gehuchten hat den feineren Bau der gestreiften Muskelfaser einer Untersuchung unterzogen. Er bespricht die Muskeln von *Rana temporaria* und *Molge cristata* vergleichend mit denen der Reptilien und constatiert die Abweichungen der letzteren vom Froschtypus. Hauptresultat ist, dass die gestreifte Muskelzelle bei allen Wirbelthieren im Grossen und Ganzen von gleichem Bau ist. La Cellule (Louvain) Bd. 4 p. 245—316, 3 Taf.

L. Kerschner macht auf die sogen. Muskelspindeln u. a. beim Gecko und Frosch aufmerksam, welche speciale Nervenendigungen enthielten und deshalb als Specialsinnesorgane, vielleicht als Sitz

des Muskelsinns, aufzufassen seien. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 126—132 und 288—296.

Nervensystem. L. Edinger hat das Vorderhirn der Wirbelthiere einer vergleichenden Betrachtung unterzogen, um gemeinsame und trennende Merkmale bei den verschiedenen Thierklassen zu finden. Er untersucht mehr den Bauplan im Grossen, als die feinere histiologische Textur. Als Beispiele unter den Batrachiern werden Embryonen und erwachsene Thiere von *Salamandra*, *Molge*, *Amblystoma*, *Rana* und *Bufo*, unter den Reptilien *Lacerta agilis* und *viridis*, *Anguis*, *Emys* und *Tropidonotus* in Schnittserien vorgeführt, die nach der Weigert'schen Haematoxylinmethode gefärbt wurden. Das Batrachiergehirn ist das einfachste in der Wirbelthierreihe; bei ihm zuerst tritt ein Lobus occipitalis an jeder Hemisphaere auf. Seine Grundformen sind im Reptilgehirn noch nachzuweisen, aber hier tritt zum ersten Mal eine Hirnrinde auf, sowie die ersten markhaltigen Stabkranzfasern in der inneren Neurogliaschicht, die Ammonsformation und der aus ihr entspringende Fornix. Während der Hirnmantel wesentliche Veränderungen erfährt, bleibt das Stammganglion nach Lage und Bau in der ganzen Wirbelthierreihe im Wesentlichen gleich. Verf. beschreibt mehr oder weniger eingehend 1. ein basales Vorderhirnbündel [vergl. Ber. f. 1887 pag. 162], 2. und 3. ein Medianbündel und ein Mantelbündel bei den Selachiern, 4. ein Bündel der sagittalen Scheidewand bei den Reptilien, 5. Fornix und Commissura fornix, 6. die vordere Commissur mit der Portio olfactoria und 7. Corpus callosum. Abh. Senckenberg. Nat. Ges. Frankfurt Bd. 15 pag. 89—121, Taf. 1—4. — Ref. in Arch. f. Psychiatr. Bd. 20 pag. 18—20 und München. Med. Wochenschr. Jahrg. 35, No. 27.

Beiträge zur Morphologie und Entwicklungsgeschichte des Nervensystem der Wirbelthiere hat J. Beard gegeben. Untersucht wurde auch *Lacerta*, sowie *Salamandra*, *Molge* und *Rana*. Eingehend beschreibt Verf. die Kopfganglien des Frosches. Die Lateralganglien bilden sich aus der inneren Lage des Epiblasts und trennen sich von ihm, bevor die Neuralganglien sie erreichen. Diese Lateralganglien existieren also, ja ihre Anlagen übertreffen an Grösse sogar bei weitem die Neuralganglien. Das wichtigste allgemeine Resultat der Untersuchung ist, dass der Zwischenstrang grade der Theil des Epiblasts oder Ectoderms ist, der nicht an der Bildung der Cranial- oder Spinalganglien theilnimmt, dass eine Zwischenrinne im Sinne von His nicht existiert, dass aber im Gegentheil im Kopf wie im Rumpf ein Zwischenstrang vorhanden ist. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. p. 874—875 und 899—901. — Ref. in Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 1132—1134.

Vergleichende Untersuchungen über die centrale Endigung des Nervus opticus bei den Wirbelthieren hat J. Bellonci angestellt. Zu seinem ersten Typus gehören Batrachier und Reptilien, von denen er einerseits *Siredon*, *Molge*, *Bufo* und *Rana*, andererseits *Lacerta*,

Tropidonotus, *Emys* und *Testudo* geprüft hat. Verf. bestreitet die Nothwendigkeit, mit Bechterew das Vorhandensein eigener optischer Fasern anzunehmen, welche direct zum motorischen Centrum der Pupille führen; wahrscheinlich endige keine einzige Opticusfaser in anderen Gehirntheilen als im Corpus opticum. Zeitschr. Wiss. Zool. Bd. 47 pag. 6—13, 4 Figg., Taf. 1—8.

Eingehende anatomische Untersuchungen über die Nervenversorgung der Mund- und Nasenhöhlendrüsen bei den Kriechthieren hat E. Gaupp veröffentlicht. Die Beobachtungen wurden gemacht an *Salamandra maculosa*; *Rana esculenta* und *temporaria*, *Bombinator igneus* und *Bufo vulgaris*; *Testudo graeca* und *Trionyx*; *Chamaeleon vulgaris*; *Gecko guttatus* und *Lacerta agilis*; *Crocodilus vulgaris*; *Python*, *Tropidonotus natrix* und *Vipera berus*. Maxillare Oberlippendrüsen liegen nach dem Verf. im Bereich des Os maxillare bei Sauriern und Schlangen; zu ihnen gehört die Giftdrüse der Ophidier. Ihre Nerven erhalten sie vom R. maxillaris superior N. trigemini. Praemaxillare Oberlippendrüsen finden sich, scharf von ihnen gesondert, bei Eidechsen und Schlangen und werden vom R. superior desselben Nerven versorgt. Vomerale Gaumendrüsen, vom N. palatinus unmittelbar versorgt, finden sich bei Sauriern — hierher auch die „Rachendrüschen“ der Anuren und die Intermaxillardrüsen der Batrachier —, praemaxillare Gaumendrüsen, vom R. primus N. trigemini versorgt, bei Schildkröten, maxillare Gaumendrüsen, gewöhnlich aus dem Plexus sphenopalatinus versorgt, bei Sauriern und Cheloniern, und Gaumenbeindrüsen, vom R. palatinus des N. facialis innerviert, bei Anuren. Die Unterlippendrüsen der Eidechsen und Schlangen stehen sämmtlich mit dem N. alveolaris inferior in Beziehung. Drüsen des Mundhöhlenbodens, welche vom N. glossopharyngeus versorgt werden, finden sich als Zungendrüsen bei Batrachiern und Reptilien, solche, welche im Bereich des N. trigeminus und des N. facialis liegen, wahrscheinlich als Unterzungendrüsen, bei Schildkröten, Eidechsen und Schlangen. Vermuthlich ebendahin gehören auch die lateralen Zungendrüschen bei Cheloniern und Sauriern. Im Bereiche der Nasenhöhle finden sich ziemlich constant eine äussere, vom N. externus narium versorgte Drüse bei Batrachiern und Reptilien und eine septale, vom N. septi narium innervierte Drüse bei ersteren und einigen Schildkröten. Morphol. Jahrb. Bd. 14 pag. 436—489, Taf. 19, Fig. 1—6.

G. Saint-Remy hat den Bau des Filum terminale des Rückenmarks auch bei Kriechthieren geprüft und an ihm embryonale Kennzeichen gefunden. Ein Sinus terminalis fehlte den untersuchten Reptilien und Batrachiern. Internat. Monatsschr. Anat. Phys. Bd. 5 pag. 17—38 und 49—63, Taf. 1. — Ref. in Bull. Soc. Sc. Nancy (2) Bd. 9 pag. 20—21.

Vergleichende histiologische Untersuchungen über den Bau des Achsencylinders und der Nervenzellen hat J. Jakimowitsch auch an Reptilien und Batrachiern angestellt. Er erkennt den fibrillären

Bau des Achsencylinders und der Ganglienzelle an, glaubt aber, dass die Fibrillen aus einer Reihe von Nervenkörperchen bestehen. Journ. Anat. et Phys. 24. Jahrg. pag. 142—168, Taf. 7. — Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. London pag. 556.

Nach S. Pansini kommen die Golgi'schen Nervenkörperchen auch bei den Kriechthieren vor, erreichen aber erst bei den Säugern ihre höchste Complication. Boll. Soc. Nat. Napoli (1) Bd. 2 pag. 135—160, Taf. 4—7 und Riforma Medica, Roma Bd. 4 pag. 752—758.

Sinnesorgane. P. Francotte's ausführliche Mittheilungen über die Entwicklung der Epiphyse bei *Anguis* und *Lacerta* [vergl. Ber. f. 1887 pag. 163] finden sich in Arch. de Biol. Bd. 8 pag. 757—821, Taf. 39—40. — Vergl. auch unten Strahl & Martin unter *Lacertilia*, Sinnesorgane.

Aus Ph. Owsiannikow's Arbeit über das dritte Auge von *Petromyzon* ist für uns der Nachweis von Interesse, dass das Parietalorgan kein Wärmesinnesapparat gewesen sein kann. Verf. erklärt es nach Bau und Stellung für ein richtiges, wenn auch verkümmertes Sehorgan. Er untersuchte dasselbe übrigens auch bei *Phrynocephalus*, *Selkio*, *Ophisaurus*, *Anguis*, *Lacerta* und *Chamaeleon*, sowie bei *Rana*. Mém. Acad. Sc. St.-Petersbourg (7) Bd. 36, No. 9. 26 pag., 1 Taf.

R. Hanitch findet das Pinealauge bei der erwachsenen *Anguis* mehr entwickelt als beim reifen Embryo. Er hält dasselbe für ein noch functionierendes Wärmesinnesorgan. Auch bei der jungen *Vipera berus* hat Verf. ein Pinealauge beobachtet. Proc. Biol. Soc. Liverpool Bd. 3 pag. 87—95, Taf. 1.

Hierher noch A. Cionini in Rivista Speriment. Freniatr. ecc. Bd. 14 pag. 65 und J. Th. Cattie in Handel. I. Ned. Nat. en Geneesk. Congr. Amsterdam v. 30. Sept. und 1. Oct. 1887. Haarlem 1888 pag. 133. Nach ersterem ist die Epiphyse nicht dem ganzen Parietalauge, sondern bloß dem Opticus desselben homolog.

Die Arbeit von M. Duval über das dritte Auge der Wirbelthiere ist eine wesentlich compilatorische und bietet nichts Neues. Journ. de Microgr. Paris 12. Jahrg. pag. 250 ff. und 13. Jahrgang (1889), Figg.

Ueber das Verhalten der nervösen Elemente in der Retina der Reptilien bei Behandlung mit Methylenblau berichtet A. S. Dogiel, wesentlich nach Versuchen an der Schildkröte. Danach sind in der Netzhaut zwei Arten von Nervenzellen anzunehmen. Die eine Art zeichnet sich dadurch aus, dass alle Zellfortsätze sich theilen und Netzbildungen eingehen; die andere Form besitzt nicht bloß sich theilende, protoplasmatische Fortsätze, sondern auch einen ungetheilt verlaufenden Achsencylinderfortsatz, der in eine Nervenfasern übergeht. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 133—143, Fig. 2 und Wratsch 1888, No. 24 (russ.).

P. Lachi hat die Chorioidea und ihre Plexus anatomisch und entwicklungsgeschichtlich einer vergleichenden Betrachtung unterzogen. Von Reptilien wurden Schildkröte, *Lacerta*, *Zamenis*, von Batrachiern *Rana* untersucht. Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa, Mem. Bd. 9 pag. 1—96, 1 Taf.

Ueber Pigmente der Iris vergl. oben Fr. Leydig pag. 167.

Eingehende anatomische und histiologische Beobachtungen am Augenlidapparat der Schlangen und Geckonen theilt E. Ficalbi mit. Die uhrglasförmige Augendecke derselben ist eine modifizierte Schuppe; die Falten, welche diesen Meniscus begränzen, entsprechen den Intersquamalfalten. Ihrer Epidermis fehlt die „Pellicula“ bei *Zamenis* in der Mitte, bei *Tarentola* in ihrer ganzen Ausdehnung; ihr Derma enthält ein Gefässnetz. Bei *Tarentola* ist ausserdem eine palpebroide Falte zu bemerken, die aber nicht als der Anfang eines Augenlids aufzufassen ist. Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa, Mem. Bd. 9 pag. 335—355, Taf. 7.

Verdauungsorgane. G. Killian hat die Bursa und Tonsilla pharyngea entwicklungsgeschichtlich und vergleichend-anatomisch untersucht. Eine Bursa fehlte sämtlichen untersuchten Reptilien und Batrachiern; vorhanden sind Rachentonsillen bei *Crocodilus vulgaris* (Fig. 50) und *Lacerta agilis*, und Spuren derselben bei *Rana temporaria* und *Salamandra*. Morphol. Jahrb. Bd. 14 pag. 618—711, Fig. 50, Taf. 25, Fig. 49.

Kurze Notizen über die Form der Zähne bei den Reptilien gibt bei Gelegenheit seiner Besprechung des möglicherweise dualistischen Ursprungs der Säugethiere St. George Mivart. Proc. Roy. Soc. London Bd. 43 p. 373—374. — Ueber Reptilcharaktere an den Zähnen der Säugethiere macht auch H. G. Seeley interessante Mittheilungen. Namentlich werden bei dieser Gelegenheit auch Form und Bau der Zähne von *Chlamydosaurus*, *Amblyrhynchus* (Fig. 8a), *Iguana*, *Ameiva* (Fig. 8b), *Cnemidophorus*, *Tejus* (Fig. 6—7), *Dimorphodon*, *Placodus*, *Ichthyosaurus*, *Polyptychodon*, *Hyperodapedon* und der Theromoren *Cynodraco*, *Lycosaurus*, *Deuterosaurus* (Fig. 1), *Glaridodon* (Fig. 2), *Galesaurus* (Fig. 3) und *Empedias* (Fig. 4—5) besprochen. Die grösste Differenzierung der Reptilzähne findet sich nach Verf. bei den geologisch ältesten Formen, den Theromoren; doch auch neuere Gruppen, wie Crocodile und Eidechsen, zeigten auch jetzt noch erhebliche Differenzierungen. Ebenda Bd. 44 pag. 129—141, 8 Figg.

R. Boulart bestätigt die plexusartige Anordnung der Gallengänge bei Schlangen der Gattungen *Crotalus*, *Bothrops*, *Coelopeltis*, *Zamenis*, *Tropidonotus*, *Boa* und *Python*; bei *Varanus arenarius*, *bengalensis* und *bivittatus* und bei *Ophisaurus*, *Gecko*, *Eumeces* und *Lacerta* fand er eine wechselnde Anzahl von sehr feinen Gallencanälchen. Compt. Rend. Soc. Biol. Paris (8) Bd. 5 pag. 224—225. — Vergl. unten auch Beddard unter Lacertilia, Verdauungsorgane.

Mittheilungen über die Form der Kloakenöffnung bei den Schlangen — *Pelamis* — und bei den Eidechsen — *Lacerta*, *Anguis*, *Chalcides* und *Tarentola* — und über die Kloakentaschen der Schlangen und von *Tarentola* bringt E. Ficalbi. Er unterscheidet eine innere und eine äussere Kloakenöffnung, die nicht immer mit einander zusammenfallen. Die Kloakentaschen sind extracloacale Hautsäcke ohne eigentlichen Drüsenbelag, deren Epiderm aber eine Substanz abscheidet, die sich aus der Degeneration seiner Zellen bildet; bei *Tarentola* öffnen sich diese Taschen nach aussen. Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa, Proc. Verb. Bd. 6 p. 142—154.

Respirationsorgane. Notizen über die Entwicklung der Thymus bei Reptilien bringt J. F. van Bemmelen. Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (2) Bd. 1, Versl. pag. 140—142.

Circulationsorgane. „Beiträge zur vergleichenden Anatomie des Herzens der Reptilien“ brachte F. R. Gasch. Untersucht wurden *Tropidonotus natrix*; *Chamaeleon vulgaris*; *Ophisaurus apus*, *Lacerta viridis* und *agilis*; *Alligator lucius*; *Emys orbicularis*, *Chelydra serpentina* und *Chelonia mydas*, und namentlich dem Septum ventriculorum, dem Septum atriorum, der Mündung der Vena pulmonalis und den Venenmündungen im rechten Vorhofe wird Beachtung geschenkt. Verf. kommt zu dem Schlusse, dass, wenn man aus physiologischen Gründen auch vielleicht berechtigt sein mag, die „Muskelleiste“ der Eidechsen, Schlangen und Schildkröten mit dem Septum ventriculorum der Crocodile und Vögel zu vergleichen, man sie doch anatomisch nach Lage und Ausbildung nur einem Theile jener Scheidewand gleichstellen dürfe. Die übrigen zahlreichen Details sind einer kurzen Berichterstattung nicht fähig. Die Abbildungen beziehen sich auf das Herz von *Alligator* und *Tropidonotus*. Arch. f. Naturg. 54. Jahrg. Bd. 1 pag. 119—152, Taf. 11—12. — Auch separ.: Berlin, Nicolai 1888, 8°. 32 pag., 2 Taf. Inaug.-Dissert. Leipzig.

Ueber die Lageveränderungen des Herzens bei Reptilien und Batrachiern stellt M. Fürbringer theoretische Betrachtungen an. Eine hintere Gränze für solche Verschiebungen ist dem Herzen gesetzt durch die Arterien, welche die Vordergliedmaassen speisen; wenn diese Gliedmaassen fehlen, wie bei den apoden Lacertiliern, Schlangen und Caecilien kann das Herz viel weiter nach hinten rücken. Bijdr. Dierk. Amsterdam Bd. 15. 49, 1751 pag., 30 Taf.

Ueber die Bedeutung und Verwandtschaft der grossen Arterien, welche bei den Reptilien vom Herzen nach dem Kopf aufsteigen, macht J. F. van Bemmelen Mittheilungen. Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (2) Bd. 1, Versl. pag. 206—208.

In einer Besprechung der Morphologie der Vena cava inferior erörtert L. Kerschner auch die einschlägigen Verhältnisse bei Reptilien und Batrachiern. Er erklärt das Nierenfortadersystem der Batrachier als morphologisch gleichwerthig mit dem der Reptilien und betrachtet die Venae renales advehentes als bei beiden Thier-

klassen homologe Gefässe. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 815—816. — Dem widerspricht F. Hochstetter auf das Entschiedenste. Ebenda pag. 872. — Dagegen repliciert L. Kerschner. Ebenda pag. 943—947.

F. Hochstetter fand bei *Lacerta agilis* und *viridis* und bei *Chamaeleon vulgaris* am entwickelten Thier ein Gekröse der hinteren Hohlvene, wie es den vom Verf. früher nachgewiesenen Verhältnissen bei Vogel- und Säugerembryonen entspricht. Aehnliches zeigt sich bei *Emys orbicularis*, während bei *Tropidonotus* nur im Embryo sich die Anlage eines solchen Gekröses nachweisen liess. Die untersuchten Arten von *Salamandra*, *Molge*, *Proteus* und *Rana* besaßen ebenfalls ein Hohlvenengekröse, das aber, abweichend von dem der Reptilien, mit dem dorsalen Darmgekröse verwachsen ist. Ebenda pag. 965—974, Fig. 3.

W. N. Parker hat Modelle hergestellt, welche die Verschiedenheit der Arterienbögen bei den verschiedenen Wirbelthierklassen im Wesentlichen nach Baur's Zeichnungen [vergl. Ber. f. 1887 pag. 165] veranschaulichen. Nature Bd. 37 pag. 499.

In seiner Mittheilung über die Entwicklung der Arterienbögen bei den Vögeln und über ihre Beziehungen zu den Subclaviën und zu den Carotiden bespricht J. Y. Mackay eingehend auch die einschlägigen Verhältnisse bei den Crocodiliern, Cheloniern, Lacertiliern und Batrachiern. Phil. Trans. Roy. Soc. London Bd. 179B pag. 111—139, 4 Taf.

Nach ihren Untersuchungen über den feineren Bau der rothen Blutkörperchen stimmen C. Cianci und G. Angiolella besser mit Brücke als mit Rollet überein. Sie finden durch die ganze Wirbelthierreihe zwei Stoffe in den Blutkörperchen, einen, der ein Netzwerk bildet, und einen zweiten amorphen. Boll. Soc. Nat. Napoli (1) Bd. 1 (1887) pag. 67—74. — Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. London 1888 pag. 928.

Ueber Ursprung und Entwicklung der rothen Blutkörperchen hat L. Cuénot neue Beobachtungen an *Lacerta agilis*, *Tropidonotus natrix*, *Rana esculenta*, *Bufo vulgaris* und *Molge marmorata*, *cristata* und *vulgaris* angestellt. Die Milz der Kriechthiere enthält nach dem Verf. zwei Formen von Zellen, kleinere, welche die Kerne der späteren rothen Blutkörperchen sind und die Milz in einem unentwickelten Zustande verlassen, und grössere, welche bereits als fertig gebildete weisse Blutkörperchen in den Blutstrom übergehen. Die Entwicklung der rothen Blutzellen, die somit nicht in der Milz, sondern erst später in den Gefässen geschieht und in diesen beobachtet werden muss, wird weiter vom Verf. eingehend geschildert. Compt. Rend. Acad. Paris Bd. 106 pag. 673—675. — Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. London pag. 395.

Urogenitalsystem. M. Sacchi's Beitrag zur Histologie des Oviducts der Sauropsiden [vergl. Ber. f. 1887 pag. 165] ist auch in Arch. Ital. Biol. Bd. 9 pag. 267—285 abgedruckt.

Ontogenie. Vergleichende Untersuchungen über Spermatogenese der Wirbelthiere, mit besonderer Berücksichtigung der Reptilien und Batrachier, hat F. Sanfelice angestellt. Die Batrachier nehmen zwischen Fischen und Amnioten eine vermittelnde Stellung ein. Die Zellart, welche der Spermatogenese zu Grunde liegt, wird Germinalzelle genannt. Aus diesen Germinalzellen entstehen die Spermatoblasten. Die Spermatozoen stammen direct von den Kernen der letzteren ab. Die bei den Batrachiern beschriebenen polymorphen Kerne sind bei allen Wirbelthieren vorhanden. Boll. Soc. Nat. Napoli (1) Bd. 2 pag. 42—98, Taf. 2—3 und Arch. Ital. Biolog. Bd. 10 pag. 69—123, 2 Taf. — Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. London 1888 pag. 923—924.

A. Prenant veröffentlicht Beobachtungen über die Spermatogenese von *Tarentola*, *Anguis*, *Lacerta agilis* und *Vipera aspis*. Er fand an den Spermatocyten einen Nebenkern, der in den Spermatiden am Vorderende des Kerns in Gestalt eines Halbmonds liegt. Aus ihm entsteht die Kopfkappe, die schliesslich abgeworfen wird. Eingehend wird die Bildung des Spermatozoenkopfs und des Mittelstücks, das schliesslich jede Andeutung von Segmentierung verliert, verfolgt und beschrieben. La Cellule (Louvain) Bd. 4 pag. 183—195, Taf. 3. — Ref. in Compt. Rend. Soc. Biol. Paris (8) Bd. 5 pag. 3—4 und Journ. Roy. Micr. Soc. London pag. 924—925.

Vergleichende Mittheilungen über die Bildung und Differenzierung des Mesoderms bei den Wirbelthieren macht C. Rabl. Holoblastische und meroblastische Eier sind nach dem Verf. von sehr verschiedenem Werthe. Je nach der Menge des Nahrungsdotters ist die Gestaltung des Gastrulationsprocesses, mit dem die Mesodermbildung in engstem Zusammenhang steht, eine verschiedene. Die Homologien der Mesodermbildung bei Batrachiern und Reptilien werden schliesslich vom Verf. ausführlich erörtert. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 654—661, 3 Figg. und pag. 667—673.

Bemerkungen über die Epithelderivate der ventralen Darmwand hinter den Kiemenspalten bei Embryonen von Reptilien und Batrachiern und speciell über die sogen. Suprapericardialkörper bei Schlangen, Eidechsen und Batrachiern und über die Carotis externa bei Schlangen, Crocodilen und Schildkröten macht J. F. van Bemmelen. Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (2) Bd. 2, Versl. pag. 37—39.

E. Selenka hat die Gaumentasche, die er am Vorderende der Chorda dorsalis von *Didelphis* entdeckt hatte, auch bei Reptilien und Batrachiern gefunden. Biol. Centr.-Blatt Bd. 7 pag. 679—683.

Notizen über den Ursprung der Gliedmassen- und Zungenmuskulatur bei Eidechsen und Schlangen bringt J. F. van Bemmelen. Untersucht wurden Stadien mit vier und fünf Kiementaschen. Versl. Akad. Wet. Amsterdam (3) Bd. 5 pag. 202—205.

Nach Versuchen F. Sanfelice's an Amnioten und Batrachiern erfolgt die Regeneration des theilweise exstirpierten Hodens immer von praeexistierenden Geweben aus und zwar hauptsächlich ver-

mittelst der *Tunicae propriae* des Hodencanälchens und der Sertoli-schen Zellen. Arch. Ital. Biolog. Bd. 10 pag. 232—245, Taf. 8.

Biologisches. Nach R. Schneider neigen viele Gewebe der Thiere unter geeigneten Bedingungen zu einer natürlichen Resorption von Eisen. Verf. hat auch Kriechthiere in dieser Hinsicht geprüft und den Gehalt in Knorpelzellen, Knochensubstanz und Bindegewebe, in Leber, Milz und Darm von *Proteus*, in Zellkernen der Lymphkörperchen bei den Larven von *Pelobates* und *Bufo* und in den Zähnen von Batrachiern bestimmt. Der Eisengehalt mag eine gewisse Festigung der Organe bewirken und bei den Zahngebilden eine Schutzhülle darstellen. Abh. Akad. Wiss. Berlin 1888. 68 pag., 5 Taf. — Ref. in Humboldt 8. Jahrg. (1889) pag. 337—345, 1 Taf.

O. Boettger bringt, überall mit Belegen aus der transkaspischen Reptilwelt, Kapitel über den Einfluss von Klima und Boden auf die Körperbeschaffenheit und speciell Mittheilungen über Locomotionsfähigkeit, Schutzvorrichtungen gegen Temperaturwechsel und Trockenheit, Anpassungen an das Sandleben und Schutzvorrichtungen gegen Sand und Staub, Anpassungen in Färbung und Zeichnung und zum Zwecke des Nahrungserwerbs und über Sorge für die Nachkommen beim Leben in der Hungersteppe. Von besonderem Interesse dürften die vom Ref. gegebenen Erklärungen der sogenannten Ohren bei *Phrynocephalus mystaceus* pag. 969 und die Notizen über das Schrillorgan am Schwanz von *Teratoscincus* pag. 971 sein. Zool. Jahrb., Abth. f. Syst. Bd. 3 pag. 871—972.

G. Carlet gibt eine Notiz über die terrestre Ortsbewegung — Kriechen und Springen — der vierfüssigen Reptilien und Batrachier im Vergleich mit der der landbewohnenden Säugethiere. Compt. Rend. Acad. Sc. Paris Bd. 107 pag. 562—564.

P. C. Amans bespricht dagegen vergleichend die Organe und die anatomischen und mechanischen Verhältnisse der aquatilen Ortsbewegung, namentlich auch von *Rana*, *Molge* und ihren Larven, sowie das Schwimmen von *Scincus* im Sande. Ann. Sc. Nat. (7) Bd. 6 pag. 1—164, Taf. 1—6.

Ueber Fang und Handel mit Süßwasserschildkröten und Fröschen in der Provinz Venezia macht A. P. Ninni Mittheilungen. Boll. Soc. Ven.-Trent. Sc. Nat. Padova, Bd. 4 pag. 108—113.

Palaeontologisches. R. Lydekker beschenkt uns mit dem ersten der vier Theile des „Catalogue of the Fossil Reptilia and Amphibia in the British Museum (N. H.). London 1888. 28, 309 pag., Figg.“, welcher die Reste der Ordnungen Ornithosauria, Crocodilia, Dinosauria, Squamata, Rhynchocephalia und Proterosauria der Londoner Sammlung behandelt und mehr oder minder kurz beschreibt und abbildet. Die systematische Anordnung ist im Wesentlichen nach Baur's neuestem Schema 1887. Von grösseren deutschen Sammlungen enthält das Museum die Häberlein'sche 1862 von Solenhofen und die Soemmerring'sche 1827; auch die Collection Van Breda 1871

brachte viel deutsches Material. — Ref. und Zusätze s. in Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 451—453.

In einer Notiz über das Parietalauge der erloschenen Wirbelthiere [vergl. Ber. f. 1887 pag. 215] sucht E. D. Cope den Nachweis zu führen, dass die Organisation gewisser Fische aus der Kohle darauf hindeute, dass der Ursprung seitlich stehender, paariger Augen auf ein einzelnes medianes Auge zurückzuführen sei. Bei den alten nordamerikanischen Batrachiergattungen fehle das Parietalloch bei *Eryops* und *Zatrachys*; nicht beobachtet sei es bei *Trimerorhachis*, gut entwickelt bei *Cricotus*. Unter den Reptilien ist es bei *Diadectes* sehr gross, bei *Belodon* fehlt es. Weitere Notizen des Verf.'s bringen die Beschreibung eines Hirnabgusses von *Diadectes* (Taf. 16), einer Gattung, die wahrscheinlich nur das Parietalauge, keine paarigen Seitenaugen, zum Sehen benutzte. Diese Gattung lebte vermuthlich unterirdisch wie ein Maulwurf. Der Hirnabguss eines *Belodon buceros* Cope (Taf. 17—18) wird im Vergleich zu dem von *Alligator* schliesslich ebenfalls abgebildet und eingehend beschrieben. Auch hier ist die Epiphyse auffallend gross, aber ein Pinealauge ist nicht mehr in Thätigkeit gewesen. Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 914—918, Taf. 16—18.

Eine Liste der fossilen Reptilien von Dorsetshire, England, hat J. C. Mansel-Pleydell zusammengestellt. Proc. Dorset Field Club Bd. 9 p. 1—40, Figg.

G. Smets macht in seinen „Notices paléontologiques“ Mittheilungen über *Palaeophis typhoeus* Ow., *Trionyx bruxellensis* Winkl. und *Gavialis dixonii* Ow. Ann. Soc. Scientif. Bruxelles Bd. 12. — Auch separ.: Bruxelles 1888, 8°. 6 und 5 pag.

T. Brennan gibt eine Notiz über fossile Reptilien. Trans. Liverpool Geol. Assoc. Bd. 6 (1886) p. 32—38.

A. Gaudry bringt, wesentlich seine früheren 12 Arbeiten über denselben Gegenstand zusammenfassend, die Literatur (pag. 1—3) und die Beschreibung der fossilen Wirbelthiere des Unt. Perms von Autun. Eingehender behandelt er die sämmtlich zuerst von ihm beschriebenen Batrachier *Protriton petrolei* (pag. 8—20, Fig. 2—3, Taf. 9, Fig. 2—3), *Pleuronura pellati* (pag. 20—23, Fig. 4, Taf. 9, Fig. 1), *Actinodon frossardi* (pag. 23—30, 47—48 und 55—56, Fig. 5—8, Taf. 2, 8 und 11, Fig. 10), *A. brevis* (pag. 40, Fig. 13) und *Euchirosauros rochei* (pag. 45—47 u. 60—70, Fig. 14—25, Taf. 9, Fig. 4 und Taf. 11, Fig. 1—9) und die Reptilien *Stereorhachis dominans* (pag. 50—52 und 70—75, Fig. 26—30) und *Haptodus baylei* (pag. 56—60, Taf. 1). Den Schluss bilden bereits veröffentlichte allgemeine Betrachtungen über die Wirbelthierfauna des Permsystems und ihre Organisation und Entwicklung (pag. 76—90). Bull. Soc. Hist. Nat. Autun Bd. 1. — Ref. in Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 164—168, 4 Figg., wo *Haptodus* mit grosser Wahrscheinlichkeit den Proterosauriern, *Stereorhachis* den Clepsydriden unter den Theromoren zugewiesen wird.

Mittheilungen über die Reptilfauna des oberen Portlandien (Ob. Jura) von Boulogne-sur-Mer macht H. E. Sauvage. Lagerung und Petrefactenführung werden beschrieben und dann die einzelnen gefundenen Formen aufgezählt (s. Dinosauria, Crocodilia, Chelonia, Sauropterygia und Ichthyopterygia). Bull. Soc. Géol. France (3) Bd. 16 pag. 623—632, Taf. 11—12.

Aus dem Ob. Jura von Fritzow bei Cammin erwähnt W. Dames Zähne eines *Machimosaurus*, kleiner als *M. hugii*, *Plesiochelys*-ähnliche Schildkrötenreste und einen Zahn von *Megalosaurus* n. sp. Zeitschr. D. Geol. Ges. Berlin Bd. 40 pag. 777—778.

A. Smith Woodward giebt eine Aufzählung aller aus der englischen Kreide bekannten Wirbelthiere. Die Schildkröten sind vertreten durch zwei Gattungen mit je einer Art, die Sauropterygier durch zwei Gattungen mit 4, resp. 5 Arten, die Ichthyopterygier durch eine Gattung mit einer Art, die Pythonomorphen durch eine Gattung mit einer Art (*Mosasaurus anceps* Ow.), die Eidechsen durch drei Gattungen mit 3 Arten, die Ornithosaurier durch eine Gattung (*Ornithochirus*) mit 3 Arten und die Dinosaurier durch eine Gattung mit einer Art (*Acanthopholis horrida* Huxl.). Alle Synonyme und ein analytischer Schlüssel zur Auffindung der Gattung sind beigegeben. Die sogen. *Emys benstedti* Mant., die Rüttimeyer für eine junge Süßwasserschildkröte hielt, wird mit Owen als erwachsene marine Schildkröte unter dem Namen *Cimolochelys* aufgeführt. Proc. Geol. Assoc. Bd. 10 pag. 274—285, 1 Taf. — Ref. in N. Jahrb. f. Min. 1888 II pag. 474—475. — Eine etwas modificierte, verbesserte Liste, in der die obengenannte Dinosauriergattung fehlt, findet sich in Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 139—142.

Croizier's Notiz über einen seltenen Saurier der Kreide von Südwest-Frankreich hat mir nicht vorgelegen. Act. Soc. Linn. Bordeaux Bd. 40, Act. pag. 30.

Die Puerco-Epoche in Nordwest-Neumexico und Südwest-Colorado hat nach E. D. Cope bis jetzt Reste von 3 Crocodiliern, 5 Cheloniern 3 Rhynchocephalen und einer Schlange geliefert. Alle sind specifisch von Arten tieferer oder höherer Schichten verschieden. Von Gattungen reicht dagegen *Champsosaurus* und *Compsemys* bis in die Laramie-Kreide zurück, und wahrscheinlich auch *Dermatemys*, die durch das Wasatch- und Bridger-Eocaen bis in die Jetztzeit geht. Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 161—163.

Derselbe zählt in seiner Synonymie der Wirbelthierfauna der untereocaenen Puerco-Schichten Neumexicos und Colorados p. 301—302 von Crocodiliern auf 3 *Crocodylus* sp., von Schildkröten *Plastomenus? communis* Cope, *Chelydra crassa* n. sp., *Compsemys*, *Emys* und *Trionyx* sp., von Rhynchocephaliern *Champsosaurus australis*, *puercensis* und *saponensis* Cope und von Schlangen *Helagras prisci-formis* Cope. Trans. Amer. Phil. Soc. Bd. 16 pag. 298—361, Taf. 4—5.

In H. Filhol's Studie über die Wirbelthiere aus dem Mittel-eocaen von Issel, Dép. Aube, findet sich die kurze Beschreibung

der von dort früher angezeigten [vergl. Ber. f. 1886 pag. 153] Schildkröten- und Krokodilreste. Mém. Soc. Géol. France (3) Bd. 5 pag. 173—174.

K. A. Weithofer erwähnt aus tertiären Braunkohlen von Casteani in Toscana kurz Reste von *Emys* und *Crocodylus*, aus Montebamboli Knochen von zwei fraglichen *Trionyx*-Arten und einem Saurier. Boll. R. Com. Geol. Ital. (2) Bd. 9 pag. 366 und 367.

In seiner Arbeit über die Entstehung und das Alter der Pampasformation in Argentinien bespricht Santiago Roth auch die phocaenen Schichten von Entre Rios, aus denen pag. 415 *Emys paranensis* Brav., *Crocodylus australis* Brav. und eine Schlange angeführt werden. Zeitschr. D. Geol. Ges. Berlin Bd. 40 pag. 375—464.

Faunistisches. Die Menagerie der Zool. Society in London erhielt 1888 von Cradock, Capcolonie, *Testudo tentoria* und *fiski* pag. 674, aus Marocco *Vipera arietans* und *Naja haje* p. 684, aus Mattogrosso, Brasilien, *Testudo carbonaria* und von Durban, Natal, *Pyrus arachnoides* pag. 686. Proc. Zool. Soc. London 1888.

Ueber die geographische Verbreitung von Reptilien macht H. W. Feilden eine Mittheilung, die mir nicht zugänglich gewesen ist. Zoologist (3) Bd. 12 pag. 236—237.

Palaearktische Region. A. König gibt als Anhang seiner Avifauna von Tunis auch eine Liste der von ihm gesammelten Kriechthiere. Es sind von Reptilien aus Tunis: *Testudo ibera* Pall., *Clemmys leprosa* Schwgg.; *Lacerta ocellata* Daud. var. *pater* Lat., *Psammodromus algirus* L., *Ophiops occidentalis* Blgr., *Eremius gutturalis* Licht., auch in der Oase Gabes, *Acanthodactylus vulgaris* D. B. neu für Tunis, *pardalis* Licht. Gabes und *boskianus* var. *aspera* Aud. Gabes, *Seps chalcides* Bon., *Chalcides ocellatus* Forsk., *Hemidactylus verruculatus* Cuv., *Tarentola mauritanica* L.; *Chamaeleon vulgaris* L.; *Naja haje* Merr., *Coelopeltis monspessulana* Herm. typ. und var. *neumayeri* Fitz., *Zamenis hippocrepis* Wgl., *Tropidonotus vipereus* Boie und *Psammophylax cucullatus* Geoffr. und aus Tripolitani: *Varanus arenarius* D. B., *Acanthodactylus pardalis* Licht. und *scutellatus* Aud., sowie *Chamaeleon vulgaris* Daud. Allen aufgezählten Arten sind kurze Bemerkungen über Art des Aufenthalts, Lebensweise und vielfach auch genaue Fundorte beigegeben. Calanis' Journ. f. Ornith. 36. Jahrg. pag. 299—304.

F. Lataste's Notiz über ein für die algerische Fauna interessantes Reptil ist dem Ref. nicht zugänglich gewesen. Bull. Assoc. Franç. Adv. Sc. Congrès d'Oran d. 30. mars 1888.

H. Simroth bringt Mittheilungen über die Kriechthiere der Azoren. Ursprünglich fehlten den oceanischen Inseln alle Landreptilien. Dass Seeschildkröten vorkommen, ist sicher; Drouët gibt *Chelonia mydas* an. Verf. fand *Lacerta dugesi* M.-Edw. auf Graciosa, Terceira und S. Miguel; die Ausbreitung derselben, sei es von Madeira, sei es von Graciosa aus, scheint auf die anderen Inseln erst in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vor sich gegangen zu sein.

Eine zweite *Lacerta* auf Graciosa, von Walker als *viridis* bezeichnet, bleibt unaufgeklärt. Arch. f. Naturg. Jahrg. 1888 I pag. 201—202.

C. C. Hopley. British Reptiles and Batrachians. Young Collector Series. London 1888, 8°. 94 pag.

J. Chalande. Faune des Reptiles de la région sous-pyrénéenne. Toulouse 1888, 8°. 13 pag.

Fr. Borchherding nennt aus der nordwestdeutschen Tiefebene vom Zwischenahner See, Grossh. Oldenburg, *Lacerta agilis* und *vivipara*, *Anguis*, *Tropidonotus natrix* und *Vipera*. Abh. Nat. Ver. Bremen Bd. 10 pag. 335—367.

W. Wolterstorff gibt ein Verzeichniss, sowie die Anleitung zur Bestimmung der Reptilien und Batrachier der preuss. Prov. Sachsen. Von ersteren werden aufgezählt *Lacerta viridis*, angeblich bei Helmstedt und Quenstedt, *L. agilis* mit var. *rubra* und *L. vivipara*, *Anguis*, *Tropidonotus natrix* und *Coronella* verbreitet, und *Vipera berus* im Gebirge am Thüringer Wald, Kyffhäuser und Harz. Zeitschr. Ges. Naturw. (Halle) Bd. 61 pag. 1—38.

In seiner Wirbelthierfauna von Kreuznach bietet uns L. Geisenheyner eine lehrreiche Skizze der Kriechthierwelt des Nahe-thals. Sehr gute Bestimmungstabellen aller verzeichneten Arten sind beigegeben; den deutschen Localnamen ist besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Reptilien sind pag. 46—72 abgehandelt, 2 Figg. Aus der Gegend werden beschrieben *Lacerta viridis*, deren letzte Stationen im Nahethal die Berge um Kreuznach und Münster sind, und für die die Form des Occipitalschildes als diagnostisches Merkmal herbeigezogen wird, *L. agilis*, *vivipara* und *muralis* im Nahethal bis Kirn aufwärts, *Anguis fragilis* mit zwei neuen Varietäten, *Coronella austriaca*, *Tropidonotus natrix* selten, *tesselatus* häufig, aber Naheaufwärts nur bis Niederhausen. Wird meterlang und fast 5 cm im Durchmesser. Die var. *hydrus* wird nach eingehenden Beobachtungen verworfen. Ueber die Lebensweise dieser Art wird ausführlich berichtet. *Vipera* fehlt; wirklich constatirt sei *V. berus* in der Rheinprovinz nur bei Neschen an der Wied, Buchholz (Bürgermeisterei Neustadt und Asbach), Trier [mir am letzterem Orte verdächtig! Ref.] und Pfaffendorf oberhalb Ehrenbreitstein. Wirbelthierfauna von Kreuznach I. Th.: Fische, Amphibien, Reptilien. Progr. No. 418 Gymn. Kreuznach 1888. 73 pag.

A. von Mojsisovics behandelt in einer Studie über „die geographische Verbreitung einiger westpalaearktischer Schlangen“ unter besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens in Oesterreich-Ungarn eingehend das Wohngebiet von *Typhlops vermicularis*, *Eryx jaculus*, *Tropidonotus natrix* (im Alpengebiet, so bei Graz, auch eine einfarbig schwarze Form; var. *persa* Pall. bei Mohács), *viperinus* und *tesselatus* var. *hydrus* (in Oesterreich allgemein verbreitet und vielleicht nur in einem Theil von Galizien und der Bukowina fehlend), *Zamenis gemonensis* mit ihren vars. *carbonaria* Fitz., *trabalis* Pall. und *viridiflava* Laur., *Z. dahli* und *hippocrepis*, *Elaphis cervone* (Vor-

kommen bei *Mehadia fraglich*), *sauromates* und *dione*, *Coluber quadridelineatus*, *aesculapii* (Verf. tritt für active Wanderung dieser Art ein; in Steiermark hauptsächlich im Murthale), *Rhinechis scalaris*, *Coronella austriaca* (für Notthafft's Angabe, dass *Vipera berus* und *Coronella* in einem und demselben Terrain sich ausschliessen, werden bestätigende Beobachtungen aus den Santhaler Alpen und dem mittleren Murthale beigebracht), *giron dica* [Ref. hat diese von Brusina für Norddalmatien erwähnte Schlange als jungen *Coluber quateradiatus* Gmel. erkannt] und *cucullata*, *Coelopeltis monspessulana*, *Tarbophis vivax*, *Trigonocephalus halys*, *Vipera berus* (überall in Oesterreich-Ungarn mit Ausnahme des istro-dalmatischen Gebietes; Verf. fing sie nächst Baden bei Wien, im oberösterr. Hochgebirge, im Salzkammergut und an vielen Punkten in Steiermark und Kärnthen) und *berus seoanei* Lat., *aspis* L. (Trebinje in Bosnien), *ammodytes* (fehlt der südungarischen Ebene), *latastei* Bosc. und *euphratica*. Als innerhalb Oesterreich-Ungarns vorkommend werden bezeichnet *Tropidonotus natrix* und *tesselatus*, *Zamenis gemonensis* mit var. *trabalis*, *Z. dahli*, *Elaphis sauromates* und *cervone*, *Coluber quadridelineatus* und *aesculapii*, *Coronella austriaca* und *giron dica* [letzteres sicher falsch! Ref.], *Coelopeltis monspessulana*, *Tarbophis vivax*, *Vipera berus*, *aspis* [bedarf der Bestätigung. Ref.] und *ammodytes*. Mitth. Nat. Ver. Steiermark Jahrg. 1887 pag. 223—287. — Auch separ.: Graz 1888, 8°. 67 pag.

Eine neue Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens bringt E. A. Bielz. Von Reptilien werden aufgezählt *Emys orbicularis*, *Lacerta viridis* typ. und var. nov. (s. Lacertidae), *agilis*, *muralis* und *vivipara*, *Anguis fragilis* typ. und var. *eryx*, *Vipera ammodytes* und *berus*, *Coronella*, *Coluber aesculapii*, *Elaphis quateradiatus* aus den Vorbergen des Burzenlandes, im Brenndorfer Wald und Tömöscherpäss, *Zamenis gemonensis* in den südlichen Vorbergen bei Zaison, *Tropidonotus natrix* und *tesselatus* var. *hydrus* mit zahlreichen Fundorten innerhalb des Landes. Verh. u. Mitth. Siebenbürg. Ver. Naturw. Hermannstadt Jahrg. 38. pag. 106—110.

G. Entz' Beiträge zur Herpetologie Siebenbürgens beschäftigen sich mit *Vipera berus* und *ammodytes*, *Lacerta vivipara* und *muralis*, *Anguis* und der alpinen Form von *Rana temporaria*. Orvos Termész. Ertesítő Klausenburg 13. Jahrg. pag. 39—51, Taf. 4 und Revue Siebenbürg. Mus. Ver. Klausenburg Bd. 10 pag. 123—135, Taf. 4.

A. De Carlini zählt aus dem Valtellin, Oberitalien, auf *Emys orbicularis* L. (eingeschleppt); *Lacerta viridis* und *muralis* Laur. und *Anguis*; *Coronella austriaca*, *Zamenis gemonensis*, *Coluber aesculapii*, *Tropidonotus natrix* und *tesselatus*, *Vipera berus* von Sondrio, von Val Fontana und von Val Furva in 2000 m und *V. aspis* häufig aus dem Val Malenco. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Milano Bd. 31 pag. 80—83.

Von G. Kolombatowitsch erschien ein Catalogus Vertebratorum Dalmaticorum. Spalati, A. Zannoni 1888, 8°. 29 pag. [vergl. Ber. f. 1886 pag. 156].

O. Boettger zählt aus den v. Oertzen'schen und v. Maltzan'schen Reisen 11 Batrachier und 32 Reptilien von Griechenland, von den griechischen und kleinasiatischen Inseln und von Kleinasien auf und gibt eine Uebersicht über alle das griechisch-kleinasiatische Gebiet betreffende Fundpunkte dieser Arten. Von besonderem Interesse dürfte sein das Vorkommen von *Tropidonotus tessellatus* Laur. auf Creta, von *Anguis* bei Brussa, von *Lacerta dunfordi* Gthr. auf Rhodos, Symi, Samos und Nikaria, von *Algiroides nigropunctatus* D. B. auf Kefallonia, von *Ophiops* auf allen kleinasiatischen Küsteninseln, von *Mabuia septemtaeniata* Rss. auf Rhodos, von *Chamaeleon vulgaris* Daud. auf Samos, von *Coluber quadrilineatus* Pall. und *Coelopeltis* in Thessalien, letztere auch aus Kleinasien, und von *Testudo ibera* Pall. auf Kos. Ein neuer *Gymnodactylus* (s. Geckonidae). Alle aufgezählten Arten werden nach ihrer Provenienz, ob aus dem Norden, Süden, Westen oder Osten stammend, geprüft und nachgewiesen, dass z. B. Creta nur *Tarentola* aus dem Süden erhalten haben kann, während auch die meisten von Norden vordringenden Arten diese Insel nicht zu erreichen im Stande waren. Hauptresultat ist, dass die Wanderungen der griechisch-kleinasiatischen Reptilien von Westen nach Osten nahezu um das Doppelte erfolgreicher gewesen zu sein scheinen als in umgekehrter Richtung. Sitz. Ber. Akad. Wiss. Berlin pag. 139—186. — Ref. in Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 543—544.

G. A. Boulenger gibt eine Liste aller bis jetzt aus Cypern erwähnten Kriechthiere [vergl. Ber. f. 1887 pag. 171]. Es sind mit *Clemmys caspia* var. *rivulata* Val., die als neu für die Insel bezeichnet wird, 2 Schildkröten, 17 Eidechsen, 10 Schlangen und 5 Anuren, doch wird das Vorkommen von *Testudo marginata* Schoepff, *Tarentola mauritanica* L., *Anguis fragilis* L., *Blanus strauchi* Bedr., *Lacerta muralis* Laur. und *Tropidonotus tessellatus* Laur. als fraglich, das von *Lacerta vivipara* Jacq. und *Chalcides tridactylus* Laur. als sehr fraglich bezeichnet. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 505—506.

L. Krulikowski's Aufzählung der Kriechthiere der Umgegend von Sarapone ist dem Ref. unzugänglich geblieben. Bull. Soc. Oural. Jekatérinbourg Bd. 11 pag. 233—236.

O. Boettger gibt eine vorläufige Mittheilung über die Kriechthiere Transkaspiens. Aufgezählt werden ausser 2 Anuren 44 Reptilien, von denen als sicher nachgewiesen bezeichnet werden: *Testudo horsfieldi* Gray und *Emys orbicularis* L.; *Teratoscincus scincus* Schlgl., *Crossobamon eversmanni* Wgm., *Gymnodactylus caspius* Fitz., *fedtschenkoi* und *russowi* Str., *Agama sanguinolenta* Pall. und *caucasia* Eichw., *Phrynocephalus helioscopus* Pall., *interscapularis* Licht. und *mystaceus* Pall., *Ophisaurus apus* Pall., *Varanus griseus* Daud., *Eremias intermedius* Str. und *velox* Pall., *Scapteira grammica* Licht. und *scripta* Str., *Mabuia septemtaeniata* Rss., *Eumeces schneideri* Daud.; *Typhlops vermicularis* Merr., *Cyclophis fasciatus* Jan., *Lytorhynchus ridgewayi* Blgr., *Zamenis diadema* Schlgl. var. *schira-*

zana Jan, *Z. ravergeri* Mén. var. *fedtschenkoi* Str. und *Z. ventrimaculatus* Gray var. *karelini* Br., *Ptyas mucosus* L., *Tropidonotus natrix* L. var. *persa* Pall. und *Tr. tessellatus* Laur. var. *hydrus* Pall., *Taphrometopon lineolatum* Br., *Eryx jaculus* L. var. *miliaris* Pall., *Naja tripudians* Merr., *Vipera obtusa* Dwig., *Echis arenicola* Boie und je ein neuer *Phrynocephalus* und eine Colubrinengattung (s. Agamidae, Colubrinae). Sieben Arten davon sind neu für das russische Reich. Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 259—263.

Desselben ausführliche Arbeit über die Reptilien und Batrachier Transkaspiens findet sich in Zool. Jahrb., Abth. f. Syst. Bd. 3 pag. 871—972, Taf. 34. Das Material stammt von der Radde-Walterschen Expedition 1886—87; vier von O. Herz in Chorassan gesammelte Arten sind beigelegt. Die Artenliste ist oben schon mitgeteilt. Angeschlossen sind Schlussfolgerungen in Bezug auf geographische Verbreitung und Wanderungslinien. Eine transkaspiische Provinz (mit Westturkestan) wird vorgeschlagen; nur mit dem Süden (Nordpersien) bestand ein lebhafter Artenaustausch.

A. M. Nikolskij zählt aus der Balkasch-Depression 21 Reptilien und 3 Batrachier auf. Arbeit. (Trudi) St. Petersburg. Naturf. Ges. Bd. 19, Beil. II pag. 150—161 (russ.) [vergl. Ber. f. 1887 p. 172].

Nordamerikanische Region. D. S. Jordan. A Manual of the Vertebrate Animals of the Northern United States, including the District North and East of the Ozark Mts., South of the Laurentian Hills, North of the Southern Boundary of Virginia, and East of the Missouri River; inclusive of marine species. 5. Edit., entirely rewritten and much enlarged. Chicago, A. C. McClury & Co. 1888, 8°. 375 pag. Die Batrachier sind auf pag. 174—186, die Reptilien auf pag. 187—211 aufgezählt.

A. W. Butler fügt in seinen Bemerkungen zu Reptilien und Batrachiern von Indiana der Fauna dieses Staates zwei neue Eutaenien zu, die Cope neu beschrieben hat, und O. P. Hay in Nachträgen zur Liste der Reptilien von Indiana [vergl. Ber. f. 1887 pag. 172] *Cinosternum pennsylvanicum*, *Tropidonotus rigidus* und *Cnemidophorus sexlineatus*, alle auf die Gewährung von R. Ridgway hin. Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 94. — Vergl. auch A. W. Butler in Journ. Cincinn. Soc. Nat. Hist. 1887 und betreffs der neuen Eutaenien unten E. D. Cope unter Colubrinae.

Eine systematische und synonymische Aufzählung der Schlangen von Florida gibt E. D. Cope (s. unten Ophidia). Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11 pag. 381—394.

Derselbe verzeichnet die von W. Taylor in San Diego, Südwest-Texas, gesammelten Reptilien. Es sind die 4 Schildkröten *Cinosternum flavescens* Ag., *Pseudemys ornata* Gray (neu für Texas), *Cistudo ornata* Ag. und *Xerobates berlandieri* Ag.; die 14 Eidechsen *Oligosoma laterale* Say, *Eumeces obsoletus* B. G., *Cnemidophorus sexlineatus* L. und *tessellatus*, *Sceloporus? scalaris* Wgm., *variabilis* Wgm., *spinosus* Wgm., eine sp. indet. und *torquatus* Green, das neue Genus

Lysoptychus (s. *Iguanidae*), *Holbrookia propinqua* D. B. und *tezana* Trosch., *Crotaphytus collaris* Say und *Phrynosoma cornutum* Harl., und die 17 Schlangen *Tantilla gracilis* B. G. und *nigricans* Kenn., *Contia episcopus* Kenn., *Ophibolus sayi* Holbr., *Rhinochilus lecontei* B. G., *Hyposiglena ochrorhynchus* Cope, *Coluber obsoletus* Say und *emoryi* B. G., *Pityophis sayi* Schlg., *Spilotes corais* var. *erebenna* Cope, *Cyclophis aestivus* L., *Bascanium flagelliforme* Cat., *Heterodon platyrhinus* Latr., *Eutaenia marci* B. G., *Natrix rhombifera* Hall., *Elaps fulvus* L. und *Crotalus adamanteus* var. *atrox* B. G. Ebenda pag. 397—398, Taf. 36, Fig. 1.

Eine Herpetologie der Umgebung von Mexico (Valle de Mexico) veröffentlicht A. Dugès. *Naturaleza Mexicana* (2) Bd. 1 p. 97—145, Taf. 11—13.

Indische Region. Nach H. M. Phipson beherbergt die Praesidentschaft Bombay von Giftschlangen *Ophiophagus elaps*, *Naja tripudians*, *Bungarus arcuatus*, *Callophis trimaculatus* und *nigrescens*, *Daboia elegans*, *Echis carinata*, *Trimeresurus anamallensis* und *Hypnale nepa*. An der Küste finden sich *Hydrophis diadema*, *robustus*, *curtus*, *aurifasciatus*, *hippion*, *guentheri*, *lindsayi* und *chloris*, sowie *Enhydryna bengalensis* und *Pelamis bicolor*. *Nature* Bd. 38 pag. 284.

Haly beschreibt 2 neue Schlangen von Ceylon (s. *Colubrinae*). *Taprobanian* (Colombo) Bd. 3 pag. 51.

G. A. Boulenger gibt ein Verzeichniss der von L. Fea in Burma nördlich von Tenasserim gesammelten Reptilien. Er nennt, unter Angabe genauer Fundorte, 6 Schildkröten: *Testudo elongata* Blyth, *Nicoria trijuga* Schwgg., *Batagur baska* Gray, *Kachuga trivittata* D. B., *Emyda scutata* Pts. und *Trionyx formosus* Gray; 24 Eidechsen: *Hemidactylus frenatus* D. B., *gleadowi* Murr., *bowringi* Gray, *garnoti* D. B. und *platyurus* Schnld., *Gehyra mutilata* Wgm., *Gecko verticillatus* Laur., *Draco maculatus* Gray, *Calotes versicolor* Daud. und *salvator* Laur., *Tachydromus sexlineatus* Daud., *Mabuia multifasciata* Kuhl, *macularia* Blyth und *quadrifasciata* Blgr., *Lygosoma indicum* Gray, *maculatum* Blyth, *doriae*, *kakhiense* und *feae* Blgr. und *cyanellum* Stol., *Tropidophorus yunnanensis* Blgr.; 43 Schlangen: *Typhlops horsfieldi* Gray und *braminus* Daud., *Cylindrophis rufus* Laur., *Xenopeltis unicolor* Reinw., *Python molurus* L., *Simotes bicaenatus* und *theobaldi* Gthr., *Ablabes collaris* Gray, *Coluber porphyraceus* Gray, *Compsosoma radiatum* Schlg., *Ptyas mucosus* L. und *korros* Reinw., *Zuocys nigromarginatus* Blyth, *Tropidonotus quincunciatus* Schlg., *macrophthalmus* Gthr., *platyceps* Blyth, *subminiatus* Schlg., *himalayanus* Gthr., *stolatus* L. und *dipsas* Blyth, *Hypsirhina enhydryis* Schnld. *Psammodynastes pulverulentus* Boie, *Gonyosoma gramineum* Gthr., *Dendrophis pictus* Gmel., *Chrysopelea ornata* Shaw, *Tragops prasinus* Boie, *Passerita mycterizans* L., *Dipsas multimaculata* Schlg., und *ochracea* Theob., *Ophites fasciatus* And., *Lycodon aulicus* L., *Naja tripudians* Merr., *Ophiophagus elaps* Schlg., *Bungarus fasciatus* Schnld. und *semifasciatus* Kuhl, *Callophis*

maccllellandi Reinh., *Bothrops monticola* Gray und *gramineus* Shaw, sowie 2 neue Gattungen und 6 neue Arten von Schlangen (s. Colubrinae, Amblycephalidae, Viperinae). Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova (2) Bd. 6 pag. 593—604, Taf. 5—7.

O. Boettger nennt aus Bangkok, Siam, u. a. *Calotes versicolor* Daud., *Liolepis belli* Gray, *Xenopeltis unicolor* Reinw., *Tropidonotus quincunciatus* Schlgl., *Homalopsis buccata* L., *Chrysopelea ornata* Shaw und *Ulupe davisoni* Blfd. 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Naturk. 1888 pag. 54.

G. Doria beschreibt 3 neue Eidechsen der Gattungen *Harpe-saurus*, *Dendragama* n. gen. und *Lygosoma* (s. Agamidae, Scincidae) aus Sumatra und nennt *Lophocalotes luedekingi* Bleek. vom Berg Singalang, West-Sumatra. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova (2) Bd. 6 pag. 646—652, 2 Figg., Taf. 8.

J. Gogorza y González gibt Beiträge zu einer Wirbelthier-fauna der Philippinen. Aus den Museen von Madrid und von der Philippinen-Ausstellung in Madrid werden 87 Reptilien als aus dem Archipel stammend namhaft gemacht. Neu für die Fauna sind nach des Ref. Ansicht pag. 28 Sep.-Abdr. *Draco dussumieri* D. B., *Dr. quinquefasciatus* Gray (Samar), pag. 29 *Egernia cunninghami* Gray, *Lygosoma chalcides* L., pag. 30 *Calamaria vermiformis* D. B. (Samar), *Coryphodon korros* Reinw. (Manila) [= *Zaocys luzonensis* Gthr. Ref.], pag. 32 *Dipsas drapiezi* D. B. (Mindanao) und pag. 34 *Hydrophis schistosus* Daud. (Mindanao). [Der grösste Theil dieser Identificationen beruht sicher auf falscher Bestimmung. Ref.] Anal. Soc. Espan. Hist. Nat. Bd. 17 pag. 272—281 (Sep. Abdr. pag. 26 bis 34).

O. Boettger bringt in seinen Materialien zur herpetologischen Fauna von China II [vergl. Ber. f. 1885 pag. 254] eine Liste der zweiten v. Moellendorfschen, der Herz'schen und der Schmacker'schen Sendungen von Reptilien aus China. Aufgezählt und mehr oder weniger eingehend beschrieben werden *Hemidactylus frenatus* D. B., *Gecko japonicus* D. B., *swinhoei* Gthr. und *verticillatus* Laur., *Calotes versicolor* Daud., *Liolepis belli* Gray, *Tachydromus sexlineatus* Daud., *Eremias argus* Pts. typ. und var. *brenchleyi* Gthr., *Lygosoma laterale* Say und *chinense* Gray, *Tropidophorus sinicus* Bttg., *Eumeces chinensis* Gray, *Typhlops braminus* Daud., *Simotes swinhoei* Gthr., *Cyclophis major* Gthr., *Coluber rufodorsatus* Cant., *Elaphis taeniurus* Cope und *virgatus* Schlgl., letztere von Korea, *Compsosoma radiatum* Schlgl., *Cynophis moellendorffi* Bttg., *Ptyas korros* Schlgl. und *mucosus* L., *Tropidonotus quincunciatus* Schlgl., *stolatus* L. und *subminiatus* Schlgl., *Hypsirhina bennetti* Gray, *chinensis* Gray und *plumbea* Boie, *Homalopsis buccata* L., *Chrysopelea ornata* Shaw, *Dipsas multi-maculata* Schlgl., *Lycodon aulicus* L., *Pareas moellendorffi* Bttg., *Python reticulatus* Schnd., *Naja tripudians* Merr., *Ophiophagus elaps* Schlgl., *Bungarus fasciatus* Schnd. und *multicinctus* Blyth, *Hydrophis cyanocinctus* Daud., *gracilis* Shaw und *viperinus* Schm., *Pelamis*

bicolor Schnd., *Trimeresurus erythrurus* Cant. und *gramineus* Shaw. Zum Schluss wird eine Aufzählung aller Reptilien und Batrachier Chinas mit Angabe der Literatur und Fundorte pag. 103—169 gegeben, auf die Verwandtschaft dieser Fauna mit der Nordamerikas aufmerksam gemacht, erwähnt, dass die Insel Hainan bis jetzt kein einziges ihr eigenthümliches Kriechthier geliefert habe, und ein Vergleich der herpetologischen Fauna Chinas mit der der Philippinen angestellt. Ein genaues Register aller Arten und Synonyma ist der Arbeit beigegeben. 26./28. Ber. Offenbach. Ver. f. Naturk. pag. 53 bis 191, Taf. 1—2.

G. A. Boulenger beschreibt von Hongkong, Südchina, 2 neue Schlangen (s. Colubrinae). Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 43 bis 44.

A. Günther gibt Bemerkungen zu einer Sammlung Reptilien, die A. E. Pratt in dem Gebirge nördlich von Kiukiang, Ostchina, zusammengebracht hat. Die Arten, bei welchen eingehendere systematische Mittheilungen gemacht werden, sind in der folgenden Liste mit * bezeichnet. Es sind **Emys reevesi* Gray, *Trionyx sinensis* Wgm.; *Tachydromus septemtrionalis* Gthr. und *wolteri* Fisch., **Lygosoma reevesi* Gray, *Eumeces elegans* Blgr., *Gecko japonicus* D. B.; **Calamaria quadrimaculata* D. B. (auch von Hongkong), *Coluber rufodorsatus* Cant., *Elaphis dione* und *sauromates* Pall., *Zaocys dhumnades* Cant., *Ptyas korros* Reinw., **Phyllophis carinatus* Gthr., *Cyclophis major* Gthr., *Tropidonotus annularis* Hall. und *tigrinus* Boie, *Ophites septemtrionalis* Gthr., *Lycodon rufozonatus* Cant., *Bungarus semifasciatus* Kuhl, *Callophis annularis* Gthr., *Halys blomhoffi* Boie und 2 neue Schlangen (s. Colubrinae und Crotalinae). Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 165—172, Taf. 12.

O. Boettger bringt eine kleine Liste ostasiatischer Reptilien. Es sind: *Japalura polygonata* Hall. und *Eumeces marginatus* Hall. von O-sima, Liukiu-Inseln, *Lygosoma laterale* Say von Napier Island nördlich von Ningpo, *Pareus moellendorffi* Bttg. vom Lofoushan-Gebirge bei Canton und *Trimeresurus gramineus* Shaw von Süd-Formosa. Ber. Senckenberg. Nat. Ges. Frankfurt pag. 187—190.

Afrikanische Region. G. A. Boulenger verzeichnet weiter von Maskat, Arabien, [vergl. Ber. f. 1887 pag. 174] *Dermochelys coriacea* L., *Rhagerhhis producta* Pts. und eine neue *Eryx* (s. Boinae). Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 508—509.

E. H. Giglioli zählt von der Reise des Grafen A. Buturlin und des Dr. L. Traversi aus Assab auf *Hemidactylus verruculatus* Cuv., aus Schoa *Agama atricollis* Smith von Entotto, *Mabuia striata* Pts. von Let Marefa und *Boodon lemniscatus* D. B. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova (2) Bd. 6 pag. 65—67.

F. Mocquard berichtet über die Sammlung G. Révoil's in Somaliland und Sansibar. Aufgezählt und mit systematischen Anmerkungen versehen werden 20 Eidechsen, darunter *Chamaeleon gracilis* Hall., *Hemidactylus mabuia* Mor. und *frenatus* Schlg., *Agama*

rueppelli Vaill., *Latastia longicaudata* Rss., *Gongylus ocellatus* Gmel., *Eumeces sundewalli* Smith, *Euprepes punctatissimus* Smith, *comorensis* und *hildebrandti* Pts., *Ablepharus boutoni* var. *peroni* Coct. und *Agamodon anguliceps* Pts. aus Somaliland, *Chamaeleon dilepis* Leach, *Varanus niloticus* D. B. und *albigularis* Daud., sowie *Cerrhosaurus major* D. B. aus Sansibar, *Lygodactylus picturatus* Pts. aus Somaliland und Sansibar, und 3 neue Arten von *Hemidactylus*, *Eremias* und *Agamodon*; 12 Schlangen, darunter *Eryx thebaicus* Geoffr., *Coronella olivacea* Pts., *Psammophis biserialis* Pts., *Crotaphopeltis rufescens* Gmel., *Dasypeltis scabra* var. *medicii* Bianc. und *Telescopus obtusus* D. B. aus Somaliland, *Leptophis punctatus* Pts. und *Psammophis sibilans* L. aus Sansibar und *Boodon quadrilineatus* D. B. aus Somaliland und Sansibar, sowie 2 neue Gattungen von Calamarien und eine neue *Dasypeltis* (s. Geckonidae, Amphisbaenidae, Lacertidae; Colubrinae, Dipsadinae). Mém. Cent. Soc. Philomath. Paris 1888 pag. 109—134, Taf. 11—12.

Fr. Stuhlmann erwähnt beiläufig von Sansibar *Varanus niloticus*, *Crocodilus niloticus* und Larven von *Dactylethra*. Sitz.-Ber. Preuss. Akad. Wiss. Berlin pag. 1255 ff.

A. Günther nennt von Monbutt u im Obercongogebiet *Pelomedusa subrufa* Lac.; *Varanus niloticus* L., *Hemidactylus brookei* Gray, *Lygodactylus gutturalis* Boc.; *Chamaeleon senegalensis* var. *laevigata* Gray; *Typhlops eschrichti* Schlg. und *liberiensis* Hall., *Neuaterophis atratus* Pts., *Dasypeltis scabra* L., *Psammophis sibilans* L., *Atractaspis aterrima* Gthr. und *irregularis* Reinh. und eine neue *Ahaetulla* (s. Colubrinae), sowie 4 Frösche (s. Ecaudata). Von diesen 17 Arten sind 9 in Afrika weit verbreitet, 7 westafrikanisch, aber keine einzige typisch ostafrikanisch. Danach wäre die Fauna des oberen Congo in ihrem Charakter mehr west-, als ostafrikanisch. Proc. Zool. Soc. London 1888 pag. 50—51.

In seinem Beitrag zur Kenntniss der tropisch-afrikanischen Schlangen beschreibt derselbe eine grössere Anzahl von neuen Gattungen und Arten, von denen unten (s. Colubrinae, Dipsadinae, Elapinae) speciell die Rede sein soll. Er vergleicht die Formen der Seen-Districte von Centralafrika eingehend mit denen Westafrikas und des Sansibar- und Mossambique-Districts. Danach kommen von 46 centralafrikanischen Arten, deren Fundorte genau verzeichnet werden, 22 an der Westküste, 17 im Gebiet von Sansibar und 18 in Mossambique vor. Ueber ganz Tropisch-Afrika sind verbreitet die folgenden 11: *Typhlops schlegeli* Bianc., *Coronella olivacea* Pts., *Psammophis sibilans* L., *Dasypeltis scabra* L., *Bucephalus capensis* Smith, *Leptodira rufescens* Gmel. und *semiannulata* Gthr., *Boodon lineatus* D. B., *Python sebae* Gmel., *Naja nigricollis* Rhdt. und *Clotho arietans* Merr. Von den übrigbleibenden 35 Arten haben nur 11 nicht den Weg nach West- oder Ostafrika gefunden und müssen als specifisch centralafrikanisch aufgefasst werden. Von diesen 35 Species kennt man 3 von Lado und dem Nyanzasee (2

davon ostafrikanisch), 7 von Monbutt und Semmio (6 davon westafrikanisch), 11 vom Kilima-ndjaro (3 davon west-, 4 ostafrikanisch), 4 von Mpwapwa und Ugogo (1 west-, 2 ostafrikanisch), 11 vom Tanganyikasee (1 west-, 8 ostafrikanisch) und 6 vom Nyassasee (1 west-, 3 ostafrikanisch). Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 322—335, Taf. 18—19.

G. A. Boulenger beschreibt aus Madagaskar 2 neue Eidechsen, ein Chamaeleon und 4 Schlangen, von Nossibé 2 neue Chamaeleonten (s. Uroplatidae, Scincidae, Chamaeleontidae, Colubrinae und Dipsadinae). Ebenda pag. 101—107, Taf. 5—6 und pag. 22—23, Taf. 2.

Derselbe nennt *Homopus signatus* Walb. von O'Kiep, 2500', in Namaland, *Agama planiceps* Pts., sowie je einen neuen *Pachydactylus* und *Mabuia* aus Namaland, *Pythonodipsas carinata* Gthr. und eine neue *Oedura* aus Damaraland, eine neue *Vipera* aus Walfischbai, Damaraland, und *Typhlops schlegeli* Bianc., *Homalosoma variegatum* Pts. und eine neue *Elapsoidea* aus Delagoa-Bai (s. Geconidae, Scincidae, Elapinae und Viperinae). Ebenda (6) Bd. 2 pag. 136—141.

J. G. Fischer zählt aus Deutsch-Südwestafrika und speciell von Angra Pequena, | Aus, Suibes und Bethanien 8 Arten Schlangen und (abgesehen von einigen noch unbeschriebenen *Eremias*-Arten) 26 Species Eidechsen auf, von denen die ihres Fundorts wegen interessantesten hier erwähnt werden sollen. *Coronella cana* Schlg. | Aus, *Psammophis sibilans* L. var. *furcata* Pts. | Aus und Route | Aus-Bethanien, *Boodon geometricus* L. | Aus, *Naja haje* L. | Aus-Bethanien; *Chondrodactylus angulifer* Pts. | Aus-Bethanien, *Agama armata* Daud. | Aus und | Aus-Bethanien, *aculeata* Daud. und *brachyura* Blgr. | Aus, *Mabuia sulcata* Pts. var. *sevivittata* J. G. Fisch. und *M. occidentalis* Pts. | Aus-Bethanien, *M. varia* Pts. | Aus und | Aus-Bethanien, *Nucras tessellata* und *Scelotes capensis* Smith | Aus-Bethanien, *Eremias suborbitalis* Pts. | Aus und | Aus-Bethanien, *undata* Smith Angra Pequena, | Aus und | Aus-Bethanien, *capensis* Smith | Aus-Bethanien und *Scapteira knoxi* M.-Edw. | Aus. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 11.

O. Boettger gibt in Materialien zur Fauna des unteren Congo II [vergl. Ber. f. 1885 pag. 256] pag. 5—11 die Literatur über die Kriechthiere des genannten Gebietes und beschreibt sodann mehr oder weniger eingehend 5 Schildkröten: *Cinyxia erosa* Schwgg., *Pelomedusa galeata* Schpff., *Sternotherus derbyanus* Gray, *Chelone viridis* Schnd. und *Thalassochelys olivacea* Eschsch.; ein Crocodil: *Crocodilus vulgaris* Cuv.; 12 Eidechsen: *Hemidactylus mabuia* Mor., *Agama colonorum congica* Pts., *Varanus niloticus* L., *Monopeltis boulengeri* Bttg., *Gerrhosaurus nigrolineatus* Hall., *Mabuia maculilabris* und *raddoni* Gray, *Lygosoma fernandi* Burt., *Ablepharus cabindae* Boc., *Sepsina hessei* Bttg., *Feylinia currori* Gray und *macrolepis* Bttg.;

3 Rhiptoglossen: *Chamaeleon gracilis* Hall., *parvilobus* Blgr. und *dilepis* Leach; 34 Schlangen: *Typhlops eschrichti* Schl.g. und *congius* Bttg., *Xenocalamus mechori* Pts., *Coronella olivacea* Pts., *Bothrophthalmus lineatus* Pts., *Grayia triangularis* Hall., *Psammophis sibilans* L., *Dromophis angolensis* Boc., *Philothamnus dorsalis* Boc., *heterodermus* Hall., *heterolepidotus* Gthr. und *irregularis* Leach, *Hapsidophrys smaragdina* Boie, *Thrasops flavigularis* Hall. typ. und var. *pustulata* B. P., *Cryptidomus aethiops* Gthr., *Bucephalus capensis* Smith, *Dryophis kirtlandi* Hall., *Lycophidium capense* Smith vars., *Boodon lineatus* D. B. typ. und vars., *Leptodira rufescens* Gmel., *Dipsas blandingi* Hall. und *pulverulenta* Fisch., *Dasypeltis scabra* L. und vars., *Python sebae* Gmel., *Naja haje* L. var. und *nigricollis* Reinh., *Elapsoidea guentheri* Boc. und *hessei* Bttg., *Dendraspis jamesoni* Traill., *Atractaspis irregularis* Reinh. typ. und var. *congius* Pts., *Causus rhombectus* Licht., *Vipera arietans* Merr., *Atheris squamigera* Hall. und *laeviceps* Bttg., sowie 7 Anuren. Das Verhältniss von Giftschlangen zu nichtgiftigen beträgt in Niederguinea 27—30 : 100, im Untercongogebiet aber 48 : 100. Eine Vergleichstabelle zeigt, dass von den unmittelbar nördlich am Unterlaufe des Congo gesammelten Arten den Congo nach Süden 56% überschreiten, von den südlich desselben gefundenen aber 80% über den Fluss nach Norden hin gewandert sind. Der Congo hat somit, ähnlich wie der Oranje, den Werth einer secundären Trennungslinie und scheidet zwei geographische Provinzen. Mit Ostafrika hat das Untercongogebiet 50, mit dem nördlicheren Westafrika aber 70% Arten gemeinsam. Ein Register ist beigegeben. Ber. Senckenberg. Nat. Ges. Frankfurt pag. 3—108, Taf. 1—2.

Nach O. Baumann findet sich auf Fernando Póo der Varan, doch sind Crocodile unbekannt. 3 Chamaeleons; *Python* ist häufig. Eine grüne giftige Baumschlange (*Dendraspis* oder *Atheris*?) wird erwähnt. Auch Seeschildkröten sind zahlreich und legen ihre Eier am Strande. Fernando Póo und die Bube. Wien & Olmütz, Ed. Hölzel 1888, 8°. 140 pag., 16 Figg.

Von Kamerun beschreibt J. G. Fischer 2 neue Schlangen und einen neuen Laubfrosch (s. Colubrinae, Viperinae und Ranidae). Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 3—10.

Bemerkungen über einige Reptilien des Oberen Senegal macht F. Mocquard (s. Eublepharidae). Le Naturaliste 10. Jahrg. pag. 282—283.

Tropisch-amerikanische Region. J. M. Dow gibt einen kurzen Bericht über Landung des U. S. Steamers Albatross auf den Galápagos-Inseln. Die grossen Landschildkröten wurden noch in Anzahl gefunden und anscheinend 2 oder 3 neue Eidechsenarten. Nature Bd. 38 pag. 569.

Von G. Bocourt erschien die 11. Lieferung [vergl. Ber. f. 1886 pag. 162] der Mission Scientifique au Mexique et dans l'Amérique centrale. 3. Partie: Études sur les Reptiles et les Batraciens. Paris,

fol. pag. 657—696, Taf. 42—47. Sie enthält Abbildung, Beschreibung und Synonymie zahlreicher Colubriuen und einiger Boinen Mexicos und Centralamerikas, deren wichtigste unten aufgezählt werden sollen.

S. Garman bringt eine Liste der Kriechthiere von den Caymans [vergl. auch Ber. f. 1887 pag. 178] und den Bahamas. Die Verwandtschaft der Cayman-Inselgruppe ist theils cubanisch, theils jamaicanisch. Auf Cayman Brac wurden gefunden *Aristelliger praesignis* Hall., *Liocephalus carinatus* Gray, *Cyclura nubila* Gray, *Alsophis angulifer* var. nov. und 3 neue Eidechsen, auf Little Cayman 2 *Crocodilus*, *Dermochelys*, *Thalassochelys* etc., *Cyclura nubila*, 2 neue Eidechsen und *Hyla septemtrionalis* Tsch. Auf Inagua (Bahamas) leben *Liocephalus schreibersi* Gray und 2 neue Eidechsen, auf Rum Cay (Bahamas) *Liocephalus loxogrammus* Cope, 2 neue Eidechsen und *Hyla septemtrionalis*, sowie auf Andros Island (Bahamas) ein neuer *Sphaerodactylus* (s. Geckonidae, Iguanidae, Anguidae, Tejidae und Colubrinae). Bull. Essex Instit. Bd. 20 pag. 1—13.

J. G. Fischer beschreibt pag. 23 eine Collection Kriechthiere von Haiti, die Herm. Rolle gesammelt hat. Es sind, abgesehen von den unten zu erwähnenden neuen Schlangen (3) und Eidechsen (1) — s. Boinae und Tejidae —, von Schildkröten *Clemmys decussata* Bell und *rugosa* Shaw; von Eidechsen *Sphaerodactylus punctatissimus* D. B., *alopez* Cope und *oxyrhinus* Gosse, sämmtlich Cap Haitien, *Aristelliger praesignis* Hall. und *Gonatodes albogularis* D. B. Gonaives, *Anolis chlorocyanus* D. B. und *semilineatus* Cope Cap Haitien, *cybotes* Cope Cap Haitien und Sanssouci, *distichus* Cope Cap Haitien, Marmelade und Plaisance, *Ameiva chrysolaema* Cope, *Liocephalus vittatus* Hall. (mit Beschreibung der Färbung pag. 27) Cap Haitien und *schreibersi* Grav. (mit desgl. pag. 29) Gonaives, *Metopoceros cornutus* Wgl. Cap Haitien, *Diploglossus striatus* Gray (mit systematischer Bemerkung pag. 29) Gonaives; *Homalochilus striatus* Fisch. Gonaives und Cap Haitien, *Tropidophis maculatus* D. B. Cap Haitien und Milo, *Hypsi-rhynchus ferox* Gthr. (mit systematischer Bemerkung pag. 41) Cap Haitien und Gonaives, *Ahaetulla catesbyi* Schl. Cap Haitien, *Uromacer oxyrhynchus* D. B. Cap Haitien und Gonaives, *Dromicus antillensis* Schl. und *parvifrons* Cope Cap Haitien, *Dr. (Alsophis) anomalus* Cope Cap Haitien und Grande Rivière, *Typhlops lumbricalis* D. B. Gonaives und *richardi* D. B. Cap Haitien. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5.

A. Günther macht Mittheilungen über eine Sammlung von Kriechthieren aus Dominica, Westindien. Es sind die 5 Eidechsen *Thecadactylus rapicauda* Houtt., *Sphaerodactylus copei* Stdchr., *Ameiva fuscata* Garm., *Anolis alliaceus* Cope und *Mabuia agilis* Raddi, die 3 Schlangen *Liophis juliae* Cope, *Dromicus leucomelas* D. B. und *Boa diviniloquax* Laur., sowie 2 Frösche. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 362—366.

A. Ernst gibt eine Aufzählung der 41 bekannten Arten von Lacertiliern aus Venezuela. *Revista Cientif. Mus. Univ. Centr. Venezuela* Bd. 1 pag. 213—218.

G. A. Boulenger zählt von Iguarasse, Prov. Pernambuco, Brasilien auf: *Hemidactylus mabuya* Mor., *Enyalius catenatus* Wied., *Strobilurus torquatus* Wgm., *Micrablepharus maximiliani* R. L., *Amphisbaena subocularis* Pts., *Anolis fuscoauratus* D'Orb., *Stenolepis ridleyi* Blgr. und *Xenodon rhabdocephalus* Wied, sowie einen neuen Geckoniden, der als erster brasilischer *Sphaerodactylus* von besonderem Interesse ist. *Ann. Mag. N. H.* (6) Bd. 2 pag. 40—43, Taf. 3.

O. Boettger bringt einen Beitrag zur Reptilfauna des oberen Beni, Bolivia, und beschreibt kurz vom Mapiri, einem Nebenfluss des Beni: *Anolis fuscoauratus* D'Orb.; *Stenostoma albifrons* Wgl., *Geophis badius* Boie, *Coronella taeniolata* Jan, *Erythrolamprus venustissimus* Schl.g. var. *tetrazona* Jan, *Leptodira annulata* L., *Dipsas cenchoa* L., *Leptognathus catesbyi* Weig., *Oxyrrhopus petalarius* L. var. *sebae* D. B. und *O. immaculatus* D. B., *Elaps corallinus* L. und einen neuen *Geophis* (s. Colubrinae). Im Ganzen sind bis jetzt 22 Reptilien, und zwar 4 Eidechsen und 18 Schlangen, vom oberen Beni bekannt, die pag. 198 aufgezählt werden. *Ber. Senckenberg. Nat. Ges.* 1888 pag. 191—199, 3 Figg.

C. V. Burmeister zählt Reptilien und Batrachier aus Patagonien auf und beschreibt eine neue Eidechse (s. Iguanidae). *Ann. Mus. Buenos Aires* Bd. 3 pag. 250—252.

Australische Region. In seiner Arbeit über die Naturgeschichte der Christmas-Insel (Ind. Ocean) bemerkt J. J. Lister, dass dasselbst 4 Eidechsen *Gymnodactylus marmoratus* Kuhl, *Lygosoma nativitatis* Blgr. und je ein neuer *Ablepharus* und *Gecko* (s. Geckonidae und Scincidae), eine Schlange *Typhlops exocoeti* Blgr. und eine Schildkröte *Chelonia virgata*?, aber kein Batrachier leben. *Proc. Zool. Soc. London* pag. 529, Taf. 26. — Vergl. auch G. A. Boulenger, ebenda pag. 534—536.

Derselbe gibt einen Dritten Beitrag [vergl. *Ber. f.* 1886 pag. 166 und 1887 pag. 180] zur Herpetologie der Salomonsinseln. Die von C. M. Woodford gesammelten Thiere fügen der Fauna der Salomonsinseln, abgesehen von einem Anuren, hinzu *Dendrophis calligaster* Gthr. und 2 neue *Hoplocephalus* (s. Elapinae). Guadalcanar ergab *Crocodylus porosus* Schn.d., *Gehyra oceanica* Less., *Varanus indicus* Daud., *Lygosoma cyanurum* Less., *nigrum* H. J. und *albofasciatum* Gthr., *Corucia zebrata* Gray (mit Greifschwanz!), *Enygrus carinatus* Schn.d., *Dendrophis calligaster* Gthr., *Dipsas irregularis* Merr. und eine der *Hoplocephalus*-Arten. Rubiana auf Neu-Georgien ergab *Lygosoma cyanurum*, *cyanogaster* Less. und *nigrum*, *Enygrus carinatus*, *Dendrophis salomonis* Gthr., *Dipsas irregularis* und einen zweiten neuen *Hoplocephalus*. Eine Tabelle pag. 90 zeigt den Bestand der Kriechthiere auf den verschiedenen Inseln der Salomonsgruppe und namentlich den grossen Abstand in

der Fauna von Faro, welche nordwestlichste Insel in Häufigkeit und Mannigfaltigkeit besonders des Batrachierlebens einen mehr papuasischen Charakter zeigt, während die äusserste Insel nach Südosten, San Cristoval, einen mehr polynesischen Habitus hat. Ein Krokodil zeigt sich auf Shortland, Neu-Georgia, Guadalcanar und auf San Cristoval und den Nachbarinseln; Lacertilien finden sich auf Faro 14, auf Shortland 6, Treasury 6, Neu-Georgia 3, Guadalcanar 5, San Cristoval etc. 8; Schlangen auf Faro 3, Shortland 4, Treasury 2, Neu-Georgia 4, Guadalcanar 4 und San Cristoval und Nachbarinseln 3. Auf die Salomonsinseln ausschliesslich beschränkt aber sind 7 Eidechsen und 4 Schlangen. Proc. Zool. Soc. London pag. 88—90.

W. Macleay nennt von King's Sound, Nordwest-Australien, *Nardoa gilberti* Gray, *Brachysoma simile* Maccl., *Pseudechis darwiniensis* Maccl., *Acanthophis antarctica* Wgl., sowie je eine neue *Dipsas* und *Diemenia* (s. Dipsadinae und Elapinae). Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2) Bd. 3 pag. 416—418.

Im Jahre 1888 erschienen von F. McCoy's Prodrum of the Zoology of Victoria. Melbourne, 8^o die Decaden 15—17. Die Abbildungen der 7 darin geschilderten Eidechsen sind unten verzeichnet (s. Pygopodidae, Varanidae und Scincidae).

Systematisches. Ray Lankester gibt in seinem Artikel „Zoology“ folgende Eintheilung der Reptilien:

Unterklasse 1. Chelonia.

„ 2. Lacertilia mit den Ordn. Rhynchocephala, Chamaeleonina und Lacertilia.

„ 3. Ophidia mit den Ordn. Ophiderontia, Colubriformia, Proteroglypha und Solenoglypha.

„ 4. Crocodilia mit den Ordn. Amphicoelia, Opisthocoelia und Procoelia.

„ 5. Pterosauria.

„ 6. Dinosauria mit den Ordn. Sauropoda, Stegosauria, Ornithopoda, Theriopoda, Coeluria, Compsognatha und Hallopoda.

„ 7. Anomodontia.

„ 8. Plesiosauria.

„ 9. Ichthyosauria.

Encyclopaedia Britannica Bd. 24 pag. 812.

M. Fürbringer discutirt in einem besonderen Kapitel die Aehnlichkeiten und die Verschiedenheiten zwischen den einzelnen Reptilordnungen und den Vögeln und die Phylogenie der Sauropsiden. Verf. hält namentlich die Lacertilien wegen des Baus ihrer Clavicula und des beweglichen Quadratbeins trotz ihres relativ späten geologischen Auftretens für einen primitiven Typ. Nur Dinosaurier,

Crocodilier und Lacertilier zeigten eine gewisse Stammesverwandschaft mit den Vögeln. Bijdr. Dierk. Amsterdam Bd. 15. 49, 1751 pag., 30 Taf.

J. G. Fischer beschreibt in seinen herpetologischen Mittheilungen zahlreiche neue Arten von *Pachydactylus*, *Ameiva*, *Mabuia*, *Tropidophis*, *Chilabothrus*, *Boodon* und *Atheris* (s. Geckonidae, Tejidae, Scincidae, Boinae, Colubrinae und Viperinae). Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 1—52, Taf. 1—4.

Lacertilla.

Integumentalgebilde. G. A. Boulenger hat die interessante Beobachtung gemacht, dass gewisse Eidechsen, wenn sie ihren abgebrochenen Schwanz reproducieren, ein anderes Schuppengesetz und andere Schuppenform an diesem Körperteil annehmen. Während nämlich *Hatteria* den Schwanz in ziemlich analoger Weise reproducirt, wie er vorher war, und ähnlich auch die Lacertiden, Gerrhosauriden und scincoiden Anguinen, zeigen sich bei den Geckoniden bereits sehr wesentliche Abweichungen von der ursprünglichen Form. Eine besonders abweichende Beschuppung aber zeigt der mit Cycloidschuppen bedeckte *Gymnophthalmus*, dessen reproducierter Schwanz die Beschuppung eines *Cercosaura*-ähnlichen Tejiden, etwa wie von *Heterodactylus*, annimmt. Umgekehrt zeigt der neue Schwanz eines mit gekielten Wirtelschuppen bedeckten *Ophisaurus* die cycloide Beschuppung etwa eines *Diploglossus*. Verf. macht mit Recht darauf aufmerksam, dass diese Neubildungen als atavistische Rückfälle aufzufassen sind, und dass sie nicht bloß einen sicheren Schluss auf die systematische Stellung aberranter Gattungen und Formen ziehen lassen, sondern auch den Lauf der Entwicklung dieser Genera aufs Schärfste anzeigen. Proc. Zool. Soc. London pag. 351—353, 2 Figg.

Sinnesorgane. W. J. McKay hat die Entwicklung und den Bau des Pinealorgans bei zwei Arten von *Himulia*, darunter *H. taeniolata*, und bei *Grammatophora muricata* in den verschiedenen Stadien untersucht. Von *Himulia* kamen die frühesten Entwicklungsformen nicht zur Beobachtung; bei *Grammatophora* zeigte sich die Entwicklung ähnlich, wie sie Hoffmann bei *Lacerta* beschrieben hat. In einem Nachtrage führt Verf. 35 australische Eidechsen auf, bei denen Whitelegge ein Pinealorgan beobachtet hat. Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2) Bd. 3 pag. 876—889, Taf. 22—24.

H. Strahl & E. Martin haben die Entwicklung des Parietalorgans bei *Anguis* und *Lacerta vivipara* verfolgt. Das durch Abtrennung der Epiphysenanlage entstandene Parietalorgan besteht anfänglich aus einer Blase von Zellen, die denen des Centralnervenrohrs in entsprechender Zeit durchaus gleichen. Durch Differenzierung wird die vordere Abtheilung dieser Blase zur Linse, die hintere zur Retina. An der Retina bilden sich zwei Schichten; die innere ist so gut wie kernlos. Weiterhin tritt ein Nervenstrang auf, der das Parietalorgan mit dem Dach des Centralnervenrohrs vor der Wurzel der Epiphyse verbindet. Durch Hinzutreten dieser Nervenfasern sind sodann drei Schichten an der Retina vorhanden; in noch weiteren Entwicklungsstadien lassen sie vier Schichten erkennen. An der Aussenfläche des Parietalorgans entwickelt sich

gleichzeitig eine Cornea; der Nerv desselben ist in mittleren Entwicklungsstadien stärker als in späteren. Arch. f. Anat. u. Phys., Anat. Abth. 1888 pag. 146—163, Taf. 10.

Verdauungsorgane. Betr. der Anatomie der Mundhöhle vergl. unten M. Holl unter Lacertidae pag. 201.

E. Gaupp beschreibt das Vorkommen echter Zungendrüsen bei Embryonen von Eidechsen. Morph. Jahrb. Bd. 14 pag. 436 ff.

Fr. E. Beddard untersuchte die Beziehungen des Zwerchfells zu den von ihm eingeschlossenen Eingeweiden bei *Uromastix*, *Iguana*, *Cyclura*, *Tejus*, *Lacerta*, *Cyclodius*, *Plestiodon* und *Trachysaurus* einerseits, die kein ausgesprochenes Diaphragma besitzen, und bei *Monitor* andererseits, wo eine Peritonealfalte die Baueingeweide bedeckt und von den Lungen abschliesst. Verf. hält deshalb eine Zusammenfassung der Varaniden mit den Lacertiden zu einer Unterordnung Fissilinguer ebenso für verfehlt, wie eine Annäherung der Varaniden an die Iguaniden. Eine ganz analoge Bildung des Zwerchfelles bei den Crocodiliern wird eingehend besprochen und die in verschiedener Hinsicht nähere Verwandtschaft der Varaniden mit den Crocodiliern betont. Schliesslich werden die sehr complicierten, ein Netzwerk bildenden Gallengänge bei *Varanus salvator* eingehender untersucht und auch hierbei die Nothwendigkeit erörtert, die Varaniden von den Lacertiliern als selbständige Gruppe abzutrennen. Proc. Zool. Soc. London pag. 98—107, 4 Figg.

Urogenitalsystem. F. Schoof untersuchte ♂♂ von Lacertiliern auf etwaige Reste einer Tube, ♀♀ auf Reste der Urniere und des Wolffschen Ganges; bei letzteren wurde auch den Ureierlagern der Ovarien Aufmerksamkeit geschenkt. Bei *Lacerta viridis* und *Stellio vulgaris* konnte mitunter eine vollkommen entwickelte männliche Tube gefunden werden, bei *Chalcides*, *Agama*, *Uromastix* und *Chamaeleon* nicht. Von der Urniere bleiben beim ♀ von *Lacerta* und *Acanthodactylus* nur wenige Canäle übrig, grössere Reste finden sich bei *Chalcides*, wo in einem Falle der Urnierengang bis zur Niere verfolgt werden konnte und Braun'sche Segmentalstränge gefunden wurden. Eine noch functionierende Urniere fand Verf. beim ♀ von *Uromastix* und *Chamaeleon*. Ureierlager zeigten sich bei allen untersuchten erwachsenen ♀♀. Ein Theil der genannten Formen muss, wenigstens in Bezug auf die Ausführungsgänge der Geschlechtsapparate, als Zwitter bezeichnet werden. Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 189—190 und Arch. f. Naturgesch. 54. Jahrg. Bd. 1 pag. 62—80, Taf. 3. — Auch separ.: Zur Kenntniss des Urogenitalsystems der Saurier. Berlin. Nicolai'scher Verlag 1888, 8°. 18 pag., 1 Taf. Inaug.-Diss. Rostock. — Ref. in Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklenburg Bd. 42 (1889), Sitz. Ber. Nat. Ges. Rostock pag. 17—18.

Ootogenie. Nachzutragen ist, dass H. Orr [s. Ber. f. 1887 pag. 182] in seinem Beitrag zur Embryologie der Eidechse auch einige spätere Stadien von Embryonen des *Sphaerodactylus notatus* und des *Liocephalus carinatus* untersucht hat. Der Wolffsche Gang stammt nach dem Verf. vom Ectoblast ab; die Urnierencanälchen entstehen zwischen Urwirbel und Seitenplatte, in der sogen. Mittelplatte. Bei Embryonen mit 4—9 Urwirbeln hängen die Kopfhöhlen mit der Chorda zusammen; am vorderen Ende des Embryo ist die letztere mit dem Epiblast verschmolzen. Journ. of Morph. Bd. 1 (1887) pag. 311—363, Taf. 12—16.

Neue Untersuchungen über Entwicklung des Amnion, des Wolffschen Ganges und der Allantois hat J. v. Perényi an *Lacerta viridis*, *muralis* und *agilis* angestellt. Der Amnionsack entwickelt sich nicht aus dem Körper des Embryo, sondern aus der Keimscheibe. Die Zellen des Wolffschen Urnierenganges sind ectodermalen, die Tubuli Wolffii mesodermalen Ursprungs. Die Allantois entsteht nicht als Ausstülpung des Canalis neurentericus (Kupffer), weder als dichte indifferente Zellmasse, in welcher Höhlungen entstehen (Stahl, Erdös), noch tritt sie als Spalte auf (Hoffmann), sondern sie schnürt sich einfach vom Endentoderm (Allantoisentoderm) der Sichel ebenso ab, wie das Darmrohr. Das Primitiventoderm theilt sich in drei Theile: 1. in das mittlere Chordaentoderm, 2. in seitliche Platten, Darmentoderm, und 3. in den Endtheil Allantoisentoderm. M. Tud. Akad. Ertesitő 1888 (ungar.) und Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 138—141.

In einer vorläufigen Mittheilung zur Entwicklungsgeschichte der Eidechsen theilt A. Ostroumoff Beobachtungen mit über den directen Uebergang der Chorda sammt dem Hypoblast in das hypoblastische Amnion, über die Hypophyse, über die Entwicklung des Afters, Wolffschen Ganges und Herzens, über die Kiemenspalten und die branchialen Sinnesorgane und über die definitive Anordnung dieser Ganglien bei *Phrynocephalus helioscopus* Pall. Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 620—622.

In seiner grösseren Arbeit sucht derselbe u. a. die Beziehungen der aus der Nervenleiste hervorgehenden Bildungen in der Occipitalregion zu den Nerven Hypoglossus und Accessorius Willisii bei den Embryonen von *Phrynocephalus* klarzustellen. Die erste Andeutung des Embryonalafters fand Verf. bei Embryonen mit 6—7 Somiten in Form eines Grübchens über der Allantoisanlage im hinteren Theil des Primitivstreifens. Arbeiten (Trudi) d. Naturf.-Ges. Univ. Kasan Bd. 19, Heft 3. 123 pag., 3 Taf. (russ.).

Einen „Beitrag zur Kenntniss der Kiemenspalten und ihrer Anlagen bei amnioten Wirbelthieren“ gibt E. Liessner [vergl. Ber. f. 1887 pag. 182]. Verf. constatiert, dass bei *Lacerta vivipara* das erste und zweite Kiemenpaar sich in der Regel öffnet, das dritte nur selten und in späteren Stadien durchbricht, die Anlage zum vierten aber nur ausnahmsweise eine Oeffnung zeigt, und dass sich die sehr spät erst auftretende Anlage zu einem fünften Kiemenspaltenpaar höchstwahrscheinlich nie zu einer offenen Spalte ausbildet, zumal an derselben schon relativ früh Rückbildungen erkannt werden können. Morph. Jahrb. Bd. 13 pag. 402—416, Taf. 16. — Auch separ.: Inaug.-Diss. Dorpat 1889, 8°. 33 pag.

Ueber Kiemenspalten und Kiemenspaltenreste bei *Lacerta* macht auch J. F. van Bemmelen [vergl. Ber. f. 1887 pag. 150] neue Mittheilungen. Verf. betont namentlich die Verschiedenheit zwischen den epitheloiden Kiementaschen-derivaten (Carotiskörperchen) und den lymphoiden (Thymus) und zwischen der medianen Thyreoiden und den lateralen Darmwandderivaten (accessorischen Thyreoiden). Feestbundel a. F. C. Donders-Jubiläum, Amsterdam 1888 pag. 434 bis 464, Taf. 11—12.

Ueber ein lebendes gabelschwänziges Exemplar von *Lacerta agilis* macht M. Bartels Mittheilungen. Jedes der beiden Schwanzenden war der Bewegung fähig. Die vorliegende Bildung wird als angeborene Missbildung angesprochen. Sitz.-Ber. Ges. Nat. Fr. Berlin pag. 69—72.

Biologisches. Joh. von Fischer zählt die Eidechsen auf, bei denen Pflanzennahrung beobachtet werden konnte. Es sind *Uromastix spinipes*, *acan-*

thinurus und *hardwickei*, *Iguana tuberculata* und *nudicollis*, *Cyclura acanthura*, *Lophiura amboinensis*, *Amblyrhynchus cristatus*, *Conolophus subcristatus*, *Trachysaurus asper* und *rugosus*, *Plestiodon aldrovandii*, *Hatteria punctata*, *Stellio vulgaris*, *Lacerta viridis*, *ocellata* und *pater*. Alle Lacerten und *Tropidosaura*, sowie die Geckonen, lieben Zucker; nur *Uromastix* und *Conolophus* ziehen bitter schmeckende Stoffe den süßen vor. Humboldt 7. Jahrg. pag. 425—426.

Palaeontologisches. Ueber die fossilen Reste von Lacertiliern im British Museum macht R. Lydekker eingehende Mittheilungen. Abgebildet werden Fig. 61 Wirbel von *Iguana europaea* Filh. aus dem Oligocaen von Hordwell, Fig. 62 von *Placosaurus margariticeps* Gerv. aus dem oligocaenen Phosphorit von Caylux, Fig. 63 Kiefer eines Anguiden von ebenda und Fig. 66 ein hinterer Rückenwirbel von *Varanus priscus* Ow. aus dem Plistocaen von Queensland. Cat. Foss. Rept. a. Amph. Brit. Mus. (N. H.) Bd. 1 pag. 275—290. — Weitere Notizen über denselben Gegenstand bringt derselbe. Er hat Reste von dem Oligocaen von Hordwell untersucht, die sich nicht von der amerikanischen Gattung *Iguana* trennen lassen und setzt diese Thatsache in Beziehung zu den Funden von *Chelydra* in Oeningen und *Latonia* (verwandt der lebenden *Ceratophrys*), die gleichfalls amerikanisches Gepräge haben. Sodann bespricht Verf. *Placosaurus rugosus* Gerv. und *Varanus margariticeps* Gerv. = *Plestiodon cadurcensis* Filh., den er als *Placosaurus margariticeps* Gerv. zu den Anguiden stellt, sowie *Palaeovaranus cayluxi* Filh., eine ächte Varanide. *Placosaurus* hatte wolentwickelte Gliedmaassen wie der lebende *Diploglossus*, und auch die eocaenen amerikanischen Gattungen *Saniva* Leidy und *Glyptosaurus* Marsh sind wahrscheinlich nahe verwandt mit ihm. Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 110—112.

Faunistisches. A. Heilprin kommt auf seine Anschauungen betreffs der Verwandtschaft der nordamerikanischen Eidechsenfauna [vergl. Ber. f. 1887 pag. 183] zurück, indem er nachzuweisen versucht, dass die nearktische Region in Bezug auf ihre Fauna gegenüber der neotropischen den Werth einer selbständigen, primären zoologischen Region habe. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 24—27. — G. A. Boulenger hält seine Auffassung über die central-amerikanische Verwandtschaft und Herkunft der nordamerikanischen Eidechsenfauna Heilprin gegenüber voll und ganz aufrecht und unterstützt seine Ansicht noch durch die Aufzählung aller 12 Eidechsenarten, die östlich des Mississippi, und der 3 Arten, die nördlich des 40.° N. Br. vorkommen. Die nahezu völlige Uebereinstimmung auch in den Gattungen springt in die Augen. Ebenda pag. 107—109.

A. Ernst gibt eine Liste der 41 bekannten Arten von Lacertiliern aus Venezuela. Revista Cientif. Mus. Centr. Venezuela Bd. 1 pag. 213—218.

Systematisches. Ueber die Verwandtschaft und Stellung der Familie Varanidae vergl. oben Fr. E. Beddard pag. 194.

Geckonidae. Sinnesorgane. Mittheilungen über die angebliche wahre Natur der sogen. Halsdrüsen von *Phyllodactylus europaeus* und über die Wichtigkeit der Kalksalze für den thierischen Organismus macht C. Lepori. Lo Spallanzani, Giorn. Scientif. Roma (2) Jahrg. 18 pag. 143—165, 1 Taf. — L. Camerano weist nach, dass die Halsdrüsen von *Phyllodactylus* bereits von Wiedersheim anatomisch und physiologisch erschöpfend erklärt worden seien. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino Bd. 3, No. 45. 3 pag.

Faunistisches. G. A. Boulenger hat einen südafrikanischen Vertreter der Gattung *Oedura* (s. unten) beschrieben, während alle bis jetzt bekannten Arten dieses Genus in Australien leben. Aehnlich zeigt auch *Phyllodactylus* zwei nahverwandte Formen, die eine in Südafrika (*porphyreus*), die andre in Australien (*marmoratus*). Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 137—138.

F. Mocquard verzeichnet *Hemidactylus frenatus* D. B. auch von Capland. Mém. Cent. Soc. Philomath. Paris 1888 pag. 113.

Systematisches. O. Boettger macht Notizen zu *Teratoscincus scincus* Schleg. pag. 878, *Crossobamon evermanni* Wgm. pag. 880, *Gymnodactylus caspius* Eichw. pag. 883, *G. fedtschenkoi* Strauch, der vielleicht nur Localvarietät des vorigen ist, pag. 884 und *G. russowi* Strauch pag. 885. Zool. Jahrb. Abth. f. Syst. Bd. 3.

J. G. Fischer gibt systematische Bemerkungen zu *Hemidactylus richardsoni* Gray (bisher unbek. Vaterlands), den er aus Gabun erhielt. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 49, Taf. 4, Fig. 10.

Crossobamon n. nom. für *Ptenodactylus* Strauch, non Gray; Boettger, Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 260.

Gecko lysteri n. sp. verwandt *pumilus* Blgr. Christmas-Insel (Ind. Ocean); Boulenger, Proc. Zool. Soc. London pag. 535.

Gymnodactylus oertzeni n. sp. verwandt *kotschy* Stdehr. Karpathos-Gruppe (Süd-Sporaden); Boettger, Sitz.-Ber. Akad. Berlin pag. 152.

Hemidactylus pumilus Hall. = *frenatus* D. B.; Boettger, 26./28. Ber. Offenbach, Ver. Nat. pag. 60. — *H. richardsoni* Gray. Gabun. Abgeb.; J. G. Fischer, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5, Taf. 4, Fig. 10. — *H. tropidolepis* n. sp. verwandt *homoeolepis*. Somaliland; Mocquard, Mém. Cent. Soc. Philom. Paris pag. 113.

Oedura africana n. sp. Damaraland; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 137.

Pachydactylus fasciatus n. sp. verwandt *bibroni* Smith. Namaland; Boulenger, l. c. pag. 138. — *P. laevigatus* n. sp. verwandt *bibroni* Smith. Namaland; J. G. Fischer, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 15, Taf. 2, Fig. 3.

Sphaerodactylus argivus n. sp. verwandt *argus*. Cayman Brac. pag. 3. — *Sph. asper* n. sp. verwandt *picturatus*. Andros Island, Bahamas. pag. 13. — *Sph. corticolus* n. sp. verwandt *notatus* und *argivus*. Rum Cay, Bahamas. p. 11. — *Sph. decoratus* n. sp. Rum Cay. pag. 12; Garman, Bull. Essex Instit. Bd. 20. — *Sph. meridionalis* n. sp. Iguarasse, Prov. Pernambuco; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 40.

Eublepharidae. Biologisches. Nach F. Mocquard wird *Psilodactylus caudicinctus* A. Dum. von den Eingeborenen des Niger als höchst giftig betrachtet. Le Naturaliste Bd. 10 pag. 282. — Dieselbe Ansicht findet sich nach J. W. Vidal über den Biss der nordindischen Bis-Cobra, *Eublepharis*, verbreitet. Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. Bd. 3 pag. 75.

Uroplatidae. Systematisches. *Uroplates phantasticus* n. sp. Madagaskar; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 101, Taf. 5, Fig. 1.

Pygopodidae. Faunistisches. S. C. Burnell nennt *Pygopus lepidopus* Lac. von Wentworthville bei Parramatta. Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2) Bd. 3 pag. 336.

Systematisches. *Aprasia pulchella* Gray. Lake Wallace und Portland, Victoria. Abgeb.; Mc Coy, Prodr. Zool. Victoria Taf. 161, Fig. 1.

Delma frazeri Gray. Melbourne und Newington Station, Wimmera-District. Abgeb.; Mc Coy, l. c., Taf. 152, Fig. 1.

Lialis burtoni Gray. Mallee Scrub, Vict., und Insel Duke of York. Abgeb.; Mc Coy, l. c., Taf. 162.

Pseudodelma impar Fisch. Melbourne und Vereinigung von Yarra und Merri Creek. Abgeb.; Mc Coy, l. c., Taf. 161, Fig. 2.

Pypopus lepidopus Lac. abgeb.; Mc Coy, l. c., Taf. 151 und 152, Fig. 2.

Agamidae. Biologisches. Joh. von Fischer gibt einen Nachtrag zur Naturgeschichte von *Uromastix acanthinurus* Bell [vergl. Ber. f. 1885 pag. 287]. Er fand, dass nur die im Winter oder im Vorfrühling bezogenen Exemplare zur Fortpflanzung schritten. Die Art der Begattung wird beschrieben. Die Abweichungen in der Färbung von Stücken aus Tunis und aus der Oase Laghouat, aus der Prov. Beni-Mzab-Mzab und den Déps. Oran und Constantine werden eingehend behandelt. Auffallend ist die grosse Sterblichkeit, aber auch die Zähmheit der östlichen Formen gegenüber der Lebensfähigkeit und Wildheit der westlichen (Tunis, Biskra). Maasse von überwinterten Jungen werden gegeben, ein ganz junges Thier sehr charakteristisch in Holzschnitt vorgeführt. Fleisch frisst der Schlenderschwanz freiwillig nicht, dagegen ist Insectennahrung namentlich in der Jugend nothwendig. Eingehend wird schliesslich der Kennzeichen gedacht, nach denen man lebenskräftige, abgemagerte und kranke Thiere dieser Art mit Sicherheit unterscheiden kann. *U. hardwickei* trinkt im Gegensatz zu seinem afrikanischen Verwandten oft und ziemlich viel; auch über seine Haltung und Pflege werden Angaben gemacht. Zool. Garten 29. Jahrg. pag. 97—108, 1 Fig.

Nach demselben frisst *Uromastix hardwickei* Gray rohen Reis, Mais und Hirse, auch Heu, Stroh und Heuschrecken. Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 115.

Derselbe beschreibt sehr anschaulich das Kleid und Gebahren des *Uromastix hardwickei* Gray in der Gefangenschaft im Vergleich zu *U. acanthinurus*. Er bedarf eines Trinkgefässes und weniger hoher Wärmegrade. Er gräbt viel. In Gefangenschaft ist er harmlos und verträglich und wird sehr zahm. Für sein gutes Gedächtniss werden Beispiele gegeben. Gesicht, Geschmack und Gehör sind vortrefflich entwickelt. Neben Getreidekörnern fressen sie auch Blätter, Blüten und Mehlwürmer und gedeihen ausgezeichnet. Zool. Garten 29. Jahrg. pag. 135—142.

Systematisches. Notizen über *Agama sanguinolenta* Pall. pag. 887 und *A. caucasia* Eichw. pag. 890, über *Phrymocephalus helioscopus* Pall. pag. 892, *Ph. interscapularis* Licht. pag. 898 und *Ph. mystaceus* Pall., der sich durch eine eigenthümliche, noch unerklärte Tuberkelschuppe in der Achselhöhle auszeichnet, pag. 899 bringt O. Boettger. Zool. Jahrb., Abth. f. Syst. Bd. 3.

G. A. Boulenger beschreibt die Färbung von *Agama planiceps* Pts. aus Namaland. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 139.

Dendragama n. gen. verwandt mit *Acanthosaura* Gray und *Gonyocephalus* Kaup, verschieden von ersterer Gattung durch die Anwesenheit eines Kehlsacks, von letzterer durch das Fehlen einer Gularfalte. — Mit *D. boulengeri* n. sp. Berg Singalang, West-Sumatra; Doria, Ann. Mus. Civ. Genova (2) Bd. 6 p. 649, Fig., Taf. 8, Fig. 1.

Harpesaurus beccarii n. sp. Lubu Selassi bei Padang, Sumatra; Doria l. c., pag. 646, Fig., Taf. 8, Fig. 2.

Phrymocephalus raddei n. sp. verwandt *helioscopus* Pall. Perewalnaja, Trans-

kaspian; Boettger, Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 262 und Zool. Jahrb., Abth. f. Syst. Bd. 3 pag. 894, Taf. 34, Fig. 2.

Iguanidae. Palaeontologisches. Ueber *Proiguana* (= *Iguana*) *europaea* Filh. macht R. Lydekker Mittheilungen. Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 110.

Systematisches. A. Guenther bringt systematische Bemerkungen zu *Anolis alliaceus* Cope von Dominica und beleuchtet seine spezifische Unterscheidung von *A. leachi* D. B. von Guadeloupe. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 363.

Notizen über *Anolis chlorocyanus* D. B. pag. 30 und zu *Liocephalus vittatus* Hall. pag. 27 macht J. G. Fischer. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anat. Bd. 5.

Eingehende Beschreibungen von *Sceloporus melanogaster* Cope pag. 114, *Sc. microlepidotus* Wgm. pag. 112, *Sc. scalaris* Wgm. pag. 111, *Sc. spinosus* Wgm. pag. 205 und *Sc. torquatus* Wgm. pag. 113 bringt A. Dugès. *Naturalæa Mexicana* (2) Bd. 1.

Anolis leachi Blgr. part., *lividus*, *oculatus* und *sabanus* Garm. = *alliaceus* Cope; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 363. — *A. leucophaeus* n. sp. Inagua, Bahamas. pag. 9. — *A. luteosignifer* n. sp. verwandt *sagrae* [nach Boulenger vermuthlich = *sagrae*. Ref.]. Cayman Brac und Little Cayman. pag. 4, 8. — *A. maynardi* n. sp. verwandt *porcatus*. Little Cayman. pag. 7; Garman, Bull. Essex Inst. Bd. 20.

Liolaemus melanops n. sp. Quelé-curá, Patagonien; Burmeister, Anal. Mus. Buenos Aires Bd. 3 pag. 252.

Lysoptychus n. gen. zwischen *Sceloporus* und *Uta*, verschieden von ersterer Gattung durch das Auftreten einer losen queren, wie bei *Ctenosaura* gebildeten Kehlfalte. — Hierher *L. lateralis* n. sp. San Diego, Südwest-Texas; Cope, Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11 pag. 397, Taf. 36, Fig. 1.

Sceloporus melanogaster Cope abgeb. Taf. 12, Fig. 1 und *Sc. microlepidotus* Wgm. abgeb. Taf. 11, Fig. 5; Dugès, *Naturalæa Mexicana* (2) Bd. 1.

Xiphosurus ferreus Cope = *Anolis leachi* D. B., Boct. pag. 363. — *X. oculatus* Cope = *Anolis alliaceus* Cope. pag. 363; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2.

Anguidae. Palaeontologisches. R. Lydekker führt den sehr interessanten Nachweis, dass ein Stück von *Ophisaurus moguntinus* Bttg. aus dem Oberoligocän von Rott, welches das Schwanzende regeneriert zeigt, dessen Pholidose während des Lebens nach Art der Beschuppung von *Anguis* reproduziert hat. Cat. Foss. Rept. a. Batr. Brit. Mus. (N. H.) Bd. 1 pag. 278. — Vergl. auch oben G. A. Boulenger pag. 193.

Notizen über *Placosaurus* Gerv. und *Palaeovaranus* Filh. bringt R. Lydekker. Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 110—111.

Faunistisches. G. Entz fand bei Klausenburg nicht selten *Anguis* in der Farbenvarietät, bei welcher der Rücken mit zwei Längsreihen von prachtvoll blauen Flecken geschmückt ist. Rev. Siebenbürg. Mus. Ver. Klausenburg Bd. 10 pag. 133—134.

Systematisches. Notizen über *Anguis fragilis* var. *colchica* Dem. bringt O. Boettger. Zool. Jahrb., Abth. f. Syst. Bd. 3 pag. 902.

Anguis fragilis L. var. *caeruleoventris* n. pag. 57 und var. *cyanopunctata* n. pag. 56 Haardt bei Kreuznach, Rheinpr.; Geisenheyner, Progr. No. 418 Gymn. Kreuznach.

Diploglossus maculatus n. sp. verwandt *crusculus* und *occiduus* [nach Boulenger = *striatus* Gray] Cayman Brac; Garman, Bull. Essex Instit. Bd. 20 pag. 5. — *D. striatus* Gray = *occiduus* (Shaw) Blgr. ?; J. G. Fischer, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 29.

Gerrhonotus imbricatus Wgm. beschr. u. abgeb.; Dugès, *Naturelleza Mexicana* (2) Bd. 1 pag. 119, Taf. 12, Fig. 9.

Helodermatidae. Biologisches. C. E. Bendire beschreibt die Eier, die er einem *Heloderma* ausgeschnitten hat. Forest and Stream (New York) Bd. 29 (1887) pag. 64–65.

Ueber einen weiteren — den dritten oder vierten bekannten — Fall von tödlichem Biss des *Heloderma suspectum* Cope, der sich in Fairbanks bei Tombstone im Territorium Arizona zutrug, berichtet G. A. Treadwell. Proc. Zool. Soc. London pag. 266. — Ref. im Zoolog. Garten 30. Jahrg. (1889) pag. 60. — Ueber *Heloderma suspectum* Cope und die giftige Wirkung seines Bisses vergl. auch R. W. Shufeldt in Forest a. Stream (New York) Bd. 29 (1887) pag. 24, Fig. — Weitere Mittheilungen über den Biss von *Heloderma* bringt H. C. Yarrow. Ebenda Bd. 30 pag. 412–413 und A. H. Buck's Reference Handbook of the Medical Sciences. New York, Will. Wood & Co. Bd. 6 pag. 171, Taf. 28.

Varanidae. Biologisches. O. Boettger gibt Notizen über die Nahrung von *Varanus griseus* Daud. in Transkaspien. Zool. Jahrb., Abth. f. Syst. Bd. 3 pag. 904.

Palaeontologisches. A. Weithofer beschreibt in seinen Beiträgen zur Fauna von Pikermi einen *Varanus marathonensis* n. Beitr. z. Palaeont. Oesterr.-Ung. Bd. 6, Wien 1888 pag. 225–292, Taf. 10–19.

Eine Notiz über *Megalania prisca* Ow. = ? *Varanus* bringt A. S. Woodward. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 85.

Systematisches. Ueber Verwandtschaft und Stellung dieser Familie macht Fr. E. Beddard interessante Mittheilungen. Neben anderen erheblichen Abweichungen im Bau von den übrigen Eidechsenfamilien constatirt Verf., dass eine Peritonealfalte die Baueingeweide sammt der Leber vollständig umschliesst. Dieselbe ist ventralwärts frei, dorsalwärts aber in der Mittellinie angeheftet und trennt die Eingeweide von Herz und Lungen. Diese Einrichtung ist durchaus homolog der bei den Crocodiliden beobachteten und lässt die letzteren eventuell von *Varanus*-ähnlichen Vorfahren ableiten. Verf. schlägt vor, die Monitores neben die Lacertilia Vera und die Rhytroglossa als gleichwerthige Unterordnung zu stellen. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 204–206. — Ref. in Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 467. — Vergl. auch oben Fr. E. Beddard pag. 194.

Varanus gouldi Gray. Kewell bei Horsham, Nordwest-Victoria. Abgeb.; McCoy, Prodr. Zool. Victoria Taf. 151.

Toxidae. Systematisches. Bemerkungen über *Ameiva fuscata* Garm., die als Art neben *A. surinamensis* anerkannt wird, bringt A. Günther. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 363.

Notizen zu *Ameiva chrysolema* Cope hat J. G. Fischer. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 24.

Ameiva maynardi n. sp. Inagua, Bahamas; Garman, Bull. Essex Inst. Bd. 20 pag. 10. — *A. regularis* n. sp. verwandt *chrysolema* Cope. Sanssouci, Haiti; J. G. Fischer, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 26.

Amphisbaenidae. Systematisches. *Agamodon compressus* n. sp. Somaliland; Mocquard, Mém. Cent. Soc. Philomath. Paris 1888 pag. 121, Taf. 11, Fig. 2.

Monopeltis boulengeri Bttg. abgeb.; Boettger, Ber. Senckenberg. Nat. Ges. Taf. 1, Fig. 1.

Lacertidae. Allgemeines. F. Lataste's Bemerkungen über *Lacerta perspicillata* sind dem Ref. unzugänglich gewesen. Bull. Assoc. Franç. Adv. Sc. Congrès d'Oran du 30. mars 1888.

Verdauungsorgane. M. Holl behandelt die makroskopischen und mikroskopischen Verhältnisse der Mundhöhle von *Lacerta agilis* und bespricht besonders den Sulcus Jacobsonii, die Schleimhaut des Mundhöhlendaches, Cutis, Epithel, Kryptenbildungen, lymphoides Gewebe, Pharynxtonsillen, Pterygoidtonsillen und Suprapterygoidtonsillen, Geschmacksorgane, sowie den Boden der Mundhöhle, das Epithel und die Geschmacksorgane der Zunge. Sitz.-Ber. Akad. Wien, Math.-nat. Cl. Bd. 96 pag. 161—169, 1 Taf.

Biologisches. Joh. von Fischer unterscheidet zwei verschieden gefärbte Formen von *Eremias pardalis* D. B. [= *guttulata* Licht.; Ref.]; die eine robuster gebaute fand er bei Boghar, Biskra, El-Kantarrah und Aïn Sefra in Algerien und bei Sfax in Tunesien, die andere schlankere, mehr der Wüstenfauna angehörige bei Maskara (Prov. Oran), Laghouat, Wargla und Selama (Prov. Alger), Tuggurth (Prov. Constantine) und bei Gafra in Tunesien. Zur Haltung der Art in Gefangenschaft gehört Sand, hohe Wärme (30° R.) und viel Licht. Sie ist äusserst rasch in ihren Bewegungen; bei Erregung nickt sie wie *Agama* und *Uromastix*. Solange der Tag dauert, gräbt sie. Frisst Insekten, bedarf des Trinkwassers und wird schnell zahm. Im Uebrigen hat sie das Benehmen von *Acanthodactylus*. Zool. Garten 29. Jahrg. pag. 5—8.

Derselbe bespricht *Lacerta pater* Lat. und ihre Verwandtschaft mit *L. ocellata* und *viridis*. Er hält *L. pater* für gute Art, wie *ocellata* und *viridis*, alle drei aber von einer einzigen, ausgestorbenen Form abstammend. *L. pater* sei die jüngste, in ihren Charakteren noch besonders schwankende Form. Verf. kennt sie nur aus Algerien und Tunis und gibt die Farbenunterschiede aus verschiedenen Oertlichkeiten in Algerien. Ueber Lebensgewohnheiten und Nahrung, die wenig von denen der *L. ocellata* abweichen, wird eingehend berichtet. Im April erfolgt die Paarung; nach 14—18 Tagen legt das ♀ 15—22 Eier, die 21 mm lang und 13 mm breit sind. Ebenda pag. 265—273.

Faunistisches. Nach M. Ramos Medina fanden sich auf einer Excursion nach Tomares und S. Juan de Aznalfarache in der Umgebung von Sevilla *Lacerta muralis* Laur. und *Psammotromus hispanicus* Fitz. Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. Bd. 17, Actas pag. 122.

Literarische Angaben über das Vorkommen von *Lacerta viridis* in der Mark Brandenburg bringt E. von Martens. Schon 1845 war die Art bei Rüdersdorf bekannt; ihre erste Erwähnung aus der Mark geschah 1823. Bei Rüdersdorf ist sie jetzt sehr selten geworden oder wol schon ausgerottet; dagegen kommt sie noch bei Oderberg und Teupitz vor. Auf Rügen und bei Greifswald fehlt die Art jetzt bestimmt, ebenso in Pommern und Mecklenburg. Sitz.-Ber. Ges. Nat. Fr. Berlin pag. 118—120.

L. Picaglia & P. Parona stellen fest, dass im Modenesischen *Lacerta viridis* allgemein verbreitet ist, dass *L. muralis* dagegen ausschliesslich den hohen Apennin bewohnt (Fiumalbo, Sestola und Serrabassa), während die var.

serpa Raf. auf die Ebene und die Hügelregion (Sassuolo) angewiesen ist. Atti Soc. Nat. Modena, Rendic. (3) Bd. 3 (1887) pag. 64.

G. Entz verzeichnet *Lacerta vivipara* Jacq. aus Siebenbürgen vom Retezat-Gebirge, Hunyader Comit. aus dem Bihar nächst der Oncsászaer Höhle, aus Mezöhas, Görgényer Gebirge, und aus den Bergen um Hermannstadt. Die sehr lebhaft gefärbte Zeichnung und auch die Tracht der Jugendform wird beschrieben. Die var. *nigra* Wolf ist aus Siebenbürgen noch nicht bekannt. *L. muralis* Laur. fand Verf. nur bei Vajda-Hunyad und Déva, Hunyader Comit. Rev. Siebenbürg. Mus. Ver. Klausenburg Bd. 10 pag. 128—133.

Systematisches. Mittheilungen über *Lacerta danfordi* Gthr. pag. 163, *L. muralis* Laur. pag. 159 und *L. viridis* var. *major* Blgr. pag. 157 aus Griechenland und Kleinasien macht O. Boettger. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Berlin 1888.

Notizen zu *Eremias intermedia* Strauch pag. 908, *Scapteira grammica* Licht. pag. 912 und *Sc. scripta* Strauch pag. 914 gibt derselbe. Zool. Jahrb., Abth. f. Syst. Bd. 3.

A. Günther behandelt eingehend die Unterschiede der 9 von ihm anerkannten *Tachydromus*-Arten und gibt einen Schlüssel zur Bestimmung derselben. Neu eine Art. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 166—169.

O. Boettger hält *Eremias brenckleyi* Gthr. für wahrscheinlich specifisch verschieden von *E. argus* Pts. 26./28. Ber. Offenbach. Ver. f. Nat. pag. 63. — Dieselbe Ansicht spricht J. G. Fischer nach Stücken von Chikiang aus. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 46.

Eremias brenckleyi Gthr. abgeb.; J. G. Fischer, l. c., Taf. 4, Fig. 9. — *E. edwardsi* n. sp. verwandt *brenneri* Pts. Somaliland; Mocquard, Mém. Cent. Soc. Philomath. Paris 1888 pag. 115, Taf. 11, Fig. 1.

Lacerta viridis var. *transsylvanica* n. Siebenbürgen; v. Kimakowicz, Verh. u. Mitth. Siebenbürg. Ver. Nat. 38. Jahrg. pag. 107.

Ophiops schluteri Bttg. = *elegans* Mén. var. mit 38—49 Längsschuppenreihen und 10—16 Schenkelporen jederseits; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 505.

Tachydromus sikkimensis n. sp. für *seolineatus* Stol. Sikkim; Günther, l. c., Bd. 1 pag. 166—168.

Scincidae. Biologisches. Notizen über die Lebensweise von *Mabuia punctata* auf Fernando Noronha [vergl. Ber. f. 1887 pag. 179] bringt J. C. Branner. Americ. Naturalist Bd. 22 pag. 866—867.

Auch *Lygosoma (Homolepida) casuarinas* erwies sich nach Palmer als lebendiggebärend; es brachte an zwei aufeinander folgenden Tagen je drei Junge zur Welt. Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2) Bd. 3 pag. 401.

Faunistisches. W. Hartwig sammelte *Chalcides viridanus* Grav. in Anzahl bei Icod de los vinos auf Tenerife; er heisst dort Lhssa. Zool. Garten 29. Jahrg. pag. 159—160.

A. Günther kennt *Mabuia agilis* Raddi von Mexico, Yucatan, Guatemala, Vera Paz, S. Salvador, Panama, Veragua, Venezuela, Ecuador, British Guayana, Rio, Martinique, Dominica und Grenada. Er zeigt, dass sich zwischen *M. agilis* und *dominicana* Garm. absolut keine Trennung ziehen lasse. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 364—365.

Systematisches. Beim jungen *Tropidophorus yunnanensis* Blgr. sind die

Rückenschuppen nach G. A. Boulenger zwei- oder dreikeilig. Ann. Mus. Civ. Genova (2) Bd. 6 pag. 596.

J. G. Fischer macht Mittheilungen über *Mabuia wahlbergi* Pts. und *striata* Pts. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 13, Taf. 2, Fig. 4.

Bemerkungen zu *Mabuia agilis* Raddi von Dominica bringt A. Günther. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 264.

G. A. Boulenger hat eine Notiz über Pholidose und Schwanzlänge von *Lygosoma nativitatis* Blgr. von Christmas-Insel (Ind. Ocean). Proc. Zool. Soc. London pag. 536.

Ablepharus aeneus Blgr. = *cabindae* Boc.; Boettger, Ber. Senckenbg. Nat. Ges. pag. 30. — *A. egeriae* n. sp. verwandt *boutoni* Desj. Christmas-Insel (Ind. Oc.); Boulenger, Proc. Zool. Soc. London pag. 535.

Cyclodus occipitalis Pts. Horsham, West-Victoria, und Süd- und West-australien. Abgeb.; Mc Coy, Prodr. Zool. Victoria Taf. 171.

Euprepes aureocularis F. Müll. = *Mabuia raddoni* Gray; Boettger, Ber. Senckenbg. Nat. Ges. pag. 28. — *Eu. chaperi* Vaill. gute Art neben *sundewalli* Smith; Mocquard, Mém. Cent. Soc. Philomath. Paris 1888 pag. 119.

Lygosoma chinense Gray. Neu beschrieben; Boettger, 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. pag. 66. — *L. (Homolepida) forbesi* n. sp. Sogere, inneres Neuguinea; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 343. — *L. (Hinulia) malayanum* n. sp. Berg Singalang, West-Sumatra; Doria, Ann. Mus. Civ. Genova (2) Bd. 6 pag. 652.

Mabuia dominicana Garm. = *agilis* Raddi; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 364. — *M. peringueyi* n. sp. verwandt *homalocephala*. Namaland; Boulenger, l. c., pag. 139. — *M. wahlbergi* Pts. = *striata* Pts. var. abgeb.; J. G. Fischer, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 14, Taf. 2, Fig. 4.

Panaspis aeneus Cope = *Ablepharus cabindae* Boc.; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. pag. 30.

Scelotes macrolepis n. sp. Madagascar; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 102.

Sepsina hessei Bttg. abgeb.; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. Taf. 1, Fig. 3 und Taf. 2, Fig. 2.

Tropidophorus sinicus Bttg. abgeb.; Boettger, 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. Taf. 2 Fig. 2.

Anelytropsidae. Systematisches. *Feylinia macrolepis* Bttg. abgeb.; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. Taf. 2, Fig. 4.

Rhaptoglossa.

Chamaeleontidae. Faunistisches. Nach O. Boettger fand Forsyth Major 1887 *Chamaeleon vulgaris* Daud. auf der Insel Samos. Sitz.-Ber. Akad. Berlin pag. 169.

Systematisches. A. Günther hält *Chamaeleon laevigatus* Gray aus dem Sudan und aus dem Monbuttugebiet (Obercongo) als Varietät von *Ch. senegalensis* Daud. aufrecht. Proc. Zool. Soc. London pag. 50.

Chamaeleon boettgeri n. sp. verwandt *nasutus*. Nossibé. pag. 23, Taf. 2, Fig. 3. — *Ch. gastrotænia* n. sp. Madagascar. pag. 103, Taf. 5, Fig. 2. — *Ch. guentheri* n. sp. Nossibé. pag. 22, Taf. 2, Fig. 1—2; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1.

Pythonomorpha

(nur fossil).

Systematisches. Ueber die Reste von Pythonomorphen im British Museum macht R. Lydekker Mittheilungen. Abgebildet werden Fig. 57 ein Zahn von *Liodon* aus der Ob. Kreide von Maestricht und Fig. 58 ein vorderer Schwanzwirbel derselben Gattung aus der Kreide von Alabama. Cat. Foss. Rept. a. Amph. Brit. Mus. (N. H.) Bd. 1 pag. 261—274. — Zusätze dazu gibt derselbe in Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 452. Danach ist *Geosaurus* kein Pythonomorphe, sondern ein Crocodilier, der neben die Metriorhynchinae zu den Teleosauriden zu stellen sei (s. Crocodilia).

Mosasauridae. In seiner Arbeit über den Schädel der Mosasaurier beschreibt L. Dollo das Quadratum, behandelt besonders eingehend die Bedeutung der Suprastapedialgrube in demselben und gibt die Abbildungen des Schädels von *Mosasaurus camperi* Cuv. und von *Hainosaurus bernardi* Dollo, letztere ohne eingehendere Beschreibung, aber mit Erklärung ihrer osteologischen Einzelheiten. Bull. Scientif. France et Belg. (3) Jahrg. 1 pag. 1—11, 8 Figg., Taf. 1. — Ref. in Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 519—520 und in N. Jahrb. f. Min. 1889 II pag. 182—183.

Ophidia.

Allgemeines. Referate von R. Franz über seine Arbeit „Deutschlands Schlangen“ [vergl. Ber. f. 1887 pag. 209] und Kritik von Grunnert s. in Forstl. Blätter Bd. 11 (1887) pag. 370—372 und Bd. 12 pag. 106—108.

Integumentalgebilde. Eingehende histologische Untersuchungen an der Haut der Schlangen hat E. Ficalbi [vergl. Ber. f. 1887 pag. 200] angestellt. Er unterscheidet fünf Schichten in der Epidermis, sechs Schichten in der Lederhaut und drei Schichten im Unterhautgewebe. Eine ächte Cuticula ist nach dem Verf. nicht vorhanden; der feine Ueberzug, den er Pellicula nennt, und der als Cuticula gedeutet werden könnte, ist ursprünglich zelliger Natur, wenn er auch späterhin keine Structur mehr erkennen lässt. Bei *Zamenis gemonensis*, *Tropidonotus* und *Elaphis* werden drei Arten von Chromatophoren beschrieben, gelbe, gelbgrüne und schwarze. Nur die Bauchhaut und überhaupt die Haut der ventralen Theile zeigt Hautmuskeln. Zum Schluss werden die Blutgefässe und Nerven, welche die Haut versorgen, geschildert und die Häutung kurz besprochen. Atti Soc. Tosc. Sc. Nat. Pisa, Mem. Bd. 9 pag. 220—333, Taf. 6. — Ref. in Arch. Ital. Biol. Bd. 10 pag. 401—418.

Nervensystem. E. Berger macht Mittheilungen über mitten im Rückenmark der Schlangen befindliche Ganglienzellen. Compt. Rend. Soc. Biol. Paris (8) Bd. 5 pag. 217.

Sinnesorgane. Aus Beobachtungen an *Naja* schliesst G. Pore, dass die Schlangen Schallwellen der Luft überhaupt nicht empfinden, sondern nur die Vibrationen des Bodens. Journ. Bombay N. H. Soc. Bd. 3 pag. 65. — Dasselbe bemerkt H. M. Phipson für *Naja* und *Daboia*. Nature Bd. 38 pag. 284.

Ontogenie. J. F. van Bemmelen will bei Embryonen von *Tropidonotus natrix*, bei denen die vierte Kiemenspalte schon angelegt, die fünfte aber noch nicht sichtbar ist, eine Anlage von Vordergliedmaassen gefunden haben [Beruht

nach späteren Mittheilungen des Verf.'s auf einer Verwechslung von Objecten. Ref.] Tijdsch. Ned. Dierk. Ver. (2) Bd. 2, Versl. pag. 40.

Biologisches. Mittheilungen über Schlangen in der Gefangenschaft bringt C. Brongniart. Le Naturaliste Jahrg. 10 pag. 101—103.

Ueber das Ergreifen und Verschlingen der Beute und die ersten Acte der Verdauungsarbeit bei den Schlangen macht L. Vaillant Mittheilungen. Mém. Cent. Soc. Philom. Paris 1888 pag. 35—46.

Fr. A. Lucas erklärt die Fähigkeit der Schlangen, Thiere oder Menschen zu fascinieren, in der Weise, dass der ganze Effect in der erschreckten Person liege und nicht in einer besonderen Eigenschaft oder Fähigkeit der Schlange. Journ. Trenton Nat. Hist. Soc. No. 3 pag. 356—358.

Dass auch die Anwesenheit eines Frenalschildes kein sicheres Kennzeichen für Nichtgiftigkeit einer Schlange sei, beweist G. A. Boulenger an dem Beispiel von *Azemiops*, einer neuen Giftschlangengattung von den Kakhien Hills in Ob. Burma, die den Habitus einer lycodonten Colubrine mit dem Giftapparat einer Viperine verbindet. Proc. Zool. Soc. London pag. 266.

A. E. Feoktistow bringt vorläufige Mittheilungen über die Wirkungen des Schlangengiftes auf den thierischen Organismus. Geprüft wurde das Gift von *Vipera ammodytes* und *berus* und von *Crotalus durissus*. In physiologischer Beziehung konnte Verf. keinen Unterschied in der Wirkung des Giftes dieser drei Arten finden. Besprochen werden die Grösse der Giftproduction, die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Giftes und seine Einwirkung auf verschiedene Thiere, sowie namentlich auf die verschiedenen Organe und Tätigkeitscentren der höheren Thiere. Den Schluss bilden Notizen über tödlich wirkende Dosen und die Therapie. Ammoniakpraeparate, Alkohol und Kaliumpermanganat verwirft Verf. als Gegenmittel. Mém. Acad. Sc. St.-Petersbourg (7) Bd. 36, No. 4. 22 pag. — Auch separ.: Experimentelle Untersuchungen über Schlangengift. Dorpat 1888, 8°. 45 pag. Inaug.-Diss. St. Petersburg.

J. H. Garnier macht interessante Mittheilungen über Schlangenbiss — die einzige Giftschlange um Ontario ist *Caudisona trigemina* B. G. und selten — und gibt als Gegenmittel verdünntes Jodkalium und dann nach einiger Zeit „sweet spirit of nitre“ innerlich, ein Mittel, das er in einem leichteren Vergiftungsfalle selbst an sich erproben konnte und in drei schweren Fällen von Klapperschlangenbiss bewährt fand. Schliesslich befürwortet Verf. in dringenden Fällen auch die sofortige Anwendung von Schlangensteinen und von Ligaturen. Proc. Canad. Inst. Toronto (3) Bd. 5 pag. 255—261.

O. Katz bringt einige allgemeine Bemerkungen über das Gift von *Hoplocephalus curtus* Schl.g. und erwähnt sodann, dass seine Versuche fehlgeschlagen seien, die zur Lösung der Frage angestellt worden waren, ob das Blut von der Schlange tödlich gebissener Thiere auf andere Thiere tödlich wirke. Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2) Bd. 3 pag. 400—401.

Ueber Wiederholung von Vergiftungssymptomen nach Schlangenbiss macht H. C. Yarrow Mittheilungen. Medical News Bd. 1 (1887) pag. 623.

Palaeontologisches. Ueber die fossilen Schlangenreste im British Museum gibt R. Lydekker eingehend Aufschluss. Abgebildet werden Wirbel Fig. 55 von *Paleryx rhombifer* Ow. aus den Phosphoriten von Caylux, Fig. 56 von *Palaeophis typhoeus* Ow. Catal. Foss. Rept. a. Batr. Brit. Mus. (N. H.) Bd. 1 pag. 249—260.

Ueber die Frage der Valenz und Stellung der Palaeophiden macht derselbe Bemerkungen. Zu den Hydrophiden oder zu den Pythoniden gehören sie nicht; wahrscheinlich sind es aber ächte Meeresschlangen gewesen, die wol den Rang einer eigenen Fam. Palaeophidae verdienen. Nach dem Verf. ist überdies *Palaeopython* Rochebr. auf Wirbel begründet, die in keiner Weise von *Paleryx* Ow. abweichen, die aber allerdings zu den Pythoninen gehören. Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 112—113.

A. Nehring nennt aus dem Quartär von Thiede bei Braunschweig Reste einer Schlange von der Grösse der *Vipera berus*. N. Jahrb. f. Min. 1889 I pag. 81.

Faunistisches. E. D. Cope verzeichnet aus Florida *Tantilla coronata* B. G., *Contia pygaea* Cope, *Osceola elapsoidea* Holbr., *Cemophora coccinea* Blum., *Ophibolus doloiatus* var. *syssyla* n. und var. *parallela* n., *O. getulus* var. *getula* L., *Dromicus flavilatus* Cope, *Coluber quadrivittatus* Daud., *Coluber guttatus* var. *guttata* L. und var. *sellata* n., *C. rosaceus* n. sp., *Pityophis melanoleucus* Holbr., *Spilotes corais* var. *erebenna* Cope, *Cyclophis aestivus* L., *Bascanium constrictor* L. und *flagelliforme* Catesb., *Heterodon platyrhinus* Latr. und *simus*, *Storeria occipitomaculata* Holbr., *Natrix taxispilota* Holbr., *N. fasciata* var. *fasciata* L. und var. *erythrogastra* Shaw, *N. nota* Cope, *N. compressicauda* var. *walkeri* Yarr., var. *compsolema* Cope, var. *compressicauda* Kenn. und var. *bivittata* n., *Eutaenia sirtalis* L. und *sackeni* Kenn., *Liodytes alleni* Garm., *Ancistrodon piscivorus* L., *Crotalophorus miliaris* L. und *Crotalus adamanteus* var. *adamantea* Beauv.; aus Virginia *Ophibolus rhombomaculatus* von Alexandria und aus Alabama und Georgia *Coluber obsoletus* var. *lemniscata* n. Von 35 Arten und Varietäten floridanischer Schlangen sind 5 Species und 6 Varietäten dem Lande eigenthümlich, aber nur 6 Formen überschreiten die östliche Küstenprovinz. Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11 pag. 381—394, Taf. 36, Fig. 3—4.

Systematisches. G. A. Boulenger spricht sich dagegen aus, bei den Schlangen getheiltes oder ungetheiltes Anale und getheilte oder ungetheilte Subcandalen bei sonstiger Uebereinstimmung als generische Charaktere zu verwerthen. Proc. Zool. Soc. London pag. 89.

Typhlopidae. Faunistisches. Burnell nennt *Typhlops nigrescens* Schlg. von Wentworthville bei Parramatta. Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2) Bd. 3 pag. 1096.

Systematisches. *Typhlops schlegelii* Bianc. wird nach G. A. Boulenger 69 cm lang und hat einen Durchmesser von 28 mm. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 140.

Ophthalmidium tenue Hall. = *Typhlops braminus* Daud.; Boettger, 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. pag. 70.

Typhlops (Onychocephalus) conigicus Bttg. abgeb.; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. Taf. 1, Fig. 5. — *T. inornatus* n. sp. Sogere, inneres Neuguinea; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 344. — *T. intermedius*, *kraussi* und *lineolatus* Jan und *punctatus* Gray = *eschrichi* Schlg.; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. pag. 42.

Boidae. a. Pythoninae. Palaeontologisches. Nach R. Lydekker ist *Palaeopython* Rochebr. identisch mit *Paleryx* Ow. Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 112.

b. Boinae. Ontogenie. F. Mocquard macht Mittheilungen über die Lage des Embryos von *Pelophilus madagascariensis* im Ei und gibt Beschreibung

der Embryonen der Rathke'schen ersten, zweiten und dritten Periode. Zu beachten ist, dass beide Oviducte je 12 Eier bargen, dass die embryonale Entwicklung sehr weit vorschreitet und die Schlange deshalb wahrscheinlich zu den ovoviviparen gehört, und dass die zahlreichen Embryonen auffallend ungleich entwickelt sind. Bull. Soc. Philomath. Paris (7) Bd. 12 pag. 34—41.

Systematisches. Notizen über *Eryx jaculus* var. *miliaris* Pall. bringt O. Boettger. Zool. Jahrb., Abth. f. Syst. Bd. 3 pag. 938.

Charina brachyops n. sp. Point Reyes, California. pag. 88, Taf. 36, Fig. 2. — *Ch. plumbea* B. G. = *bottae* Blainv. pag. 88; Cope, Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11.

Chilabothrus gracilis n. sp. verwandt *maculatus* Fisch. Cap Haytien. pag. 85, Taf. 3, Fig. 8. — *Ch. maculatus* n. sp. verwandt *inornatus* Rhdt. Cap Haytien und Gonaives. pag. 33, Taf. 3, Fig. 7; J. G. Fischer, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5.

Eryx jaculus var. *miliaris* Pall. neu diagnosticiert; Boettger, Zool. Jahrb., Abth. f. Syst. Bd. 3 pag. 942. — *E. jayakari* n. sp. Maskat, Arabien; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 508.

Tropidophis conjunctus n. sp. verwandt *maculatus* Bibr. Cap Haytien; J. G. Fischer, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 31, Taf. 3, Fig. 5.

Ungalia moreleti Boc. abgeb.; Bocourt, Miss. Scientif. Mex. Rept. Taf. 42, Fig. 5.

Uropeltidae. Systematisches. G. E. Mason beschreibt eine neue *Silybura* und macht Bemerkungen über Färbung und Pholidose von *Silybura nilgerriensis* var. *picta* Bedd., sowie über *Rhinophis sanguineus* Bedd. var. von den Wullingy-Bergwäldern bei Palghat und über *Melanophidium punctatum* Bedd. von Peermaad in Nord-Travancore. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 184—186.

Silybura phipsei n. sp. verwandt *myhendrae* Bedd. Bombay Ghats; Mason, l. c., pag. 184.

Palaeophidae (foss.). Betr. dieser Familie vergl. R. Lydekker in Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 112—113.

Colubridae. a. Colubrinae. Biologisches. A. Lendl macht Mittheilungen über die Begattung von *Zamenis gemonensis*. Termész. Füzetek Budapest Bd. 11 pag. 59—60, Fig. und pag. 87—89, Fig.

Ueber das laute Zischgeräusch von *Pityophis deppei* Jan berichtet Herrera. Naturaleza Mexicana (2) Bd. 1 pag. 281, Fig.

Faunistisches. F. C. Noll erhielt *Tropidonotus tessellatus* Laur. von Carden und Pommern im Moselthal und erwähnt ihn auch von Bertrich an der Mosel. Zoolog. Garten 29. Jahrg. pag. 242—243.

Systematisches. Bemerkungen zu *Cyclophis fasciatus* Jan bringt O. Boettger pag. 920, zu *Lytorhynchus ridgewayi* Blgr. aus Durun, Transkaspien, pag. 924. Zool. Jahrb., Abth. f. Syst. Bd. 3.

A. Dugès beschreibt eingehend *Tropidonotus (Eutaenia) collaris* Jan pag. 125 und *insigniarum* Cope pag. 127, *Tr. mesomelanus* Jan pag. 129, *Tr. (Eutaenia) pulcherrimus* Cope pag. 126 und *scalaris* Cope pag. 128. Naturaleza Mexicana (2) Bd. 1.

E. D. Cope zählt die Eutaenien von Südost-Indiana auf und beschreibt zwei neue Varietäten und eine neue Art. Die Arten sind *Eutaenia sirtalis* L. typ. und var. *ordinata* L., var. *graminea* n. und var. *obscura* Cope, *Eu. butleri*

n. sp., *Eu. radix* var. *melanotaenia* n. und *Eu. saurita* L. Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11 pag. 399—401.

Mittheilungen über die Unterscheidung der nordamerikanischen *Ophibolus*-Formen, speciell über *O. doliatus* L., *triangulum*, *coccineus*, *rhombomaculatus*, *calligaster*, *annulatus*, *gentilis* und *amaurus* macht derselbe pag. 381. Er stellt zu *O. doliatus* 11 Unterarten und gibt eine Unterscheidungstabelle, sowie die nach ihren Färbungscharakteren wahrscheinlichste phylogenetische Anordnung derselben. Auf pag. 389 erörtert Verf. die Geschichte des Gattungsnamens *Coluber* Opp. und betrachtet danach *C. aesculapii* als Typus der Gattung mit dem Vermerk Günther 1858 und gibt pag. 391 Notizen über die Gattung *Tropidoclonium* Cope. Ebenda Bd. 11.

Notiz zu *Phyllorhis carinatus* Gthr. von Kiukiang gibt A. Günther. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 170.

Derselbe bringt auch Bemerkungen über Färbung und Pholidose von *Elaomorphus acanthias* Kroey. pag. 323, über Stücke von *Uriechis capensis* Smith aus Sansibar und vom Nyassasee, von *U. lunulatus* Pts. vom Nyassasee und von *U. concolor* Fisch. aus Lado und über ihre Unterschiede pag. 324—325 und über Färbung von *Grayia triangularis* Hall. vom Congo und Gabun pag. 325. In einer Notiz über *Boodon geometricus* Boie, der möglicherweise mit *B. mentalis* Gthr. zusammenfalle, bemerkt Verf. pag. 328, dass er die Boie'sche Art nicht kenne, gibt aber einen Schlüssel für 5 neue, nächstverwandte Formen. Ebenda Bd. 1.

Mittheilungen über Färbung von *Homalosoma variegatum* Pts. bringt G. A. Boulenger. Ebenda Bd. 2 pag. 140.

J. G. Fischer gibt systematische Bemerkungen pag. 40 zu *Dromicus antillensis* Schlg. und *parvifrons* Cope und eingehende Beschreibung pag. 37 von *Dr. (Alsophis) anomalus* Pts. und pag. 41 von *Uromacer oxyrrhynchus* D. B. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5.

Ablates homeyeri Pts. = *Dromophis angolensis* Boc.; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 55.

Achalinus rufescens n. sp. angebl. Hongkong; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 43.

Acrophis juliae Cope = *Liophis*, neu diagnostiziert; Günther, l. c., pag. 365.

Ahaetulla bocagei n. sp. Angola; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 326. — *A. emini* n. sp. Monbuttu, Ob. Congo; Günther, Proc. Zool. Soc. London pag. 51 und Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 325. — *A. gracillima* n. sp. Unt. Congo; Günther, l. c., pag. 326. — *A. shirana* n. sp. Shirefluss, Trop. Afr.; Günther, l. c., pag. 326.

Alopecion als Subgen. von *Boodon* wieder aufgenommen für die Arten mit 15—17 Schuppenreihen, mit einer Verticalreihe grösserer sechseckiger Schuppen und mit sehr schlanker Körperform; J. G. Fischer, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 3.

Alsophis angulifer var. *fuscicauda* n. Cayman Brac; Garman, Bull. Essex Instit. Bd. 20 pag. 6. — *A. sibonius* Cope = *Dromicus leucomelas* D. B. Marie Galante, Dominica, Guadeloupe und S. Domingo; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 366.

Amphiardis n. gen. verwandt *Storeria*. Kopf nicht scharf vom Halse abgesetzt; Zähne gleich gross; 2 Nasalen, 2 Internasalen, kein Praeoculare, statt

dessen ein Frenale; Anale einfach; Schuppen gekielt. — Für *Virginia inornata* Garm.; Cope, Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11 pag. 391.

Boodon bipraeocularis n. sp. Tanganyika und Mombas; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 330, Taf. 18, Fig. B. — *B. capensis* D. B., *geometricus* Pts. und *quadrivittatus* Hall. = *lineatus* D. B. var. *capensis*; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. pag. 70. — *B. mentalis* n. sp. Damaraland; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 331, Taf. 19, Fig. A. — *B. niger* Fisch., *quadrivirgatus* Hall. und *virgatus* Cope = *lineatus* D. B. var. *nigra*; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. pag. 71. — *B. poensis* n. sp. Fernando Póo. pag. 330. — *B. seychellensis* n. sp. Seychellen. pag. 330, Taf. 18, Fig. C. — *B. ventralis* n. sp. Alt-Calabar und Ashanti. pag. 329, Taf. 18, Fig. A; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1. — *B. (Alopecion) vossi* n. sp. Kamerun; J. G. Fischer, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 3, Taf. 1, Fig. 1.

Bothrophthalmus melanozostus Jan = *lineatus* Pts.; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. pag. 50.

Brachyopsis n. gen. verwandt *Amblyodipsas*, aber mit grossem Occipitale hinter den Parietalen; das erste Supralabiale in Contact mit dem Internasale; Anale getheilt; Subcaudalen einfach. — Mit *Br. revoili* n. sp. Somaliland; Mocquard, Mém. Cent. Soc. Philomath. Paris 1888 pag. 125, Taf. 11, Fig. 3.

Calamelaps miolepis n. sp. verwandt *unicolor*. Cap Maclear, Nyassasee; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 323.

Calamohydrus n. gen. Kiefer- und Gaumenzähne klein, von gleicher Grösse. Kopf ziemlich verlängert, leicht vom Halse abgesetzt; Augen sehr klein mit runder Pupille, durch Infraocularen von den Labialen getrennt. Naslöcher nach oben gerichtet, im oberen Theile eines Nasale eingestochen. 2 Internasalen, ein unpaares Praefrontale; Rostrale klein, nicht vorgezogen; Frenale, Prae- und Postocularen vorhanden. Schuppen fein gestreift und schwach gekielt, in 17 Reihen. Schwanz mässig lang mit fein ausgezogener Spitze. Anale und Subcaudalen getheilt. Verbindet die Calamarinen mit den Homalopsinen. — Mit *C. andersoni* n. sp. angebl. Hongkong; Boulenger, l. c., (6) Bd. 2 pag. 43.

Clonophis n. gen. verwandt *Storeria*. Zähne gleich gross; Kopf vom Halse nicht abgesetzt; Nasale theilweise getheilt, Frenale vorhanden; Anale getheilt; Schuppen gekielt. — Für *Regina kirtlandi* Kenn.; Cope, Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11 pag. 391.

Coluber guttatus var. *sellata* n. Florida. pag. 387. — *C. obsoletus* var. *lemniscata* n. Mobile, Alabama und Whitfield Cty., N. Georgia. pag. 386. — *C. rosaceus* n. sp. zwischen *guttatus* und *quadrivittatus*. Key West, Florida. pag. 388, Taf. 36, Fig. 3; Cope, Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11.

Coronella microps n. sp. Madagascar. pag. 104, Taf. 5, Fig. 4. — *C. torquata* n. sp. Madagaskar. pag. 103, Taf. 5, Fig. 3; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1.

Coryphodon adumbratus Jan = *Dromicus (Alsophis) anomalus* Pts.?, J. G. Fischer, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 39.

Cyclophiops n. gen. nächstverwandt *Cyclophis*, aber mit getheiltem Nasale; mit 15 Schuppenreihen, Schuppen ohne Apicalporen, Anale einfach. — Mit *C. doriae* n. sp. Kakhien Hills, Burma; Boulenger, Ann. Mus. Civ. Genova (2) Bd. 6 pag. 599, Taf. 6, Fig. 1.

Cynophis moellendorffi Bttg. abgeb.; Boettger, 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. Taf. 1, Fig. 1.

Dendrophis gregorii n. sp. Ceylon; Haly, Taprobanian Bd. 3 pag. 51. — *D. subocularis* n. sp. Bhamò, Burma; Boulenger, Ann. Mus. Civ. Genova (2) Bd. 6 pag. 600, Taf. 6, Fig. 2.

Dromicus baroni n. sp. Madagascar; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 104, Taf. 5, Fig. 5. — *Dr. juliae* Garm. = *Liophis*; Günther, l. c., Bd. 2 pag. 365.

Elapomorphus coecutiens n. sp. verwandt *gabonicus*. Kamerun; Günther, l. c., Bd. 1, pag. 323, Taf. 19, Fig. B.

Elaposchema n. gen. verwandt *Elapomorphus*, aber ohne Praeoculare und Frenale [nach Boulenger = *Calamelaps* Gthr.]. — Mit *E. vaillanti* n. sp. Somaliland; Mocquard, Mém. Cent. Soc. Philomath. Paris 1888 pag. 123, Taf. 12, Fig. 1.

Erythrolamprus grammophrys n. sp. Tingohecho in Michoacán, Mexico; Dugès, Proc. Amer. Phil. Soc. Philadelphia Bd. 25 pag. 181, Fig. 1.

Eutaenia butleri n. sp. Richmond, Südost-Indiana. pag. 399. — *Eu. radix* var. *melanotaenia* n. Südost-Indiana. pag. 400. — *Eu. sirtalis* var. *graminea* n. ebenda. pag. 399; Cope, Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11.

Geophis emmeli n. sp. verwandt *occipitoalbus* Jan. Oberer Beni, Bolivia; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 192, 3 Figg.

Grayia silurophaga Gthr. = *triangularis* Hall.; Boettger, l. c., pag. 51.

Helicops alleni Garm. = *Liodytes* Cope; Cope, Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11 pag. 393.

Hemigenius variabilis n. sp. Guadalajara und Guanajuato, Mexico; Dugès, Proc. Amer. Phil. Soc. Philadelphia Bd. 25 pag. 182, Fig. 2.

Leptophis trifrenatus Hall. = *Zamenis mucosus* L.; Boettger, 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. pag. 75.

Liophis juliae Cope neu diagnostiziert; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 365.

Lycophidium capense Smith mut. *multimaculata* n. Banana, Congo; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. pag. 67. — *L. laterale* Hall. = *capense* Smith var.; Boettger, l. c., pag. 68.

Natrix compressicauda var. *bivittata* n. zwischen dem Typus und *N. sipedon* var. *fasciata*. Florida; Cope, Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11 pag. 392, Taf. 36, Fig. 4.

Neusterophis atratus Pts. = *Coronella olivacea* Pts.; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. pag. 48.

Odontomus fergusoni n. sp. Ceylon; Haly, Taprobanian Bd. 3 pag. 51.

Ophibolus doliatus var. *parallela* n. Gainesville, Florida. pag. 385 und var. *syssila* n. Südl. Ver. Staaten. pag. 381; Cope, Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11.

Periops dorri n. sp. verwandt *parallelus*. Fort Bakel, Ob. Senegal; Lataste, Le Naturaliste 10. Jahrg. pag. 227—228.

Pityophis deppoi Jan beschr. und abgeb.; Dugès, Naturaleza Mexicana (2) Bd. 1 pag. 123, Taf. 13, Fig. 15.

Pseudocyclophis n. gen. verschieden von *Cyclophis* Gthr. durch verticale Pupille, längeren und schlankeren Rumpf, 194—231 (nicht 125—175) Schuppenreihen, mitunter fehlendes Frenale und einfaches Prae- und Postoculare. Transkaspien, Persien. — Hierher *Ps. persicus* Anders. und *Ps. walteri* n. sp. Neu-Serachs, Transkaspien; Boettger, Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 262 und Zool. Jahrb., Abth. f. Syst. Bd. 3 pag. 922, Taf. 34, Fig. 1.

Rhinocalamus n. gen. Körper verlängert, cylindrisch, überall gleich dick; Kopf klein, nicht abgesetzt, schmal und zugespitzt; Schwanz ziemlich lang und stumpf; Auge sehr klein; Maulspalte eng mit schwachen Kiefern; Schuppen glatt in 17 Reihen; Subcaudalen doppelt. Rostrale keilförmig zugespitzt; 2 Paar Frontalen, die hinteren auch noch das Frenale und Praeoculare ersetzend; Nasale einfach, aber mit einer Grube unter dem engen Nasloch. Oberkiefer mit wenigen, verhältnissmässig kräftigen Zähnen, die beiden hintersten grösser und gefurcht. — Mit *Rh. dimidiatus* n. sp. Mpwapwa, Centr.-Afrika; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 322, Taf. 19, Fig. C.

Rhinochilus antonii Dug. abgeb.; Dugès, *Natureza Mexicana* (2) Bd. 1, Taf. 7.

Simocephalus nyassae n. sp. Nyassasee; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 328.

Simotes chinensis n. sp. Kinkiang; Günther, l. c., pag. 169. — *S. herzi* Bttg. = *Coluber rufodorsatus* Cant.; Boettger, 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. pag. 70. — *S. planiceps* n. sp. Minhlà, Burma. pag. 598, Taf. 5, Fig. 2. — *S. torquatus* n. sp. Bhamò, Burma. pag. 597, Taf. 5, Fig. 1; Boulenger, Ann. Mus. Civ. Genova (2) Bd. 6.

Spilotes argus n. sp. verwandt *poecilonotus*. Mexico; Bocourt, Miss. Scient. Mex. Rept. pag. 692, Taf. 48, Fig. 10 und Le Naturaliste 10. Jahrg. pag. 234—235, 7 Figg. — *Sp. pullatus* L. var. *anomalolepis* n. Brasilien; Bocourt, Miss. Scient. l. c., Taf. 44, Fig. 2.

Storeria dekayi var. *anomala* n. Orizaba, Mexico; Dugès, Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11 pag. 9, Fig. 6.

Tropiclonum storerioides Cope = *Natrix*; Cope, l. c., pag. 392.

Tropidonotus Kuhl 1826 = *Natrix* Laurenti 1789; Cope, l. c., pag. 392. — *Tr. (Eutaenia) collaris* Jan abgeb. Fig. 16 und *Tr. (Eutaenia) scalaris* Cope abgeb. Fig. 17; Dugès, *Natureza Mexicana* (2) Bd. 1, Taf. 13.

Ulupe davisoni Blfd. Zusätze zur Diagnose nach einem Stück von Siam; Boettger, 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. pag. 55.

Uriechis jacksoni n. sp. verwandt *capensis*. Kilimandjaro, O.-Afr.; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 325, Taf. 19, Fig. E.

Uromacer oxyrrhynchus D. B. abgeb.; J. G. Fischer, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5, Taf. 3, Fig. 6.

Zamenis anomalus Pts. = *Dromicus (Alsophis) anomalus* Pts. von Haiti; J. G. Fischer, l. c., pag. 37.

b. Dipsadinae. Biologisches. Ueber die giftige Wirkung des Bisses von *Dryophis* auf seine Opfer macht L. Vaillant Mittheilungen. Mém. Cent. Soc. Philomath. Paris 1888 pag. 44.

Systematisches. F. Mocquard gibt einen Zweiten Beitrag [vergl. Ber. f. 1887 pag. 205] zur Kenntniss der Gattung *Psammodynastes* Gthr. Er zieht *Ps. conjunctus* Pts. und *pictus* Gthr. zusammen und weist nach, dass *Ps. pictus* bis jetzt nur von Billiton und Borneo bekannt sei, dass er aber als eine von *Ps. pulverulentus* Boie hinreichend verschiedene Species aufgefasst werden dürfe. Bull. Soc. Philomath. Paris (7) Bd. 12 pag. 104—107.

Amphiophis angolensis Boc. = *Dromophis*; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. pag. 55.

Coelopeltis oxyrhynchus und *porrectus* Jan = *Rhagerrhis oxyrhynchus* Rhdt.; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 327.

Dasypeltis elongata n. sp. Sansibar; Mocquard, Mém. Cent. Soc. Philomath. Paris 1888 pag. 131, Taf. 12, Fig. 2. — *D. scabra* vars. *fasciolata* und *medicis* Pts. = *D. scabra fasciata* A. Smith; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. pag. 76.

Dipsas carinata Hall. = *Dasypeltis scabra fasciata* A. Smith; Boettger, l. c., pag. 76. — *D. ornata* n. sp. King's Sound, Northwest-Australien; Macleay, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2) Bd. 3 pag. 416. — *D. regalis* F. Müll. und *valida* Fisch. = *blandingi* Hall.; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. pag. 74.

Dipsina rubropunctata Fisch. = *Rhagerrhis*; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 327.

Langaha intermedia n. sp. Nossibé; Boulenger, l. c., pag. 105, Taf. 5, Fig. 6.

Psammodynastes conjunctus Pts. = *pictus* Gthr.; Mocquard, Bull. Soc. Philomath. Paris (7) Bd. 12 pag. 105.

Psammophis acutus n. sp. Pungo Andongo, Angola, pag. 327, Taf. 19, Fig. D. — *Ps. oxyrhynchus* Rhdt. = *Rhagerrhis*. pag. 327; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1.

Pythonodipsas carinata Gthr. neu diagnostiziert; Boulenger, l. c. (6) Bd. 2 pag. 140.

Rhagerrhis unguiculata Gthr. = *oxyrhynchus* Rhdt.; Günther, l. c. (6) Bd. 1 pag. 327.

Rhamphiophis rostratus Pts. = *Rhagerrhis oxyrhynchus* Rhdt.; Günther, l. c.

Toxicodryas blandingi Hall. = *Dipsas*; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. pag. 74.

Triglyphodon fuscus D. B. = *Dipsas blandingi* Hall.; Boettger, l. c.

c. Homalopsinae. Systematisches. *Hypsirhina maculata* D. B. und *H. enhydris* var. *maculata* Jan = *bennetti* Gray; Boettger, 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. pag. 81.

d. Elapinae. Biologisches. *Naja tripudians* Merr. ist nach H. M. Phipson ovipar und legt 12–20 Eier; *Bungarus arcuatus* frisst Schlangen (*Dipsas gokool* und *Zamenis mucosus*). Nature Bd. 38 pag. 284.

Systematisches. Notizen zu *Naja tripudians* Merr. var. *oxiana* Eichw. gibt O. Boettger. Zool. Jahrb., Abth. f. Syst., Bd. 3 pag. 943.

G. A. Boulenger beschreibt eine Farbenvarietät von *Callophis maclellandi* Reinh. von den Kakhien Hills, Burma. Ann. Mus. Civ. Genova (2) Bd. 6 pag. 602.

O. Boettger vervollständigt die Diagnose von *Bungarus multicinctus* Blyth. 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. pag. 86.

A. Günther gibt systematische Notizen zu *Atractaspis irregularis* Reinh. und zu *A. aterrima* Gthr. von Monbuttu, Ober-Congo. Proc. Zool. Soc. London pag. 51.

Derselbe erwähnt *Atractaspis microlepidota* Gthr. vom Tanganyika und gibt Notizen über ihre Pholidose. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 332.

J. V. Barboza du Bocage bespricht die 7 bekannten Formen von *Dendraspis* und zieht sie zu vier Arten zusammen, für deren Bestimmung er pag. 146 einen Schlüssel gibt. Eine neue Art. Journ. Sc. Math., Phys. e Nat. Lisboa Bd. 12 pag. 138–147, 11 Fig.

Bemerkungen zu *Vermicella bertholdi* Jan und *Diemenia superciliosa* Fisch. macht A. Zietz. Trans. Roy. Soc. S.-Austr. Bd. 10 pag. 300.

Douglas-Ogilby erwähnt eine neue Schlange von South Solitary Island, ohne ihr einen Namen zu geben. Sie unterscheidet sich von der nahe verwandten Gattung *Pseudechis* durch einfaches Nasale. Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2) Bd. 3 pag. 337.

Asemiops n. gen. s. unten unter Viperinae pag. 217.

Bungarus semifasciatus Gthr. & Boettg. ex parte = *multicinctus* Blyth; Boettger, 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. pag. 86.

Causus jacksoni n. sp. Tanganyika und Lamu, O.-Afr.; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 331.

Dendraspis angusticeps Smith, typ. abgeb. Fig. 9 und var. *polylepis* Gthr. abgeb. Fig. 10. — *D. antinorii* Pts. abgeb. Fig. 11. — *D. jamesoni* Traill, typ. Bissau abgeb. Fig. 1, var. von Ssibange (Gabun) abgeb. Fig. 2—3 (Westafrika nördlich des Aequators!). — *D. neglecta* n. sp. für *angusticeps* ant. non Smith, für *fasciolatus* Fisch. und *welwitschi* Gthr., typ. abgeb. Fig. 4, var. *fasciolata* Fisch. Gabun abgeb. Fig. 5—6, var. 2 Gabun und Congo abgeb. Fig. 7 und var. *welwitschi* Gthr. Gabun abgeb. Fig. 8 (Westafrika vom Senegal bis Quanza!); Bocage, Journ. Sc. Math. Lisboa Bd. 12 pag. 138—147.

Diemenia angusticeps n. sp. King's Sound, Nordwest-Austr.; Macleay, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2) Bd. 3 pag. 417.

Dinophis fasciolatus Fisch. = *Dendraspis jamesoni* Traill; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. pag. 85.

Elapsoidea decosteri n. sp. verwandt *sundewalli* Smith. Delagoa-Bai; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 141. — *E. hessei* Bttg. abgeb.; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. Taf. 2, Fig. 6. — *E. nigra* n. sp. Ushambola, Trop. Afr.; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 332.

Hoplocephalus melanurus n. sp. Guadalcanar, Salomonsins. pag. 88. — *H. woodfordi* n. sp. dem vorigen verwandt. Neu-Georgia, Salomonsins. pag. 89; Boulenger, Proc. Zool. Soc. London 1888.

Naja haje var. *leucosticta* Fisch. = var. *melanoleuca* Hall.; Boettger, Ber. Senck. Nat. Ges. pag. 80.

e. Hydrophiinae. Faunistisches. A. W. Buckland führt das vereinzelte Vorkommen von *Pelamis* am Cap im Jahre 1885 [vergl. Ber. f. 1885 pag. 279] auf Meeresströmungen infolge des Krakatau-Ausbruchs 1883 in der Javasee zurück. Nature Bd. 38 pag. 245.

J. G. Fischer beschreibt *Platurus colubrinus* Schn. von der Insel Okinawa, Liukiu-Gruppe, und berichtet über die von Doederlein wie von Warburg verbürgte Harmlosigkeit dieser Seeschlange, die trotz ihrer Giftzähne den Menschen niemals beißt. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 18.

Systematisches. G. A. Boulenger fand bei *Hydrophis viperinus* Schm. einen neuen Typus der Bezahnung, nämlich eine Reihe von vier gleichweit von einander abstehenden, gleichgrossen Furchenzähnen ohne hintere solide Zähne. Bis jetzt war der *Calamaria*-ähnliche *Ogmodon* Pts. die einzige Schlange, welche eine Reihe von Grubenzähnen trägt. Auch eine grosse Giftdrüse konnte nachgewiesen werden. Wahrscheinlich wird demnach der Gattungsname *Distira* Lac. für diese und ähnlich gezahnte Hydrophiden aufrecht erhalten werden können. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 44—45.

In einer Notiz über äussere Geschlechtscharaktere bei den Seeschlangen constatiert O. Boettger an zahlreichen Stücken von *Hydrophis cyanocinctus*

Daud., *loreatus* Gray und *ornatus* Gray von den Philippinen, dass beim ♂ derselben die Anzahl der Schuppen in der Ventrallinie und die der Schuppen um den Nacken kleiner, die Zahl der Praeanalschuppen aber grösser ist als beim ♀. Die stacheligen Protuberanzen der Schuppen sind ein Geschlechtscharakter wesentlich des ♂ und dienen zur Fixierung beim Begattungsact. Acht Arten Hydrophiden werden von den Philippinen namhaft gemacht. Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 395–398.

Distira praescutata D. B. = *viperina* Schm.; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 44.

Hydrophis abbreviatus Jan und *H. brevis* Jan = *loreatus* Gray; Boettger, Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 396. — *H. rappi* Jan = *cyanocinctus* Daud.; Boettger, 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. pag. 88. — *H. westermanni* Jan = *cyanocinctus* Daud.; Boettger, Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 396.

Platurus schistorhynchus Gthr. = *colubrinus* Schnld.; J. G. Fischer, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 19.

Amblycephalidae. Systematisches. *Paras andersoni* n. sp. verwandt *modestus* und *moellendorffi*. Bhamò und Kakhien Hills, Burma; Boulenger, Ann. Mus. Civ. Genova (2) Bd. 6 pag. 601, Taf. 5, Fig. 3. — *P. moellendorffi* Bttg. abgeh.; Boettger, 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. Taf. 2, Fig. 1.

Viperidae. Allgemeines. H. Lachmann's „Giftschlangen Europas. Magdeburg 1888, Crentz'sche Verlagsbuchh. 105 pag., 9 Figg.“ ist eine fleissige, aber dem Verf. nicht in Fleisch und Blut übergegangene Compilation. Im Verzeichniss der benutzten Literatur wird Streubel statt Strauch geschrieben; auch dass Verf. Gray's Synops. Vipers benutzt habe, ist unwahrscheinlich. Wo und wann Verf. *Trionocephalus halys* in Gefangenschaft beobachten konnte (pag. 19, 55), wäre zu hören interessant. Was pag. 37 über das Abschneiden gebissener erster Phalangen sagt, dürfte doch über das Ziel hinauschiessen; auch die äussere Beschreibung der Giftschlangen ist zu langathmig und für ein Laienpublikum viel zu gelehrt abgeschrieben. Die Beschreibung der nordafrikanischen *Vipera cerastes* war jedenfalls ganz überflüssig. Die besondere Lebhaftigkeit der Otter beim Nachtfang wird entgegen den meisten neueren Beobachtungen (pag. 90) besonders betont. Die eigenen Beobachtungen des Verf.'s dürften mit Vorsicht aufzunehmen sein.

a. *Viperinae*. Biologisches. Nach Bleyer vergiftet und verschlingt die Kreuzotter auch in der Gefangenschaft ihre Beute. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien Bd. 38, Sitz.-Ber. pag. 53–54.

Ueber Krankheitserscheinungen nach dem Biss der Kreuzotter vergl. Wien. Med. Wochenschr. Bd. 26 (1886) pag. 10. — Ref. in Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. Jahrg. 44 pag. 233–234.

Vergl. auch G. St. Mivart's Artikel „Viper“ in Encyclopaedia Britannica Bd. 24 pag. 247–248, Figg.

Faunistisches. Mit Hilfe von Fragebogen hat J. Blum die grosse Aufgabe, eine Karte der Verbreitung von *Vipera berus* L. in Deutschland zu geben, in musterhafter Weise gelöst. In einem allgemeinen Theile werden die 6 deutschen Schlangenarten in Bezug auf ihr Verbreitungsgebiet kurz erwähnt, dann die Kreuzotter eingehend beschrieben. Die schwarze Varietät (*var. prester*) fehlt im Thüringerwald, Harz und Fichtelgebirge. Weiter werden über Geschlechtsunterschied, Giftzähne, Verschlingen der Beute, Fortbewegung,

Schwimmen, Häutung, Nahrung, nächtliche Lebensweise oder Tagesaufenthalt, Faszinierung, Verhalten in der Gefangenschaft, Fortpflanzung, allgemeine Verbreitung, Zusammenvorkommen mit *Coronella austriaca*, Aufenthaltsorte, Verschleppung, Versteck, Winterschlaf, Verhalten im Sommer, Biss und dessen Folgen bei Mensch und Thier, Krankheitserscheinungen und Therapie, Vorsichtsmaassregeln und Schutzmittel, Prämien, Unterricht, Feinde in der Thierwelt und Nutzen der Kreuzotter wichtige und z. Th. neue Mittheilungen gemacht. Den Haupttheil der umfangreichen Arbeit macht die Angabe der Fundorte aus, die nach Ländern, Provinzen, Bezirken und Kreisen geordnet, aufs Genaueste auch nach geologischer Beschaffenheit, Höhenlage und Culturverhältnissen behandelt werden. Ein Schlusswort fasst die auf einer Karte angemerkten Einzelresultate übersichtlich zusammen. Ganz frei von *Vipera* sind in Deutschland das nördliche Baden und Württemberg, der grössere Theil von Unterfranken — das Rhöngebiet ausgenommen —, das ganze Grossherzogthum Hessen, der Reg.-Bezirk Wiesbaden, die Rheinprovinz mit Ausnahme von wenigen Fundorten, das Fürstenthum Birkenfeld, die ganze Pfalz und Ober- und Unterelsass. Auch in den Fürstenthümern Schaumburg-Lippe und Lippe, in Waldeck und Sachsen-Coburg fehlt sie, überhaupt also in den wärmsten Gegenden Deutschlands und so ziemlich in allen Weinlagen. Auch in Ueberschwemmungsgebieten mangelt sie. Verf. constatirt aus den letzten zehn Jahren mindestens 17 Fälle von tödlichem Biss; die Verletzungen von Menschen innerhalb dieses Zeitraums schätzt er auf 600. In einem Anhang ist ein übersichtlicher Schlüssel zur Unterscheidung der Otter von den ungiftigen Schlangen mit 8 correspondierenden Abbildungen gegeben. Die überaus fleissige Arbeit bringt ein statistisches Material über ganz Deutschland, wie wir es bis jetzt noch von keinem einzigen wildlebenden Thiere besaßen. Abh. Senckenberg. Nat. Ges. Bd. 15 pag. 123 bis 278, mit 9 Figg. und Karte. — Ref. in Zool. Garten 29. Jahrg. pag. 300 bis 304.

O. Krimmel macht Mittheilungen über die Verbreitung der Kreuzotter in Württemberg. Verf. kennt aus dem Lande keine Verwundung durch Otternbiss mit tödlichem Ausgange. Sie bewohnt zahlreich das Plateau des weissen Juras und steigt nur an einzelnen Orten, wie bei Aalen, in die Thäler des braunen Juras hinab. Auf der schwäbischen Alb ist sie nahezu überall zu finden. Ebenso ist sie in den Rieden von Oberschwaben eine häufige Erscheinung. Auf dem württembergischen Schwarzwald ist die Kreuzotter nur an einzelnen Orten mit Sicherheit nachgewiesen. Das Vorkommen im Unterlande, im Gebiet des Muschelkalkes und Keupers, bedarf vielfach noch der Bestätigung. Zahlreiche genaue Fundorte, die z. Th. noch neuerdings bestätigt werden konnten, werden angeführt. Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk. Württ. Jahrg. 44 pag. 232 bis 239.

Mittheilungen über das Vorkommen von *Vipera berus* L. im Herzogthum Sachsen-Altenburg bringt C. Wezel. Mitth. Nat. Ges. Osterlande. Altenburg N. F. Bd. 4 pag. 81—87.

Zahlreiche Fundorte für *V. berus* in der preuss. Provinz Sachsen gibt W. Wolterstorff. Zeitschr. Ges. Naturw. (Halle) Bd. 61 pag. 1—38.

O. G. A. Brischke fand *V. berus* var. *prester* häufig auf der Landzunge Hela, Westpreussen. Schrift. Nat. Ges. Danzig. N. F. Bd. 7 Heft 1 pag. 45.

Bemerkungen über *V. berus* bringt auch C. F. von Homeyer. Die Natur Jahrg. 36 (1887) pag. 428—433.

G. Entz macht Mittheilungen über die in Siebenbürgen allgemein verbreitete *Vipera berus* L., die im Hunyader Comitatz mit *V. ammodytes* L. zusammentreffe. Er kennt Stücke der letzteren von Kolczvár am Fusse des Retyezát, während er selbst erstere auf dem Retyezát sammelte, beschreibt die Färbung von *V. berus* aus Klausenburg und Esztény im Szolnok-Dobokaer Comitatz und lenkt dann die Aufmerksamkeit auf zwei Rassen derselben, eine lang- und eine breitköpfige, die sich auch [unwesentlich; Ref.] in der Kopfhuldose und im Aufenthaltsort von einander unterscheiden. Bei Klausenburg lebt *Vipera* mit *Coronella* auf denselben Heuwiesen. Rev. Siebenbürg. Mus. Ver. Klausenburg Bd. 10 pag. 123—128, Taf. 4.

J. Blum erhielt *Vipera aspis* L. von den Rochers de la Phrase zwischen Novéant und Dornot in Deutsch-Lothringen [vergl. Ber. f. 1887 pag. 209] und erwähnt sie auch von Waldshut im südlichen Schwarzwalde. Der Weidmann Bd. 19 pag. 134. — Eine Notiz über das Vorkommen bei Novéant-Dornot und über die Färbung der Schwanzspitze der europäischen Ottern bringt auch O. Boettger. Ber. Senckenberg. Nat. Ges. 1888, Anhang pag. 64—65.

G. A. Pirona entdeckte *Vipera ammodytes* L. auf den Bergen Flagello und Corno im Friaul. Atti Istit. Veneto Sc. (6) Bd. 6 pag. 1165—1172.

M. Bartels nennt *Vipera arietans* Merr. von der Mündung des Olifant-River in Transvaal. Sitz.-Ber. Ges. Nat. Fr. Berlin 1888 pag. 69.

Systematisches. In einem I. Theil seiner Monographie der Schlangen Italiens behandelt L. Camerano systematisch und geographisch die Viperiden Italiens. Auf ein sehr umfangreiches Vergleichsmaterial gestützt sucht er nachzuweisen, dass in ganz Europa nur zwei *Vipera*-Arten — *V. ammodytes* und *V. berus* — existieren; von letzterer sei *V. aspis* L. nur eine südliche Subspecies, und von dieser wieder sei *V. latastei* Bosc. eine Varietät. *V. latastei* und *V. seonei* Lat. seien nur wenig stabile Zwischenformen zwischen *V. berus* und *V. berus* subsp. *aspis*. In Italien finden sich *V. ammodytes*, *berus* und *berus* subsp. *aspis*. Monografia d. Ofidi Italiani. Pt. I: Viperidi. Torino, E. Lösscher, 4°. 51 pag., Taf. 1—2 und in Mem. R. Accad. Sc. Torino (2) Bd. 39. — Ref. in Atti R. Accad. Sc. Torino Bd. 23 pag. 622—624 und in Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino Bd. 3, No. 49. 2 pag.

Notizen über die unterscheidenden Merkmale von *Vipera obtusa* Dwig. und *xanthina* Gray pag. 946 und Bemerkungen über *Echis arenicola* Boie pag. 949 bringt O. Boettger. Zool. Jahrb., Abth. f. Syst., Bd. 3.

Derselbe gibt die Unterscheidungscharactere der 3 bekannten *Atheris*-Arten. Ber. Senck. Nat. Ges. pag. 93.

J. G. Fischer macht ebenfalls Bemerkungen über die spezifische Verschiedenheit der bis jetzt beschriebenen Baumvipern (*Atheris*). Weder die Färbung, noch die Anzahl der Bauch- und Schwanzschilder oder der Schuppenreihen, noch auch die Anzahl der Schuppenreihen zwischen Auge und Lippen-schildern und die Kielung der Scheitelschuppen scheine spezifischen Werth zu haben; höchstens vielleicht die Form der Schuppen der äussersten Seitenreihe. Verf. kommt zu dem Resultate, dass entweder alle *Atheris*-Formen in eine einzige Art zusammenzuziehen sind, oder dass höchstens *A. chloroechis* Schlg.

und *A. squamigera* Hall. als solche zu betrachten sind. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 7.

Atheris anisolepis Mocq. = *chloroechis* Schlg.; Boulenger, Ber. Senck. Nat. Ges. pag. 93. — *A. laeviceps* Bttg. abgeb.; Boettger, l. c., Taf. 2, Fig. 7. — *A. subocularis* n. sp. Kamerun; J. G. Fischer, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 5, Taf. 1, Fig. 2 und Taf. 2, Fig. 11.

Azemiope n. gen. Maxillare kurz, grade, mit einem einzigen grossen, durchbohrten Zahn; Palatin- und Pterygoidzähne zahlreich, klein. Kopf abgesetzt; Nasale einfach; Auge klein mit senkrechter Pupille; 2 Prae- und 2 Postocularen; Frenale vorhanden. Rumpf und Schwanz von mässiger Länge, cylindrisch; Schuppen glatt; Anale einfach; Subcaudalen doppelt. — Wahrscheinlich nächstverwandt *Dinodipsas* Pts.; verbindet die äusseren Charactere einer lycodonten Colubrine mit dem Giftapparat einer Viperide. — Mit *A. feae* n. sp. Kakhien Hills, Burma; Boulenger, Ann. Mus. Civ. Genova (2) Bd. 6 pag. 602, Taf. 7. — Vergl. auch Proc. Zool. Soc. London pag. 266.

Vipera ammodytes L. zahlreiche Abbild. des Nasenaufsatzes und der Structur der Schuppen. Taf. 2. — *V. aspis* L. typ. zahlr. Abbild. der Zeichnung, der Kopfschilder, der Schnauze, der Structur der Schuppen etc. Taf. 1—2 und *V. aspis* subsp. *berus* L. desgl. Taf. 1—2; Camerano, Mem. R. Accad. Sc. Torino (2) Bd. 39. — *V. peringueyi* n. sp. Oestl. von Walfischbai, Damaraland; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 141.

b. Crotalinae. Integumentalgebilde. S. Garman bespricht die Häutung der Schlangen und bemerkt, dass die Klapper der Crotalinen als das Relict von Häutungsresten aufzufassen sei. Er schildert die Art des Wachstums der Klapper bei *Sistrurus* und *Crotalus* und sucht den Ursprung des Gebildes unter Zugrundelegung der mannigfachen Schwanzstachelformen der übrigen Crotalinen zu erklären. Die verschiedenen Arten von beobachteten Klappern lassen sich jedoch wahrscheinlich nicht von einer einzigen, noch lebenden, nicht klappertragenden Urform ableiten, sondern von zweien. Bull. Mus. Comp. Zool. Cambridge Bd. 13 pag. 259—268, Taf. 1—2 und Bull. Essex Instit. Bd. 19 pag. 119—121. — Ref. in Nature Bd. 39 (1889) pag. 569.

Systematisches. J. G. Fischer beschreibt *Trimeresurus riukianus* Hilgdf. von Okinawa, Liukin-Gruppe, und vergleicht ihn mit dem verwandten *Tr. mucrosquamatus* Cant. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 20.

A. Dugès gibt Beschreibungen von *Crotalus basiliscus* Cope und von *Cr. polystictus* Cope. Naturaleza Mexicana (2) Bd. 1 pag. 132—133.

Halys acutus n. sp. Kinkiang, China; Günther, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 171, Taf. 12.

Ornithosauria

(nur fossil).

Allgemeines. Zusammenfassende Mittheilungen über unsere heutige Kenntniss der Ornithosauria bringt E. T. Newton. Er theilt dieselben ein:

1. Ohne Zähne: Pteranodontia mit *Pteranodon* und *Nyctodactylus*.

2. Mit Zähnen: Pterosauria.

a. 2 Phalangen im Flugfinger: *Ornithopterus*.

b. 4 Phalangen im Flugfinger: alle übrigen Gattungen.

Verf. unterscheidet 14 Gattungen (ausser den obigen noch *Pterodactylus*, *Cycno-*

rhamphus, *Ptenodracon*, *Scaphognathus*, *Dimorphodon*, *Rhamphorhynchus*, *Rhamphocephalus*, *Dorygnathus*, *Ornithochirus*, *Ornithostoma* und *Dermodactylus*) mit in allem 86 Arten. Proc. Geologist's Assoc. Bd. 10 pag. 406—424, 13 Figg. — Ref. in N. Jahrb. f. Min. 1889 II pag. 179—180.

Systematisches. Ueber Diagnose der Ordnung, der Unterordnungen, Gattungen und Arten von Ornithosauriern im British Museum macht R. Lydekker pag. 2—42 ausführliche Mittheilungen. Er theilt dieselben ein in Pteranodontier und Pterosaurier und letztere wiederum in die Familien Pterodactylidae und Rhamphorhynchidae. Für *Ornithocephalus brevirostris* Sömm. schlägt er pag. 3 den Namen *Ptenodracon* n. gen. vor und bildet ab Fig. 2 *Pterodactylus antiquus* Sömm., Fig. 3 *Pt. spectabilis* v. Meyr. und Fig. 4 *Scaphognathus crassirostris* Goldf. Cat. Foss. Rept. a. Amph. Brit. Mus. (N. H.) Bd. 1.

Pterodactylidae. G. de la Moussaye beschreibt und bildet ab einen von einem Canal durchbohrten gigantischen Zahn aus dem Fullers von Leulinghen, den er einem *Pterodactylus leulinghenensis* n. zuschreibt. Danach hätten die Pterodactylen Giftzähne gehabt. [Natürlich eine ganz unbewiesene Behauptung. Ref.] Le Naturaliste 10. Jahrg. pag. 239—240, 4 Figg.

Rhamphorhynchidae. Mittheilungen über Schädel, Gehirn und Gehörorgan eines neuen Ornithosauriers *Scaphognathus purdoni* n. aus dem Ob. Lias von Lofthouse bei Whitby in Yorkshire bringt E. T. Newton. Der Schädelbau und namentlich die Schädelbasis liegt klarer vor, als bei irgend einem der früher beschriebenen Pterodactylier. Jederseits zeigen sich fünf Oeffnungen: die Augenhöhle, die Anteorbitalgrube, die Nasenöffnung und je eine Supra- und eine Infraorbitalgrube. Ungewöhnlich ist die Form des Jugale und des Quadratojugale, ebenso der Bau der Schädelbasis. Die Basispterygoidfortsätze des Sphenoids und überhaupt die Schädelbasis erinnern nämlich an gleiche Bildungen beim Chamaeleon. Der hintere Theil des Schädels hat eidechsenartigen Bau. Das vogelähnliche Gehirn zeigt nur den achten Theil der Schädellänge; das Gehörorgan hat Aehnlichkeit mit dem des Chamaeleons, ein Trommelfell fehlte wahrscheinlich. Die Ornithosaurier sind nach diesen Befunden aber nicht vermittelnde Zwischenglieder zwischen Vögeln und Eidechsen, sondern alle drei Formengruppen, Aves, Ornithosauria und Reptilia leiten sich divergierend von einem gemeinsamen älteren Stamme ab. Der Arbeit folgt eine Aufzählung der Gattungen und Arten der bekannten Ornithosaurier mit ihren Synonymen. Phil. Trans. Roy. Soc. London Bd. 179 B (1889) pag. 503—537, 4 Figg., Taf. 77—78. — Ref. in Proc. Roy. Soc. London Bd. 43 pag. 436—440, in N. Jahrb. f. Min. 1889 II pag. 180—181 und in Nature Bd. 37 pag. 598—599. — G. Baur macht in einer Notiz dazu einige Bemerkungen über die Beziehungen einzelner Knochen zu einander. Geol. Magaz. (3) Bd. 6 pag. 171—174.

Dinosauria

(nur fossil).

Allgemeines. G. de la Moussaye. Les Dinosauriens et le Transfornisme. Paris 1888, 8°. 8 pag.

Ueber Diagnose der Ordnung, der Unterordnungen, Gattungen und Arten fossiler Dinosaurier im British Museum macht R. Lydekker eingehende Mittheilungen. Verf. theilt die ihm näher bekannten Arten ein in:

I. Unterordn. Sauropoda.

1. Fam. Cetiosauridae mit *Titanosaurus*, *Dinodocus* und *Cetiosaurus*.
2. Fam. Atlantosauridae mit *Atlantosaurus*, *Pelorosaurus* und *Ornithopsis*.
Unsichere Gattungen: *Thecospondylus* und *Macrurosaurus*.

II. Unterordn. Theropoda.

1. Fam. Coeluridae mit *Coelurus*.
2. Fam. Compsognathidae mit *Compsognathus*.
3. Fam. Megalosauridae mit *Aristosuchus*, *Megalosaurus*, *Dryptosaurus*,
Bothriospondylus und *Zanclodon*.
4. Fam. Anchisauridae mit *Thecodontosaurus*.

III. Unterordn. Ornithopoda.

1. Fam. Omosauridae mit *Omosaurus*.
2. Fam. Scelidosauridae mit *Scelidosaurus*, *Acanthopholis*, *Regnosaurus*,
Hylaeosaurus und *Polacanthus*.
3. Fam. Iguanodontidae mit *Hypsilophodon*, *Iguanodon* und *Sphenospondylus*.
4. Fam. Trachodontidae mit *Orthomerus* und *Trachodon*.

Unsicherer Ordnung: *Nuthetes* und *Echinodon*.

Für die Familie Morosauridae wird pag. 133 der Name Cetiosauridae wegen der Identität von *Morosaurus* Marsh mit *Cetiosaurus* vorgeschlagen. Verf. rechnet auch *Pleurocoelus* Marsh pag. 134 zu den Cetiosauriden; *Ornithopsis leedsi* Ilke. pag. 151 sei wahrscheinlich = *humero cristatus* Ilke. Abgebildet werden Zähne Fig. 20 von *Morosaurus grandis* Marsh, Fig. 24 von *Ornithopsis hulkei* Seel., Fig. 28 von *Zanclodon* sp. aus dem Unt. Lias von Lime-Regis, Fig. 30 von *Thecodontosaurus platyodon* R. S. aus der Ob. Trias von Bristol, Fig. 33 von *Scelidosaurus harrisi* Ow. aus der Unt. Trias von Dorsetshire und Fig. 37 von *Iguanodon* sp. aus englischem Wealden. Catal. Foss. Rept. a. Amph. Brit. Mus. (N. H.) Bd. 1 pag. 131—248. — Berichtigungen zu seiner Auffassung verschiedener Dinosaurierreste in diesem Catalog bringt derselbe in Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 452—453, wo zu den Gattungen *Iguanodon*, *Hylaeosaurus*, *Diplodocus*, *Regnosaurus*, *Polacanthus*, *Vectisaurus*, *Cetiosaurus*, *Ornithopsis*, *Laosaurus*, *Camptonotus*, *Omosaurus* und *Stegosaurus* Zusätze gemacht werden.

Systematisches. H. G. Seeley ersetzt die Ordnungsamen Omosauria und Cetiosauria [vergl. Ber. f. 1887 pag. 212] jetzt durch die Benennungen Ornithischia und Saurischia. Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 45—46 und Rep. 57. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. pag. 698—699.

R. Lydekker macht Mittheilungen über verschiedene Dinosaurier-Reste im British Museum. Qu. Journ. Geol. Soc. London Bd. 44 pag. 46—60, 3 Figg., Taf. 3. — Ref. in Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 58.

Weitere, namentlich geschichtliche Mittheilungen über Classification der Dinosaurier bringt H. G. Seeley. Die Cetiosaurier will er von den Sauropoden getrennt wissen; Sauropoden und Theropoden vereinigt er zu einer Ordnung Saurischia. Qu. Journ. Geol. Soc. London Bd. 44 pag. 85—86.

O. C. Marsh beschreibt zwei neue Gattungen und 5 neue Arten von Dinosauriern aus der oberjurassischen Potomac-Gruppe Nordamerikas. Amer. Journ. Sc. Arts (3) Bd. 35 pag. 89—94, 9 Figg.

H. E. Sauvage zählt aus dem Ober-Portlandien von Boulogne-sur-Mer

von Dinosauriern auf *Megalosaurus insignis* Desl. (Taf. 12, Fig. 6), *Iguanodon prestwichi* Hlke. (Zahn Taf. 12, Fig. 5), *Caulodon praecursor* Svge. (Taf. 12, Fig. 1–4 = *Neosodon* Mouss.) und Reste eines sauropoden Dinosauriers. Bull. Soc. Géol. France (3) Bd. 16 pag. 625–627, Taf. 12. — G. de la Moussaye hält seinen *Neosodon praecursor* für verschieden von *Caulodon praecursor*. Ebenda pag. 692. — R. Lydekker erklärt *Caulodon praecursor* Svge. für nächstverwandt mit *Pelorosaurus humerocristatus* Hlke. Qu. Journ. Geol. Soc. London Bd. 45 (1889) pag. 244–245.

Sauropoda. R. Lydekker kann sich mit der Ansicht Seeley's, dass Sauropoden und Theropoden zu einer Unterordnung verschmolzen werden sollten, nicht befreunden. Er beleuchtet sodann eingehend die Verwandtschaften der beiden bestbekannten englischen Gattungen *Cetiosaurus* und *Ornithopsis*. Qu. Journ. Geol. Soc. London Bd. 44 pag. 53–59.

Cetiosauridae. Derselbe fand, dass *Cetiosaurus humerocristatus* Hlke. ohne Frage zu *Ornithopsis* gehört; auch *Gigantosaurus megalonyx* Seel. und *Ornithopsis leedsi* Hlke. seien vermuthlich mit diesem *Ornithopsis humerocristatus* (Hlke.) identisch. *Cetiosaurus* sei mit dem nordamerikanischen *Morosaurus* überaus nahe verwandt, was eingehend dargelegt wird. Ebenso finden sich Bemerkungen über *Cetiosaurus brevis*, *Titanosaurus* und *Bothryospondylus magnus*. Ebenda pag. 58–59.

Ueber die Wirbel von *Bothryospondylus suffossus* Lyd., die zu *Ornithopsis* gehören dürften, und von *B. robustus*, die zu *Cetiosaurus* zu stellen sein mögen, vergl. denselben. Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 452.

Pleurocoelidae. O. C. Marsh errichtet für die neue Gattung *Pleurocoelus* (mit *nanus* n. pag. 90, Fig. 1–6 und *altus* n. pag. 92) aus der oberjurassischen Potomac-Gruppe von Prince George Co., Maryland, eine neue Familie mit folgenden Kennzeichen: Verwandt *Morosaurus*, aber die Zähne mit zusammengedrückter Krone, die Dorsalwirbel mit langer, tiefer Längsgrube auf jeder Seite des Centrums, die Sacralwirbel solid, ebenfalls mit Aushöhlung auf jeder Seite und davor eine Rückenfacette, die vorderen Schwanzwirbel mit flachen Gelenkflächen und quer zusammengedrückten Neuraldornen, die hinteren Schwanzwirbel mit dem Neuralbogen auf der vorderen Hälfte des Centrums. Amer. Journ. Sc. Arts (3) Bd. 35 pag. 90–92, 6 Figg.

Atlantosauridae. R. Lydekker behandelt die Verwandtschaften der Reste von *Ornithopsis* aus England mit dem nordamerikanischen *Brontosaurus* und beschreibt die Scapula und einen vermuthlich zu *O. hulkei* zu stellenden Zahn (Fig. 4), sowie die Maxilla (Fig. 1–3) dieses Thieres aus dem Wealden von Wight. Auch der Humerus von *Pelorosaurus* könnte zu *Ornithopsis* gehören, und *Cetiosaurus humerocristatus* Seel. sei sicher eine *Ornithopsis*. Qu. Journ. Geol. Soc. London Bd. 44 pag. 54–58, Taf. 3.

Theropoda. Derselbe beschreibt Theropodenreste aus dem Karroosystem des Basutolandes, Südafrika, als *Massospondylus* n. gen. (*carinatus* Ow.), die zum mindesten generisch mit solchen aus den indischen Maleri-Schichten übereinstimmen. Rec. Geol. Survey India Bd. 21 pag. 147, Figg.

Coeluridae. H. G. Seeley beschreibt den unvollständigen vorderen Theil eines Halswirbels von *Coelurus*-ähnlichem Bau aus dem Wealden von Wight als *Thecospondylus daviesi* n. Qu. Journ. Geol. Soc. London Bd. 44 pag. 79–86, 5 Figg. — Hulke stellt denselben provisorisch zu *Coelurus* Marsh. Ebenda

pag. 87. — Ref. in Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 45. — R. Lydekker bringt denselben ebenfalls zu *Coelurus*. Cat. Foss. Rept. a. Batr. Brit. Mus. (N. H.) Bd. 1 pag. 156.

O. C. Marsh gibt kurze Diagnose eines neuen kleinen *Coelurus* (*gracilis* n.) nach Gliedmaassenresten aus der oberjurassischen Potomac-Gruppe von Prince George Co., Maryland. Amer. Journ. Sc. Arts (3) Bd. 35 pag. 94.

Megalosauridae. R. Lydekker gibt Notizen über die Verwandtschaft der Wirbel von *Bothryospondylus* Ow. mit denen des amerikanischen *Creosaurus* Marsh und sucht den Nachweis zu führen, dass *Megalosaurus dunkeri* Kok. nur auf abgekaute Zähne begründet ist; nichtsdestoweniger sei diese Species wegen der feinen und bald schwindenden Zähnelung aufrecht zu erhalten. Qu. Journ. Geol. Soc. London Bd. 44 pag. 59—60.

O. C. Marsh beschreibt kurz nach Zähnen und Gliedmaassenknochen einen *Allosaurus* (*medius* n.) aus der oberjurassischen Potomac-Gruppe von Prince George Co., Maryland. Amer. Journ. Sc. Arts (3) Bd. 35 pag. 93.

Anchisauridae. R. Lydekker emendiert die Gattung *Massospondylus* Owen und gibt Notizen über den Wirbelbau von *M. carinatus* Ow. Rec. Geol. Survey India Bd. 21 pag. 146—147, Fig. 3.

Ornithopoda. O. C. Marsh beschreibt den Zahn eines herbivoren Dinosauriers aus der oberjurassischen Potomac-Gruppe von Prince George Co., Maryland, als *Priconodon crassus* n. gen. et sp. Amer. Journ. Sc. Arts (3) Bd. 35 pag. 93, Fig. 7—9. — Ueber das geologische Alter dieser Lagerstätte vergl. W. J. McGee. Ebenda pag. 126—143, Taf. 2.

L. Dollo characterisiert eingehend die Familien Camptonotidae [besser Camptosauridae; vergl. Ber. f. 1885 pag. 269] und Iguanodontidae Marsh. Compt. Rend. Acad. Sc. Paris Bd. 106 pag. 775—777. — Ref. in Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 520 und in N. Jahrb. f. Min. 1889 I pag. 145—146.

Stegosauridae. *Omosaurus* ist durch Leidy praeoccupiert; da nach R. Lydekker *Stegosaurus* wahrscheinlich mit *Omosaurus* synonym ist, wird *Stegosaurus* und Stegosauridae für die Zukunft zu setzen sein. Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 453.

Ceratopsidae. O. C. Marsh beschreibt einen gehörnten Dinosaurier als *Ceratops montanus* n. gen. n. sp. aus den obercretaceischen Laramieschichten von Montana, der mit dem jurassischen *Stegosaurus* verwandt erscheint, und gründet darauf eine neue Familie. Die paarigen Hornzapfen, die in Form und Stellung sehr denen ungulater Säugethiere ähneln, sind mit dem Hinterhauptskamm durch Knochensubstanz verschmolzen. Das 25—30' lange Thier scheint mit Hornschildern wie eine Schildkröte bedeckt gewesen zu sein. Amer. Journ. Sc. Arts (3) Bd. 36 pag. 477—478, Taf. 11. — Ref. in N. Jahrb. f. Min. 1889 II pag. 353. — E. D. Cope spricht in seinem Referat darüber die Ansicht aus, dass, die Verwandtschaft von *Ceratops* mit *Hypsirophus* (*Stegosaurus*) vorausgesetzt, die Gattung vielleicht zu *Polygonax* Cope gehören könne. Amer. Natural. Bd. 22 pag. 1108—1109.

Scelidosauridae. R. Lydekker beschreibt und bildet ab ein Ilium aus dem Wealden von Cuckfield, das zu *Hylaeosaurus* zu stellen sein dürfte, von dem ein solches noch nicht bekannt war. Qu. Journ. Geol. Soc. London Bd. 44 pag. 52—53.

Camptosauridae. L. Dollo characterisiert diese Familie jetzt in folgender

Weise: Praemaxillaren mit Zähnen. Sternum unpaarig, rhomboidisch. Hand morphologisch fünffingerig und am Cubitalrand in centripetalem Sinne reducirt. Daumen normal. Pubis im Knochenzustand die Spitze des Ischiums erreichend. Ein vierter „hangender“ Trochanter. Vier functionierende Zehen im Fusse. — Hierher die Gattungen *Camptosaurus* Mrsh. und *Hypsilophodon* Huxl. Compt. Rend. Acad. Sc. Paris Bd. 106 pag. 775—777.

Iguanodontidae. Derselbe gibt jetzt folgende Kennzeichen für diese Familie: Praemaxillaren zahnlos. Sternumknochen paarig. Hand morphologisch fünffingerig und am Radialrand in centrifugalem Sinne reducirt. Fünfter Finger normal. Pubis nur im ligamentösen Zustand das distale Ende des Ischiums erreichend. Vierter Trochanter mit Kamm. Drei functionierende Zehen im Fuss. — Hierher nur die Gattung *Iguanodon* Mant. Ebenda pag. 775—777.

Derselbe macht Mittheilungen über die verknöcherten Ligamente der Dinosaurier von Bernissart. Arch. Biol. Gand Bd. 7 pag. 240—265, 2 Taf.

Ueber die neueren Funde von *Iguanodon* bei Bernissart in Belgien machen auch L. C. Miall in Trans. Geol. Assoc. Leeds 1886/87 pag. 104—107 und J. Wohlgemuth in Bull. Soc. Sc. Nancy (2) Bd. 7 pag. 46—56, 1 Taf. Mittheilungen.

Auch R. Lydekker hält *Iguanodon seeleyi* für identisch mit *I. bernissartensis* Blgr. *Sphenospondylus* verbindet wahrscheinlich *Iguanodon* mit *Trachodon*, dürfte aber noch zu den Iguanodontiden gehören. Die typische Art nennt Verf. pag. 47 *Sph. gracilis* n.; sie stammt aus dem Wealden der Insel Wight. Sodann werden als *Iguanodon dawsoni* n. Wirbel (Fig. 1) und Becken (Fig. 2) aus dem Wadhurst Clay im Unt.-Wealden von Hastings beschrieben und diese Form in eine proiguanodonte Gruppe gestellt, während die ächten Iguanodonten Euiguanodonten genannt werden. Eine Scapula und andre einzeln gefundene Knochen mögen demselben Thier angehört haben. Qu. Journ. Geol. Soc. London Bd. 44 pag. 46—52, 2 Figg. — Ref. in Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 40—41. — Weitere Mittheilungen über *Iguanodon dawsoni* gibt derselbe in Cat. Foss. Rept. a. Amph. Brit. Mus. (N. H.) Bd. 1 pag. 196—200, Fig. 39 (Ischium).

H. G. Seeley errichtet für *Iguanodon prestwichi* Hlke. die neue Gattung *Cumnoria*. Rep. 57. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. for 1887 pag. 698. — Nach R. Lydekker ist sie von *Iguanodon* nicht zu trennen oder kann höchstens als Untergattung Geltung behalten. Qu. Journ. Geol. Soc. London Bd. 44 pag. 47 und Cat. Foss. Rept. a. Amph. Brit. Mus. (H. N.) Bd. 1 pag. 195.

Trachodontidae. G. Smets hat nach vermeintlichen Knochenfragmenten eine neue Gattung *Achenosaurus* (*multidens* n.) aus den Kreidesanden von Aix-la-Chapelle [vergl. Ber. f. 1887 pag. 213] aufgestellt. *Achenosaurus multidens*, Reptile fossile des Sables d'Aix-la-Chapelle. Hasselt 1888, 8°. 23 pag., 1 Taf. — L. Dollo erklärt diese Reste nach Autopsie für Stücke von Kieselholz. Bull. Soc. Belg. Géol. Bd. 2 pag. 300. — Ref. in N. Jahrb. f. Min. 1889 I pag. 349.

Crocodylia.

Palaeontologisches. Eingehende Mittheilungen über Diagnose der Ordnung, der Unterordnungen, Gattungen und Arten fossiler Crocodylier im British Museum macht R. Lydekker. Er gibt folgende feinere Eintheilung:

I. Unterordn. Eusuchia.

A. Procoele Gruppe.

1. Fam. Crocodilidae.
 - a. Kurzschnüzige Section mit *Alligator*, *Diplocynodon* und *Crocodilus*.
 - b. Langschnüzige Section mit *Tomistoma*, *Gavialis*, *Thoracosaurus* und *Rhamphosuchus*.
 - c. Unsichere Gattungen: *Pristichamps* und *Heterosuchus*.
- B. Amphicoele Gruppe.
 2. Fam. Goniopholididae.
 - Subfam. 1. Bernissartiinae mit *Hylaeochamps*.
 - Subfam. 2. Goniopholidinae.
 - a. Kurzschnüzige Section mit *Theriosuchus*, *Goniopholis*, *Nannosuchus* und *Oweniasuchus*.
 - b. Langschnüzige Section mit *Pholidosaurus*.
 - Subfam. 3. Pterosuchinae mit *Pterosuchus*.
 - Unsichere Gattungen: *Suchosaurus* und *Petrosuchus*.
 3. Fam. Teleosauridae.
 - Subfam. 1. Metriorhynchinae mit *Dacosaurus* und *Metriorhynchus*.
 - Unsichere Gattung: *Aeolodon*.
 - Subfam. 2. Teleosaurinae mit *Teleidosaurus*, *Machimosaurus*, *Pelagosaurus*, *Steneosaurus* und *Teleosaurus*.
- II. Unterordn. Parasuchia.
 4. Fam. Phytosauridae mit *Phytosaurus* und *Stagonolepis*.
 5. Fam. Parasuchidae mit *Parasuchus*.

Abgebildet werden Fig. 9 Schädel von *Crocodilus spenceri* Buckl., Fig. 15 von *Pelagosaurus typus* Bronn, Fig. 16 von *Steneosaurus heberti* Mor. d. Gl. und Fig. 17—18 von *Phytosaurus cylindricodon* Jäg. Für die Fam. Belodontidae wird der Name Phytosauridae pag. 123 vorgeschlagen. Cat. Foss. Rept. a. Amph. Brit Mus. (N. H.) Bd. 1 pag. 42—130.

E. Koken schlägt vor, die Parasuchia ganz von den Crocodilia zu trennen und beide als gleichwerthige Unterordnungen neben einander zu stellen: der Schädel der ersteren stehe dem der Lacertilier näher als dem der Crocodilier, namentlich sei eine mittlere eustachische Röhre überhaupt nicht vorhanden. Eine besonders grosse Aehnlichkeit der Parasuchia mit den Rhynchocephaliern existiere nicht. Verf. theilt demnach die Ordn. Crocodiloidea in die Unterordn. Parasuchia und Crocodilia und schaltet sie im System zwischen die Lacertilien und die Dinosauria ein. Schliesslich kritisiert er die neueste Lydekker'sche Einteilung der Eusuchia (s. oben). Zeitschr. D. Geol. Ges. Berlin Bd. 40 pag. 754—773.

H. E. Sauvage beschreibt mehr oder weniger ausführlich von Crocodiliern aus dem oberen Portlandien von Boulogne-sur-Mer Reste von *Machimosaurus interruptus* Svge. und von *Goniopholis unidens* Mouss. (Zahn, Halswirbel und Panzerreste Taf. 11, Fig. 7—9 und Taf. 12, Fig. 7—12). Bull. Soc. Géol. France (3) Bd. 16 pag. 628—629.

J. W. Hulke bringt Mittheilungen über den Skelettbau der Mesosuchia nach Fossilresten aus den Oxfordmergeln von Peterborough. Die Untersuchung war sehr schwierig wegen unserer geringen Kenntniss der Unterschiede am Skelett lebender Crocodile und mehr noch der fossilen, namentlich betreffs des

taxinomischen Werthes gewisser gefundener Merkmale. Die zwei Familien der Teleosauriden und der Metriorhynchiden werden sodann nach ihren Skelettverschiedenheiten beleuchtet und mit dem Skelett der Eusuchia verglichen, und die Morphologie gewisser Knochen wird schliesslich discutirt. Von *Metriorhynchus* werden Atlas, Epistropheus, Rückenwirbel, Kreuzbein und Schwanzwirbel, dann vom Schultergürtel Scapula, Coracoid und Humerus und vom Beckengürtel Ilium, Ischium und Pubis beschrieben, von *Steneosaurus* die von der ersteren Gattung wesentlich abweichenden Theile, nämlich Epistropheus, Sacrum und vom Beckengürtel Ilium und Pubis, Femur und Tibia eingehend besprochen. Ein Schlusskapitel behandelt den äusseren Panzer von *Steneosaurus*. Die Hauptunterschiede der Mesosuchia von den Eusuchia liegen nach dem Verf. in dem amphicoelen Bau aller Wirbel mit Ausnahme der beiden ersten und der beiden Sacralwirbel, in der Abwesenheit des bei den Eusuchiern so stark entwickelten Kiels der Halswirbel und in sehr wesentlichen Verschiedenheiten im Bau des Atlas und des Epistropheus. Proc. Zool. Soc. London pag. 417—442, 6 Figg., Taf. 18—19.

A. S. Woodward erwähnt Zähne und einen Schwanzwirbel aus Unterkreide-Sandstein von Bahia, Brasilien, beschreibt sie mit einigen Worten und stellt sie zu *Hyposaurus derbianus* Cope. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 133—134.

Crocodylidae. Integumentalgebilde. A. Dugès, Bolsas glandulosas de los Crocodilos. Naturaleza Mexicana (2) Bd. 1 pag. 206—207, Taf. 18.

Skelettsystem. G. Tornier behandelt in seiner Phylogenie des terminalen Segmentes der Säugethier-Hintergliedmaassen sehr eingehend auch die Gelenkverbindung zwischen Astragalus und Calcaneum bei den Crocodilen im Vergleich mit der der Säuger. Morphol. Jahrb. Bd. 14 pag. 223—328, Taf. 11—12.

Respirationsorgane. Untersuchungen über die Athmung des Caimans hat E. Couvreur angestellt. Compt. Rend. Soc. Biolog. Paris Bd. 5, Abh. pag. 51—52.

Biologisches. S. F. Clarke berichtet über den Bau zweier Nester von *Alligator lucius* Cuv., die er am 9. und 10. Juni mit 29 und 30 Eiern belegt in Florida fand. Auch Ei und Inhalt werden beschrieben; die ersten Stadien der Embryonal-Anlage konnten noch nicht studiert werden. Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 568—570 und Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 509—511. — Ref. in Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 1032—1033.

Palaeontologisches. E. Koken beschreibt den prachtvoll erhaltenen Schädel von *Thoracosaurus macrorhynchus* Blv. aus der Tuffkreide von Maestricht. Nur der Vordertheil der Schnauze und das eigentliche Schädeldach fehlen; die Choanenmündung ist beschädigt. Einerseits schliesst sich die Gattung an *Gavialis*, andererseits an *Tomistoma* an. Zeitschr. D. Geol. Ges. Berlin Bd. 40 pag. 754—773, Taf. 32.

H. Filhol errichtet für den eocänen *Crocodylus doduni* Cuv. die Gattung *Isselosaurus*. Mém. Soc. Géol. France (3) Bd. 5 pag. 174.

Bemerkungen über *Gavialis dixonii* Ow. macht G. Smets. Ann. Soc. Scientif. Bruxelles Bd. 12 pag. 191.

Systematisches. Die grosse Aehnlichkeit mit *Alligator*, die J. W. Hulke in verschiedenen Theilen des Skeletts der Mesosuchier fand, und die fast völlige Uebereinstimmung der Hautpanzerung dieser alten Crocodilier mit *Jacare* lassen den Verf. vermuthen, dass die Alligatoren keine Abkömmlinge der Gaviale oder der ächten Crocodile sind. Diese drei lebenden Gattungen

fasst er somit nicht als successive Entwicklungsphasen einer Thierform auf, sondern als die Ausläufer von drei verschiedenen Descendenzreihen, trotzdem dass das angebliche Auftreten dieser Gattungen im Laufe der geologischen Zeiten mit dieser Ansicht in gewissem Widerspruch zu stehen scheine. Proc. Zool. Soc. London pag. 440.

Goniopholididae (foss.). E. D. Cope beschreibt nach Schädel und Skelettresten eine *Goniopholis* (*lucasi*) aus dem Jura von Canyon City, Colorado, die er früher *Amphicotylus* genannt hatte. Sie stammt aus den Camarosaurus-Beds und war kleiner als *G. crassidentata*. Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 1106—1107.

Teleosauridae (foss.). R. Lydekker stellt für die Gattung *Geosaurus*, die er mit *Cricosaurus* vereinigt, die weitere Unterfam. Cricosaurinae auf, welche er im Schädelbau den Metriorhynchinae verwandt nennt, von denen sie sich aber durch den Mangel einer Bepanzerung und durch das Vorhandensein eines knöchernen Scleroticalrings unterscheidet. Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 452 und Qu. Journ. Geol. Soc. London Bd. 45 (1889) pag. 41. — Nach E. Koken war auch *Cricosaurus* bepanzert. Zeitschr. D. Geol. Ges. Berlin Bd. 40 pag. 767, Anm.

Chelonia.

Skelettsystem. G. Baur schlägt zur Bezeichnung der knöchernen Schilder der Chelonier (im Gegensatz zu den äusseren Hautschildern) folgende Termini vor: Rückenschild mit den Neuralia, Postneuralia (die hinter dem letzten Neurale und dem Pygale liegenden Elemente) und Pleuralia; Rand mit den Peripheralia (Nuchale, Pygale); Bauchschild mit Epiplastron, Endoplastron, Hypoplastron, Mesoplastron, Hypoplastron und Xiphiplastron. Zool. Anz. 11. Jahrg. pag. 418.

Derselbe bespricht eingehend die Schädelcharacteres und die verschiedenartige Entwicklung des zehnten Rückenwirbels bei den Trionychiden, das Quadratojugale von *Terrapene carolina* L. und den Mangel des Foramen carotico-temporale im Schädel seiner Staurotypiden, Cinosterniden und Dematemydiden. Ebenda pag. 736—740.

Nervensystem. In einem weiteren Beitrag zur Innervation des Herzens [vergl. Ber. f. 1885 pag. 263] beschreibt A. Kazem-Beck eingehend Lage und Verlauf des Nervus depressor cordis, sowie die Herzszweige des Vagus und des Sympathicus bei *Emys caspia* und *Testudo ibera*. Arch. f. Anat. u. Phys., Anat. Abtheil. 1888 pag. 338—345, Taf. 19, Fig. 3, 5—10 und Pam. Tow. L. Bd. 84 (russ.).

Sinnesorgane. Ueber das Verhalten der nervösen Elemente in der Retina der Schildkröten vergl. A. Dogiel. Anat. Anzeiger Bd. 3 pag. 137—138, Figg.

Ontogenie. K. Mitsukuri hat an Embryonen von *Clemmys japonica* Gray und von *Trionyx japonica* Schlgl. den ectoblastischen Ursprung des Wolffschen Ganges nachgewiesen. Zool. Anz. 11. Jahrg. pag. 111.

Mittheilung über eine junge *Chrysemys picta* mit zwei Köpfen macht E. H. Barbour. Das Thier mochte beim Fange 2—3 Tage alt gewesen sein und konnte bis zum Abdruck der Notiz — 3 Monate — lebend beobachtet werden. Die beiden Köpfe und Häuse sind vollständig normal entwickelt, auch in Bezug

auf die Sinnesorgane. Die Köpfe zeigen von einander unabhängige Functionen; jeder beherrscht die Bewegung seiner Rumpfsseite, aber der eine Kopf hat gelernt, sich dem andern anzupassen, sodass eine gemeinsame Bewegung möglich, wenn auch schwierig, ist. Die einzige Schwäche des Doppeltiers scheint zu sein, dass jede Mundöffnung von Zeit zu Zeit nach Luft schnappt, als ob es ihm daran fehle. Amer. Journ. Sc. Arts (3) Bd. 36 pag. 227—230, 1 Taf. — Ref. in Zool. Garten 30. Jahrg. pag. 61—62.

Palaeontologisches. H. E. Sauvage beschreibt von Cheloniern aus dem oberen Portlandien von Boulogne-sur-Mer Hautknochen, die er zwei Arten von *Plesiochelys* (Taf. 11, Fig. 1—4) zuteilt, und ein Panzerfragment, das er zu *Tropidemys* (Taf. 11, Fig. 5—6) stellt. Bull. Soc. Géol. France (3) Bd. 16 pag. 627—628, Taf. 11.

Ueber Lagerung und Alter der eocänen Schildkrötenschichten von Melsbroek, nordöstlich von Brüssel, macht M. Murlon Mittheilungen. Sie gehören zum Bruxellien und enthalten *Chelonia*, *Trionyx brabantica*, *Pseudotrionyx delheidi* und *Emys camperi*. Auch Fundstellen anderer Schildkröten werden kurz besprochen. Bull. Acad. Roy. Belg. (3) Bd. 17 pag. 80—101.

Systematisches. In seinem Artikel „Tortoise“ der Encyclopaedia Britannica Bd. 23 pag. 455—460, Figg. stellt A. Günther folgende Anordnung der Schildkröten auf:

Unterordn. I. Athecae.

Fam. Sphargidae.

Unterordn. II. Testudinata.

Reihe 1. *Cryptodira*.

Gruppe a. *Digitata*.

Fam. Testudinidae, Platysternidae, Baenidae, Chelydridae, Staurotypidae, Cinosternidae und Pseudotrionychidae.

Gruppe b. *Pinnata*.

Fam. Chelonidae.

Reihe 2. *Pleurodira*.

Fam. Chelydidae, Pelomedusidae, Carettochelydidae und Miolaniidae.

Unterordn. III. Trionychoidea.

Fam. Trionychidae.

G. A. Boulenger weist Baur's Widerspruch gegen einige diagnostische Merkmale zurück, die Verf. für die pleurodiren Schildkröten aufgestellt hatte. Ebenso wendet er sich entschieden gegen die Stellung, welche Baur den Sphargiden in nächster Nähe der Cheloniden anweisen will, und verbessert einige Ansichten desselben über die Classification der Pleurodiren. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 352—354.

Athecae. Palaeontologisches. Mittheilungen über die fossilen Schildkröten des belgischen mitteloligocänen Rupelthens [vergl. Ber. f. 1887 pag. 218] macht G. Smets. Ann. Soc. Scientif. Bruxelles Bd. 12. Sep.-Abdr. 24 pag., 9 Figg.

Sphargidae. Systematisches. G. Baur verfißt mit gewichtigen Gründen philologisch und historisch die Annahme des Namens *Dermochelys* Blainv. für *Sphargis* Merr. Die Sphargiden sind nach ihm nur eine specialisierte Gruppe der Chelonii Oppel. Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 44.

In einer Notiz über ungewöhnliche Hautverknöcherungen wendet sich derselbe neuerdings gegen die Ansicht, die Dermochelyden von den Cheloniden abzutrennen. Auch betrachtet Verf. die Protostegiden nicht als Athecen, d. h. als *Dermochelys*-ähnliche Formen. Science (New-York) 1888 pag. 144.

Sphargis Merr. = *Dermochelys* Blv.; Baur, Zool. Anzeiger 11. Jahrgang pag. 44.

Thecophora. Systematisches. Mittheilungen über die Unterschiede der Familien Pelomedusidae und Chelydidae macht G. A. Boulenger. Keine Trennung der typischen Chelonier (mit Ausnahme der Athecen und der Trionychidae) ist natürlicher als die Scheidung in Cryptodira und Pleurodira. Ausser den bekannten Unterschieden gibt Verf. noch folgende für die Pleurodira: Der Unterkiefer artikuliert mit dem Schädel vermittelt eines Condylus, welcher in eine Höhlung des Quadratheins einpasst; der Aussenrand der Tympanalvertiefung wird vom Quadratum vollständig umschlossen; die Flügelbeine sind in ihrer ganzen Ausdehnung ausserordentlich breit und bilden flügelähnliche seitliche Ausbreitungen; die Halswirbel haben kräftige Querfortsätze und ihre concav-convexen Gelenke sind durchweg einfach. Die lebenden Pleurodiren lassen sich in drei Familien eintheilen:

1. Pelomedusidae (= Pelomedusidae + Peltoccephalidae Gray).
2. Chelydidae (= Chelydidae + Hydraspidae Gray).
3. Carettochelydidae.

Die weitere Eintheilung der beiden erstgenannten Familien s. unten pag. 231 unter Pelomedusidae und Chelydidae. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 346–347.

G. Baur gibt folgende Eintheilung der typischen Pleurodira:

Pleurodira. Intergulare vorhanden, Plastron mehr oder weniger auf den Carapax übergreifend, Becken mit Rücken- und Bauchschild durch Suturen verbunden. Schon im Wealden in zwei Gruppen auftretend.

a. Mesoplastralia.

1. Fam. Pleurosternidae mit *Pleurosternum* Ow.
2. Fam. Sternotheridae mit *Sternotherus* Bell.
3. Fam. Pelomedusidae mit *Podocnemis* Wgl., *Peltoccephalus* D. B., *Pelomedusa* Wgl., *Taphrosphys* Cope. *Dumerilia* Grand. sei vielleicht = *Podocnemis* Wgl.

b. Amesoplastralia.

4. Fam. Plesiochelydidae mit *Plesiochelys* Rüt. und *Craspedochelys* Rüt.
5. Fam. Chelydidae mit *Chelys* Dum., *Platemys* Wgl., *Hydromedusa* Wgl., *Chelodina* Fitz., *Emydura* Bon., *Elseya* Gray und *Euchelymys* Gray.

Alle genannten Familien werden characterisirt und einige osteologische Eigenthümlichkeiten der lebenden Pleurodiren namhaft gemacht. Bei allen ist das Kreuzbein um einen bis drei Wirbel nach vorn gerückt, so dass also ein oder zwei Sacralwirbel, ja sogar der letzte Dorsalwirbel zu Schwanzwirbeln geworden sind; bei *Chelodina* und *Chelymys* kommen wie bei den Trionychiden in der fünften Zehe mehr als drei Phalangen vor. Verf. sucht im Uebrigen zu zeigen, dass — entgegen Boulenger's Anschauungen — Cryptodira und Pleurodira durch eine Menge (namentlich fossiler) Uebergangsformen zusammenhängen. Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 419–424.

Derselbe macht Mittheilungen über osteologische Eigenthümlichkeiten der lebenden Pleurodira. Beim Schädel macht er auf die Verwachsung der hinteren Elemente des Unterkiefers zu einem Stück bei älteren Thieren aufmerksam. Sodann bespricht er den Hinterhauptscondylus von *Pelomedusa*, der nur von den beiden Exoccipitalien gebildet werde. Was die systematische Stellung von *Dermatemys* Gray anlangt, so gehört diese Schildkröte nach Form der Halswirbel, Phalangenzahl und wegen der vollkommenen Reihe der Inframarginalen nicht zu den Testudiniden oder Emydiden, sondern zu einer eigenen Familie neben die Chelydriden, Staurotypiden, Cinosterniden, Cheloniiden und Dermochelydiden. Ebenda pag. 592—595.

Derselbe bringt weiter Notizen über den Schädel von *Chelymys*, *Pelomedusa* und *Chelodina*. Er fasst die Pleurodira jetzt anders (als oben) und gibt osteologische und systematische Definitionen der

Fam. Sternotheridae mit *Sternotherus* und *Pelomedusa*, und der

Fam. Podocnemidae mit *Podocnemis*, *Erymnochelys* und *Peltecephalus*. *Erymnochelys* (= *Dumerilia* Grand.) hält er entgegen Boulenger für gute Gattung neben *Podocnemis*. Sodann verbreitet sich Verf. über die Sattelgelenke der Halswirbel von *Podocnemis* und das Sattelgelenk am Bogen zwischen dem zehnten Dorsal- und ersten Sacralwirbel von *Chelydra serpentina* L. Ebenda pag. 736—740.

Chelydridae. Palaeontologisches. E. D. Cope beschreibt nach Panzerresten eine *Chelydra crassa* n. sp. aus den untereocänen Puerco-Schichten Neu-Mexicos und Colorados und vergleicht sie mit der lebenden *Ch. serpentina*. Sie ist die älteste Art der Gattung. Trans. Amer. Phil. Soc. Bd. 16 pag. 306.

Dermatemydidae. Palaeontologisches. Nach G. Baur ist die fossile *Amphimys* Cope = *Agomphus* Cope und gehört zu Cope's Fam. Adocidae. Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 595.

Systematisches. Diese Familie definiert derselbe in folgender Weise: Neun Pastralelemente; Nuchale mit seitlichen Fortsätzen; Hornschilder vorhanden. Schwanzwirbel procoel; nur ein biconvexer Halswirbel, der zweite; der achte Halswirbel procoel, hintere Halswirbel mit doppelten Gelenkflächen. Drei Phalangen im fünften Finger der Hand, Inframarginalschilder wol entwickelt. — Hierher die Gattung *Dermatemys* Gray. Ebenda pag. 595.

Chloremys Gray = *Dermatemys* Gray; Baur, l. c., pag. 595.

Dermatemys abnormis Cope und *D. berardi* = *mawi* Gray; Baur, l. c., pag. 595.

Cinosternidae. Systematisches. *Cinosternum integrum* Lec. abgeb. [als *C. pennsylvanicum*; Ref.]; Dugès, *Natureza Mexicana* (2) Bd. 1, Taf. 11, Fig. 1—4.

Testudinidae. Integumentalgebilde. In einer Notiz über ungewöhnliche Hautknochenbildungen lenkt G. Baur die Aufmerksamkeit auf die starken Tuberkelschuppen an den Vordergliedmaassen von *Testudo leithi* Gthr. Science (New York) Bd. 11 pag. 144.

Palaeontologisches. F. Foerster u. H. Becker beschreiben aus dem Unteroligocän von Rixheim und Brunnstadt im Elsass nach Panzerresten eine *Testudo laurae* n. sp. und vergleichen sie mit *T. escheri* P. H. und *T. antiqua* Bronn. Die nächsten lebenden Verwandten sind die drei circummediterranen Arten von *Testudo*, von denen sich die alte Tertiärart nur durch einige unter-

geordnete primitive Charaktere — *Emys*-Merkmale — unterscheidet. Mitth. Geol. Landesunters. Strassburg Bd. 1 pag. 215—228, Taf. 4—5.

P. Fischer bringt eine Mittheilung über Hautpanzer und Verwandtschaft der *Testudo perpinniana* aus dem Pliocæn von Perpignan. Sie nähert sich in den verknöcherten Tuberkeln der Gliedmaassen den lebenden *T. pardalis* und *sulcata*, kann also als Riesenform einer jetzt afrikanischen Gruppe betrachtet werden. Compt. Rend. Acad. Sc. Paris Bd. 107 pag. 458—460.

Faunistisches. K. Moebius hat Funde von *Emys orbicularis* L. zusammengestellt. 1888 wurde ein Stück im Herrensee bei Straussberg, 30 Kilom. östlich von Berlin, gefangen. Noch anfangs der fünfziger Jahre war sie um Berlin häufig; jetzt ist sie eine Seltenheit. Bei Schwansen zwischen der Eckernförder Bucht und der Schlei, Schleswig, wurde sie 1859 erbeutet. Fossile Stücke aus holsteinischen Mooren liegen im Kieler Museum. Sitz.-Ber. Ges. Nat. Fr. Berlin pag. 177. — Ascherson nennt sie 1855 von der Jungfernhäide, P. Magnus vom Tegelsee. Ebenda pag. 177.

H. Danneel hat sie bei Möllenbeck, Mecklenburg-Strelitz, gefangen; das Stück legte in Gefangenschaft 13 Eier. Arch. Fr. Nat. Meckl. 41. Jahrg. pag. 232.

C. Grevé fand sie bei Moskau und constatirte, dass die Art zwar sicher eingeschleppt ist, dass sie sich aber in den warmen Abwässern einer Färberei daselbst erhalten und fortgepflanzt habe. Beim Fressen von Fischen soll die Fischblase seltsamerweise stets unverletzt bleiben, nach oben treiben und so den Aufenthalt dieser Schildkröte verrathen. Zool. Garten 29. Jahrg. p. 54—57.

G. A. Boulenger nennt *Clemmys caspia* var. *riculata* Val. aus Cypem. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 505.

Systematisches. Was die systematische Stellung von *Manouria* anlangt, so ist nach G. Baur diese Gattung von den ächten Testudiniden durch die starken Rippenköpfe, die getheilten Analen, die Fontanellen zwischen Costalen und Marginalen und durch das emydidenähnliche Coracoid verschieden, im Uebrigen aber dieser Familie doch am nächsten verwandt, so dass es sich empfiehlt, sie als Unterfamilie zu betrachten. Wir hätten dann folgende feinere Eintheilung der Testudiniden:

1. Subfam. Testudinina. Rippenköpfe rudimentär werdend; Zahl der Phalangen in Hand und Fuss zwei. Hautossificationen an den Extremitäten, namentlich an den vorderen.

2. Subfam. Manouriina. Rippenköpfe wolentwickelt; Analia getheilt, sonst wie bei den vorigen. — Hierher wahrscheinlich auch *Scapia* Gray und *Hadrianus* Cope.

3. Subfam. Emydina. Rippenköpfe wolentwickelt; Zahl der Phalangen in Hand und Fuss (digit. 2—4) mehr als zwei. Pleuralia sich nicht in der Mittellinie belegend. Keine Hautossificationen an den Extremitäten.

4. Subfam. Terrapinina. Rippenköpfe wolentwickelt; Zahl der Phalangen (digit. 2—4) zwei oder mehr als zwei. Pleuralia 8, sich in der Mittellinie berührend. Neuralia und Pleuralia im Alter meist unter einander verschmelzend. Keine Hautossificationen an den Extremitäten.

Zoolog. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 595—597.

G. A. Boulenger bringt die ersten Notizen über das Thier von *Homopus signatus* Walb. aus O'Kiep, 2500', in Namaland. Obgleich sonst ein ächter *Homopus*, hat die Art fünf Nägel an der Hand und zeigt hierin wiederum

einmal, wie wenig taxonomischen Werth die Zahl der Zehen bei den Reptilien hat. Auf der Hinterseite des Oberschenkels steht ein grosser conischer Tuberkel. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 136—137. — Vergl. auch Proc. Zool. Soc. London pag. 251.

F. Lataste beschreibt *Homopus nogueyi* Lat. [vergl. Ber. f. 1886 pag. 172] nochmals. Act. Soc. Linn. Bordeaux Bd. 40, Compt. Rend. pag. 22—24.

Bemerkungen über *Testudo berlandieri* Ag. und *T. polyphemus* Daud. bringt A. Dugès. Natureza Mexicana (2) Bd. 1 pag. 144—145.

Cinixys dorri n. sp. Bakel, Ob. Senegal. pag. 164—166, Fig. 1—3 = *belliana* Gray. pag. 228; Lataste, Le Naturaliste 10. Jahrg.

Cistuda Flem. 1822 = *Terrapene* Merr. 1820; Baur, Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 597.

Cistudo (Onychotria) mexicana Gray. gute Art; Dugès, Natureza Mexicana (2) Bd. 1 pag. 107.

Homopus femoralis n. sp. Cradock, S.-Afr.; Boulenger, Proc. Zool. Soc. London pag. 251, Taf. 14.

Chelonidae. Integumentalgebilde. Korschelt hat verzweigte Zellkerne in den Hautdrüsen von *Chelone* gefunden. Sitz.-Ber. Ges. Nat. Fr. Berlin 1887 pag. 126—136.

Skelettsystem. Unter den Reptilien hat W. K. Parker nur bei *Chelone mydas* das Rudiment des Postpalatale der Caudaten gefunden. Proc. Roy. Soc. London Bd. 43 pag. 397—402.

Eingehend schildert G. Baur osteologisch die Gattung *Colpochelys* Garm.; die Untersuchung soll des Verf.'s Ansicht stützen, dass *Dermochelys* die am höchsten specialisierte Seeschildkröte sei. Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 423.

Palaeontologisches. C. Ubaghs beschreibt aus der Ob. Kreide von Maestricht und bildet ab den Schädel von *Chelone hoffmanni* Gray. Bull. Soc. Belg. Géol., Pal. et Hydr. Bruxelles Bd. 2 pag. 383—392, Figg., Taf. 10—13. — G. Baur errichtet dafür die neue Gattung *Allopleuron* [nach R. Lydekker 1889 = *Chelone*]. Science (New York) Bd. 11 pag. 144. — Ref. in Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 373.

G. Smets beschreibt die fossilen *Chelone vanbenedeni* Smets und *Ch. waterkeyni* Van Ben. Ann. Soc. Scientif. Bruxelles Bd. 12 pag. 125 und 209, Figg.

Propleuridae (foss.). Eine Mittheilung über den Humerus und über Verwandtschaft und systematische Stellung von *Eucastes* Cope (= *Lytoloma* Cope, = *Puppigerus* Cope, = *Glossochelys* Seel., = *Pachyrhynchus* Dollo, = *Erquelinnesia* Dollo) bringt L. Dollo [vergl. Ber. f. 1886 pag. 173 und 1887 pag. 218]. Verf. stellt die Gattung definitiv in die Fam. Propleuridae Cope, die er nach Bau des Schädels und der procoelen Schwanzwirbel den Cheloniden als Unterfamilie einfügen würde, wenn nicht der *Chelydra*-ähnliche Humerus derselben eine solche Eintheilung unmöglich machte. Der betreffende Humerus von *Eucastes gosseleti* Dollo aus dem Unt. Eocæn von Erquelinnes wird eingehend beschrieben, mit dem von *Chelone* und *Chelydra* verglichen und abgebildet. Die Form soll eine wesentlich litoral lebende Meeresschildkröte gewesen sein. Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 261—267, 3 Figg. und Bull. Soc. Géol. Nord Bd. 15 pag. 114—122. — R. Lydekker weist nach, dass auch der Name *Eucastes* praeoccupiert ist und schlägt dafür *Lytoloma* Cope 1870 vor. Qu. Journ. Geol. Soc. London Bd. 45 (1889) pag. 233 und Proc. Zool. Soc. London 1889 pag. 62.

Pelomedusidae. Systematisches. G. A. Boulenger charakterisiert diese Familie in folgender Weise: 11 Plastralia, Mesoplastra vorhanden. Ein knöcherner Temporalbogen; Quadrato-Jugale vorhanden; Praefrontalen in Berührung mit einander; keine Nasalen; Palatinen in Contact; Zahnbein einfach. Zweiter Halswirbel biconvex. Nacken vollkommen in den Panzer zurückziehbar. — Afrika, Madagascar, Südamerika.

a. Keine knöcherne Temporaldecke; Mesoplastra quer über das Plastron: *Sternotherus*.

b. Ebenso, aber die Mesoplastra klein und seitlich: *Pelomedusa*.

c. Eine knöcherne Temporaldecke; das Quadrato-Jugale mit dem Parietale Sultur bildend; Mesoplastra klein und seitlich: *Podocnemis* (*Dumerilia*) und *Peltecephalus*. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 346—347.

Dumerilia Grand. = *Podocnemis*; Boulenger, l. c., Bd. 2 pag. 354.

Erymnochelys n. gen. für *Dumerilia* Grand., non Boc.; Baur, Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 421 = *Podocnemis*; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 354.

Pelomedusa galeata Schöpf 1792 = *subrufa* Lacép. 1788; Baur, Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 593.

Chelydidae. Skelettsystem. Derselbe glaubt die Existenz von *Ossa transversa* am Schädel von *Hydraspis hilairei* Schw. nachgewiesen zu haben, nimmt aber diese Ansicht später wieder zurück. Die auf diese Beobachtung hin aufgestellten Schlussfolgerungen müssen infolgedessen ebenfalls fallen. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 452—453, Fig. und Bd. 2 pag. 122.

Systematisches. Derselbe diagnosticiert diese Familie so: 9 Plastralia. Kein knöcherner Temporalbogen; Quadrato-Jugale fehlend; Praefrontalen getrennt; Nasalen vorhanden, mit Ausnahme von *Chelys*; Palatinen durch den Vomer getrennt, Zahnbeine deutlich. Fünfter und achter Halswirbel biconvex. Nacken sich unter den Rand des Panzers legend, immer exponiert. — Südamerika, Australien und Papuasien.

a. Hals länger als die Rückenwirbelreihe: *Chelys*, *Hydromedusa* und *Chelodina*.

b. Hals kürzer als dieselbe: *Hydraspis*, *Platemys*, *Elseya* und *Chelymys*. Ebenda Bd. 1 pag. 346—347.

Bis jetzt waren nach demselben drei endemische Süßwasserschildkröten aus Neu Guinea in der Literatur erwähnt gewesen: *Platemys novaeguinae* A. B. Mey., *Euchelymys subglobosa* Krefft und *Carettochelys insculpta* Rams. Verf. gibt Neubeschreibungen der beiden ersteren und Diagnosen je einer neuen Art von *Emydura* und *Chelodina*. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova (2) Bd. 6 pag. 449—452.

Chelodina novaeguinae n. sp. verwandt *longicollis* und *expansa*. Südost-Neuguinea; Boulenger, l. c., pag. 450 und 452.

Chelymys Gray = *Emydura* Bp.; Boulenger, l. c., pag. 449.

Emydura albertisi n. sp. Südost-Neuguinea; Boulenger, l. c., pag. 449 und 451.

Euchelymys Gray = *Emydura* Bp.; Boulenger, l. c., pag. 449.

Platemys novaeguinae Meyr. = *Emydura*; Boulenger, l. c., pag. 450.

Miolanidae (foss.). Nachdem sich herausgestellt hat, dass die als *Megalania* und als *Miolania* beschriebenen australischen pliocänen Knochenreste nicht zu

den Eidechsen, sondern in der Hauptsache zu den pleurodiren Schildkröten gehören, und dass anfangs dazu gestellte Fussknochen zu den Beutelhieren zu stellen sind, bleibt A. S. Woodward noch übrig, einen Theil der Wirbel und Hinterhauptsfragmente systematisch festzulegen. Ob dieselben zu *Varanus* oder zu einer davon verschiedenen, aber verwandten Gattung gehören, lässt Verf. unentschieden. Der von Huxley gegebene Name *Ceratochelys sthenurus* muss demnach gegenüber *Miolania platyceps* Ow. fallen; eine zweite aus Queensland stammende, von Owen *Megalania prisca* genannte, von Huxley mit seiner *Ceratochelys sthenurus* vereinigte Art benennt Verf. *Miolania oweni* (n.). *Miolania minor* Ow. aber dürfte mit *M. platyceps* Ow. zusammenfallen. Die verwickelte Synonymie aller dieser Formen ist beigegeben. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 85—89.

Proganochelydidae (foss.). Rücken- und Bauchpanzer vollkommen verknochert, ohne Fontanellen. Plastron nur mit den Peripherialien suturös verbunden, die Pleuralia nicht berührend. Ilium suturös mit Rückenschild, Pubis mit Bauchschild in Verbindung. Zu dieser neuen Familie stellt G. Baur die neue Gattung *Proganochelys* (mit *quenstedti* n.) aus dem Ob. Keuper Württembergs. Zoolog. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 419. — Notiz über diesen Fund gibt auch Zakrzewski. Das Stück wurde im Stubensandstein des Keupers — Horizont von *Phytosaurus* und *Aëtiosaurus* — im Schonbuch bei Häfner-Neuhausen gefunden. Es ist ein Ausguss der Schale und zeigt in negativem Bilde Wirbelsäule, Schulter- und Beckengürtel. Jahresh. Ver. Vat. Nat. Württ. Jahrg. 44 pag. 38. — Ref. in Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 373.

Trionychoidea. Trionychidae. Allgemein Anatomisches. Notizen über Trionychiden und anatomische Absonderlichkeiten speciell von *Aspidonectes spinifer* Les. bringt G. A. Stockwell. Journ. Comp. Medic. a. Surg. Bd. 9 pag. 28—42.

Systematisches. In einer vorläufigen Notiz über die amerikanischen Trionychiden zählt G. Baur 6 Arten auf: *Platypeltis agassizi* n. sp., *Aspidonectes ferox* Schnld., *asper* Ag., *spinifer* Les., *emoryi* Ag. und *muticus* Les. Verf. macht auf die grossen sexuellen Unterschiede bei *A. muticus* aufmerksam; das ♀ ist ähnlich wie bei *Podocnemis expansa* doppelt so gross als das ♂. Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 1121—1122.

Aspidonectes nuchalis Ag. = *spinifer* Les.; Baur, l. c., pag. 1122.

Callinia microcephala Gray = *Amyda mutica* Les.; Baur, l. c., pag. 1121.

Platypeltis ferox Ag. = *agassizi* n. sp.; Baur, l. c., pag. 1121.

Testudo ferox Schnld. typ. = *Aspidonectes*; Baur, l. c., pag. 1121.

Trionyx peguensis Gray = *formosus* Gray; Boulenger, Ann. Mus. Civ. Genova (2) Bd. 6 pag. 594.

Sauropterygia

(nur fossil).

Plesiosauridae. Allgemein Anatomisches. W. K. Parker macht auf Aehnlichkeiten im Bau der Embryonen der Vogelgattungen *Phalacrocorax* und *Plotus* mit *Plesiosaurus* aufmerksam. Proc. Roy. Soc. London Bd. 43 pag. 397 bis 402 und 465—482.

Systematisches. R. Lydekker erwähnt aus dem Oxfordthon von Kempston Ober- und Unterkieferzähne, einen Theil des Unterkiefers, Brust- und Rückenwirbel, Brust- und Beckengürtel und Theile der Gliedmaassen eines Sauropterygiers, den er zu *Plesiosaurus philarchus* Seel. stellt. Die Art zeigt eine Mittelstellung zwischen *Plesiosaurus* und *Phiosaurus*, kann aber nicht als Vorfahre von *Phiosaurus* angesehen werden, da sich ächte *Phiosaurus*-Zähne bereits im Corallrag finden. Nichtsdestoweniger genüge der vorliegende Rest, den Beweis zu führen, dass eine selbständige Familie Pliosauridae sich nicht mehr halten lasse, und dass beide Gattungen künftig in eine und dieselbe Familie gestellt werden müssen. Qu. Journ. Geol. Soc. London Bd. 44, Proc. pag. 89—90. — Ref. in Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 119—120 und in Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 330—331.

Eingehende Mittheilungen über die Sauropterygier der englischen Oxford- und Kimeridgethone macht derselbe. *Muraenosaurus leedsi* Seel. wird mit *Plesiosaurus plicatus* Phill. vereinigt und gezeigt, dass der Bau seines Schultergürtels mit dem von *Colymbosaurus*, resp. von *Elasmosaurus* Cope übereinstimmt, den Verf. nur als Untergattung von *Plesiosaurus* gelten lässt. Eine zweite Species von *Plesiosaurus* aus dem Oxford von Weymouth soll später beschrieben werden. Die dritte Art ist *Pl. oxoniensis* Phill., von Seeley als Untergattung zu *Muraenosaurus* gestellt, und zu ihr gehört als Synonym auch *Pl. eurymerus* Phill. Weitere Notizen beziehen sich auf eine vierte Art, den (bereits oben genannten) *Pl. philarchus* Seel., der dem württembergischen *Thaumatosauros oolithicus* und dem englischen *Pl. (Rhomaleosaurus) cramptoni* nahe verwandt ist. Für diese drei Arten und *Pl. megacephalus* nimmt Verf. jetzt die Gatt. *Thaumatosauros* an; bei ihr ist ein kleines Omosternum vorhanden. Zähne von *Phiosaurus* lassen sich nicht von *Liopleurodon ferox* Svge. trennen; er nennt die Art *Pl. ferox* Svge. und vermuthet, dass auch *Pl. pachydirus* Seel. zu derselben gehört. Ausführlich wird sodann die Geschichte und Synonymie einer dem *Pl. oxoniensis* Phill. verwandten grossen Art aus dem Kimeridge von Cambridgeshire behandelt. *Pl. manseli*, *trochanterius*, *brachistospondylus*, *brachyspondylus*, *validus* und *megadirus* sind ein und dieselbe Art und müssen *Pl. trochanterius* Ow. heissen. Der Schultergürtel, auf den *Colymbosaurus* gegründet wurde, gehört sehr wahrscheinlich ebenfalls zu dieser Species. Sodann geisselt Verf. die curiose Restauration Cope's von *Elasmosaurus platyrus* (s. auch pag. 453) und trennt alle supraliassischen Plesiosaurier als Gatt. *Cimoliosaurus* Leidy ab, die einfache Costalfacetten und einen Schultergürtel ohne Omosternum besitzen und deren Coracoide durch ein mittleres Verbindungsstück mit den Praecoracoiden verbunden sind. *Elasmosaurus* Cope sei mit *Cimoliosaurus* synonym. Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 350—356, 2 Figg. — Weitere Notizen desselben lassen doch einen *Plesiosaurus eurymerus* Phill. neben *Pl. oxoniensis* Phill. als wahrscheinlicher erscheinen; für *Thaumatosauros philarchus* Seel. hält er jetzt die Aufstellung einer neuen Gattung geboten, die *Thaumatosauros* mit *Phiosaurus* verbinde. Ebenda pag. 453. — E. D. Cope referiert über diese Arbeiten und bemerkt, dass er Seeley's Eintheilung der Sauropterygier doch für besser begründet halte als die Lydekker'sche, mit Ausnahme von *Muraenosaurus*, der ein Synonym von *Colymbosaurus* sei. *Polycotylus* sei in erster Linie nach dem Flossenbau, nicht auf den Wirbelbau begründet. Verf. wendet sich sodann gegen den Angriff betreffs *Elasmosaurus* (s. oben) und führt aus, dass *Cimoliosaurus*

von ihm nie regelrecht diagnosticiert worden sei. Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 724—726.

Mansel-Pleydell diagnosticiert einen neuen *Plesiosaurus (plicatus n.)* aus jurassischem Oxfordthon von Weymouth [Name vergriffen; R. Lydekker nennt die Art 1889 *Pl. richardsoni*; Ref.]. Proc. Dorset Nat. Hist. Club Bd. 9 pag. 40, Taf.

H. E. Sauvage beschreibt aus dem Ober-Portlandien von Boulogne-sur-Mer und Buckinghamshire Wirbel von *Plesiosaurus philippii* Svge. (= *carinatus* Phillips, non Cuv.) und von *Pl. aff. ellipsospondylus* Ow. Bull. Soc. Géol. France (3) Bd. 16 pag. 630—632.

H. Conwentz nennt einen mittleren Halswirbel von *Plesiosaurus helmerseni* Kipr. (Ob. Kreide) als Geschiebefund von Scheipnitz bei Danzig. Schrift. Nat. Ges. Danzig N. F. Bd. 7 Heft 1 pag. 41.

F. W. Cragin gibt die Beschreibung einer neuen Saurpterygiengattung *Trinacromerum (bentonianum)* aus der nordamerikanischen Kreide. Amer. Geol. Bd. 2 pag. 405. — Nach R. Lydekker gehört diese Art wahrscheinlich zu *Cimoliosaurus* Leidy. Cat. Foss. Rept. a. Amph. Brit. Mus. (N. H.) Bd. 2 (1889) pag. 180 und 247.

R. Etheridge jun. beschreibt und bildet ab Reste von vier Rückenwirbeln und Rippenreste von *Plesiosaurus* aus der mesozoischen Rolling-Downs-Gruppe vom Walsh River in Nord-Queensland. Er vergleicht sie mit den aus Queensland und Neuseeland bis jetzt beschriebenen *Plesiosaurus*-Resten, ohne zu einem sicheren Resultat betreffs ihrer specifischen Selbständigkeit zu gelangen. Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2) Bd. 3 pag. 410—413, Taf. 8.

Nothosauridae. H. Kunisch beschreibt eine Saurierplatte aus dem Muschelkalk von Gogolin in Oberschlesien, welche Rückenwirbelsäule, Rippen, Bauchrippen, Theile der hinteren Extremität und Schwanzwirbelsäule eines *Nothosaurus*-artigen Reptils enthält. Die Form wird mit einiger Reserve dem *Nothosaurus venustus* Mstr. zugewiesen und abgebildet. Zeitschr. D. Geol. Ges. Berlin Bd. 40 pag. 671—693, Taf. 29—30.

G. Gürich bespricht einen Kiefer aus dem Chorzower Muschelkalk von Königshütte, Oberschlesien, der wahrscheinlich zu *Nothosaurus latifrons* Gür. gehört, und einen zweiten von Gogolin, der ebenfalls auf diese Art bezogen werden kann. 66. Jahr.-Ber. Schles. Ges. Vat. Cult. Breslau 1888 pag. 89—90.

Ichthyopterygia

(nur fossil).

Allgemeines. Mittheilungen über die Flosse von *Ichthyosaurus triscissus* und *quadrisissus* Qu. bringt E. Fraas. Die Weichtheile der Vorderflosse des letzteren legen sich auf dem Hinterrande bedeutend breiter als auf dem Vorderrande um das Knochenskelett herum, während sie nach unten in stumpfem Bogen nur 1 cm von den letzten Carpalplatten endigen. Auf der nach rückwärts gekehrten Seite, sowie auf dem erhaltenen Rumpfstück sieht man ungemein zarte Falten, welche auf eine weiche, lederartige Haut schliessen lassen. Mikroskopisch untersucht zeigte diese Haut drei Schichten, eine farblose innere Fleischmasse, eine stark gefärbte Cutis und eine schmale farblose Epidermis. Die

Pigmentzellen der Cutis sind rundliche Körper, die in der Rumpfhaut regellos zerstreut, in der Flosse selbst aber in Längsreihen angeordnet liegen. Der Vorderrand der Flosse wird durch eine Lage starker Schuppen gebildet, die einen den Hornschuppen der Epidermis vollständig analogen Bau zeigen. Nach dem Bau dieser plumpen Flosse war also eine Bewegung auf dem Lande ganz ausgeschlossen, und die Thiere waren sicher vivipar. Württ. Jahresh. Bd. 44 pag. 280—303, Taf. 7. — Ref. in Ber. 21. Vers. Oberrhein. Geol. Ver. pag. 31—32. — Eine Bemerkung dazu von R. Lydekker s. in Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 314.

Systematisches. Eingehende Mittheilungen über die Classification der Ichthyopterygiern bringt R. Lydekker. Abgesehen von *Cetarthrosaurus*, der von Hulke zu den Mosasauriden gestellt worden ist, wird die Ordnung von vier Gattungen gebildet, *Ophthalmosaurus* Seel., *Baptanodon* Marsh, *Ichthyosaurus* Koen. und *Miosaurus* Baur. *Baptanodon* erklärt Verf. für identisch mit *Ophthalmosaurus*; in der Gattung *Ichthyosaurus* kann er sich nicht entschliessen Untergattungen anzuerkennen, und alle drei genannten fossilen Genera stellt er entgegen Baur's Ansicht [vergl. Ber. f. 1887 pag. 223] zu einer einzigen Fam. Ichthyosauridae. Nach dem Verf. ist der älteste Typus von *Ichthyosaurus* vierfingerig; er theilt die Gattung daher in primärer Weise nach dem einfacheren oder mehr complicierten Bau der Vorderextremität ein. Eine systematische Aufzählung aller von ihm gutgeheissenen Arten bringt 4 Species *Ophthalmosaurus*, 22 *Ichthyosaurus* und einen *Miosaurus*; von 19 weiteren, ebenfalls verzeichneten Formen ist die Stellung unsicher. Weiter folgen synonymische Bemerkungen. Als neu werden beschrieben und kurz charakterisiert *Ophthalmosaurus cantabrigiensis* n. nach einem Humerus aus dem Grünsand von Cambridge und *Ichthyosaurus conybeari* n. nach dem unvollständigen Skelett aus dem Unt. Lias von Lyme-Regis. Interessant ist die Mittheilung, dass *I. acutirostris* Ow. (= *microdon* Wagn., = *quadricissus* Qu.) die häufigste Form bei Banz und überhaupt aus dem bayrischen und württembergischen Ob. Lias ist. Ebenda pag. 309—314. — In einer weiteren Notiz nimmt derselbe zurück, dass *Baptanodon* mit *Ophthalmosaurus* identisch sei. Ebenda pag. 453. — Ref. in Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 724—725 und 730—731.

Von Ichthyopterygiern nennt S. E. Sauvage aus dem oberen Portlandien von Boulogne-sur-Mer nur Reste von *Ichthyosaurus* aff. *thyreospondylus* Ow. Bull. Soc. Géol. France (3) Bd. 16 pag. 629—630.

K. Martin beschreibt das Schnauzenfragment eines *Ichthyosaurus ceramensis* (n.) von gewaltiger Grösse aus fraglichen Kreideschichten von der Insel Ceram. Samml. Geol. Reichsmus. Leiden (1) Bd. 4 pag. 69—80, Taf. 10; auch unter d. Titel: Beitr. z. Geol. O.-Asiens No. 16. I.

R. Etheridge jun. gibt Abbildung und Beschreibung von Schnauzenende und Zahn eines vielleicht zweiten australischen *Ichthyosaurus* aus der mesozoischen Rolling-Downs-Gruppe von Marathon Station in Nord-Queensland. Die Art wird *I. marathonsensis* (n.) genannt und mit *I. australis* McCoy und *I. campylodon* Cart. verglichen. Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2) Bd. 3 pag. 405 bis 409, Taf. 7. — Vergl. auch Journ. a. Proc. Roy. Soc. N.-S.-Wales Bd. 21 pag. 57.

Rhynchocephalia.

Palaeontologisches. Ueber die fossilen Reste von Rhynchocephaliern im British Museum macht R. Lydekker eingehende Mittheilungen. Er theilt die Arten des Londoner Museums ein in:

I. Unterordn. Homoeosauria.

1. Fam. Homoeosauridae mit *Homoeosaurus*, *Ardeosaurus*, *Sapheosaurus* und *Aphelosaurus*.
2. Fam. Pleurosauridae mit *Pleurosaurus*.
3. Fam. Telerpetidae mit *Telerpeton* und *Saurosternum*.

II. Unterordn. Sphenodontia.

4. Fam. Rhynchosauridae mit *Rhynchosaurus* und *Hyperodapedon*.

Abgebildet wird Fig. 69 die rechte Palato-Maxilla von *Hyperodapedon huxleyi* Lyd. aus den Maleri-Schichten Centralindiens. Cat. Foss. Rept. a. Amph. Brit. Mus. (N. H.) Bd. 1 pag. 290–301.

Hatteridae. Allgemein Anatomisches. Die Arbeit J. F. van Bemmelens über die anatomischen Verhältnisse des Halstheiles von *Sphenodon* [vergl. Ber. f. 1887 pag. 159] findet sich in Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (2) Bd. 1, Versl. pag. 148–151.

Skelettsystem. J. Cornet, wie früher G. Smets [vergl. Ber. f. 1887 pag. 225] behauptet, bei *Sphenodon punctatus* keinen ProAtlas gefunden zu haben. Bull. Acad. Roy. Belg. (3) Bd. 15 pag. 406–420, 1 Taf. — Ref. ebenda pag. 260. — L. Dollo gibt eine Kritik dieser Arbeit und behauptet, dass der ProAtlas bei *Sphenodon* immer vorhanden sei, auch bei *Champsosaurus* und *Rhynchosaurus* nicht fehle und überhaupt bei allen Rhynchocephaliern wie bei allen Crocodiliern constant aufzutreten scheine. Zool. Jahrb., Abth. f. Anat. Bd. 3 pag. 433 bis 446.

Bei Gelegenheit seiner Untersuchungen über *Palaeohatteria* gibt H. Credner Fig. 4 auch Abbildungen der Intercentra und der unteren Bögen von 6 Schwanzwirbeln, Fig. 6 der Anheftung der Rumpfrippen, Fig. 10 des Schädelumrisses, Fig. 14 des Basisphenoids und Fig. 16 des Episternums und der Claviculae von *Sphenodon punctatus* Gray. Zeitschr. D. Geol. Ges. Berlin Bd. 40 pag. 490 ff.

Palaeohatteridae (foss.). H. Credner gibt in einem VII. Theil [vergl. Ber. f. 1886 pag. 235] seiner Stegocephalen und Saurier aus dem Rothliegenden des Plauen'schen Grundes bei Dresden ausführliche Beschreibung und Abbildung der neuen, überaus merkwürdigen und in fast allen Skeletttheilen vortrefflich erhaltenen Gattung *Palaeohatteria* (*longicaudata* n.) von Niederhässlich. Abweichend von *Sphenodon* ist die Gestalt des Beckens und namentlich des Ileums. Die kammartige, z. Th. auch nach vorn gerichtete Ausbreitung seines costalen Randes, sowie die Gabelung seines acetabularen Endes sind Merkmale, welche nicht den Sauriern, sondern den Crocodiliern und in noch höherem Maasse den Dinosauriern eigenthümlich sind. An letztere erinnert auch die plattenförmige Ausbreitung der Pubica, sowie die starke Verlängerung der Ischia nach rückwärts. Auf der anderen Seite ist das Auftreten von 5 Tarsalien der zweiten Reihe und eines getrennten Tibiales und Fibulares im Tarsus ein Verhältniss, das sich bei lebenden Reptilien nur im Embryonalzustand der Lacertilier wieder-

findet, aber mit *Palaeohatteria* auch dem palaeozoischen *Stereosternum* Cope [vergl. Ber. f. 1885 pag. 279] gemeinsam ist. *Palaeohatteria* repraesentiert bei naher Verwandtschaft mit *Sphenodon* einen noch mehr verallgemeinerten Typus als dieser und beweist uns, dass schon in palaeozoischer Zeit der Typus der Reptilien fix und fertig neben dem der Batrachier (Stegocephalen) bestanden hat. Eingehend wird sodann die Organisation mit der von *Dendroperpeton* Ow., *Haptodus* und *Stereorhachis* Gaudry und mit *Proterosaurus speneri* v. Meyr. verglichen; namentlich auch in Bezug auf Episternum, Clavicula und Abdominalrippen. Zeitschr. D. Geol. Ges. Berlin Bd. 40 pag. 490—558, 24 Figg., Taf. 24 bis 26. — Ref. in Nature Bd. 39 (1890) pag. 562—564.

Rhynchosauridae. Eine literarische Notiz über den Theilrest einer Praemaxilla von *Hyperodapedon* aus englischer Trias bringt A. S. Woodward. Qu. Journ. Geol. Soc. London Bd. 44 pag. 163.

Proterosauria

(nur fossil).

Systematisches. Notizen über die Proterosaurierreste des British Museums bringt R. Lydekker. Cat. Foss. Rept. a. Amph. Brit. Mus. (N. H.) Bd. 1 pag. 301—303.

Bei Gelegenheit seiner Untersuchungen über *Palaeohatteria* hat H. Credner auch *Proterosaurus speneri* v. Meyr. einer eingehenden Prüfung unterzogen. Er fand pag. 519 ein hammerförmiges Episternum und die Clavicula, die Fig. 19 gezeichnet werden, sowie pag. 528, Fig. 21 neun Carpalelemente. Auch der Tarsus wird pag. 534, die Bauchrippen pag. 538, Fig. 24 nach Autopsie beschrieben. Ein Theil der von H. v. Meyer als Abdominalrippen gedeuteten Hartgebilde wird wol als Schuppen des Bauchpanzers anzusprechen sein. Weitere Notizen pag. 553—555 suchen zu beweisen, dass ein innigeres Verwandtschaftsverhältniss von *Proterosaurus* mit den Rhynchocephaliern nicht bestand. Zeitschr. D. Geol. Ges. Berlin Bd. 40. — In einem Referat darüber spricht sich G. A. Boulenger dahin aus, dass ihm die Stellung der Proterosaurier innerhalb der Rhynchocephalier kaum mehr zweifelhaft erscheine. Nature Bd. 39 (1890) pag. 564.

Proganosauria

(nur fossil).

Systematisches. Ueberraschend gross ist nach H. Credner die Uebereinstimmung des Tarsus von *Stereosternum tumidum* Cope [vergl. Ber. f. 1885 pag. 249] mit dem von *Palaeohatteria*. Beide zeigen 7 Tarsalelemente. [Wir dürfen nach diesem Nachweise wohl Baur's Proganosauria beanstanden und *Stereosternum* provisorisch unter die Rhynchocephalier stellen. Ref.] Zeitschr. D. Geol. Ges. Berlin Bd. 40 pag. 525.

J. W. Matthews bildet den Hinterfuss und einen Theil des Schwanzes eines Mesosauriers aus den Schieferen der Diamantminen von Kimberley, Südafrika, ab. Incwadi Yami or Twenty years personal Experience in South Africa, New York 1887, Taf. 2.

Theromora

(nur fossil).

Systematisches. H. G. Seeley theilt die Ordnung in 3 Gruppen: *Pariasauria* und *Procolophonia*; *Dicynodontia*, *Gennetotheria* und *Pelecysauria*; *Theriodontia*, *Cotylosauria* und *Placodontia*. Das eine Ende der Reihe verbinde die Reptilien mit den Batrachiern, das andre mit den Säugethieren. *Proc. Roy. Soc. London* Bd. 44 pag. 383.

Derselbe macht weitere vorläufige Mittheilungen über den Schädel von *Galesaurus* und über Schädel, Gaumen und Schultergürtel von *Procolophon*. Letztere Gattung hatte Zähne am Vomer und an den Flügelbeinen. Nach allen Anzeichen gehören demnach die *Procolophonia* nicht zu den *Rhynchocephaliern*, wohin sie früher gestellt worden waren, sondern zu den anomodonten *Theromoren*. Ebenda pag. 382—383.

Anomodontia. Vorläufige Mittheilungen über diese Unterordnung und die hierhergehörigen Gattungen und Familien bringt derselbe. Er bespricht die Schädelorganisation und den Gehirnausguss der *Dicynodontiden* und beschreibt einen neuen Typus des Quadratus von einem Anomodonten. Weitere Notizen beziehen sich auf den Wirbelbau der *Dicynodontiden* und den Schwanzwirbelbau von *Platypodosaurus* im Specillen, und auf Pubis und Gliedmaassenknochen von *Titanosuchus ferox* Ow. Ebenda pag. 381—382.

Procolophonidae. H. G. Seeley stellt die *Procolophonia*, die früher bei den *Rhynchocephaliern* gestanden hatten, zu den Anomodontiern. Ebenda pag. 383.

Dicynodontidae. Der [Ber. f. 1887 pag. 226] bereits erwähnte *Theromora* aus der Karrooformation Südafrikas wird von A. Weithofer als *Dicynodon simocephalus* n. ausführlich beschrieben und abgebildet. Erhalten ist nur die rechte Schädelhälfte ohne die Knochen der Unterseite und ohne den Unterkiefer. Der Schädel zeichnet sich besonders aus durch das ausserordentlich hohe Parietale, die eingesenkte Stirn und die tiefliegenden Orbitae, die weit nach vorn verlegten Nasenöffnungen, den Kamm auf den Nasalen und dem Praemaxillare, sowie durch die eigenthümlich gestalteten Maxillaren. *Ann. Nat. Hofmus. Wien* Bd. 3 pag. 1—5, Taf. 1. — Ref. in *Amer. Naturalist* Bd. 22 pag. 638—639.

H. G. Seeley beschreibt pag. 487—501, Taf. 75—76 als *Cirognathus cordylus* n. gen. n. sp. Reste des Schädels und der Halswirbelsäule, Scapula und Vordergliedmaassen eines Anomodontiers aus dem Karroosystem von Klipfontein, Capland, und pag. 500 als *Eurycarpus oweni* n. gen. n. sp. Reste der Wirbelsäule und der Gliedmaassen einer zweiten Anomodontierform aus analogen Schichten der Sneewberg-Kette. *Phil. Trans. Roy. Soc. London* Bd. 179 B. — Ref. in *Proc. Roy. Soc. London* Bd. 44 pag. 142—143.

Theriodontia. Tapinocephalidae. H. G. Seeley stellt eine Gattung *Phocosaurus megischon* n. gen. n. sp. aus dem südafrikanischen Karroosystem auf [die nach Lydekker, *Cat. Foss. Rept. Brit. Mus.* Bd. 4 pag. 83 mit *Tapinocephalus atherstonei* Ow. zusammenfällt]. *Phil. Trans. Roy. Soc. London* for 1888 pag. 91.

Derselbe begründet die neue Gattung *Glaridodon*, verwandt *Titanosuchus* Ow., auf einen Schneidezahn aus dem Karroosystem von Beaufort West, Südafrika. *Proc. Roy. Soc. London* Bd. 44 pag. 135—136, Fig. 2.

Diadectidae. Weitere Mittheilungen über Parietalforamen, Pinealauge und Gehirn von *Diadectes* [vergl. Ber. f. 1887 pag. 215] bringt E. D. Cope Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 916, Taf. 16.

H. G. Seeley bildet den Backenzahn von *Empedias molaris* Cope aus dem Perm von Texas ab. Proc. Roy. Soc. London Bd. 44 pag. 137, Fig. 4.

Glosydropidae. In diese Familie gehört nach E. D. Cope die Gattung *Stereorhachis* Gaudry aus dem Perm von Autun. Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 1019.

Pariosauria. Pariosauridae. H. G. Seeley begründet auf einen Humerus die neue Gattung *Propappus* (*omocratus* n.) aus dem Karroosystem von Beaufort West, Südafrika. Verf. findet Aehnlichkeiten im Bau einerseits mit Saurischiern, Ornithosauriern und Anomodontiern, andererseits mit den Monotremen und schlägt vor, die Gattung mit *Stereorhachis* (s. oben) in eine Ordnung Gennetotheria zu stellen. Bei *Stereorhachis* sei der Humerus ganz monotremenartig, aber der Schultergürtel mit *Echidna* und *Cirognathus* verwandt und das Gehirn das von *Lycosaurus*. Proc. Roy. Soc. London Bd. 44 pag. 142. — Vergl. auch R. Lydekker in Proc. Zool. Soc. London 1889 pag. 573, Anm.

Batrachia.

Geschichte, Sage. Ueber einen Frosch, der angeblich vier Jahre in einem Menschen gelebt hat, berichtet Genseric. Rev. Med. - Nat. Sect. Siebenbürg. Mus. - Ver. Klausenburg Bd. 10 pag. 203—204.

Museen. E. Thurston gibt in seinem „Catalogue of the Batr. Salientia and Apoda of Southern India. Madras 1888, 8^o. 54 pag., 13 Taf.“ Beschreibung und Abbildung aller 58 Batrachier Südindiens, im Westlichen nach den British Museums-Catalogen. Ueber Färbung der Thiere im Leben, Lebensweise u. s. w. werden nach allen, bei uns z. Th. schwierig aufzutreibenden Quellenarbeiten von Jerdon, Beddome u. a. eingehende Mittheilungen bei den einzelnen Arten gemacht. Das faunistisch für uns Wichtigste ist unten pag. 248 unter „Indische Region“ verzeichnet.

M. A. Kulagin bringt Beschreibung und Liste der Batrachiersammlung des Museums d. Ksl. Moskauer Universität. Nachr. Ksl. Ges. Fr. Natw., Anthr. u. Ethn. Moskau Bd. 56, Lief. 2. 39 pag. (russ.).

Technische Hilfsmittel, Methoden. Ueber Herstellung guter Knorpelskelette ganzer Batrachierlarven mit Hilfe der Freesthätigkeit lebender Batrachierlarven macht Fr. E. Schulze eine kurze Mittheilung. Sitz.-Ber. Ges. Fr. Nat. Berlin pag. 122.

C. O. Whitman empfiehlt Natriumhypochlorid als ausgezeichnetes Lösungsmittel für die gelatinöse Hülle des Batrachiereies. Erprobt wurde das Mittel bei *Necturus* und *Rana*. Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 857. — Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. 1889 pag. 138.

Ueber Fixierung des Blutes von Fröschen und Molchen und über die Herstellung von Blutpräparaten macht G. Boccardi Mittheilungen. Estr. Rendic. R. Accad. Sc. Fis. e Mat. Napoli Heft 4/5.

Ueber Färbung von Zellen und Geweben mit Methylenblau im lebenden Thier vergl. O. Schultze in Anat. Anzeiger Bd. 2 (1887) pag. 684—688 und über zweifarbige Tingierung mit demselben Mittel A. Pilliet in St. Louis Med. a. Surg. Journ. Bd. 55 pag. 28—29 und Journ. de Microgr. Bd. 12 pag. 285—290.

Aehnliche Versuche über Absorption von Anilinpigmenten — namentlich von Bismarckbraun und Methylenblau — durch lebende Zellen von Froschlärven hat G. Martinotti angestellt. Zeitschr. Wiss. Mikrosk. Bd. 5 pag. 505—513 und Giorn. R. Accad. Med. 1888 No. 6/7.

Nach H. Griesbach erleidet bei der Tinction intra vitam und am todtten Gewebe das Metanilgelb, in den Lymphsack von Fröschen eingespritzt, bestimmte Veränderungen. Zeitschr. Wiss. Mikrosk. Bd. 4 pag. 439—463.

Ueber Färbung mikroskopischer Objecte durch Osmiumsäure in Verbindung mit Uransalzen vergl. A. Kolossow. Ebenda Bd. 5 pag. 50—53.

Nachträglich sei auch noch auf die verschiedenen Methoden aufmerksam gemacht, mittelst deren A. Kotlarewsky [vergl. Ber. f. 1887 pag. 238] Nervenzellen und periphere Ganglien präparierte. Mitth. Nat. Ges. Bern (1887) pag. 3—23.

Integumentalgebilde. Ueber Pigmente der Hautdecke vergl. oben Fr. Leydig pag. 167.

Skelettsystem. In seiner Arbeit über die Gehörknochen und die Beziehungen der hyoiden zu den otischen Elementen im Schädel der Batrachier beschreibt E. D. Cope und bildet ab Quadratum, Stapedial- und Hyoid-Apparat der Ganocephalen, Rhachitomen, Proteiden und besonders eingehend der Urodelen (Trematodera, Amphiumoidea, Apoda und Pseudosauria), dann der Trachystomata und der Anuren. Die Resultate der Untersuchung sind, dass die Beziehungen von Stapes zu Quadratum bei den Urodelen sich nach zwei Typen gebildet zeigen, einem niederen, der den Pseudosauriern und Trachystomaten zukommt, und einem höheren Typus, der den übrigen Gruppen eigen ist. Zwischen Ceratohyalbogen und Schädel lassen sich bei den verschiedenen Ordnungen dreierlei Arten von Beziehungen erkennen. Für die weiteren ausgedehnten Schlussfolgerungen, die sich in Kürze nicht wiedergeben lassen, muss auf die wichtige Arbeit selbst verwiesen werden. Journ. of Morph. Bd. 2 pag. 297—310, Taf. 22—24. — Ref. in Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 464—467, Taf. 6.

R. Wiedersheim bespricht in seiner Notiz zur Urgeschichte des Beckens auch die Bauchrippen der Stegocephalen und das sogen. Sternum der Batrachier. Ber. Nat. Ges. Freiburg i. Br. Bd. 4 Heft 3. 4 pag.

G. Baur behandelt eingehend die Elemente des Carpus und Tarsus der lebenden und der fossilen Batrachier mit Ausschluss der

Anuren in anatomischer, embryologischer und palaeontologischer Richtung. Neue Mittheilungen enthalten die Kapitel über den Carpus und Tarsus des Ganocephalen *Archegosaurus* pag. 6 und 81, des Rhachitomen *Eryops*, der Embolomeren und Stegocephalen, des Proteiden *Necturus* und der Urodelen. Von letzteren werden eingehend abgehandelt die Cryptobranchiden *Cryptobranchus maximus* pag. 22 und 81 und *alleganiensis*, die Sireniden *Siren lacertina* und *Pseudobranchius striatus*, die Amphiumide *Amphiuma tridactyla*, die Caeciliide *Hypogeophis rostratus*, die Amblystomiden *Onychodactylus*, *Amblystoma jeffersonianum*, *opacum*, *punctatum* und *tigrinum*, *Hynobius* und *Salamandrella* pag. 41 und 82 und *Batrachyperus*, die Plethodontiden *Plethodon glutinosus*, *Batrachoseps scutatus*, *Spelerpes bilineatus*, *fuscus* und *uniformis*, die Desmognathide *Desmognathus fuscus* und die Salamandriden *Salamandra* und *Diemyctylus*. Auf pag. 53—57 werden die gewonnenen Resultate zusammengefasst und pag. 58—62 eine Tabelle der Carpal- und Tarsalelemente der lebenden geschwänzten Batrachier gegeben. Ein weiteres Kapitel pag. 63—65 behandelt die Anzahl der Phalangen in Hand und Fuss der Batrachier. Interessant ist, dass bei keinem lebenden Batrachier bis jetzt mehr als 4 Phalangen an einer Zehe (in der vierten Zehe der Amblystomatiden), bei keinem mehr als 3 Phalangen an einem Finger gefunden worden sind; ein Theil der Salamandriden, die Pleurodeliden, Plethodontiden und Desmognathiden (ob alle?) besitzen nur eine Phalange im ersten Finger der Hand. Ueber die Anzahl der Finger in Hand und Fuss handeln sodann pag. 65—66, über die Entstehung des Chiropterygiums pag. 60—80. Nach dem Verf. spricht das konstante Vorkommen von einem Strahl (Humerus, Femur) in der ersten Serie, von zwei Strahlen (Radius und Ulna, Tibia und Fibula) in der zweiten Serie, sowie von „ursprünglich“ nur 2 Phalangen im ersten Finger oder in der ersten Zehe bei allen über den Fischen stehenden Wirbelthieren, wenn ihre Gliedmaassen nicht stark modifiziert sind, dafür, dass ihre Ahnen bereits einerseits Humerus und Femur, andererseits Radius und Ulna, Tibia und Fibula gehabt haben und erkennen lassen müssen. Endigten aber die beiden Strahlen der zweiten Serie in nur 2 Strahlen, wofür manches spricht, so sind der dritte, vierte, fünfte u. s. w. Strahl der Urodelen als durch Neubildung entstanden aufzufassen. Von den 49 beigegebenen Abbildungen sind alle bis auf zwei Originalzeichnungen. Beiträge zur Morphogenie des Carpus und Tarsus der Vertebraten. I. Theil: Batrachia. Jena, G. Fischer, 8°. 88 pag., 1 Fig., 3 Taf. — Ref. in Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 435—437.

Beobachtungen über die Morphologie und Genese der überzähligen Phalangen, mit besonderer Berücksichtigung der Batrachier, haben G. B. Howes und A. M. Davies angestellt. Sie zeigen, dass das Vorkommen einer überzähligen Phalanx zwischen dem letzten und vorletzten Zehenglied bei gewissen Anuren identisch ist mit dem Auftreten von interphalangealen Syndesmosen, und dass dieselben den Zweck haben, den fallenden Körper beim Sprunge aufzuhalten

und so die Fallwirkung abzuschwächen. Nur die Discoglossiden hätten nicht differenzierte Syndesmosen auf Lebenszeit behalten, ein Charakter, der einen weiteren Beweis liefere für den alterthümlichen Typus dieser Familie. Auch die Verwandtschaft des Baues solcher modifizierter Syndesmosen gewisser Anuren mit dem Kniegelenk der Säugethiere wird betont. Proc. Zool. Soc. London pag. 495—511, Taf. 24—25.

Nervensystem. Einen sehr eingehenden descriptiven Beitrag zum feineren Bau des Batrachiergehirns gibt H. F. Osborn. Seine Untersuchungen beziehen sich in erster Linie auf *Cryptobranchus*, aber auch auf *Amphiuma*, *Necturus*, *Siredon*, *Proteus*, *Siren* und *Rana*. Nach dem Verf. ist das kleine Gehirn nicht den übrigen Hirnbläschen gleichwerthig, sondern intersegmental angelegt und in seiner primitiven Gestalt eine Querbrücke sich kreuzender Commissurenfasern. In Betreff der Faserung der Hirncommissuren nimmt er jetzt allgemein an, dass dieselben sowohl Kreuzungsfasern als reine Commissurenfasern enthalten. Nach ihrem Ursprung theilt er die Cranialnerven in drei grosse Gruppen, in deren feinere Einteilung hier nicht näher eingegangen werden kann. Journ. of Morphol. Bd. 2 pag. 51—96, Taf. 4—6.

Bei vergleichender Untersuchung der sensiblen Endorgane bemerkt L. Kerschner, dass er an den Sehnen von Frosch und Salamander keine Kolbenkörperchen, sondern nur die Rollett'schen Endschollen habe finden können, in der Ausbildung, wie sie Gempt beschrieben habe. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 291—292.

P. Mitrophanow untersuchte die Entwicklung der motorischen Nervenenden an dem Musculus submaxillaris der Larven von *Molge* und *Amblystoma*. Er findet, dass die ursprüngliche Verbindung des Nerven mit einer Muskelfaser ein einfacher Contact des verbreiterten Nervenendes ist, welches sich mittelst einer feinkörnigen Substanz an der Muskelsubstanz festheftet. Anlagerung und Befestigung des über mehrere Muskelfasern hinziehenden Nervenfadens sind weitere Wachstumserscheinungen; die Bildung der Endplatten ist ein Product späterer Differenzierung. Sodann spricht Verf. über die einfachere Nervenendigung bei jungen, die complicirtere bei alten Fröschen. Von aus der Muskelsubstanz hervorragenden Neurococcen ist nichts wahrzunehmen; die Nervenenden gehen aus der Nervenfaser selbst hervor, und die körnige Substanz des Muskels betheiligt sich höchstens an der Bildung der Kernplatte. Bull. Acad. Sc. St.-Petersbourg Bd. 59, Beil. No. 7. St. Petersburg 1888. 34 pag., 1 Taf.

Eigene Untersuchungen auch an Batrachiern führten M. Fürbringer zu der Annahme, dass die Achsencylinder aus dem Ectoderm entstehen und zwar als Ausläufer der Ganglienzellen des Rückenmarks. Wahrscheinlich sei, dass Muskel und Nerv ursprünglich aus einer einzigen Zelle hervorgingen. Bijdr. Dierk. Amsterdam Bd. 15. 49, 1751 pag., 30 Taf.

Sinnesorgane. Ueber Pigmente der Iris vergl. oben Fr. Leydig pag. 167.

Verdauungsorgane. M. Holl macht Zusätze zu seinen Angaben über das Epithel an der oberen Fläche der Zunge bei *Salamandra maculosa* [vergl. Ber. f. 1885 pag. 321] und bei *Rana temporaria* [vergl. Ber. f. 1887 pag. 239]. Die Leydig'sche Angabe bezüglich des Vorkommens der Flimmerzellen bei *Rana* ist die richtige; bei *Salamandra* konnte sich Verf. von der Existenz der Flimmerzellen an den Papillen nicht überzeugen. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, Math.-nat. Cl. Bd. 96 pag. 168—169.

In seinen Beiträgen zur Histologie und Physiologie der Dünndarmschleimhaut berücksichtigt R. Heidenhain auch die einschlagenden Verhältnisse bei *Rana*, *Salamandra*, *Molge*, *Spelerpes* und *Siredon*. Pflüger's Arch. Phys. Bd. 43, Suppl. 103 pag., 4 Taf.

Héron-Royer hat bei allen europäischen Batrachiern eine sackartige Umhüllung der Excremente beobachtet, die eine spirale Drehung erkennen lässt. Genauere Untersuchung des Rectums hat ergeben, dass diese Faecalhülle sich ununterbrochen erzeugt, jederzeit den Sphincter des Dickdarms abschliesst und so verhindert, dass die Excremente den Fortpflanzungsorganen und ihren Producten schädlich werden können. Bull. Soc. Zool. France pag. 55—57, Fig.

Respirationsorgane. F. Maurer ergänzt in seiner Abhandlung über die Kiemen und ihre Gefässe bei den anuren und caudaten Batrachiern die Arbeiten von Boas [vergl. Ber. f. 1882 pag. 535] in Bezug auf die erste Entwicklung der Kiemengefässe bei den Batrachiern überhaupt und speciell bei den Anurenlarven. Die Anuren besitzen in früher Larvenperiode einen Kiemenapparat, der dem bis zur Metamorphose bestehenden bleibenden der Caudaten homolog ist. Da aus diesem Apparat sich bei den Anuren ein anderer secundärer entwickelt, so stellen die Caudatenkiemen im Vergleich mit den inneren Anurenkiemen einen primitiven Zustand dar. Der ganze Apparat der inneren Kiemen der Anuren kommt an einer intermediären Zone der Caudatenkieme zur Entwicklung, d. h. zwischen äusserer Kieme und Kiemenplatte. Auch für den vierten Kiemenbogen werden die Homologieen zwischen Anuren und Caudaten erörtert, und schliesslich das Kiemensystem der ersteren mit dem der Fische verglichen; jenes ist ectodermaler, letzteres entodermaler Natur. Die Athmung der Batrachier ist somit als eine localisierte Hautathmung aufzufassen, und auch die inneren Kiemen der Anurenlarven sind als Hautkiemen zu betrachten. Aber diese inneren Kiemen stellen einen höheren Zustand dar als die ersten äusseren Kiemen und als die äusseren Kiemen der Caudatenlarven, weil sie durch die Ausbildung eines Kiemensackes secundär mit dem Vorderdarm in Beziehung getreten sind. Morph. Jahrb. Bd. 14 pag. 175 bis 208, 4 Figg., Taf. 9 und 10, Fig. 1—19.

Von Fr. E. Schulze's Arbeit über die inneren Kiemen und ihre Gefässe bei den Batrachiern in Abh. Preuss. Akad. Wiss. ist bis jetzt nur der erste Theil erschienen, der das Epithel der Lippen und

der Mund-, Rachen- und Kiemenhöhle der Larve von *Pelobates fuscus* behandelt. Vergl. unten unter Ecaudata pag. 255.

S. Mayer stimmt in Bezug auf die Lehre von der Schilddrüse und Thymus der Batrachier vielfach mit Maurer [vergl. Ber. f. 1887 pag. 228] überein, macht aber nach der histologischen und physiologischen Seite einige Zusätze. Eine Schilddrüse ist vorhanden. In der Pseudothyreoidea hat Verf. mitotische Vorgänge beobachtet. Die grossen Zellen der Thymus hat er als Sarcolyten erkannt, myogene Körper, die nur secundär in das Organ gelangen konnten. Somit zeigt die Thymus mit der Pseudothyreoidea die beachtenswerthe Aehnlichkeit, dass sich in beiden mitotische Processe und Erscheinungen des Austrittes gefärbter Blutkörperchen und nachträglicher Veränderungen der letzteren nachweisen lassen. Die Pseudothyreoidea und die Thymus sind nach dem Verf. dazu bestimmt, im Organismus der Batrachier für diejenigen Functionen aufzukommen, die bei den höheren Wirbelthieren an die den Batrachiern in typischer Ausbildung fehlenden Lymphdrüsen geknüpft sind. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 97—103.

Circulationsorgane. Ueber die Veränderungen der Blutplättchen von *Rana* und *Salamandra* bei und nach der Gerinnung machen C. Mondino & L. Sala Mittheilungen. Atti R. Accad. Lincei Roma (4) Bd. 4 pag. 377 und Giorn. Sc. Nat. Econom. Palermo Bd. 19 pag. 113—124, 1 Taf.

Urogenitalsystem. In seinen Beiträgen zur Kenntniss des thierischen Eies im unbefruchteten Zustand behandelt Fr. Leydig auch pag. 340—357 und Fig. 91—108 das Ei der Batrachier und speciell das von *Molge taeniata*, *Salamandra maculosa* (mit Notiz über ihr Vorkommen bei Bonn pag. 348), *Bufo vulgaris* und *Rana esculenta* und erörtert in besonderen Kapiteln Herkommen der Eizellen, Keimbläschen, Dotter, Dotterhaut und Dotterschale, Membrana granulosa, Kapsel- oder Follikelzellen und Eizelle und Gewebszellen. Zool. Jahrb., Abth. f. Anat. Bd. 3 pag. 287—432, Taf. 11—17.

Ontogenie. Héron-Royer theilt mit, dass sich bei ihm *Bufo arabicus* Gerv. ♂ mit *B. vulgaris* Laur. ♀ gepaart habe, und dass die Embryonen sich bis jetzt normal entwickelt hätten. Bull. Soc. Zool. France Bd. 13 pag. 103.

Auch Ch. Mailles paarte, wie frühere Forscher vor ihm, *Rana arvalis* Nilss. ♂ mit *R. fusca* Rös. ♀ mit negativem Erfolg. Nach Bull. Soc. Acclimat. Paris 1888 in Le Naturaliste 10. Jahrg. pag. 184.

Die Arbeit von Fr. Schanz [vergl. Ber. f. 1887 pag. 231] ist als Inaug.-Dissert. auch selbständig erschienen. Das Schicksal des Blastoporus bei den Amphibien. Jena 1888, 8°. 12 pag., 1 Taf. — Ref. in Journ. Micr. Soc. London pag. 189.

Eingehende Untersuchungen über die Entwicklung der Batrachier, besonders betreffs des Centralnervensystems, aber auch mit beiläufigen Mittheilungen über Hypophyse, Mund, Kopfanhänge und Kopfskelett, bringt H. Orr. An *Amblystoma*, *Molge* und *Rana* findet

er im Wesentlichen die Hauptresultate, die er bei den Lacertiliern beobachtet hat, bestätigt, und auch diese Batrachiertypen zeigen unter einander in der Entwicklung ihres Centralnervensystems keine fundamentalen Unterschiede. Bei Embryonen von *Amblystoma* und *Molge* sah Verf. [die von Maurer bereits erwähnte] Bildung eines mandibularen Arterienbogens. Qu. Journ. Micr. Sc. (2) Bd. 29 pag. 295—324, Taf. 27—29. — Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. 1889 pag. 188.

Nach C. Bergonzini spielen die Sertoli'schen Zellen des Säugethierhodens bei der Spermatogenese keine Rolle. Im Batrachierhoden werden sie nur durch die den Spermatogonien angelagerten Kerne repräsentiert. Ein Vergleich der Spermatogenese mit der Oogenese führt den Verf. zu der Annahme, dass die passive Sertoli'sche Zelle des Hodens im Ovarium zum Ei wird, während die Generation der activen Zellen des Hodens im Ovarium das Follikel epithel liefert. Rassegna Sc. Med. Modena Jahrg. 3 pag. 337—344, Taf.

Versuche über Regeneration des Schwanzes hat D. Barfurth an den Larven unserer einheimischen Batrachier angestellt. Liegt bei einer Amputation der Schwanzspitze die Schnittebene senkrecht zur Längsachse des Schwanzes, so erfolgt die Regeneration genau in der Richtung derselben Achse; fällt die Schnittebene schief nach oben oder unten, so steht auch die Achse des regenerierten Stückes schief nach oben oder unten. Erst später streckt sich im letzteren Falle das schiefgewachsene Stück, nachweislich infolge der Wirkung der Schwimmfunction des Schwanzes. Die Schnelligkeit der Regeneration ist durchaus abhängig von der Temperatur. Mikroskopisch liess sich nachweisen, dass bei der Regeneration die erstmalige Entwicklung in der Hauptsache wiederholt wird. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 403—405.

In seinen Mittheilungen über Zwitterbildung gibt A. Suchetet auch eingehende Notizen über hybride Batrachier. Rev. Quest. Scientif. Bd. 12 pag. 197—205.

L. Camerano beschreibt eine abnorme Larve von *Rana esculenta* L. von Chivasso, deren Vorderextremität vollständig entwickelt ist, während die Hinterextremität im Wachsthum ausserordentlich zurückblieb. Vermuthlich handelt es sich um eine Neubildung nach gewaltsamem Verlust der normalen Hintergliedmaassen. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino Bd. 3, No. 36. 2 pag.

Unter Bezugnahme auf ähnliche in der Literatur erwähnte Fälle von Polymelie macht M. Cazorro y Ruiz auf einen sechsbeinigen *Pleurodeles waltli* aufmerksam. Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. Bd. 17, Actas pag. 87—89.

F. Mazza beschreibt einen Fall von Polymelie bei *Rana esculenta*. Das interessante Thier zeigt 3 freie, von nahezu einem Punkt ausstrahlende, linke Vordergliedmaassen mit fast gleich entwickeltem Oberarm, Unterarm, Carpus und 4, 4 und 1 entwickelten Fingern.

Abbildung der abnormen Skeletttheile ist beigegeben. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Milano Bd. 31 pag. 145—150, Taf. 1.

Biologisches. Betr. der Locomotion der vierfüssigen Batrachier vergl. oben G. Carlet pag. 176.

Palaeontologisches. Eingehend behandelt K. Zittel die fossilen Batrachier in seinem wichtigen Werke „Handbuch der Palaeontologie I. Abth., Bd. 3, Lief. 2“ auf pag. 337—436, Fig. 324—421. Die ältesten fossilen Batrachier finden sich nach dem Verf. in der productiven Steinkohlengruppe und zwar als Stegocephalen der Unterordnungen Lepospondyli, Temnospondyli und Stereospondyli. Die Stegocephalen sterben mit der Gruppe Stereospondyli in der Trias aus. Aechte Caudaten erscheinen erst in der Unt. Kreide, Anuren erst im Eocaen. — Ref. in Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 1018 bis 1019.

Palaearktische Region. A. Koenig gibt als Anhang seiner Avifauna von Tunis auch eine Liste der von ihm gesammelten Kriechthiere. Von Batrachiern werden aufgezählt aus Tunis: *Rana esculenta* L. var. *ridibunda* Pall. Tunis und Gabes, *Discoglossus pictus* Otth, *Bufo mauritanicus* Schlg. und *variabilis* Pall., aus Tripolitanien nur die letztgenannte Art. Cabanis' Journ. f. Ornith. 36. Jahrg. pag. 299—304.

Von Batrachiern der Azoren nennt H. Simroth *Rana esculenta* L. von allen Inselgruppen, aber wohl nicht von allen Inseln. Ein einmaliger Import dieser nachweislich eingeführten Art scheint aber doch zweifelhaft, da nach W. Wolterstorff auf S. Miguel zwei verschiedene Varietäten des Wasserfroschs vorkommen, eine mit grösseren Augen, die blos in Nordspanien lebt, und eine mit kleineren Augen, die mit *R. esculenta lutastei* Cam. aus Nordafrika übereinstimmen dürfte. Ein von Nordamerika nach Fayal eingeführter *Bufo* hat sich nicht halten können. Arch. f. Naturg. 1888 I pag. 202—203.

Auf einer Excursion, welche die Spanische Ges. f. Naturgeschichte von San Ildefonso nach Peñalara gemacht hat, wurden an der Laguna de los Pájaros *Salamandra maculosa* und *Alytes obstetricans* Laur. erbeutet. Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. Bd. 17, Actas pag. 65.

Fr. Borcharding nennt aus der nordwestdeutschen Tiefebene vom Zwischenahner See, Grossh. Oldenburg, *Hyla*, *Rana temporaria* und *esculenta ridibunda*, *Pelobates*, *Bufo vulgaris*, *Salamandra*, *Molge cristata*, *alpestris* und *taeniata*, vom Dümmer See, Kreis Diepholz, Hannover, *Rana esculenta ridibunda*, *Bufo vulgaris* und *calamita*, *Molge cristata* und *taeniata*, und vom Steinhuder Meer, Grenze von Hannover und Lippe-Schaumburg, *Rana esculenta ridibunda*. Abh. Nat. Ver. Bremen Bd. 10 pag. 335—367.

K. M. Heller fand *Rana arvalis* Nilss. und *Bombinator bombinus* L. bei Braunschweig; *Alytes obstetricans* finde sich bei Grund am Harz. Zool. Garten 29. Jahrg. pag. 177—181.

W. Wolterstorff verzeichnet aus der preussischen Prov. Sachsen: *Rana esculenta* typ. und var. *ridibunda* von vielen Fundorten, *R. temporaria* und *arvalis*, beide gleich häufig, *Bufo vulgaris*, *viridis* und *calamita*, letztere selten, *Hyla*, *Pelobates*, *Bombinator bombinus* von Sulza im Ilmthal und Osterfeld bei Goslar, *igneus* verbreitet, aber nicht überall häufig. Der südlichste Fundpunkt für *B. igneus* bei Ammendorf in der Saalau liegt nur 45 Kilom. nördlich vom ersten sicheren Fundort für *B. bombinus* bei Sulza, Thüringer Hochebene. *Alytes* angeblich vom Hohenstein bei Nordhausen und vom Stöckey bei Walkenried am Südfuss des Harzes. *Salamandra* nur im Gebirge, *Molge cristata*, *alpestris*, *taeniata* und *palmata*, letztere auch bei Gernrode, Mägdesprung, Lauterberg und Wernigerode. Zeitschr. Ges. Naturw. (Halle) Bd. 61 pag. 1—38.

F. Leydig erhielt *Molge palmata* aus dem Spessart zwischen Lichtenau und Weibersbrunn, *Rana agilis* Tho. von Höchberg bei Würzburg in Franken. Verf. macht für beide Arten Angaben über ihre Entdeckung und über alle deutschen Fundorte mit Beifügung der Literaturnachweise und glaubt, dass *R. agilis* in Deutschland im Aussterben begriffen sei, da bis jetzt nur 3 oder 4 Exemplare von 3 oder 4 Fundorten bekannt geworden seien. Beiläufig erwähnt er aus den Hassbergen noch *Molge cristata*, *alpestris* und *taeniata*, von Lichtenau *alpestris* und aus dem Spessart überdies noch *taeniata*. Verh. Phys.-Med. Ges. Würzburg N. F. Bd. 22 pag. 191 bis 206.

In seiner Wirbelthierfauna von Kreuznach gibt L. Geisenheyner eine Skizze auch der Batrachierwelt des Nahethals. Er verzeichnet von dort *Pelobates fuscus* (Larve), *Bombinator bombinus*, *Alytes obstetricans*, über den Mittheilungen betr. Brunstzeit, Eierzahl und Larvenentwicklung gemacht werden, *Hyla*, *Rana esculenta* typ. im oberen Nahethal, bei Kreuznach nur die var. *ridibunda* Pall., *R. fusca* Rös. und zwar Formen mit glatter und solche mit warziger Haut, sowie eine schlankere Varietät, die aber nicht mit *R. acutirostris* Fat. übereinstimme. Notizen über Laichzeit und Entwicklung werden beigelegt. Weiter *Bufo vulgaris*, *calamita* in zwei Farbenspielarten und *variabilis*, *Molge taeniata*, *palmata* nur bei Waldalgesheim, *alpestris*, *cristata* und *Salamandra*. Wirbelthierfauna von Kreuznach I. Theil. Fische, Amph. u. Reptilien. Progr. Nr. 418. Gymn. Kreuznach pag. 25—45.

In Siebenbürgen kommen nach E. A. Bielz an Batrachiern vor: *Salamandra maculosa*, *Molge cristata*, *alpestris* und *vulgaris* L., *Rana esculenta* typ. und var. *ridibunda* von Szamofalva nächst Klausenburg und (?) vom Hammersdorfer Berge, *R. temporaria* und var. *platyrhinus* Steenstr., letztere im Gebirge verbreitet, *R. agilis* von Hermannstadt, *Hyla arborea*, *Pelobates fuscus* von Hermannstadt, Hammersdorf und Klausenburg, *Bombinator igneus* Laur. (verus) und *Bufo vulgaris* und *variabilis*. Verh. und Mitth. Siebenbürg. Ver. Nat. Jahrg. 38 pag. 110—113.

A. De Carlini zählt aus dem Valtellin, Oberitalien, auf *Hyla arborea* L., *Rana esculenta* L. var. *lessonae* Cam. und *R. temporaria* L., *Bufo vulgaris* und *viridis* von Sondrio; *Salamandra maculosa*, *Molge cristata* und *alpestris* aus dem Val Fraele in 2000 m. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Milano Bd. 31 pag. 83—85.

O. Boettger verzeichnet von den v. Oertzen'schen und v. Maltzan'schen Reisen 11 Batrachier aus Griechenland, von den griechischen und kleinasiatischen Inseln und aus Kleinasien und gibt eine Uebersicht über alle das griechisch-kleinasiatische Gebiet betreffende Fundpunkte dieser Arten. Von besonderem Interesse dürfte sein das Vorkommen von *Molge alpestris* im phokischen Parnass, von *Rana latastei* Blgr. an der Grenze von Aetolien und Doris und aus Bosnien, von *R. agilis* Tho. bei Avlona in Albanien, von *Bufo vulgaris* Laur. auf Samos und bei Smyrna und von *Hyla* auf Creta [s. auch oben pag. 182]. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Berlin pag. 139—186.

G. A. Boulenger gibt eine Liste der 5 bis jetzt von Cypern erwähnten Batrachier. Es sind sämtlich Anuren; das Vorkommen von *Bufo vulgaris* Laur. wird als fraglich, das von *Rana temporaria* L. als sehr fraglich bezeichnet. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 505 bis 506.

O. Boettger zählt von Batrachiern aus Transkaspien nur auf die Anuren *Rana esculenta* var. *ridibunda* Pall. und *Bufo viridis* Laur. Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 259—263. — Ueber die Batrachier Transkaspiums berichtet auch A. Walter. Die beiden ebengenannten Anuren sind die einzigen Batrachierformen des Landes, aber sie finden sich im ganzen Gebiete und in erstaunlicher Individuenmenge. *Rana esculenta*, die Verf. von var. *fortis* Blgr. für verschieden erklärt, ist direct aus Persien eingewandert, *Bufo* durch Verschleppung ihrer Eischnüre durch Vögel. Reichliche und sehr interessante biologische Beobachtungen werden für beide Arten beigebracht. Zool. Jahrb., Abth. f. Syst. Bd. 3 pag. 973—986.

A. M. Nikolskij nennt aus der Balkasch-Depression nur 3 Arten von Batrachiern. Arbeit. (Trudi) St. Petersburg. Naturf.-Ges. Bd. 19, Beil. II pag. 59—188.

Nordamerikanische Region. A. W. Butler fügt in seinen Bemerkungen über Reptilien und Batrachier von Indiana der Fauna dieses Staates *Plethodon cinereus* und *Hyla squirilla* zu. Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 94.

E. D. Cope zählt die von W. Taylor in San Diego, Südwest-Texas, gesammelten Batrachier auf. Es sind *Siren lacertina* L.; *Diemyctylus viridescens* var. *meridionalis* Cope; *Bufo punctatus* B. G., *insidiator* Gir. und *valliceps* Wgm., *Hypopachus cuneus* n. sp. (s. Engystomatidae), *Engystoma carolinense* Holbr. und *Rana virescens* Kalm. Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11 pag. 395—396.

Indische Region. In oder bei Stadt Madras finden sich nach E. Thurston nur *Rana hexadactyla* und *tigrina*, *Rhacophorus*

maculatus, *Microhyla rubra*, *Callula olivacea*, *Bufo melanostictus* und *Cacopus systema* [denen Ref. noch *Rana limnocharis* Wgm. beifügen kann]. Ausserdem erwähnt Verf. *Rana breviceps* Schn. und *beddomei* Blgr. und *Microhyla ornata* D. B. von Tinevelly, *Rana curtipes* Jerd. von Wynaad, *R. temporalis* Blgr. von Coonoor, Nilgiris, *Rhacophorus pleurostictus* Blgr., *Ixalus opisthorhodus* Gthr. und *glundulosus* Jerd. von Kotagiri, Nilgiris, *Rhacophorus maculatus* Gray von den Shevaroyes, *Ixalus variabilis* Gthr. von Ootacamund und Kotagiri und *signatus* Blgr. von Pycara und Coonoor, *Microhyla rubra* Jerd. von den Nilgiris und Tinevelly, *Callula triangularis* Gthr. von Ootacamund, *Cacopus systema* Schn. von den Nilgiris, *Bufo melanostictus* Schn. von Cochin, Ootacamund, Kotagiri und Coonoor und *B. microtypanum* Blgr. von Kodaikanal in den Palni Hills und Coonoor. Cat. Batr. Sal. a. Apod. S. India. Madras 1888. 54 pag., 13 Taf.

G. A. Boulenger beschreibt zwei neue *Rana* (s. Ranidae) aus Indien. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 506—508.

O. Boettger nennt aus Bangkok, Siam, *Ichthyophis glutinosus* L. und (fälschlich) einen neuen *Ixalus* (s. Ranidae). 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. pag. 57.

Derselbe gibt in seinen Materialien zur herpetologischen Fauna von China II [s. oben pag. 185] eine zweite Liste von Batrachiern aus China. Aufgezählt und mehr oder weniger eingehend beschrieben werden *Oxyglossus lima* Tsch., *Rana esculenta* var. *japonica* Blgr., *R. gracilis* Wgm., *guentheri* Blgr., *japonica* Blgr., *macroductyla* Gthr. und *tigrina* Daud., *Rhacophorus maculatus* Gray, *Microhyla ornata* D. B. und *pulchra* Hall., *Bufo melanostictus* Schn. und *Molge sinensis* Gray. Zum Schluss wird eine Aufzählung aller Batrachier Chinas mit Angabe der Literatur und der bekannten Fundorte gegeben. Ebenda pag. 53—191.

Derselbe bringt eine kleine Liste ostasiatischer Batrachier. Es sind *Oxyglossus lima* Tsch. vom Lofoushan bei Canton und *Rana esculenta japonica* Blgr., *gracilis* Wgm. und *plancyi* Lat., sowie *Bufo vulgaris* Laur. und eine neue Varietät von *Hyla* (s. Hylidae) von Shanghai. Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 187—190.

J. Gogorza y González zählt in seinen Beiträgen zu einer Wirbelthierfauna der Philippinen 10 Batrachier von dort auf. Neu für die Philippinen wären pag. 35 *Rana chalconota* Gthr. (Bulacán) und *Bufo biporcatus* Schl. [= *philippinicus* Blgr.; Ref.], wenn nicht diese Identificationen sehr wahrscheinlich auf falscher Bestimmung beruhten. Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. Bd. 17 pag. 34—35.

Afrikanische Region. F. Mocquard verzeichnet *Rana mascareniensis* D. B. und *Chirromantis petersi* Blgr. aus Somaliland. Mém. Cent. Soc. Philomath. Paris 1888 pag. 109—134.

G. A. Boulenger beschreibt 4 neue Frösche (s. Ranidae, Dendrobatidae und Dyscophidae) aus Madagascar. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 105—107, Taf. 6.

A. Günther nennt aus Monbuttu, Obercongogebiet, *Rana occipitalis* Gthr. und *mascareniensis* D. B., *Rappia cinctiventris* Cope und *Bufo regularis* Rss. Die Fauna ist näher mit der West-, als mit der Ostafrikas verwandt [s. auch oben pag. 187]. Proc. Zool. Soc. London pag. 51.

O. Boettger gibt in Materialien zur Fauna des Unteren Congo II pag. 5—11 die Literatur auch über die Batrachier des dortigen Gebietes und beschreibt sodann mehr oder weniger eingehend die 7 Anuren *Rana albolabris* Hall., *Rappia marmorata parallela* Gthr., *R. fuscigula* Boc., *cinctiventris* Cope und *imbriolata* B. P., *Hylambates aubryi* A. Dum. und *Bufo regularis* Rss. var. *spinosa* Boc. Ber. Senck. Nat. Ges. 1888 pag. 3—108.

Tropisch-amerikanische Region. J. G. Fischer erwähnt von Haiti nur *Bufo gutturosus* Laur. und *Hyla (Trachycephalus) ovata* Cope aus Cap Haytien, letztere auch aus Grande Rivière und Sanssouci (mit Beschreibung der Färbung und der Larve auf pag. 44). Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5.

A. Günther verzeichnet aus Dominica, Westindien, nur *Cystignathus pentadactylus* Laur. und *Hylodes martinicensis* Tsch. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 366.

G. A. Boulenger beschreibt 4 neue Batrachier aus den Gattungen *Leptodactylus*, *Eupemphix*, *Hyla* und *Siphonops* (s. Cystignathidae, Bufonidae, Hylidae und Caeciliidae) aus Brasilien. Ebenda Bd. 1 pag. 187—189.

Derselbe zählt von Iguarasse, Prov. Pernambuco, Brasilien auf: Larven von *Rana palmipes* Spix, sowie *Paludicola biligonigera* Cope, *Hyla rubra* Daud. und 3 neue Anuren (s. Cystignathidae und Hylidae). Besonders interessant ist der erste Nachweis eines *Noto-trema* so weit östlich von den Anden. Ebenda Bd. 2 pag. 40—43, Taf. 3.

Derselbe gibt eine Liste von Batrachiern der brasilianischen Provinz St. Catharina. Folgende 21 Arten wurden in der Sierra do Catharina von Hrn. Michaëlis gesammelt: *Engystoma ovale* var. *bicolor* Val., *Pseudis mantidactyla* Cope, *Elosia nasus* Licht., *Hylodes gollmeri* Pts., *Ceratophrys boiei* Wied, *Paludicola olfersi* Mts. und *biligonigera* Cope, *Leptodactylus gaudichaudi* D. B., *Eupemphix nana* Blgr., *Bufo arenarum* Hens., *Hyla faber* Wied, *marginata* Blgr., *pulchella* D. B., *bischoffi* Blgr., *bivittata* Blgr., *nasica* Cope, *senicula* Burm., *aurantiaca* Daud., *Phyllomedusa iheringi* Blgr., sowie je eine neue *Engystoma* und *Hyla* (s. Engystomatidae und Hylidae). Ebenda Bd. 1 pag. 415—417.

Australische Region. G. A. Boulenger beschreibt aus Neu-guinea eine neue *Rana* und ein neues Anurengeschlecht (s. Ranidae und Engystomatidae), welche H. O. Forbes daselbst gesammelt hat. Ebenda Bd. 1 pag. 345—346.

In einem Dritten Beitrag zur Herpetologie der Salomonsinseln fügt derselbe der dortigen Fauna noch *Cornufer corrugatus* A. Dum hinzu. Die Insel Guadalcanar ergab von Anuren *Rana guppyi* (♂ 21, ♂ 10 cm von Schnauze zu After; frisst grosse Krebse!) und *kreffti* Blgr., *Cornufer salomonis* Blgr. und *corrugatus*, *Ceratobatrachus guentheri* und *Hyla macrops* Blgr. Von Rubiana auf Neu-Georgia stammen *Rana guppyi*, *Cornufer corrugatus* und *Ceratobatrachus guentheri*. Es finden sich auf den einzelnen Inseln auf Faro 9, auf Shortland 4, auf Treasury 8, auf Neu-Georgia 3, auf Guadalcanar 6 und auf San Cristoval und den Nachbarinseln eine Froschart, und ausschliesslich auf die Salomonsinseln beschränkt sind 11 Species Anuren. Proc. Zool. Soc. London pag. 88—90.

Derselbe beschreibt einen neuen *Limnodynastes* aus N.-S.-Wales und eine neue *Crinia* aus Victoria (s. Cystignathidae). Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2) Bd. 3 pag. 1258.

Systematisches. G. Baur gibt folgende neue Eintheilung der Batrachier nach E. D. Cope:

Ordn. 1. Ganocephala.

Ordn. 2. Rhachitomi.

Ordn. 3. Embolomeri.

Ordn. 4. Stegocephali.

Ordn. 5. Proteida mit Fam. Proteidae.

Ordn. 6. Urodela mit den Fam. Cryptobranchidae, Sirenidae, Amphiumidae, Caeciliidae, Amblystomatidae, Plethodontidae, Desmognathidae, Salamandridae und Pleurodelidae.

Ordn. 7. Anura.

Beitr. z. Morphogenie d. Carpus und Tarsus d. Vertebraten I. Th.: Batrachia. Jena, G. Fischer 1888, 8°.

Ecaudata.

Allgemein Anatomisches. Von A. M. Marshall's „The Frog. Introduction to Anatomy, Histology and Embryology. Manchester 1888, 8°. 154 pag., Figg.“ erschien eine dritte durchgesehene Auflage, welche auch ein neues Kapitel über Entwicklungsgeschichte enthält.

L. Ranvier zeigt, dass an Fröschen, die er in warmes Wasser brachte, Unterschiede in der Zusammensetzung des Bindegewebes in den verschiedenen Organen desselben Thieres sowol wie bei verschiedenen Thieren zu bemerken waren. Journ. de Microgr. No. 16 pag. 491—499.

Skelettsystem. Héron-Royer vergleicht die osteologischen Merkmale des Schädels verschiedener *Pelobates*-Formen und gedenkt namentlich eingehend der Gestalt des Ethmoideums bei *Pelobates* und *Rana* und des Hyofdeums bei den drei europäischen *Pelobates*-Formen. Bull. Soc. Zool. France Bd. 13 pag. 85 bis 91, 10 Figg.

G. B. Howes & W. Ridewood haben in eingehendster Weise Carpus und Tarsus der Anuren untersucht. Ihre Beobachtungen basieren auf der Vergleichung von 37 Gattungen und 60 Arten in allen Entwicklungsstufen aus sämtlichen, bis auf vier weniger wichtigen Familien. Die interessantesten Schlüsse, die sie ziehen, sind, dass in den Vordergliedmaassen das Pyramidale das Ulnare darstellt, dass das Naviculare ein praeaxiales Centrale und dass seine Verbindung mit dem Radius immer secundär ist, dass ferner die Andeutung eines fünften Carpale bei den erwachsenen Discoglossiden und Pelobatiden vorhanden ist, dass das bisherige fünfte Carpale ein postaxiales Centrale darstellt, und dass die lebenden Anuren die einzige Wirbelthierordnung mit doppeltem Centrale carpi sind. In den Hintergliedmaassen fehlt ebenfalls jedes dritte proximale Tarsalelement, und, während die Tarsalen der vierten und fünften Zehe öfters als Bänder vertreten sind, zeigen sich Skelettspuren eines vierten nur bei den Discoglossiden. Das Naviculare des Tarsus ist ein Centrale und nicht ein basales Segment des Praehallux, der nie aus mehr als vier Stücken besteht. Auch die morphologische Bedeutung von Pollux und Praehallux wird in Betracht gezogen. Ein zweiter Theil beschäftigt sich mit den Verschiedenheiten von Carpus und Tarsus bei den einzelnen Anurenfamilien und ihrem Werth und Einfluss auf die Classification. Schliesslich wird nachgewiesen, dass die Discoglossiden augenscheinlich die am wenigsten modificierten Knochenelemente in beiden Extremitäten aufzuweisen haben. Proc. Zool. Soc. London pag. 141—182, 3 Figg., Taf. 7—9.

Kurze Mittheilungen über sesamoide Knochen der Achillessehne des Frosches bringt M. Fürbringer. Bijdr. Dierk. Amsterdam Bd. 15. 49, 1751 pag., 30 Taf.

Muskelsystem. C. v. Lucowicz. Versuche über die Anatomie des Froschherzens. Inaug.-Diss. Halle 1888, 8°. 29 pag.

In einer Mittheilung über den feineren Bau der gestreiften Muskelzellen macht A. v. Gehuchten auch Notizen über die Muskelkerne des Frosches. Diese Kerne sind immer als ovale Körperchen mit ein oder zwei Kernchen beschrieben worden, aber ihr Bau ist ein bei weitem complicierterer. Das Knäuelstadium ist nicht das erste Stadium der Kerntheilung, sondern der normale Bau des Kernes in der Ruhe. Arch. f. Anat. u. Phys., Phys. Abth. 1888 pag. 563 bis 564. — Weitere Notizen über die Muskelkerne der erwachsenen *Rana temporaria* bringt derselbe. Tagebl. 61. Vers. D. Naturf. u. Aerzte Köln 1888 pag. 46—47.

Nervensystem. Eine eingehende Darstellung des anatomischen Baues des Froschgehirns bringt M. Koeppen. Die einfachen Verhältnisse des Rückenmarks finden sich in allen höheren Gehirnthteilen wieder; Medulla oblongata, Lobus opticus, Thalamus und Vorderhirn behalten den Bauplan des Rückenmarks im grossen Ganzen bei. Das Einzige, was man im Thalamus-Grosshirnabschnitt vermisst, sind motorische Ganglienzellen und motorische Wurzeln. Das Centralnervensystem des Frosches wird aus sensiblen und aus motorischen Elementen gebildet. Eine ausgesprochene Gliederung der sensiblen Bestandtheile fehlt; nur wegen der Formverhältnisse machen wir Eintheilungen. Dagegen zeigen eine vollkommene Gliederung die motorischen Bestandtheile. Vermittelt wird der Nervenreiz aus den sensiblen Elementen in die motorischen durch eine dritte Art von Nervenbahnen, die sogen. Reflexfasern. Verf. beobachtete nun

beim Frosche die Eigenthümlichkeit, dass entferntere sensible Centren nicht in dem Maasse verbunden sind, wie bei höheren Thieren; dadurch erkläre sich eine gewisse Selbständigkeit der einzelnen Abschnitte des Centralorgans desselben auch anatomisch, und vor allem die grosse Selbständigkeit der tieferen Centren gegenüber dem Grosshirn. Schliesslich wird die Bedeutung des Grosshirns im Gesammbau des Centralnervensystems geschildert. Arch. für Anat. u. Phys., Anat. Abth. 1888 pag. 1—34, Taf. 1—3.

A. C. Wightman macht Mittheilungen über die Epithelzellen der Ventriculi cerebri des Frosches und ihre Anastomosen mit den Nervenzellen. Johns Hopkins Univ. Baltimore Circul. Bd. 7 pag. 84—85.

M. Koeppen hat die Bildung einer vorderen und einer hinteren Wurzel, welche getrennt aus dem Lobus opticus entspringen, im Froschgehirn gefunden. Neurolog. Centralbl. Jahrg. 7 pag. 10—12.

Eine Notiz über die Hemmungscentren der Kröte bringt P. Albertoni. Centr.-Blatt f. Physiol. No. 26a v. 17. März 1888.

Die hintere Grenze für „das Centrum des reflectorischen Lidschlusses“ liegt nach Versuchen von R. Nickell beim Frosch genau in der Mitte der Rautengrube. Pflüger's Arch. f. Phys. Bd. 42 pag. 547—557. — Auch separ.: Inaug.-Diss. Königsberg i. Pr. 1888, 8°. 40 pag.

Mittheilungen über die feinere Structur der Nervenfasern beim Frosche macht M. Joseph. Er fand im Achsenraum ein Netzwerk, ein wirkliches Achsengerüst, in dessen Maschen die Nervenfibrillen liegen. Dieses Maschenwerk übertrifft an Feinheit bei weitem das sogenannte Neurokeratingerüst Ewald & Kühne's in der Markscheide. In einer normalen Nervenfasern macht der Achsenraum das grösste Contingent der Fasern aus und übertrifft die Markscheide um das Fünf- bis Mehrfache an Durchmesser. Die Bezeichnung Neurokeratin für die in der Markscheide enthaltene Substanz sei nicht angebracht. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Berlin 1888 pag. 1321—1330, 3 Figg. und Arch. f. Anat. und Phys., Phys. Abth. 1888 pag. 184—187.

W. Krause hat die Nervenendigungen im Froschmuskel ebenfalls eingehend untersucht. Er findet 93% der Muskelfasern im Frosch Sartorius nur an einer einzigen Stelle mit Nervenfasern in Verbindung. Die motorischen Endplatten lägen ausserhalb des Sarcolemms. Intern. Monatsschr. Anat. Phys. Bd. 5 pag. 64—80 und pag. 97—106, Taf. 4—6.

Aus Versuchen an der Froschzunge schliesst G. N. Dürdufi, dass im N. glossopharyngeus Vasodilatoren vorhanden sind. Die Geschmackspapillen besitzen wahrscheinlich eine gemischte Nervenversorgung; die in der Mittellinie der Zunge liegenden Papillen werden von beiden Glossopharyngei versorgt. Deutsch. Med. Wochenschr. 1888 pag. 518—519.

Mittheilungen über die Nervenendigungen in den Bauchmuskeln von *Rana temporaria* und *esculenta* bringt G. Cuccati. Er findet vier Typen der Endigung, bandförmige, netzförmige, unvollkommen netzförmige und traubenförmige Endplatten; Kerne sind kein integrierender Bestandtheil der Nervenendigung. Intern. Monatsschr. f. Anat. u. Phys. Bd. 5 pag. 337—343, Taf. 24.

A. Smirnow hat die Nervenendknäuel in der Froschlunge untersucht und bringt den Nachweis, dass die von Arnstein als Endplatten bezeichneten Gebilde mit demselben Rechte, wie die Endkolben der Conjunctiva, als Nervenendorgane

gelten dürfen. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 258—261, 2 Figg. und 100. Beil. z. d. Protok. Naturf.-Ges. Kasan 1888 pag. 1—6 (russ.).

Ueber die Verbreitung und die Endigung der Nervenfasern in der Lunge von *Rana temporaria* hat auch G. Cuccati Untersuchungen angestellt. Er beschreibt dieselben, ebenfalls nach der Methylenblaumethode gefärbten Endknäuel. Intern. Monatsschr. f. Anat. u. Phys. Bd. 5 pag. 194—204, Taf. 18. — Ref. in Rend. Accad. Istit. Bologna 1887/88 pag. 44.

Weitere Mittheilungen [vergl. Ber. f. 1887 pag. 238] über „die Natur der peripherischen Nervenendigungen“ im Froschlارvenschwanz bringt P. Mitrophanow. Der morphologische Charakter der verschiedenartigen peripheren Nervenendigungen trägt den Stempel der Einfachheit an sich; er lässt sich ausdrücken als ursprünglicher Contact des freien Nervenendes mit dem peripheren Endapparate. Rede v. 13. März 1888 Mag. Zool. Univ. St. Petersburg, Warschau 1888. 9 pag. (russ.).

A. Adamkiewicz hat seine „Nervenkörperchen“ des erwachsenen Menschen, die er Vignal gegenüber aufrecht erhält, beim Frosche vergebens gesucht. Sitz.-Ber. Akad. Wien 97. Bd. 3. Abth. pag. 24—42, Taf. 1—3. — N. Cybulski macht einige Bemerkungen über die Adamkiewicz'schen Nervenkörperchen, wobei er auch die Verhältnisse beim Frosche berücksichtigt. Dieselben seien nichts anderes als die an der Innenfläche der Schwann'schen Scheide gelagerten, allgemein bekannten Körper, welche aus einem ovalen Kern und Protoplasma beständen. Med. Rundschau (Przegląd lekarski) Krakau 1888, No. 46, 47 und 49. 21 pag., 1 Taf. (poln.).

Sinnesorgane. Wegen Zunge und Geschmacksorganen der Larven von *Pelobates* vergl. unten F. E. Schulze unter Respirationsorgane pag. 255.

T. Schottländer hat Untersuchungen über Kern- und Zelltheilung am Endothelium der Froschcornea angestellt. Archiv microsk. Anat. Bd. 31 pag. 426 bis 482, 1 Taf. — Ref. in Journ. Micr. Soc. London pag. 554.

In seinen Mittheilungen über Muskulatur und Bruch'sche Membran der Iris geht A. Grünhagen auch auf das Auge des Frosches ein und erwähnt das Vorkommen der sogen. Kittsubstanz an zwei Stellen der Iris und die Anwesenheit des Sphincters auch beim Frosche. Der Pupillartheil der Froschiris enthält zwei Arten von Spindelzellen und zwar ächte glatte Muskelzellen und Pigmentzellen von eigenthümlichem Bau (Chromatophoren). Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 27—32, Fig.

A. Dogiel hat die nervösen Elemente in der Netzhaut des Frosches einer erneuten Prüfung unterzogen. Die Stäbchen und Zapfen färben sich in Methylenblau nicht. In der Körnerschicht müssen drei Arten von Nervelementen unterschieden werden, nämlich sternförmige Zellen, bipolare Zellen und Spongioblasten. Einer der varicösen Fäden der bipolaren Zellen dringt direct in die Schicht der Sehzellen ein, wo er bis an die M. l. externa zu verfolgen ist. Hier endet er häufig mit einer kleinen Verdickung, die an die Landolt'schen Kolben der Reptilien erinnert. Unter den Spongioblasten sind zwei Formen zu unterscheiden. Die Zellen der gangliösen Schicht unterscheiden sich nicht wesentlich von denen der Reptilien. Ebenda pag. 342—344, 2 Figg. und Wratsch 1888, No. 30 (russ.).

Verdaunungsorgane. Ueber ein reichentwickeltes System vielzelliger Drüsen der hinteren Partie des Pharynx bei den Larven von *Pelobates* berichtet F.

E. Schulze. Diese Drüsen sind dadurch besonders bemerkenswerth, dass sie nicht im Bindegewebe eingelagert sind, sondern ausschliesslich dem Epithel angehören. Abh. Akad. Wiss. Berlin 1888 pag. 46—49. — Ref. in Biol. Centr.-Blatt Bd. 8 pag. 580—582.

Mikroskopische Beobachtungen über den Glycogenansatz in der Froschleber hat O. Moszeit angestellt. Die Untersuchung zerfiel in drei Theile. Erstlich musste der vorhandene Glycogengehalt aus der Leber entfernt werden, zweitens wurden verschiedene Substanzen bei Dunkelheit und niederer Temperatur verfüttert, und drittens erst konnte das neu angesetzte Glycogen chemisch und mikroskopisch geprüft werden. Frösche, welche glycogenfreie Leber hatten, setzten bei Fütterung mit reinen Kohlehydraten beträchtliche Mengen von Glycogen an, solche, die mit reinen Eiweisskörpern gefüttert wurden, nicht oder nur spurweise. Gemischtes Futter verursacht den bedeutendsten Glycogenansatz. Morphologische Veränderungen der Leberzelle gehen mit der chemischen Hand in Hand. Nach allen Versuchen des Verf.'s erklärt sich der Mangel an aufgespeichertem Glycogen in der Leber des freilebenden Frosches zur Sommerszeit dadurch, dass dasselbe gleichzeitig mit der Bildung durch die Muskelthätigkeit verbraucht wird. Bei niedriger Temperatur und beim Aufhören der Muskelaktion im Herbste kommt es nach reichlicher Nahrungsaufnahme zu einer Anhäufung von Glycogen. Pflüger's Arch. f. Phys. Bd. 42 pag. 556—581, Taf. 9.

Mittheilungen über die Bildung des Gallenfarbstoffes in der Froschleber macht M. Löwit. Beitr. z. Pathol. Anat. (Ziegler u. Nauwerck) Bd. 4 pag. 223 bis 264, 1 Taf.

S. auch im folgenden unter Respirationsorgane.

Respirationsorgane. Versuche über die Expirationsbewegungen von *Rana esculenta* hat O. Langendorff angestellt. Er gelangte dabei, ähnlich wie Knoll [vergl. Ber. f. 1887 pag. 237], zu der Ueberzeugung, dass bei der normalen Athmung expiratorische Muskelkräfte nicht zur Verwendung kommen, dass wir es bei der Ausathmung vielmehr mit einem durchaus passiven Vorgang, mit dem Spiel der elastischen Kräfte der Lungen, zu thun haben. Arch. f. Anat. u. Phys., Phys. Abth. 1888 pag. 304—310, 3 Figg.

P. Jordan giebt auch eine Beschreibung der Entwicklung und des Baues des Kiemendeckels der Anuren und des die beiden Kiemenhöhlen verbindenden Kanals. Entwicklung der vorderen Extremität der anuren Batrachier. Inaug.-Diss. Leipzig, G. Fock 1888, 8°. 55 pag., 2 Taf.

Eingehende anatomische und histiologische Mittheilungen über die inneren Kiemen der Batrachierlarven und speciell über das Epithel der Lippen, der Mund-, Rachen- und Kiemenhöhle und über die Stiftzähnen erwachsener Larven von *Pelobates fuscus* macht Fr. E. Schulze. Untersucht wurden die Larven in dem Stadium, in welchem die Hinterextremität bereits frei vorragt, während die Vorderextremität die äussere Haut noch nicht durchbrochen hat. Nach dem Verf. ist der Unterschied zwischen Cuticularbildung und Verhornung ein fundamentaler, denn im ersteren Fall bleibt der Haupttheil des Zellkörpers selbst und besonders dessen Kern lebenskräftig und im Wesentlichen unverändert, im letzteren Fall aber handelt es sich um einen tiefgreifenden Umwandlungsprocess des ganzen Zelleibes mit Einschluss des Kerns. Phys. Abh. Akad. Wiss. Berlin 1888, Abh. I pag. 1—59, Taf. 1—4. — Ref. daraus: Ueber mehr-

zellige epitheliale Drüsen bei Batrachierlarven vergl. in Biol. Centr.-Blatt Bd. 8 pag. 580—582.

S. auch G. Cuccati oben unter Nervensystem pag. 254.

Circulationsorgane. C. v. Lucowicz. Versuche über die Anatomie des Froschherzens. Inaug.-Diss. Halle a. S. 1888, 8°. 29 pag.

T. Tigerstedt u. C. A. Strömberg haben den Venensinus des Herzens von *Rana temporaria* physiologisch untersucht. Sie finden, dass, ebenso wie die Herzcontraction selbst von dem Sinus ausgeht, sie auch in den mannigfaltigsten Hinsichten von ihm beeinflusst und geregelt wird. Bihang till Handl. Svensk. Vet.-Akad. Bd. 13 Abth. 4. 67 pag., 3 Taf.

G. B. Howes macht Mittheilungen über die Azygos-Venen der Anuren. Ausnahmsweise fand er bei einem Stück von *Rana temporaria*, dass die Azygos-Vene (praerenaler Theil der Vena cardinalis posterior) einseitig erhalten geblieben war, dass aber ihre Verhältnisse in wesentlichen Punkten sich von denen unterschieden, welche Hochstetter bei *Bombinator* gefunden hatte. Auch bei *Discoglossus* und bei einem unter 5 Stücken von *Alytes obstetricans* sah er diese Venen und stützt mit diesen Beobachtungen Cope's und Boulenger's Ansicht von der wenig nahen Verwandtschaft der Discoglossiden mit den übrigen Anuren. Bei den Aglossen fehlen Azygos-Venen, ebenso bei *Pelobates* und *Pelodytes*, so dass eine Abtrennung der Pelobatiden von den Discoglossiden auch nach dieser Seite hin Unterstützung erfährt. Proc. Zool. Soc. London pag. 122—126, Fig.

Notizen über das Verhalten der morphologischen Bestandtheile der Froschlymphe und des Froschblutes zu Methylenblau bringt N. Kowalewsky. Die amoeboiden Leucocyten nehmen intra vitam den Farbstoff auf, anfangs in diffuser Form, später aber mit allmählicher Concentration desselben in einem centralgelegenen Körnerhaufen bei gleichzeitiger Entfärbung der peripheren contractilen Substanz. Auch das Stroma der rothen Blutzellen färbt sich post mortem. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 53—56.

Bei Gelegenheit seiner Untersuchungen der Beschaffenheit und Umwandlungen der Membran, des Protoplasmas und des Kerns von Pflanzenzellen hat C. Frommann auch die Leucocyten des Froschblutes studiert. Jena. Zeitschr. f. Naturw. Bd. 22 pag. 47—174, 5 Taf.

Ueber Blutplättchen und Thrombose beim Frosch macht M. Löwit Mittheilungen. Danach sind die Spindelzellen der Batrachier verschieden von den Blutplättchen der Säugethiere und zwar eine besondere jugendliche Form von haemiglobinfreien Zellen, aus welcher sie in die bekannte Rundform übergeführt werden können. Fortschr. d. Medicin Bd. 6 pag. 369—374.

Urogenitalsystem. In einem Beitrag zur Histologie der Vorniere hat A. E. Giles die Entwicklung des Fettkörpers bei *Rana temporaria* einer Prüfung unterzogen. Derselbe entsteht durch fettige Degeneration der Vorniere. Qu. Journ. Micr. Sc. (2) Bd. 29 pag. 133—142, Taf. 14.

Mittheilung über ein durch das Auftreten von Bidder'schem Organ und Eileiter abnormes Genitalsystem bei einer einjährigen männlichen *Rana temporaria* macht W. G. Ridewood. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 333—336, Fig.

J. Massart gibt vorläufige Notizen über Versuche betreffs der Reizbarkeit der Spermatozoiden des Frosches und über die primäre Ursache, welche dieselben zum Eintritt in die Eielemente bewegt. Die einzigen bisherigen Resultate des Verf.'s sind, dass das Ei keine chemisch wirkende Substanz secerniert, die

auf die Spermatozoiden Einfluss hat, dass aber die Reizbarkeit der letzteren eine augenblickliche ist, sobald eine Berührung derselben mit den Eielementen stattfindet. Bull. Acad. Roy. Belg. (3) Bd. 15 pag. 750—754. — Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. London 1888 pag. 707.

C. O. Whitman's Betrachtungen über kinetische Erscheinungen am Ei während der Reifung und Befruchtung stützen sich auf Untersuchungen am Froschei. Eingehend werden namentlich die Anziehungserscheinungen an den Vorkernen besprochen. Journ. of Morph. Bd. 1 (1887) pag. 227—252.

Ontogenie. J. W. Gatehouse gibt eine Darstellung der Entwicklung und der Lebensgeschichte der Kaulquappe. Journ. Micr. a. Nat. Sc. N. S. Bd. 1 pag. 33—38, 2 Taf.

Eine weitere Replik auf O. Schultze's Mittheilungen über die Achsenbestimmung beim Froschembryo [vergl. Ber. f. 1887 pag. 241] bringt W. Roux. Biol. Centr.-Blatt Bd. 8 pag. 399—413.

O. Schultze hält nach seinen Untersuchungen über die Keimblattbildung der Batrachier eine Anwendung der Coelomtheorie auf die Anuren nicht für möglich. Das mittlere Blatt entwickle sich nicht aus paarigen Anlagen von der Wand des Urdarmes aus neben dem Chordaentoblast, es stelle vielmehr eine einheitliche Anlage dar, und die Bildung des Ento- und des Mesoblast erfolge gleichzeitig von dem Urmund aus durch Invagination. Eine zweiblättrige Gastrula fehle den Anuren; durch das Vorhandensein eines Primitivstreifs schlossen sich dieselben mehr den höheren Wirbelthieren an. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 678.

Mittheilungen über die Lagerung des Medullarrohres im gefurchten Froschei und über Versuche, um einen Einblick in die Massenverschiebungen zu gewinnen, welche bei der Gastrulation vor sich gehen, macht W. Roux. Verf. fand, dass sich die Gastrulation des Froscheies wesentlich durch Ueberwachsung der weissen unteren Hälfte des Eies von den beiden Seitenhälften des Aequators aus vollzieht, also durch bilaterale Epibolie. Die schwarze, am Eiaequator angelegte Urmundslippe des Froscheies entspreche dem Randwulste der Knochenfische. Ebenda pag. 697—705, 4 Figg.

Weitere eingehende Untersuchungen über die Entwicklung der Keimblätter und der Chorda dorsalis von *Rana temporaria* bringt O. Schultze. Nach vorn von dem Primitivstreif bildet sich als erste Anlage der Chorda eine Verdickung des Mittelblatts, der Kopffortsatz. Die Chorda dorsalis stammt in ihrer ganzen Länge vom Mesoblast ab. Die Spinalganglien bilden sich aus den peripheren Theilen der Medullarplatte. Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 47 pag. 325—353, Taf. 28—29. — Ref. in Journ. Micr. Soc. 1889 pag. 30—31.

J. Perényi's Notiz über den Blastoporus beim Frosche [vergl. Ber. f. 1886 pag. 218] findet sich auch in Math. Nat. Ber. Ungarn Budapest Bd. 5 pag. 253—258.

Ueber das Schicksal des Blastoporus bei *Rana temporaria* macht auch H. Sidebotham nach der Untersuchung von mehr als 60 Embryonen Mittheilung. Er stimmt mit den älteren Ansichten von Balfour überein, findet aber, dass die Neuralfaltten den Blastoporus nicht einschliessen, und dass der letztere erst nach dem Zusammentreffen der Neuralfaltten sich schliesst. Der After sei nicht von einem persistenten Blastopor herzuleiten, wie Spencer will, sondern bilde sich als von denselben unabhängige Einstülpung. Qu. Journ. Micr.

Sc. (2) Bd. 29 pag. 49—54, Taf. 5. — Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. London, 1888 pag. 925.

P. Jordan hat „die Entwicklung der vorderen Extremität der anuren Batrachier“ einer eingehenden Untersuchung unterzogen. Inaug.-Diss. Leipzig, G. Fock 1888, 8°. 55 pag., 2 Taf.

C. Bergonzini beschreibt die Mitosen in den La Valette'schen Follikelzellen der Samencanälchen von *Rana esculenta* und glaubt, dass dieselben die übrigen zelligen Generationen des Samencanälchens aus sich hervorgehen lassen, also wohl die Rolle von Spermatogonien spielen. Atti Soc. Nat. Modena, Mem. (3) Bd. 7 pag. 62—68, 5 Figg.

A. Looss, der die Degenerationerscheinungen im Froschlarvenschwanz [vergl. Ber. f. 1887 pag. 241] bei der Verwandlung der Larven studierte, fand, dass bei der Auflösung der Gewebe die Leucocyten, wenn überhaupt, eine viel weniger active und aggressive Rolle spielen als bei den wirbellosen Thieren. Die Degeneration erfolgt durch einen selbständigen Zerfall der Gewebe, der Schwanz wird infolge mangelhafter Ernährung atrophisch, seine Bestandtheile lösen sich auf und gehen in die Körperflüssigkeit über. Tagebl. 61. Vers. D. Naturf. u. Aerzte Köln 1888 pag. 50—54.

W. Roux's künstliche Hervorbringung halber Embryonen durch Zerstörung einer der beiden ersten Furchungskugeln, sowie seine Beobachtungen über Nachentwicklung (Postregeneration) der fehlenden Körperhälfte stützen sich auf Versuche am Froschei. Arch. Path. Anat. Bd. 114 pag. 113—154 und pag. 246 bis 291, Taf. 2—3. — Ref. in 66. Jahr. Ber. Schles. Ges. Nat. Cult. Breslau 1888, pag. 267.

L. Griffini hat nach theilweiser Exstirpation des Hodens beim Frosche die Regeneration des Drüsenparenchyms und die Neubildung von Spermatogonien beobachtet. Arch. Sc. Mediche Bd. 11 (1887) pag. 367—384, 1 Taf.

Biologisches. Mittheilungen über die Entwicklung albiner Larven von *Rana temporaria* und über Albinismus überhaupt macht H. Fischer-Sigwart. Die Augen der Larven waren schwarz; die jungen Frösche, die sich daraus entwickelten, zeigten sich nicht albin, sondern nur etwas heller gefärbt als normale Stücke. Albinismus tritt nach dem Verf. besonders dann auf, wenn in ihrer Individuenzahl stark reducierte Arten plötzlich wieder für sie günstige Lebensbedingungen erhalten. Arch. Sc. Phys. Nat. Genève (3) Bd. 20 pag. 350 bis 352 und Verh. 71. Jahr.-Vers. Schweiz. Nat. Ges. Solothurn 1888 pag. 59—61.

Palaeontologisches. A. Nehring nennt aus dem Quartär von Thiede bei Braunschweig Reste von *Rana temporaria* häufig, vielleicht auch *R. arvalis*, *Bufo* sp. ziemlich häufig und *Pelobates fuscus* selten. N. Jahrb. f. Min. 1889 I pag. 81.

Systematisches. In einer Notiz über die Classification der Anuren nimmt F. Lataste Blanchard gegenüber das Verdienst in Anspruch, dass er nicht nur zuerst auf die verschiedene Lage der Athemröhre bei den Anurenlarven hingewiesen, sondern dass er auch die Bedeutung dieser Entdeckung für die Systematik betont habe. Dass die Laevogyriden mit lateralem Spiraculum procoele und rippenlose, die Mediogyriden opisthocoele und vom zweiten bis vierten rippentragende Wirbel besitzen, war ebenfalls schon 1878 vom Verf. vor Blanchard nachgewiesen worden. Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 236—240. — R. Blanchard giebt alles dies gerne zu. Ebenda pag. 358—359. — Eine

weitere Replik F. Lataste's darauf ist polemischer Natur. Ebenda pag. 540 bis 542.

Betr. der Verwandtschaft der Fam. Pelobatidae und Discoglossidae vergl. auch G. B. Howes oben pag. 256.

In historischer wie in synonymischer Beziehung beachtenswerth ist S. Garman's Arbeit über die Batrachier in Kalm's „Resa til Norra America“. Die einzigen Frösche, die mit einiger Wahrscheinlichkeit identificiert werden können, sind *Rana catesbyana* Shaw (= *boans* Kalm, non L.) und *R. pipiens* Schreb. (= *halecina* aut.). Bull. Essex Instit. Bd. 20. 11 pag.

Ranidae. Skelettsystem. Bei einer *Rana esculenta* L. fand K. M. Heller nur 9 Rückenwirbel; es handelte sich um eine Synostose des achten Wirbels mit dem Sacrale, was eingehend beschrieben wird. Zool. Garten 29. Jahrg. pag. 181.

Biologisches. H. Fischer-Sigwart widerlegt die Ansicht, dass *Rana temporaria* im Hochgebirge nahezu ihre ganze Lebenszeit im Wasser verbringe. Dass sie dort in späterer Jahreszeit laiche, und dass sich auch die Entwicklung verzögere, sei natürlich, und wird direct nachgewiesen; aber nach der Entwicklung verlasse auch der Bergfrosch, wie die Form der Ebene, das Wasser, wenn auch sein späteres Sommerleben naturgemäss kürzer ausfalle. Ausgewachsene Larven fand Verf. in 2231 m Höhe noch am 2. September. Weitere Daten über Entwicklung und Verwandlung im Terrarium sind angeschlossen. Humboldt 7. Jahrg. pag. 426—427.

Ueber die Nahrung von *Rana esculenta perezii* Seoane auf S. Miguel, Azoren, berichtet J. de Guerne pag. 24—27. Die vom Ref. beschriebenen Riesenlarven aus dem See von Sete Citades [s. Ber. f. 1887 pag. 169] erklärt Verf. nicht für aus Nahrungsmangel entstanden, sondern aus Mangel an Wasser- und Ellenbogenraum. *Rana esculenta* wird pag. 37 auch vom Krater von Fayal angegeben. Campagnes Scientif. du Yacht Monégasque L'Hirondelle 1887: Excursions Zool. dans les Iles de Fayal et de S. Miguel, Açores. Paris, Gauthier-Villars et Fils 1888. 111 pag.

Levi-Morenos fand, dass die Larven von *Rana esculenta* L. am besten das Plasma von Diatomeen verdauen, am schlechtesten aber die grünen, von Cellulosemembran umgebenen Algen. Rendic. R. Accad. Lincei Bd. 4, Fasc. 8, 2. Sem. und Veneto Agricolo (1889) No. 1/2.

Mittheilungen über die Ueberwinterung von *Rana temporaria* und *esculenta* im Freien macht Ch. Mailles. Er kommt zu dem Schlusse, dass nur die erwachsenen Frösche im Wasser und Schlamm überwintern, dass dagegen die Jungen im Winter geschütztere Zufluchtsorte in Erdlöchern, unter Moos und Steinen aufsuchen. Bull. Soc. Zool. France Bd. 13 pag. 231—233.

Faunistisches. Nach G. Entz soll *Rana temporaria* L. var. *platyrrhinus* Steenstr. am Zenoga-See im Retezat-Gebirge, Siebenbürgen, vorkommen [, was L. v. Méhely, Zool. Anzeiger, 13. Jahrg. pag. 447 bestreitet]. Orv. term. tud. Értésitő Klausenburg 13. Jahrg. pag. 51 und Rev. Siebenbürg. Mus. - Ver. Klausenburg Bd. 10 pag. 134.

Nach L. Picaglia fehlt *Rana latastei* Blgr. im Modenesischen; *R. agilis* Tho. lebt hauptsächlich im Tiefland, *R. temporaria* im Gebirge des Modenese. Um Modena selbst kommen beide vor, aber *R. agilis* ist häufiger. Atti Soc. Nat. Modena, Mem. (3) Bd. 7 pag. 220.

Systematisches. G. A. Boulenger macht Mittheilungen über die Classification der Raniden. Auch heute ist nach dem Verf. eine Theilung der Gattung *Rana* in *Raninae* und *Polypedatinae* unmöglich. Peters' Charakter einer kleinen überzähligen Phalanx zwischen letztem und vorletztem Fingerglied in allen Fingern und Zehen bei *Rhacophorus* ist dagegen constant. Infolgedessen müssen auch *Hyla bürgeri* Schlg. und *Theloderma leprosum* Tsch., trotz ihrer freien Finger, zu *Rhacophorus* gestellt werden. Auch *Cassina* hat die überzählige Phalanx wie *Hylambates*. Die Gattung *Ixalus* ist unnatürlich; ein Theil der Arten nur hat normale Phalangenzahlen. Verf. theilt danach die Raniden in zwei Gruppen:

a. mit überzähliger Phalanx in allen Fingern und Zehen, enthaltend die Gattungen *Cassina* Gir., *Hylambates* A. Dum., *Rappia* Gthr., *Megalixalus* Gthr., *Rhacophorus* Kuhl., *Chiromantis* Pts., *Ixalus* Tsch. und *Nyctixalus* Blgr.

b. mit normaler Phalangenzahl: alle übrigen Ranidengattungen.

Auch *Phyllobates* Bibr. gehört nach des Verf.'s Untersuchung zu den Raniden, steht zwischen *Hylaxalus* Esp. und *Prostherapis* Cope und unterscheidet sich von ersterer Gattung durch freie Zehen, von letzterer durch den Zungeneinschnitt. Hierher *Ph. bicolor* Bibr., *limbatus* Cope, *melanorhinus* Berth., *trinitatis* Garm. und *trilineatus* Blgr. Proc. Zool. Soc. London pag. 204—206, 2 Figg.

K. M. Heller macht auf die Variationsbreite in Länge der Hinterextremität, Zuspitzung der Schnauze und Färbung und namentlich auf die 3/4-Schwimnhaut des ♂ von *Rana arvalis* Nilss. in der Brunstzeit aufmerksam, die überdies abweichend von *R. temporaria* lappig erweitert erscheint. Die Copulationsbürste ist schwarz. Die Laichzeit beider Arten fiel 1888 bei Braunschweig zusammen. Zool. Garten 29. Jahrg. pag. 177—181, Fig.

Verschiedene Notizen über deutsche Stücke von *Rana agilis* Tho. gibt Fr. Leydig. Ver. Phys.-med. Ges. Würzburg N. F. Bd. 22 pag. 191.

Notizen über griechische und kleinasiatische Stücke der *Rana esculenta* L. var. *ridibunda* Pall. giebt O. Boettger. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Berlin 1888 pag. 145.

Mittheilungen über transkaspische Stücke derselben Art bringt derselbe pag. 953 und A. Walter pag. 973. Zool. Jahrb., Abth. f. Syst. Bd. 3.

G. A. Boulenger gibt einen Schlüssel für die 4 bei Darjiling vorkommenden, einander nahe verwandten Arten *Rana livida* Blyth, *latopalmata* Blgr., *himalayana* Blgr. und *formosa* Gthr. und beschreibt 2 neue *Rana* aus Indien. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 506—508.

A. Dugès gibt Beschreibungen von *Rana halecina* Kalm und *R. montezumae* Baird. Naturaleza Mexicana (2) Bd. 1 pag. 136—137.

Hylarana malabarica Stchr. = *Rana guentheri* Blgr.; Boettger, 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. 1888 pag. 95.

Hyperolius fimbriolatus B. Pts. = *Rappia*; gute Art; Boettger, Ber. Senckenberg. Nat. Ges. 1888 pag. 98.

Ixalus granulatus n. sp. [fälschlich von] Siam [= *natator* Gthr. Borneo; Ref.]; Boettger 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. pag. 57.

Micrixalus n. gen. verschieden von *Ixalus* durch normale Anzahl der Phalangen an allen Fingern und Zehen. S. Indien und Ceylon. — Mit M.

opisthorodus Gthr., *sylvaticus* Blgr., *fuscus* Blgr., *saxicola* Jerd. und *sarasinorum* F. Müll.; Boulenger, Proc. Zool. Soc. London pag. 205.

Rana halecina aut. = *virescens* Kalm; Cope, Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11 pag. 396. — *R. himalayana* n. sp. zwischen *latopalmata* Blgr. und *formosa* Gthr. Darjiling. pag. 507. — *R. leithi* n. sp. verwandt *beddomei* Gthr. Matheran, Bombay. pag. 506; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2. — *R. macroscelis* n. sp. verwandt *guppyi*. Sogere, inneres Neu Guinea; Boulenger, l. c. Bd. 1 pag. 345. — *R. trivittata* Hall. = *macrodactyla* Gthr.: Boettger, 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. pag. 93.

Rappia sordida n. sp. verwandt *marmorata* Gthr. und *cinctiventris* Cope. Kamerun; J. G. Fischer, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 10.

Rhacophorus albilabris n. sp. O. Imerina, Madagascar; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 105, Taf. 6, Fig. 1. — *Rh. cruciger* Blyth. gute Art neben *maculatus* Gray; H. Nevill, Taprobanian Bd. 3 pag. 6. — *Rh. opisthodon* n. sp. Madagascar; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 105.

Tomopterna porosa Cope = *Rana esculenta japonica* Blgr.; Boettger, 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. pag. 93.

Dendrobatiidae. Biologisches. Notizen über die Brutpflege von *Dendrobates* nach Cope & H. S. Smith [vergl. Ber. f. 1887 pag. 246], Wilder und Kappler [vergl. Ber. f. 1885 pag. 309] bringt G. A. Boulenger. Die Thatsache ist bereits 1857 von Wyman in Surinam beobachtet und auch publiciert worden. Das Geschlecht des Thieres, welches die Larven trägt, ist noch unaufgeklärt. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 454–455 und Bd. 2 pag. 122–123.

Systematisches. *Mantella baroni* n. sp. verwandt *betsileo*. Madagascar; Boulenger, l. c. Bd. 1 pag. 106, Taf. 6, Fig. 2.

Engystomatidae. Biologisches. G. B. Howes beschreibt eingehend die Art und Weise der Befestigung der Bruttasche von *Rhinoderma darwini* und der Lage der Embryonen in derselben. Zu diesem Zwecke ist der Kehlsack des ♂ modificiert und nimmt schliesslich den Raum der ganzen Bauchfläche ein. Verf. bestreitet schliesslich die Ansicht Espada's, dass die Ernährungsfunctionen des Nährvaters während der Entwicklung der Embryonen in irgend einer Weise gestört seien. Proc. Zool. Soc. London pag. 231–237, 5 Figg.

Systematisches. E. D. Cope gibt einen Schlüssel für die Unterscheidung der drei ihm bekannten *Hypopachus*-Formen. Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11 pag. 395.

Callulops n. gen. zwischen *Callula* und *Xenobatrachus*, von ersterer Gattung abweichend durch das deutliche Trommelfell, durch eine einzige quere Hautfalte am Gaumen und durch einfache distale Phalangen, von letzterer durch oblonge, hinten nicht eingeschnittene Zunge und durch das Fehlen besonders grosser Zähne auf den Gaumenbeinen. — Mit *C. doriae* n. sp. Milne-Golf, Neu Guinea; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 345.

Engystoma leucostictum n. sp. Sta. Catharina, Brasilien; Boulenger, l. c., pag. 416.

Hypopachus cuneus n. sp. San Diego, Texas [nach Boulenger = *oxyrhynchus* Blgr.]; Cope, Proc. U. S. Nat. Mus. Bd. 11 pag. 395.

Dyscophidae. Systematisches. *Platypelis pollicaris* n. sp. Madagascar; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 106, Taf. 6, Fig. 3.

Cystignathidae. Faunistisches. A. Günther nennt *Hylodes martiniensis* Tsch. auch von S. Domingo, St. Vincent, Dominica und Barbadoes. Ebenda Bd. 2 pag. 366.

Systematisches. Nach G. A. Boulenger existiert wahrscheinlich eine Gruppe der Cystignathiden, die Cope's Definition von *Phyllobates* entspricht. Es sind *Hylodes* ohne Vomerzähne, die den Namen *Syrrhopus* Cope führen müssen und die Cope'schen Gattungen *Malachylodes* und *Hypodictyon* einschliessen. Hierher *Syrr. marnocki*, *leprus*, *cystignathoides*, *verrucipes*, *guttulatus*, *hyliiformis* und *ridens* Cope und *chalceus* und *verruculatus* Pts. Proc. Zool. Soc. London, pag. 206.

Crinia victoriana n. sp. Warragul, Gippsland (Victoria); Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 142.

Hylodes guentheri Stöckr. = *gollmeri* Pts.; Boulenger, l. c., Bd. 1 pag. 416. — *H. plicifera* n. sp. und *H. ramagei* n. sp. Iguarasse, Prov. Pernambuco; Boulenger, l. c., Bd. 2 pag. 41.

Leptodactylus glandulosus Cope = *diptyx* Bttg. pag. 187. — *L. prognathus* n. sp. verwandt *typhonius* Daud. Rio Grande do Sul, Brasilien. pag. 187; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1.

Limnodynastes fletcheri n. sp. verwandt *tasmaniensis* und *platycephalus*. Guntawang bei Mudgee, N.-S.-Wales; Boulenger, l. c., Bd. 2 pag. 142.

Phyllobates Bibr. s. oben unter Ranidae pag. 260.

Bufoidea. Biologisches. Héron-Royer beschreibt die Stellung des ♂ von *Bufo viridis* bei der Begattung und bespricht eingehend die Lageveränderungen, welchen die Eier dieser Art in den Eischnüren im Verlaufe der Entwicklung der Embryonen unterworfen sind, Thatsachen, welche theilweise schon vorher veröffentlicht worden sind. Verf. vergleicht weiter die Unterschiede der Eischnüre der drei mitteleuropäischen *Bufo*-Arten. Bull. Soc. Zool. France Bd. 13 pag. 26—31, 4 Figg. und pag. 84.

Die Begattung von *Bufo intermedius* Gthr. aus Guanajuato, Mexico, ist nach A. Dugès und Héron-Royer analog der unseres *B. vulgaris*, das Gift von *B. marinus* wirkt auch noch nach Jahren, innerlich gegeben, tödlich auf Reptilien. Ebenda pag. 73—74.

Ueber Schädlichkeit von *B. vulgaris* in Fischteichen berichtet K. Knauthe. Jahr.-Ber. 1884/88 Ges. Fr. Naturw. Gera pag. 231—232.

Faunistisches. Nach M. Ramos Medina fand sich auf einer Excursion nach Tomares und S. Juan de Aznalfarache in der Umgegend von Sevilla *Bufo calamita* Laur. Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. Bd. 17, Actas pag. 122.

R. Blanchard will *Bufo viridis* Laur. zum ersten Mal für Frankreich bei Bourget, Dép. Hts. Alpes, an der Gränze Piemonts in 1900 m nachgewiesen haben. Weiter erwähnt er die Art von Belgrad und Ravanitzta nächst Tschupria in Serbien. Bull. Soc. Zool. France Bd. 13 pag. 66—67. — Bemerkungen über Funde von *Bufo viridis* in Frankreich macht F. Lataste. Bull. Assoc. Franç. Adv. Sc. Congrès d'Oran d. 30. mars 1888.

Ueber Vorkommen von *Bufo calamita* in Cheshire und Lancashire macht L. Greening Mittheilungen. The Naturalist (Yorkshire) 1888 pag. 357.

Systematisches. Einen Beitrag zur Diagnose von *Bufo calamita* und *viridis*, wesentlich sich stützend auf die relative Länge von Fingern und Zehen, bringt J. v. Bedriaga. Nur der portugiesische *Bufo calamita* biete kleinere,

der algerische *viridis* grössere Abweichungen betreffs der Zehenlänge von der Regel. Bull. Soc. Zool. France Bd. 13 pag. 220—222.

Ueber transkaspische Exemplare von *Bufo viridis* Laur. macht A. Walter eingehende Mittheilungen. Zool. Jahrb., Abth. f. Syst. Bd. 3 pag. 983.

A. Dugès giebt Beschreibung von *Bufo compactilis* Wgm. pag. 139 und Notizen zu *Rhinophrymus dorsalis* D. B. pag. 156. Naturaleza Mexicana (2) Bd. 1.

G. A. Boulenger bringt einen Schlüssel zur Bestimmung der 4 bis jetzt bekannten Arten der Gattung *Eupemphix* Stöchr. (*Eu. nattereri* Stdr., *nana* Blgr., *pustulosa* Cope und *stenor* Esp.). Er bemerkt, dass *Eupemphix* in allen Punkten mit Ausnahme des Mangels der Zähne mit *Paludicola* übereinstimme und sich zu dieser Cystignathidengattung verhalte, wie *Pseudophryne* zu *Crinia*. Diese Thatsache zeige, dass auf die Anwesenheit oder das Fehlen von Vomerzähnen basierte Froschfamilien künstliche Gruppierungen seien. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 188.

Bufo aduncus n. sp. Texas; Cope, Bull. U. S. Nat. Mus. Bd. 11 pag. 317—318. — *B. griseus* Hall. = *melanostictus* Schnd.; Boettger, 26./28 Ber. Offenbach. Ver. Nat. pag. 99. — *B. speciosus* Gir. gute Art neben *compactilis* Wgm.; Garman, Bull. Essex Instit. Bd. 19 pag. 136.

Eupemphix nana n. sp. Lages, Prov. Sta. Catharina; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 187.

Rhinophrymus dorsalis D. B. abgeb.; Dugès, Naturaleza Mexicana (2) Bd. 1, Taf. 15.

Hylidae. Biologisches. G. A. Boulenger fand bei *Nototrema fissipes* Blgr. ♀ die Rückentasche gefüllt mit 16 sehr grossen, 10 mm im Durchmesser zeigenden Eiern; die Jungen vollenden also höchstwahrscheinlich wie bei *N. oviferum* die ganze Metamorphose innerhalb der Bruttasche. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 2 pag. 42, Taf. 3.

Faunistisches. Ueber die Entdeckung eines *Nototrema* in Brasilien östlich und weit entfernt von den Anden vergl. auch denselben in Proc. Zool. Soc. London pag. 219.

Systematisches. Bemerkungen zu *Hyla ovata* Cope macht J. G. Fischer. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. Bd. 5 pag. 44.

Hyla bivittata n. sp. Lages, Prov. Sta. Catharina. pag. 188. — *H. catharinae* n. sp. Sta. Catharina. pag. 417; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1. — *H. chinensis* Gthr. var. *immaculata* n. Shanghai [gehört nach neuerer Untersuchung weiterer Exemplare als gute Var. zu *arborea* L.; Ref.]; Boettger, Ber. Senckenberg. Nat. Ges. pag. 189. — *H. copei* Blgr. = *arenicolor* Cope; Cope, Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 80 = gute Art; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 189.

Nototrema fissipes n. sp. Iguarasse, Prov. Pernambuco; Boulenger, l. c., Bd. 2 pag. 42, Taf. 3.

Pelobatidae. Skelettsystem. Ueber die osteologischen Merkmale des Schädels der verschiedenen europäischen *Pelobates*-Formen vergl. Héron-Royer in Bull. Soc. Zool. France Bd. 13 pag. 85—91, 10 Figg.

Respirationsorgane. Betr. Fr. E. Schulze's Untersuchungen über das Epithel der Lippen, der Mund-, Rachen- und Kiemenhöhlen erwachsener Larven von *Pelobates fuscus* s. oben pag. 255.

Biologisches. C. W. Hargitt bringt eine Notiz über das plötzliche Erscheinen von *Scaphiopus holbrooki* in Anzahl bei heftigem Regen nächst

Marthas Vineyard, Indiana, seinen Ruf, den späten Act seines Laichens in der ersten Angusthälfte und seine grabende und nächtliche Lebensweise. Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 95 und 535—537.

Faunistisches. Ueber Knoblauchskröten aus Ungarn vergl. A. Nehring. Corr.-Blatt. Ges. f. Anthropol. 18. Jahrg. (1887) No. 6.

C. Hennig's Bemerkungen zu dem Funde von *Pelobates* bei Cröbern sind mir ebenfalls nicht zugänglich gewesen. Ebenda 19. Jahrg. pag. 9—10.

H. Gadeau de Kerville hat *Pelodytes punctatus* Daud. im Dép. Seine-Inférieure nachgewiesen. Bull. Soc. Amis Sc. Nat. Rouen 1888, 2e. sér.

Systematisches. Betreffe weiterer Gründe für die Trennung der Pelobatiden von den Discoglossiden vergl. oben G. B. Howes pag. 256.

In einer Berichtigung hebt Héron-Royer hervor, dass der Metatarsaltuberkel bei *Pelobates fuscus* grade so kräftig ist als bei seinem *P. latifrons*, und giebt eine tabellarische Zusammenstellung der Hauptunterschiede beider Formen. Bull. Soc. Zool. France Bd. 13 pag. 108—110. — G. A. Boulenger weist nach, dass die Form des *Pelobates* von Turin (*latifrons* Hér.-Roy.) dem typischen *fuscus* von Berlin entspricht, und dass, wenn für die französische Form ein Name nöthig wäre, derselbe *minor* J. Müll. heissen müsste. Doch seien alle diese Unterschiede nicht spezifischer Natur. Uebrigens sei die Breite der Frontoparietalen in der That im Verhältniss zur Breite des Schädels bei den Stücken aus Deutschland und Oberitalien grösser als bei denen aus Frankreich und aus dem Elsass. Ebenda pag. 115—116. — Darauf entgegnet Héron-Royer, dass er den *Pelobates* von Berlin nicht als zu seinem *latifrons* gehörig betrachten könne, und dass er den *latifrons* auch nach gewissen Unterschieden in den Weichtheilen und im Bau der Larve aufrecht erhalten müsse. Ebenda pag. 117—121. — G. A. Boulenger macht dagegen geltend, dass auch die relative Länge von Testikel und Niere bei *Pelobates* ebenso wechselnd sei, wie die Entfernung der Nasenöffnungen von einander und wie die Bauchfärbung. Ebenda pag. 163. — Auch M. G. Peracca verwirft nach eingehendem Vergleich der äusseren und der Skelettcharaktere den *Pelobates latifrons* als Species. Bull. Mus. Zool. Anat. comp. Torino Bd. 3, No. 46. 6 pag. — Dagegen hält Ch. Mailles den *Pelobates* von Turin für verschieden von dem *fuscus* Frankreichs und Deutschlands. Bull. Soc. Zool. France Bd. 13 pag. 165. — W. Wolterstorff sucht nachzuweisen, dass in den Charakteren der Wirbelsäule, in den Maassverhältnissen des Vomers, der Frontonasalen und der Frontoparietalen allerdings Unterschiede zwischen dem Turiner und dem nordfranzösisch-norddeutschen *Pelobates* bestehen, die zur Abtrennung der norditalischen Form als Varietät berechtigten. *P. fuscus* typ. besitze durchschnittlich schmäleres Schädeldach, breitere Wirbelsäule, var. *insubrica* Corn. umgekehrt. Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 672—679.

Pelobates latifrons n. sp. verwandt *fuscus*. Turin; Héron-Royer, Bull. Soc. Zool. France Bd. 13 pag. 85, Fig. und pag. 108—110 = *fuscus* var. *insubrica* Corn.; Boulenger bei Wolterstorff, Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 678.

Discoglossidae. Respirationsorgane. J. W. Spengel bemerkt, dass zuerst Goette 1885 die mediane Lage des Spiraculum bei der Larve von *Bombinator* entdeckt habe, und dass dem medianen Spiraculum ein medianer After, dem linksgerichteten Spiraculum aber ein rechtsgelegener After ent-

spreche. Ebenda pag. 338—339. — Kritik dieser Notiz von F. Lataste vergl. ebenda pag. 427—428, der die Richtigkeit der von Goette aufgestellten Correlation zwischen der Lage des unpaaren Kiemenlochs und der Stellung des Hautafters mit Boulenger bestreitet.

Biologisches. Héron-Royer hat Versuche über die Uebertragung von Färbung und Zeichnung bei *Discoglossus* und *Alytes* angestellt und gefunden, dass die grössere Zahl der Jungen die Tracht der Mutter annahm, dass die weiblichen Charactere sich also leichter vererben als die männlichen. Bull. Soc. Zool. France Bd. 13 pag. 205—206.

Faunistisches. In einer Notiz über Synonymie und geographische Verbreitung der beiden europäischen *Bombinator*-Arten führt G. A. Boulenger den Nachweis, dass *Rana bombina* L. nicht die Art mit pomeranzgelbem Bauch ist, welche in Schweden fehlt, sondern dass die Linné'sche Art mit *B. igneus* Laur. zusammenfällt. Die Art mit pomeranzgelbem Bauch muss daher *B. pachypus* Bonap. heissen. *B. igneus* Laur. mit orangerothem Bauch ist eine östliche Species und geht von Schweden und Dänemark bis Ungarn, Moskau und Charkow. Verf. gibt eingehende Synonymie beider Arten. Ebenda, pag. 173—176.

Nach J. v. Bedriaga kommt die algerische Form von *Discoglossus (auritus* Hér.-Roy.) auch in ganz Südspanien vor, während in Galicia, Nordwest-Spanien, nur die typische Form anzutreffen sei. Auch habe er dieselben Färbungsunterschiede bei den Larven beider Formen beobachtet wie Héron-Royer. Ebenda pag. 220.

Systematisches. Betr. weiterer Gründe für die Trennung der *Discoglossiden* von den *Pelobatiden* vergl. oben G. B. Howes pag. 256.

Discoglossus auritus n. sp. verwandt *pictus* [= *pictus* Otth var. Ref.] für die algerische Form; Héron-Royer, Bull. Soc. Zool. France Bd. 13 pag. 205 und 220.

Caudata.

Sinnesorgane. Ueber die Organe eines sechsten Sinnes [vergl. auch Ber. f. 1887 pag. 250] bei den Caudaten macht P. Mitrophanow eingehende Mittheilungen. Es sind die Fr. E. Schulze'schen Nervenbügel. Die erste sich deutlicher manifestierende einheitliche Angabe für diese „Sinnesorgane“ fand Verf. zu beiden Seiten des Kopfes dorsalwärts von der Anlage der Kiemenbogen in Form länglicher, in spitze Ausläufer sich fortsetzender Entodermverdickungen. Bis in diese Verdickung reicht eine Fortsetzung des embryonalen Nervenrohrs als Anlage des Nervus lateralis. Durch Aussendung von Fortsätzen aus dieser primären Anlage, sowie durch Theilung und Sonderung dieser Fortsätze in kleinere Gruppen entstehen allmählich die Reihen der gesonderten Nervenbügel am Kopf und in der Seitenlinie. Ueber die Organe einer sechsten Sinnesthätigkeit bei Amphibien. Eine histogenetische Studie. Warschauer Univ.-Nachr. Warschau 1888, 8°. 80 pag., 3 Taf. (russ.).

Salamandridae. a. Salamandrinae. Integumentalgebilde. In seiner Arbeit über den Schichtenbau von *Amphioxus* bemerkt B. Hatschek, dass

die Cutis der Salamanderlarven ebenfalls mit einem Gränzepithel versehen sei. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 662—667, 4 Figg.

O. Schultze beobachtete an *Molge*-Larven, dass unter dem Einfluss des Hungers die Kerne der Epithelien des Schwanzflossensaums eingeschnürt und gelappt werden, und dass die färbbare Substanz der Kerne stark an Masse abnimmt. Sitz.-Ber. Phys.-med. Ges. Würzburg v. 17. Nov. 1888. 7 pag.

Verdauungsorgane. Ueber regressive Metamorphosen des Zellkerns in den einzelligen Drüsen des Mundepithels von Salamanderlarven macht F. Hermann Mittheilungen. Anat. Anzeiger 3. Jahrg. pag. 59—61.

S. M. Lukjanow fand in der Magenschleimhaut von *Salamandra maculosa* Kernkörperchen von eigenthümlicher Kolbenform, nennt sie Nucleoli claviformes und betrachtet sie als Elemente sui generis. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 32 pag. 474—478, Taf. 19. — Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. London, 1890, pag. 36.

Mittheilungen über die Becherzellen im Dünndarmepithel von *Salamandra maculosa* macht J. Steinhaus. Dieselben sind weder ausschliesslich schleimig degenerierte Epithelzellen, noch ausschliesslich in einzellige Schleimdrüsen verwandelte Zellen. Sie sind z. Th. das eine, z. Th. das andere, denn, ist kein zweiter Kern in der Zelle vorhanden, so degeneriert die Zelle vollständig, ist ein solcher vorhanden, so fungiert die Zelle wie eine Drüse; nach der Secretion kann sie dank der Anwesenheit eines zweiten Kernes sich regenerieren und wieder zum secernierenden Becher werden. Jede Cylinderzelle des Darmes kann sich in eine Becherzelle umwandeln, doch sind Ursachen und Bedingungen dieser Becherbildung noch nicht genügend klargestellt. Nur so viel lässt sich sagen, dass je energischer die physiologischen Processe im Darm vor sich gehen, desto grösser die Anzahl der Becher ist. Arch. f. Anat. u. Phys., Phys. Abth. 1888 pag. 311—322, Taf. 6—8. — Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. London, pag. 712.

Derselbe macht weitere Mittheilungen über die Metamorphosen und über die „indirecte Knospung“ der Kerne im Darmepithel von *Salamandra maculosa*. Die durch die indirecte Knospung entstehenden Kerne ersetzen die alten Zellkerne, welche während ihrer Entwicklung zu Grunde gehen. Arch. de Physiol. (4) Bd. 2 pag. 60—78, 2 Taf.

Eine eingehende histiologische Untersuchung der secernierenden Zellen der Dünndarmschleimhaut bei *Molge* hat auch J. Paneth angestellt. Nach ihm gehen die Becherzellen im Dünndarm aus gewöhnlichen Epithelzellen hervor, und nach Entleerung ihres Secrets wird aus der Becherzelle wieder eine Epithelzelle. Weitere Beobachtungen des Verf.'s beziehen sich auf die sogen. Bourrelets bei *Molge* im Hungerstadium. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 31 pag. 113 bis 191, 3 Taf. — Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. London pag. 556.

Respirationsorgane. Fr. Legge fand in der Lunge von *Molge cristata*, dass die Epithelzellen im August einen Vermehrungsprozess erleiden. Diese Vermehrung geschieht manchmal durch directe Theilung, noch öfter aber erleidet das Kernnetz vor der Segmentierung eine Ausziehung, oder wird auch durch das Erscheinen einer Art von rudimentärer achromatischer Spindel ersetzt. Verf. glaubt daraus schliessen zu dürfen, dass zwischen der directen und der indirecten Theilung Uebergangsformen bestehen. Est. Bull. R. Accad. Med. Roma Jahrg. 13 (1886/87) Heft 4.

Circulationsorgane. L. Török hat an Blut und Milz von *Salamandra* und ihrer Larve Untersuchungen über die Theilung der rothen Blutzellen angestellt. Die rothe Blutzelle nimmt während der Kerntheilung eine mehr rundliche Form an, welche im Laufe des Diasterstadiums einer mehr oblongen weicht. In der letzteren Phase beginnt auch die Theilung der Zellsubstanz und kommt auch gewöhnlich noch während derselben zu Ende. Der Theilungsprocess der Zellsubstanz geht also ziemlich rasch, rascher als bei sonstigen Zellen, von statten. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 32 pag. 603–612, Taf. 23. — Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. London 1889 pag. 191–192.

Mittheilungen über pathologischen Bau des Kerns der Blutzellen von *Salamandra* und ihrer Larve hat auch W. Pfitzner gemacht. Virchow's Arch. f. Path. u. Hist. Anat. Bd. 103 (1886) pag. 275–300, 1 Taf. -- Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. London pag. 391–392.

Urogenitalsystem. Eine weitere Notiz über ein feines Häkchen am Kopfe des Spermatozoon von *Molge* bringt Dowdeswell. Journ. Roy. Micr. Soc. London 1888 pag. 1065–1066.

Ontogenie. Kurze vorläufige Mittheilungen über Vorgänge bei der Spermatogenese des Salamanders macht F. Hermann. Sitz.-Ber. Phys.-med. Ges. Erlangen 1888 pag. 47–48.

Biologisches. In einer Notiz über die Befruchtung bei den Tritonen theilt J. Chalande seine Beobachtungen an *Molge palmata* mit. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse Bd. 21 pag. 12–14.

Kirchhoff berichtet über eine Larve von *Salamandra maculosa*, welche er seit einem Jahre künstlich verhindert hatte, ans Land zu gehen. Kiemen, Larvenform und Larvenfärbung waren noch erhalten. Zeitschr. f. Naturw. (Halle) Bd. 61 pag. 645.

Nach G. Riehm waren in Gefangenschaft geborene Larven von *Salamandra* dreimal grösser (32–35 mm) als in der Freiheit geborene. Ebenda pag. 641.

Joh. v. Fischer beobachtete, dass im September alle seine *Pleurodeles waltii* das Wasser freiwillig verliessen und aufs Land gingen. 5 Rippenmolche, die das Wasser nicht verlassen konnten, froren ein, wurden aber sämmtlich durch vorsichtiges Aufthauen vom Tode gerettet. Humboldt 7. Jahrg. pag. 138 bis 139.

Palaeontologisches. K. Zittel beschreibt eine neue Gattung *Megalotriton (filholi* n.) aus dem Oligocaen von Quercy, Frankreich, nach Wirbeln, Oberarm und Oberschenkel. Handb. d. Palaeont. I. Abth. Bd. 3 pag. 420, Fig. 410.

Faunistisches. Eine Notiz über die Molche der Umgehung von Warrington, England bringt L. Greening. The Naturalist (Yorkshire) 1888 pag. 243.

Notizen über locale Abweichungen in Grösse, Färbung und Kammform bei süd- und norddeutschen *Molge palmata* bringt Fr. Leydig. Verh. Phys.-med. Ges. Würzburg N. F. Bd. 22 pag. 200–201.

Bemerkungen über *Molge sinensis* Gray macht O. Boettger. 26./28. Ber. Offenbach. Ver. Nat. 1888 pag. 100.

Systematisches. G. A. Boulenger hält *Diemyctylus miniatus* Raf. subsp. *meridionalis* Cope von San Diego, Texas, für gute Art und vergleicht sie unter dem Namen *Molge meridionalis* Cope eingehend mit *M. viridescens*. Die drei Temporalgruben der amerikanischen *Molge*-Arten kommen allein dem ♂ zu;

es sind Oeffnungen secretabscheidender Drüsen von unbekannter Bedeutung. Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 24.

Molge 1820 und *Triton* 1768, non L. 1748 = *Triturus* Raf. 1819; Baur, Beitr. z. Morphogenie d. Carpus u. Tarsus I. Jena, G. Fischer. pag. 49.

b. *Amblystomatinae*. Skelettsystem. H. Orr beschreibt das Knorpelskelett des Kopfes von jungen Larven von *Amblystoma*. Qu. Journ. Micr. Sc. (2) Bd. 29 pag. 295 ff.

Respirationsorgane. F. R. M. Hitchcock macht eine Mittheilung über die sogen. Balancierorgane junger Larven von *Amblystoma punctatum*. Sie sind, wie die Saugfortsätze anderer Caudaten und die Saugscheiben der Anurenlarven, als modifizierte Kiemenreste aufzufassen, die ihre frühere Thätigkeit eingestellt haben. Auch die Reihenfolge des Auftretens anderer äusserer Organe an den ersten Tagen nach dem Ausschlüpfen aus dem Ei wird beschrieben. Trans. New York Acad. Sc. Bd. 7 pag. 255—258. — Ueber den Bau derselben macht auch H. Orr Mittheilungen. Sie sind Aequivalente einer äusseren Kieme und werden von einem Zweige des Unterkiefer-Arterienbogens ernährt. Auch er hält die Saugorgane der Anuren für homologe Bildungen. Qu. Journ. Micr. Sc. (2) Bd. 29 pag. 295 ff.

Ontogenie. In einer Notiz über Segmentierung des Eies und Schicksal des Blastoporus beim Axolotl stellen F. Houssay u. Bataillon fest, dass die Segmentierung des Eies in 2, 4, 8, 24 und 32 Zellen beobachtet werden konnte; weitere Zählung war unmöglich. Der Blastoporus bleibt beim Axolotl immer offen und wird zum definitiven After; ein Canalis neurentericus fehlt. Compt. Rend. Acad. Sc. Paris Bd. 107 pag. 282—284. — Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. London pag. 708.

Weitere Mittheilungen derselben beziehen sich auf die Bildung der Gastrula, des Mesoblasts und der Chorda dorsalis beim Axolotl. Der Urdarm entsteht nicht durch Invagination, sondern durch ein Auseinanderweichen der vegetativen Zellen. Die Verf. stimmen mit Goette darin überein, dass die Notochorda mesoblastischen Ursprungs ist. Ebenda pag. 134—136. — Ref. in Journ. Roy. Micr. Soc. London pag. 707—708.

Faunistisches. E. D. Cope nennt als einzigen Molch der Cascade Mts. von Oregon *Amblystoma macrodactylum*. Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 1000.

Systematisches. Ueber *Amblystoma carolinae* (= *tigrinum* Green) und seine Kiemenform *Siredon edulis* Hern. macht A. Dugès Mittheilungen. Naturaleza Mexicana (2) Bd. 1 pag. 140—143.

Amphiumidae. Allgemeines. Mittheilungen über den japanischen Riesensalamander bringen K. W. Struve und Geerts. Nachr. Ksl. Ges. Fr. Naturw. Moskau Bd. 50, Prot. Zool. Abth. pag. 32—33 und 33—37.

Physiologische Bemerkungen über *Megalobatrachus maximus* Schlg. macht N. F. Bjeletzkij. Arbeit. Naturf.-Ges. Univ. Charkow Bd. 15 pag. 173—206, 1 Taf. (russ.).

Biologisches. O. P. Hay beobachtete *Amphiuma means* L. im Brutgeschäft. Das ♀ lag spiralförmig um die Eier geringelt, welche in zwei rosenkranzähnlichen Strängen angeordnet sind. Während das Ei 9 mm Durchmesser zeigt, hat der noch nicht ausgeschlüpfte Embryo eine Länge von 45 mm. Der Embryo wird eingehend makroskopisch geschildert, und sodann die Ver-

hältnisse von Schädel, Schultergürtel, vorderen Wirbeln und Gehirn der Larve mit denen des jungen Axolotl verglichen. Verf. konnte bei *Amphiuma* eine Stimme beobachten. Die Möglichkeit des Grabens im Schlamm wird durch Einrichtungen an den Kiemen und durch die Form der Schnauze und der Lippen ermöglicht. Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 95 und 315—321, Fig. — Ryder betont die Aehnlichkeit dieser Brutpflege mit der von *Ichthyophis*. Ebenda pag. 182.

Protelidae. Biologisches. Mittheilungen über die Larve von *Proteus anguineus* macht E. Zeller. Die Olme hatten vom 14. bis 16. April 76 Eier gelegt; nach 90 Tagen schlüpften 2 Larven aus, die, in der Entwicklung weiter als andere Caudatenlarven vorgeschritten, anfangs 22 mm in der Länge maassen, wovon nur 5 mm auf den Schwanz kommen. Ihre Gestalt ist der des erwachsenen Thieres schon sehr ähnlich, doch erstreckt sich der Flossensaum über $\frac{3}{4}$ der Rückenlänge nach vorn. Die Kiemenbüschel sind nicht mehr entwickelt als beim erwachsenen Olm. Die Vordergliedmaassen haben schon 3 Zehen, die hinteren sind noch stummelförmig. Angefügt werden Beobachtungen über die späteren Stadien der Entwicklung im Ei von der neunten Woche an. Zool. Anzeiger 11. Jahrg. pag. 570—572. — Ref. in Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 1031 bis 1032.

Faunistisches. J. H. Garnier nennt *Necturus maculatus* Raf. vom Don und St. Clair-See, Canada, und beschreibt eine neue Varietät desselben. Proc. Canad. Inst. Toronto (3) Bd. 5 pag. 218—219.

Systematisches. *Necturus maculatus* Raf. 1819 = *maculosus* Raf. 1818, 1820; Baur, Beiträge z. Morphogenie d. Carpus u. Tarsus I. Jena, G. Fischer. pag. 16, 17 Anm. — *N. maculatus* var. *latastei* n. Maitland River, Canada; Garnier, Proc. Canad. Inst. Toronto (3) Bd. 5 pag. 218—219.

Apoda.

Sinnesorgane. C. B. Greeff. Ueber das Auge von *Siphonops thomensis*. Ein Beitrag zur Kenntniss der Gymnophionen. Inaug.-Diss. Freiburg i. Br. 1888, 8°. 22 pag.

Systematisches. *Siphonops hardyi* n. sp. Porto Real, Prov. Rio Janeiro; Boulenger, Ann. Mag. N. H. (6) Bd. 1 pag. 189.

Stegocephala

(nur fossil).

Skelettsystem. Wegen des Auftretens von Parietallöchern und des Pinealanges bei den alten amerikanischen Batrachiern vergl. oben E. D. Cope, pag. 177.

H. Credner weist pag. 520 nach, dass die mittlere Thoracalplatte gewisser ächter Stegocephalen, z. B. von *Melanerpeton*, ein ähnliches Episternum ist, wie es den palaeozoischen Reptilien *Palaeohatteria* und *Proterosaurus* zu-

kommt, ein Character, der den Urodelen gänzlich fehlt, für die Stegocephalen aber sehr bezeichnend ist. Zeitschr. D. Geol. Ges. Berlin Bd. 40.

Systematisches. K. Zittel theilt im Handbuch d. Palaeontologie I. Abth., Bd. 3 pag. 370 ff. die Ordn. Stegocephala ein in:

I. Unterordn. Lepospondyli. Wirbelkörper aus einheitlichen Knochenhüllen bestehend, welche Reste der Chorda umschliessen. Hinterhaupt knorpelig oder verknöchert. Zähne einfach, mit grosser Pulpa.

Fam. 1. Branchiosauridae.

Fam. 2. Microsauria (mit Hylonomidae, Microbrachidae, Limnerpetidae, Nectridea und Heleothrepta).

Fam. 3. Aistopoda.

II. Unterordn. Temnospondyli (= Ganocephala Ow. pp., Rhachitomi und Embolomeri Cope). Wirbelkörper aus mehreren getrennten Knochenstücken bestehend, meist rhachitom, selten embolomer. Hinterhaupt knorpelig oder verknöchert. Zahnschubstanz im Innern meist radial gefaltet.

a) Gattungen mit rhachitomen Wirbeln.

b) Gattungen mit embolomeren Wirbeln.

III. Unterordn. Stereospondyli. Wirbelkörper aus einer vorn und hinten etwas ausgehöhlten, im Centrum zuweilen durchbohrten Knochenscheibe bestehend. Hinterhaupt verknöchert. Dentinschubstanz der Zähne labyrinthisch gefaltet. Schleimcanäle zwischen den Augenhöhlen und den Nasenlöchern eine Lyra bildend.

Fam. 1. Gastrolepidoti. Bauch bedeckt mit knöchernen Schuppen von länglicher Form; radiale Ausbuchtungen der Zahnpulpa nur mässig verzweigt. — Mit den Gattungen *Baphetes* Ow., *Stereorhachis* Gaudry, ? *Pholiderpeton* Huxl., *Platyops* Twelv., *Macromerion* Fritsch, *Anthracosaurus* Huxl., *Eosaurus* Msh., ? *Megalerpeton* Young und *Loxomma* Huxl.

Fam. 2. Labyrinthodonta (= Euglypta Miall). Bauchschuppen und Sclerotica-Ring fehlen. Kehlbustplatten gross, rau sculpiert. Labyrinthstructur der Zähne stark entwickelt. Auf dem Gaumen, Vomer und in der Symphyse des Unterkiefers vereinzelte gewaltige Fangzähne. — Mit den Gattungen *Trematosaurus* Braun, *Metopias* v. Mey., *Capitosaurus* Mstr., *Mastodonsaurus* Jaeg., *Labyrinthodon* Ow., ? *Diadethognathus* Miall, *Rhytidosteus* Ow., *Xestorhynchias* v. Mey. u. a.

E. D. Cope wendet gegen die primäre Eintheilung in drei Gruppen ein, dass sich zwischen Zittel's Lepospondyli und Temnospondyli keine scharfe Gränze ziehen lasse, da die Form eines röhrenartigen Wirbelcentrums durch alle Uebergänge mit dem eines amphicoelen Wirbelcentrums verknüpft sei. Die Temnospondyli seien deshalb keine natürliche, scharf abgegränzte Gruppe. Auch das Auftreten oder Fehlen von zwei Occipitalcondylen sei bei einer primären Eintheilung nicht zu vernachlässigen. Amer. Naturalist Bd. 22 pag. 1019.

H. Credner gibt eine Uebersicht der bis jetzt beschriebenen Stegocephalen aus dem Mittel-Rothliegenden von Nieder-Häslich. Er theilt sie ein in:

I. Kranzwirbler (Rhachitomi). Der Wirbelkörper besteht aus einem Kranze von getrennten Knochenstücken. — Hierher 1. *Archegosaurus*, 2. *Disco-saurus* und 3. *Sparagmites*.

II. Hülsenwirbler. Der Wirbelkörper besteht aus einer einheitlichen Knochenhülse.

a. Tonnenwirbler. Die Wirbelhülsen tonnenförmig, also intervertebral erweitert; Rippen kurz und gerade; Schädel stumpf; Carpus und Tarsus nicht verknöchert; keine Ossa publica; Schwanz kurz, stummelförmig. — Hierher 4. *Branchiosaurus*, 5. *Pelosaurus*, 6. *Melanerpeton* und 7. *Acanthostoma*.

b. Sanduhrwirbler. Die Wirbelhülsen sanduhrförmig, also beiderseits erweitert; Rippen lang und gebogen, mit Capitulum und Tuberculum; Schädel zugespitzt; Carpus und Tarsus theilweise schwach verknöchert; secrete Ossa publica; Schwanz lang. — Hierher 8. *Hylonomus*.

Zeitschr. D. Geol. Ges. Berlin Bd. 40 pag. 555—556.

A. Fritsch's Palaeontological Researches in Nature Bd. 37 pag. 244—245 sind ein Referat über Fritsch's Fauna der Gaskohle Bd. 2, Heft 1, 1885 [vergl. Ber. f. 1885 pag. 325]. — Dazu bemerkt J. W. Dawson, dass er *Dendroterpetum* zu den Labyrinthodonten und nicht zu den Microsauriern gestellt habe, welche letztere einfache und nicht gefaltete Zähne besitzen. Die Microsauria, obgleich in gewisser Hinsicht niedriger stehend als die Labyrinthodonten, zeigten in ihrer Organisation doch bereits Anklänge an die Reptilien. Ebenda pag. 393.

Branchiosauridae. M. Lohest kündigt aus dem Ober-Famnenien des belgischen Devons Reste eines Stegocephalen an, der, dem *Branchiosaurus* verwandt, der älteste bis jetzt bekannte Rest eines Batrachiers sei. Ann. Soc. Géol. Belg. Bd. 15, Proc. verb. pag. 120—127, 2 Figg.

Archegosauridae. M. Boule gibt im Wesentlichen nach A. Gaudry [vergl. Ber. f. 1887 pag. 256] in Holzschnitt das vollständige Skelett und die Restauration von *Actinodon frossardi* Gaud. aus dem Unt. Perm von Muse bei Autun. Die Supratemporalia und die Postorbitalia sind auffallend stark entwickelt. Jeder Wirbelkörper besteht aus drei isoliert bleibenden Theilen. Der Bauch zeigt eine Bedeckung mit Ganoidschuppen. Le Naturaliste 10. Jahrg. pag. 41—42, 2 Figg.

A. Gaudry hält *Actinodon* für identisch mit *Sclerocephalus* Goldf. [was aber B. Lydekker, Cat. Foss. Rept. Br. Mus. Bd. 4 pag. 184 bestreitet, der mit Zittel *Weissia* Branco mit *Sclerocephalus* identificiert]. Mém. Soc. Hist. Nat. Autun Bd. 1 pag. 29.

Eingehende Mittheilungen über den Schultergürtel und den Bau der Extremitäten von *Eryops* macht E. D. Cope. Trans. Amer. Phil. Soc. (2) Bd. 16 pag. 362—367, 1 Taf.

Labyrinthodontidae. K. v. Zittel bezweifelt die Batrachiernatur des *Labyrinthodon rutimeyeri* Wiedersb. und hält diesen Rest für ein Reptil. R. Wiedersheim schliesst sich jetzt dieser Ansicht an und erinnert an

Aehnlichkeiten mit *Phrynosoma* und mit Geckonen. N. Jahrb. f. Min. 1888 II pag. 257—258.

In einer Notiz über Wirbelthierreste in den Triasschichten der Südküste von Devonshire zwischen Budleigh Salterton und Sidmouth bemerkt H. J. Carter bei Besprechung von Coprolithen, dass die Nahrung der triassischen Labyrinthodonten wie die der liassischen Ichthyosauren aus Ganoidfischen bestand. Qu. Journ. Geol. Soc. London Bd. 44 pag. 318—319. — Ref. in Geol. Magaz. (3) Bd. 5 pag. 182.

H. Kunisch beschreibt ein Kieferfragment von *Mastodonsaurus silesiacus* Kun. [vergl. Ber. f. 1885 pag. 330] aus dem Muschelkalk von Sacrau bei Gogolin, Oberschlesien, das die Kenntniss dieses Thieres nicht unwesentlich vervollständigt. 66. Jahr. Ber. Schles. Ges. Vat. Cult. Breslau 1888 pag. 90—91.



Bericht

über

die Leistungen in der Ichthyologie während
des Jahres 1887.

Von

Dr. F. Hilgendorf.

Allgemeines.

A. Günther [u. Boulenger], Guide to the galleries of Reptiles and Fishes in the dep. of zool. of the British Museum (Nat. History), 101 Xyl. London 8°. Pisces S. 47—113.

B. G. Wilder, „Classification of Vertebrata“. Die Fische kommen nach dem Vf. in die Abth. der „Megaulica“, nur die Dipnoi zu den „Micraulica“ (d. h. den Amphib. + Amniota) u. Branchiostoma bildet die „Monocoelia“; Megaul. u. Micraul. zusammen bilden die Abth. „Polycoelia“, Polyc. und Monoc. zus. die „Phenocoelia“ (= Vertebrata), Phenoc. u. „Cryptocoelia“ (= Tunicata) zus. die „Coeloneura“, die Coelon. u. „Stereoneura“ zus. die Metazoa. Innerhalb der Megaul. bilden Ganoiden u. Teleostier zus. die „Pisces“. Die Höhlungen des Centralnervensystems sind von hervorragendem taxon. Werthe. — Amer. Natur. XXI 913—7, 1033.

D. S. Jordan, Science sketches. Chicago 1887. 8°. 276 S. Darin ein Kapitel über Ausbreitung der Süßwasserfische, eine vollst. Liste der Werke des Vf.

Vergleiche ferner: Günther, über Präparation von Regalecus unter Systematik; Jordan, Nomenclaturprincipien unter geogr. Verbreit. (Westindien); Hubrecht, Abstamm. der Chordaten bei Entwickl. (Phylog.); Schneider, Ausscheidung der Dipnoi u. Myxin. von den Fischen bei Syst.

Anatomie und Physiologie.

Allgemeines. L. Brieger, Unters. üb. Ptomaine, stellte aus faulendem Dorschfleisch dar: 1. Neuridin, 2. ein Aethylidendiamin?, 3. Muscarin, 4. Gadinin, 5. ein unerforschtes Pt. u. Triäthylamin. Biol. Centralbl. VI 690, 742.

Haut (Seitenorgane, Leuchtorgane). Günther erwähnt von *Lycodes reticulatus* ein dickes Stratum von „coagulated mucus“, das sich in grossen Fetzen ablöst. Die ist wohl nur die ältere Bezeichnung für das Epithel selbst. Chall. XXII 78.

J. Brock, „üb. Terminalkörperchen-ähnliche Organe in der Haut von Knochenf.“ Bei e. Lophobranchier, *Gastrotokus biacul.*, beschreibt Vf. ein schon von Kaup [und Day] erwähntes Tastkissen vor dem Anus. Dessen Papillen enthalten beim Weibchen häufig entweder ein Tastkörperchen, d. h. eine aus platten, sternf. Zellen mit homogen. Zwsbst. aufgeschichtete Säule, oder einen Endkolben, d. h. e. homogenen ovalen Körper, zu dem Vf. e. Nerv gehen sah; da aber e. wirkl. Eintreten von N. weder in die Endk. noch Tastk. beobachtet wurde, bleibt die Natur der Termkp. unsicher. Eine Kapsel von Pigmentz. umgiebt diese Körper. Beim Männchen sehr selten Endk. aber die Tastk. sehr lang (bis 400 μ). Bisher ähnliche Gebilde bei Fischen kaum bekannt. Intern. Monschr. Anat. Physiol., IV 301—311, Taf. 12.

M. Sacchi, sulla struttura del tegumento negli embrioni e avannotti del *Salmo lacustris*; Rendic. Istit. Lombardo (2) XX 642—9, Taf.

Solger, „üb. d. Cupula terminalis der Seitenorg. der Fische, (Demonstration an *Chimaera* u. *Notopterus*). Die C. t. ist ein Schutzapparat epithelialer Herkunft, nicht etwa das Kunstproduct einer Quellung od. sonstigen Veränd. der Sinneshaare. Die C., im frischen Zust. gallertartig u. glashell, besteht aus langgestreckten cylindr. Segmenten, die ausserhalb des Gebietes der haartragenden Sinnesz. deutlicher erkennbar sind. Bei Chim. findet sich Cupulasubstanz auch entfernter vom Sinneshügel, indem sie als dünne Cuticula auch die freie Fläche des die Seitenwandungen der Rinne auskleidenden Epithels deckt. Schleimzellen kommen nicht in Frage. . . F. Eilh. Schulze bemerkt dazu, dass die Gallertcylinder der Knochenf. aus einer festeren Rinden- und einer weichen Innenschicht bestehen. Tagebl. 60. Vers. D. Natf. u. Ae. Wiesbaden, S. 93 u. 111.

R. v. Lendenfeld, Rep. on the structure of the phosphorescent organs of fishes. = Appendix B zu Günther's Tiefseef. im Chall. Rep., Zool. XXII, S. 277—329, Tf. 69—73. Vf. untersuchte 5 Fam.: Stomiidae, (Opistomias, Echiostoma, Pachystomias Malacosteus, Astronesthes), Sternoptychidae (Argyrop. u. Sternoptyx), Scopelidae (Scopelus benoiti), Alepoceph. (Xenodermichthys) u. Halosaur. (Halosaurus), in welchem Material alle bisher beschriebenen Typen von Leuchtorg. der F. vertreten sind [excl. Ipnops]. Er unterscheidet unter seinen 12 Formen 2 Hptgruppen: I. „regelmässige ocellare phosphorescirende Org.“, weil Gestalt u. Vertheilung üb. d. Körper regelm., meist segmental, erscheint; sie sind entw. A. „einfach“, von Sack- oder Kugelform (= drüsenartige Org. Ussow's u. augenähnl. Org. Leydig's z. Th.), sie kommen mit (No. 3) u. ohne (No. 2) Pigmentmantel vor u. haben nie einen Reflektor, oder B. „zusammengesetzt“,

d. h. mit abgeschnürtem becherförm. distalem Theile (= augen- u. glasperlenähn. O. früherer Autt.), Pigmentmantel stets vorhanden, ein aus nadelf. Elementen gebildeter silberglänz. Reflektor (modific. Schuppe) fehlt der einen Abth. (Nr. 4), die Org. bleiben hier immer isolirt u. stehen senkrecht zur Haut, die Org. der Abth. mit Refl. (Nr. 5) stehen schief und können in ihren proxim. Theilen verschmelzen sie sind die auffallendsten (glasp. Org. Leydigs). II. „Unregelm. drüsenf. Org.“ (Leuchtorg. Leydig), sie kommen vor zerstreut (Nr. 7), auf dem Untkfr. (Nr. 8), an Barteln u. Flossenstr. (Nr. 9), unter dem Kiemendeckel (Nr. 10), und in hoher Ausbildung als „Suborbitalorgane“ entw. ohne (Nr. 11) od. mit Reflektor (Nr. 12). Zu den regelm. oc. Org., einf. ohne Pigmentm., gehören noch die Leuchtorg. von Halos., die (1 mm br., 3 mm hoch) auf den Schuppen der Seitenlinie, am Schuppenloch gelegen sind (Nr. 1); auf einer basalen Schicht von Kapillaren, Nerven u. multipol. Ganglienz. (Leuchtzellen?) stehen spindelf. Z. mit hyal. Zwischensubstanz, darüber eine Membran, daher „regelm. oc. bedeckte Org.“ genannt; die Schuppen besitzen eine reflektirende Membran. Zwischen Schuppen u. Schleimkanal liegen in einem Fasergewebe gelbe, feste, linsenf. Körperchen (Sekretion?). Gestielte, an der Körperfläche herabhängende Leuchtorg. besitzt Xenoderm., sie sind reg. oc. Org. mit Pigment, u. mit einer einseitigen Einschnürung (also unvollkommen zusammengesetzt) (Nr. 6). — Vf. betrachtet alle Abth. als Leuchtorg., weil einige direkt als solche beobachtet wurden (auch von Willemoes-Suhm) u. die übrigen in ihrer Structur ähnl. sind. Der Zweck des Leuchtens ist für die der Sehrichtung parallel leuchtenden Org. (vorn am Kopfe) Beleuchtung des Jagdfeldes, also ein aggressiver, für die nach hinten blitzenden Abschreckung der Feinde, ein defensiver. [Sollte nicht vielleicht eine Anlockung der beiden Geschlechter in Frage kommen? Ref.] Die Org. an Barteln u. Flossen sollen die Beute anlocken. — Ihren morphol. Ausgang haben sie von den gewöhnlichen Schleimdrüsen des Schleimkanalsystems, die zunächst leuchtenden Schleim producirt; dann bildeten sich in der oberflächl. Schicht einige Zellen zu Leuchtzellen aus, die bei starker Innervation unter den Einfluss des Willens traten, zunächst Spindelzellen, dann die vom Vf. entdeckten kolbenf. Leuchtz., deren angeschwollener Aussentheil einen secernirten Leuchttropfen enthält. Die tubulösen Drüsen in der distalen Hälfte liefern in ihrem Sekret dann nur das Feuerungsmaterial für die Leuchtschicht. Leydig's u. Emery's Angaben werden bestätigt; das Material des Vf. war oft ungenügend conservirt. — Die stets ergiebige Nervenversorgung liegt für die grossen Suborbitalorg. einem modific. Trigemini-Ast, für die übr. Org. den gewöhl. oberflächlichen Nerven ob. Ein eigner Lobus phosphorius am Trig. bei Echiostoma (Abb.). Einen eingehenden Ausz. liefert Vf. im Biol. Centralbl. VII 609—21, woraus die obige Anordnung der Abth. der Leuchtorg. entnommen wurde; sie weicht im Chall. Rep. etwas ab. Eine Beziehung zu dem Parietalaug der Reptilien leugnet Vf.

H. N. Moseley, Report on the struct. of the peculiar organs on the head of Ipnops. Die führe Ansicht, dass das O. ein immens verbreitetes Auge sei (hervorgerufen durch ein zufällig eingeschliches mikr. Präp. vom Auge irgend eines Teleostiers), wird aufgeben, ziemi. sicher wird es jetzt als Leuchtorgan bezeichnet. Es liegt als dünne Platte unter einer freien, durchsichtigen Knochendecke (enorme Praefront.?, Gth.), und erstreckt sich nach hinten über d. Gehirn, von demselben aber durch Knochen getrennt. Die Struktur der Platte ist allerorts die gleiche, ihre Dicke nur $40\ \mu$; sie zerfällt in hexagonale Fächer von $40\ \mu$ Dm., deren jedes auf einer grossen hex. Pigmentzelle ruht (wie in Ussows „Tapetum“ bei Stomias, bei Ipn. aber braun, ohne irisierende Flitterchen, die dem ganzen Organ bei I. mangeln). Jedes Fach enthält ca. 40 hexag., unten nicht verdünnte, senkrechte Stäbchen (hyalin, schwach färbbar u. meist ohne Kern), jedes Stäbchen wird oben von einer Zelle mit grossem Kern (stark färbbar) gekrönt; die Schicht dieser Zellen löst sich leicht von der Stäbchenmasse ab, und bildet eine Abweichung gegenüber allen andern bekannten Leuchtorganen. Unterlagert wird das Organ von einer entwickelten Bindegewebsschicht, die anscheinend vom Trigem. innervirt u. von den Carotiden reichlich mit Blut gespeist wird, auch reichlich verästelte Pigmentz. enthält, die mit Nerven u. Gefässen in das phosph. Org. eindringen. Weder eine Spur von Augen oder Sehnerv noch e. N. olfact. oder eine Riechhaut wurden in der Schnittserie entdeckt, der N. acust. war dagegen wohl entwickelt. — Gegen Deutung als Sehorgan (ebenso wie als Riecho.) spricht der Mangel des betreff. Nerven, gegen die als elektr. O. das Fehlen isolirender Bindegewebs-Wände zwischen den hexag. Fächern, für ein Leuchtorgan dagegen die Blutfülle u. die Durchsichtigkeit des Daches. Zwischen den Muskelfasern sah Vf. überall massenhafte pseudonavicellare Psorospermien. — Challenger Report, Zool. Vol. XXII, p. 269—76, Tf. 67, 68 (als Appendix A zu Günth. Tiefseef.)

Vergleiche über Haut ferner: Brock, Hautdrüse des Plotosus, bei Generationsorg.; Ryder, bei Entwickl. (I Gadus, IX Gastr.); Dunn, chromat. Funktion u. Epithelverstärkung bei Gadus poll. in d. Systematik; Günther, Tastorg. an der Brustfl. von Bathypterois, unter Syst. (Scopelidae); Vaillant, desg. ebd.; Fritsch, Haut u. Haut-Sinnesorg. des Malapterurus unt. Syst.; Sm. Woodward, Seitenlinie der Pteraspiden, s. fossile Fische; Guitel, Seitl. von Lepadogaster bei Syst. (Gobies.); Wenckebach, Entw. der Hautsinnesorg. unt. System. (Engraulis); Günther, Leuchtorgane, unt. geogr. Verbreit. (Tiefseefische).

Skelett (und allgemeine Morphologie) G. Mivart, Artikel „Skeleton“ in Encyclopaedia britannica Vol. 22, S. 105—119.

W. Roux, „üb. e. im Knochen lebende Gruppe von Fadenpilzen (Mycelites ossifragus).“ Zuerst vom Vf. in Kn. von Rhytina, dann aber im Knorpel und Knochen fossiler Plagiostomen bez. Teleost. häufig nachgewiesen; bildet Canäle von $3\text{--}12\ \mu$ Durchm. Früher

ähnliches von Kolliker in Schuppen von *Beryx* beobachtet. Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. 45, Heft 2, S. 227—54, Tf. 14.

C. B. Brühl, Beitr. z. Osteologie der Knochenf. Berlin 130 S., 11 Tf. (Eine unveränd. Ausg. des älteren Werks: Osteologisches aus d. Pariser Pflanzengarten.)

C. Gegenbaur, „die Metamerie des Kopfes u. die Wirbeltheorie des Kopfskeletes, im Lichte der neueren Untersuch. geprüft.“ Die Metam. des Kopfes ist das Endziel der Forschung, die Wirbeltheorie des Schädels ist eine, die historisch älteste Seite des Problems. Die Metamerie, von Ggb. durch Prüfung der Kiemenb. u. Nerven wahrscheinlich gemacht, ist durch den embr. Nachweis von (9) Kopfsomiten jetzt unzweifelhaft dargethan. Die Kiemenbögen hatten ursprünglich dieselbe Metamerie wie die dorsalen Kopfteile (gegen Ahlborn). Schon in der Ontogenie der Selachier (des günstigsten Objekts) ist aber die phylog. früheste Form des Kopfbaues grossentheils geschwunden u. verändert, so ist die Zahl der Urwirbel, 9 (6), sicher zu gering für die Urwirbelthiere; Beweis, die zahlreichen Kiemen bei *Heptanchus*. Eine Vorstellung des phyl. ältesten Zustandes giebt der Kopf von *Amphioxus* mit seinen Myotomen, doch ist hier durch Entwickl. der Peribranchialhöhle die Kiemenpartie stark umgebildet). Durch Ausbildung der Sinnesorgane u. des Gehirns wurde die Beweglichkeit des Kopfes beeinflusst, dadurch die Muskulatur zum Schwund gebracht. So sind denn das 4.—6. Myotom Wijhe's von der ontog. Weiterentwicklung ausgeschlossen, sie liefern keine Muskeln mehr. Die 3 letzten Som. W.'s liefern nicht nur dorsale, sondern auch ventrale Muskeln u. gehörten wahrsch. ursprünglich nicht zum Kopf; zw. ihnen u. den 3 mittleren Som. sind aber eine Zahl Kopfsom. nebst deren Kiembg. verloren gegangen u. selbst im Embryo nicht mehr sichtbar. — Auch der Schädel hatte wahrsch. (innerhalb der Parachordalknorpel) urspr. eine metamere Gliederung, wenngleich (selbst ontogenetisch) nicht mehr nachweisbar; eine Angliederung weiterer Wirbel von der Wirbelsäule her fand nicht statt; erst secundär erfolgen später (Selachier) Verwachsungen derart, welche aber dem morphol. Bestand, der von jeher mit dem Vagusbereich endete, nichts zufügen. Wie die Kiemenbögen zum Cranium, so gehören die Rippen als ventrale Anhänge zur Wirbelsäule. — In 5 Kapiteln werden Einzelheiten beleuchtet. I. Urwirbel: Das 1. Somit ist viell. urspr. erst vom 2. aus gebildet worden, ihm fehlt die ventrale Mesodermabtheilung (Seitenpl.), seine Höhle erscheint später. Es liefert Augenmusk. (obl. inf., rct. sup., r. inf., r. int.), so auch das 2. (obl. sup.) u. 3. (r. ext.). Das 4., 5., 6. verkümmern; das 7. bis 9. liefern (mit Rumpfm. yot.) den M. coraco-hyo. Dieser ungleiche Werth der Somite mindert ihren Werth als Zeugen für die Phylogenese. II. Kiemenpalten: Sie sind wesentlich Entodermbildungen, daher giebt es keine präorale Ksp.; weder Nase noch Lacrymalpalte, noch Mund, noch Thyreoidea, noch After, noch die van Bemmelen'schen Ksp. - Spuren, ausg. viell. der Suprapericardialkörper, werden als Ksp. anerkannt. III. Verhalten der dors. u.

ventr. Metamerenbild. zu einander: Die urspr. Uebereinstimmung wurde nur durch Verkümmern der dors. Metam. vernichtet. Dass auf die Kiemenbg. Mesoderm von den Kopfsomit. her sich erstreckt, u. dass bei Mand. u. Hyoid. das Coelom dieser Kbg. mit dem der zugehörigen Kopfsom. zusammenhängt, ist sicherer Beweis für das Entsprechen beider Metamerien. IV. Nerven. Der Olfact. u. Opt. sind keine segmentalen Nerven. Der Oculomot. ist viell. als selbständig vom Trig. anzuerkennen; es tritt, wie der Ram. ophth. prof. mit dem 1. Somit zusammen, u. bildet einen vorderen Kopfabschnitt, der aber, weil des ventralen Theils entbehrend, kein echtes Metamer ist. Von dem Trigem. kann wohl selbständig entstanden sein auch der Ram. ophth. prof., zumal er durch ein Ganglion (ciliare) als segm. Nerv charakterisirt wird; er gehört dann zum präor. Abschnitt; der Ram. III u. sein Spross, Ram. II, zu denen sich (ob als ventr. Wurzel??) der Trochl. gesellt, sind die dem 1. echten Metamer (dem des 2. Somits oder dem Kiefbg.) zukommenden Nerven. Der Acust. u. Facialis gehören einem u. demselben (2.) Met. zu (Hyoidbg., 3. Somit), zu welchem auch der Abducens (als ventr. Wurzel??) zu rechnen ist. Der Glossoph. ist der Nerv des 1. definitiven Kbg. (5. Somit., 3. Met.). Der Vagus wurde früher vom Vf. u. nach ihm von vielen Autt. als polymerer Nerv aufgefasst; die Sonderung der Wurzeln tritt aber ont. erst später auf, und von den 4 ehemals als ihm zugehörig betrachteten Somiten (6.—9.) sind das 7.—9. Rumpfsomit. daher ist der X, trotz der Länge seiner Basis ein einfacher Nerv. In den sog. ventr. (oder untern) Wurzeln des X hatte Vf. früher den Hypogl. angenommen. Diese W. sind aber dem Metamer des Vagus fremd u. erst secundär vom Rumpf her dem Kopf angeschlossen. Ihre Zahl variirt, sie verbinden sich mit (1—11) Spinalnerven und versorgen dann die Muskeln der Blutflosse u. die ventr. Längsmuskeln, Uebrigens hat weder der Kopf noch das Cranium durch Zutritt jener Portion eine Zahl echter, primitiver Metameren gewonnen; in diesem Material fand vor der Zuführung eine Einschmelzung der Metameren statt. Der sog. Hypoglossus der Fische enthält ausser den sog. „unt. Vaguswurzeln“ sicher noch Spinalnerven in sich; sein Verbreitungsgebiet entspricht nicht dem bei den Amnioten; der Hypogl. dieser hat sich erst aus jenem Nervencomplex der Fische gesondert durch Entfernung des Schultergürtels vom Kopfe, oder ist viell. erst aus Spinalnerven neugebildet worden ganz unabhängig von den „unt. Vagwz.“ Der Access. Will. tritt sicher erst bei den höh. Vertebraten auf, er sondert sich wohl vom Vagus ab; für die Metamerie ist er bedeutungslos. V. Kopfskelett. Die Chorda zeigt bei niederen Vertebraten im Kopfe nie Metamerie; ihre Einschnürungen bei Säugern deuten auch wohl nicht auf Metamerie. Das Cranium bis zur Vagusregion incl. wird nie metamerisch angelegt. Ueber später eintretende Concreescenz mit Rückenwirbeln s. Gegenbaur S. 279. Zu den Kiemenbögen gehören nicht die vorderen Schädelbalken (axiale Skelettheile), fraglich ist dies für die Labialknorpel (die Nasalknorpel, Differenzirungen der Nasenkapsel,

sind dem dorsalen Sk. zuzurechnen u. haben mit Labialkn. oder gar mit Kiembg. nichts zu schaffen). An seiner früheren Theorie, dass das obere Stück des Hyoidbogens zum Kfbrg. hinübertücke, um als Hyomandib. dessen Suspensorium zu bilden, hält Ggb. fest; Wijhe, der den Hyobg. doppelt sein lässt, fusst nur auf irrthüml. Angaben Parkers (Lachs-Entwickl.); die Embryologie hat hier nur dasselbe Bild geliefert wie die vergl. Anat.; Dohrn's Polemik gegen Ggb. beruht auf einer Verwechselung von Hyoidbogen mit Hyoid (= unt. Theil des Hybg.) — Bez. Blau's Theorie der Riechmembran bemerkt Ggb., dass die Aehnlichkeit der Rmbr. mit Endknospenbildungen sich bei den höheren Fischtypen findet, mithin kein primärer, sondern ein später erworbener Zustand ist. — Morph. Jahrb., XIII, 1—144.

A. Fropie, Bem. z. Wirbeltheorie des Kopfskeletts. Vf. resumirt seine Auffassung der früheren und neueren Gegenbaur's gegenüber; die Hauptabtheilungen des Schädels haben ihre Grenze zw. spinalem (Hypoglossusgebiet) u. praespinalen Schädel, nicht zw. chordalem u. praechord., wie Ggb. will. Wirbeltheorie sei mit Metamerentheorie nicht zu verwechseln. Anat. Anz. II 815—835.

C. Gegenbaur, „üb. d. Occipitalregion u. die ihr benachbarten Wirbel der Fische“. Selachier: Die Verschmelzung des Knorpels von Wirbelsäule u. Schädel bei *Hexanchus* u. *Centroph.* ist wohl Verwachsung, aber nicht ohne weiteres Wirbelassimilation. Die von Rosenberg als ontogenetische Angliederung aufgefasste Verschiedenheit zwischen alten und jungen *Carcharias* findet eine andre Erklärung; der 1. Wirb. ist in beiden Fällen frei. Bei Umwachsung der ersten W. durch einen Fortsatz des Occip.-Knorpels (bei einem andern *Carch.*) besteht nicht Verschmelzung, sondern nur äussere Auflagerung, was Ggb. durch Querschnitte beweist. Bei *Mustelus* scheint aber Rsbg. wirklich einen Wirbelanschluss entdeckt zu haben. Die Morphol. des eigentl. Schädels und die Natur der Hirnnerven wird dadurch nicht berührt. (Fig. 1; 2 Xyl.) Ganoiden: *Acipenser* (Fig. 2, 3) hat wahrsch. 6 mit dem Cranium verschmolzene u. durch das Parasph. gleichfalls unterstützte Knorpelwirbel; das elast. Band, das ihren Bogenheil noch durchzieht, zeigt, dass es echte Wirbel sind; ein primitiver Zustand liegt auch in dieser Verschmelzung nicht vor. Bei *Amia* sind die Bögen von 2 Wirbeln dem Occ. bas. aufgesetzt, bei *Lepidosteus* (Fig. 4, 5) 1 Bgn. Bei *Polypt.* ist ein ob. Bg. mit rudimentärem Wkörper. zw. Occ. u. 1. vollständ. Wirb. eingeklemmt; dies Verhalten (Fig. 6) macht es fraglich, ob bei *Am.* u. *Lep.* nicht vielleicht auch die Wbkp. nur geschwunden sind, wahr. Bridge u. Sagemehl sie als existirend, aber mit dem Occ. bas. verschmolzen betrachten. Teleostier: Die mit Weber'schem Apparat versehen *Physostomi* bieten vielfache, aber durch diesen App. secundär beeinflusste, daher schwer zu beurtheilende Modificationen dar. *Esox* (Fig. 7, 8) hat 1 ob. Bogen, der dem Occ. bas. ähnlich aufsitzt, wie bei *Lepidosteus*; da das Knorpelkreuz des O. b. sich nicht in den access. Bogen, sondern in das O. lat. fortsetzt, so kann bei *E.* der Wrbkörper. des Bogens nicht im O. bas. stecken. *Salmo salar* hat einen

freien Bogen von schwankender Breite, der sich bald dem O. lat. bald dem 1. vollst. Wrb. anheftet. Bei *S. lacustris* (Fig. 9—11) sitzt der Bogen dem O. later. auf, kann also seinen Körper schwerlich im O. bas. haben, der Wb. ist eher als verloren zu betrachten; der Dornforts. ist in diesen Fällen immer sehr zurückgebildet. In toto schliesst sich der 1. Wb. an den Schädel bei *Ostracion*, *Thynnus*, *Xiphias*. Aehn. auch bei *Gadus* (Fig. 12, 13), bei welchem der sog. Hypoglossus entweder zw. dem 1. Wb. u. dem O. lat., oder m. o. w. innerhalb des O. lat. durchbricht; aus dieser Variabilität kann man schliessen, dass eine Knochenbrücke zw. Hypogl.-Loch u. Hintertl. nicht ein Wrb. sei, wie Sagemehl will. Eine Verkümmern der vordersten Wb. ist bei Tele. häufig; bei *Pagrus arg.* der 1. sehr kurz, bei *Chromis nil.* mit 2 Bögen. Dafür, dass es bei Fischen eine „vertebrale Schädelregion“ giebt, liefert die vergl. Anat. mithin nur bei *Mustelus*, *Lepid.* u. *Amia* einen Fingerzeig, wenn auch noch nicht einen völlig klaren Beweis. Festschrift, A. v. Kölliker gew. von s. Schülern, Leipzig 1887, 4^o; S. 1—33, Tf. I.

C. Strecker, „üb. die Condylen des Hinterhaupts“, behandelt Fische S. 301—3 (*Lepidost.* u. *Polypt.*, *Teleost.*), 324, 326 (geringe Bewegungen in 3 Richtungen durch das Occip.-Atlas-Gelenk beim Lachs möglich). *Arch. für Anat. u. Physiol.*, Abth. Anat. Jg. 87, S. 301—338.

A. La vocat, „des tiges jugale et ptérygoïde chez les Vertébrés“. Die Fische haben keine Jugale. *C. r. ac.* Paris, T. 104, p. 303.

E. D. Cope, „Zittel's manual of Palaeontology“. Als Anhänger der Theorie, welche die paarigen Flossen gleich den unpaar. aus epiblastischen Längsfalten entstehen lässt, hat Vf. auch die morphol. Nomenklatur einheitlich durchgeführt. Jeder einzelne Stütztheil der Flosse besteht theoretisch aus 3 Abtheilungen, die von der Wirbels. aus so folgen: 1. Dornfortsatz (*Hämal*-, *Neural*-Dorn, *Diapophyse*), 2. *Axonost* (interneuraler, interhaemaler Knochen; 1877: *axiales Segment*), 3. *Baseost* (1870 *basilares Segm.*, = *Actinost* Gill, *Actinophor* Ry.); auf dem *Baseost* ruht der Flossenstrahl. Die Brustfl. lässt allerdings nur bei *Tristichopterus* (foss.) die 3 Theile erkennen, dann weicht die Caud. u. danach die V. am stärksten vom Urtyp ab. Die *Teleostomi* werden nach Entw. obiger Theile classificirt (s. bei Systematik). — Die verticalen Stacheln, welche bei *Polyterus* die Flösschen [der D.] tragen, werden jetzt nicht mehr als „basilars“ angesehen. In der Wirbelsäule der Fische scheinen mit Ausn. d. *Amia*-ähn. immer nur *Intercentra*, wie bei den *Batrachiern*, aber keine *Centra* vorzukommen. *Amer. Naturalist* XXI 1014—19.

B. N. Lvoff, „vergl.-anatom. Studien üb. die Chorda u. d. Chordascheide.“ Die Ch. dors. u. ihre Scheide ist bei allen Fischen nach demselben Typus gebaut. Die Chorda besteht aus isolirbaren Zellen ohne Zwischensubstanz, also Epithelz.; die meisten sind vacuolisirt u. enthalten etwas Luft, nur an der Peripherie sind sie protoplasmahaltig u. bilden das sog. *Chordaepithel*; jede Zelle hat hier einen peripherischen Saum (*Cuticula chordae* Hasse). Die Chorda-

scheide hängt weder durch Fasern mit diesem Chordaepithel zusammen, noch wird sie von ihm abgesondert; vielmehr ist sie immer nur Bindegewebe, das stets noch Zellreste und Ringfibrillen erkennen lässt; nur ein gradueller Unterschied besteht zw. sog. zellfreien (früher als Cuticularbild. betrachteten) Chsch. u. stärker zellhaltigen (Haie, Chimaeren, Dipnoer). Die Z. der Chsch. stammen von der perichordalen Zellschicht. Die *Elastica externa* besitzt isolirbare elast. Fasern (die „*elastica interna*“ ist nur die Cuticula des Chordaepithels) u. bei zahlreichen Chsch., die einem Faserknorpel gleichen können, zahlreichere Durchbrechungen. Unters.: *Acip. ruth.* u. *huso*, *Petro-myzon*, *Lota*, *Esox*, *Salmo*, *Protopt.*, *Chim.*, *Acanthias*. — *Bull. soc. nat. Moscou* 87 No. 2, p. 442—482, Taf. 4—6 u. ausführl. (russisch): ebd. p. 227—342.

G. Baur, *Morphology of Ribs*. Nach Beobacht. am *Amia* gehören die Rippen zum hinteren Theil des Wirbels, dem öfters noch selbständigen Intercentrum; die untern Bogen am Schwanz von *Amia* sind wirkliche Rippen; dies ist die ursprüngl. Anordnung (*Ganoidei*, *Dipnoi*). Bei *Teleost.* (u. den *Stapedifera*) werden die *Haemapophysen* aber nur von den Processus des Intercentrum gebildet, an welchen bei *Amia* die R. sitzen, die Rippen selbst wandern nach oben. *Owens* *Neurapophysis* u. *Pleurap.* sind keine Apophysen, sondern selbständige Stücke „*Neuroid*“ u. „*Pleuroid*“. *Amer. Natur.* XXI 942—5 (*Amer. Ass. Adv. Sc.* 1887).

G. B. Howes, „üb. d. Skelett u. Verwandtschaften der paarigen Flossen von *Ceratodus*, mit Bemerk. über die der *Elasmobr.*“ *Verf. resümirte*: 1. Das Sk. der Flossen von *Cer.* ist in seinem Bau variabel, mit Ausn. des Baues der dorsalen Seitenstrahlen („der praeaxialen Parameren“) der Brustfl. und des 1. Gliedes des Axenstrahls („des basalen Mesomers“) der Brust- u. Bauchfl. 2. Ein *Metapterygium* ist in der *Pect.* immer vorhanden, aber in reducirtem Zustande und meist mit dem 2. Gliede des Axstr. („dem 2. Mesomer“) verschmolzen. 3. Spuren eines Repräsentanten des *Metapt.* werden zuweilen getroffen an der Bauchfl. derart, dass man an *Atavismus* denken darf. 4. Das 1. Gl. des Axstr. ist bei *Ceratodus* denkbarer Weise vom *Metapt.* abzuleiten. 5. Bei *Chimaeriden* ist der Bau der beiden paarigen Fl. identisch u. durch Mangel des *Mesopt.* ausgezeichnet. 6. Die paar. Fl. der *Plagiost.* u. *Dipnoer* sind wahrsch. unabhängig von einander entstanden von einem Typus, ähnlich dem der lebenden *Chimaeriden*. 7. Beiläufig wird festgestellt, dass der Basalknorpel der Brustfl. von *Cestracion*, der meist als *Mesopt.* gilt, als e. Verwachsung des Pro. u. *Mesopt.* der anderen *Plagiost.* anzusehen ist. — *Verf.* unters. 6 Expl. von *Ceratodus*; Abb. der Brustfl. v. *Cestracion* u. *Polypt.*, der Bauchfl. v. *Chimaera*, u. mehrerer Expl. der Fl. von *Cerat.* — *Proc. Zool. Soc. London*, 1887, S. 3—26, Tf. 1—3.

C. Emery, „Beziehungen des *Cheiropterygiums* zum *Ichthyopterygium*.“ Verwirft die Ableitung der Fischgliedmaassen v. Kiemenbögen u. die des *Cheiropt.* von e. *Archipterygium*. Nicht nur das *Metapter.* der *Selachierflosse*, sondern auch das Pro- u. *Mesopt.* bleiben

im Chiropt. erhalten; das Propt. bildet den Radius nebst Radiale carpi (bez. Tibia nebst Tibiale tarsi) das Metapt. die Ulna nebst U. c. (bez. Fibula nebst Fib. t.), das prox. Stück von Propt. u. Metapt. zusammen den Humerus (bez. Femur). Das Mesopt. dient zum Aufbau des Intermedium u. der Centralia, währ. die Carpalia (bez. Tars.) distalia nebst Metacarp. (Metatars.) und Phalangen aus den Knorpelstrahlen (Basalia) entspringen. Polypterus ist e. Zwischenform; die Ceratodusflosse stammt wohl von e. Crossopterygium ab, in welchem d. Humerus (Femur) schon differenziert war. Zool. Anz. 87, p. 185—9, Xyl.

J. A. Ryder, homologies and early history of the limbs of Vertebrates. Die phylog. Entstehung der Wirbelthier-Extremitäten schildert Verf. ganz nach Dohrn's Auffassung. Die Selachier u. besonders die Rochen bilden den Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung. Die seriale Homologie zw. vorderen u. hint. Extr. ist unvollkommen. Die Vorderextremitäten bei versch. Typen, sind nicht exact homolog, ebensowenig die hinteren. Verf. betont dabei die Anzahl u. die Ordnungszahl der Somiten, welche den betreffenden Flossen zugehören; die Som. bestimmt er nach den den Nervenplexus bildenden N. spinales. So ist die Hinterextr. von *Cottus scorpius* dem 5. bis 7. Rumpfsomit zugehörig, bei *Esox* 18.—25., bei *Raja eglanteria* 33.—46. (bei Schlangen gar dem 275.—278.). Phylog. Verschiebungen der Plexus rück- oder vorwärts sind unwahrsch., weil ontogenetisch nicht nachweisbar. Bei den *Lyomeri* (*Gastrostomus* u. *Ophiogn.*) nimmt er e. Rückwanderung der Brustfl. um 13 Metameren an, welche veranlasst wird durch den weit nach hinten drängenden Kiefer. Die entgegengesetzte Verschiebung tritt bei den Bauchfl. der Kehlflusser auf, ohne dass deren Plexus (*Postplexus* im Gegensatz zum *Proplexus* der vord. Extr.) die Wirbelgegend änderte. Ob Vf. überhaupt noch die Bauchfl. von *Esox* u. *Scorp.* für homolog hält, oder ob er hier mehr als 2 typ. Extremitätenpaare annimmt, wird nicht klar; bei der Kopffl. der *Torpedinidae* ist er für Selbständigkeit derselben. Bei monströsen Goldfischen spricht er von einem 3. und 4. Paare, welche durch Spaltung der Anal-, bez. Caudalflosse entstehen. Die Hervorbildung des Chiropterygiums aus dem Ichthyopter. hat wahrsch. polyphyletisch in verschiedener Weise stattgefunden. — Proc. ac. nat. scienc. Philad. 1887; part 3, p. 344—68.

Edw. E. Prince, Devel. of pectoral fin and girdle in Teleost., hält den Schultergürtel für homolog mit Rippen (geg. Dohrn u. Gegb.), weil er aus der Somatopleura gebildet wird (Kiemenb. aus d. Splanchnopl.). Die Flosse selbst entsteht aus der longit. Seitenfalte u. rückt erst spät nach vorn, um sich mit dem Schulterg. zu verbinden. Rep. 56 meet. Brit. ass. adv. sc. (86), 697.

Albrecht, Entstehung der freien Gliedmaassen aus Radii branchiostegi der Extremitätengürtelrippen des Schädels. Bei *Diodon hystrix* zeigt der am meisten ventral gelegene R. br. eine Verbreiterung

ähnl. der V. oder P. eines Teleostiers, woraus die Entstehung der paar. Fl. aus Extrgürttrpp. gefolgert wird. Zool. Anz. II, 406.

Watase, „Caudal and Anal Fins of Gold-Fishes“. Dies Werk wird unter der Ueberschrift „Die Entwicklung eines Vertebraten mit 8 Gliedmaassen“ von Ryder besprochen in: Amer. Natur. XXXI, 862.

Fanny Hitchcock, „vorl. Notiz zur Osteol. v. *Alosa sapid.*“. Der Muskel der Seitenlinie entwickelt im Bindegew. zw. den Segmenten des Msk. 1 Reihe Knorpelplättchen. Bemerk. über Homologien der Flossen und ihren Zusammenhang mit Seitenorganen. Amer. natur. XXI, 1032.

Vergleiche über Skelett ferner (Anordnung systematisch): Eigenmann u. H., Schädeldach v. Spariden, bei Systematik; Günther, Skel. von *Beryx*, s. Syst.; Lütken, Skel. v. *Himantol.*, s. Syst. (Pediculati); Cornish, Saugscheibe des Cyclopt. im Alter zurückgebildet, s. Syst. (Discob.); Guitel, Extremitäten von *Lepadogaster*, s. Syst. (Gobies.); Günther, Osteol. v. *Notacanthus*, s. Syst.; Ryder, Knorpelanlage des Schädels u. Drehung der Brustfl. bei *Amiurus*, s. Entwickl.; Watase, monstrose Flossen bei Goldfischen, s. Biologie (Krankheiten); Lidth de J., Analis als Copulationsorg. bei *Poecilia*, s. Syst. (Cyprinodont.); Günther, Brustfl. v. *Omosudis* u. *Bathypterois*, s. Syst. (Scopel.); Vaillant, Bathypt. desgl., ebd.; Günther, Sk. der *Halosauridae*, s. Syst.; Ryder, Neuralbogen u. Schwanzfl. von *Siphostoma*, s. Entwickl.; Iwanzow, Skelett v. *Scaphirhynchus*, s. Syst.; Zograff, Acipenser (Rückenschilder sind Flossenstrahlen), s. Syst.; Schneider, Flossen der Dipnoi, s. Syst.; Parker, Sk. v. *Carcharodon*, s. Syst.; Günther, desgl. ebd.; Günther, Pterygopod. von *Chlamydoselache*, s. Syst.

Muskeln und elektrische Organe. C. F. Marshall findet bei Fischen (*Myxine*, *Scyllium*, *Gastrosteus*) die gestreiften Muskeln mit demselben Netzwerk ausgestattet (Goldpräparate) wie bei andern Vertebr. u. bei Invertebr. Q. Journ. Micr. Science (2) Vol. 28, S. 90.

E. Bornand, *Gaîne de sarcolemme chez les poissons*. Die Scheide ist zweischichtig; die innere Schicht entsteht aus amöboiden Z., sie bildet die Sohle der motorischen Platte. Bull. soc. Vaudoise sc. nat. (Lausanne), Bd. 23, S. 1—6, Taf. 1.

C. Fr. W. Krukenberg, „Fortgesetzte Untersuch. zur vergl. Muskelphysiologie“. Nicht nur Harnstoff (bei Elasmobranchiern, vergl. unten bei Niere) und Kreatinin (in den meerblauen Muskeln von *Luvarus*) fand Vf., sondern noch einen andern, leicht zersetzbaren Stoff, der mit Nitroprussidnatrium u. Ammoniak purpurrothe Farbe, am ähnlichsten wie Aceton u. Aldehyd reagierend, giebt; Muskeln von *Mustelus*, *Torpedo* u. *Tinca*, sowie das elektr. Org. von *Torp.* enthalten ihn. Indol, Indican u. Rhodankalium fehlen. Vf. berichtet über Hewitt Brown's Unters. am Lachs, wonach Einwirkung von warmem Alkohol und selbst Glycerin, sowohl bei rothen (haemoglobin-haltigen) wie blassen (rodophan-h.) M., den Stoff, der die Doppelbrechung bedingt, Myosin, weit schwieriger zerstört als bei

Arthropoden-Muskeln; die dunkeln Lachs-M. leiden aber etwas stärker. Höhe der Muskelfächer der dunkl. M.: 1,6—1,9 μ , Breite 81,6—106, der hellen: 1,9 bez. 23,3—67. Die blassen M. besitzen gekrümmte Kerne (11,6 μ . l., 4,6 br.), bei dunklen werden diese durch andre, runde (7 l., 4,5—5,5 br.) fast ganz verdrängt. — Vergl.-phys. Studien, 2. Reihe, 4. Abth., S. 143—170.

J. C. Ewart, „Rigor mortis bei Fischen und dessen Bezieh. zur Fäulniss“. Die Starre kann physiologisch sein, wenn nämlich das Myosin gleichzeitig mit dem Tode der Nerven coagulirt; in diesem Falle nimmt der Fisch Contractionsstellungen an. Erfolgt der Nerventod einige Stunden vorher, so ist die Starre pathologisch und die Stellung des F. beliebig. Der Grad der Starre hängt von der Lebenskraft der Fischmuskeln ab; ein erschöpfter M. hat unvollkommene Starre. Der M. wird aber erschöpft durch den Reiz der lebenden Nerven. Die Zerstörung des Centralnervensystems, verlängert und verstärkt daher die Starre. Verschiedene Arten sind abweichend. *Perca fluviatilis* stirbt, wenn 35 Min. ausser Wasser, die Starre beginnt 2 1/4 St. nach dem Tode, ist in den nächsten 25 Min. vollständig, u. verschwindet 21 St. nach dem Tode. *Anguilla* wurde durch einen Schlag auf den Kopf getödtet. Nach 24 St. noch schwache Erregbarkeit auf mechan. Reize, starke auf electriche; 52 St. nach d. T. wird das vordere Drittel starr, erst später die hintern Theile; 82 St. n. d. T. erst hört der Rigor auf, wobei alkalische Reaction und Bacterien auftreten. Wenn der Aal nach dem Tode (elektr. Schlag) sofort sterilisirt wird, hält der Rigor sehr lange an (mindestens 6 Wochen). Bei hoher Temperatur tritt der Rigor schnell nach dem Tode ein (9° C.: 1—3 1/2 St. n. d. T., bei 25°: 15—25 Min., bei 35° sofort), er schwindet aber auch schneller; bei —7° bis —20° tritt selbst nach Tagen noch kein Rigor auf. Junge Fische haben schwachen Rigor. Nach Tod durch starke elektrische Schläge tritt ebenfalls Rigor ein; ein auf der Haut einer Seite verlaufender elektr. Schlag bringt intensivere Färbung der Haut u. Muskelstarre dieser Seite hervor. Wenn ein elektrischer Fisch einen Fisch tödtet, so tritt dessen Starre später ein als bei künstl. Elektr., der *Gymnotus* etc. wird daher beim Verschlingen der Beute nicht durch deren Steifheit gestört. Schnell einsetzende Starre dauert nicht lange. Alle Muskeln contrahiren sich dabei, die Extensoren haben aber das Uebergewicht, meist auch krümmt sich der Fisch nach einer Seite. Die verschied. Musk. scheinen in bestimmter Zeitfolge nach einander sich zu contrahiren. Vernichtet kann die Starre werden durch mechanische Bewegung (Krümmen des F.), Erhöhung der Temperatur, Frieren, Säuren u. Alkalien, Organismen; unter gewöhnl. Umständen sind stets die letzteren als Fäulnisserreger die Vernichter. Als praktisches Ergebniss resultirt: Die todtten Fische sollen bei —1° bis 2° C. aufbewahrt werden, sofort beim Fang ist das Gehirn zu tödten u. der Fisch auszuweiden, die Fische sollen vor dem Aufhören der Starre conservirt werden (in Eis, oder Salz, dieses mit oder ohne Compression);

alles, was den Eintritt des Rigor nach dem Tode schwächt ist schädlich. — Proc. Roy. Soc. of London, Vol. 42, p. 438—459.

R. Wiedersheim, „das Geruchsorgan der Tetrodonten nebst Bem. üb. d. Hautmuskulatur derselben“, (üb. die Nase s. bei Sinnesorgan). Die Hautmusk. ist von der zähen Haut durch einen Lymphraum gesondert, sie umzieht mit transversaler Faserung den Körper. Dazu gesellen sich noch Sphincteren für Mund-, Kiemenöffnung u. Augenlid, radiale Dilatatoren finden sich gleichfalls. Abb. des Gehirns v. T. immacul. (Fig. 4). Festschrift, A. v. Kölliker gew. von s. Schülern, Leipz. 1887. 4^o, S. 74—84, Tf. VI.

Fr. Gotch, „the electromotive properties of the electrical organ of *Torpedo marm.*“ Vf. schliesst aus seinen Versuchen, dass die physiol. Effecte, welche an dem Organ durch Verletzungen, durch Ströme u. durch Stimulirung der electr. Nerven erzeugt werden, ungeachtet der Verschiedenheit in Verbreitung, Dauer u. Intensität, doch alle Excitationsphänomene sind. — Proc. r. soc. London, Vol. 42, 357 (Abstract).

Gotch, dieselbe Arbeit ausführl. in: R. Soc. London, Philosoph. Trans., Bd. 178 B, S. 487—537.

E. du Bois-R., Lebende Zitterrochen; Abdruck von 1885 (s. Ber. S. 340) in Arch. für Physiol. Jg. 87, 51—110.

W. Krause, Resekt. el. Nerv. Zitrtr.; Abdr. von 1886 (s. B. 86. S. 248), A. für Phys. 1887, 148—153.

Vergleiche über Muskeln: Stuhlmann (p. 32), Lähmung der M. durch Curare bei Fischen unsicher (s. Generationsorg.): Mitrophanow, M. von Cobitis (s. Systematik); Schneider, M. der Flossen u. Kehle bei *Dipnoi* (System.); McWilliam, Kiemenmuskeln; Günther, M. des Schultergürtels v. *Bathypterois* (Scopel.) u. ein medianer M. zw. Mandib. u. Hyoid. bei *Malacosteus* (Stomiat.) s. Syst.; Shipley, Entw. der M. bei *Petromyzon* (s. Entwickl.); Charbonnel, Compression d. Schwimmb. (s. Darmk.). Bez. der elektr. Org. vergl.: Fritsch, *Malopterurus* (Syst.); Krukenberg, Harnstoffgehalt der el. O. (s. Niere).

Nervensystem H. F. Osborn, „Beziehung der dorsalen Hirn-Commissuren zum Entstehen der Hirnbläschen“. Die Einschnürungen des Hirndachs, durch welche die 4 Bläschen gebildet werden, dienen zur Herbeiführung von 3 dorsal decussirenden Nervenfasern, der Com. sup., C. post. u. des Cerebellums, welche 3 ursprüngl. eine seriale Homology besitzen (Abb. nach Frosch-Hirn). Amer. Natur. XXI 940.

A. Sanders, Contr. anat. centr. nervous syst. in vertebrate animals, I. Ichtyops., 1. Pisces, b. Plagiostomi (Forts. zu: Ph. Tr. Vol. 169, 1878). Vorl. Mitth. s. Ber. 86, S. 253. Die Rabl-R.'sche Anschauung üb. das Cerebrum ist für Plag. nicht anwendbar, da hier deutl. Ventrikel im Cer. vorhanden (die nach vorn zeigenden Aeste des Gabelf. Hohlraums, dessen einf. Stiel den beiden For. Monroi entspricht). Auch bez. der Teleost. ist Vf. nicht ganz für

R.'s Theorie, eher als R.'s Ventr. comm. kommt die von v. Baer bei Tel.-Embr. beob. Höhle nebst Höcker als Ventr. lat. bzw. Corp. str. in Betracht. In der Deutung des mittleren Hirnthells geht Vf. mit R. gegen Fritsch u. Rohon. — R. Soc. London, Phil. Trans. Vol. 177, part 2, S. 733—766, Tf. 38—41.

R. Fusari „Unters. üb. d. fein. Anat. des Gehirnes der Teleostier“. Tinca, Carassius, S. salar u. fario präp. mit Müller'scher Lösung, wonach Osmium u. Silber. An den Nervenzellen ist stets der Nervenfortsatz deutlich von den protoplasmatis. Forts. unterschieden. Die Forts. der Epithelzellen hängen mit denen der Neuroglia innig zus., u. beide Zellen sind auch sonst so ähnlich, dass für beide der gleiche (ektodermale) Ursprung wahrsch. ist. Vf. unters. Kleinhirn, Valvula cerebelli u. Opticusdach; letzteres ist homolog dem vordern Paare der Corp. quadr. der Säuger. Die histol. Struktur des Hirns der nied. Vertebr. weicht im Allgemeinen nicht von der der höheren ab. (Vorl. Notiz: Ber. 86 p. 250). Mem. Accad. dei Lincei (4) IV 18—35, 3 Taf.; Uebers.: Intern. Monsschr. f. Anat. u. Phys. IV, 275—300, Taf. 9 (als XI!), 10 (IX), 11 (IX).

J. Waldschmidt, „B. z. Anat. des Zentralnervensystems u. d. Geruchso. v. Polypterus bichir“. Der als secund. Vorderhirn (Hemisphären) betrachtete Abschnitt stellt nur die Basalganglien (C. striat.) dar, die Rindenpartie (Pallium) ist (wie es bei Knochenf. Rabl-R. fand) vorhanden, aber zu e. einschichtigen Epithel reducirt. Nach oben wird das Pallium durch ein Gewebe bedeckt, das der Kopfniere Teleostier gleicht u. als veränderter Vordertheil der Zirbeldrüse zu deuten ist. Diese besteht aus einer Schicht von Epithelzellen wie das Pallium, entspricht ganz der der Teleost., sie ist nach hinten u. vorn stark entwickelt und durch Lymphe gespannt. Die Hypophyse verlängert sich in einer eignen Höhlung der Schädelbasis (wie eine röhrlige Sella turcica) weit hinterwärts u. ist an einem Punkte nur durch die Schleimhaut der Mundhöhle von letzterer getrennt, auch bei Pol. zeigt sie drüsigen Bau. Das Gehirn, obwohl durch Grösse der Zirbel u. Hypophysis als primitiv gekennzeichnet, steht doch dem der Knochenf. in mehrfache Bezieh. näher, als man bis jetzt, durch mangelhaftes Material getäuscht, annahm. Anatom. Anzeiger II S. 311—322, 11 Xyl.

H. Rabl-Rückhard, „Zur onto- u. phylog. Entwickl. des Torus longitudinalis im Mittelhirn der Knochenf.“ Zuerst ist die Medianpartie des Daches am Mittelh. der Knf. (bei Salmo) sehr dünn, später entwickelt sich aber eine vom Dach herabhängende Längsleiste, die median durch einen Längsspalt in 2 bilaterale Hälften geschieden wird; dies ist die Anlage des Torus long.; die innere Zellenlage des Tectum liefert das Material zu dessen Aufbau. Als Theil des Mittelh. kann der T. l. natürlich nicht als Fornix gedeutet werden (Carus, Gottsche, Fritsch); ein wirkl. Homologon bei höheren Vertebr. war bisher unbekannt; Vf. findet ein solches in Epithelfranzen der betreffenden Stelle bei Amph. u. Rept. (besonders bei Chelonia), an-

deutungsweise bei Vögeln u. auch an Embr. von Säugern. Anat. Anz. II, 549—51.

J. Beard, the parietal eye in fishes. Während bei den Fischen sonst die Epiphysis keine Ausbildung als Auge erkennen lässt, sah Vf. bei *Petromyzon (planeri)* u. *Myxine* Strukturen, die einer Retina vergleichbar sind; bei der Larve (*Ammocoetes*) sind sie wenig entwickelt. Bei *Ptr.* ist eine Pigmentschicht u. e. weisser Fleck der Haut vorhanden, bei *Myx.* nicht; eine Linse fehlt beiden. Das Organ ist also auch hier schon rückgebildet. Nature (London) Vol. 36, 246—8, (1 Xyl.) u. 340—1.

C. Julin, de la signification morphol. de epiphyse (glande pinéale) des vertébrés, I. L'épiph. des poissons. Bull. scient. de la France et Belg. (2) X 55—65.

M. Léger „anomalie du cercelet d'un *Alopias vulpes*“. Ein Expl. von 4 m zeigte gestielte unsymmetr. Fortsätze des Kleinhirns, die Verf. für abnorm hält, weil einem Ex. von 3 m diese fehlten; unsymm. war dessen Klh. indess (wie oft bei Selachiern) auch, der Haupteinschnitt diagonal. Bull. soc. philom. Paris (7) XI 160.

Onodi, „Neurolog. Mitth.“ Nach Verf. trennen sich im Kopfteil der Vertebraten [meistens] keine sympath. Ganglien mehr ab, sie sind aber morphologisch bei den Selachiern in den Ganglien der Kiemennerven zugleich mit den Spinalganglien enthalten. Der Trigemini u. der Oculomot. enthalten [gesonderte] symp. Ggl.; der Trg. führt im Stamm von allen drei Äesten ansehnliche Ganglienmasse (bei *Mustelus*); makrosk. erkennbar werden diese als Ganglion an der Abgangsstelle der R. ophth. prof. (Wijhe hält dies mit Unrecht für ein Spinalg.). Ebenso erscheint eines am Oculomot. (auch dieses symp. G.); letzteres variiert bei *Must. laevis* ausserordentlich, kann einfach od. doppelt sein, in oder ausserhalb des Ocm. liegen, auch auf den Ast des M. obl. inf. übergehen. Bei *Galeus* u. *A.* gehen von ihm Äeste zu den Gefässen, was bestimmt für seine symp. Natur spricht. Verf. untersuchte 26 *Selechier*-Species (vergl. Bericht 1886, S. 253), das G. ciliare (d. h. G. des Oculomot.) war makrosk. nur bei 3 Sp. nachweisbar. Die Ergebnisse über ventr. Vaguswurzeln (1886) werden resumiert. Arch. für Physiol. Jg. 87, 357—63.

J. Beard, „Ciliary or motoroculi ganglion and ganglion of the ophthalmicus profundus in sharks“. In der bisherigen embryol. Litteratur sind 2 Ganglien nicht auseinander gehalten worden, 1, das G. des ophthalmicus profundus, welches an der Haut als Suprabranchialgangl. entsteht, später aber dem G. Gasseri sich dicht anlegt, vom Vf. jetzt als *G. mesocephalicum* bezeichnet (= *G. ophthalmicum* Hoffm. der Name ophth. ist aber synonym mit ciliare; *G. cil.* Remak, Schwalbe, Marshall, His, Wij., Beard, Dohrn) und 2, das G. ciliare (= oculomotorii Wijhe, ciliare Hoffm.), welches viel später sich entwickelt als das G. mesoc., u. wohl mit Recht dem Sympathicus zugerechnet wird. Hoffm. lässt (bei Reptilien) das G. cil. nach Art symp. Ganglien vom G. mesoc. aussprossen, doch sind seine Abb.

nicht beweisend; bei *Acanthias* wurde es zuerst am untern Ast des Oculomot., nahe dem M. obliq. inf. beobachtet. Untersucht wurden *Torpedo oc.* u. *Acanthias*. Anat. Anz. II 565—75, 5 Xyl.

A. Froriep, „Homologon der Chorda tympani bei niederen Wirbelth.“ Bei *Torpedo ocell.* (embr. Stad. L nach Blfr.) erkennt Vf. dies Homol. in dem von Stannius als R. mandib. ext. bezeichneten Ast des Facialis der Plagiost. Von den 3 Aesten des Fac.: Portio fac. des R. ophth. supf., R. buccalis u. einem hinteren (mit dem sog. Stamm des Fac., dem R. hyoid, gemeinsam entspringenden), dem R. mand. ext., die jeder aus e. besonderen Portion des Gangl. entspringen, versorgt jeder e. bestimmte Partie als Hautsinnesast, nämlich bezw. die Orbitalregion, den Obkfr. u. den Untkfr. Da der R. m. ext. genau wie die Ch. t. bei Säugethembr. unterhalb der 1. Visceralspalte (Spritzloch) vom 2. Viscbog. auf dem 1. (Untkf.) hinüberzieht, und auch gleichen Ursprung wie jene hat, so ist er zweifellos der Ch. tymp. homolog. nicht aber der Ram. praetrematicus des Fac. (Balf.). Die ursprüngl. Bedeutung der Chorda wäre mithin die gewesen, als Hautsinnesnerv zu fungiren (bei *Torp.* versorgt der R. m. ext. den sog. Schleimkanal des Untkf.). Anat. Anz. II 486—93, Xyl.

Ch. Julin, le système nerveux grand sympathique de l'*Ammocoetes* (*P. planeri*). 1, Die versch. Eingeweide bergen in ihrer Wand zahlreiche Ganglienzellen, öfter zu Ganglien verschmolzen (*G. sympathica profunda*). Diese Nerven Elemente sind zu einem Plexus vereinigt, der (bei Darmcanal u. Herz) in Verbindung steht sowohl mit den Endästen des Vagus als mit d. Spinalnerven; dies sind Langerhans u. Owsj.'s Herz- u. Darmplx., die ihnen als ausschliessl. Repräsentanten des symp. Nervensystems gelten. Die Nplx. der andern Eingeweide sind nur mit dors. u. ventr. Spinnalnerven verknüpft. Embryol. Untersuch. müssen zeigen, ob diese viscer. Nplx. wirklich unabhängig vom Centralnervensystem entstehen (*Onodi 1886*); sicher giebt es für Pl. card. u. intest. bei *Ammoc.* noch weitere Verbind. mit dem Cnsyst. (geg. Ows.). — 2, Mit den Spinalnrv. treten diese viscer. Nplx. mittelst sympathischer Ganglien (*G. superficialia*), welche rechts u. links von der Aorta, zw. Aorta u. Vena card., liegen, und von denen je 1 Paar für jeden dors. u. ventr. Spinnrv. existirt, in Verbindung. Für die *G. symp. supf.* einer Seite unter sich giebt es keine Längsbrücken, u. für *Ammoc.* also keinen symp. Nrvstrang. Da nach Balf. u. *Onodi* dieser Strang bei allen Wirbelth. sich secundär entwickelt, so folgt, dass die Anordnung des symp. Nrvsyst. bei *Amm.* eine primordiale ist. — 3, Da die Elemente des symp. Syst. bei *Amm.* Verknüpfung haben ebenso wohl mit den dors. als den ventr. N. spin., so ist es sehr wahrsch., dass die motorischen u. die sensiblen Elem. dieses Systems bei *Amm.* getrennt sind, wie es sehr wahrsch. auch bei den N. spin. der Fall, indem die N. sp. dors. ausschliesslich sens., die N. sp. v. aber mot. sind. — Anat. Anz. II. 192—201.

Vergleiche üb. Nervensystem: Wilder, Benutz. des Nvs. zur Classification, s. Allgemeines (S. 273); Fritsch, Gehirn u. Nerven bei Malopter. (s. Systematik); Zograff, Gehirn d. Acipens. (Syst.); Wiedersheim, Geh. v. Tetrodon (Syst.); v. Lendenfeld, Innervirung der Leuchtorg., Geh. u. Trigem. des Echiost. (Stomiat.) mit e. Lobus phosphorius (s. Haut, S. 274); Parker, Abb. des Geh. v. Carcharodon (Syst.); Wilder, Geh. v. Ceratodus (Syst.); Ryder (Fig. 174) Längsschnitt des Geh. eines 10-täg. Ictalurus (s. Entwickl.); Vaillant, Medulla oblong. bei Bathypterois mit Knoten (s. Syst., Scopelidae); Shipley, Entwickl. d. Nerven bei Petromyzon (s. Entwickl.); Gegenbaur, Metamerie der Kopfn. (s. S. 277); Dohrn, ein Ast des Facialis, der später mit dem Glossoph. communicirt, geht anfangs bei der Petromyzon-Larve statt dessen an die Haut (s. Entwickl.); Gegenbaur, Austrittsloch des Hypogl. (s. S. 280); Ryder, Proplexus und Postpl. d. Gliedm. (s. S. 282); Guitel, Nerven der Extr. von Lepad. (s. Syst., Gobiesoc.).

Sinnesorgane. J. Waldschmidt, Zentralnervensyst. u. Geruchsorgan von Polypterus bichir. Das Geruchsorgan ist von Wiedersheim (Lb. vergl. Anat., 2. Aufl. 380) und von Wehmer (nicht publicirt) untersucht worden. Die Höhlungen sind allerdings (wie auch der Nerv ungewöhnl. entwickelt ist) complicirt, aber alle stehen im Zusammenhang, einschliesslich das „Nebenriechorgan“, das auch eines besondern Nerven ermangelt; da es ausserdem nicht mit der Mundhöhle communicirt, kann es nicht als Jacobson'sches Organ gedeutet werden. Blaue'sche Geruchsknospen sind vorhanden. Der Riechnerv hat 3 Wurzeln. Anat. Anz. II 308—11, 2 Xyl. (vergl. S. 286).

R. Wiedersheim, „Ueber rudimentäre Fischnasen“. Beschreibt zunächst Tetrodon-Arten mit gespaltenem Nasententakel (hispidus, immac., nigrop.) [diese Sp. gehören nach Gth. zum Subg. Arothron, mit ungeschlitztem Tent., während e. geschlitzter nur beim Subg. Crayracion vorkommen sollte]. Die einander zugekehrten Flächen der 2 Zipfel sind mit netzförmig verbundenen Leisten besetzt; Vf. sah ganze Nester von Nervenbügeln, wie sie aus der Haut der Fische hinlängl. bekannt sind und wie sie von Blaue auch im Geruchorg. vieler F. nachgewiesen wurden. Bei T. pardalis [subg. Gastrophysus] fand Vf. in der Höhlung des Tent. klappenartige Hautbildungen ebenfalls mit Nervenbügeln, ebenso bei Diodon macul. Bei Tetr. papua [sub. Anosmius, ohne sichtbare Nasentent. od. Grube], zeigt ein schwarzes Fleckchen die Stelle an, wo der hier sehr verkümmerte Nerv endet, anscheinend ohne spezifische Geruchsorganisation. Bei allen Sp. fehlt eine eigentliche im Schädel versenkte Riechgrube u. der Riechnerv ist durch die starke Entw. der Kiefermuskulatur in die Höhe gedrängt dicht bis an die Haut. Anat. Anz. II 652—7, 4 Xyl.; auch in: Festschrift für v. Kölliker, mit Tafel (s. bei Muskulatur S. 285).

Vergleiche über Nase: Gegenbaur, Blaue's Ansicht kritisirt (s. S. 279); Moseley, N. olf. u. Riechhaut fehlt bei *Ipnops* (s. S. 276).

Schiefferdecker, „üb. d. Fischauge“. Findet bei *Leuciscus* („Plötze“), *Esox* u. (?) *Clupea alosa* („Maischolle“) die Retina im obern Theil besser entwickelt, viell. wegen besserer Ernährung durch die benachbarte Chorioidealdrüse. Bei *Leuc.* wird das Pigmentepithel glänzend. Bei *Esox* u. *Cypr. carpio* liegt im ob. Theil der Cornea eine Zahl gelber Pigmentz., welche die Farbenwahrnehmung beeinflussen dürften. Anat. Anz. II 381 (11 Zeilen).

H. Virchow bemerkt hierzu, dass eine Fovea centr. von *Synathus* bekannt sei, u. dass die Chordr. die Ernähr. der Stelle nicht vermehre. Ebd. S. 382.

J. P. Nuel, développ. phylogénétique de l'organe visuel des vertébrés. Die geringere Ausbildung der Kopfbeuge lässt bei Embryonen von *Petromyzon planeri* erkennen, dass der Ursprung des N. opt. ursprüngl. hinter dem Infundibulum liegt u. somit ist der N. opt. einem Spinalnerven homolog u. der 1. Cerebralnerv, das zugehörige Intervertebralganglion ist die Retina, die Linse entspricht dem Sinnesepithel. Arch. de Biol. VII 389—409, 3 Xyl.

Vergleiche über Auge: Beard, Parietalauge (s. S. 287); Smith, am Auge des *Lepadogaster* ein ?Schutzorgan oder ?Reflektor (s. Syst., *Gobiesoc.*); über das Fehlen des Au. bei *Ipnops*, s. Moseley (S. 279), Lendenfeld (S. 274) u. Günther (Tiefseef., geogr. Verbr.).

Gefäßsystem (nebst Thymus u. Thyreoidea). H. J. Hamburger, durch Salz- u. Rohrzucker-Lös. bewirkte Veränder. der Blutkörp. Vf. findet bei *Tinca*, dass das Serum gleichwirkend mit einer Na Cl-Lösung von 0,936 Proc. ist; beide müssen mit 145 V. Pr. Wasser verdünnt werden, um Haemoglobin ausziehen zu können; die Plasmolyse ist ähnl. wie bei Vogel- u. Amphibien-Blut und der Pflanzenzelle; bei Säugerblut bewirkt weder Verdünn. noch Concentration Plasm. Arch. für Physiol. (A. f. A. u. Ph., Abth. Phys.) Jg. 87, S. 42, Tf. 1, Fig. 39—50.

C. J. Eberth, „z. K. der Blutplättchen bei d. nied. Wirbth.“ Auch bei Fischen (die bisher nur Loewit 85 hierauf untersuchte) gibt es Blutk. der 3. Sorte, die sich durch Farblosigkeit von den farbigen, durch nichtamöboide Form von den weissen Blutk. unterscheiden; sie sind leicht veränderlich und bilden durch Klebrigkeit gern Zellhäufchen und Thromben. Herkunft unsicher. Sind nicht (Hayem) werdende farbige Blutk. Abb. des Blutes mit diesen kernhaltigen Spindeln aus *Leuciscus*, Tf. II f. 1, 2, 3. Festschrift, A. v. Kölliker gew. von s. Schülern, Leipzig, 1887, S. 35—48.

D'Arcy W. Thompson, „Blutkörper der Cyclostomata“. Die rothen von *Myxine* sind 26 μ lang, 10 br., 3 dick, der Kern leicht färbbar, rundl. od. stabf. (also ähnl. anderen Fischen), die weissen so gross wie die menschlichen, fast ebenso zahlreich wie die rothen,

mit grossem Nucleus. Die r. von Petrom. mar. sind kreisf., 12—14 μ Durchm., Kern klein, excentrisch, schwer färbbar; die w. Bltk. sind 3—4 mal so zahlr. als die r., Nucl. klein; Uebergänge zu den rothen scheinen vorzukommen. Merkwürdig ist, dass (nach Shipley) die *Ammocoetes* noch ovale r. Blkp. besitzen wie *Myx.* Weisse Bltk. sind bei Fischen sonst sehr gering an Zahl. *Ann. Mag. N. H.* (5) XX, 231—3; auch in *Anat. Anz.* II, 630.

J. C. Ewart, *Presence of Bacteria in the lymph etc. of living fish and other Vertebr.* Vf. beschränkt die Angaben von Olivier u. Richet (C. r. 1883, Febr., Sept.), wonach nicht nur die Lymphe, sondern auch Blut u. alle Muskeln etc. u. zwar bei allen Species *Bact.* enthalten, dahin, dass normal höchstens die Bauchhöhle u. die benachbarten Theile inficirt seien, bei der Forelle und einigen Seef. (*Raja*, *Acanthias*, *Lophius*) fand Verf. selbst die Bauchh. frei. Die *Bact.* stammen aus dem Darminhalt. In wärmerem Wasser lebende F. haben mehr *Bact.* Viell. veranlasst diese Unbequemlichkeit das period. Wandern in kälteres Wasser. Die *Bact.* scheinen nicht zu den Fäulnisb. zu gehören. Bei gesunden Amphibien, Rept., Vögeln u. Säugern, fand Vf. weder *Micrococcen* noch *Bact.* in den Bauchh. Die Fische zeichnen sich also hierin aus. — *Pr. r. soc. Edinb.* XIV, 262—70. Vf. citirt: *Ichthyopathologischer Jahresber. d. Münchener Thierarznei-Schule* 82/83. Auszug: *Nature*, Vol. 36, 251.

J. E. V. Boas, „Ueb. d. Arterienbogen der Wirbelthiere“. Bei allen Classen sind 6 Artbg. anzunehmen, der 5. ist nur bei Säugern noch nicht nachgewiesen; das 3. Paar liefert die Carotiden, das 4. die Aorta, das 6. die Lungenarterien. *Morph. Jahrb.* XIII, 115—8, Taf. I (Fig. 1: *Ceratodus*).

P. Mayer, „über d. Entw. des Herzens u. der gross. Gefässstämme bei den Selachiern“. *Unters. Pristiur., Scyll., Mustelus, Torp., Raja.* Die Vena subintestinalis legt sich doppelt an (geg. Balf.), wie die Aorta. Da bei niederen Würmern die Gefässe auch doppelt sind, so entsteht damit für d. Ableit. der Vertebr. von Würmern kein Hinderniss. Die Auffindung von metamerischen Anastomosen zw. Venen u. Aorten im Embryo der Sel. stützt sie sogar. Das Herz tritt zwar bei Sel. ontogen. als einfaches Organ auf, wenigstens für das theoret. wichtigere Endocardium; indess ist, da dicht vor u. hinter dem H. die Gefässe typisch doppelt sind, wohl auch das Herz urspr. doppelt gewesen (wie bei höh. Vertebr.). Das erste ont. Auftreten des Gef. syst. erfolgt am hinteren Rumpf, und zwar erscheinen zuerst die dem Darm anliegenden Gef., die V. card. viel später. *Mitth. zool. Stat. Neapel*, VII, 338—370, Tfl. 11, 12.

Ch. Julin, „des origines de l'aorte et des carotides chez les Cyclostomes.“ *Aei Ammocoetes* tritt die Car. interna jederseits aus der 1. V. branchialis hervor, kurz vorher ehe diese sich mit der gegenseitigen V. br. zur Bildung des Aorten-Anfangs vereinigt; die C. int. versorgt die dorsale Hälfte der Kopfregion. Die C. externa entspringt jederseits schon unten aus dem Anfang der 2., 3. u.

4. Kiemenvene; sie lagert, von der gegenseitigen C. ext. getrennt, am Boden der Kiemenhöhle; die 2 C. ext. versorgen die ventrale Kopfreion. Die Aorta entsteht aus dem Rest der 1.—4. V. br. u. aus der ganzen 5.—8. V. br., sie ist von vorn (Ohrkapsel) bis zur Schwanzspitze einfach. — Die Art. br. und die V. br. schliessen sich bei den Petromyzontidae an die Kiemenbögen an, d. h. sind 8, bei den Myxin. dagegen an die Kiemen-Säcke u. entsprechen hier der Zahl der Säcke. Bei Petr. fluv. vereinigen sich die 2 Car. int. auf eine kurze, bei Bdellost. u. Myxine auf e. lange Strecke u. bilden dann (aber nur scheinbar) e. Fortsetzung der Aorta. Die C. externae beim erwachs. Petrom. sind noch unbekannt (viell. ähnl. wie bei Amm.), was J. Müller u. Rathke dafür hielten, sind nur Zweige der C. int.; bei Bd. u. Myx. entspringt die C. ext. ähnlich wie bei Amm. von der Basis der Venae branch. Anat. Anz., II, 228—38 (4 Xyl.).

F. Hochstetter, „Beitr. zur vergl. Anat. u. Entwicklgesch. des Venensystems der Amphibien u. Fische“. Injicirte mit Teichmann's kalter Kittmasse; Forellenembr. lebend beobachtet, zuweilen auch Schnittserien. Untersuchte Selachier (bei Triest): *Acanthias*, *Mustelus*, *Scyllium*, *Squatina*, *Raja* (schulzii, miral., clav.), *Trygon past.*, *Myliob. aq.*, *Torp. marm.* Ferner: *Acip. sturio* u. *Teleostei*: *Anguilla*, *Esox*, *Salmo*, *Tinca*, *C. carpio*, *Chondr. nasus*, *Phrynorhombus*, *Platessa*, *Solea*, *Crenilabrus*, *Serranus*, *Uranosc.*, *Scomber*, *Cepola*, *Lophius*, *Mugil.* — Ein Nierenpfortadersyst., zu dessen Bildung auch die Caudalvene sich auflöst, ist bei allen Sel. u. vielen Tel. vorhanden. Die Sel. zeichnen sich durch Sinusbildungen u. Communicationen an den grossen Venenstämmen vor den Tel. aus, am einfachsten ist hierin *Acanth.* u. *Squat.* Eine Verbindung zw. Lebervenensinus u. Cardinalvenen (*Raja*) ist der erste Anfang zur Bild. einer Vena cava. Für die Tel. kommen Jacobson's Angaben (von Cuv. u. Owen verworfen, von Hyrtl u. Jourdain aber bestätigt) voll zur Geltung. Für dessen 3. Fall, Verb. der Caudv. mit Pfortader, giebt Tinca ein Extrem, indem diese Communicationsvene schon hinten im Schwanz selbständig wird; die Caudv. geht mit dem Hauptast direkt in die Cardv. über, ein 3. Ast löst sich in der Niere auf. Asymmetr. Bildung der 2 hint. Cardinalv. ist bei Tel. die Regel. — Entw. bei Selach.: Zuerst erscheint die Subintestinalvene, hinten als Caudalvene beginnend, die Caudv. verliert dann diesen Zusammenhang u. geht gabelförmig in die 2 neugebildeten Cardinalv. über, anfangs direkt; später beim Andrängen des Mesonephros bildet sich in diesem das Capillarnetz zw. Caudal- und Cardv. Die Subintestv. ist inzwischen zum Lebercapillarnetz zerfallen. Sinus u. Communicationen im Vorderleibe entwickeln sich später. Entw. bei Tel.: Bei *S. salvelinus* fand Vf. in manchen Bruten fast jeden Embryo mit 2 symmetr. Dottervenen, bei den andern Bruten dagegen fast jeden (Tf. IV, Fig. 10) nur mit einer (linken) Dottv. versehen, das Gefässnetz schiebt sich in letzterem Falle ventral über die Mittellinie nach der rechten Dotteroberfläche hinüber. Arterien treten nicht in die Dottersack-circulation ein (gegen Vogt, dessen Angaben üb. *Coregonus* sonst

meist bestätigt werden), während bei Selach. ein Aorta-Ast zum Dotter geht. — Die Vertretung der schwindenden Subintestv. durch die Cardv. ist bei den Tel. am vollständigsten, bei Sel. bleiben Spuren der Sbintv., bei Petromyzon bleibt dieselbe ganz bestehen. Amphioxus (mit bleibender Sbintv. u. ohne Cardv.) und andererseits Lepidosiren (ohne Subintv. u. ohne Cardv. aber schon mit V. cava inf.) weichen ganz von den typ. Fischen ab. Morph. Jahrb. XIII, 119—172 (auf Fische bez.: Xyl. 1—4, Tf. II, 1—3, IV, 10).

T. Jeff. Parker, Blood-vessels of *Mustelus antarcticus*; a contr. to the morph. of the vasc. system in the Vertebr. Behandelt auch *Scymnus lichia* u. *Callorhynchus*. Zahlr. Communicationen zwischen Arterien: zw. link. vord. u. r. hint. Carotis u. entsprechend symmetrisch, ferner zw. den 2 Art. branch. effer. jeder Vollkieme, sodann zw. der von der A. subcl. abzweigenden und dann ganz ventral, unter dem Truncus arter. liegenden A. hypobranch. u. den Artt. branch. effer. Noch zahlreicher sind die Comm. zw. Venen, die überdies reiche Sinus erzeugen: Hyoidsinus communicirt mit V. jugularis, der jug. inf. u. mit dem Sinus der Gegenseite; die 2 Venae card. mit einander u. mit der V. portae; die lateralen V. mit einander, die Cloakalvenen desgl.; die vordere ventrale Hautv. geht vorn in die laterale V., hinten in die V. iliaca; die laterale Hautv. comm. vorn mit der V. subscap. u. hinten mit den caudalen u. dors. Hautvenen. Ein Nierenpfortader-System besteht auch bei den Selachiern. Die Entwickl. der Kiemenarterien, die Derivate der embr. Subintestinalvene, die Homologie der Lateralvene mit der V. epigastr. der Amphibien etc. werden behandelt. Philos. trans. roy. soc. Vol. 177, part 2, p. 685—732, Taf. 34—37, Xyl.

T. J. Parker, Bem. zu: „Blood-vessels of *Mustelus antarct.* (Phil. Trans. 86)“. Auch bei M. ant. existirt die Anastomose zw. den 2 Orbitasinus, der Interorbitalsinus, wie bei *Scyllium*, er ist aber nur 1 mm dick (bei e. Expl. v. 1 m). Proc. r. soc. Lond., Vol. 42, 437.

G. E. Laguesse, développ. de la rate des poiss. oss.; C. r. soc. de Biol. (Paris) (8) IV 458—60.

Vergleiche über Gefäßsystem: Coggi, Gef. u. rothe Körper der Schwimml. (bei Darmcanal); Ryder, Dottergef. v. *Gastrosteus* (Entwickl.); Stuhlmann, Uterusgef. des *Zoarces* (Generationsorg.); Günther, Gef. an Darm u. Schwimml. v. *Neobythites* (Syst., Ophidiidae); Zograf, Klappen des Con. art. von *Acipenser* (Syst.); Parker, Herz v. *Carcharodon* (Syst., Squali); Günther, Con. art. von *Chlamydosel.* u. *Centroph.* (Syst., Squali); Dohrn, Gef. u. Thyreoida v. *Petromyzon* (bei Entwickl.).

Darmkanal u. Schwimmblase. Fr. Decker, „zur Physiologie des Fischdarms“, unters. *Esox*, *Perca*, *S. fario*, *Anguilla*, *Lucioperca*, *Tinca*, *Leuc. cephal.*, *Abr. brama*, *C. carpio*, *Barbus*, *Cob. foss.* Vgl. findet: 1, Nicht nur die Magenschleimhaut, sondern auch der Oesophagus, der Mittel- u. Enddarm, die Cloake u. die App. pylor. geben

mit 0,1% Salzsäure ein Extract, das auf Fibrin verdauend wirkt, also ein dem Pepsin ähnliches Ferment enthält. 2. Bei Fischen ist die Absonderung dieses Ferments nicht an eine cubische oder conische od. polyedrische, als Haupt- oder Belegzellen anzusprechende Zellform gebunden, sondern kann ebenso von schmalen, cylindrischen, während der Sekretion möglicherweise Becherzellenform annehmenden Zellen der Oberfl. einer drüsenlosen Schleimhaut vollzogen werden. 3. Das Fibrin wird nicht nur gelöst, sondern auch in Peptone übergeführt. — Festschr., A. v. Kolliker gew. von s. Schülern, Leipz. 1887, 4^o, S. 387—411.

E. Bornand, *ét. histol. des nerfs et de la muqueuse buccale chez les poissons*. Die Mucosa buccalis enthält ausser gewöhnl. Epithelz. u. Schleimz. (offenen u. becherf.) auch Stäbchenzellen, die aus e. epithelialen Nervennetz her versorgt werden. Bull. soc. Vaudoise (Lausanne) 2, Vol. 23, p. 6—19, Taf. 2.

A. Coggi, „corpi rossi della vescica natatoria di alc. Teleostei“. Vf. untersuchte das Epithel, welches die „rothen Körper“ der Schwimmblase an der Innenfläche der Schwbl. überzieht. Dasselbe ist ein gleichmässiger dünner Belag bei Cyprinus, Esox, den Murænidæ u. den Verwandten (d. h. dem 1., 2., 4. Typus Müller's): „nichtepitheliale r. K.“; es erscheint dagegen in der Umgebung der r. K. verdickt, gefaltet u. mit den auf die Wundernetze folgenden Gefässen durchsetzt bei den Formen vom (3.) Perca-Typus M.'s.: „epitheliale r. K.“ Anfangsstadien dieser stärkeren Ausbild. des Ep. zeigen die Scombresoc., Mugil., Gobiidae, mittlere Stadien die Triglidae, Gadidae, Scopel., Plectognathi u. Lophobr., höchste die Labridae, Perc., Dentex. Letzterer hat im mehrschichtigen Epth. Riesenzellen (üb. 100 μ Durchm.). Mitth. zool. Stat. Neapel VII, 381—400, Taf. 14.

L. Charbonnel-Salle, *Recherches expérim. sur les fonctions hydrostatiques de la vessie natatoire*. Vf. bestätigt die Ergebnisse A. Moreau's (1876), wonach Borelli's Theorie, die noch immer in Lehrbüchern sich hält, falsch ist. Vf. befestigt am Rücken des Fisches eine ihn hebende Blase mit Luft u. am Bauche ein Gegengewicht, das entweder zu leicht oder zu schwer ist, so dass der Fisch sich gezwungen sieht, nach Kräften bezw. abwärts oder aufwärts zu streben. Wird der Luftdruck innerhalb der Blase durch ein nach aussen geleitetes Rohr (Trocart u. Gummischlauch) manometrisch (mit Registrirapparat) gemessen, so findet sich, dass der Fisch weder durch Compression noch durch Druckminderung das Volum der Blase zu ändern trachtet. Dieses V. ändert sich allerdings bei verschiedenem Niveau je nach der Höhe der Wassersäule, aber genau so, wie es in der Blase über dem Rücken, deren Druck auch manometrisch registriert wurde, sich ändert, d. h. also nur passiv, nicht durch Muskeldruck. Scharfe Biegungen des Körpers können die Blase comprimiren, haben aber wegen kurzer Dauer der Compression keinen Einfluss auf Steigen und Fallen des Thieres. Bei Fischen mit

getheilter Blase (Tinca) finden Druckveränderungen in beiden Abtheilungen gleichzeitig statt (mit 2 Trocarts constatirt), sodass ein Heben oder Senken des Vorderkörpers durch diese Theilung (J. Müller) nicht erzielt wird. Unters. an Perca, Esox, Anguilla; Schwimmblasen mit besonderen Muskeln viell. physiol. verschieden. *Annales des sc. nat.* (7) II 303—331 (6 Xyl., Curven).

M. Traube-Mengarini: Gase der Schwimmblase der F., I. Nur Uebersicht. d. Litteratur. *Atti r. acc. dei Lincei*, Jg. 284. (4) *Rendic.* III. 2. Sem., p. 55—62.

Günther, Tiefseefische, Chall.-Rep., Zool. Vol. XXII 172. Die Schwimmblase von *Gonostoma denud.* hat keine Communication mit dem Darm, obgleich die Gatt. zu einer Physostomenfam. (Sternopt.) gehört, ist sehr entwickelt, mehrere Muskeln setzen sich an sie; Magen lang, blindsackartig; Coec. pyl. 7, kurz. Aehn. Muskelapparat zur Gascompression auch an der Schwbl. von *Photichthys* (Fam. Sternopt.), p. 178.

H. Corblin, Rech. sur la locomotion du poisson et sur la fonction hydrostatique de la vessie natatoire. Vf. kommt zu ähnl. Resultaten wie Charb.-Salle. *C. r. soc. de biol. (Paris)*, (8) IV 652—4.

Vergleiche üb. Darmk. u. Schwimmbl.: Krukenberg, Harnstoff in der Leber (bei Niere); Günther, After (abnorm?) weit vorn bei *Trachichthys trailli* (Systematik, Berycidae); Günther, Abb. des Darmk. v. *Scombrops* (Syst., Percidae); Stuhlmann, Darmk. des Fötus v. *Zoarces* (s. Generationsorg.); Guitel, Schwimmbl. wird bei *Lepadog.* anfangs zwar angelegt, fehlt aber später (Syst., Gobiesoc.); Günther, Darm u. Schwimmbl. der *Notacanthini* (s. Syst.), desgleichen v. *Neobyth.* (Syst., Ophidiidae), ferner von *Bathysaurus ferox* u. *Bathypterois* (bei *Scopelidae*), von *Bathytroctes* (bei *Alepocephalidae*), von *Halosaurus* (bei *Halosaur.*); Cunningham, die Schwimmbl. v. *Clupea sprattus* öffnet sich hinten nach aussen (s. Generationsorg.); Iwanzow, Darmk. u. Schwbl. von *Scaphirh.* mit Abb. (Syst., Acipens.); Zograff, Zähne der Knorpelganoiden (ebd.); Parker, Darmk. von *Charcharodon* (Syst., Squali); Günther, Darmk. v. *Chlamydoselachus* u. *Centrophor.* (ebd.).

Athmungsorgane. Metamerie d. Kiemenbögen u. Zurückweisung der zahlreichen hypothetischen Kiemenspalten, s. Gegenbaur (Skelett, S. 277). — Athmung des *Protopterus* in seiner Cyste, s. Wiedersheim (Systematik). — Athm. des Fötus von *Zoarces*, s. Stuhlmann (Generationsorgane). — Verkümmern der Kiemenblättchen bei Tiefseef., s. Günther (Geogr. Verbreit.).

Niere, Nebenniere. C. Fr. W. Krukenberg. „Die Harnstoffretention in den Organen der Rochen und Haie“. Die Menge des Harnstoff ist in den Muskeln meist grösser als in den Nieren, die rothen Muskeln sind kaum ärmer daran als die weissen; die Leber hält nur wenig Hst. zurück, die elektr. Organe sehr viel, z. Th. in leicht-

gebundener Form. Schon der Dotter der Eier u. junge Embryonen zeigen hohen Gehalt. Centralbl. f. d. mediz. Wiss. 1887, No. 25, 5 S.

Vergleiche über Niere: Günther, einzelnes üb. die äussere Erscheinung in Challenger Report. Zool. XXII; Iwanzow, Abb. der Niere etc. von Scaphirh. (s. System. Acipenser.); Ryder, Spinndrüse v. *Gatosteus* (s. Entwickl.); Hochstetter, Blutlauf der Niere (s. Gefässsyst.); Beard, ektod. Entwickl. des Vornierengangs (s. Entw.); Brook, desgl. bei *Salmo fario* (ebd.).

Generationsorgane (Hermaphroditismus, sekundäre Geschlechtscharaktere). F. Stuhlmann, „z. K. des Ovariums der Aalmutter (*Zoarces vivip.*)“ stellt an Embr. von 3,4—5,8 mm fest, dass das Ovarium (mit Rathke) als ein aus 2 seitl. einzelnen Ov. verschmolzenes zu betrachten ist, u. dass der Hoden sogar noch deutlich die Trennung in 2 Theile zeigt (p. 9). Das Hinterende des Ov. geht histologisch so allmählich in den Oviduct über, dass eine gesonderte Entstehung beiden unwahrscheinlich ist (p. 10). — Die Granulosazellen sind keine Wanderz., sondern Z. des Keimepithels. Die jüngsten Eizellen sind bei Pikrokarmine-Haematoxylinf. als solche schon durch röthliche Färbung des Kerns, während die Kerne des Keimepithels blau sind, erkennbar (p. 12). Festere, stark färbbare Partikel des Dotters („Dotterkern“ Schütz) werden weder vom Keimbläschen noch von der Granulosaz. geliefert, sondern bilden sich im Dotter selbst dicht neben dem Keimbl.; die eigentlichen Dotterpartikel erscheinen viel später. Die kleineren Nucleoli sind abgelöste Stücke des grossen. Zwei verschiedene Zonen des Eiplasmas (v. Bambeke, Ransom, His) sind bei *Zoarces* nicht vorhanden, wenn man nicht die Dotterkernlage als Grenze ansehen will (p. 17). Das Keimbläschen erhält (durch amöboide Bewegungen) Protuberanzen, die je einen der kleinen Nucleoli enthalten (p. 18). Auch die Dotterbildung geht im Innern des Eies (dicht neben der schwindenden Dotterkernzone) ohne Betheiligung des Follikelepithels vor sich (p. 23). Ob die Zona rad. von letzterem oder vom Ei stammt, bleibt zweifelhaft. Die Eier bilden sich beim embryonalen Z. auf Längsleisten des Ovars, bei den späteren Nachschüben aber nur in der Nähe der früheren Eier (p. 25). Die Zotten enthalten nur Gefässe, keine Capillaren, sind also Wundernetze (p. 26); die Gef. der Achse sind arteriell, die peripherischen venös (p. 30, gegen Rathke). Die Zotten des Ovariums sind entleerte Eifollikel, die nunmehr stark mit Blut durchströmt für die Ernährung der aus ihnen in die Ovarialhöhle getretenen Embryonen zu sorgen haben (p. 29). Die hier stark wachsenden Fötus verschlucken die Flüssigkeit der Ovarialhöhle; deren Serum wird im Mitteldarm verdaut, die zahlreichen Blutkörperchen aber erst in dem sehr entwickelten Enddarm (p. 40). Der zur Athmung des Fötus nothwendige Sauerstoff wird durch diese Blutk. geschafft (p. 41); die sehr geringe Menge der Ovarialflüssigkeit könnte für eine Kiemen- oder Hautathmung nicht genügen. Der Koth bleibt im Darm angehäuft. Das Verhalten der Harnsekretion

bleibt unaufgeklärt. Ein besonderer, hinterer Ovarialtheil, der für die Ernährung der Fötus secernirte, existirt nicht. — Abhdl. aus d. Gebiete d. Natw. v. Natw. Verein in Hamburg, Bd. X, 48 S., 4 Tfln., 4°.

J. T. Cunningham, „Development of the Oviduct in Teleosteans.“ Bei *Clupea sprattus* 5 cm l. entsteht neben dem Mesenterium ein Band; von dessen medianer Fläche entwickelt sich eine Falte, die auf der later. Fläche Eier ausbildet; eine Falte von der later. Fläche des Bandes wächst der Keimfalte entgegen, um die Höhlung des Ovars zu schliessen. Nach hinten zu verschwinden zuerst die Falten, dann auch die Bänder. Die Schwimmblase öffnet sich hinten links vom Anus. Bem. über unreifes Ovar von *Zoarces*. Pr. r. phys. soc. Edinb., sess. 116 (86/7), p. 342—5.

J. T. Cunningham, „The eggs and larvae of Teleosteans.“ 11 Sp. sicher bestimmbarer Arten beschrieben, wobei mehr der Systematik als der Histologie Rechnung getragen wird: *Clupea harengus*, *Salmo leuiscensis*, *Osm. eperlanus* (die äussere Schicht der Z. rad. stülpt sich um und wird zu einem haftenden Stiel), *Pleuron. platessa*, *flesus*, *limanda*, *cynoglossus* (die Entwickl. eingehender verfolgt), *microceph.*, *Gadus aeglel.*, *Cottus scorpius*, *Liparis mont.*, *Cyclopterus lumpus*. Ferner 3 pelag. Eier u. Larven beschr., deren Species unbekannt (wie vorige 11 von der schottischen Küste): Ei mit Perivitellarraum fast so dick als der Radius des Dotters, Dotter ganz homogen u. durchsichtig, Durchm. 2,1 mm.; Ei von 0,84 mm Dm. mit 1 Oelkugel (nahe am Schwanzende), wahrsch. *Motella* sp.; Ei etwas oval 0,97 mm l., Dotter ganz pellucid mit polyedr. Zerklüftung, ein ähnliches von Agassiz fälschlich als *Osmerus*-Ei beschr., nach Hensen (briefl.) viell. *Cl. sprattus*, nach Vf. viell. *Anguilla*. Endlich Eier (30 Fd., Golf von Guinea) 1,5 mm Dm. mit je 1 Schopf von Fäden, durch welche die Eier sich verbinden, am Gegenpol ein Büschel kurzer Fäden. Alle diese Objekte abgebildet. — Vf. giebt dann p. 108—130 e. Uebersicht über die bisher bekannten Eier u. Larven nach den Familien [Owsjannikow (85) nicht berücks.]. Bez. der *Scombresocidae* weist Vf. darauf hin, dass anscheinend der Anus der Larve dicht am Dottersack anliegt u. danach die Fam. nicht zu den Physostomen gehöre, sondern (mit Claus 1882) eher zu den *Anacanthini*. Bei *Esox* entwickeln sich die Bauchfl. nicht aus den ventr. Flossenfalten, welche noch lange nach dem Auftreten der beiden V. zwischen diesen fortbestehen [gegen die Thacher'sche Theorie]. Kein Physostome hat pelagische Eier, der Anus der Larve immer weit vom Dotter entfernt. Unter den *Anacanthinen* hat allein *Lota* sinkende Eier, aber deren Struktur u. die Larvenform stimmt mit denen der *Gadiden*. Bei den *Labridae* hat nur 1 Genus (*Crenilabrus*) *adhaesive*, die andere alle pelag. Eier; der Anus der Larve ist ein wenig von dem Dotter entfernt (wie auch bei *Temnodon*), aber lange nicht so weit wie bei den Physostomen; die Chorda ist immer bei ihnen multicolumnar. [Im Ganzen kennt man etwas über die Fortpflanz. nur bei 35 Familien.]. — Der Schlussabschnitt,

„Reifung u. Befruchtung des Teleostier-Eies“ (p. 130—3). Die erste Theilungsebene bei der Furchung geht nicht der Eioberfl. parallel (Hoffm.), sondern entspricht einer Meridianebene; Hoffm. wahrsch. optisch getäuscht. Der Austritt vom (1) Polkörper an Pleuron. limanda u. cynogl. beob.; er findet auch ohne vorherige Befruchtung statt, aber langsamer, dagegen aber keine Furchung ohne Befr. — Trans. roy. soc. Edinb., Vol. 33 p. 97—136, Taf. 1—7.

McIntosh, „The eggs of fishes.“ Eine Vorlesung, nichts neues. Abdr.: Bull. U. S. Fish C. VII, 58—62.

Fr. Raffaele, Uova e larve di Teleostei. I. Vf. liess pelag. Eier (Winter) sich entwickeln u. erhielt 30 mm l. Brut, *Clupea pilchardus*? II. Ei (oval, Sommer) u. Larve von *Engraulis*. Boll. Soc. di natur. in Napoli (1) I fasc. 1, p. 53—8 bez. fasc. 2, p. 83—84.

Rob. Scharff, Ueb. das intra-ovariale Ei einiger Knochenfische. Untersuchte *Gadus vir.*, aegl., lusc., merl., *Lophius*, *Salmo salar*, *Anarrichas*, *Conger*, *Blennius pholis*, *Hippoglossoides*, haupts. *Trigla gurn.*, weil diese im Ov. gleichzeitig alle Eistadien enthält, im St. Andrew's Marine Laboratory. Der Dotter lässt eine innere, dichter gekörnte Zone erkennen. Die Zone selbst wird wahrsch. auch durch Zutritt von Substanz aus dem Nucleus erzeugt, später wird diese Z. absorbiert u. der N. wird kleiner u. lässt jetzt keine Membran erkennen. In diese innere Z. treten Nucleoli aus dem Kern, die viell. bis zur Peripherie des Eies dringen, um die Nuclei des Follikel-epithels zu bilden; sie nehmen meist noch eine Hüllschicht aus dem Kern mit und täuschen dann Zellen vor [vgl. Owsiannikow, Bericht 85, S. 349]. Diese Bläschen mit ihrem Nucleolarinhalt sind die „Dotterkugeln“; bei der Reifung des Eies werden sie erst feinkörnig, dann durchsichtig (nun als „Oelkugeln“ bezeichnet?); in andern Fällen scheinen sie freilich von aussen her aus dem Follikel-epithel zu stammen (*Protopterus*, Beddard). Von Eimembranen beob. Vf. (am intraov. Ei) zwei, eine stärkere, festere, die *Zona radiata* (= Dotterhaut Aubert, Bedd., Cunn., Häckel, Eikapsel His etc., [äuss.] *Yolk-sac* Ransom, *Z. pelluc.* Eimer, *Chorion* Leuck., Rathke, Eischale Oell., Vogt), ihre Streifung ist in Präparaten nicht immer deutlich, wohl aber an frischen Obj.; bei *Tr. gurn.* ist sie 8 μ dick; zweitens eine gleichfalls gestreifte, halbflüss. schwächer färbbare, die *Zonoid-Schicht* (helle Randschicht Ggb.), die bisher als äussere Sch. des Dotters gegolten hat. Sie ist bei *Tr.* 25 μ dick, tritt vor den Z. r. auf u. verschwindet bei reifen Eiern, bei *Blennius* fehlt sie stets. Eine wirkl. äussere Dotterschicht kann ausserdem existiren (*Trigla*), viell. ist die *Zona* ihr Sekret. Die Nahrung des nachwachsenden Eies stammt von den Granulosazellen, sie geht zunächst zum Nucleus, dann modifiziert zum Dotter. Fortsätze von Granz. zur Z. r. sah Vf. nie. Bei *Blennius* strecken sich die Zellen der Granulosa auf einer Seite des Eies (statt 7 μ 32 μ dick) u. secerniren Schleim in eine dem Ei ringf. aufliegende Höhle. Die Follikelzellen entstehen schon ehe die Eimembran sich bildet, ob vom

Innern des Eies her oder aus Bindegewebe, ist zweifelhaft. Q. Journ. Micr. Sc. Vol. 28, p. 53—74, Tf. 5; Ausz. Pr. R. Soc. Vol. 41, Nr. 250, p. 447—9.

R. Scharff, Egg-membranes of oss. f., sieht bei *Trigla gurn*. innerhalb der Zona rad. eine deutliche Dotterhaut, welche die protoplasmatische Rinde des Eies (Periblast) überdeckt; viell. verhalten sich alle Tel. so. Die Z. rad. ist dann nicht als „vitelline membrane“ (Balf.) zu bezeichnen, sondern als Cuticularbildung zu betrachten. Die Z. r. von *Anarrhichas* spaltet leicht; die von *Gadus morrhua* ist zart u. scheinbar nicht porös. Rep. 56. meet. Brit. ass. adv. sc. (86), 698.

C. Benda, „zur Spermatogenese der Wirbth.“. In allen Wrbth.-Classen (incl. Selachii) finden sich im Hoden 2 morphol. u. funktionell verschiedene Zellarten, bei den Knochenfischen allein giebt es nur 1 Art. Mit Swaen u. Msq. nimmt Vf. an, dass die Samenfäden in dem „runden Z.“ entstehen u. durch „Kopulation“ mit den „Stützzellen“ oder „verästigten Z.“ zur Weiterentwickl. sich verbinden. Anat. Anz. II 369 (u. 358).

J. Brock, „üb. Anhangsgebilde des Urogenitalapp. von Knochenf.“. Nur bei *Plotosus anguillaris* u. *Copidoglanis albilabris* ist der dritrische Anhang zw. Urogenitalpapille u. After bisher gefunden worden. [Day bildet ihn aber auch bei *Pl. canius*, der andern bek. Art, ab; Cop. zieht Day mit *Pl.* zus.] Vf. findet (an jüng. Ex.) als Hauptmasse Blutgefäße (Venen-Erweiterungen), daneben glatte Muskfas., spärliches Bindegewebe; an der Oberfl. liegt Plattenepithel, das an dem Grunde der Grübchen einschichtig wird, u. unter dem eine Schicht Cylinderz. liegt, die Vf. als Drüsenz. ansieht. Das Organ ist ihm ein neuer, merkw. Typus von Hautdrüsen, mit typisch cavernösem Gewebe, das Erektilität besitzen muss. Es steht wahrsch. zur Geschlechtsfunktion in Beziehung, das Nähere aber unbekannt. Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. 45, S. 532—41. Taf. 25.

Vergleiche über Generationsorg.: Guitel, Eischale v. *Lepadog.* (s. System., *Gobiesoc.*); Ryder, Ei von *Gastrosteus* u. *Perca* (s. Entwickl.); Günther, Gener.-Org. der *Notacanthini* (s. Syst.); List, Ei u. Sperma von *Crenilabrus* (s. Entw.); Ryder, Eischale v. *Ictalurus* (Entw.); Günther, Gen.-Org. von *Bathytroctes* (*Alepocephalidae*) u. *Halosaurus* (s. System.); Eierstock u. Ei von *Engraulis* (s. Syst.); Möbius, Reifung des Ovar. u. der Testes bei *Anguilla* (Syst.); Günther, Gener.-Org. v. *Chlamydosel.* u. *Centroph.* (Syst., *Squali*); Weber, Fortpfl. v. *Myxine* (Syst.).

M. Weber, üb. Hermaphroditismus bei Fischen, 2. Mitth.; betrifft *Gadus morrhua*, *Scomber* sc., *Clupea* har. (s. System.). Vf. findet, dass bei derselben Gatt. die Form des Herm. eine Gleichartigkeit erkennen lässt. Tijdschr. Nederl. dierk. Vereen. (2) I 128—134.

Secundäre Sexualcharaktere, vergleiche: Steindachner, bei *Dules* (Systematik, Perc.); Facciola, Ruder der Bauchscheibe

bei *Leptopterygius* (Syst., Gobiesoc.); Hay, Verringerung der Zahl der Schlundzähne bei alten Männchen v. *Notropis lutr.* (Syst., Cyprinidae); Lidth, Copulationsorg. (Analıs) bei *Poecilia* (Syst., Cyprinodont.); Möbius, Paarungsfarbe bei *Anguilla* (Syst.).

Entwicklung.

Ontogenie. A. A. Böhm, „üb. d. Befruchtung des Neunaugeneies“. „1, Während der Reifung des Eies rückt das Keimbläschen, indem es grösser wird, gegen die Oberfläche empor, verbreitet sich am animalen Pole um das Pol-Plasma zu bilden (gegen Calb.), das während der Befr. eine aktive Rolle spielt. Die Membran des Keimbl. schwindet; der Keimfleck wird sehr chromatinarm. — 2, Nach der Imprägnation wird ein zweites Richtungskörp. gebildet. — 3, Während der Impr., Hand in Hand mit der Bildung der Dotter- (Befruchtungs-) Membran, umgiebt sich das Polpl. mit e. neuen, dicken, gefalteten Membran; sie scheint e. wesentl. Rolle zu spielen, indem sie den Copulationsact auf e. geringen Raum concentrirt. Sie schwindet nach der gesch. Copul. der Vorkerne. — 4, Das Polpl. mit den die Befr. bewerkstelligenden Elementen, rückt in die Tiefe des Eies, wobei ein dünner protoplasm. Strang die Hauptmasse des Polpl. mit der Oberfl. des Eies verbindet. Dieser Verbindungsstrang liegt in der Axe des Eies u. kommt in die Ebene der später einschneidenden, 1. Meridionalfurche zu liegen. — 5, Die Befr. wird dadurch eingeleitet, dass zuerst der männliche u. dann der w. Vorkern in Stücke zerfallen, die man mit dem Namen *Spermato-* resp. *Karyomeriten* belegen kann. — 6, Eine zeitlang kann man die Sp.- u. die Karm. mikrochemisch bequem von einander unterscheiden. 7, Die Meriten mengen sich zunächst nicht mit einander, sondern bilden 2 eng anliegende Gruppen (provisor. Furchungskern). Die Trennungsebene der genannten Gr. fällt mit e. meridionalen Ebene des Eies zusammen. 8, Ein Merit besteht aus e. chromatinarmen Körper u. e. chr.-reichen Korn, dem *Microsom*. 9, Der defin. Furchungskern entsteht dadurch, dass die Körper der Karyo- u. Sp.-Meriten zu e. gleichartigen Masse verschmelzen, in welcher die Mikrosomen, die man nun nicht mehr ihrer Abkunft nach auseinander halten kann, zu liegen kommen. 10, Aus diesen Mikros. baut sich der chromat. Antheil der karyokinetischen Figur auf.“ Sitzb. Ges. f. Morph. u. Physiol. München, III 9—11.

G. Brook, „relation of yolk to blastoderm in teleost. f.“ Neue Unters. des Vf. stützen seine Ansicht (Ber. 85, S. 357), dass der Hypoblast aus dem Parablast sich forme. Die Dottermasse des reifen Eies wird entw. ungetheilt von einem Protoplasmamantel eingehüllt (pelag. Eier), oder in einzelne Stücke, zerfällt mit Scheidewänden von Prtpl. (Clupea), oder steht in einer Weise, die zw. diesen Vertheilungsarten (*Salmo*) liegt, mit d. Prtpl. in Berührung. Auch nach

der Befruchtung bleibt, selbst bei pelag. E., stets eine Pröplhülle bestehen, die bei Salmo (nach Oell.) besonders dick ist u. den Dotter gegen die coagulirende Einwirkung des Wassers schützt. (Genau genommen sind also alle diese Eier centro-, nicht telolecithal.) Weil die Dottersubstanz nicht wie bei holoblast. Eiern in die einzelnen Furchungszellen übergeht, sondern e. abgesonderte Masse darstellt, so ist eine Einrichtung zur Ueberführung des D. in den aktivem Theil des Eies nöthig; dem Parablast ist diese Aufgabe zugetheilt. Da bei pel. E. eine perivitelline Blutcirculation, die (nach Gensch) ihm entstammen könnte, fehlt, die Parablastzellen aber ebenso, oft besser, sich entwickeln, als bei Eiern mit priv. Circ., dürften sie für den Aufbau des Embryo selbst bestimmt sein. Pr. roy. phys. soc. Edinb. 85/86, p. 186—193.

G. Brook, „The formation of germinal layers in Teleostei“, ist die Ausführung seiner vorjährigen Mitth. (Ber. 86, S. 273). Die Beob. u. Abb. beziehen sich nur auf *Clupea harengus*; jedem Kapitel geht e. histor. Einleit. voraus: Reifes unbefr. Ei, Bildung der Keimscheibe, Furchung, die Rolle des Parablast, theor. Betrachtungen. Die 1. aequat. Furche tritt bei Teleost. wahrsch. früher auf, als man annimmt; bei *Trachinus* z. B. ist es wie bei *Clupea* (u. *Rana*) die 3. Trans. roy. soc. Edinburgh, Vol. 33, S. 199—239, col. Taf. 13—15.

R. Fusari, „la segmentation des oeufs des téléostiens“. Untersucht e. Blenniiden: *Cristiceps argentatus*. Durch 1, dann 1, dann meist 2 Meridianfurchen werden häufig 8 dreieckige Theile gebildet, die sich darauf in 4 Paare ordnen. Im Stad. von 32 Blastomeren sind die 16 centralen von der intermediären Schicht abgelöst u. anscheinend von den 16 äuss. durch eine Aequatorialfurchung geschieden; darauf findet die Trennung in eine oberflächliche u. e. tiefere Zelllage statt. Die peripher. Blastom. steuern aus ihrer oberfl. Lage Zellen zur centralen Masse, in der unteren vereinigen sie sich mit der intermed. Schicht, um den Parablast zu bilden. C. rendus 12. Congrès de l'assoc. méd. ital., Pavia, Sept. 87.) Arch. ital. de Biologie IX p. 22—4.

Edw. E. Prince, „signific. of the Yolk in the eggs of osseous f.“ Bezügl. der Gastrulation vertritt Vf. Häckel's Ansicht, dass der ganze Rand der Keimscheibe Urmundrand sei. Der Nahrungsdotter, der bei Teleost. schärfer als bei allen anderen Vertbr. sich functionell von dem keimbereitenden Theil des Eies sondert, ist weder eine grosse veget. Furchungszelle, noch ein Syncytium kleinerer, sondern verhält sich nach Ausströmung der Protoplasmas zur Keimscheibe, protoplasmatisch. Corticalschicht, u. zum Periblast, völlig passiv; er dient erst, nachdem der Embryo weit entwickelt, diesem als Nahrung. Die Figg. geben mehrere Stad. von *Gadus aeglefinus*. — Ann. Mg. N. Hist. (5) XX, p. 1—8, Tf. 2.

E. Ziegler, „Gastrulation der Teleostei“. Die G. der Tel. ist insofern für das Verständniss der Gastr. der Amnioten von Bedeut., als bei solidem Medullarrohr die Mesoderm-Streifen von Anfang an

hinter dem soliden Can. neurent. sich zur Schwanzknospe vereinigen können. Rückt diese in das Innere des Blastoderms, so ist das Homologon des Primitivstreifens gegeben u. es kann dann secundär wieder zur Entstehung eines offenen C. neur. kommen. Tagebl. 60. Vers. D. Natf. u. Ae., Wiesb., S. 258.

A. Swaen, études sur le dével. de la Torpille (T. ocell.), 1. Theil, Bild. der Gastrula, des Mesoblast u. der Ch. dorsalis. Die im Bericht f. 1885 S. 358 referirten Untersuchungen werden ausführl. gegeben. — Arch. de Biologie (E. van Ben. et van Bamb.) VII, 537—585, Tf. 14—16.

J. H. List [gestorben 1891] „z. Entw. der Knochenf. (Labriden)“, I. morphol. Ergebnisse. Vf. unters. Crenilabrus 5-mac., rostr., ocell. u. besonders tinca u. pavo, jedoch nur an ungeschnittenen Eiern, und betont die Uebereinstimmung mit der Entw. von Clupea (Kupffer). Die Eihülle (Zona pell.) im äusseren Drittel mit prismat. Hohlräumen. Eindringen von 1 Spermatoz. u. Austritt des Richtgkörp. beob.; Keimfortsätze aus der Rindenlage der Keimsubstanz ins Innere fehlen. Nach der Befr. bildet sich ein Eiraum, der aber auch schon durch blosse Einwirk. von Wasser sich erzeugt. Kernspindeln treten während der Furchung nicht auf. Zeitweilig wird die Keimscheibe (vom Pol gesehen) elliptisch u. entsprechend plattet sich auch der Dotter von 2 Seiten ab. Die Kerne der intermediären Schicht werden von den Zellen des Blastodiskrandes geliefert (die K. wurden früher vom Vf. für abgeschnürte Zellen gehalten, Biol. Cbl. VIII). Die Ausbildung des Embryonalwulstes, d. h. der ersten Anlage des Embryo, erfolgt nicht von dem Blastodiskrande aus [d. h. von einer Stelle allmählig polwärts fortschreitend], sondern fast gleichzeitig in dem ganzen Meridianstück, und zwar durch Material, zu welchem alle Theile des Bldsk., nicht nur der Rand, beisteuern [also keine „Concrescenz“]. Von einzelnen Org. behandelt Vf.: die Augenblasen, Gehörbl., Gehirn, Chorda und Urwirbel, Herz, Pigmentz., Analblase (aus ihr bildet sich der Darm hervor). Die Harnblase tritt erst nach Entw. des Darms auf, als ein Spalt, von dem dann der Ureter nach vorn sich abzweigt; zuerst öffnet sie sich in den Darm selbst, später selbständig weiter hinten. — Zeitschr. f. wiss. Zool., Bd. 45, S. 595—645, Tf. 31—33, 9 Xyl.

J. H. List, „Periblast bei Knochenf. (Labriden)“, Biol. Centralbl. VII 81—88. Vergl. oben.

J. Rückert, üb. d. Anlage des mittleren Keimblattes u. die erste Blutbildung bei Torpedo.“ Balfour liess noch das mittlere Keimblatt der Selachier durch Spaltung vom untern her sich entwickeln. Aber O. Hertwig vermuthete bereits nach B.'s eignen Abbild., dass es hier durch paarige Auswüchse des untern entstehe. R.'s Untersuch. zeigen nun, dass in der That am Hintertheil des Embryo, neben der Anlage der Chorda jederseits eine Einwucherung der hier sich vermehrenden Entoblastz. auftritt, die zuerst ohne Höhle, später m. od. w. deutlich e. Spaltung in eine parietale u. viscerales Platte zeigt u. somit eine Coelombildung, sehr ähnlich wie bei Amphioxus, ergiebt;

die Unterschiede werden durch Mehrschichtigkeit des Entobl. bei Torp. bedingt. Der bei der Coelombildung im Entoblast entstandene Defect schliesst sich darauf wieder, der Entobl. grenzt sich von dem darüberliegenden Mesoblast ab, er wird zum sekundären Entoblast, nur die caudalwärts davon gelegene Entoblastpartie bleibt noch mit dem Mesbl. im Zusammenhang. Die Uebergangszone zw. Ekto- u. Entoblast am Umschlagsrand spielt im weiteren Verlauf durch Bildung neuer Mesoblastsomiten eine Rolle, sodass nicht der Entoblast allein an der Mesoblastbildung theilnimmt. Am Vordertheil des Embryo legt sich später der Mesoblast so an, dass durch den Zusammenhang des parietalen Blattes mit dem Chordaentoblast u. des visc. Bl. mit dem lateralen Darmentoblast, besonders beim Auftreten einer Spalte zw. visc. u. par. Blatt, das Bild eines Coeloms sich deutlich ausprägt, obgleich die untere Schicht des Entbl. intakt bleibt. — Die Chorda entwickelt sich später, aber ähnl. wie der Mesbl.; hinten nimmt auch hier die untere Lage des Entbl. an der Bildung Theil u. auch eine rinnenf. Einstülpung tritt auf, vorn steuert nur die obere Schicht zum Chordamaterial bei. Wie beim Mesbl. wächst auch die Chorda hinten am Umschlagsrand nachträglich in die Länge. — Lateralwärts lässt sich die Coelom- u. Mesoblastbildung längs des Umschlagsrandes zwar noch verfolgen, aber sie modificirt sich mehr u. mehr, so dass der Mesoblast schliesslich durch eine einfache Abspaltung vom Entoblast sich zu bilden scheint. Dass die Mesbl.-Bildung ringsum vom Rande der Keimscheibe ausgeht, spricht für die Häckel'sche Auffassung, wonach dieser Rand dem Urmundrand einer Gastrula entspricht. — Ein Theil des Umschlagsrandes wird zur Bildung der axialen Anlage verwandt; wenn auch an der Oberfl. keine Naht das Zusammenwachsen der Hälften des Randes verräth, so wird es doch (im Querschnitt) durch die radiale Richtung der Zellen, die jederseits neben der Medianlinie das Umschlagen des Ecto- in den Entoblast noch erkennen lässt, bewiesen. Doch entsteht nicht die ganze Embryo-Anlage aus dieser Concrescenz (gegen His). Diese Concr. stellt die Schliessung des Blastoporus dar, sie ist bei Selach. indess nur auf eine kleinere Strecke beschränkt. Bald erfolgt das Weiterwachsen des Randes nur noch in einer reducirten Weise als dünnes *ausserembryonales* oder *Dotterperistom*. Vf. schildert die Bild. des Can. neurentericus. Hinter dem Embryo verschmelzen die Ränder des Dotterperist., ebenfalls in die Medianlinie. — Die erste Anlage des Blutes erfolgt nahe am Rande des Dtp., zuerst vorn an der Keimscheibe, als Blutinseln, die zu Streifen confluiren. Eine Zona pellucida mit hinterer Einbuchtung unterhalb des Kopfes bleibt blutfrei. Am hintern Theile des Dtp. entstehen diese Inseln sicher nur aus Häufchen von Mesblz. (diese lösen sich von der am Umschlagsrand entstehenden u. mit diesem peripher vorrückenden Mesoblastplatte ab); denn die Furchungselemente des unterliegenden Dotters sind hier hinten längst verbraucht. An den seitlichen u. vordern Partien des Dtp. dagegen ergänzt sich das Material für die Blutbildung durch frisch abgefurchte Z. vom Dotter

aus. In der Blastulahöhle sind es lediglich die zahllosen Megaspähren, die zu Blut werden, u. zwar liefern sie nur Blutzellen; die Höhle stülpt dabei den Ectoblast als *Blastodermknopf* nach aussen vor. Bei den Umwandl. der Mgsph. an anderen Stellen sind die Tochterzellen, die an der Peripherie der Zelle entstehen, meist den Entoblastz. ähnlich u. werden wohl zu solchen u. zu Gefässwandungen, während die centralen, rundlichen einer Blutinsel gleichen. Die Mgsph. bilden aber nicht bloss Blut, sondern ausser den Entoblastzll. sogar Ectoblz., sie ergänzen eben als Producte einer verspäteten Furchung das vorhandene Zellenmaterial des Blastoderms überhaupt. Die Anlage des Mesoderms erfolgt bei Torp. nur an einem kleinen Abschnitt des Coeloms so, dass die Zellen im epithelialen Zusammenhang bleiben u. mithin einen echten Mesoblast darstellen, meist hat das lockere Gewebe zuerst eher den histolog. Charakter eines Mesenchyms u. wird erst später epithelial. Dennoch dürfte das ganze Mesoderm v. Torpedo, so wie das aller Wirbelth. als eine einheitliche Anlage zu bezeichnen sein. Anat. Anz. II, 97—112 u. 154—176, 1 Xyl.

A. E. Shipley, „üb. ein. Punkte in d. Entw. des Petromyzon fluv.“ Der Mesoblast wird ventral gebildet durch Herabwachsen der Mesoblast-Platten (von hypobl. Dotterz. nach Scott). Der Blastoporus wird nicht geschlossen, sondern verbleibt als Anus. Ein neurenterischer Canal ist nicht vorh., es gehen solide Stränge von Darm, Mesoblast u. Rückenmark rückwärts zu einer gemeinsch. undiffer. Zellmasse. Das Darmlumen ist identisch mit dem Mesenteronl., es schliesst sich während des Larvenlebens nicht. In seinem vorderen Ende bleibt der Hypoblast in Verbind. mit d. Epibl. an den Punkten, wo die Kiemenspalten entstehen wollen. Zw. den Kmisp. tritt der Mesoblast herab als Kiemerbögen. Beschreib. der Entw. v. Wimperring u. Hypopharyngealrinne u. -Balken. Die Platten der Leibesmuskulatur entwickeln sich jede aus nur 1 Zelle eines Mesoblastsomiten; die Musk. für Kiemen, Lippe, Auge, welche andrer Struktur sind, kommen vom ventralen, unsegm. Teile. Die Blutkrp. stammen v. den freien ventr. Rändern des Mesobl., sie sammeln sich in einem Sinus, der mit dem Herzen anfangs communicirt und später zur subintest. Vene wird. Der Segmentalgang legt sich (vorn) als offene Rinne an, 4—5 Stellen bleiben ungeschlossen, es sind die Wimpertrichter (diese werden also nicht als blinde Zweige des Sgmng. entwickelt); von Anfang an hat der Pronephros doppelte Blutzufuhr: reines Blut der Aorta zum Glomer., unr. der V. card. zu den Tubuli. Beschr. der frühesten Stadien des Skeletts. Der Centralcanal der Medulla entwickelt sich erst nach Abtrenn. des Neuralstrangs; hat wohl keine Auskleidung von invag. Epidermis (geg. Calb. u. Scott). Vom Gehirn erscheinen zuerst (16. Tag) Augenblasen u. Zirbeldr., dann Trennung zw. Hinter- u. Mittelhirn u. schwache zw. M.- u. Vorderhirn. Eine Quercomm. (obere Comm. Osborn) vor dem Stiel der Zbdr., als erste; um sie häufen sich Ganglienz. als Ggl. habenulæ. Die Ganglien des V, VII, IX u. X kommen von Epiblastverdickungen,

ihre Wurzeln wahrsch. von der Neuralleiste; das G. des V zerfällt in 2: Gg. ophthalm. u. mandib., welche e. gemeinsame Wurzel haben. Der N. VII versorgt schon anfangs die 1. od. Spiracularspalte; auch wenn diese zum Wimperring wird, bleibt ihr der VII. Eine Verbindung zw. den Ggl. der N. V, VII u. X existirt nicht, sie muss späteren Ursprungs sein. Der X hat an d. Wurzel e. grosses Ggl. u. je 1 Ggl. über den 6 letzten Kiemsp.; vom Ram. later. keine Spur sichtbar. Der Ursprung der Hirnnervenggl. hat keine Beziehung zu den Hautsinnesorganen, welche auch in Sh.'s ältesten Larven noch nicht erschienen waren. Q. Journ. micr. science, Vol. 27, 325—370, Tf. 26—29.

Scott, spricht über Entw. von *Petromyzon*; 36. meet. Amer. ass. adv. sc., N. York, Aug. 87. (Amer. Naturalist XXI 871.)

L. F. Henneguy, „sur le mode d'accroissement de l'embryon des poiss. osseux“. Der Embryo (von *S. fario*) wächst in die Länge an der Strecke zwischen dem Kupff. Bläschen u. dem hintersten (jüngsten) Umrirbel; die Bildung neuer Umrirbel hält fast gleichen Schritt mit dieser Vergrößerung. Dies ergibt sich aus mikrometrischen Messungen. Danach ist His' Concrecenztheorie nicht annehmbar; es müsste die Vereinigung der beiden Randseiten schon vor dem Kupff. Bl. statt finden, um den Henn.'schen Berechnungen zu genügen, während sie sich hinter dem Bl. verbinden. C. r. acad. Paris, T. 104 p. 85—87.

C. Kupffer, „üb. d. Canalis neurentericus der Wirbelt.“ Wo die Anlage des Nervensystems sich nicht über den Blastoporus ausdehnt, bleibt dieser als After auch bei Vertebraten bestehen; so bei *Petromyzon* (geg. Benecke) u. einigen Amphibien. Es bildet sich dann weder ein C. neur. noch ein postanaler Darm, noch ein secundärer After. Dies Verhalten ist das ursprünglichste, später erst kam es zunächst zur gemeinsamen Ausmündung von Darm u. Rückenmarkskanal in den Blastoneuroporus Wijhe's u. noch später zur Bild. des C. neurent., welcher das Rudiment des überwachsenen Afterdarms ist. Sitzb. Ges. Morph. Physiol. München III, S. 1—5.

J. A. Ryder. On the development of osseous fishes. I. *Gadus morrhua*. Auch hier wird nun eine „Nuclearzone“ erkannt (Kranz flacher Zellen am Rande des Blastoderms nach Beendigung der Furchung). Vf. erkennt jetzt ebenfalls die Gastrulation bei Knochenf. an als ein „centripetales Hineinwachsen von Zellen vom Rande des Blastodisks aus“. Die grossen integumentären Sinus am Kopf eines 5 mm l. Jungen abgebildet (Fig. 1, 2); bei andern Species fälschlich als Flossenfalte gedeutet; sind Lymphräume, welche den Kopf beim Flottiren nach oben richten (S. 496, 499). Asymmetrie der segment. Sinnesorg. am Schwanztheil. Drehung des schwimmenden Eies bei Ausbild. des Embryo, welcher stets unten. Beschreib. des Chester'schen Bruttrogs. Junge in der Entwickl. bekannt bis 10 T. nach dem Auschlüpfen (5 mm.), dann erst wieder von 20 mm. L. II [*Labrax*] *lineatus*. Xyl. eines 16 T. alten (5 mm.) Expl., wonach A. Ag.'s

Fisch 1882 einer andern Gatt. zugehörig; Bastard von *Clupea sapid.* ♀ u. Lab. lin. ♂ Abb. Tf. 2; ähnl. Angabe von Roosevelt 1885 citirt (S. 505). III. *Clupea vernalis*, Ei kleiner, Zona rad. dicker als bei *Cl. sapid.*, Athemkammer fehlt; Abb. der 2 Tage alten Brut (5 mm), Fig. 8. IV. *Idus melanotus*. Bem. üb. Ei u. Abb. des ausschlüpfenden Fischchens (6, 6 mm) Fig. 9. V. *Carassius auratus* S. 506. 3 embr. Stadien u. Junges 5 T. alt (5,75 mm) abgebildet, Fig. 16, 17, 18, 10. VI. *Elacate canada*, Morulastadium des Eies u. das Stad., in welchem die Conrescenz des Embryo aus zwei halben Somitreihen klar ersichtlich ist (vergl. Ber. 85 S. 358), abgebildet, Fig. 14, 15. VII. *Siphostoma fusca* (S. 508), 3 Stad. der Entwickl. abgebildet (Fig. 20, 19, 21, 12), mehrere Correkturen der Arb. von Mc. Murrich (Ber. 83, S. 451) u. der Ryders 1881; die Caudalis wird nicht heterocercal, sondern archic. angelegt. Die Neuralbogen der Wirbel bei den Lophobranchiern sehr auffällig. VIII. *Monacanthus broccus*, Abb. des unbefr. Eies, Fig. 15, mit sehr kräftiger Keimscheibe. IX. [*Gastrosteus*] *quadracus* (S. 511), Ei mit echter Z. rad., hat knopff. Fortsätze an einer Stelle wie *leirus*, beim Austritt aus dem Ovarium noch ohne Keimscheibe. Das Bläschen für das Vorderhirn sehr gross aber dünnwandig. Die Brustfl. entwickelt sich schon im Ei. Gegen die Zeit des Ausschlüpfens treten zu dem schwarzen Pigmentz. 3 Längsreihen grosser brauner Zellen. Die Anlage der Gefässe ausführlicher beschrieben, auffällig eine (vorübergehende) Asymmetrie der Dottergefässe (Abb. Taf. 5), der Sinus venosus wird nach rechts gedrängt; diese seitl. Lage u. einseitige Ausbild. der Aeste bringt Aehnlichk. mit der *Area vasculosa* der Vögel hervor. Die segm. Sinnesorgane der Seitenlinie abweichend von denen bei *Gadus* angelegt. Macht auf seine früheren Beobachtungen über den Nestbau u. die Spinnndrüsen (publicirt 1881) aufmerksam. X. *Esox reticulatus*, Bem. üb. 2 Junge 9 und 11,5 mm. l. (Fig. 28 u. 29) u. üb. d. Entwickl. der P. (nach Swirski). X. (b) „Species No. 1“. Unbestimmbarer Süßw. (? Centrarchide); Eier (an Leder) klebend, mit 1 gross. Oeltropfen; dieser tritt nebst wenigem Dotter zw. Kopf- u. Schwanzende des Embryo als abgeschnürter Buckel nach aussen hervor; bis 3 T. alt beobachtet. Fig. 30—34. XI. *Perca americana*, Ei 3,5 mm, mit sehr dicker Schale, haupts. aus der elastischen Schicht mit Porenkanälen gebildet (Fig. 35). XII. [*Labrax*] amer. Schlüpft zieml. unentwickelt aus, noch ohne Flossen, Abb. (Fig. 36—44) von 4 Stad. vor u. 5 nach dem Ausschl. XIII. [*Lucioperca*] *vitrea*, Bem. üb. Ei u. Junge, Fig. 45. XIV. [*Cybiium*] *maculatum* (S. 520). Schnitte durch einen 1 Tag alten Fisch nebst kurzen Bem., Fig. 46—56. XV. [*Ephippus*] *faber*, laicht im Juni u. Juli, 1 Million Eier; Furchung schnell, in 1 Stunde bis zum Stadium von 32 Zellen; Kranz der Marginalz. sehr deutlich; nach 24 St. schlüpft d. Embryo aus, 2,5 mm l., 53 St. alt schon Wölbung der Stirn ähnl. den Alten, Abb. F. 57—66; das Larvenstad. wahrsch. leuchtend, Junge $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{4}$ Zoll l. mit lebhaften Qbd. XVI. *Gadus tomcod* (S. 523), Bem. üb.

Ei u. Brut (Abb. Fig. 67), letztere ohne die Kopfblase des *G. morrhua*. XVII. *Clupea sapidissima* (S. 523—533, Fig. 68—153), 1 ♀ legt 200 000 Eier. April-Juli, in die Flüsse aufsteigend; 50 bis 70 000 000 Eier jährlich künstlich befruchtet. Skizze der Entwicklung von der Befruchtung bis zur 28 Tage alten Brut. Die Richtungskörper lösen sich ab und zerfliessen im Wasser der Athemkammer. 5 St. nach d. Befrucht. beginnt die Theilung der Morula in 2 Zellschichten, jetzt Kerne im Periblast deutlich, darauf Erscheinen der Furchungshöhle. Nach Umwachsung des ganzen Dotters durch das Blastoderm, ist der D. zunächst vom Periblast bedeckt, dann folgt die Furchungshöhle, schliesslich eine dünne Epiblast-Membran; da die Furchungsh. sich direkt in die Leibeshöhle fortsetzt, so entspricht die Epibr. der Somatopleure, das Periblast der Splanchnopleure. Unter der Normaltemperatur (55—80° F.) treten regelmässig Verzerrungen am Embryo oder schon an der Keimscheibe auf (Fig. 122—4). XVIII. (*Amiurus albidus*) (S. 533—544, Fig. 154—174). Vervollständigte Skizze der Entw. dieses Siluriden, welche 1883 beob. u. beschr. (s. Ber. 83, S. 501) wurde. Die Eischale ist eigenthümlich, die äussere sehr elastische Schicht ruht mit säulenf. Fortsätzen auf der innern (Z. rad.), dadurch vermag das Ei das athmungsfördernde Schütteln des Männchens zu ertragen. Früh legt sich das cavernöse Organ oberhalb der Brustfl. an (am 3. Tag). Ausschlüpfen erfolgt am 6. Tag, am 20. gleicht die Brut mehr der Gatt. *Noturus*. Wenn das ♂ die an der Nahrung hängende Brut mit erfasst, speit es die Jungen unbeschädigt wieder aus. Die Schwimmblase erhält erst nachträglich die hintere Einkerbung, sie bringt die Muskulatur der Leibeswand zum Schwund u. tritt so hinter dem Schultergürtel in unmittelbare Berührung mit der Haut, die sie blasig vortreibt. Der Knorpelschädel eines 10 T. alten Fisches, nach Schnitten reconstruirt (Tf. XXX), zeigt das Palatopterygoid aus 2 Stücken bestehend, das Tegmen cranii ist breiter als sonst (bei *Salmo*), die 3 Paar Barteln haben Knorpelanlagen, das Supraoccip. hat eine abgesonderte Knorpelanlage, die Epipharyngialia tragen schon Zähne; ob der sog. Maxillarbartel wirklich einer Maxilla, welche sonst stets häutig angelegt wird entspricht, bleibt zweifelhaft, viell. ist das Adnasale von Mc. Murrich nicht ein Knochen des Suborbitalrings, sondern Vertreter des Max. Unterhalb der Insertion der Brustfl. entwickelt sich ein langer Knorpel (*Coracoid* Hxl.), der von dem Scapular-Knorpel nicht getrennt ist. U. S. Commission of fish and fisheries, Report (XIII) for 1885, Wash. 87. 8°. S. 489—544, Taf. 1—30.

G. Brook, Epiblastic origin of the segmental duct in Teleostean f. and in birds. Bei *Salmo fario* zeigt der Embryo von 27 Tg. den Segmentalgang deutlich entwickelt in der Rumpfmittle, vorn und hinten verliert er sich. Vorn erscheint er als eine Epiblastverdickung, dorsal von der Stelle, wo man ihn früher im Mesoblast entstehen liess; weiter hinten wird diese Verdick. noch kräftiger, rund, bleibt aber überall noch mehr od. w. in Zusammenhang mit d. Epibl.; er

lagert zw. der Wirbelplatte u. dem lateralen Mesoblast. Sein Lumen tritt zuerst als unregelm. Höhlung auf; später schwindet die Verbindung mit d. Epbl. — Pr. R. soc. Edinburgh (86/87) XIV, 368—370 (16 Zeilen).

J. Beard, „origin of the segmental duct in Elasmobranchs.“ Vf. beobachtet an *Scyllium* (? canic.) u. *Torp. ocell.*, ganz wie Wijhe, 1. den mesoblastischen Ursprung des Pronephros, 2. die epiblastische Natur des Segmentalganges (gegen Balfour) u. dessen Zusammenhang mit dem Epiblast auf die gleiche Ausdehnung. Vf. nimmt an, dass die annelidenartigen Vorfahren der Vert. eine Reihe segmentaler Nephridien besaßen, welche sich jederseits in eine longitudinale Grube öffnete, u. dass (wegen Vergrößerung der Cloake?, und weil jede Grube röhrig zu werden strebt) diese Grube, die sich mit den Neph. bis zur Cloake ausdehnte, zu einem Canal eingefaltet wurde. Bekämpft von Wijhe's und Cunningham's phylog. Ansichten. *Amphioxus* steht mit den Tunicaten u. Balanogl. den Vertebraten fern. — Zool. Anz. II, 646—52.

A. C. Haddon, „Epiblastic origin of the segmental duct.“ Verf. hält das Abstammen des Excretionsapparats der Vertebraten von dem der Anneliden immerhin für denkbar, wenn die Anlage des Segmentalganges auch epiblastischer Natur ist. Die Aussenmündungen der Nephridien versenkten sich in eine gemeinsch. Längsgrube, die sich zum Canal schloss u. ihre Mündung nach hinten verlegte. Bei der Invagination des Proctodaeum gelangte dann die Mündung in ihre definitive Lage. Pr. R. Dublin Soc. V., part. 6, 1887, S. 463—72, Tf. 10.

Ryder, (Notiz bei Besprechung von Haddon's Arbeit) fand auch bei *Amiurus* den Segmgang. in Verbindung mit dem Epiblast. Amer. Natur. XXI, 587.

A. Dohrn, „Stud. z. Urgesch. des Wirbthkörp. XII: Thyreoidea und Hypobranchialrinne, Spritzlochsack und Pseudobranchialrinne bei Fischen, *Ammocoetes* u. Tunicaten“. Vf. bekämpft E. van Beneden u. Julin, welche die Homologie zw. Ascidien u. *Amphioxus* (u. höheren Fischen) bezüglich der Kiemen, des Herzens, des Darms, der Pseudo- u. Hypobranchialrinne leugnen, indem sie die zahlreichen hinteren Segmente, welche die Asc. einst in der That besaßen, als verloren betrachten u. alles neu aus der nie metamerisch angelegt gewesen „vésicule préchordale, hypoblastique“ hervorgehen lassen, während bei *Amphioxus* etc. ein hinterer, segmentirter Abschnitt diese Organe liefert. Dohrn hält daran fest, dass die Pseudobr.-R. des *Ammocoetes* dem Sillon péricoronal der Tun. homolog sei, dass sie ferner deutlich als Kiementasche sich anlege u. dem Spritzloch der Selachier u. der Pseudobr. der Tel. entspreche (vergl. Ber. 85) u. betont, dass die nächste Kiementasche (die 1. definitive) des Amm. schon zw. dem N. facialis u. glossoph. liege u. daher nicht, wie Ben. will, mit dem Sprl. der Sel. zu homologisiren sei, dass ferner bei jungen Stadien des Amm. noch ein Aortenbogen vorn vor der Anlage der Pseudobr.-R. aufsteige, ein Homologon der Sprl.-Arterie. Wenn Ben. bei e. *Acan-*

thias von 250 mm die Thyr. longitudinal weit verlängert findet und von mehreren Nerven versorgt, so sind das secund. Erscheinungen im älteren Embryo. Dass eine Kiementasche ganz zur Schleimdrüse wurde, lag an der Lebensweise des Amm., der beim Schlammfressen gegen Laesionen des Darmes (durch Steinchen verursacht) mittelst Schleim geschützt werden musste. — In e. „Nachtrag“ giebt Verf. Bemerk. über Shipley's Arbeit (Entw. v. *Petromyzon*): Die sogen. äusseren Kiembg. der Selachier sind nicht homolog mit den Kiemknorp. von Petr. (Dohrn 1884). Das Verbindungsstück zw. den beiderseitigen ersten Kopfhöhlen ist mit Wijhe als dorsal anzusehen, weil die Carotis unter ihm verläuft (von Dohrn, Stud. X, als ventral genommen) den Musc. levator labii sup. ist nicht von der 1. Kopfhöhle abzuleiten (wie es D. früher glaubte). Da das wahre, d. h. Augenmusk. bildende Homologon der vordersten Kopfhöhle der Sel. Shipley bei Petr. entgangen ist (zwei seitliche Zellenmassen, die sehr lange embryonalen Charakter behalten u. mit Dotterplättchen gefüllt sind), so ist die Homologisirung seiner vordersten (er nimmt vor der Hyomdbspalte deren 2 an) Kopfhöhle des Petr. mit der 1. Kpfl. der Sel. unrichtig. — Mitth. zool. Stat. Neapel, VII, 301—337; Taf. 4, 5 (Entw. v. Amm. u. *Acip. ruth.*). [NB.! Im Ber. für 1885 ist p. 360, Z. 3 v. o. der Titel von Studie X einzufügen vergessen worden.]

Vergleiche über Ontogenie: Scharff, intraovar. Entw. des Eies (Generationsorg.); List, Unregelmässigkeit der Furchung bei Bastarden (s. unten); Cunningham, Polkörper, Furchung (s. Generationsorg.); Gegenbaur, Entw. von Schädel, Kiemen, Nerven (s. Skelett); Watase, Entw. der Flossen bei monst. Goldfischen (s. Krankheiten); Rabl-R., Entw. des Gehirns (s. Nervsyst.); Froriep, Entw. des N. facialis (ebd.); Beard, Nervenentw. (ebd.); Laguesse, Entw. der Milz (s. Gefässsyst.); Hochstetter, Entw. der Venen (ebd.); Mayer, Entw. der Gef. bei Selachiern (ebd.); M' Intosh, die Leber dringt in den Dotter v. *Gunellus* (s. bei Britische Inseln); Cunningham, Entw. des Ovidukts (Generat.-Org.); Wenckebach, Entw. von *Engraulis* (s. System.); Stuhlmann, Entw. v. *Zoarces* (s. Gener.-Org.).

Eiablage vergleiche: Ryder, *Ictalurus* (bei Entwickl.); Smith, *Lepadogaster* (bei System., *Gobiesoc.*).

Jugendformen. Die Larven zahlr. Arten bei Ryder s. S. 305 *Antigonia*, Höhe des Körpers ändernd, Günther (s. *Cyttidae*, Systematik). Junge *Zoarces*, Stuhlmann, S. 296 *Lepadogaster*, jung ohne Saugnapf, Smith (s. Systematik). *Labrus*, M' Intosh (s. Syst.), *Liparis* u. *Gadus* M' Intosh (s. Faunistik, England). *Engraulis*, Hoffmann (Syst.), Engr. u. *Clupea*, Raffaele (s. S. 298); *Ausbild. d. Flossen* bei *Ceratodus*, Schneider (Syst.), *Chimaera*, Günther (Syst.). Fötus v. *Carcharodon*, Parker (System.)

Cunningham beschreibt die Jugendf. mehrerer schottischen Küstenfische und liefert eine Uebersicht aller bekannten Larven (vergl. bei Generationsorg. S. 297).

Alterserscheinungen. Rückbildung des Saugnapfes bei *Cyclopterus* (s. Systematik).

Phylogenie. A. A. W. Hubrecht, Relation of Nemertea to Vertebrata. Verf. zählt als Aehnlichkeiten auf: a) die Bildung des Nervensystems im Allgemeinen; b) ein Homologon der Hypophysis cerebri in Gestalt eines wohlentwickelten und wichtigen Organs (Rüssel); c) ein Homol. der Chorda dors. (das Gewebe der Rüsselscheide); d) der vordere Darmtractus ist Athemorgan. Aus den Nem. entstanden die urspüngl. Chordaten. Q. journ. micr. science, Bd. 27, 605—644.

Variabilität. Gilbert, Variab. in Zeichnung, Beschuppung etc. bei *Etheostoma* (s. Systematik, Percidae); Hay, Var. der Schlundzähne bei *Hybognathus* (ebd., Cyprinidae); Howes, Var. des Flossenskeletts bei *Ceratodus* (ebd., Dipnoi); Onodi, Var. des Gangl. ciliare bei *Mustelus* (s. Nervensyst.); Hochstetter, Var. der Dottervenen (s. Gefäßssystem.).

Bastarde. J. H. List, „Barstardierungsversuche bei Knochenf. (Labridae).“ 11 verschiedene Combinationen zw. 4 *Crenilabrus*-Species ergaben stets ausschüpfende Junge. Die Entwickl. bei Barstarden scheint kürzere Zeit zu erfordern als die ohne Kreuzung; die Furchung zeigt häufige Unregelmässigkeiten, der Embryonalwulst abnorme Verdickungen, was aber später sich wieder ausgleicht. — Biol. Centrbl. VII 20—21.

Vergleiche über Bastarde: Selys Longch. (bei Mitteleuropa); Ryder, *Labrax* u. *Clupea* (s. S. 306); Day, Salmoniden (bei Brit. Inseln); Day, *Clupea pilch.* (bei System.).

Biologie.

Allgemeines. Ueber das Leben der Fische in Burmah bringt der Gazetteer of Brit. Burmah Notizen (Nestbau des *Ophiocephalus*, *Arius burman.* brütet d. Eier im Munde aus etc.). [Nach Amer. Natur. XXI, 190.]

Vergleiche: Cornish, widriger Geruch des *Crenilabrus* (bei Systematik); Wiedersheim, Biol. des *Protopterus* (ebd.); Fritsch, Biol. des *Malapterurus* (ebd.); Lockwood, Biol. des *Hippocampus* (ebd.).

Nahrung. M'Intosh, „Die pelagische Fauna unserer Küsten in ihrer Bezieh. als Nahrung der jungen Nutzfische.“ Nach e. Vorlesung, gekürzt. — Ann. Mag. N. H. (5) XIX 137—145.

Vergleiche: Weber, *Engraulis* (bei Syst.); Pouchet u. de Guerne, *Clupea pilchardus* (ebd.); Monticelli, desgl. (ebd.).

Bewegung. Charbonnel, Steigen u. Sinken nur durch Flossen, nicht durch Schwimmb. (s. S. 294). — Wanderung: Ewart; Wand. viell. durch Bakterien veranlasst (s. S. 291); Pavesi, Orc.

thynnus wandert nicht weit (s. System., Scombr.); Weber, W. von *Engraulis* (s. Syst.); Pölsam, W. der Heringe des Kaspi-See (ebd.); Rice, *Stizostedium* wandert in fremdes Gebiet (?) (ebd., Percidae); Bund (bei Wärme S. 311).

Stimme. Schlaf. Ueber **Leuchten** vergl. bei Haut (S. 274).

Töne. W. R. Hamilton, „Croaking of the perch“, ahmt am toten Fisch („perch“ ist der *Haplodonotus grunniens*, ein Süßwasser-Sciaenide) durch Bewegungen der Schlundzähne das Knurren so gut nach, dass die Fischer den Ton sofort erkennen. Bull. U. S. Fish. Comm. VII 63.

Mimicry. J. Schedel, Schutzfärbung der Tiere (Ostsee) *Pleuronectes platessa* u. *flesus*, *Raja*, *Syngnathus typhle*, *Nerophis oph.*, *Gobius ruth.* erwähnt. Zool. Gart. Jg. 28, S. 141.

Vergleiche: Dunn, Farbenwechsel v. *Gadus poll.* (bei Systematik); Günther, dass der Brustflossenstrahl v. *Bathypterois* e. *Mim.* nach *Umbellularia* darstelle, ist unwahrsch. (s. Syst., Scopel.).

Zusammenleben. Vergl. Fewkes, ein Hydroidpolyp auf *Seriola* (bei System., Carang.).

Salzgehalt. Kerbert, „zalmeieren in zeewater“, Versuche Eier v. *Salmo salar* in Salzw. od. Brackw. zu entwickeln misslingen; Tijdschr. nederl. dierk. vereen., (2) I Afl. 3, 4, Versl., S. röm. 217.

Druck. Licht. Trockenheit (siehe *Anguilla* bei System.).

Wärme. W. A. Carter, Temperature in relation of fish. Vf. notirt die höchsten u. tiefsten Temp., bei denen Süß- u. Salzwasserf. im Aquarium abstarben. Nature, Vol. 36 p. 213.

J. W. Bund, Influence of weather on the migration of fish. Journ. nation. fish-cult. assoc. I, p. 26—34.

Vergleiche: Hoffmann, Wärme vermehrt die Fruchtbarkeit, (s. Syst., *Engraulis*); Ryder beob., dass Kälte Verzerrungen der Embryonen von *Clupea* hervorbringt (s. Entwickl.).

Sexualdimorphismus und Bastarde s. S. 299 bez. 310.

Laichen. J. H. List, „Variation der Laichzeit bei Labriden.“ Schwankt nach der Temperatur der Jahre um 7 Wochen. Biol. Centrbl. VII 64 (23 Zeilen).

Brutpflege. Stuhlmann, *Zoarces* (s. Generationsorg. S. 296); Ryder, *Ictalurus* u. *Gastrosteus* (bei Entw., S. 307, 306); Vaillant, Nest von *Antennarius* (s. Syst., *Pediculati*); Smith, *Lepadogaster* (Syst. *Gobiesoc.*); Lockwood, *Hippocampus* (Syst.); vergl. auch Cunningham S. 297.

Gefangenleben. Zwitter (s. Generationsorgane).

Feinde. G. Dimmock, *Belostomidae* etc. (s. Ber. 86, 285), Ausz. in: Zoologist XI 101—5.

R. R. Wright, „Argulus and mortality of fishes.“ Washburn's Crustaceum (Ber. 86, S. 287) ist *Arg. spec.* — Amer. Nat. XXI 188.

Krankheiten. S. Watase, Schwanz- u. Analflosse der Goldfische, untersucht die Monstrositäten dieser Flossen, deren Verdopplung mit der Thacher'schen Theorie in Verbindung gebracht wird; auch die präanale Fl. der Embryonen kann doppelt werden, sie erstreckt sich nur bis zur Vertikalen der Bauchfl. [geht bei Verdoppl. aber nicht zur V. hinauf], am Anus wird sie einfach. Abb. des Endes der Wirbelsäule, der sog. japanischen u. koreanischen Rasse, etc. Journ. Coll. of Sc. Univ. Japan (Tokyo) I, 247—267, Tf. 18—20 u. Xyl.

Plötzliches massenhaftes Absterben der Fische in den öffentl. Wasserläufen Berlins. Nach heftigen Gewitterregen, wahrsch. verursacht durch Öffnen der Nothausläufe der Canalisation, schwerlich durch Blitzwirkungen. Als Gegenmittel schnelle Erneuerung des Spreewassers durch Aufziehen der Schleusen. Circ. Deutsch. Fisch. Ver. 1887, S. 16—

Giglioli berichtet, dass einige Tage nach einem Erdbeben (23. Feb. 87) Tiefseefische in grosser Zahl bei Nizza halbtodt oder todt aufgetrieben, *Alepoceph.*, *Tetragonurus*, *Dentex macrophth.*, *Scopelus elong.*, *Spinax*. Nature, Vol. 36 p. 4 (referirt im Zool. Garten Jg. 28, S. 322).

Smiley. Grosse Massen todter Fische (meist *Clupea manhaden*) Ende Dec. 86 in Süd-Carolina an den Strand getrieben. Bull. Fish Comm. VI 413.

Vergleiche üb. Krankh.: Günther, Albino von *Macrurus* u. *Synaphobranchus* (Muraenidae) *Macrurus serr.* u. *crassie.* erzeugen nach Verstümmelung der Schwanzfl. lange Strahlen, After abnorm (?) weit vorgerückt bei *Trachichthys trailli* (Berycidae) siehe bei Systematik; Stuhlmann, unsichere Wirkung der Curare auf Fische (s. S. 296); Mott, Seuche bei *Leuciscus* (s. Syst.); Monticelli, Parasiten v. *Clupea* (Syst.); Moseley, Psorospermien bei *Ipnots* (s. Haut, S. 276); Ewart, Bakterien in der Bauchhöhle etc. (s. S. 291).

Monstra, hierüber Notizen bei: Browne, *Perca* (s. System.); Dunn, *Gadus poll.* (desgl.); Ryder, bei *Clupea* durch Kälte erzeugt (s. S. 307); Day, von *Salmo* (bei Geogr. Verbr., England).

Riesen u. Zwerge.

Nutzen und Schaden.

Smiley, grossartig. fabrikmässige Ausnutzung des Fischmaterials in England nach allen Richtungen (auch Leder [von Seesäugethieren?] gewonnen); Bull. Fish. Comm. VI 414.

A. Carruccio, „üb. Vergiftung durch Fischgenuss“. In Cagliari erkrankten 3 Personen nach Genuss einer *Gobius*-Species; als Ursache wird Vergiftung dieser Fische (durch „lua“, eine *Euphorbiacee*) behufs des Fanges angenommen. Fälle der Vergiftung durch *Barbus barbus* citirt. Boll. R. Accad. Medica di Roma, Anno 13 (86/87), fasc. 6.

Alex Layet, Hygiène expérimentale. Note sur le rouge de la Morue. Nach Brieger (1884/5) enthält das roth gewordene Fleisch des gesalzenen Kabeljaus ein Ptomain; den betreffenden Organismus hält Vf. für eine Alge (*Beggiatoa*?). *Revue sanitaire de Bordeaux* April 86. Uebers: *Bull. Fish Comm.* VII 90—95.

Vergleiche auch: Wilcox, Unfall durch *Xiphias* (bei System.)

Fischzucht.

A. Metzger, Fischerei u. Fischzucht in den Binnengewässern. (Abdruck aus Lorey's Handbuch der Forstwirthschaft, Bd. 1, Abth. 2.) Tübingen 8°. 94 S. Giebt zu Anfang eine system. Uebersicht der mitteleurop. Süßwasserfische und danach einen Abschnitt über biologisches Verhalten und wirthschaftl. Bedeutung. Kurz, aber fleissig gearbeitet (S. 1—46).

Circulare des Deutschen Fischerei-Vereins i. J. 1887, (Nr. 1—5.) Die einheimische u. internationale Vertheilung von Laich u. Brut wird wie alljährlich durch v. d. Borne in ausführl. Listen publicirt. Alle wichtigeren Verhältnisse werden fortlaufend besprochen. Einzelnes s. auch bei Systematik.

O. Hermann, A Magyar Holászat Könyve, Budapest 1887, 2 Theile. Betrifft die ungarische volksthümliche Fischerei; Notiz (von E. Friedel) darüber in *Zeitschr. f. Ethnol.*, Berlin 1887 S. (314).

5. Annual Report of the Fishery Board for Scotland (for 86) enthält: Ewart, Artificial hatching and rearing of sea fish. Duncan, Clupea, Bau, schottische Varietäten; Nahrung des Whiting (*Gadus merl.*); Eier, Brut u. Nest des Ballan Wrasse (*Labrus mac.*) R. D. Clarkson, Nährwerth der Weissfische. Brook, Futter der jungen Gadiden, Laichen des Hechtes.

Ertrag der norwegischen Seefischerei 1881—5: *G. morrhua* jährl. 33—59 Million Stück, *Scomber* 5—6 Million, *S. salar* 3 bis 600 000 kg, *Cl. harengus* 503 000 bis 1 131 000 hl. *Zool. Garten* Jg. 28, S. 222.

Bull. soc. d'acclimatat. France. (4) IV (Jahrg. 87). Enthält: Raveret-Wattel: Ber. üb. d. internat. Fischerei-Ausstellungen zu Edinburg u. London p. 9 (betrifft Lachs u. Forelle). Berthoule, migrations sous-marines. (Betrifft *Clupea pilchardus*) p. 97. J. de Guerne, Ber. üb. die Ministerial Comm. für Unters. d. deutschen Meere in Kiel, p. 210—224. Ferner verschiedene kürzere Bemerk. über Fischzucht, Einbürgerung fremder Arten etc. (Auch die früheren Jahrgänge enthalten mehrfach hierher gehöriges.)

Seefischerei Frankreichs u. Algeriens: „Statistique des pêches maritimes et de l'ostréiculture pour 1885, Paris 1887“, im Bericht des Minist. der Marine u. Colonien, Abdr.: *Bull. U. S. Fish. Comm.* VII 51—55.

Journal National Fish Culturists Assoc., London, Vol. I.

J. R. G. Maitland. The history of Howietoun. Part. I. (Vergl. Referat in: Nature, London, Vol. 35.)

Arbeiten der ichthyol. Section d. k. russ. Akklimationsges., herausg. von Zograff u. Zolonitzky. (In: Mitth. der Ges. von Freunden der Natw., Anthrop. u. Ethnogr.) Moskau 1887, 4 Taf., 3 Karten, Xyl. Die Notizen beziehen sich auf Vorträge von Oct. 82 bis März 87. Auszug in: Bull. soc. d'accl. France (4) V 1086 (1888).

C. Rogenerud, Künstliche Zucht des Kabliau in Norwegen. Bericht der Kabliau-Brutanstalt bei Flodevig für 1886. Die kältere Temperatur verlängerte die Brutzeit auf 42 Tage u. damit die Gefahren, sodass ein geringerer Procentsatz ausschlüpfte. Andererseits war beobachtet worden, dass Fische des tieferen, salzigeren Wassers (dunklere) in dem nur 1,024 wiegenden W. der Anstalt unbrauchbaren Rogen gaben, u. erst nach Akklimatisation sich dies änderte, so dass weniger Stammfische nöthig wurden. In einem grossen Bassin, in das Wasser aus der See gepumpt wurde, wurde die Brut versuchsweise bis zu 115 (selbst 157) mm Länge aufgezogen, 1884, 85 u. 86 wurden bez. 5, 29 u. 32 Millionen Junge in die See gesetzt. (Uebers. in: Bull. U. S. Fish C. VII 113—119.

B. S. Thorarinsson, Nachrichten üb. die Brutanstalten und Süsswischerei Islands. Im Winter 84/85 wurden zuerst 3400 gezüchtete *S. salar* u. 7000 *S. alpinus* in den grössten See Islands gesetzt (worin auch *S. trutta* lebt). Züchtung u. sonstige Verhältnisse aber noch sehr unvollkommen. Ausgeführt wird der Lachs meist gesalzen. Bull. U. S. Fish Comm. VII 120—6.

U. S. Commission of fish and fisheries, Report for 1885. (Part. XIII), Wash. 87, 80. CXII u. 1099 S., zahlr. Taf. u. Xyl. — In der 1. Abth. werden die officiellen Angelegenheiten erörtert und über die Arbeiten der 4 Schiffe (Albatross, Fish Hawk, Lookout u. Grampus) der Comm. berichtet; die künstl. Zucht erstreckt sich auf 22 Sp., wobei 7 nichtamerikanische. Die 25 Abhandl. der 2. Abth. betreffen meist Fischerei; ichthyol. Interesse haben: Ryder, Entwickl. von Knochenfischen (s. oben S. 305); Jordan, Cat. Fish. N. Am. (Separatausg. s. Ber. für 85, S. 379), S. 791—973.

Dieselbe, Bulletin. Im J. 1887 erschien Vol. VI (for 86) Nr. 26—30, VII (87) S. 1—128.

Sav. Kent, Bericht über die Fischerei Tasmaniens für 1885. Auszug in: Nature, Vol. 35 p. 233. Von einheim. essb. Fischen wurden künstlich gezüchtet: *Arripis salar*, *Chilodactylus allporti*, *macropt.* u. *gibbosus*, *Latris hekateia* u. *forsteri*, *Sebastes percoides*, *Platycephalus bassensis*, *Sillago ciliata*, *Neptonemus brama*, *Agonostoma forsteri*, *Pseudophycis barb.*, *Genypterus blacodes*, *Rhombosolex monopus*.

P. Ascherson üb. ägyptischen Caviar (Butargh), Fischart noch unbestimmt. Zeitschr. f. Ethnol., Berlin 1887, S. (315). [Ist *Mugil cephalus* u. *Labrax lupus* nach Bestimmung des Ref.]

Die Conservirung der Fische durch Borsäure ermöglicht es den norwegischen Fischern, den britischen in London Concurrenz zu machen; aber, wenn auch ungefährlich, sind diese Fische doch unschmackhaft. Journ. Nat. Fish Cult. Ass. Engl. I, Jan. u. Apr. 87. (Abdr.: Bull. F. C. VII 41, 44).

Ein Aquarium wurde in Rom erbaut. Bull. del Natur. Siena, Juli 87, ref. im Zool. Gart., Jg. 28. S. 322.

D. Vinciguerra. Per la solenne inaugurazione dello Acquario Romano, 29. Maggio 87. Roma 1887, 8°. 13 S.

J. König, Die Verunreinigung der Gewässer, Berlin 1887. (Preisgekrönt.) — Notitz darüber, Circ. Deutsch. Fisch.-Ver., S. 121.

M. v. d. Borne, Das Wasser für Fischerei u. Fischzucht, Neudamm 1887, 57 S., 4 Xyl.

Smiley berichtet (nach Norsk Fiskeritidende Oct. 86), dass Salicylsäure in $\frac{1}{3}$ procentiger Lösung, wovon 4 Tropfen auf 100 Gr. Wasser, Aquarien-Wasser monatelang frisch erhält. Bull. U. S. Fish Comm. VI 401.

Th. J. Moore sandte in hängenden kugelf. Glasaquarien („Mortimer“-Aquar.) im J. 1886 61 junge Solea glücklich nach Nordamerika. Je 4 Stück wurden mit Sand in 1 Aq. gethan. Proc. Liter. Philos. Soc. Liverpool Nr. 40, p. 185., Abdr. in: Bull. U. S. Fish C. VII S. 1—7.

Vergleiche ferner über Fischerei: Grimm, Fischerei Russlands (s. Faunen); Jordan u. Ev., Speisefische von Indiana (ebd., Nordam.); Day, Salmoniden (ebd., Brit. Inseln); Chambers, Salmoniden (s. System.); Hoffmann u. andere, Engraulis (ebd.); van Bemmelen, Belone u. Raja (ebd.); Clupea har. nach Neuseeland (ebd.); Ryder, Brutapparat von Chester beschr. u. über künstl. Züchtungen (s. S. 305).

Faunen.

Allgemeines. W. Marshall, Atlas der Thierverbreitung (= Berghaus, phys. Atl. VI), Gotha 1887. Auf Karte 6 wird durch 6 Kärtchen Verbr. d. Süß- u. Salzwasserf. gleichzeitig wiedergegeben. Eine Uebersicht der Meeresregionen fehlt übrigens im Atlas (ebenso wie in Wallace Werk), die Grundlage d. Darstellung sind die Familien; die des Süßw. sind durch Umrisslinien dargestellt, öfters zu eng begrenzt, weil die neuere Specialliteratur nicht verworther wurde. Die Verbr. der Fam. im Salzw. ist nach der gewählten Methode nicht leicht erkennbar; der Zwang, auf kleinem Raum viel zu geben, hat offenbar der Deutlichkeit Abbruch gethan. Als erster Versuch einer graphischen Zoogeogr. der Fische anerkennenswerth und nützlich.

A. Günther, Report on the deep-sea fishes coll. by H. M. S. Challenger 1873—1876. — Als obere Grenze des Vorkommens der Tiefseef. wird jetzt 100 Fd. angenommen (früher 300), p. II. Ausser den 610 Expl. des Chall. wurde noch Material vom „Knight Errant“,

„Triton“ u. a. m. im ganzen 794 Ex., welche 266 Species repräsentiren, untersucht; der Ch. lieferte dabei 144 sp. n. — Kurze Geschichte der Forsch. üb. Tiefseefische (Risso, Lowe, Johnson, Günther, Collett, Goode u. Bean, „Knight Errant“ u. „Triton“, „Travailleur“ u. „Talisman“, italienische Exp. „Washington“). — Charakteristik d. Tiefseef. (S. XXIV): Die Schwimmblase der Tiefseef. ist nicht wesentlich modificirt, jedoch communicirt sie nie, selbst bei Physostomen nicht, mit dem Darm. Das Vorkommen von stark erweiterten Schleimkanälen u. von s. g. Leuchtorganen schliessen sich aus, nur die Halosauri vereinigen beides; die starke Ausbildung des Schleimkanalsystems bei vielen Tiefseef. macht eine besondere Funktion oder Nebenfunktion wahrscheinlich, Verf. denkt an die Produktion von Leuchtschleim. Die s. g. phosphorescirenden Organe oder Leuchtkörper sind nur zwei mal wirklich (bei *Scopelus*) in der Lichterzeugung beobachtet worden. Sie kommen an Tiefseefischen bei folgenden Fam. vor: Bei Beryc., Gadidae, Carang. und Alepoceph. selten, bei Pediculati, Sternopt., Scopel. u. Stomiati. häufig. Dagegen scheinen sie bei den Macrur., Ophidiidae u. einigen Muraen. durch das Schleimsystem ersetzt zu werden. Nach der Vertheilung am Körper u. der Ausbildung unterscheidet Vf. 9 Haupttypen: 1. Ueber den ganzen Leib in metamerischen Gruppen zusammengehäufte winzige Höcker (*Echiostoma*, *Opostomias*, *Pachystomias*, *Photoneustes*, *Malacosteus* u. ? *Ceratias*). 2. Grösser u. stark vorspringend u. am Kopf den Schleimkanälen folgend (*Xenodermichthys*). 3. Augenähnliche weisse Org. in regelm. Längsreihen am Bauche (*Gonostoma*, *Chauliodus*, *Astronesthes*, *Stomias*, *Echiost.*, *Opost.*, *Pachyst.* und *Idiacanthus*). 4. Aehnlich, aber mit Silberglanz, nur bei den 2 Fam. Sternopt. und Scopel. (*Gonost.*, *Argyopel.*, *Sternoptyx*, *Polipnus*, *Photichthys*, *Scopelus*, *Nannobranchium*). 5. Ausgedehntere weisse Flecken von drüsiger Masse, a) an der Seite des Leibes (*Astron.*), b) am Schwanzstiel (*Gonost.*, *Nannobr.*), c) an der Kiemenspalte (*Sternoptyx*, *Opost.*, *Halosaurus*), d) infraorbital (*Photichthys*), e) auf der Schnauze (*Melamphaes*, *Melanonus*, *Scopelus*), f) an Barteln (*Linophryne*, *Stomias*, *Opost.*, *Idia.*), g) an Flossenstacheln (*Melanoc.*, *Chaunax*, *Himantolophus*). 6. In einer infraorbitalen Höhlung, drüsige Massen (*Anomalops*, *Echiost.*, *Opost.*, *Pachyst.*, *Photon.*, *Malacosteus*, *Idia.*, *Astron.*). 7. Leuchtapparat an der Pinna dors., eine Höhlung, aus der ein Tentakel hervortreten kann, nur bei Pediculaten (*Himant.*, *Aegaeon.*, *Ceratias*, *Oneir.*, *Linophr.*). 8. Leuchtorgane in einfacher Reihe auf der Lin. lat. (*Halosaurus*). 9. Das Stirnorgan von *Ipnopt.* Der Zweck der Leuchtorg. ist die Beleuchtung der Umgebung oder die Anlockung von Beutethieren, nicht aber das Abschrecken der Feinde durch Lichtblitze. Verf. glaubt, dass die vollendeteren Org. nach dem Willen der Thiere leuchten. Tastorgane sind bei Tiefseef. nur selten besonders entwickelt (fadenförm. Ventralen der Ophidiidae, Pectoralstrahlen bei *Pterodon*, *Microlene*, *Mixon* und besonders bei *Bathypterois*), was beweist, dass die Augen viel zu leisten haben.

Die Kiemenblättchen sind häufig an Zahl und Grösse reducirt. Bei einigen Tiefseef. entwickelt sich der Laich an der Oberfläche des Meeres, vielleicht grade bei den Formen, die noch den hochlebenden Fischen ähnlich geblieben sind. Die Farbe der Tiefseef. ist meist schwarz (frisch oft nur blau), fleischfarben oder silbrig, dunkle Punkte der Flossen od. Querbinden des Körpers sind selten, ebenso Scharlachroth (an Filamenten od. Flossenstrahlen). Albinismus bei schwarzen Tiefseef. öfter beobachtet. — Vertikale u. horiz. Verbreit. d. Tiefseef. S. XXXIII. Fische, die unter 100 Fd. hinabgehen, sind jetzt ca. 370 bekannt. Verf. fügt zu den bisherigen Kategorien (Uferf., pelag. F., Tiefseef.) noch eine neue: F. des Mittelwassers, „mid-water fishes“, die für das Süßsw. in der Schwebforelle (*Salmo lac.*) ein Analogon haben. Die Abgrenzung nach Tiefenzonen ist schwer, weil viele F. in sehr verschiedenen Tiefen leben können, Uferfische gehen bis 700 Fd., einige Tiefsf. von 300—2000 Fd.; die F., welche in 2900 Fd. (der grössten für F. constatirten Tiefe) leben, können es sicher auch in jeder noch grösseren Tiefe. Von Familien gehen abwärts bis nur 400 Fd.: Gobiidae, Trachin. (Ausn. *Bathyraco*), Blenn., Perc., Scorp., Trich., Cyttidae, Cataphr., Bathythriss.; bis 500: Haie, Rochen und (mit 1 Ausn.) Pleuron.; bis 700: Cott., Discob., Lycod. (1 Ausn.), Trachypt., Myxine; 1200: Holoceph.; 2000: Gadidae, Salm., Notac.; am tiefsten kommen: Beryc., Pedic., Ophid., Macrur., Sternopt., Scop., Stom., Muraen.; auch *Alepoceph.* u. *Halosaur.*, die nie über 100 Fd. hinaufgehen. Die Specieszahl mindert sich in den tieferen Zonen (auch abgesehen von dem schwierigen Fang) offenbar erheblich; die Zone zw. 100 300 Fd. zählt 232 Sp., 3—500: 142, 5—700: 76, 7—1500: 56, 15—2000: 24, 20—2900: 23; von den 232 Sp. der 1. Z. erheben sich 108 noch in die Z. zw. 0—100 Fd. Sicher sind unsere bisherigen Daten, aber noch sehr unvollständig. — Die Zusammensetzung der Fischfauna der Tiefsee unterhalb 300 Fd. (S. XXXVII). Es liefern dazu: *Chondropterygii* 8 Sp. (= $3\frac{1}{2}\%$); *Holoceph.* 2 (1%); *Acanthopt.* 64 (26%), nämlich *Beryc.* 24 Sp., *Pedic.* 7, *Trachypt.* 7, *Scorp.* 5, *Disc.* 5, *Perc.* 4, *Trichiur.* 4, *Cott.* 3, *Cataphr.* 2, *Cytt.* 1, *Trachin.* 1, *Lophot.* 1; *Anacanth.* 91 (40%), nämll. *Lyc.* 13, *Gad.* 19, *Ophid.* 20, *Macr.* 37, *Pleur.* 4; *Physostomi* 63 (26%), nämll. *Scop.* 17, *Muraen.* 13, *Stom.* 10, *Alepoc.* 9, *Halos.* 3, *Sternopt.* 4, *Salm.* 2, *Notac.* 2, *Bathythr.* 1; *Cyclost.* 2 (1%). An Individuenzahl stehen obenan die *Macrur.*, dann folgen *Ophid.* und *Gadidae*, weiter *Scop.* u. *Stom.*, *Beryc.* Eine tabellarische Uebersicht der Verbreit. der Tiefsf. nach 8 Tiefenzonen schliesst die Einleitung, einige Sp. scheinen ausgelassen zu sein wegen unsicherer Tiefeangaben (z. B. *Chlamydoselache*). Den Haupttheil des Werks (p. 1 bis 268, Tf. 1—66) füllt die Aufzählung aller bekannten Tiefsee-Arten (unter 100 Fd.) nebst Syn. u. Fundortsangaben, meist auch Noten u. Beschreibungen (auch *Splanchnologie* u. *Osteologie*). Die Mehrzahl der gen. et spec. nn. wurden schon 1877 u. 78 vorläufig in *Ann. Mg. N. H.*, andere 1880 in *Chall. Zool. Vol. I* (Küstenfische) publicirt, jetzt werden weiter als neu beschrieben 13 Gen., ferner

2 Gen. neu benannt, 8 neue Subg.; die Zahl der neuen Sp. beträgt 43, als neue Fam. werden die Lyconidae betrachtet. Die neuen Gen. u. Subg. vertheilen sich nach Fam. auf die Percidae: 1, Beryc.: 1, Pedic.: 2, Gadidae: 1, Ophid.: 5, Macrur.: 6, Lycon.: 1, Sternopt.: 1, Scopel.: 2, Stomiat.: 3. Eine sehr reiche Nachlese! Die nach G. als Tiefsf. zu betrachtenden Spee. sind sämmtlich (unter Systematik) vom Ref. berücksichtigt worden. Berichtigt mag werden, dass der Name V. Storm's durchgehends versehentlich vom Verf. als „Strom“ citirt wird. — Rep. of scient. results Chall., Zool., Vol. XXII (= Chall. Zool. Report Nr. 57).

L. Vaillant, „considér. sur les poiss. des grandes profondeurs,“ 2. Note. Vf. betont das Vorherrschen der Anacanthini (Pleuronectidae indess höchstens 560 m tief); grösste nachgewiesene Tiefe von Fischen 4255 m (Coryphaenoides gigas) u. 5005 m (Alexeterion parfaiti). Am häufigsten wurde Macrurus sclerorh. gefangen (640—3655 m). Die Tiefseef. der trop. u. gemäss. Zone gleichen australen u. noch mehr borealen Typen; ihre Verbreitung ist ausgedehnter als die der Küstenf. und die ganze Fauna daher überall ziemlich gleichartig. C. r. acad. Paris, Tome 104, p. 123—6.

Vergleiche über Tiefseefische Palacky bei Mittelmeer, über Verpflanzungen von Nutzfischen bei Fischzucht u. im system. Theil.

Nordeuropa. Vergleiche: Günther, die Tiefseef. des Gebiets, Chall. Rep. Zool. XXII (s. oben); Collett, Aphanopus (s. System., Trichiur.); Lütken, Himantol. (ebd., Pediculati); Grieg, Regalecus (ebd., Trachypt.); Mc Donald, Salvelinus font. in Norwegen (ebd., Salmon.).

Mittleuropa. B. Benecke, Die Westpreussischen Fische. 5 Tafeln. Im Auftr. des Westpr. Fisch.-Ver. zusammengestellt. Danzig, gross Folio 1887. Profilfigur für jede Art nebst kurzen Bemerkungen. (Sehr wohlfeil.)

E. de Selys Longchamps, Révision des poissons d'eau douce de la faune belge. Verbreitung, wallonische u. flämische Namen; durch Erkennung mehrerer Arten als Varietäten oder Bastarde sinkt die Zahl gegenüber der früheren Liste des Vf. (1842) von 53 auf 41. Salmo trutta ist als nicht sicher constatirt gestrichen worden, Leucaspis delin. hinzugekommen; 14 versch. Bastarde von Cypriniden behandelt, von denen 11 in B. nachgewiesen, 3 möglicherw. vorkommen. Uebers. ü. d. einschlägige neuere Literatur. — Bulletins de l'Ac. r. sc. de Belgique (16. Dec. 87) S. 1021—98, 57. Jg.

K. Möbius, Thiere des Plankton, westl. Ostsee u. atl. Oc. bis jenseit d. Hebriden. — Nur 3 sp.: 1 Cyclopt., (24 mm) Mot. cimbria (28—36 mm), Scop. glac. (am Grunde) gefunden; [keine Eier]. — V. Bericht Comm. Z. wiss. Unts. deutsch. Meere, Kiel 2^o, S. 113.

A. E. Jurinac, Liste der Fische Kroatiens; Rad jugoslavenske akad. znanosti i umjetnosti (Zagreb), Bd. 83, S. 114—121.

Vergleiche auch: Novicki, Weichselfische (bei Osteuropa); über eingebürgerte Fische in der System. bei Stizostedium (Percidae), Grystes, Salmo, Amiurus, Anguilla, Acipenser.

Für die Niederlande vergl.: Bamps, Leucaspius (Syst., Cyprin.); Hoffmann, van Bemmelen u. a., Engraulis, Belone u. Raja (bei System.).

Britische Inseln. J. C. Howden, Report on the fishes of the north-east of Scotland. Unter Zugrundelegung von Day's Werk werden 187 Sp. u. Var. aufgezählt. Auch die Expl. der Localmuseen u. die Localnamen verzeichnet. Es fehlen an der Ostküste von Day's Sp. bez. Gatt.: Acerina, Serranus, Polyprion, Box, Pagrus, Pag. bogar., Cottus gobio, Orcynus germon, Echeneis, Centrol. brit., Sched., Luv., Pamm., Lichia, Trich. u. Lepid., Gobius minutus, pictus u. quadrim., Aphya, Call. mac., Lepad. decand., Ath. boy., Gastr. acul. var. semil. u. trachyc., Centriscus, Crenil. mel. var. rone, couchi u. penn., Acanthol., Ammod. cic., Arnogl. lat., Sol. varieg., Argyrop.; Salmo trutta var. cambr., Var. a—h von S. fario, S. alp., fontin., alle Coreg., Argent., Exoc., Cyprinidae sämmtl. ausgen. L. phoxinus u. Nem. barbat., Balistes, Centrina, Torp. marm., Cephaloptera. Angehängt sind: Bibliographie der Ichth. Ostschottlands u. eine Besch. des von Day benutzten Ex. von Trachypterus arct. — The Scottish Naturalist (n. ser.) Nr. 14.

M'Intosh, Notes from the St. Andrews Mar. Lab. VIII. 1. Ein postlarvaler Labrus nebst Bem. üb. Farbe der larvalen Bauchflosse. (Motella, Gadus, Lophius; Pleuronectiden, Callionymus, Cottus wegen Färb. des Körpers erwähnt; s. bei Labrus) 2. Postlarv. Verhalten von Liparis mont. (10 mm l. hat L. eine vorn erhöhte D., die P. hat dagegen keine verläng. Str.) 3. Eigenthüml. Dottersack eines Knochenf. (Bei ?Centronotus geht die Leber in den Ds. hinab). 4. Allg. Bem. über postlarvale Nutzfische. (Gadus morrhua, merl. u. aegl. gleichen sich in der Lebensweise, grade wie bez. ihrer Eier u. (bis 15 mm) ihrer Gestalt; die Jungen wandern nicht, sondern wohnen da, wo die flottirenden Eier hingelangen, meist in der Nähe der Alten; Wanderungen der J. in Sars' Sinne kommen nicht vor.) Ann. Mg. N. Hist. (2) XX 300—4.

Mont. Browne, Vertebr. animals of Leicestershire, führt auf: Acip. sturio, Perca (stumpfschnauzige persistirende Monstros.), Cottus gobio, Gastr. acul. u. pung., Lota, Cypr. carpio, Barbus, Gobio, Leuc. rut., ceph., vulg., erythr., phox., Tinca, Abr. brama, blicca, Alb. luc., N. barb., Cob. taenia, Esox, S. salar. u. fario, Thymallus, Ang. latir. u. vulg., Petrom. fl. u. plan. — Zoologist (3) XI 57—61.

W. And. Smith, notes on the sucker fishes, Liparis and Lepadogaster. Biologische Notizen, Eiablage von Lep. Proc. roy. phys. soc. Edinburgh, Sess. 85/6, p. 143—151, Tf. 7.

W. H. Bath, Thresher Shark [Alopias] at Cornwall, 10 F. l.; Zoologist XI 393.

Th. Cornish, Ray's Bream at Scilly [Brama], ebd. 393. —

F. Day. British and Irish Salmonidae. London 1887, 8°. 298 S., 12 meist col. Taf., Xyl. Enthält *Salmo* u. *Thymallus*, berücksichtigt die praktische Seite. Bastarde, p. 254—270, Monstrositäten (p. 271—7).

H. J. Charbonnier, Notes on the reptiles, amph. and fish of the Bristol district; Proc. Bristol naturalists soc. (2) V 133—142.

Vergleiche über England ferner: M' Intosh (bei Biologie, S. 310); Cunningham (bei Gener.-Org.), S. 297); Cornish, *Crenilabrus*, *Lepidopus*, *Cyclopt.*, *Orcynus*, *Pagrus* (bei System.); Elliott, *Mullus* (ebd.); Matthews, *Sebastes* (ebd.); Day, *Scorpaena* (ebd.); Haigh, *Cyclopt.* (ebd.); Dunn, *Gadus poll.* (ebd.); Brook, *Zeugopt.* (ebd., *Pleuronect.*); Day, *Salmo purp.* (ebd.); Chambers, *Salmo* u. *Coreg.* von Amerika (ebd.); Day, *Clupea pilch.* (ebd.).

Frankreich. Vergleiche bei System. (*Salmo irideus*) u. bei Mittelmeer.

Südenropa. G. B. Torossi, i pesci e i molluschi fluviatili della prov. di Vicenza. Vicenza 1887 8°, 32 S. 4 Taf.

Mittelmeer. J. Palacky, „üb. d. Tiefseefische des westl. Mittelmeeres,“ zählt 69 Sp. auf u. bespricht ihre Verbreitung ausserhalb dieses Meeres u. die paläontol. Verhältnisse. Sitzb. k. böhm. Ges. d. Wiss. 1887, (25. Febr.) S. 329—33.

A. F. Marion, les Faunes des étangs saumâtres des Bouches du Rhône. Das nach Salzgehalt u. Temperatur sehr schwankende Wasser des Etang de Berre enthält ausser Fischen des Mittelmeers (*Trabacos*, *Tons*, *Bordigues*, *Muges*, *Loups*, *Daurades*, *Anguilles*, *Atherines*) auch solche aus d. Schwarzen Meer, *Syngnathus bucculentus* u. *Siphonostoma argentatum* S. 13, was durch den ehemaligen Zusammenhang der Ostsee mit dem Rhône-Thal einer u. dem Schw. M. andrerseits erklärt wird (S. 16). — Discours (Ac. sc. Marseille), Marseille 1886, 8°. (Vergl. Ber. 86 S. 338.)

L. Facciola, üb. 2 *Lepadogastrini* und 1 n. *Nettastoma* von Sicilien. Naturalista siciliano VI 163—7, Tf. 3. — 2 versch. Formen v. *Microstoma* bei Messina; ebd. 193—7.

Vergleiche über Mittelmeer: Günther, sämmt. Tiefseef. aufgeführt, Chall. Rep., Zool. XXII (s. oben); Facciola, *Rhombodichthys*, *Arnoglossus* (s. Syst., *Pleuron.*, auch in Ber. f. 1886); *Trois*, *Dentex* u. *Trygon* (ebd.); Raffaele, Eier u. Larve von *Clupea* u. *Engraulis* (s. Entw., S. 298); Monticelli, Nahr. u. Helminthen v. *Clupea pilch.* (s. Syst.)

Osteuropa. Nowicki, M. Die Fische des Weichsel-, Styr-Dniester- und Pruthgebietes in Galizien. Krakau 1887. Quer 2°. 4 chromolith. Taf. ohne Text. — *Perca fl.*, *Luc. s.*, *Aspro z. u. str.*, *Ac. cern. u. tanaicensis* Güld., *Cott. gob. u. poecilopus* H., *Gaster. acul.*, *Gobius kessleri* Gth., *fluv.*, *gymnotrachelus* Kss., *trautv.* Kss., *Lota v.*, *Sil. gl.*, *Cypr. carpio*, *Carass. v.*, *Tinca v.*, *Gobio fluv.* und

uranosc., *Barbus petenyi* u. fluv., *Rhod. am.*, *Leuc. wyrozub* Güld. u. rut., *Scard. erythr.*, *Squal. leuc. u. ceph.*, *Idus mel.*, *Phox. laev.*, *Pelecus cultr.*, *Alb. bipunct.*, *luc. u. delin.*, *Asp. rap.*, *Blicca bj.*, *Abr. brama*, *sapa P. u. vimba*, *Chondr. nas.*, *Thym. v.*, *Salmo hucho*, *Tr. fario*, u. *salar*, *Es. luc.*, *Cob. foss.*, *barb. u. taen.*, *Ang. vulg.*, *Acip. schypa*, *ruth.*, *stell. u. sturio*, *Petr. plan.* Zus. 54 Sp., Maximalgrösse, einheim. Namen. (Eine Verbreitungskarte der galiz. F. von demselben Vf. erschien 1883).

O. Grimm, „Fishing and hunting on Russian waters“, Petersburg 1883 8°, 55 S. — Erschien (englisch) gelegentlich die intern. Fisch.-Ausst. zu London im Auftrag d. russ. Minist. d. Domänen. Enthält: I Uebers. u. Charakter der Wasserbecken des eur. Russl. II Liste der Fische (auch Seef.) des eur. R. mit ihrer geogr. Verbr. (286 Sp.). III Ueberblick üb. d. wichtigeren Arten. IV—IX Statistik u. Praktisches. X u. XI betrifft, Säugethiere, Krebse etc.

M. Ruzsky, Fische des Flusses Swijaga; Trudui obsch. estestvoisp. imp. Kasansk. Univ., Bd. 17, 4. Theil, 67 S. (russ.).

Vergleiche üb. Russland: Pölsam, *Clupea* des Kaspi-See (s. System.); Zograff, *Acipenser ruth.* (ebd.); Iwanzow, *Acip.* (ebd.).

Africa. G. A. Boulenger, new fishes from the lower Congo. Neu für dies Gebiet: *Chromis dumerili* Std., *Channallabes apus* Gth. u. *Polypterus palmas* Ay.; 3 sp. n.: *Ctenopoma*, *Clarias*, *Mormyrus*. Ann. Mg. N. Hist., Febr. 87, S. 148—9.

A. Günther, Descr. of 2 n. sp. of fishes from Mauritius, Pr. Zool. S. London, 87, 550—1, Taf. 48, 49. (*Latilus* u. *Platycephalus*.)

Vergleiche ferner für Afrika: Günther, Tiefseef. von Mauritius u. westl. v. Sierra Leone, Chall. Rep. Z. XXII; Steindachner, *Hemichromis* (Goldküste), *Glyphidodon* (Cap-Verd.-I.), *Pseudoscarus* (Madag.), s. System.; Vaillant, *Neopercis atl.* (ebd., *Trachinidae*); Schneider, *Protopterus* (ebd.); Fritsch, *Malapterurus* (ebd.).

Asien. G. A. Boulenger, Fishes obt. by Surg.-M. Jayakar at Muscat, Arabia. 172 Arten (1 *Gobius*, 1 *Scaphiodon*, 1 *Cyprinodon* aus Süsswasser), 14 sp. n.; Gatt. *Trigla* neu für östl. Ind. Ocean; nur 1 *Selachier* (*Trygon*). Das Wichtigere wird in d. Systematik referirt. Proc. Zool. Soc. London, 87, p. 653—667; Taf. 54.

A. Haly (s. Ber. 86 S. 298), die von Ceylon erw. Sp. sind: *Serranus* sp., *Pogonoperca ocell.*, *Genyoroge macolor*, *Peristethus* sp., *Malacanthus latovitt.*, *Tetradrachmum trimac.*, *Cheilinus undul.* [var.] (5 $\frac{1}{2}$ Fuss l.), *Xiphochilus rob.*, *PlatyGLOSSUS jav.*, *Cossyphus bilun.*, *Coris* sp., *Syngnathus conspic.*, *Balistes buniva*, *Diodon mac.*, *Orthagor.* sp., *Galeocerdo rayn.*, *Zyg. mall.*, *Lamna spall.*, *Alop. vulpes*, *Rhinodon typ.* (23'), *Stegost. tigr.* (6'), *Chiloscy. ind.* (9'), *Pristis perr.* u. *cusps.*, *Rhinob. ancyl.*, *djedd.* u. *granul.*, *Trygon uarnak* (5'6" br.), *Pteropl. micrura* (6' br.), *Aetob. nar.*, *Dicerob. kuhli* (18' br.), *Amphioxus*. Taprob. I 165.

A. A. W. Hubrecht. Kruijpende dieren en Visschen, systematische Lijst [des gesammelten Materials], in: Midden-Sumatra, von P. J. Veth, IV Natuurlijke Historie 1. Fauna, 1. Hälfte, 2. Abtheilung. Leyden 1887. — 32 bekannte Sp.: 1 Periophth., 1 Eleotris, 1 *Pristolepis* (Nandidae), 1 *Osphrom.*, 2 *Ophioceph.*, 2 *Mastacemb.*, 5 *Siluridae*, 17 *Cyprinidae*, 1 *Monopterus*, 1 *Tetrodom.* — (S. 9—14, nur Fundort u. einheim. Namen; kurze Notiz von Snelleman über die Sammlung, S. 20.)

Slater erwähnt, dass nach Mitth. Strauch's Preczewalski von seiner 4. Expedition 643 Fische mitgebracht; ein (russ.) Katalog der Ausstellung in Petersb. giebt einige der Namen. Pr. Zool. Soc. London, 87 p. 362.

E. Thurston, Prel. report on the marine fauna of Rameswaram and the neighb. isl. Government central museum, Madras; science series Nr. 1, Madras 1887. 8°, 41 S, 6 Taf.; Liste der Fische S. 22—27.

S. Herzenstein u. Warpachowski, „Notizen üb. d. Fisch-fauna des Amur-Beckens u. der angrenz. Gebiete“. Gepräge wesentlich das der mantschurischen Subregion mit geringen Beimischungen von nördl. (Salmon.), ostsibir. (*Phox. lagowski*) u. eigenthüml. Formen (*Pseudasp.*); als noch südlichere kommen dazu: *Eleotris* u. *Ophioceph.* Bekannt 40 Sp.: *Gastrosteus bussei* (sp. n.) u. *pung.*, *Sinip. chu.*, *Cottus szananga* u. *haitej*, *Eleotris pleskei* (sp. n.), *dyb.* (sp. n.), *glehni*, *Ophioc. pekin.*, *Lota vulg.*, *Silur. as.*, *Macrones fulvi-dr.* u. *ussur.*, *Cypr. carpio*, *Carass. vulg.*, *Barbus laeo*, *Gobio fluv.*, *Pseudogobio amur.*, *Sarcochil. lac.*, *Ladisl. tacz.*, *Pseudorasb. parva*, *Xenoc. arg.*, *Idus wal.*, *Pseudasp. leptoc.*, *Phox. lag.*, *czekan. u. laevis*, *Ctenophar. idellus*, *Rhodeus amarus*, *Hypophthalmi. dybowski* (sp. n.); *Elopi. bamb.*, *Chanodi. mong.*, *Parabramis bramula* u. *pekin.*, *Culter erythropt.*, *alburnus*, *mong.*, *Hemic. lucidus* u. *schrencki* (sp. n.), *Cobitis taenia*, *Octonema pleskei* (n. g., n. sp., *Cobitide*). Russ. mit deutschem Ausz., 1 Taf. Arbeiten der St. Petersb. natw.-Ges., Tom. 18, Zool. Abth., 58 p.

H. H. Giglioli and Th. Salvadori, Brief notes Fauna of Corea; zählen auf 4 [japanische] Spec. von Gensan: *Sebastes inermis*, *Clupea zunasi*, *Tetrodon porphyreus*, *Ostr. cubicus*. Pr. Z. Soc. London 87, p. 595—6. Ersch. 1888.

F. Steindachner u. L. Döderlein, Beitr. z. K. d. Fische Japan's IV, (Vergl. Ber. 85 S. 377) umfasst die No. 166—234 u. die Fam. Cottidae (Schluss), Chiridae, Mugilidae, Atherinidae, Fistularidae, Centrisc., Cepol., Gobiesoc., Labridae, Gadidae, Ophidiidae (*Myxoccephalus* g. n.), Macrur., Ateleop., Silur., Scopel., Stomiid., Scombro-socidae. Im Nachtrag wird *Bathysebastes* Död. einzogen, Abb. nachträglich zu *Setarches*, *Sebastes*, *Scorpaena*, *Cottus*, *Centriderm*. 16 Sp. n. Denkschr. Ak. W. Wien, m.-n. Cl., Bd. 53, S. 257—96, Tf. 1—4.

Edw. Nyström, Ber. ü. die japanische Fischesammlung im zool. Mus. der Universität Upsala. 177 Sp. [Meeresfische], welche von Petersen u. Smitt aus Nagasaki eingesandt wurden. Durchgehends werden Längenmaas, sehr häufig Abweich. von früheren Aut., meist die Flossenformel betreffend, gegeben (oft ist diese dann niedriger als bei Steind., der nach nördl. Expl. arbeitete, klimat. Einfluss? oder Verschiedh. des Zählmodus?). 7 Sp. n. in den Gatt. Hapalogenys, Lepidotrigla, Dactylopt., Bembras, Ditrema, Raja, Urolophus. Bihang till svenska Vet.-Ak. Handlingar, Bd. 13, Afd. IV, Nr. 4, 54 S. 80. (Schwedisch.)

Vergleiche für Asien: Günther, Tiefseef. des Ind. Archipels u. von Japan, Chall. Rep. Z. XXII; Murray, Day, Indien (s. Sstem. bei Zygaena u. Lamna); Warpachowski, Hemiculturella, von China (System., Cyprinidae); Hilgendorf, Pterothrissus (System., Clupeidae); Murray, Pseudochromis, Salarias (Syst.).

Australien. E. P. Ramsay and J. Douglas-Ogilby, Notes on the genera of Australian Fishes, Part. I. Es werden Diagnosen von 6 Perciden-Gattungen (Percalates g. n.) gegeben. Pr. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II 181—4.

Dieselben: „Descript. of n. Australian f.“, ebd. 241—3 (Choerops, Labrichthys), 561—4 (Opisthogn., Trichiurus, Neopempheris, Cossyphus), „Undescr. Dules“ ebd., S. 4. „Undescr. shark“ S. 163, Apogon roseigaster, ebd. I 1061 (Ogilby) u. 1101.

J. Douglas-Ogilby, n. g. et sp. of Australian Mugilidae, Pr. Z. S. London, 87, S. 614—5 (Trachystoma). Ersch. 1888. On a n. g. of Percidae. Ebd. 616—8 (Chthamaloptyrys), 1 Xyl. Ersch. 1888.

J. Palacky, „Ueber die Fische Neuseelands.“ Süswasserf. 15 Sp. entweder antarktischen Charakters oder uneigentl. Swf.; Meeresfische 175 Sp.: 67 endemisch, 70 auch in Australien u. Tasmanien, 13 cosmopol. bez. aus d. Mittelmeer, 9 Cap u. Südamerika, 6 Polynesien, 5 Südam., 4 (trop.) Afr., Austr., Südam., 3 ind. Arch., 2 Austr. u. Polynes., 1 Kerguelen u. Aukland, 1 Austr. u. Aukl., 1 Madeira. — Sitzb. k. böhm. Ges. d. Wiss., 1886. 29 Oct., 7 S.

Smiley. Vom California salmon (Oncorh. tshaw.) in Australien (Victoria) schon Expl. von 7 Pfund, dorthin auch Eier von Salmo fario u. trutta importirt; Bull. Fish Comm. VI 409. In Neuseeland Oncorh. quinnat u. S. fontinalis mit zweifelh. Erfolg, S. fario mit grossem eingeführt; letzterer geht hier in Brackwasser u. ähnelt dann der S. trutta, wird 20 Pfund schwer. Ebd. S. 463.

Fr. McCoy, Prodromus of the Zoology of Victoria, Decas 14—15. (Scombrosox, Hemirhamphus, Labrichthys, Brama, Monacanthus, Echinorhinus, Regalecus).

Vergleiche über Australien ferner: Günther, Tiefseefische, Chall. Rep. Z. XXII, u. bei System. (Beryx u. Polyprion); Douglas-Og., Girella (Sparidae) u. Prionurus (Acronur.) bei System.; Steindachner, Dules (Syst., Percidae); Parker, Carcharodon (Syst., Squali); Sauvage, Notothenia (Syst. Trachinid.); Schneider,

Ceratodus (Syst.); *Clupea harengus* übersiedelt (Syst.); Kent, Fischerei Tasmaniens (s. S. 314).

Amerika. Günther, Tiefseef., Chall. Rep. Z. XXII.

Arktisches America. C. Lütken, „Korte Bidrag til nordisk Ichthyographi VI. Eine für Grönland neue Rochen-Art (*R. fyllae*)“, Vidensk. Meddelelser fra nat. Foren. i Kjøeb. for 87, S. 1–4. Taf. 1. (s. *Raja* u. *Acanthias*).

C. H. Townsend fand im sehr fischreichen Kowak-Fluss (Alaska) 18 Sp., 450 engl. M. von der Mündung viele grosse *Salvelinus namaycush*; Rep. U. S. Fish-Comm. XIII, S. röm. 69. Im gleichen Werke zahlreiche Notizen über Fischzucht etc. nordam. Fische. (*Idus melanotus* dort eingeführt).

Vergl. bez. des arct. Amer.: Collett, Trichiuridae (System).

Nordamerika. C. H. Eigenmann und Eliz. G. Hughes, rev. of N. Amer. Species of *Lagodon*, *Archosargus* und *Diplodus*. Proc. U. S. nation. mus. X 65–74. (Nur atlantisch, vergl. Sparidae.)

Ch. H. Gilbert, „Descr. of new and little known Etheostomoids“. Behandelt die Ausbeute (1884) in Indiana, Kentucky, Tennessee, Alabama, S.W.-Missouri, Arkansas, Texas. Die hier als Sp. nn. bez. Arten sind fast sämtlich schon in Jordans Cat. als nom. nuda aufgeführt (vergl. Ber. 85, S. 389) u. einige 1886 charakterisirt, wofür aber keine Citate gegeben werden. In der Zusammenfass. vieler Gatt. weicht G. von J. ab. Pr. U. S. Nation. Mus X (1887) p. 47–64.

Jordan u. C. H. Eigenmann, Coll. of f. sent by Leslie from Charleston, S. C. Bem. üb. 18 interessantere Sp., wovon 10 neu für Charl., d. h. nach J. u. G's Liste 1882, hier mit * bez.:

*Serranus bras.**, *Epineph. drumm.**, *Pseudopriac. altus**, *Rhombopl. auror.**, *Lobotes*, *Scorp. bras.**, *Eques acum.**, *Trachynotus falc.**, *Eleotris ambl.*, *Dormit. mac.*, *Cithari. (Aram.) paet.**, *Cyprinodon varieg.**, *Siphost. louis.*, *Hippoc. punct.** Pr. n. mus. X 269–70.

O. P. Hay, „contr. knowl. fishes of Kansas.“ Sammelte an 6 Orten Juli 85 in N.W.-Kansas 29 [30] Sp. (*Notropis* 2 (3?) sp. n.). *Percidae* 4 sp., *Cyprinidae* 18, *Catastom.* 2, *Silur.* 3, *Cyprinodont.* 1, *Hyodont.* 1, *Lepidost.* 1. Vielfache krit. Bemerk. Proc. n. mus. X 242–253.

Carl H. Eigenmann, „specific names of certain N. Amer. fishes.“ Pr. ac. nat. sc. Philad., 87 II 295–6. *Perca*, *Morone* (= *Labrax*), *Etrumeus* (*Clupea*).

J. F. James, Catalogue of mammals, birds, rept., batr. and fishes in the coll. of Cincin. soc. n. h.; Journ. Cincinnati soc. nat. hist. X, Fische S. 36–48.

Jordan and Evermann, über die Speisefische von Indiana; von 150 dortigen Arten kommen 50 als Marktfische vor. Amer. Natur. XXI 1034 (urspr. im Agricult. Report of Indiana).

O. P. Jenkins, list of fishes of Beaufort Harbour, N. Carol.; zählt 134 Sp. auf, darunter 23 neu für die Lokalität. Studies biol. lab. Johns Hopkins Univ., IV 83–94.

Vergleiche weiter bez. Nordam.: Ryder, Entwickl. verschied. nordam. Süß- u. Salzwasserf. (S. 305); Rice, Stizostedium in Conn. (s. System., Perc.); Eigenmann u. Horning, Chaetodontidae, auch mittelamer., (System.); Moore, Solea von England importirt (s. S. 315); Smiley, Salmo levenensis desgl., S. fario u. S. salvelinus, sowie Tinca aus Deutschland (s. System.); Heilprin, Ictalurus sp. n. (ebd.); Jordan, Polynemus (ebd.).

Mittelamerika. D. S. Jordan, „a preliminary list of the fishes of the West Indies.“ Schliesst ein den Golf von Mexico u. das Caraib. M., auch Bermudas-J., ausgeschlossen Südküste der U. S. u. Brasilien. Günth. Cat. u. Poey fortlaufend berücksichtigt. 875 Sp., wozu ein Nachtrag von 51 Sp. von den Florida Keys, welche trop. Charakters, aber noch nicht in obigem Gebiet nachgewiesen sind. Nominale Sp. wurde möglichst ausgeschlossen. Nomenklatur nach den Canons der Amer. Ornith. Union (nur Canon 17 u. 18 werden verworfen), daher zahlreiche Aenderung von Gatt.-Namen (s. diese in der System.). 1 Gen. nov. Amiiichthys (Apogoninae); auch einige neue Familien abgezweigt. Proc. U. S. nat. mus. IX 554—608.

Th. W. van Lidth de Jeude, „Coll. of Rept. and Fishes from the West-Indies.“ Enthält marine F.: [Tetrodon] Cheil. psitt. von Surinam, die übr. Sp., Myripr. jacobus, Serranus tigrinus, Pomac. paru, Gobius sopor., Blennius crinitus u. Muraena catenata von Curaçao; Süßwf.: Poecilia vandepolli sp. n. (nach d. Sammler ben.) von Cur. u. P. vand. var. arubensis von Aruba. — Notes Leyden Mus., IX 135—9.

T. H. Bean, „Descr. 5 n. sp. fishes sent by Dugès from Prov. Guanajuato, Mexiko.“ 4 Cyprinodontidae (Charac. u. Fund.) u. 1 Petromyz. (Lampetra), Westabhang. Proc. U. S. nat. mus. X 370—5.

Jordan u. Gilbert, „Descr. n. sp. of Thalassophryne (Th. dowi).“ Pr. n. m. X 388 (s. Batrachidae).

Vergleiche bez. Mittelamer.: Eigenm. u. Horn., Chaetodontidae (s. System.); Smiley, Cyprinus carpio in Mexico (ebd.).

Südamerika. G. A. Boulenger, Fishes coll. by C. Buckley in eastern Ecuador. Gesammelt 1880 bei Canelos, Sarayacu u. Pallatanga: 2 Chromides, 16 Silur. (6 sp. n., 1 n. g. Nannoglanis) 11 Charac. (n. g. Leptagoniates, 3 sp. n.), 4 Gymnotidae (1 sp. n.). Ein Theil dieser Samml. schon von Steind. beschrieben. Proc. Zool. Soc. London, 1887, S. 274—83, Tf. 20—24.

G. A. Boulenger, Descr. of new South-American Characinoid Fishes. 1 Curimatus, 2 Tetragnopt., Schlüssel für 5 Tetr.-sp. von Rio Grande do Sul; Ann. Mag. Nat. H., März 87, S. 172—4.

R. A. Philippi, „Vorl. Nachr. über . . . einige Fische der chilenischen Küste.“ 10 Sp. Haie, 1 Xiphias, 1 Histiophorus werden erwähnt. Zoolog. Garten, Jg. 28, S. 85—88.

Derselbe, sobre los tiburones y algunos otros peces de Chile. Ausführung der vorigen Publication. Vf. kennt 19 Sp. Haie (= tibu-

rones) aus dem chilenischen Meer, die er im Museum von Santiago (13 Sp.) u. Valparaiso studierte (s. Systematik, Squali). In Appendix werden beschrieben: 1 Xiphias, 1 Histiophorus u. 2 Labridae: Trochocopus u. Graus (n. g.). Es ist sehr verdienstlich, dass Vf. die schwer zugänglichen grossen Arten beschrieben und abgebildet hat; die Zahl der von Chile bekannten Squali betrug bisher nur 7, wie die historische Einleitung ergibt (Vergl. unten: Perez.). Ob die zahlreichen sp. n. sämtlich haltbar sind, wünscht Vf. nach seinen Darstellungen geprüft zu sehen. Anales de la Universidad de Chile, tomo 71. Santiago 42 S. 80, 8 Taf.

C. Perez Canto, Estudios sobre algunos Escualos de la costa de Chile. (Valparaiso 1887?) Die Perez'sche Arbeit wird von Philippi citirt; dem Ref. unbekannt.

D. S. Jordan, „Descr. of two n. sp. of fishes from S. Amer.“, Proc. ac. nat. sciences Philad., 1887 III, p. 387—8. Cristiceps u. Mycteroperca (Percidae).

D. S. Jordan, Note on Achirus lorentzi. Ebd. p. 389—391 (Süsswasser).

A. Kappler, Fische von holländisch Guiana; Ausland 1885, S. 879, 896, 918, 936.

Vergleiche weiter über Südamer.: Günther, Tiefseef. [gegenüber der Laplata-Mündung u. Pernambuco, sowie bei Chile u. an der Südspitze], Chall. Rep. Z. XXII; Schneider, Lepidosiren (s. Syst.); Baur, desgl. (ebd.); Giglioli, desgl. (ebd.); Günther, Polyprion (ebd.); Steindachner, Dules u. Elopomorphus (ebd. Perc. u. Characin.); Boulenger, Siluridae v. Columbien (ebd.); Smith, Tetrodon (ebd.).

Anhang. Systematische Arbeiten ohne faunistische Begrenzung: Günther, Siluridae (s. System.); Steindachner, vermischte sp. n. n., Anzeig. Akad. Wiss. Wien, Bd. 27. S. 230—1.

Fossile Fische.

W. Anderson, Notes on the fish remains from the bonebed at Abden, near Kinghorn, Fife; Trans. Edinburgh Geol. Soc. V 310—4.

H. Böcklen, „die Gattung Ceratodus“; Jahresh. Ver. vat. Natk. Württ., Jg. 43, S. 76—81. (In der Lettenkohle von Hoheneck nur 2 Sp.: kaupi und runcinatus.)

P. B. Brodie, Discovery of foss. fish in the New Red Sandstone (upper Keuper) in Warwickshire. Rep. 56. meet. Brit. Ass. Advanc. Science 86, 629.

E. D. Cope. System. catalogue of sp. of Vertebrata found in the beds of the Permian epoch in N. Am. Trans. Amer. philos. soc. XVI 285—297, Tf. 2—3.

— Crossophilus magnicaudatus, Priscacara sp. n., Notogoneus osc. Mem. ac. Washington III (1896) 162, 164, Taf.

W. Dames, die Gattung Saurodon Hays. Sitzb. Ges. naturf. Fr. Berlin, 87, S. 72—78.

— Ueb. *Titanichthys pharao* n. g., n. sp. aus der Kreideform. *Aegyptens*. Ebd. S. 69. Bemerk. dazu, S. 137. (Der Name Tit. in *Gigantichthys* n. g. umgewandelt).

J. W. Davis, Note on a fossil sp. of *Chlamydoselachus* (*Chl. lawleyi* sp. n.; die Zähne wurden 1876 von Toscana beschrieben). Pr. Zool. soc. London, 87 p. 542—44.

— The fossil fishes of the chalk of Mount Lebanon. Trans. roy. Dublin soc. (2) III 457—636, Taf. 14—38; n. gen.: *Centrophoroides*, *Rhinognathus* (geändert in: *Scapanorhynchus* Sm. Woodw.) *Spathiurus*, *Amphitaphurus*, *Xenopholis*, *Pantopholis*, *Eurygnathus*, *Phylactcephalus*.

— *Chondrosteus acipenseroides*. Q. journ. geol. soc. Vol. 43, 605—616, Taf. 23.

— n. sp. of *Pholidophorus* (*purbeckensis*) Geol. mag. (3) IV 338, Taf. 10, Fig. 2.

Dollo, ein restaurirtes Skelett von *Carcharodon heterodon*, Revue des quest. scientif. (Brüssel), XXII 81—91.

E. Dupont. Sur les ossements de la faune maestrichtienne placés récemment dans les galleries du Musée r. à Bruxelles. Bull. Ac. Belg. (3) XIII 706—710.

D. Gorjanovic-Kramberger. Palaeichthyol. Beiträge. Glasnik Narav. Bruztva Band I (1886) pag. 123—137. Deutscher Auszug aus der früheren Publ. 1884.

F. Hitchcock, *Edestus* wird auf Intermandibularzähne zurückgeführt. Amer. Nat. XXI, 847.

R. Lydekker. The fossil Vertebrata of India. Rec. Geol. Survey Ind. XX 69—71.

C. Malaise, poissons devoniens dans le bord nord du bassin de Namur. Bull. Ac. r. sc. de Belgique, Jg. 57, S. 771—2.

C. F. Matthew. *Pteraspis? acadia* sp. n. Canadian Record, II 251, 323.

F. K. Mixer und H. U. Williams, Fish-remains in the Carboniferous near Buffalo. Bull. Buffalo soc. V p. 84, Taf. (1886).

E. T. Newton, Remains of f. from the Keuper of Warwick and Nottingham. Q. journ. geol. soc. Vol. 43, p. 537—540, Taf. 22.

J. Riess, Ueber einige Chimaeriden-Reste im Münchener palaeontologischen Museum. Palaeontographica. Bd. 34, S. 1—27, Taf. 1—3.

Romanovsky, *Lyrolepis caucasicus* g. n. Mém. soc. min. XXII (1886), vergl. Bull. com. géol. St. Pétersb. VI, Suppl. p. 52.

E. Rivière, Faune des oiseaux, des reptiles et des poissons des grottes de Menton. Comptes rend. assoc. franç. av. sc. XV 450—7.

R. Storms, *Platylates* g. n. Mém. soc. belg. géol. I 98, Xyl.

Struckmann, *Eugnathus nienstedtensis* sp. n. Zeitschr. D. geol. Ges., Bd. 39, S. 87.

Traquair, „Notes on *Chondrosteus acipenseroides* Ag.“ Pr. r. phys. soc. Edinburgh, Sess. 116, p. 349—361, 5. Xyl. u. Geol. mag. (3) IV 248—257.

—, Fossils of the bone bed of Abden; Trans. Edinb. geol. soc. V 310—4.

J. F. Whiteaves, Illustrations of foss. f. of the devonian rocks of Canada, Part I; Proc. Trans. r. soc. Canada IV, 101—110, Taf. 6—10.

H. U. Williams, *Palaeoniscus reticulatus* u. antiquus. Bull. Buff. soc. (86) V p. 83, 84.

A. S. Woodward. Post. Liassic species of *Acrodus* Geol. mag. (3) IV 101–5, Xyl.

— Liste der fossilen bisher beschrieb. Berycidae. Ebd. 357–8.

— *Holocentrum melitense* sp. n. Ebd. 355.

— *Arius egertoni* u. A. (?) *bartonensis*. Ebd. 304.

— On dentition and affinities of *Ptychodus*. Q. journ. geol. soc. Vol. 43, 121–130, Taf. 10.

— On the so-called *Microdon nuchalis* Dixon, from the Chalk of Sussex, a n. sp. of *Platax*. Ann. Mg. N. H. (2) XX 342. — Auch *Micr. pulchellus* Davis vom Libanon ist kein Pycnodont, sondern e. Teleostier.

—, On the affinities of the so-called *Torpedo* (*Cyclobatis*, Egerton) from the Cretaceous of Mt Libanon. Ann. Mg. (2) XX 389 (Ausz. aus: Sect. C, Brit. Assoc., Manchester 1887). Ist ein Trygonide. Vergl. Geol. mag. (3) IV 508.

—, On a n. sp. of *Semionotus* [joassi], from the lower Oolite of Brora. Ann. Mag. N. H. (5) XX 175, 320. Tf. 7.

—, Canal-system, evidently sensory, in the shields of Pteraspidian f. [*Pteraspis*, *Holaspis*]; Pr. Zool. S. London, p. 478–81, 1 Xyl.

—, Note on the „Lateral Line“ of *Squaloraja*. Ebd. p. 481.

— On the fossil teleostean g. *Rhacolepis* Ag. Ebd. p. 535–542, Tf. 46, 47. Steht nahe *Elops* (*Clupeidae*), nicht *Percide*.

K. A. Zittel, Handbuch der Palaeontologie, 1. Abth., III. Bd., Liefr. 1 (S. 1–156) enthält die Fische mit Ausn. der Teleostei (diese ersch. 1889). Die Hauptgruppen nach J. Müller's System. 266 treffliche Xyl., z. Th. Originalzeichn., sehr vollst. u. klare Darstellung. (Gen. nov.: *Chalcodus* [*Cochliodontidae*] S. 72, *Metopacanthus* [*Chimaeridae*] S. 110, *Chimaeropsis* [desgl.] S. 113.) Im Inhaltsverz. (1890 erschienen) sind die Familiennamen mehrfach philologisch verändert.

Systematik.

Vorbemerkung: Die in dieser Abth. referirten Arbeiten sind im Vorhergehenden (besonders unter „Faunen“) schon aufgeführt und dort meist ausführlicher citirt. — Die Namen neuer Gatt. und Arten sind schräg gedruckt.

Allgemeines. E. D. Cope (vergl. S. 280) ergänzt sein System: 1. Die *Agnatha* Häck. ohne Mandibel und Schultergürtel sind eine eigne Classe (dazu *Marsipobranchi*, ferner die foss. *Pterichth.*, *Bothriolep.*, *Pterasp.*, *Cephalasp.*, 2. Die Fische zerfallen nach dem Schädelbau in *Holoceph.*, *Dipnoi*, *Selachii*, *Teleostomi* Ow. (= *Ganoid.* e. p. und *Teleostei*). 3. Die Superordnungen der *Teleostomi* werden durch die fundamentalen Modificationen des Flossenbaus angezeigt. 4. Die Ordn. nach unwichtigeren Skelettverschiedenh. als die unter 2 u. 3. — Die 4 Superordn. des *Teleostomi*:

D., A., P. u. V.-*Axonosten* vorhanden, für jede Fl. durch 1 einz. Element repräsentirt *Rhipidopterygia*.

D, A, P u. V-Ax. vorh.; die der D. u. A. zahlreich, jedes, wenn überhaupt, mit 1 Baseost artikulierend; P-Ax. in variab. Zahl, mit zahlr. wohlentw. Bas. artic.; V-Ax. einzeln, mit zahlr. Bas. art. *Crossopterygia*

D u. A.-Ax. wie vorige; P-Ax. 0, Bas. rudim.; 1 V-Ax. mit zahlr. B.

Podopterygia

D u. A.-Ax. wie vor.; P-Ax. 0, Bas. wenige, klein; V-Ax. vorh., mit kleinen od. ohne B. *Actinopterygia*

Die Superordn. werden nach folgendem Schlüssel in Ordn. zerlegt:

Rhipidopterygia. Baseosten vorh. in D u. A. Ordn: *Rhipidistia*.

Bas. 0 in D. u. A.; Axonosten in der C vorh.; jedes mit einem Neuraldorn artikulierend *Actinistia* Cp. 70.

Crossopterygia. A. Dorsale Baseosten vorhanden.

Dermale Strahlen (*Actinotrichia* Rd.) zahlreicher als Bas.; jedes Axonost artik. mit einem Neuraldorn *Haplistia*.

Dermalstr. gleichzahlig mit Bas. u. mit diesen art. *Taxistia*.

AA. Dorsale Baseosten fehlen.

Dstr. gleichz. m. Bas. u. damit art.; Ax. nicht mit Nd. art. *Cladistia*.

[*Podopterygia*. Enthält nur die Chondrostei Ow., Cope olim.]

Actinopterygia (*Actinopteri* Cp. ol.). I. Dermstr. mehr als Bas. u. Axon. Intercentra deutlich, klein (*Heterocerci* Ztt. 87) *Lysopteri* Cp. 80.

II. Dermstr. gleichzahlig mit Bas. u. Ax.

Wirbel mit deutl. Intercentris auf der Chorda dors. *Merospondyli*.

W. mit vollständigen Intc., welche amphicoel od. annulär. *Isospondyli*.

W. mit vollst. Intc., welche opisthocoel *Ginglymodi*.

W.-Säule mit vollst. Intc. u. Centris, beide amphicoel *Halecomorphi*.

[Zu den *Actinopterygii* würden ferner noch gehören die Teleostier, welche Cp. hier nicht behandelt.]

Diesen Ordnungen entsprechen folgende Familien: *Rhip.* = Fam. *Tristichopteridae*; *Act.* = F. *Coelacanthidae*; *Hapl.* = *Phaneropleur.*; *Tax.* = *Cyclo-dipterini* (besser: *Holoptychiidae*) u. *Glyptodipt.* (besser: *Osteolepidae*); *Clad.* = *Polypter.*; [*Chondro.* = *Acipens.*, *Spatular.*]; *Lys.* = *Palaeonisc.* nebst *Platysom.*; *Merosp.* = F. *Sauropsidae* (*Microlep.* u. *Cyclolep.* Ztt.), *Pycnodont.* u. andre Fam. (*Stylodont.*, *Sphaerodont.*, *Saurodont.* Ztt.); *Isosp.* = *Aspidorhynch.* (*Rhynchodont.* Ztt.), u. a.; [*Ginglym.* = *Lepidosteidae*; *Halecom.* = *Amiadae*]. — Ob die Ordn. *Placodermi* (excl. *Pteraspidae* u. andre *Agnatha*, s. oben!) zu den *Actinopterygia* gehört od. zu *Isosp.*, ist unsicher. — Amer. Naturalist XXI 1014–9.

J. V. Carus, mehrere Artikel in Ersch u. Gruber, Allg. Encyclop. 2. Sekt., 41. Theil (*Labrax*, *Labrus*, *Labyrinthfische*).

Vergleiche über Stellung der *Notacanthini* bei dieser Fam.

Acanthopteri.

Percidae. *Perca*, Diagnose der Gatt. (in Australien eingeführt), Ramsay u. Dg., Pr. L. S. N.-S.-Wales (2) II S. 182.

Perca fluviatilis, rothe Körper der Schwimmblase, Coggi, s. S. 294; *Rigor mortis*, Ewart, s. S. 284; *Monstrosität*, Browne, s. S. 319; *P. amer.*, Ei Ryder, s. S. 306.

Perca flavescens (Mitch., 1814 Jan., als *Morone* fl.) hat Prior. vor *Centropomus luteus* Raf. 1814. C. H. Eigenmann, Pr. ac. n. sc. Philad. 87 II, p. 295.

Siniperca chuatsi, syn: *Actenolepis dittmari* Dyb., Herz. u. Warp., Fischf. Amur., S. 16 u. 54.

Morone hat Prior vor *Roccus*; *Morone mississippiensis* Jord. u. Eig. statt *R. interruptus* Gill. (praeocc. durch *Perca mitch.* var. interr. Mitch. 1815); C. H. Eigenmann, Pr. ac. nat. sc. Philad., 87 II, p. 295. — Ein Bastard zw. *Roccus* u. *Clupea* sp., Ryder, s. S. 306. —

Labrax lineatus in Californien eingeführt (1887 Expl. von 25 Pf. gefangen); Smiley, Bull. U. S. F. Comm. VII 48 u. Dunn, der auch das Gedeihen des *Micropterus* in Calif. erwähnt, ebd. 49.

Lates = *Pseudolates* All. et Mcl. 75, s. *Percalates*.

Percalates g. n. für *L. colonorum* Gthr., von *Lates* abw. durch: Br. 6 (*Lates* 7), Psdbr. entwickelt, Op. mit 2 (statt 1) Stach., Zunge glatt, D I 9 (st. 6–8), Occiput ohne Schuppen; Ramsay u. Douglas-Og., Pr. L. S. N. S. Wales, (2) II S. 182.

Psammoperca (syn.: *Cnidon* M. Tr.), Diagnose (D. 8, Schpp. bis zur Schnauze); Ramsay u. D-Og., Pr. L. S. N. S. W. (2) II 183.

Ctenolates Gth. 71, Diagnose; Ramsay u. D. Og., Pr. L. S. NSW. II 183. *Stizostedion lucioperca*, künstliche Aufzucht, Hübner, Circ. D. Fisch. Ver. 1887, S. 9. Gedeiht jetzt im Rhein; ebd., S. 48. u. 71. —

H. Lanz, „Vermehr. der Fischfauna des Bodensees“ Jahres. Ver. vat. Naturk. Württ., Jg. 43, S. 446–8. Der Zander 1882–84 im Bodensee ausgesetzt, 1887 ein 59 cm grosses Expl. gefangen.

„*Stiz. vitreum* im Becken des Connecticut“, wo das Genus fehlt, ange-troffen. Durch Vögel (als Ei) oder durch Angler vom St. Lorenz-Becken verschleppt? W. N. Rice, Amer. Natur. XXI 938. — *Stiz. amer.*, Entwicklung, Ryder, s. S. 306.

Etheostoma (*Ulocentra*) *histrio* J. et Gilb. (86), Arkansas; [in Jord. Cat. ist Ul. selbst. Gatt.]; Gilbert, Pr. n. m. X. 47; Ul. *blennius* s. bei E. (Rhot.).

E. (*Cottogaster*) *uranidea* [um] J. et Gilb. 85, nahe *shumardi*, Arkansas; [Cott. in Jord. Cat. selbst. G.]; Gilbert, Pr. n. m. X 48.

E. (*Hadropt.*) [in Jord. Cat. selbst. Gatt.] *ouachitae* J. et G. 85, Arkansas, p. 49; *squamatus* [um] Glb. et Swain 85, Tennessee, p. 50; *cymatotaenia* Glb. et Meek 85, Missouri, pag. 51; *nianguae* G. et M. 85, Missouri, u. *nianguae* sbsp. *spilotum* Glb., Kentucky pag. 53; Gilbert, Pr. nat. mus. X 49–53.

Etheostoma (*Rhothoea*) *zonale*, sehr variabel D. 10/11 bis 12/13, A 2/7 oder 8, L. 1. 41–43, Zeichn., Brust u. Kopf nackt oder beschuppt; daher sbsp. *arcans* (85) u. ? *E. lynceum* viell. nur var.; Gilbert, Pr. n. m. X 54. E. (*Roth.*) *blennius* Glb. et Swain (85 als *Uloc.*) Alabama; nahe *inscriptum*, aber Auge kleiner u. Zeichn. versch., p. 55; *rupestre* G. et Sw. (85 als *E. Poecili. rup.*), Alabama, ? sbsp. zu *thalass.*, aber schlanker, düsterere Färb., Sq. kleiner u. auch auf Operc., Gilbert, ebd. 57.

E. (*Etheostoma*) *saxatile*, weit verbreitet, Beschr. [in Jord. Cat. wie die folgenden 5 Sp. beim Subg. *Poecilichthys*], p. 57; *luteovinctum* Glb. et Swain 85, Tennessee, p. 58; *parrvipinne* G. Sw. 85, 1 Expl., Alamba, p. 59; E. *punctul.*, *whipplei*, *cragini*. Beschreibung p. 60–62, E. *whipplei* sbsp. *alabamiae* p. 62; *tuscumbia*, nur 1 Analdorn, nach Auffass. andrer Autt. viell. selbstständiges Genus, häufig bei *Tuscumbia* (Ala.) p. 63. Gilbert, Pr. n. m. X 57–63.

Eth. (*Alvarius* [in Jord. Cat. selbst. Gatt.]) *fonticola* J. et G. (vergl. Ber. 85 u. 86) als sp. n. beschr., viell. syn. zu *lateralis*, p. 63; *punctatus* (früher *Microp. punct.* Putn.) wird, weil der Name *punct.* beim Gen. *Eth. praeoccipit.*, „*Eth.* (*Alv.*) *microperea* J. et Gilb.“ p. 64, Anmerk.; Gilbert, Pr. n. m. X 63, 64.

Etheostoma (*Poecili.*) *lepidum*, Bem.; Hay, Pr. n. m. X 248, 252.

Boleosoma olmat., Bem.; Hay, ebd. 249.

Centropomus, als westind. aufgezählt 5 Sp. (als Fam. *Centrop.*); Jordan, pr. n. m. IX 578.

Polyprion prognathus Forster, von *cernium* versch.; syn.: *Epin. oxygen.* Bl. Schn., *Centrop. gigas* Ow. (für e. Skelett), *Oligorus gigas* Gth. (für dasselbe Sk.) u. Hutton (n. indigen. *Hapuku*), *Hectoria Castelnau* 73; *P. kneri* Std. 75 von Juan Fernandez, Gth. 80. Günther, „Notes on the *Hapuku* (*P. progn.*)“, Ann. Mg. N. H (5) XX. 236.

Polyprion cern. als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII 268.

Anthias megalepis als Tiefsf. erw., Günther Chall. XXII 13.

Centropristis pleurospilus als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII 13.

(*Centropristis* Gth.) 10+1 Sp. von Westind. aufgezählt (1 als *Centrop.*, 2 als *Diplectr.*, 7 als *Serranus*), Jordan, Pr. n. m. IX 579, 607.

Epinephelus brasiliensis, n. f. Charleston; Jordan u. E., Pr. n. m. X 269.

Serranus scriba, die rothen Körper d. Schwimmb. (Abb.), Coggi, s. S. 294 — *Serranus* sp. n.?, 9/18, 3/9, 92; Mx. bis Hinterrand des Au.; Präop. sehr fein gesägt, C. wenig convex, braun, D. u. A. schwärzlich, weiss gekümt, P. schwärzl. mit gelbl. Binde, C. schwärzl. mit weiss. mondfl. Rand; Ceylon, klein; Haly, *Taprobanian* I 166 [nicht in Day's Nachträgen erw.].

Serranus brunneus, *awoara* u. *tsirimenara*; Nyström, Jap. Fisks., Bih. svenska V.-A. Handl., Bd. 13, IV. Nr. 4, S. 6.

Serranus tigrinus, Färb. etwas abweich., Curaçao; Lidth de Jeude, Not. Leyd. Mus. IX 135.

Serranus praepercularis, 11/14-15, 3/8, 100—110, 13-14/45-50 (unterh. des 6. D-Stach.), nahe *morrhua*, 65 cm l., Arabien (Maskat); *S. gibbosus*, nahe *striolatus* Playf., 11/19, 3/10, 110, 22/65; Maskat, 40 cm; ebendaher noch *S. angularis* (*celebicus* Blk.), geoffr. Klz., *morrhua*, *hemistictus*, *gigas*, *stoliczkae*, Boulenger, Pr. z. soc. Lond., 87, 654.

Mycteropercia xenarcha; nahe *bonaci* u. *falcata*; 11/16, 3/11, Sq. 110—115; Kopfl. 2½, in Krpl. (o. C.), Höhe 3 mal; James-I. (Galapagos) u. Payta (Peru); D. S. Jordan, Pr. ac. nat. sc. Philad., 87 III, 387.

Serranus. Von Jordan, Westind., werden 25 Sp. (als *Paranthias*, *Mycterop.*, *Promicrops*, *Epineph.*, *Enneacentrus*, *Dermatolepis* angeführt, Pr. n. m. IX 580—1.

(*Plectropoma*) 12 + 1 westind. Sp. aufgezählt (als *Hypoplectrus*, *Goniopl.* u. *Alphestes*), Jordan, P. n. m. IX 579, 607.

Rhypticus, 5 westind. Sp.; Jordan, ebd. 581.

Mesoprius bohar, *rangus*, *fulvif.*, *ehrenb.*, *chirtah* (annul.), *quinquel.*, *lineol.* bei Maskat, Boulenger, Pr. zool. s. L., 87, 655.

Rhomboplites aurorub., n. f. Charleston, Jordan u. E., Pr. n. m. X 270.

Genyoroge 5-linearis, beng. u. rivul. bei Maskat, Boulenger, Pr. z. s. 87, p. 655.

Pseudopriacanthus altus, neu f. Charleston, grosses Exp. (11 Zoll), Form u. *Praeopstacheln* etc. von juv. versch.; Jordan u. E. Pr. n. m. X 270.

Cheilodipteridae als Name für die Fam. Apogonidae, weil (mit Blkr.) *Amia* Gron. statt *Apogon*, angenommen; Jordan, Pr. n. m. IX. 586 (u. 542), 607.

Apogon roseigaster, 6 1/10, 2 9—10, Innenkante des Praeop. auf beiden Rändern crenulirt, mit einigen schwachen Zähnen am Winkel, Aussenkante und das Praeorb. glatt; Z. auf Vomer, aber Palz. 0, Zunge mit 2 schwarzen Lappen; blassgelb, D. I oben schwarz, D. II u. A. mit schwarzer Lb. Häufig im Parramatta-River. 65 mm, laicht Oct. u. Nov. Ramsay u. Dougl., Pr. Lin. S. N. S. W. (2) I 1101 (u. 1061, als *Apogonichthys*).

Apogon maximus, 7 1/9, 2/7; 26—27, 2/6; jede Schuppe mit 1—3 schwarzen Fl., P.-basis schwärzlich; Maskat, 25 cm.; ebd. noch *A. annularis* u. *Chilodipt.* lin. u. octovitt.; Boulenger, Pr. z. s. 87, p. 655.

Amiichthys g. n. (Poey M. S.!) für eine zu der Fam. der Cheilodipteridae [= Apogonidae] gerechnete u. als diapterus (Synopsis pisc. cub. p. 305) beschr. Art; ohne Diagnose; Jordan, Pr. n. m. IX 586.

Scombrops chilod. 345 Fd. bei Enosima (Japan); Xyl. der Eingeweide, Gallenblase sehr lang, Coeca pyl. 17+1 langes; ? ob = *Latebrus ocul.* Poey 58.

Latebrus Poey 1858, s. *Scombrops*.

Acropoma philipp. Gthr. 80, erw. als Tiefsf., Günther, Chall. XXII 15.

Malacichthys griseus Döb. Tiefsf., Diagn. copirt, Günther, Chall. XXII 15.

Synagrops nom. n. für *Melanostoma* Döb. praecoc., S. jap. Döb., Tiefsf., Diagn. copirt, Günther, Chall. XXII 16.

Ei eines Centrarchiden?, Ryder, s. S. 306.

Grystes. Ueber gelungene Fortpflanzung des Schwarz- u. Forellenbareches in Deutschland u. deren ökon. Werth, v. d. Borne, Circ. Deutsch. Fisch-Ver. 1887 S. 103—8. Desgl. F. E. Schulze, Sitzb. Ges. natf. Fr. Berlin 87, S. 15.

Lepomis humilis, Männchen lebhafter gefärbt, Hay, Pr. n. m. X 243.

Odontonectes erythrog., 65 cm l., bei Maskat, Boulenger, Pr. z. soc. 87, p. 656.

Oligorus, s. oben bei *Polyprion*.

Hectoria, desgl.

Dules nitens, 10/11, 3/11, 52, 5/13, einfarbig silberig, Rücken grünlich; S. O-Küste Neu-Guineas, E. P. Ramsay u. J. Douglas-Ogilby, Pr. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II S. 4.

Dules flaviventris = *auriga* fem., Rad. branch. einseitig abnorm 7; Steindachner, Anz. Ak. Wiss., Jg. 27, S. 231.

Monoropsis sandwicensis, 10/11, 3/11, Sq. 51, 7 1/2/13; Kpfl. 3 1/2, Körphöh. 2 1/2 in Krpl.; Augd. 3 in Kpfl.; einförmig silberweiss, C. schmal schwarz gesäumt, Bd. auf D, A, C 0; Sandw.-I.; Steindachner, Anz. Ak. Wiss. Wien, Jg. 27, S. 230.

Pristipomatidae. *Macquaria* C. V., Diagnose, dazu syn. (mit Klz.): *Murrayia* u. *Riverina* Cast. 72; Ramsay u. Dg.-Og., Pr. L. S. N.-S.-W. II 181—184.

Pristipoma, 14 Sp. von Westind. aufgezählt (als *Orthopsistis*, *Pomadasya*, *Anisotremus*, *Genyatremus*); Jordan, Pr. n. m. IX 583—4. — *Pr. japonicum* Expl. von 11 cm mit 3 hellen Lbd.; Nyström, Japanska F., 9. — *Pr. hasta*, duss., *stridens*, bei Maskat, Boulenger, Pr. z. soc. 87, 656.

Hapalogenys aculeatus, von *nigripinnis* Pet. 1880 durch einen horiz.

Stachel vor der D. abw.; viell. acul. als ad. zu mucron.; nigrip. Pet. wohl nicht ident. mit nigr. Schl. u. Std.; Nyström, Jap. F. 10.

Diagramma jayakari, 13/22, 3/8; 100, 13/20; Maskat (Arabien), 27 cm; ebenda noch: griseum, gater., punct.; Boulenger; Pr. z. soc. 87, 656.

Dentex gibbosus, von vulg. als Sp. zu trennen, weil die Kiemendornen schlanker, auch Eingeweide versch. etc. E. F. Trois, „consider. sul D. gibb.“, Atti istit. Veneto (6) V, 35–40. — Die r. Körp. d. Schwimmb. von *Dentex* (Abb.), Coggi, s. S. 294. — *Dentex maculatus* cf. *Trochocopus* (Labridae).

Scolopsis, bei Maskat (Arabien) *Sc. auratus*, ghanam, bimac., inermis; Boulenger, Pr. z. soc. p. 656.

Propoma roseum Gthr. 80, erw. als Tiefsf., Günther, Chall. XXII 15.

Synagris tolu u. *bleek*. bei Maskat, desgl. *Caesio chrysoz.*, Boul., Pr. z. s. 657.

Aphareus rutilans, 11/11, 3/11, 63, 6/16., Bemerk., bei Maskat, Boulenger, Pr. z. soc. 657.

Cypselichthys Std. = *Cubiceps*, nicht zu den Maenini, sondern zu Nomeidae gehörig. Günther, Chall. XXII p. 16 Anm..

Gerres acinaces bei Maskat, Boul., Pr. z. s. 657. —

Gerres japonicus, bei 3 Expl. D. 10/9 (statt 9/10 bei allen *Gerres*-Sp.); Nyström, Jap. F., 12.

Chthamalopteryx n. g. für *Gerres melbournensis* Cast. 72; wie *Gerres*, aber mehr weiche Str. in D. u. A. (9/17, 3/17); Douglas-Ogilby, Pr. Z. Soc. Lond., 87 p. 616, Xyl.

Lobotes surin., Bem.; Jordan u. E., Pr. n. m. X 270.

Gramma loreto Poey, als besondere Fam. *Grammidae* zw. *Lobotidae* u. *Sparidae* aufgeführt, Jordan Pr. n. m. IX 582.

Sparidae. Als westind. werden aufgezählt: 7+1 *Calamus*, 1+1 *Sparus*, 2 *Diplodus*, 3 *Archos.*, 1 *Lag.*, 1 *Boops*; Jordan, Pr. n. m. X 584. 607.

Girella cyanea, Beschr., Lebensweise etc.; Douglas-Ogilby, Descr. of 1. kn. Australian f., Pr. Zool. Soc. London, p. 393.

Schlüssel der 6. nordamer. Gatt. der *Sargina*: *Sparus* (= *Chrys.*, *Pagrus* u. *Pagellus*), *Lagodon*, *Archosargus*, *Diplodus*, *Stenotomus* (diese 4 zus. = *Sargus* autt.) u. *Calamus* (= *Chrys.* u. *Pagell.*). *Sten.* u. *Cal.* durch federf. 2. Interhaemaldorn von den 4 andern G. versch.; breit meisself. Zähne haben: *Lag.* Arch., Di., schmal meissf.: *Sten.*, conische: *Spar* u. *Cal.*; e. horiz. Dorn vor der D.: *Lag.*, Arch., *Sten.*, er fehlt allen europ. Spec.; die Leistenbildungen und Anschwell. auf dem Schädel werden zur Gattdiag. verwandt, bei *Sten.* fehlen die Parietalleisten, bei *Lag.* verwachsen sie nicht mit der Occipl., sie thun es dagegen (vorn) bei den andern 4 G.). Eigenmann u. Hughes, Pr. n. mus. X 65.

(*Sargus*.) Als nordamer. werden folg. Spec. anerkannt u. beschr. (vergl. oben!): 1. *Lagodon rhomboides* (L.); 2. *Archosargus probatoc.* (Walb.) (= *ovis* autt.), wozu als südl. Var. *A. pr. aries* (C. V.); 3. *A. unimac.*, wozu *caribaeus* P. u. als höhere Var. *flavolin.*, nahe steht *pourtalesi* Std. 81 von Galapagos; 4. *A. tridens* (Poey),? abnormer *unimac*; 5. *Diplodus holbrooki* (Bean) 78, juv. = *caudimacula* Jord. (nec Poey); 6. *D. argenteus* (C. V.), syn. *caudim.* P.; 7. *D. sargus* (L.), Europa, nur bis Bermudas. Eigenmann u. Hughes, Pr. n. m. X 65–74.

Sargus rondel. var. *capensis* Sm., dazu syn. *kotschy* Std., bei Maskat; Boulenger, Pr. z. soc. 87, S. 658.

Lethrinus longir., *marshena*, *ramak* bei Maskat, Boul., Pr. z. s., 658.

[*Pagrus vulgaris*.], „Becker or Braise in Cornwall“, durch Form, Bezeichnung, Farbe u. gutes Fleisch versch. vom „Spanish Bream“ [*bogaraveo*], nicht selten; meist für *Sea Bream* [centrod.] gehalten; Th. Cornish, Zoologist XI 353.

Pagrus tumifrons u. *major*, Bemerk.; Nyström, Jap. F., 14.

Pagrus ruber, 1. u. 2. Dstach. sehr kurz, 3. am längsten; Protuberanz vor der Stirn; 6—7 Sqr. auf Präop.; Maskat., 50 cm; Boulenger, Pr. z. s. London, 87 p. 658.

Pagellus affinis, A. $\frac{3}{10}$, Rücken mit Punktreihen; *erythrinus* var? Günth. Cat. 475; Maskat, 36 cm; auch am Cap; Boulenger, ebd. 659.

Chrysophrys sarba, *bifasc.*, *hasta* bei Maskat, Boul., Pr. z. s. 659.

Hoplognathidae.

Squamipinnes. Ch. H. Eigenmann und Jennie E. Horning, „a review of the Chaetodontidae of North America“, enthält nach Ausschluss der Ehippidae nur 3 amerik. Genera: *Prognath.*, *Chaetodon*, *Pomacanthus* mit 14 Sp.; Centralamerika u. Westindien scheint dabei inbegriffen. Ausführl. Schlüssel, Synonyme, chronolog. u. geogr. Uebersichten. Ann. New York Acad. of sciences, IV 1—18.

Chaetodon bleibt der Name für die Gattung, in America 3 Subg.: *Chaetodontops* (5 Sp.) *Tetragonopterus* (1 Sp.) u. *Hemichaetodon* (1 Sp.): *Ch. nigrirostris* (Cap. S. Lucas), ocell. (Westind. syn.: *bimac.*, *maculocinctus* jung 61, *amplexicaollis* Larve 63), aya 86 (Pensacola), *sedentarius* Poey 58 (syn: *gracilis*, Westi.), *humeral.* (Pacif.), *Ch. (Tetrag.) striatus* (West- u. Ostindien), *Ch. (Hemich. oder Chaetodon s. s.) capistratus* (W.- u. Ostind.). Eigenmann u. Horning, p. 3—9.

Chaetodon obscurus, 13/22, 3/18, 38, 5/17—18; Schnauze länger als Augd.; braun, vorn gelb, jede Schuppe mit 1 schwarzen Fl., C. u. Saum der D., A., V. schwarz; Maskat (Arabien), 14 cm.; ebd. auch *collaris*, *selene*, *melanopt.*; Boulenger, Pr. z. soc. London, 87 p. 657.

Prognathodes, viell. mit *Chelmon* zu vereinigen; einz. amer. Sp.: *Pr. aculeatus* Poey, Juli 60 (syn.: *Ch. pelta* Gth., Sept. 60); Eigenm. u. Horn., l. c., p. 2.

Heniochus macrol., *Holac. macul.* u. *imper.*, *Drep. punct.*, bei Maskat; Boul., Pr. z. s. 657.

Pomacanthus, hierzu wird *Holacanthus* gezogen mangels einer scharfen Grenze; von Pom. im alten, engern Sinne (D. 8—11/23—32, Sq. nach Größe u. Anordnung unregelmässig) werden 3 Sp. anerkannt: *aureus* Bl., L. l. 50—55, D. 9/32, A. 3/24 (syn.: *arcuatus* Bl., balt., *paru* Gth. part.), westind. u. nördl.; *arcuatus* L., L. l. 85—90, D. 10/29—30, A. 3/23—24 (syn: *lutesc.*, *paru* Bl., Gth. part., C. V., *5-cinctus*, *littorcola* 68), westind. u. südl.; *zonipectus*, L. l. 70, D. 11/23, A. 3/20—22 (syn. als juv.: *crecentalis*), Westamer., Eig. u. Horn., l. c., S. 9—14.

Holacanthus. Vgl. *Pomacanthus*. Eigenm. u. Horn. p. 14—16 zählen als amerik.: *P. passer* (syn. als juv.: *strigatus*), *pacif.*; *tricolor*, westind.; *ciliaris* (syn. *parrae*, *squamulosus*, *acul.*, *formosus*), westind.

Ehippus, Bem. üb. Entwickl., Larve leuchtend? Ryder, s. S. 306.

Mullidae. *Upenoides sulph.* u. *japon.*, Bem.; Nyström, Jap. F., 16.

Upeneus dubius, hat auch im Vomer u. Palat. Zähne, daher zu *Mullus* gestellt; U. barb., 1 Stachel in A. vorh.; Nyström, Jap. F., S. 16, 17.

Mullus barbatus, „Plain Surmullet on the Devonshire Coast“ 1885—1887 häufiger; E. Elliot, Zoologist XI 155.

Mullus grandis Oast. nur älteres Ex. von *dobula* Gth., Douglas-Og., Pr. Z. S. Lond. 87, 615.

Mulloides zeylonicus, Bem., von flavolin. versch. durch längl. Körper, breiteren Scheitel, rothe Färb.; beide bei Maskat, wo auch *Upeneus macron.*, cyclost., dispil.; Boulenger, Pr. z. soc. 87, 658.

Cirritidae. *Chilodactylus* zon. u. gibb., Bem.; Nyström, Jap. F., 18.

Scorpaenidae. *Sebastes*, zu den Tiefseef. gehören: *S. marinus* u. vivip. aus Nordeuropa, macrochir (Gth. 1880, Japan), hexanema (80, Ki-I.), ocul. (Magellan-Str. bis 345 Fd.); Günther, Chall. XXII 18. — *Seb. marm.*, oblongus, ventric. (jüng. mit läng. P.), Bem.; Nyström, Jap. F. 20. — *Seb. vulpes* Dd., Abb.; Steind. u. Döb., F. Jap. IV, Tf. 2.

„*Sebastes norvegicus*“ von J. D. Matthews, 5 Expl., bei 90—100 Fd. östl. von Schottland geangelt, zeigen statt D. 15/15, A. 3/8-9 nur 12/12-14, 3/6 [also ähnlich dactylopt.]. 1 Expl. v. Shetland-I. 15/13, 3/7. Ann. Mag. (2) XX 445.

Bathysebastes Döb. 1885 wird *Setarches* Lowe (62); *B. albescens* nur durch Fehlen der schwarzen Fleckchen u. durch andre Länge der D.-Stach. von *S. guntheri* versch.; Steind. in Steind. u. Döb., F. Japan IV 295, Abb. von *Set. albesc.* Tf. 1. —

Setarches, dazu *Bathysebastes*, s. oben. Auch *Lioscorpius* viell. mit *Set.* zu vereinigen; *L. lonciceps* als Tiefsef. erw., ebenso *Bathys. alb.*; Günther, Chall. XXII 20.

Setarches fidjensis, D. 10 1/10, A. 3/5, P. 23; Kopf unbeschuppt; Matuku, 315 Fd.; 1 Expl. 3 Zoll l., jetzt verloren; *Set.* ist ein Tiefsee-*Sebastes*, 1 Sp. bei Madeira, 1 Sp. bei Neu-England; Günther Chall. XXII 19, Tf. 1, Fig. C.

Scorpaena scrofa neu f. Brit., Day, „Occurr. of Sc. scr. off the south coast of England“, Pr. z. Soc. London, 87, S. 342 — *Sc. kagoshimana* Dd., Abb.; Steind. u. Döb. F. Jap. IV, Tf. 3, F. 1. — *Sc. percoides* Sol. syn.: *barathri* Hector 75, Südastralien bis Fidji-J., bis 400 Fd. tief; Vert. 10/14-15; *Sc. dactyl.* u. *kuhli* als Tiefsef. erw.; Günther, Chall. XXII 17. — *Sc. brasil.*, neu f. Charleston; Jordan u. E., Pr. n. m. X 270.

Pterois vol., lun. u. miles bei Maskat; Boulenger, Pr. z. s., 659.

Synacidium erosum, Bem.; Nyström, Jap. F. 19.

Nandidae. *Polycentridae*.

Teuthidae. *Teuthis fuscescens*, bei 1 Expl. D. 13/9; Nyström, Jap. F. 37. — *T. javus* u. *oramin* bei Maskat; Boul., Pr. z. s. 659.

Beryoidae. Als westind. aufgezählt: 1 *Polymixia*, 1 *Beryx*, 1 *Anoplog.*, u. (als Fam. Holoc.) 8 *Holocentrus*, 1 *Plectrypops*, 2 *Myripr.*; Jordan, Pr. n. m. IX 577.

Hoplostethus medit. syn.: japon., als Tiefsef. erw., Günther, Chall. XXII 21.

Trachichthys, trotz der Vomerz. wohl mit *Hoplost.* zu vereinigen; bekannte Sp.: austr., jacks. 79, elong. (Abb. Tf. IV Fig. C.), *fernandezianus* (D. 5/14, A. 3/12, L. l. 85, Scut. abd. 10, Juan Fern., 5 Zoll l.), *trailli* 75 (Abb. Tf. 55, Fig. A; der After abnormer? Weise vor der Ventralis), *macl.* 80, *intermedius* (Abb. Tf. 5 Fig. D), *darwini* (Madeira, damit syn.: japon. 83); alle sind wohl Tiefseef.; Günther, Chall. XXII 21—25.

Anoplogaster cornutus, Gatt.-Diagn., Bem., Tiefsf., Günther, Chall. XXII, 25.

Caulolepis longidens, Tiefsf., Günther, Chall. XXII, 26.

Beryx gerrardi, nahe affinis; 6/13, 4/12; 37, 6/12; hint. Nasenloch kleiner u. weiter vom vord. als bei aff.; die 2 Leisten auf der Stirnmitte hinten convergirend (statt parallel), Adelaide, 34 cm l. (Xyl.). *B. affinis*, Diagn. u. Xyl. *B. lineatus* C. V., syn.: *mülleri* Klz. 80. — Günther, „Australian f. of the genus *Beryx*“, Ann. Mg. N. H. (5) XX 237—9.

Beryx, Bem. üb. das Skelett, von 5 Sp. nur 2 in der Tiefsee: *B. decad.* (Abb. d. Skeletts Tf. 6) und *splendens*; Günther, Chall. XXII 31—33.

Melamphaës, die 8 bekannten Sp., alle Tiefsf., sind: *microps* Gth. 78, *typhlops* Lowe 43 (Abb. Taf. 5), *megalops* Ltk. 77 (Abb. Taf. 5), *crassiceps* Gth. 78 (Abb. Taf. 8), *mizolepis* Gth. 78, *robustus* (SW. v. Sierra Leone, 1850 Fd.), *beani* (crassic. Bean nec G.), *suborbitalis* Gill 84.; Günther, Chall. XXII 26—30.

Malacosarcus g. n. ein verkümmerter *Melamphaës*. Kopf gross u. dick, dünnknochig, mit grossen Schleimhöhlen, auch Kanal der L. l. weit. Maul gross, aufwärts gerichtet, Kiefer fast gleich, mit schmaler Zahnbinde, Palatinz. 0. Branch. 8, Psdbr. vorh.; Praeop. u. Mandb. (unten) mit Dornen. Sq. dünn, glatt, abfallend, mittelgross, unregelm. Eine Dors., O. ausgerandet, ob. u. unt. mit breiter Basalfalte; A. Stacheln schwach; V. 5, klein, etwas hinter der P.; Kiemen 4, mit kurzen Blättchen u. langen Dornen. — *M. macrostoma* (= *Scopelus macrostoma* Günther 1878), Pacifisch 2350 und 2425 Faden Günther, Chall., XXII 31.

Stephanoberyx monae 84, als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII 31.

Polymixia nur 1 Sp., *nobilis* (syn.: *lowei*, *japonica*, *Dinemus venustus* Poey 60), Abb. eines Ex. von *Enosima* (Japan) 345 Fd. (Taf. 1), auch bei *Mauritius*; Günther, Chall. XXII 34.

Poromitra capito G. B. 83, als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII 34.

Myripristis kaianus 80, als Tiefsf. erw., 140 Fd.; Günther, Chall. XXII 35. — *M. murdjan* u. *Holocentrum rubrum* bei Maskat; Boul., Pr. z. s. 659.

Kurtidae. *Pempheris schomb.* u. *poeyi* als westind. aufgezählt; Jordan, Pr. n. m. IX 577.

Neopempheris pectoralis, 4/17, 3/26, 74, 11/10 (vom Anf. der D bis zur A-Basis), ähnl. *ramsayi*, aber ohne schwarz. Dorsalfleck, P. etwas kürzer als Kopf, L. l. bogig bis zur Afterverticale, dahinter grade; Aird-River (Neuguinea) 40 km von der Münd.; Ramsay u. Dg.-Og., Pr. L. S. NSW. (2) II 563.

Polynemidae. *Polyn. pleb.* bei Maskat; Boul., Pr. z. s. 660. — „Note of *Polyn. californ.* of *Thomiot*“, ist wohl *P. approximans* Lay et B. juv.; Jordan, Pr. n. mus. X 322.

Sciaenidae. *Umbrina striata*, 19 1/28, 2/7, 50, 8/13; Längs. der Sq. mit dunklen Streifen, Bartf. sehr kurz, Präop. gezähnelte, C. abgestutzt, nur Sammetzähne; Maskat (Arabien), 40 cm; Boulenger, Pr. z. soc. L., 87 p. 660.

Corvina nigra, rothe Körp. d. Schwimmb.; Coggi, s. S. 294.

Haplodonotus gruniensis, Töne; Hamilton, s. S. 311.

Eques acuminatus, neu f. Charleston, sonst erst mex. Golf., Beschr.; Jordan u. E., Pr. n. mus. X 270.

Xiphiidae. 1 *Xiphias*, 2 Tetrapt., 1 Istioph. als westind. bez.; Jordan, Pr. n. m. IX 573.

Xiphias gladius. An der Küste von Massachusetts wird ein Mann, der in einem Boot liegt, durch einen harpunirten, das Boot durchbohrenden Schwertfisch tödtlich verletzt. Wilcox, Bull. N. S. Fish Comm. VI, 411, 417 (u. Zoologist XI 307).

Xiphias gladius?, nom. indig.: pez espada oder missbräuchlich albacora. Durch Flossen-Dimensionen u. dunklere Färb. vom europ. abweichend, Philippi, Tib. de Chile, Appendice, p. 33, Tf. VIII 1 u. Zool. Gart. Bd. 28, p. 87.

Histiophorus audax, nom. ind.: pez-aguja. D. etwa so hoch (44 cm) als der Leib, Schnabel bis zum Mundwinkel (beim ♂) 72 cm (Total. 272 cm); D I 38, II 5; Hautossificationen 25 cm l., 2 br., ungegabelt; 5 silberne Schrägstr. unter der D I. Das ♀ 283 cm l., seine Flossen verhältnissm. länger, A 2 (verstümmelt?), statt 12. Philippi, Tib. p. 35, Tf. VIII 2, 3 u. Zool. G. Bd. 28, p. 88. — *Hist. gladius* u. brevior. bei Maskat; Boul., Pr. z. s. 660.

Trichiuridae. 8 Sp. in 7 Gatt. als westind. bez.; Jordan, Pr. n. m. IX 573.

Nealotus tripes Johnson 65, wohl kein Tiefseefisch; der Typus verloren, Günther, Chall. XXII 35.

?*Aphanopus minor*, R. br. 7, D. 41, Kopfl. $2\frac{2}{3}$ in Krpl. bis Anus (352 mm), Augd. $4\frac{1}{2}$ in Kpfl., 2 Caninen + 6 grosse Z. im Intmx., 8 kürzere Z. in Mndb., Vomerz. u. Palz. 0; Pinna ventr. 0, dolchf. Stachel hinter d. Anus; Schwimmb. vorhanden. App. pyl. 7; östl. Grönland, 65° N., 1 unvollst. Expl. R. Collet, „Aph. m., en ny Dybvandsfisk af Trichiur. Fam.“ Forhandl. i Videnskabs-Selsk. i Christiania, Aar 86, Nr. 19. (7 S., 1 Xyl.). —

Aphanopus carbo, als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII 36, Tf. 7.

Nesiarchus nasutus Johns. 62 (syn. *Promethes paradoxus* Cap.), Tiefsf.; Günther, Chall. XXII 37.

Lepidopus caudatus, Verbreitung, Xyl. des Beckens; L. *tenuis* 77, Beschr. u. Abb. (Tf. 7); L. *elongatus* (syn. *Benthod. elong.* G. B. 82), in Neuseeland u. Neufundland, sehr ähnl. *tenuis*, nur Flossenformel verschieden; sind Tiefsf.; Günther, Chall. XXII 37, 38. — L. *argyreus*, „Scabbard fish on the cornish coast“, bei Marazion (Mount's Bay); Th. Cornish, Zoologist XI 114.

Trichiurus coxii, D. 140 Kpfl. 8, Krph. $16\frac{3}{4}$ mal in Krpl.; 1 schwarzer Fl. zw. 1. u. 4. Dst., P. schwärzl.; Broken Bay (Austr.), 100 cm; Ramsay u. Dg.-Og., Pr. L. S. NSW. (2) II 562.

Trichiurus lepturus, bei Enosima (Japan) als Tiefsf. (345 Fd.); Günther, Chall. XXII 39.

Euxymetopon taeniatus Poey, wahrsch. Tiefsf.; E. *poeyi*, ein enormer vorderer D.-Stachel (viell. verloren bei taen.?) u. kein postanaler Dorn, sondern eine Schuppe, sonst gleich taen., Mauritius, 70 Fd., 78 Zoll l.; Günther, Chall., 39, Tf. 43.

Thyrsites pretiosus u. *promethes* als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII 268.

Gempylus serpens, wahrsch. Tiefsf., Günther, Chall. XXII 41.

Acanthuridae. *Acanthurus sohal*, nigrof., xanth. bei Maskat; Boul., Pr. z. s. 660.

Prionurus maculatus, 9/24, 3/23, Schnauze wie *scalprum*, auch dem latiel.

ähnl.; hell gefleckt; Port Jackson, 40 cm. Douglas-Ogilby, undescrib. f. of the g. Prion.; Proc. Zool. S. London, p. 395.

Carangidae. Als westind. werden aufgezählt; 2 *Decapt.*, 2 *Trachurus*, 1 *Tracharops*, 10 *Caranx*, 2 *Vomer*, 1 *Selene* 1 *Chlorosc.*, 5 *Trachinotus*, 1 *Nauer*. 8 *Seriola*, 1 *Elagatis*, 2 *Oligopl.*, 1 *Pomatomus*; Jordan, Pr. n. m. IX 575.

Caranx jayakari, 8 $\frac{1}{21}$, 2 $\frac{1}{16}$, Sc. lat. klein, 30, Sammetz. in Kfr., V., Pal. u. Zunge; Kpfl. 4 mal, Krph. 3 $\frac{1}{2}$ in Ttl.; Augd. 4 $\frac{1}{2}$ in Kpfl., 1 $\frac{3}{8}$ in Snzl.; kein Fetthid; Mx. bis unter Vorderr. des Au.; Untkfr. länger; weiche D. u. A. vorn verläng.; Brust nackt, L. l. wird grade unterh. der Mitte der w. D.; schwarzer Achsel- u. Opercfleck; Maskat (Ar.) 33 cm. Ausserdem noch dort: *C. russelli* (kurra), *crumen.*, *djedd.* *ferdan*, *fulvogutt.* F., *aurogutt.* C. V. (fulvg. Rp.) *helv.*, *speciosus*, *hippos*, *chrysophrys* (= *oides* Blk.), *gallus* (1 m l.). Boulenger, Pr. z. soc. L., 87 p. 661. — *C. delicatissimus*, A. 2+1/21 (statt 11 bei Steind. u. D., Druckfehler?), ausserdem (von Nagasaki) genannt: *equula*, *flavocoer.*, *muroadai*, *trachurus*; Nyström, Jap. F., 34.

Seriola quinquerad. (D. 6, 1/30) u. *purpurascens* (A. 2, 1/21); Nyström, Jap. F., 35.

Seriola zonata C. trug auf der Haut einen Hydroidpolypen (*Hydrichthys* g. n.) als Parasiten oder Commensalen, bei Newport Mass.; J. W. Fewkes, Nature Vol. 36, 604.

Trachinotus falcatus, n. f. Charleston, beschr.; Jordan u. Eig., Pr. n. m. X 269.

Seriolichthys bipinn. (1 m l.), Chorin. lysan u. moad., *Trachyn.* baill. u. obl., *Platax vesp.* u. *teira*, Equ. fasc. u. edent. bei Maskat (Arab.), Boul., Pr. z. s. 87, 661.

Anomalops palpebratus, als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII 41.

Antigonia capros, in der Jugend nehmen sie an Höhe zu, später wieder ab; lebt in mässiger Tiefe (129 Fd.), Günther, Chall. XXII 44.

Diretmus Johns. 63 (= *Discus Campb.* 79) provisorisch in die Nähe von *Brama* gestellt; *D. argenteus* nur durch die verbreiterten V.-Stacheln von *aureus* verschieden (Altersunterschied?); Tiefsf.; Günther, Chall. XXII 45.

Cyttidae. *Cyttus abbreviatus* 75 (syn. *Antigonia mülleri* Klz. 80), Beschr. u. Abb. (Tf. 10), ein Tiefsf. (400 Fd.); Günther, Chall. XXII 42.

Stromateidae.

Zur Fam. **Coryphaenidae** gehört die Fam. **Icosteidae**. Günther, Chall. XXII 46.

Schedophilus medusoph. und *lockingtoni* (syn.: *Ichthyus lock.*) als Tiefsf. erw., *enigmaticus* (syn.: *Icosteus enigm.* u. *Schedophilopsis spinosus* Std. 81) desgl., Beschr., u. Abb. (Taf. 44) nach Ex. v. Californien; Günther, Chall. XXII 46.

Als westind. werden aufgezählt: 1 *Lampris*, 3 *Brama* (1 *Steinegeria* S. 607), 2 *Coryph.*; Jordan, Pr. n. m. IX 577.

Brama japonica Bemerk.; Nyström, Jap. F., 30. — *Brama raji*, Abb. u. Beschr.; Mc Coy, Prodr. zool. Victoriae, Taf. 133.

Nomeidae. Als eigne Familie **Grammicolepidae** (mit einem?) wird *Gramm.* *brach.* Poey u. ausserdem *Nom. gron.* ferner 2 *Psenes* u. 1 *Antigonia* (als Fam. *Psenidae*?) als westind. aufgezählt; Jordan, Pr. n. m. IX 576.

Cubiceps, dazu synonym *Cypselichthys* (s. *Pristipomatidae*).

Scombridae. 1 Scomber, 1 Aux., 2 Cyb., 1 Acathocyb., 3 Orcynus, 2 Euthynnus als westind. bez., Jordan, Pr. n. m. IX 574.

Scomber scombrus, ein Zwitter (von Christiania) zeigt einseitige Zwitterigkeit mit überwiegendem Hodenthail, wie bei Malm's Expl. 1876; Weber, s. S. 299. —

Scomber kanag. u. janes. bei Maskat, Boul., Pr. z. s. 87 p. 662.

Thynnus thynnus, 120 cm, mit 10 Flösschen bei Maskat, ebd. auch thunnina u. pelamys (auch Cybium comm. u. Elacate), Boulenger, Pr. z. s. 87 p. 662. — Orcynus thynnus. Dass die Thune nicht grosse Wanderungen vom Atl. Oc. bis Italien und Griechenl. machen, sondern nur aus den tiefen Stellen des Mittelmeers zu den benachbarten Küsten aufsteigen wird durch die regellose Zeit ihres Erscheinens an den verschiedenen Fangplätzen bewiesen. O. germo u. pelamys haben eher pelagischen Charakter. Pavesi, R. istit. Lomb., Rendic. (ser. 2) XX, fasc. 8, p. 311 (Ausz.: Biol. Centrbl. VII 493—7; desgl. S. Calloni in: Arch. soc. phys. nat. Genève (3) XVII 536—42). — „Tunny at Penzance“ 11. Juli junges Ex. gestrandet, Pilchard im Magen, Fleisch trefflich; Th. Cornish, Zoologist XI 307. — Thynnus pelamys, Bem.; Nyström, Japan. F., 31.

Cybium, Entwicklung; Ryder, s. S. 306.

Elacata, Entwicklung (Concrescenztheorie), Ryder, s. S. 306.

Trachinidae. Uranoscopus kaianus Gth. 80, Tiefsf. (140 Fd.), Günther, Chall. XXII 49.

Neopercis atlantica, sehr nahe multifasc. Dödl., aber P. kaum den Anf. der A. überragend, Stirn kaum $\frac{1}{2}$ Augd., Max. nur bis unter Vorderrand des Auges, Qb. vollständiger; Cap-Verd. Ins. 80 mtr., Gatt. (incl. Percis) neu f. Atl. Oc.; Vaillant, C. rend., T. 105 p. 1032 („Prés. de Neopercis dans l'Atlantique“) u. Bull. soc. phil. Paris, (7) XII 7—9 („genre nouv. pour l'Atl.“).

Bathyraco, nahe Chaenichthys; B. antarcticus 78, Beschr. u. Abb. (Tf. 8); Günther, Chall. XXII 48.

Aphritis gobio Gth. 80, als Tiefsf. (140 Fd.) erw., Günther, Chall. XXII 48.

Acanthaphritis grandisquamis Gth. 80, Tiefsf. (140 Fd.), Günther, Chall. XXII 49.

Champsodon vorax Gth. 80, Tiefsf. (115—152 Fd.), Günther, Chall. XXII, 49.

Hoplolatilus g. n. ?; Latilus fronticinctus, 10/13!, 2/12, L. l. 125; Praeop. u. Op. stark bedornt, Infraorb. sehr schmal, Kehlbrücke sehr breit; Mauritius, 20 cm; Günther, Pr. Z. Soc. Lond., p. 550, Tf. 48.

Pseudochromis persicus, Persischer Golf, J. A. Murray, Journ. Bombay n. h. Soc. II p. 49 u. Ind. Ann. N. H. I p. 24.

Opisthognathus muscatensis, 25—27, 15—17; Mx. bis Mitte zw. Auge u. Pbasis; braun mit dunklen Flecken, grosse ovale Ocelle zw. 3. u. 7. Dstr., Arabien (Maskat) 30 cm, Boulenger, Pr. z. s. 87, 662, Taf. 54; (Ebd. auch Percis nebul u. albog. sowie Sill. sihana erw.)

Opisthognathus inornatus, 12/16, 2/14, Sq. sehr klein, L. l. nur bis 9. D-Stach., Mx. $\frac{2}{3}$ der Kpfl.; einfarbig braun; Derby (Austr.), 28 cm; Ramsay u. Dg.-Og. Pr. L. S. NSW. (2) II 561.

Opisthognathus, 3 westind. Sp.; megastoma syn. zu macrognatha Poey; Jordan, Pr. n. m. IX 598, 608.

Gnathypops (viell. fem. zu Opisthogn.), ebd.

Notothenia mizops 80, als Tiefsf. erw. (120 Fd.), Günther, Chall. XXII 268. — Not. *filholi*, Campbell-I. Sauvage in: Filhol, Miss. Campbell, Mém. Passage de Vénus III, pt. 2, p. 345 (1885).

Malacanthidae. Psychrolutidae.

Batrachidae. *Batr. grunniens* L. (trisp. Gthr.) bei Maskat, Boul., Pr. z. s., 87, 662.

Thalassophryne dowi, durch zahlr. Str. (D. 2/33, A. 30) von den 5 bek. Sp. versch., Panama u. Punta Arenas; Jordan u. Gilbert, Pr. U. S. nat. mus. X 388.

Pediculati. *Lophius*, Bauchhöhle frei von Bacterien, Ewart, s. S. 291. — Mit *Lophius* viell. generisch zu vereinigen: *Melanocetes*, *Oneirodes* u. *Ceratias*; L. pisc. als Tiefsf. (bei Neuengland 120—365 Fd.) erw., L. *naresi* Gth. 80 ist stets Tiefsf.; Günther, Chall. XXII 49.

Himantolophus reinhardti, jung. Ex. (Island, 207 mm lang) hat einfachern Schopf am Stirntentakel (Xyl.). Das Skelett des erwachsenen beschr. u. abgebildet; Wirbel 10/9, Knochen am Kranium gut entwickelt; mit dem Schädel von *Ceratias* verglichen. Lütken, Fortgesetzte Beitr. z. K. d. arkt. Tiefseepediculaten, insbes. des Gen. *Himantol.*, Kong. Danske vidensk. selskabs Skrifter (7) Natur-math. Afd., IV S. 323—334, 1 Taf. (dänisch m. Franz. Ausz.). — Him. groenl. u. reindh. als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII 51.

Aegaonichthys appeli Clarke 78, Neuseeland, desgl., ebd. 52.

Ceratias. Günther, Chall. XXII 52—55, giebt Bemerk. üb. 6 Sp. u. folg. Schlüssel:

I. Zwei Stachelstrahlen auf dem Kopfe . . . C. (*Diceratias* sg. n) *bispinosus*.

II. Ein Stachelstrahl auf d. Kopfe.

A. Ein 2. Stach. auf d. Rücken. mit seith. Karunkeln, Vomerz. 0 . . . C. (*Ceratias*) *holböllii*.

B. Kein Stach. a. d. Rücken; mit Karunkeln.

1. Kar. von der weichen Dors. entfernt.

a) Nur 2 Kar.; Vomerz. 0 . . . C. (*Mancalias*) *uranoscopus*.

b) 3 Kar.; Vomerz. ? . . . C. (*Typhlopsaras*) *shufeldti*.

2. Kar. unmittelbar vor der w. D.

a) Terminales Kopfglied sehr kurz . . . C. (—) *carunculatus*.

b) Term. Kopfgl. lang . . . C. (*Cryptopsaras*) *conesi*.

Cer. bispinosus, ähnl. *johnsoni*, ab. Haut sammetartig durch feine Stacheln, Vomerzbinde in der Mitte unterbrochen; Banda-I., 360 Fd., 8 cm; Taf. 11 Fg. B. C. *carunculatus*, ? = *conesi*, Südl. v. Tokio, 345 Fd., 4 cm; Taf. 11 Fg. D.; C. *uranosc.* Beschr. u. Abb. (Tf. 11, C), Atl. Oc. 2400 Fd.

Oneirodes, vergl. *Lophius*; O. *eschrichti*, Bemerk., Tiefsf.; Günther, Chall. XXII 56.

Melanocetus (*Lyocetus* sg. n.) *murrayi*, D. 1/13, A. 4, P. 14, sehr ähnl. *ohnsoni*, aber ohne Vomerz.; mittlerer Atl. Oc., 1850 u. 2450 Fd., 13 Zoll l.; Günther, Chall. XXII 57, Tf. 11 Fg. A.

Linophryne lucifer, Tiefsf., Günther, ebd. 57.

Antennarius marm., über dessen Nest, Vaillant, C. r. soc. biologique (Paris), (8) IV 792. — A. *nummifer* bei Maskat, Boul., Pr. z. s. 663.

(Antennarius.) *Pterophrynoides histrio* (L.), syn.: *A. marm.* Gthr.; *A. scaber* C., syn.: *histrio* G.; *multicell.*, syn.: *annul.* Gill; Jordan, Pr. n. m. IX 603.

Chaunax, nur 1 Sp.: *pictus* (syn. *fimbriatus*), bek. von Madeira, Japan, Viti-L., Neu-England; Günther, Chall. XXII 58, Expl. v. Viti (315 Fd.) Abb. Tf. X Fg. A.

Halientaea senticosa 81, als Tiefsf. erw., Günther, ebd. 59.

Dibranchus atlanticus 75, desgl. (360! Fd.), Günther, ebd.

Cottidae. *Cottus scorpius*, Entwickl., Cunningham, s. S. 297. — *Cottus szanaga* Dyb. von *poecilopus* nur durch kürzeren u. niedrig. Schwanzstiel versch., viell. nur var.; *C. haitej* Dyb. zur Gatt. *Uranidea*, hat aber stärkere Kopfbewaffnung u. die freie Kiemenhautfalte angedeutet, daher Ur. nicht als Gatt. abzutrennen; Herzst. u. Warpach., Fischf. Amurb., S. 17 u. 54. — *C. hilgendorfi*, Abb.; Steind. u. Döb., F. Jap. IV, Taf. 4, f. 3.

Cottus, dazu als Subg. *Cottunculus* (s. unt.). *C. bathybius*, D. 5/10, A. 7, P. 17, V. 3; durch stark entwick. Schleimkanäle als Tiefsf. charakterisirt; graubraun, Kehle u. Flossen schwarz; Südl. v. Tokio, 565 Fd., 6 cm l.; Günther, Chall. XXII 62, Tf. 10, C.

Cottunculus, charakterisirt durch Verschmelz. der 1. u. 2. D. u. durch Theilung der Vornz. in 2 Gruppen; nur ein Subg. von *Cottus*. *C. microps*, als Tiefsf. erw., Bemerk. u. Abb. (Tf. 9, A); *Cottunc. thomsoni* (*Cottus th.* Gth. 82, syn.: *Cottunc. torvus* 83) verbindet beide Gattungen, Beschr. u. Abb. (Tf. 9, B); Günther, Chall. XXII 60, 61.

Centridermichtys affinis St. u. D., Tango (Westküste) u. Kanagawa, 10/19, 17, Orbitaltent. vorh., P. ungefleckt, Schnauze = Augd.; *argenteus* D. (? = *schlegelii* D. juv.), Tokio; *elegans* St. juv.?; *nudus* D., Tokio; Schlüssel der 10 jap. Sp., Abb. von *C. schlegelii* Tf. 3, f. 2; Steind. u. Döb., Fische Jap. VI, 257–9. — *Centr. uncinatus* als Tiefsf. (223 Fd.) erw.; Günther, Chall. XXII 62.

Icelus hamatus (syn. *furc.* 65), als Tiefsf. (250 Fd.) erw.; ebd. 63.

Triglops pingelii als Tiefsf. (263 Fd.) erw.; Günther, ebd. 63.

Platycephalus subfasciatus, 1/8/12, 11, L. l. 74; Mauritius, 25 cm; Günther, Pr. Z. Soc. London, p. 551, Taf. 49. — *Platyc. insid.*, *punct. macrolepis*, *rudis*, *jap.*, *asper*, Notizen; Steind. u. Döb., F. Jap. IV, 259–61. — *Platyc. punct.*, Bem.; *Pl. macrolepis* 1/8/11, 11, 50; Nyström, Jap. F. 25, 26.

Bembras laevis, Körph. 10 mal in Ttl., obere Kopffläche gänzlich ohne Dornen u. Kiele, 6/14, 15, 40; [Nagasaki] 135 cm; Nyström, Jap. Fisk., 26. — *B. japon.*, Tiefsee; Steind. u. D., 261.

Hoplichthys langed., Notizen, Steind. u. Döb., F. Jap. IV 261.

Prionotus jap., s. *Lepidotrigla*.

Lepidotrigla serripens, 9/17, 17; L. l. 65., *L. güntheri* (Beschreib.); *L. japonica* (präocc. vergl. unten!), 8/15, 15, 55, die Knochenplatten neben der D. ähnl. gүнth., sonst ähnlicher *serripens*; Nyström, Jap. Fisk., 21–3. — *Lepidotrigla longispinis* St. u. D. 8–9/15, 15, L. l. 58–60, 2 D.-Stach. 1½, in Kpfl., Tokio, Tf. 4, F. 1; *L. microptera* Gth., wozu als ad. *L. strauchii* Std., Abb. Tf. 4, F. 2.; *microptera* Gth. juv., an *L. maculosa* Döb.?, 7 cm, Tango, jap. Westküste; *japonica* Blk. hat keine Gaumenz., daher zu *Lepidotr.* statt *Prion.*; *L. bürgeri*, Bem.; Steind. u. Döb., F. Japan's IV 261–5.

Trigla kumu, jung mit 4 Qb. von Flecken; P.-Länge bei ad. u. juv. ca. $\frac{1}{2}$ Totl.; Steind. u. D., ebd. 265. — *Trigla leptacantha* u. *spiloptera* (80), als Tiefsf. (140 Fd.) erw.; Günther, Chall. XXII 63. — *Trigla arabica*, 7/12, 12; nahe hemisticta; 1 Ex. 23 cm bei Maskat; die Gattung bisher in Indien u. Ostaf. unbekannt. Boulenger, Pr. z. s. L., 87 p. 663. (Ebendort auch *Platyceph. insid.*). — *Tr. gurnardus*, Ei; Scharff, s. S. 298; rothe Körper der Schwimmblase, Coggi, s. S. 294.

Cataphracti. *Agonus decagonus*, als Tiefsf. (260 Fd.) erw.; Günther, Chall. XXII 65.

Peristethus, wahrsch. alle Sp. bis in die Tiefsee gehend; *P. miniatum* (sehr nahe *brevirostre*), molucc., murrayi, liorhynchus, micronema, truncatum als Tiefsf. erwähnt; Günther, Chall. XXII 64. — *Peristethus* sp., 7/15, 15, L. l. 24 [34 Day]. Präorb. Fortsätze kurz, $3\frac{1}{2}$ in Schnzl. Ein Paar Dornen auf dem Occiput, das jederseits eine niedrige, in 1 Stachel endende Leiste trägt, vordere verticale Platten länger als breit. Die Opercularleiste bildet e. kräft. Dorn. Untkfr. mit Barteln, der äussere länger; einfarbig roth; tieferes Wasser bei Galle (Ceylon); Genus neu f. Indien; Haly, Taprob. I 166. [1888 von Day *P. halei* genannt.]

Dactylopterus peterseni, nur 1 freier Str. vor D., C. pyl. 13, Occipitalfortsätze bis zum 2. D.-Stachel, Abstand ihrer Spitzen $1\frac{1}{2}$ Mal in der Länge des Einschnitts zwischen ihnen; Nyström, Jap. Fisk., 24.

Pegasidae.

Discoboli. „*Cyclopterus lumpus* at Scilly“ bei 2 ♂ (16 Zoll) war der Saugnapf deutlich von den Brustfl. geschieden, hart u. anscheinend für Adhaesion unbrauchbar (Alterszeichen?); Th. Cornish, Zoologist XI 196. — „On the Welsh Coast“ ebenso wie *Anarrhichas* selten. G. H. C. Haigh, ebd. 273. — *Cycl. spinosus* als Tiefsf. erw. (129 Fd.), *C. orbis* viell. synonym.; Günther, Chall. XXII 66. — Entwickl. von *Cycl.*, Cunningham, s. S. 297.

Liparis C. wird *Cyclogaster* Gron. 1763; Jordan, Pr. z. m. IX 542 (1886). — *L. vulg.* u. *mont.*, einige kurze biolog. Noten, W. A. Smith, Pr. r. phys. s. Edinb. 85/6, pag. 143. — Entwickl. von *Lip.*, M'Intosh, s. S. 319 u. Cunningham, s. S. 297.

Liparis micropus, D. 35–37, A. 35–36; Schwanz dünn, wie *Careproctus*; Kopfl. $\frac{1}{4}$ der Körperl. (mit C.), Ventralscheibe $\frac{1}{4}$ der Kopfl.; hellgrau oder purpurn; Färöe-Canal, 608 Fd., 5–9 cm. Günther, Chall. XXII 66, Tf. 12, B. Als Tiefsf. werden noch erw. *L. fabr.* (106 Fd.), *liparis?* (Shetland, 180 Fd.), *gelat.* (263–658 Fd.); ebd.

Paraliparis membranaceus, D. u. A. ca. 70; Kopf gross u. hoch, Bauchhöhle kurz; eine Medianfalte von der Schnauze bis zur C., im hintern Theil mit Strahlen, A. gleichfalls vorn als Falte entwickelt bis zum After (gegenüber dem hint. Augenrand) reichend, P. sehr gross, die untere Abth. mit (8) freien Str. nicht von der ob. getrennt; Kiemenspalte unten geschlossen; Cap. St. Vincent, 400 Fd., 6 cm l. Ob Jugendform? Günther, Chall. XXII 69, Taf. 12, D. — *P. bathybius*, nach e. Exp. vom Färöe-Canal beschrieben (640 Fd.); die Saugsch. fehlt völlig, der untere Theil der P. (3 Strahlen) von der obern abgetrennt, ebd. S. 68, Taf. 12, C. — *Monomitra* wahrsch. syn. zu *Paral.*; *P. liparina* ebenfalls Tiefsf. (487 Fd.) Günther, ebd.

Monomitra liparina Goode, zu *Paraliparis* (s. oben).

Gobiidae. *Gobius capito*, rothe Körper der Schwimmblase, Abb.; Coggi, s. S. 294. — Eine Mittelmeerart durch Aufnahme v. Pflanzengiften giftig; Carruccio, s. S. 312. — *Gobius jayakari*, 6 $\frac{1}{10}$, 1/10, Sq. 65–67, 16 zw. D. II u. A.; keine Caninen; Kpfl. $\frac{1}{8}$ Krpl. (o. C.), Augd. $\frac{1}{4}$ Kpfl., Au. fast in Kopfmittle; hellbraun mit undentl. Querb., D. u. A. mit Fleckchen; Maskat, Süßw., 16 cm; Boulenger, Pr. z. soc. L. 87 p. 663, Taf. 54.

Eleotris pleskei Warp., D. 6, 1/10, A. 1/9; L. l. 40–43, tr. 18–19, Kopf u. Körp. zieml. comprimirt, Form cyprinoiden-artig; Fluss Lefu; Herzenst. u. Warpach., Fischf. Amurb., S. 19 u. 54, Fig. 2. — *E. dybowskii* H. et W.; 7, 1/11, 2/8; 40–42, 18–19, Sumpf bei Chingan; *E. (Percottus) glehni* Dyb., beschr.; Herzst. Warp., ebd. S. 21 u. 54.

Callionymus kaianus (140 Fd.) u. *calauropomus* (115) als Tiefsf. erw.; Günther, Chall. XXII 70.

Cepolidae. *Cepola schlegelii* u. *krusensternii* (hierzu syn.: marg. u. limb. C. V., mesoprion Blk. als juv., abbrev. C. V.), Bem.; Steind. u. Död., F. Japan's IV 268–70.

Heterolepidotidae. *Hexagrammus asper* Stell. (*Chirus hexagr.* Pall.), Bem., Steind. u. Död. F. Japan's IV 266.

Agrammus schlegelii, desgl. ebd.

Anoplopoma fimbria, Fischfang. u. Verwerthung, Rep. XIII U. S. Fish. Comm., S. röm. 67.

Blenniidae. *Anarchochias*, Ei; Scharff, s. S. 298. — *Anarrh. minor* (200 Fd.) u. *latifrons* (280) als Tiefsf. erw.; Günther, Chall. XXII 70.

Blennius crinitas, Curaçao, Bemerk., Lidth de Jeude, Not. Leyd. Mus., IX 136. — Ei von *Blennius*; Scharff, s. S. 298.

Salarias tridact. bei Maskat (als einz. Blennioid); Boul., Pr. z. s. 664. — *S. pulcher* u. *opercularis*, Kurraachee, J. A. Murray, Journ. Bombay soc. II u. Ind. Ann. N. H. I.

(*Salarias*.) *Salariichthys textilis*, dazu syn.: *vomerinus*; Jordan, Pr. n. m. IX 599.

Cremnobates, hierzu *Clinus nigripinnis* Std.; 4 + 1 westind. Sp. aufgezählt, Jordan, Pr. n. m. IX 599, 608.

(*Clinus*.) *Labrisomus buccifer* Poey, syn.: *bigutt.* Op.; Jordan, Pr. n. m. IX 599. — Vergl. *Cremnobates*.

Cristiceps eigenmanni, D. 3, 29/2, A. 27–28, L. l. 80, Kopfl. 4 in Krpl. (o. C.); ähnl. *Auchenopt. marm.*, ab. Sq. viel kleiner; N.O.-Patagonien, 41° 17' S.; D. S. Jordan, Pr. acad. nat. sc. Philad., 87 III, 387. — Entwickl. von *Cr. Fusari*, s. S. 301.

Blenniops ascanii (180 Fd.) als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII 71.

(*Centronotus*.) *Muraenoides* Lac. wird *Pholis* Gron. 1763, Jordan. Pr. n. m. IX 542, Anm. (1886). — Entwickl. von *Centr.*, M'Intosh, s. S. 319.

Zoarcas C. wird *Enchelyopus* Gron. 1763 [nec Klein nec Bl. Schn.]; Jordan, Pr. n. m. IX 542 (1886). — Entwickl. von Z., Stuhlmann, s. S. 296 u. Cunningham, s. S. 297.

Acanthoolinidae. Mastacembelidae.

Sphyaenidae. *Sphyaena*, 4 Sp. westindisch; Jordan, Pr. n. m. IX

572. — *Sph. obtusata* Bem.; Nyström, Japan. Fisk., 29. — *Sph. jello, kenie, obtus.*, *chrysotaenia* Klz. bei Maskat; Boul., Pr. z. s. 87 p. 664.

Atherinidae. 3 + 1 Sp. *Atherina* u. 2 *Menidia* als westind. aufgeführt; Jordan, Pr. n. m. IX 571, 607. —

Atherina bleekeri, Bem.; Steind. u. Död., Fische Jap., 267. — *Ath. valenciennesii*, Bem.; Nyström, Jap. F., 38. — *A. pinguis* bei Maskat, Boul., Pr. z. s. 664.

Mugilidae. 3 Sp. von *Mugil*, 3 *Agonost.*, 1 *Joturus* (1 *Querim.*) als westind. aufgeführt; Jordan, Pr. n. m. IX 571, 607.

Mugil für Forsk. (*cephalotus* C. V.) u. *M. haematochilus* Schl. (nec Gth.), wozu syn. *joineri* Gth., Bem.; Steind. u. Död., F. Japan's IV 266. — *Mugil scheli* (axill.) u. *ceylon*, bei Maskat; Boul., Pr. z. s. 664.

Trachystoma g. n. Br. 6, Psbr. vorhanden, kein Fettlid, Vom. u. Pal. mit deutl. Binden von Sammetz., Kiefer zahnlos, Sq. zieml. klein, fein ctenoid. *Tr. multident.*, D. 4, 1/8, A. 3/9, Sq. 48—51, 16; von der Mündung des Kerauh-R. 3 Ex. im Febr. auf dem Markt in Sidney, 40 cm. Douglas-Ogilby, Pr. Zool. S. Lond. 87, p. 614.

Gastrosteidae. *Gastrosteus bussei* Warp., 9—8/8—9, 1/8—8, L. l. 33—34, näher dem *stenurus* Kss. als dem *sinensis* Guich., Lefu Fluss; Herzenstein u. Warpachowski, Fischf. Amurb., S. 13 u. 54, Fig. 1. — Ueber Muskelstruktur von *Gastrosteus* s. Marshall (S. 283); üb. Spinndrüse, Ei u. Entw. von G. quadr., Ryder, s. S. 306; üb. rothe Körper der Schwimmblase, Coggi, s. S. 294.

Fistularidae. *Fistularia serrata* u. *depressa*, Bem.; Steind. u. Död., F. Jap. IV 267.

Centriscidae. *Centriscus scolopax*, Bem.; Steind. u. Död. ebd.

Gobiesocidae. *Sicyases* als Subg. zu *Gobiesox*, 5 westind. Sp., Jordan, Pr. n. m. IX 597.

Gobiesox (vergl. *Sicyases*), 4 westind. Sp., virgat. (82) viell. zu *G. nudus* autt. nec L., Jordan, Pr. n. m. 597.

Lepadogaster dentatus, ähnl. desfont., aber D. weiter vor der A., Kopf oben etwas convex, Zähne gleich, der vordere Theil der Bauchscheibe convex, ein glattes Viereck in der Mitte der Bechb., Entfernen des Anus von der A. grösser als Länge der D., einfache Genitalpapille statt e. Schopfes, ein Fleck unter P.; Messina; Facciola, Natur. sicil. VI 165—6, Tf. III Fig. 2 (dabei Not. üb. *gracilis* u. *ottaviani*). — *Lepad. minimus* Död. D. 7, A. 5; C. von D. u. A. getrennt. 23 mm l., Sagami 100 Fd.; Steind. u. Död., F. Japan's IV 270.

Lepadogaster gouani, „système de la ligne latérale de Lép.“ Der longitud. Canal fehlt gänzlich. *Gobiesox* hat gleichen Typus; Beschr. der mikr. Baues der Nervenendigungen; Fr. Guitel, C. r. acad. Paris, Tome 105, p. 687. — Guitel: „Coque de l'oeuf des Lepadogaster.“ Die Eier sind niedergedrückt, die Unterseite ist mit strahlenförmig gestellten, am Ende zweizipfligen Cylindern versehen, mittelst deren die Eier an Steinen etc. haften; die Stäbchen werden vom Eifollikel gebildet. Ebd. p. 876. „Embryogénie et système nerveux des Lép.“ Schilderung der allgemeinen Entwicklung. Die Schwimmblase bildet sich, verschwindet aber bald wieder völlig. Die Deutung der Stücke des Saugnapfes betreffend, so würde allerdings die Nervenvertheilung eher für die Stannius'sche Auffass., die Entwickl. aber mehr für die Günther'sche sprechen, wonach der

vordere Saugnapf der Ventralis zugehört, der hintere aber vom Postclaviculare gebildet wird. Ebd. 1270.

Lepadogaster decandolli, Laichen, Brut, Untsch. zw. Männchen u. W., Farbenwechsel, eigenth. Schutz(?)-Organ des Auges; W. A. Smith, Pr. r. phys. soc. Edinb. 85/6, p. 143, Taf. 7.

Leptopterygius piger, 2 Paar Ruder zur Seite der Bauchscheibe scheinen einen secundären Sexualcharakter der Art darzustellen (für Beschleunigung der Fortbewegung u. für die Anheftung des Thieres von Bedeutung); Facciola, Naturalista sicil. VI 163—4, Tf. III F. 1.

Ophiocephalidae. *Ophiocephalus pekinensis*, beschr., von der Mündung des Muren; Herzenst. u. Warpach., Fischf. Amurb., S. 23 u. 54.

Labyrinthici. *Otenopoma conicum*, 17/8, 11/10, Sq. 27, 3/8; n. indig. Kouandé, in Lagunen der Inseln des untern Congo; Boulenger, Ann. Mg. Febr. 87, S. 148.

Ludiocephalidae.

Lophotidae. *Lophotes* als Tiefseef. erwähnt, Günther, Chall. XXII 76.

Trachypteridae. Th. Gill; Char. u. Relations of the Ribbon-Fishes, hält Regal. u. Trachypt. für Repräsentanten zweier Fam., welche zus. einen Subordo „Taeniosemi“ der Teliocephali bilden (cf. Standard Nat. Hist. III 265, 1885), Parker's osteol. Angaben (Ber. f. 86, S. 241) stützen seine Ansicht. Von den Taeniosemi könnten die Heterosomata [Pleuronect.] abstammen. Amer. Natur. XXI S. 86.

Trachypterus, Bemerk. üb. bekannte Sp. u. Schwierigkeiten der Unterscheidung; Tr. sp. juv., sehr ähnl. repandus bei den Philippinen (in 700 Fd. oder im obern Wasser?) gedrescht, 4 cm l. Alle Sp. wohl Tiefseef., wenn auch öfter in höherem Niveau. Günther, Chall. XXII 72. — Trach. arct. beschr.; Howden, s. S. 319.

Stylophorus chord., das einz. bek. Expl. in schlechten Zustand gerathen; als Tiefseef. erw.; Günther, Chall. XXII 73.

Regalecus. Artunterscheidung wegen Seltenheit u. schlechter Coservirung der Expl. unmöglich; man soll die frischen Expl. in einzelne Stücke geschnitten, jedes in Musselin gewickelt, mit stärkstem Spiritus conserviren. Aufzählung aller genauer bekannten Funde: Skandinavien 14, Brit. Meere 19 (letzter 1884), Mittelmeer 1, Bermudas 1, Cap 3, Indien 1, Neuseeland 5; scheinen in den stürmischen Jahreszeiten in die Höhe zu kommen. Günther, Chall. XXII 73—76.

Regalecus glesne, Grieg's Arbeit (s. Ber. 86 S. 319) übers. in Ann. Mag. N. H. (5) XIX 246. — *R. banksi*, ein Expl. v. Tasmanien beschr. u. abgeb.; Mc Coy, Prodr. zool. of Victoria, Decas 15, Taf. 145.

Notacanthi. Schwimmbiase hat keinen offenen Gang zum Darm, trotzdem u. trotz der D., A. u. V.-Stacheln keine Acanthoptergier, weil die mehrstrahlige (7—10) V. durchaus abdominal gelegen, jedoch eigentlich auch nicht den Physostomi einzureihen u. nicht besonders den Holosaur. od. Muraen. (zwischen welchen in der Reihenfolge eingeschoben) verwandt, sondern wahrsch. e. eigne Ordnung darstellend; die mangelhafte Kenntniss allein hindert deren Begründung. Günther; Chall. XXII 242.

Notacanthus, Diagn. d. Gatt.; 2 Subg.: 1. Not. (s. s.) mit weniger (6—11) D.-Stacheln, Zähne des Obkf. comprimirt schräg dreieckig, 2. *Polyacanthonotus*,

Dst. mehr als 30, Z. im Obk. wenig compr., aufrecht (hierzu nur *rissoanus*). — *N. sexspinis* Beschr. u. Abb. (Tf. 61, A.); Splanchnologie (Schwimmb. s. oben, Coeca pyl. 5. Ausführliche Osteologie (Tf. 60); Knochen kräftig (nicht nach Art echter Tiefsf.), am Schädel z. Th. verschmolzen, Knorpel nur im Vorderschädel entwickelt, Intmax. fast den ganzen Mundrand bildend, mit dem Schädel, und dem Max. unbewegl. verbunden, Max. einen suborbitalen Dorn tragend. Vomer [u. Metapter.] fehlen; der Gaumenbogen ist beweglich u. die Palz. treffen auf die Mandbzähne (wie bei Haifischen); vor dem Palatinum ein kleiner Knorpel; Mandb. hoch ohne deutl. Angulare; Op. u. Subop. häufig u. zerfasert, mit den 9 R. br. in e. gemeinsch. Haut. Infraorbitalia fehlen. Nur 1 Supraclav. [d. h. Omolita u. Scapulare Stann. verschmolzen], welches lose mit d. Occiput verbunden; Postclav. 0. Wirbel am Schwanz comprimirt u. die hintern sehr verlängert, schliesslich rudimentär; vert. abd. 49. Zwischen je 2 Analstacheln ein horizontaler, basaler Knochen. Tiefsf. (?Fd.). — *N. nasus*, Diagn. (?syn. analis Gill 84), Tiefsf. (?Fd.); *phasganorus* 81, Diagn. cop., Tiefsf. (?Fd.); *bonaparti*, Beschr., Abb. (Tf. 61, C), auch an Westküste v. Südamer., Tiefsf. (400 Fd.); ?*rissoanus*, Beschr. eines Ex. von Japan, Splanchnologie, Tiefsf. (1875 Fd.) Tf. 61, B. Günther, Chall. XXII 243–251.

Acanth. Pharyngognathi.

Pomacentridae. *Amphiprion sebae* u. *clarki*, Glyph. coelest. u. sord., Dasc. trimac., Heli. opercul. von Maskat erw.; Boulenger, Pr. z. s. 87 p. 664.

Glyphidodon (Parma) *hermani*, 13/18, 2/14; Sq. stark gezähnt, 31–32, 4 1/2/12; schwarz, C. schwefelgelb; Capverd.-I.; Steindachner, Ans. Ak. Wiss. Wien., Ig. 27, S. 230.

Heliastes roseus (1890) als einz. Tiefseef. (140 Fd.) unter den Pharyngogn. erwähnt, Günther, Chall. XXII 76.

Labridae. *Labrus*, Färbung eines postlarvalen (11 mm) Exp. v. L. macul. ?; Weiss, Silber u. Braun bilden die Zeichnungen, Blau, Gelb u. Orange fehlt noch; die P. ist in schneller vibrierender Bewegung. M'Intosh, Ann. Mag. (2) XX 300 (vergl. S. 319). *Labrus maculatus*, Eier, Brut u. Nest, Duncan, 5. ann. report Fish. Board Scotl. — *Labrus merula*, rothe Körper d. Schwimmblase; Coggi, s. S. 294.

„*Crenilabrus exoletus* at Penzance“, Lebensfärbung eines ♂ im Mai; riecht schlecht; Th. Cornish, Zoologist XI 308. — *Cr. tinca* u. *pavo* u. *3. andre* Sp., Entwickl., List, s. S. 302; Bastarde, List, S. 310; Laichzeit, List, S. 311.

Choerops macleayi, A. 3/10, 29, 4/10, einfarbig rothbraun, 14 cm, Port Jackson; Ramsay u. Dg.-O., Pr. Linn. S. N. S. Wales (2) II S. 241. — *Choerops jap.* Beschr.; Steind. u. Död., F. Jap. IV 276.

Semicossyphus retic., beschr.; Steind. u. Död., F. Jap. IV 270; *S. robecchi* St. u. Bellotti, 12/10, 3/12, Sq. 8/18, 49; Kpfl. = Krph., üb. 3 1/2 in Totl.; silbriges Längsb., 1 viol. Fleck auf weich. D. u. A., Yokohama; ebd. S. 15. *S. unimac.* in Japan, Beschr., ebd. 271.

Trochocopus canis, n. indig. „peje-perro.“ D. 12/9, A. 3/12, L. l. 45–50, dunkel mit orange Fleck oberhalb der P.; = *Dentex maculatus* Perez, estud. p. 11.; Philippi, Tib. de Chile p. 38, Tf. VII 3.

Graus gen. nov. Br. 6, D. 13/ [A. 3/]; aussen 1 Reihe grosser, dann 1 R. kleinerer Zähne, u. innen eine Binde kleinster, kein hinterer Caninus; V. hinter P.; 4 vollständige Kiemen u. 1 rudimentäre [Pseudobrachie]; Praeop. ganzrandig, Wangen, Vorderkopf u. Basis der D. u. A. nackt, Schuppen mittelgross, die des Operc. klein. Gr. *nigra*; n. indig. „Vieja negra“; Krpl. 58 cm, H. 12, Dicke 10,5, Kpfl. 13,5.; Chile; Philippi, Tiburones de Chile, p. 40.

Cossyphus bellis, 2/11, 3/12, blassroth, Bauch gelblich, dunkle Lstr. nach Schpplin., 2 unterbroch. hellrothe Lbd.; Shoalhaven (Ostaustr.), 28 cm; Ramsay u. Dg.-Og., Pr. L. S. N. S. W. (2) II 561. — *C. unimac.*, beschr. Steind. u. Döb., F. Jap. IV 271.

Labrichthys rubig., 3 Färbvar. (*affinis* D. var. n.); *L. gracilis* L. tr. 2/9, 3 R. Wangenschen., Basis der C. schuppenfrei, Tokio Steind. u. Döb., F. Jap. IV 272—3. — *L. rubiginosa*, ♂ u. ♀ beschr.; Nyström, Jap. F., 40. — *Labrichthys cyanogenys*, Sq. 25, 3/9, Wangen mit 2 R. Schpp.; rothbraun mit 2 viol. Qb., Kopf oben grünblau, seitlich viol., unten indigo, D. viol. vorn gelblich, C. bräunl. mit Purpur u. Gelb, P. mit blauem Basalband; Broken Bay (Austr.), 45 cm. frisst Mollusken; Ramsay u. Dg.-Og., Pr. L. S. N. S. Wales (2) II 242.

Duymaeria japonica Blk., dazu syn.: *flagell.* Schl. (nec *flag.* C. V., welche L. l. 20 statt 25) u. *spilog.* (viell. als ♀); Steind. u. Döb., F. Jap. IV 273.

PlatyGLOSSUS bleekeri, 9/12, 3/12, 28, 2/8, dunkler Fl. im Anf. der D., Kopf mit 4 gelben Lbd.; Tokio, jap. N.: Hombera; Bem. üb. Pl. pyrrh. u. poecilopty.; St. u. D., ebd. S. 275.

Julis cupido, Färbung, St. u. D., ebd. S. 276. — *Julis vulg.*, rothe Körper der Schwimmbi.; Coggi, s. S. 294.

Coris sp. 9/12, 3/12; 75, 3/27; Kpfl. 4 in Krpl., 1. D stach. = Krph. roth mit 11 Qb., jede Sq. mit 1 grün Fl., Kopf orange mit viol. Radien vom Auge; Ceylon; Haly, Taprob. I 166 (Ebd. noch 4 andre Labr. erw.). [Wird *Coris halei* Day, nahe *C. bleekeri* Hubr. 76, 1888].

Pseudoscarnus madagascariensis, 2 Schppr. auf der Wange, 1 auf Präoprand; Kiefer grün, nur halb von der Lippe bedeckt; Sq. der L. l. wenig verzweigt; hellbraun mit breiten, dunkl. Lgstrf., die am Kopfe netzförmig, Lippen gelb, obere mit 1, unt. 2 viol. Qb.; C. hinten wellenf. mit schwach vorgezog. Ecken; Madag., Steindachner, Anzeiger Ak. Wiss. Wien, math. nat. Cl., Jg. 24, S. 230. *Ps. aerug.* Kner (Novara) von Auckland wird *Ps. kneri*; von aer. Blk. versch. durch Einbucht. der C. u. Zeichnung; ebd. 231. — *Ps. ovifrons* (? an *Ps. schlegelii* St.), auf dem Praeop. 5 Schuppen (statt 1 bei ov.); Steind. u. Döb., F. Jap. IV 277. *Ps. globiceps* bei Oshima; ebd. — *Ps. duss.* u. *ianthochir* bei Maskat; Boul., Pr. z. s. 664.

Embiotocidae. *Ditrema smitti*, Krph. 1/3 Ttl. hinterer Theil der A. hoch, ihr 17. bis 20. Strahl fadenf. verlängert, Spitze der P. bis zur A.; 11/21, 3/27, 78, 11/18; [Nagasaki] 18 cm; Nyström, Jap. Fisk., 32.

Chromides. *Hemichromis voltae*, 16—17/9—10, 3/6—7; Sq. 4 auf Wange, 28, 3 1/2/9; Krph. 2 1/2—2 1/2, Kpfl. 2 3/4—3/4 mal in Krpl.; dunkle Qb. stark verschwommen; Voltafluss, Goldküste; Steindachner, Anz. Ak. W. Wien, Jg. 27, 230.

Acara sypilos Cp. 72, bei (Canelos); Boulenger, Pr. Z. S. 87, S. 275.

Orenicichla saxat., bei Canelos (Ecuador); Boulenger, Pr. Z. S. 87, S. 275.

*Anacanthini.***Gadopsidae. Cerdalidae.**

Lycodidae. Lycodes, wahrsch. gehen alle Sp. unter die 100-Fadenlinie hinab; von folg. ist dies constatirt: *L. esmarki* (im Färöe-C. 608 Fd., viell. syn. zu *vahllei*), *reticul.* (nach einem Ex., 22 Zoll l., v. Färöe-C. beschr. u. abgeb. [Tf. 13]; syn.: *lütkeni*), *frigidus* (variirt! in Ausdehnung der Beschuppung u. Länge der L. l., Färöer-C. 540—640 Fd.), *pallidus*, *seminudus*, *muraena* (Färöe-C. 540—640 Fd., A. 87—100, Beschupp. unregelmässig, Tf. 12, A.), *sarsi* (1 Ex., 85 mm, N. Atl., 180 Fd. Beschr. u. Xyl.), *verilli*, *paxillus*, *paxilloides*; Günther, Chall. XXII 76—81.

Lycodon mirab. als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII 81.

Gymnelis viridis, als Tiefsf. erw.; nur noch eine andre Sp.: *G. picta* durch Flossenformel versch., die Färbung nach dem Alter ändernd; Günther, Chall. XXII 81.

Melanostigma gelatinosum als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII 82.

Gadidae. *Gadus*, Wandrungen der jungen *Gadus*; M'Intosh, s. S. 319. Eier von 4 Species; Scharff, s. S. 298. Entwicklung, (*G. morrhua* u. *tomc.*), Ryder, s. S. 305, Entw. (*G. aegl.*) Prince, s. S. 301 u. Cunningham, s. S. 297. Bau der Occiput (*G. morrhua* u. *aegl.*); Gegenbaur, s. S. 280. Zersetzung des gesalzenen Fleisches; Layet, s. S. 313 u. Brieger, S. 273. Von *Gadus*arten geht *morrhua* im Sommer unter 100 Fd. hinab; *poutassou* u. *argenteus* als Tiefsf. erw.; Günther, Chall. XXII p. 82 u. *minutus* desgl. p. XIX.

Gadus morrhua (vergl. oben). Ein Zwitter von den Lofoten, bei beiden Geschlechtsdrüsen die vordere (grössere) Hälfte ♀, die hint. ♂; Weber (s. S. 299). — Künstliche Zucht in Norwegen; Rogenerud, s. S. 314.

Gadus pollachius, „facts in the life-history of the Pollack“: Wechselt die Farbe nach der Umgebung; Laichzeit März, 4 Millionen Eier, wächst bis Herbst zu 6 Zoll, während des Winters kaum; die Haut in der kalten Jahreszeit mit dickem ($\frac{1}{16}$ Z.), transparentem Schleim [Epithel] bedeckt; öfters Rückgratverkrümmung. M. Dunn, Zoologist XI 241—8. —

Gadus minor Dd., D. 11/12/19, A. 19/19, Untkfr. länger als Obkfr., Bartel?, Tokio-Bai; Steind. u. Döderl., F. Jap. IV 277.

Mora mediterranea als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII 83.

Halargyreus johnsoni, als Tiefsf. erw., 3 Expl. aus Neuseeland: D. 7, 47—57, A. 41—46; Günther, Chall. XXII 83.

Strinsia tinca wahrsch. Tiefseef.; Günther, Chall. XXII 85.

Melanonus, von *Strinsia* nur in Zähnen u. Flossen abweichend, *M. gracilis* (1878) 1975 Fd., antarctisch. Beschr. u. Abb., Günther, Chall. XXII 84, Tf. 14, B. *Merluccius vulg.* als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII 85.

Hypsicometes gobioides 81, als Tiefsf. (115 Fd.) erw., Günther, Chall. XXII 86.

Lotella marginata 78, Beschr. u. Abb., Magellan-Str. 345 Fd.; Günther Chall. XXII 86, Taf. 14, A. — (?*Lot.*) *maxillaris* 85, als Tiefsf. erw.; ebd. — *Lot. phycis*, Beschr., Steind. u. Döderl. Fische Jap. IV 278.

Uraleptus maraldi, als Tiefsf. (mässig tief) erw., Günther, Chall. XXII 87.

Physiculus Kp. (dazu *Pseudophysiculus* Gth.); *Ph. dalwigki* (dazu *bacchus*), *kanpi* (syn.: *japonicus* 79; von Cuba, St. Helena u. Jap.; Bem., Abb. Tf. 17, A) und *peregrinus* als Tiefsf. erw.; die Tiefe von *breviusc.* Rich. = *bacchus* Forst. u. von *barbatus* Gth. = palm. Klz. nicht bekannt; Günther, Chall. XXII 87. — *Phys. dalwigkii* (♀), D. 7/52?, A. 65, R. br. 7. 1. D. hintere P-Wurzel, Tokio-Bay, 6 cm; Steind. u. Döderl., F. Japans IV 279.

Phycis, wohl alle Sp. gehen tiefer als 100 Fd., sicher: *blennioides*, *chesteri* (79), *regius* 81, *americ.* (syn.: *chuss* G. B. 83), *tenuis* 83; Günther, Chall. XXII 89.

Laemonema, kaum von *Phycis* generisch verschieden; *barbatulum* (83) ein Tiefsf. (312 Fd.), *robustum* u. *yarr.* wahrsch. auch unter 100 Fd., *brasil.* (syn. *brevifile*) aber Küstenfisch; Günther, Chall. XXII 90.

Haloporphyrus, alle Sp. Tiefsf.; *H. guentheri* Gigl. 80 (lepid. G. nec. R.) Beschr. u. Abb. (Tf. 18, A); *lepidion* R., Bem.; *eques*, D. 4, 56–62, A. 49–54, L. 1. 180, Auge u. Kopf grösser als bei *guentheri*, Färø-C. 530 Fd., 13 Zoll l. (Tf. 18, B); *inosimae*, D. 5, 60, A. 52, sehr ähnl. lepid., ab. Sq. kleiner, *Enosima* (Japan) 345 Fd., 12 Zoll l. (Tf. 20, B); *ensiferus*, D. 5, 52 A. 46, der 1. Dorsalstrahl sehr breit u. comprimirt, weisser Fleck auf Ende der D. u. A., Mündung des Rio Plata, 600 Fd., 14 Zoll l. (Tf. 19, A). Günther, Chall. XXII p. 90–92. — Hal. austr. siehe *Salilota*.

Antimora rostrata (78) u. *viola* 79, Tiefsf., Beschr. u. Abb.; Günther, Chall. XXII 93, 94, Tf. 16, A. u. 15.

Salilota g. n. für *Haloporphyrus australis* Gth. 78. Länglich, Schuppen sehr klein, Kopf dick, aber etwas comprimirt. C. abgetrennt; 2D. u. 1A; V. mit breiter Basis, mit mehreren (8) Str. Bauchhöhle reicht weit hinter den After hinaus. Sammetz. gleicher Länge in Kiefern u. Vomer, Palz. O. D I ca. 9. Bartel am Kinn. Coec. pyl. sehr lang, in mässiger Zahl. Bildet e. Uebergang zu *Lota*, aber Kopfform versch. Kein Tiefseefisch. — S. austr., Magellanstr., 55–70 Fd., Beschr. Abb.; Günther, Chall. XXII p. 95, Tf. 17, B.

Lota, *Chorda dorsalis*; Lvoff, s. S. 280.

Molva molva (150 Fd.) u. *abyss.* (300 Fd.), Tiefsf.; Günther, Chall. XXII 96. (*Motella*.) *Onus macrophth.* Gth. 67, nur 1 Ex. von den Hebriden (90 Fd.) bek., nicht = mediterr. juv. (gegen Ltk. u. Collett); *O. carpenteri*, D. 49, A. 45, P. 23, V. 6 (= *M. macrophth.* Gth. 74 nec 67), nördl. Shetland-I. 180 Fd., Tf. 42, D.; *reinhardti* 12 Zoll l., (640 Fd.) Färø-C., Beschr., Abb. (Tf. 19, B); *septentrionalis* (150 Fd.); *ensis* (1106 Fd.); *cimbrius* (178 Fd.); alle als Tiefsf. aufgeführt. Günther, Chall. XXII 98. — Entwickl. von *Motella*; Cunningham, s. S. 297. Die rothen Körper der Schwimmb.; Coggi, s. S. 294.

Brosmin *brosme*, Färø-C. 530 Fd., Tiefsf., Günther, Chall. XXII 98.

Chiasmodon niger, grösstes bek. Ex. 6½ Zoll, bis 1500 Fd., Günther, Chall. XXII 99.

Ophidiidae. *Brotula japonica*, D + C + A 235–8, Kpfl. ⅓ der Ttl. (statt 188 bez. ⅓ bei multib.), Tokio, 37 cm; Steindachner u. Död., F. Jap. IV 279.

Sirembo armatus, ausf. Beschr.; Steind. u. D., ebd. 280.

Myxocephalus g. n. Gestreckt (H. in Ttl. 4⅓), spitz endend; Rumpf stark comprimirt, kleinschuppig, Kopf schwach compr., nackt, Kopfknochen grubig, Op. oben mit langem Stachel; Zähne büstenf., auf Kiefern, Vomer u.

Gmb.; vert. Flossen vereinigt, V. kehlständig, einstrahlig, R. br. 8; Pseudobr. u. App. pyl. 0; Schwimmblase zieml. gross. *M. japonicus*, 128, 92, C. 8 cm, P. 31, L. l. ca 90; kupferfarbig, Flossen dunkler; Tiefsee bei Tokio, 37 cm, Steind. u. Döderlein, Fische Japans IV 281.

Barathrodemus manatinus, als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII 100.

Neobythites, syn. *Tetranematopus* Gth.; *N. grandis* (Siremba gr. Gth. 77), Beschr. u. Abb. (Taf. 21, A), Eingeweide beschr., Darm mit sehr grossen Zotten u. starken Gefässen, die Schwimmblase gross, quer geteilt mit e. grossen Rete mirabile, Japan 1875 Fd.; *N. macrops*, Augd. = Schnauzl. u. Stirnbr., Praeop. mit 2 Dornen unten am Hinterrand, 8—9 Längsr. von Schuppen zw. Anfang der D. u. L. l. braungrau mit braunen Fl., 6—7 schwarze auf der D. Philippinen 375 Fd., 20 cm, nach Knochenstruktur, Augengrösse u. Zeichnung eher Oberflächenfisch (Taf. 20, A.); *N. ocellatus*, Stirn concav, 6—7 Längsr. v. Sch. zw. D. u. L. l., 2—3 schwarze weissrandige Fl. auf D., Pernambuco 350 Fd., 9 cm. l. (Tf. 21, B); *N. gilli*. Tiefsf. (111 Fd.). Copie d. Beschr. Günther, ebd. 100—3.

Cataetyx g. n. (für Siremba messieri Gth. 78). Gestreckt, comprimirt, Schpp. sehr klein, L. l. undeutlich u. unterbrochen, Kopf länglich u. mit Ansn. des Vorderendes der etwas spitzen Schnauze beschuppt. Kopfknochen fest, Schleimkanäle wohl entwickelt. Auge zieml. klein; vord. Nasenloch auf der Schnauzenspitze, hint. etwas vor dem Auge. Kein Bartel. Dornen nur 1, am Op.; Maul weit, Obkfr. etwas länger als Ukfr., Sammetz. in Binden am Vomer u. Pal., an der Seite des Ukfrs. eine Reihe grösserer Z. Schwanz mässig verdünnt, D., C. u. A. verschmolzen, beide V. genähert, einfache Fäden, unter der Mitte des Op. inserirt. Kiemen 4, Blättchen entwickelt, Kdornen kurz u. breit. Psbr. 0, Br. 8, C. pyl. vorh. — C. mess., 20 cm., Messier Str., 345 Fd. Günther, Chall. XXII 104, Taf. 23, B.

Pteridium atrum, als Tiefsf. erw., Beschr., Günther, Chall. XXII 105.

Pteroidonus n. g. Die unt. (5) P.-Str. frei u. verlängert, Körper comprimirt, verlängert, kleinschuppig, L. l. unvollständig nahe der Rückenhöhe. Kopf längl., dick, beschuppt. Auge klein. A. etwas verlängert, mit D. u. A. verschmolzen, V. einfacher Faden hinter der Symphyse des Schultergürtels inserirt, beide von einander etwas abstehend. Schnauze breit, Maul unterständig, weit, Ukfr. kürzer; Sammetz. auf Kfr., Vom. u. Pal. Bartel 0. Op. mit 1, Präop. mit (3) Dornen. Br. 8, Kiemenblättchen zieml. kurz, Kdorn. zieml. lang, lanzettf. weitgestellt, Psbr. 0. — *Pt. quinquarius*, 99, 87, L. tr. (über Anus) ca. 35. Fleischfarben, vertik. Flossen u. Mundhöhle schwarz; Japan 565 Fd., 36 cm. l. Günther, Chall. XXII 106, Tf. 22, B.

Dicrolene intronigra (83), als Tiefsf. erw., beschr.; Günther, Chall. XXI 107.

Mixonus g. n. Von *Pteroidonus* u. *Dicrolene* durch Kopfform versch.; Kopf etwas compr., breit, oben flach, vorn deprimirt, nur zw. den Mandibeln (u. ? auf den Wangen) beschuppt. Für *Bathynectes laticeps* Gth. 78. Nur 1 Ex. 13 cm. l., schlecht erhalten, bekannt, Mittelatl. 2500 Fd., Günther, Chall. XXII 108, Tf. 25, B.

Bathyonus (= Bath. G. partim u. *Bathynectes* Gth. partim) Diagnose; B. compressus 78, Beschr., Abb. (Taf. 22, A.); B. *taenia*, D. 138, A. 115, P. 90, V. 1, hell, Kopf. u. Abdomen schwarz, Mittelatl. 2500 Fd., 26 cm. (Taf. 23, A.); B. *catena* (86) als Tiefsf. erw.; Günther, Chall. XXII 109—111.

Porogadus gracilis Gth. 78, 1400 Fd. Beschr. (Taf. 16, B); P. *miles* (86) als

Tiefsf. erw. (1168 Fd.); *P. rostratus*, B. 8, D. 120, P. 21, V. 2, Krph. 2/5 der Rumpfl.; Schnauze über das Maul hinausragend, in der Mitte vorspringend, nördl. Celebes 2150 Fd., 28 cm. Günther, Chall. XXII 111—4, Tf. 24, B.

Nematonus g. n. Von *Porogadus* nur durch den Mangel der Kopfdornen verschieden. N. pectoralis G. B. 86, Tiefsf. Günther, Chall. XXII 114.

Diplacanthopoma g. n. Körper comprimirt, verlängert, kleinschuppig, L. l. undeutlich. Kopf etwas deprimirt, nackt, dünnknochig mit weiten Schleimkanälen. Auge mässig. Vord. Nasenloch im Schnauzenrande, hint. dicht vorm Auge. Am Op. 2 Dornen, der untere am Winkel, abwärts gerichtet, keine am Praeop. Schnauze breit, deprimirt, Obkfr. länger als Ukf. Kein Bartel. Maul mässig weit, Hechelz. in Kfrn. Vom. u. Pal. Schwanz spitz ausgezogen. D., C. u. A. verschmolzen, V. 1 einf. Faden, beide nahe zusammen, unter der Mitte des Op. inserirt. Kiemen 4, mit weitstehenden, lanzettf. Kdornen, Blättchen entwickelt; Psdhr. 0. — *D. brachysoma*, oben hellbraun, unten u. Fl. farblos; Perambuco, 350 Fd., 11 C. Günther, Chall. XXII 115, Tf. 23, C.

Acanthonus armatus Gth. 78., Beschr., Abb., Günther, Chall. XXII 116, Tf. 24, A.

Typhlonus nasus Gth. 78, Beschr., das Augenrudiment kleiner als ein Stecknadelkopf, im Innern des Kopfes; Günther, Chall. XXII 118, Tf. 25, A.

Aphyonus gelatinosus Gth. 78. Chorda dors. persistirt, nur Andeutungen von Wirbelsegmentierungen ihrer Oberfläche, Eierstöcke des einz. Ex. entwickelt, sonst könnte diese Sp. leicht für ein Entwicklungsstadium des *Typhlonus* gehalten werden, mit dem es Mangel äusserer Augen. u. Beschaffenheit der Eingeweide theilt. „Der niedrigste aller Anacanthini.“ Beschr., Abb.; Günther, Chall. XXII 120, Tf. 26, A.

Rhodichthys regina Coll., als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII, 121.

Ophidium muraenolepis Gth. 80, als Tiefsf. erw. (140 Fd.), Günther, Chall. XXII 268.

Fierasfer *kagoshimanus*, Kopfl. 7½, in Ttl.; Zähne klein in Kfr. Gmb., im Vomer etwas grösser als kurzes Längsband; P. 2½, in Kpfl.; Süd-japan, 11 cm.; Steind. u. Döb., F. Japan IV 283.

Macruridae. *Macrurus*. Mit dieser Gatt. vereinigt Günther, Chall. XXII 122—152, die Gatt. *Coryphaenoides* u. *Malacoceph.* Dagegen scheidet er als 3 Gattungen diejenigen Formen aus, denen die häutige Verbreiterung an der Peripherie des 1. Kiemenbogens fehlt (*Trachyrhynchus*, *Bathygadus* u. *Macruronus*). Die 11 Subg. von *Macrurus* werden in erster Linie nach der sehr constanten Bezahnung unterschieden. Die Schuppen erhalten erst spät Dornen (bei 8 Zoll Länge), die Zähnelung des D.-Stachels ist e. constanter Char., nur im Alter verschwindet sie in einigen Fällen. Nackenlöcher fehlen, die D II ist vorn sehr kurz. Schlüssel für die neuen Subgenera, von denen 7 neu sind (p. 124):

I. Hechelzähne, im Ukf. die Zahnbinde am breitesten an der Symphyse, manchmal an der Seite einreihig werdend.

A. Schuppen deutlich dachziegelf., keine vergrösserten Rückenschuppen.

1. Schuppen gedorn.

a) Maul ganz unterständig, longitudinale Crista auf der Infraorbitalgegend, Dstach. glatt *Coelorchynchus*.

b) Maul unterst., Infraorb. Cr. mehr od. w. deutlich, Dst. gesägt
Macrurus.

- c) Maul weit und lateral, Dst. gesägt *Coryphaenoides*.
- d) Maul weit u. lateral, Dst. glatt *Mystacourus*.
- 2. Schuppen glatt *Lionurus*.
- B. Schuppen undeutlich, die ganze Haut mit Dörnchen . . *Trachonurus*.
- C. Eine Reihe grosser Sch. längs der Basis die D. u. A. . . *Cetonurus*.
- II. Zwischenkfr. heterodont, innen mit Hechelz. aussen eine Reihe grosser weilküftiger Z.
- A. Dorsalstachel gesägt, *Chalinurus*.
- B. Dorsalstachel glatt *Optonurus*.
- III. Zwischenkfrz. ein- od. zweireihig, Ukfrzähne einreihig.
- A. Dorsalstachel glatt *Malacocephalus*.
- B. Dorsalstachel gesägt *Nematonurus*.
- Alle Arten sind Tiefseef. Als ursprüngl. Ausgangsform gilt der Gadus-ähnli. *Nem. longifilis*, als höchst differenziert *Coelorh.* Nicht einzureihen vermochte Vf. *Macrurus macroleph. Kp.*, *acrolepis* Bean, *carrib. G. B.* *occa G. B.* u. *Malacoc. occid. G. B.* Trotz der enormen Häufigkeit der *Macruren* hat die Chall.-Exp. keine Larvenformen (Krohnus) gesammelt.
- M. (Coelorhynchus) parallelus* Gth. 77, Beschr., Abb. (Taf. 29, A), japon. (Abb. d. Schuppe Tf. 29 C), *australis, coelorh. (syn. atlant.), carminatus* 81 (Tf. 50, B, von den Bahama-I.) *fasciatus* 78 (Tf. 28, A). *M. (Macrur) fabricii, rudis* 78, (Tf. 27), *nasutus* 77 (Tf. 30, B), *serrulatus* 78 (Tf. 30, A), nach Abbrechen der Schwanzspitze hat ein Expl. verlängerte Strahlen erzeugt, einer besonderen Schwanzfl. ähnlich, *sclerorchynchus* (Tf. 32, A.), *aequalis* 78 (? *serratus* Lowe, Tf. 32, C), *bairdi* 77 (Tf. 32, B), *goodi* (p. 136 *asper* Goode nec Gth.), *holotrachys* 78 (Tf. 28, B), *asper* 77 (Tf. 36, A.), *carinatus* 78 (Tf. 33, A). *M. (Coryph.) rupestris* Gunner (? *carapinus* G. B. 83), *altipinnis* 77 (Tf. 39, A). *M. (Mystacourus) longibarbis*, Viti-I. 316 Fd., 14 cm l. (p. 139, Tf. 18, C), *italicus* Gigl. (ähnli. *laevis*, aber Bezahn. versch.). *M. (Lionurus) flicanda* 78 (Tf. 34, B), *microlepis* 78. *M. (Trachonurus) villosus* 77 (Tf. 36, B). *M. (Cetonurus) crassiceps* 78 (? *globiceps* Vaill. 84, Tf. 37; eine *Pseudocandalis* wie bei *serrul.*). *M. (Chalinurus G. B.) leptolepis* 77 (Tf. 31), *simulus* G. B., *fernandesianus*, Juan Fern. 1375 Fd. (p. 145, Taf. 38, B), *liocephalus* Japan u. mittl. Pacif. Oc. 1875 u. 2060 Fd., 40 cm. (p. 145, Tf. 38, A). *M. (Optonurus) denticulatus* Rich., Neuseeland u. Kermadek-I. *M. (Malacoceph.) laevis* (Tf. 39, B), *macrochir* 77 (Tf. 29, B), *sulcatus* 86. *M. (Nematonurus) armatus* 75 (Tf. 40, A; ein Albino mit schwächeren Schuppen), *affinis* 78 (Tf. 40, B), *longifilis* 77 (Tf. 35). — Alle 37 Sp. sind beschrieben, auch Synom. u. Verbreitung.

Macrurus tokiensis 11/119, 119, V. 7, L. l. 130, tr. 5/15 (bis zur V.); Unterseite des Kopfes nur am Praeop. beschuppt, Rumpfsch. mit 6—9 Leisten; Zähne schwächer als bei jap.; Tokio, 80 cm. Steind. u. Död., F. Japan IV 283. *M. japonicus*, Bem., ebd.

Coryphaenoides marginatus, 10/116, 120, L. l. 150, tr. 7/23; Schnauze breit, eckig mit tuberkelartiger Spitze, Tokio, 53 cm. Steind. u. Död., F. Jap. IV 284. — Steind. lässt *Coryph.* nur als Subg. von *Macr.* gelten; ebd. 285.

Trachyrhynchus Giorna (syn. *Lepidoleprus*), 1. Kiemenbog. frei, 4 Kiemen mit entwick. Blättchen; Schnauze zu einem langen Fortsatz ausgezogen, Maul hufeisenf. an der Unters. des Kopfes, Hechelz. im Obkfr. u. Ukf, ein Bartel,

eine schuppenlose Grube jederseits am Nacken; D II vorn gut entwick.; Schuppen mittelgross, dornig, grosse gekielte Sch. vorn neben der D. u. A.; Op. sehr klein. Tr. trachyrh., Beschr., Abb. d. Schuppen (p. 152, Tf. 41 C); Tr. longirostris Gth. 78, Beschr. (p. 153, Abb. Schuppe Tf. 41, B.); Tr. *murrayi*, D. 9, P. 23, V. 7, hellgelb, vertik. Flossen, der verläng. Strahl der V. u. Mundhöhle schwarz, Färde-C. 555 Fd., 15 Zoll l. (p. 153, Tf. 41, A). Günther, Chall. XXII p. 152—5.

Bathygadus cottoides Gth. 78, Beschr. Abb. (Tf. 42, A); B. *multifilis* D. 8, P. 15, südl. v. den Philippinen, 500 Fd., 12 cm l. (p. 155, Tf. 42, B); B. cavernosus 86, macrops 86, longifilis 86, Diagn. copirt. Alle Sp. Tiefseef., Günther, Chall. XXII 154—7.

Macruronus Gth., Zool. Record VIII 1873 p. 103, Diagnose, M. novaezelandiae, Bemerk., Günther, Chall. XXII 157.

Lycionidae, fam. nov. Ein mehr generalisirter Typus als die Macruridae. Körper in e. langen, compr., spitzen Schwanz auslaufend, kleinschuppig. Eine continuirl. D. vom Nacken (üb. der Basis des P.) bis zur Schwanzspitze (die 3—4 vord. Str. verlängert); A. vom After bis zur Schwsp.; C. 0; V. thoracisch mit mehreren (10) Str. Pseudobr. vorhanden; Kiemen 4; R. branch. 7. Günther, Chall. XXII p. 158.

Lyconus g. n. Kopf u. Körper comprimirt, dünnknochig, aber mit engen Schleimkanälen (ausg. auf der Stirn); Mittelkörper („trunk“) so lang oder länger als d. Kopf; Auge gross; Schnauze kurz; Maul weit, endständig, beide Kfr. mit 1 Reihe weitstehender, ungleicher Z., Obk. vorn mit 2 Caninen, Vomer mit 2 Z. Sq. sehr klein, cycloid, abfallend. Kiemenhäute nicht vereinigt. Bartel 0. — *L. pinnatus*, 1 Ex. 12 cm l. (juv.) auf d. südl. atl. Oc. treibend gefunden (1876 vom Mus. Godeffroy erhalten), Tiefseefisch. Günther ebd.

Ateleopidae. Ateleopus, Diagnose; A. jap., Diagn. nach e. Expl. von 9 Zoll, Form der Flossen abweich. v. Schlegel's Fig.; Günther, Chall. XXII 159, Tf. 50, A. — Atel. japon., Beschr. e. Expl. von Tokio; Steind. u. Döderl. F. Jap. IV 286.

Xenoccephalidae.

Pleuronectidae. Die Fam. enthält 19 Tiefsf. (unterhalb 100 Fd.), wobei 4 zugleich Küstenf. sind; keine Sp. bisher tiefer als 732 Fd. Die als Larvenform beschr. Delothyris pell. (115 Fd.) würde als 20. Sp. hinzukommen; Günther, Chall. XXII 160. — Abstammung der Pleuronectiden von den Trachypteriden, s. Gill, S. 345.

Psettodes erumei, Pseudorh. russelli, Pardachirus marmor. bei Maskat; Boul. Pr. z. s. 87 p. 665.

Hippoglossus hippoglossus, 41 Zoll l., ausnahmsweise im Süssw. (Potomac-R.); Nature, Vol. 35 p. 569 (nach Science). — Hipp. pinguis als Tiefsf. erw. (447 Fd.); Günther, Chall. XXII 161.

Hippoglossoides platess., Tiefsf. (220 Fd.); Günther, Chall. XXII 161. — Ei von Hipp. plat.; Scharff, s. S. 298.

(Rhombus) Zeugopterus *papillosus*, D. 94—95, A 68—69 (also zw. Z. punct. u. unimac.), V. mit A. vereinigt (wie punct.), Westschottland, nur 11 cm; Abb. der 3 Sp.; G. Brook, „The British sp. of Zeug.“, Pr. roy. phys. soc. Edinb., sess. 116 (86/7) p. 362—9, Taf. 14—16.

Arnoglossus lophotes Gthr., 2 Ex. im März 86 bei Messina, der erste be-
Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 1889. Bd. II. H. 1.

stimmte Fundort der Sp., Beschr.; L. Facciola, „rinvenim. dell' Arn. loph. nel mar di Mess.“, Atti soc. nat. Modena, Rendic. (3) III p. 91—94.

Monolene sessilicauda 81, Tiefsf. (155 Fd.), Günther, Chall. XXII 165.

Samaris macul. 80, Tiefsf. (140 Fd.); Günther, Chall. XXII 162.

Lepidopsetta macul. 80, Tiefsf. (310 Fd.); Günther, Chall. XXII 162.

Poecilopsetta colorata 80, Tiefsf. (129 Fd.); Günther, Chall. XXII 162.

Anticitharus polysp. 80, Tiefsf. (140 Fd.); Günther, Chall. XXII 162.

(*Hemirhombus*.) *Aramaca papillosa* (L.), syn.: ?*Cithari. ocell.* Poey u. Hemirh. aram. Gth.; Jordan, Pr. n. m. IX 602. — *Aram. patula*, weit nördlich (Charleston); Jordan u. E., ebd. X 270.

Citharichthys spilopt., syn.: *Hemirh. fuscus* P., Jordan ebd. IX 602. — *Cith. arctifrons* 81 (197 Fd.) u. *unicornis* 81 (155 Fd.), Tiefsf.; Günther, Chall. XXII 165.

(*Pseudorhombus*.) *Paralichthys brasil.* (Ranz.), syn.: *vorax* Gth.; Jordan, Pr. n. m. IX 602.

Pseudorhombus hectoris für *Ps. boops* Gth. 1880 nec Hct., Neuseeland 150 Fd., 16 cm l.: D. 117, A. 89, L. l. 78., bräunlich (statt gelblich), Sq. deutlicher ciliirt, Xyl. (Kopf v. *hect.* u. *boops*), Tiefsf.; Günther, Chall. XXII 163; Beschr. des Typus von *boops* Hct. (400 Fd.) ebd. S. 164. *Ps. oblongus* G. B. (100 Fd.) u. *ocellatus* Gth. 80 (152 Fd.) als Tiefsf. erw., ebd.

Rhomboidichthys cornutus 80, Tiefsf. (32—350 Fd.); Günther, Chall. XXII 165. — Vergl. üb. Jugendform v. *Platophrys* unten bei *Plagusia*.

Pleuronectes, die Entwickl. von *plat. fesus*, *lim.*, *cynogl.*, *microc.*; Cunningham, s. S. 297. — *Pl. beani* 80 (126 Fd.) u. *cynoglossus* (*littoral* u. bis 732 Fd.), Tiefsf.; Günther, Chall. XXII 166.

Parophrys cornuta, Bem.; Nyström, Jap. F. 42.

Nematops microstoma 80 (152 Fd.), Tiefsf.; Günther, Chall. XXII 166.

Solea, nur 1 Sp. Tiefsf. (*S. kaiana* 1880, 140 Fd.), Günther, Chall. XXII 166. — *S. solea* nach Nordamerika; Moore, s. S. 315. — *S. hartzfeldi*, Bem.; Nyström, Jap. F. 41.

(*Solea*.) *Achirus lorentzi*, Weyenbergh's Beschreib. reproducirt; wohl nicht syn. zu *mentalis* (geg. Gthr.), Süßw. (Parana); Jordan, Pr. ac. nat. sc. Philad. 87 III p. 389. — *Achirus inscriptus*, syn.; *reticul.* P.; *A. achirus* (L.), syn.: *browni* Gthr., ?*apoda* Mitch., ?*lineatus* L. Jordan, Pr. n. m. IX 602.

Synaptura quagga, D. 74, A. 61, L. l. 90; Nyström, Jap. F. 41.

Aphoristia nebulosa 83, Tiefsf. (229 Fd.); Günther, Chall. XXII 167.

Plagusia, die von Agass. 1878 beschrieb. Jugendform ist nicht *Pl.*, sondern wahrsch. *Platophrys ocell.*, Jordan, Pr. ac. nat. sc. Philad. 87 III, p. 391.

Physostomi.

Allgemeines. Günther, der Schwimmblasengang kann abortiv werden, s. *Halosauridae*; vergl. auch *Notacanthi* (S. 345).

Siluridae. A. Günther, ein kurzer Artikel „*Siluridae*“ mit einigen Xyl. in *Encyclopaedia britannica* Vol. 22, S. 67—9.

Clarias melas, 105, 88, P. 1/7, e. Uebergangsform zw. *Clarias* u. *Gymnallabes*; n. indig. Fouca; Lagunen u. Schlammböhlen des untern Congo; Boulenger, Ann. Mg., Febr. 87, S. 119.

Plotosus, das Anhangsorgan der Genitalpapille; Brock, s. S. 299.

Silurus asotus, *Albinos* nicht selten; Steind. u. Döb., F. Jap. IV 287.

Pseudobagrus ransomnetti St. 1/7, 22; nahe *fulvidraco* (von welcher *calvarias* schon durch gedrungene Körperform versch.), aber P.-stachel ungezähnt, Kopf schlanker u. mit gleichmässig schwacher Krümmung des ob. Profils bis zur D., Kopfhaut zart u. ohne Papillen, Zahnbinde des Vomer schmaler; Osaka 10 cm. *Ps. tokiensis* sp. n. ? Dd. 1/7, 20; von aurant. durch viel niedrigere D. u. viel kürz. Fettf. untersch.; Tokio, 16 cm. Steind. u. Döb., F. Jap. IV 287, 288.

Macrones ussuriensis, beschr.; Herz. u. Warp., Amurbecken, S. 24, 55.

Amiurus nebulosus, in Deutschland gezüchtet, v. d. Borne, Circ. d. Deutsch. Fisch.-V., 1887 S. 102. — Epiblastischer Ursprung des Segmentalgangs; Ryder, s. S. 308.

Ictalurus okeechobeensis, nahe *lacustris*; Florida im Ok.-See, 50 cm; A. Heilprin, „a n. sp. of Catfish“, Pr. ac. nat. sc. Philad., 1887 I, p. 9. — Entwickl. und Brutpflege; Ryder, s. S. 307.

Pinelodus buckleyi, = *lateristriga* Cp. 72 neo M. Tr., bei Canelos; Boulenger, Pr. Z. S. Lond. 87, S. 275, Tf. XX 1. *P. longicauda* u. *pulcher*, Canelos; ebd. S. 275 bez. 276, Tf. XX 2, XXI 1.

Arius thalassinus, bei Maskat 75 cm lang; durch kürz. Schnauze, läng. Mxhart. u. Mangel der Granulationen von *nasutus* versch., keine Alters- aber viell. Geschlechtsunterschiede; Boulenger, Pr. z. s. 87 p. 665. (Ebd. auch *Plotosus anguill.*)

Galeichthys, hiermit wird vereinigt *Arius*; 27 Sp. als westindisch aufgeführt; zu *G. felis* syn.: *A. milberti* u. *equestris*, Jordan, Pr. n. m. IX 558.

Cetopsis plumbeus Std. 83, bei Sarayacu (Ecuador), Boulenger, Pr. Z. S., 87 S. 276.

Malopterus electricus. G. Fritsch, „die elektr. Fische, nach neuen Unters. anat.-zool. dargestellt, 1. Abth. Mal. electr.“, Leipzig 4^o. 12 Taf., 3 Xyl. — Arab. Name u. Darstell. durch die alten Egypter. Lebensweise u. Vorkommen (im Nildelta zahlreich). Ob der Mal. lebende Junge hat, oder laicht, ist unsicher, wie die Entwickl. überhaupt noch e. Desiderium; die Laichzeit wäre wahrsch. der Juli. Vom Dec. bis März verschwindet der Fisch (in Schlupfwinkel am Grunde?). Verf. will e. „orthognathe, hypsikephale“ westafr. u. e. „progn. platyk.“ ostafr. Rasse unterscheiden, aber mit Peters nur 1 Sp. (Abb. nach d. Leben p. 1 u. 6). Das elektr. Organ ist bei jüngern Ex. einheitlich rings um den Körper ausgebreitet, bei ält. Ex. in der Medianlinie durch Bindegewebe in 2 Hälften getheilt. Das Gewicht des Organs ist mehr (bei ält. Ex.) oder weniger (jüng.) als $\frac{1}{2}$ des Körpergewichts. Die Cloake zeigt nur beim ♂ ein äusserlich erkennb. Orificium urogen. Die Verbreitung der peripher. Nerven anlangend, so gilt der N. electr. trotz seines Ursprunges neben dem 3. Spinalnerv dem Vf. für einen Theil des Vagus u. zwar als Ast N. later.; dieser Zweig hat nur eine Umlagerung erfahren u. entspricht dem Ast des N. lateralis vagi, welcher bei andern Siluriden zur Schultergegend u. Brustflosse u. mit einem stärkern Durchmesser u. reichlicherer Vertheilung zur Bauchhaut zieht. Die Seitenlinie wird von dem eigentlichen, nicht dislocirten N. lat. vagi aus innervirt; ein Ast desselben biegt nämlich vor dem el. Org. nach aussen u. zieht zw. dem el. O. u. dem Corium, unterhalb des Canals der L. I. zum Schwanz. Die Lage der

Organe wird (Taf. 4) in 5 Querschnitten dargestellt. Der mikrosk. Bau wird erörtert von der Haut, den Seitenorganen, haupts. aber vom el. Organ u. dessen Nerv nebst der dazugehörigen Riesenganglienzelle in der Medulla. Abb. des Gehirns u. mehrerer periph. Nerven. (Vergl. die vorl. Mitth. Ber. 1886. S. 239, 247, 265, 326).

Stygogones guentheri, nahe cyclopus, aber Kopf länger, Columbia, 83 mm; Boulenger, Ann. Mg. N. H. (5) XIX 348. — *St. humboldti* Gth. (= ? *P. cyclopus* Hmb.), bei Pallatanga (Ecu). Boulenger, Pr. Z. S. 87, 276, Tf. XXI 2.

Plecostomus bicirrosus, bei Canelos, Boulenger, ebd. S. 277.

Chaetostomus setosus, 1/7—8, 1/8, P. 1/8, L. l. 25, Augd. 1/8, Stirnbr., Schnauzr. granulirt, beim W. mit feinen, b. M. mit grossen Borsten; Schilder mit Dornenreihen, ungekielt, 4—5 Sch. zw. D I u. II, Floss. schwarz gefleckt; Columbia, Boulenger, Ann. Mg. N. H. (5) XIX 349. — *Chaet. dermorhynchus*; 1/8, 1/8 L. l. 25, nahe microps u. nudirostris, Canelos (Ecuador); Boulenger, Pr. Z. S. 87, S. 277, Tf. 22; bei Canelos auch *Ch. cirrosus* u. microps.

Loricaria filamentosa Std. 79 u. *L. lanceol.* Std. 68 bei Canelos; Boulenger, ebd. 277. — *Acestra kneri* hier u. bei Sarayacu; ebd.

Trichomycterus nigromaculatus, 8, 6, A ganz hinter der D., C. nicht gegabelt, ob. Mxlbart. bis P.basis, Columbia, 135 mm; Boulenger, Ann. Mg. N. H. (5) XIX 349.

Nannoglanis g. n. *Trichomycterinorum*; Fetth. gross, D. kurz (7), ohne Stachel, fast in Körpermitte, hinter V., A. kurz (8), C. abgestutzt; hechelf. Z. in breiten Binden, Gaumz. 0.; Maul mässig gross. 1 Maxillar-, 2 seidl. Kinn-, 0 Nasen-Bartel. Augen aufwärts gerichtet. Kopfhaut weich, Op. u. Intop. unbewaffnet. Kiemenöffn. weit, über die Kehle hinüberziehend. V 6. *N. fasciatus*, 4 Qb. u. 1 seidl. Schnzstr. braun. Ecuador. Boulenger, Pr. Z. S. Lond. 87, S. 278, Tf. XXI 3.

Stegophilus punctatus; 8, 7; nahe macrops Std.; oben braun punktiert, D. u. C. gefleckt, 1 Längsreihe von runden purpurbraunen Fl.; Canelos (Ecu.). Boulenger, Pr. Z. S. Lond. 87, S. 279, Tf. XXI 4.

Scoepelidae. *Saurus varius* u. *tumbil* bei Mascat, Boul., Pr. z. s. 665. — *S. varius*, *myops* u. *tumbil*, Bemerk.; Steind. u. Död., F. Jap. IV 289. — *S. kaianus* 1880, Tiefsf. (140 Fd.), viell. auch andre Sp. unter 100 Fd.; Günther, Chall. XXII 179.

Saurida argyrophanes, Bemerk.; Steind. u. Död., F. J. IV 289.

Harpodon microchir 1878, wahrsch. Tiefsf., Beschr., Abb.; Günther, Chall. XXII 180, Tf. 47, A.

Aulopus japonicus, Beschr., selten bei Tokio; Steind. u. Död., F. J. IV 289.

Bathysaurus, Diagn. der Gatt.; *B. ferox* 78 (wahrsch. syn.: *B. agassizi* 83), Beschr. auch des Eingeweid., Abb. (Tf. 46, A.); *B. mollis* 78, Beschr., Abb. (Tf. 46, B); beide in sehr tiefen Zonen; Günther, Chall. XXII 181—4.

Bathypterois, Diagn. der Gatt.; der lange oberste P.-Strahl, der für sich beweglich u. grade aufwärts gerichtet ist (so auch bei dem toten, eben gefangenen Fisch), wird durch eine eigene Musculatur versorgt [für die Aufrichtung scheint, nach der Fig. zu urtheilen nicht die Muskulatur, sondern viell. ein elastisches Band wirksam zu sein], auch osteologisch erscheint der Schultergürtel etwas modificirt. (Abb. Tf. 46, B). Dass dieser Strahl eine Mimicry nach *Umbellula*

darstelle, zur Anlockung von Beutethieren glaubt Vf. nicht, weil man keine Umb-fressenden Thiere kennt, er ist geneigt sie für Tastorgane anzusehen. — *B. longifilis* 78, Beschr. Abb. (Tf. 47, B; 48, B), Schultergürtel u. Eingeweide beschr.; 630 Fd.; *B. longipes* 78, Beschr. (Tf. 48, A), 2650 Fd.; *B. longicauda* 78, Beschr. (Tf. 26 B), 2550 Fd.; viell. nur e. Jugendstadium; *B. quadrifilis* 78, Beschr., Abb. (Tf. 33, B), 770 Fd.; Günther, Chall. XXII 185–9.

Bathypterois. L. Vaillant, „les rayons tactiles des Bathypt.“ Beschreibt das Gelenk der Pectoralis-Fäden; auch die ersten Strahlen d. V. sind modificirt u. besitzen „aiguilles ostéoides“ in Spindeln 1041 μ lang 17 dick, wie die Fühlstrahlen bei Trigla; auch die Knoten an der Medulla oblong. hat B. mit Tr. gemein C. rendus, 105 p. 619.

Ipnots, nahe *Bathypt.*, Diagnose d. Gatt.; die Ansicht, dass das (Leucht-) Organ auf der Oberseite des Kopfes ein modif. riesiges Auge sei, ist nach Moseley's Untersuch. aufzugeben; der Fisch besitzt weder Seh- noch Tastorgane, das enorme Leuchtorgan, durch welches die Nährtiere angelockt werden, entschädigt dafür. *B. murrayi* 78, Beschr., 2150 Fd.; Günther, Chall. XXII 190, Tf. 49, B. Die Anat. des Leuchtorg., s. Moseley, S. 276.

Chlorophthalmus, syn.: *Hyphalonedrus* Goode 81, die von Goode vermissten Zungenzähne wohl nur übersehen, ihr Mangel würde aber noch keine Abtrennung erfordern; 4 Sp. bekannt. *Chl. agassizi*, Beschr. Abb. (Tf. 50, C); *C. productus*, nahe agass., aber Schnauze länger u. Sq. 58, 8/9, Viti-I. 315 Fd., 13 cm (Tf. 50 D); *C. nigripinnis* 78, Beschr., Abb. (Tf. 51, A); *C. gracilis* 78, Beschr. (auch Eingeweide), Abb. (Tf. 49, A). Günther, Chall. XXII 192–5.

Scopelus, einige Arten (*macrolep.* u. *glac.*) gehören sicher zur bathybischen Fauna, andre mögen erst beim Aufziehen des Schleppnetzes in geringen Tiefen gefangen worden sein. *Sc. macrolepidotus* bei den Kermadec-I., 630 Fd.; *S. glacialis*, Synonymie; *S. antarcticus* 78, Beschr. Abb. (Tf. 51, D); *S. engraulis*, 14, 14–15, Sq. 38, 3/5, nahe *dumerili*, aber die 4 lateralen Leuchtorg. weiter von der L. l. hinabgerückt, Auge kleiner, Philippinen, 200 Fd., 16 cm (Tf. 51, C); *S. dumer.*, 1 Ex. von Viti-I. 315 Fd. beschr. Günther, Chall. XXII 198.

Scopelus macrost. wird *Malacosarcus* (s. *Berycidae*). — *Sc. benoiti*, die rothen Körper der Schwimmbl. beschrieben (Abb.); Coggi, s. S. 294.

Nannobrachium g. n. Nahe *Scopelus*, aber P. rudimentär (3–4 feine Fädchen), Augen mässig gross, ein drüsenartiges Leuchtorg. an der ob. u. untern Seite des Schwanzstiels; *N. nigrum*, 14, 19, L. l. 34, Habitus ähnl. *Sc. engraulis*, Kiembl. sehr kurz; schwarz; Philippinen, 500 Fd., 12 cm. Günther; Chall. XXII 199, Tf. 52, B.

Odontostomus, Diagn. d. Gatt.; *O. hyalinus*, Beschr. nach e. Ex. von Nizza, Tiefsf.; Günther, Chall. XXII 200, Tf. 52, A.

Omosudis g. n. Körper länglich, compr., nackt; Kopf. compr., Schnauze mässig lang, Maul sehr weit, Intmx. u. Maxill. schlank, Intmx. mit 1 Reihe sehr kleiner Z. u. 1–2 gröss. Z. vorn, Mndb., Vomer u. Pal. mit wenigen aber sehr grossen lanzenf. Z., Mndb. breit, aber wie die andern Kopfknochen sehr dünn. Supraclavicula und Postcl. (Xyl.) bilden zus. eine lange Ruthe vom Occiput bis zur Unterkante des Abdomen, z. Th. unbedeckt von Haut. D. hinter d. Körpermitte, V. unter d. Anfang der D., Fetth. sehr klein, A. lang. Magen sehr ausdehnbar. R. br. 8; Psdbr. gut entwickelt; Kiemen 4, Kmbl.

breit, Kmd. sehr kurz. — *O. lowi*, 9, 14. Madeira u. Philippinen, 500 Fd., 8 cm; Günther, Chall. XXII, 201, Tf. 52, C, C'.

Alepidosaurus ferox, bei Tokio sehr selten, Beschr.; Steind. u. Döb., F. J. IV 290. — *Plagyodus*, 4 Sp. bek., alle Tiefsf.: *ferox*, *aesculapius* 83, *altivelis*, *borealis*; Günther, Chall. XXII 203.

Cyprinidae. I. *Catostomina*. *Ictiobus velifer*, Bem., Hay, Pr. n. m. X 242.

Moxostoma macrolep., Bem., Hay, Pr. n. m. X 247.

II. *Cyprinina*. *Cyprinus carpio*, nach Mexico eingeführt, Smiley, Bull. U. S. F. Comm. VII 43. — Auge; Schiefferdecker, s. S. 290.

Carassius, Gehirn; Fusari, s. S. 286. *C. auratus*, Unters. üb. die monströsen Flossen; Watase, s. S. 312 u. 283. Entwickl.; Ryder, s. S. 306 (u. 283).

Scaphiodon moscatensis, 3/10–11, 2/7, 38–39, 4 Sq. zw. L. I. und V.; 1 Bartel jederseits, 3/5 Augd.; Arabien, 11 cm.; Boulenger, Pr. z. soc. L. 87 p. 665.

Barbus, Giftigkeit; Carruccio, s. S. 312.

Sarcocheilichthys, dazu syn. *Barbodon* Dyb.; Herzst. u. Warpach., Amurb. S. 29, 55.

Ladislavia Dyb. gehört zu Gthr.'s Abtheilung II A. 1b; ebd. 30, 55.

Pimephales, damit ist *Oliola* (*vigilax*) zu vereinigen, Länge des Darms bei *P. notatus* variabel, öfter kürzer als 2 Körperl.; Hay, Pr. n. m. X 246, 249.

Hybognathus nuchalis, abnorme Vermehr. der Schlundz. 3, 1, 4–4, 2; das Gen. *Tirodon* 82 auf ähnliche H. nuch. gegründet; Hay, Pr. n. m. X 251; vergl. *Notropis* (Alb.) *germanus*.

Phenacobius mirab., Bem. Hay, Pr. n. m. X 243, 249, 252.

Micraspius syn. zu *Pseudorasbora*. *M. mianowski* Dyb. = *Ps. parva*, Herzst. u. Warp., Amur, S. 32, 55.

III. *Rhoteichthyina*. IV. *Leptobarbina*. V. *Rasborina*. VI. *Semiplotina*.

VII. *Xenocypridina*. *Xenocypris*, dazu *Plagiognathus*; Pl. jelski Dyb. nur durch L. I. u. Augd. von *X. microlepis* versch.; Herzst. u. Warp., Amur, S. 32, 55.

VIII. *Leuciscina*. *Leuciscus*, Auge; Schiefferdecker, s. S. 290. Blut, Eberth, s. S. 290. — Zur Gatt. *Leuciscus* ist viell. auch *Pseudaspius* zu ziehen; s. unten! — [*L. rutilus*] „Roach“ sterben aus unbekannter Ursache massenweise in einem Teiche, während andre Fischarten gesund bleiben; Mott, Nature, Vol. 36, 222. — *L. rut.*, Rigor mortis; Ewart, s. S. 284. — *L. idus* nach Nordamer. übersiedelt, Report U. S. Fisch Comm. XIII, S. röm. 98. — Entwickl. von *L. idus*, Ryder, s. S. 306.

Idus walecki von *melanotus* nur durch hinten niedriger verlaufende L. I. versch.; Herzst. u. Warp., Amur, S. 33, 55.

Notropis (*Moniana*) *lutrensis*, dazu syn. (*ausser gibbos.*, *billings.*, u. *forbesi* mit Jord. Cat.) auch noch *bubalinus* (mit *umbrosa*) u. *lepidus*, welche beim Subg. *Cyprinella* standen, Weibch. u. Jungen scheinen 1. 4–4. 1 Z. (Formel von *Moniana*) zu haben, alte M. aber 4–4 (*Cyprinella*); Krph. in Krpl. schwankt von 2½ bis 4! Hay, Pr. n. m. X. 243, 249, 250, 253.

N. (*Cyprinella*) *macrostoma*, oder sp. n. *umbriker*?, Unterschiede von N. (Alb.) *topeka*, N. W. Kansas, Beloit (98° W, 39½ N), Z.: 1, 4—4, 1. Hay, Pr. n. m. X 245.

N. (*Moniana*?) *aeneolus*, Z. 4—4 mit Kauffläche, viell. = *Mon. aurata* [nach Jord. Cat. = *proserpina*], aber Sq. 35, 6, 5, kaum höher als lang, Kansas (bei Beloit, Kirwin, Wa Keeney; Hay, Pr. n. m. X 245, 248, 251, 252.

N. (*Alburnops*) *delic.* u. *topeka*, Bem., Hay, Pr. n. m. X 246, 252.

N. (Alb.) *germanus*, Darm kürzer als Krpl. sonst wie *Hybognathus* (*Dionda*) *nubila*, 2½, Zoll, Wallace (Westgrenze von Kansas); Hay, ebd. 252. *Cliola* kommt zu *Pimephales*, s. oben.

Phoxinus, 3 sp. im Amur, Herzenst. u. Warp., Amur, 36.

Otenopharyngodon idellus, syn.: *Pristiodon seminowi* Dyb., 1 Expl. 92 cm l.; Herz. u. Warpach., Amurb., S. 36, 56.

Tinca tinca, gedeiht in Nordamer.; [Smiley], Bull. U. S. Fish-Comm. VII 44. — Blut von *Tinca*; Hamburger, s. S. 290. — Venen; Hochstetter, s. S. 292. — Gehirn; Fusari, s. S. 286. — Muskelphysiologie; Krukenberg, s. S. 283.

Semotilus atrom., Sq. 65; Hay, Pr. n. m. X 249.

IX. *Rhodeina*. *Devatio asmussi* Dyb. ist synonym zu *Rhodeus amarus*; als var. dazu gilt *sericeus* Pall., schlanker mit kürz. Kopf; Herzenst. u. Warp., Amur, S. 37, 56.

X. *Danionina*.

XI. *Hypophthalmichthyina*. *Hypophthalmichthys dybowskii* viell. = *Onychodon mantschuricus* D., welche Art aber die D. näher der Schnauze hat. Futschau; Schlüssel für die 8 Species; Herzenst. u. Warp., Amurbecken, S. 38—41, 56.

XII. *Abramidina*. *Pseudaspis* durch kleine Sq. u. Zähne 2.4—4.2 charakt., danach also zu *Leuciscus* Gthr. passend; viell. aber die Zahnformel variabel u. eher zu *Aspius* führend. *Ps. leptceph.* (Pall.), Abb., Fig. 3; Herzenst. u. Warp., Amur S. 33, 56.

Leucaspis delineatus im Frühj. 86 bei Hasselt in e. völlig abgeschlossenen Teiche entdeckt; C. Bamps, „espèces rares faune des vertébrés de la Belgique“ *Bulletins Ac. r. sc. Belg.*, Jg. 57, S. 372—3 (⅞ 87).

Culter erythr. Bas., dazu syn.: *sieboldi* Dyb., charakt. durch kleine Sq. L. l. 95) bei subvertik. Maul; C. *alburnus*, Bemerk.; C. *mongol.* B., syn.: *rutilus* Dyb.; Herzenst. u. Warp., Amur, S. 42—46, 57.

Hemiculter *schrencki* Warp. von Futschau; ⅞, ⅜, Sq. 48, 9—10/2; Herz. u. Warpachowski, Amur, S. 46, Fig. 4.

Hemiculter Blkr., von Culter u. Chanodi. durch niedrige Lage der stark gebogenen L. l., durch kurze A., durch D. etwas hinter A. beginnend, durch mittelgr. Sq. u. dreireih. Zähne versch.; dazu 7 Sp.: *leucisculus* Bas., kneri Wrp. (C. *leucisc.* Kn., Chan. l. Gth.), *schrencki* Wrp., *balnei* Svg. 84, *bleekeri* Wrp. (*leucisc.* Blkr.), *dispar* Pt. 80, *lucidus* Dyb. 77; alle im östl. Asien; Schlüssel u. Beschreib. N. Warpachowski „üb. d. Gatt. Hemic. u. üb. e. n. Gatt. *Hemiculturella*“, Bull. ac. sc. Pétersb., T. 32, p. 13—23.

Hemiculturella g. n., ähnl. Hemiculter, aber 2. Str. der D. nicht verdickt, Bauch vor der V. ungekielt, A. nicht üb. 13 getheilte Str., Z. zweireihig (5.3/2.4).

H. sawagei, $\frac{2}{11}$, $\frac{2}{10}$; 50, $\frac{7}{12}$; Krph. 4,8 mal in L. (o. C.), Kpfl. $4\frac{1}{2}$ mal; silbrig mit Lb. auf 5. Sq.-reihe; westl. See-Tschuan, 12 cm; Warpachowski ebd. 23.

XIII. Homalopterina.

XIV. Cobitidina. *Cobitis fossilis*. Die Muskeln v. C. foss. besitzen zw. Sarcolemm u. Muskelfaser eine mehr o. w. dicke Protoplasmascheide mit zahlreichen runden Kernen, also ähnlich wie die Muskeln v. Arthropoden; Mitrophanow, „Musk. v. Cob. f.“ Bull. soc. des amis des sc. nat. de Moscou, T. 50, fasc. 1, p. 87, Ausz.: Arch. slaves Biol. IV 375.

Octonema Herzst. g. n. nahe *Oreonectes*; Kopf sehr depress, Mund fast terminal, Suborbitaldorn 0; vordere Nasenlöcher mit zieml. langem Bartel, Barteln der Schnauze 4, supramax. 2; D. hinter V. beginnend. Hinterer Theil der Schwimmblase in der Bauchhöhle frei; *O. pleskei* Herz., von *O. costatum* Kssl. durch schwächere Vertiefungen zw. den Muskelsegmenten etc. versch., D. 8, A. 7; Fluss Lefu; Herzenstein u. Warpach., Amurbecken, S. 47, 57, Fig. 5.

Kneriidae.

Characinidae. Als westind. werden nur Gill's Spec. aufgeführt, 6 Erythrinidae u. 5 Characinidae; Jordan, P. n. m. IX 560.

Curimatus hypostoma, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{8}$, Sq. 49—52, 8/8; ähnl. asper u. trachyst., aber höher u. Schnauze weit vorragend; Ucayali-Fl.; Boulenger, Ann. Mg., März 87, S. 172. — *Cur. nasus* Stdehn. = *dobula* Gth.; Boul., Pr. z. s. 279.

Elopomorphus orinocensis, D. 11, A. 12, P. 18; Sq. 103, 20/11—12; Kpfl. 3 in Krph.; schwarzbrauner Fleck auf L. 1. hinter D.; C. mit langen, schmalen Lappen, die innen violett; Orinoco; Steindachner, Anz. Ak. W. Wien, Jg. 27, 231.

Parodon buckleyi, 12, 9, P. 17 (16?), L. 1. 37, Mundbz. 3—3, Intmx. mit ca 20 Spitzen; Krph. kaum $\frac{1}{4}$ der L. (ohne C.); Canelos (Ecu.). Schlüssel der 5 bek. Sp.; Boulenger, Pr. Z. S. Lond. 87, S. 279, Tf. 23 Fig. 1.

Characidium fasciatum Rhdt. 66, Beschr.; Boulenger, ebd. 280.

Piabucina elongata = *taeniata* Std. 83 nec Gth.; Beschr. u. Abb.; Boulenger, ebd., S. 280, Tf. 23, F. 2.

Tetragonopterus iheringi; 2/8, 3/16—18, Sq. 35—37, 5—5 $\frac{1}{2}$ /3—4; Form u. Färb. wie *ruutilus* juv.; San Lorenzo (Rio Gr. Sul); Boulenger, Ann. Mg. März 87, S. 172—3. *T. lütkeni*; $\frac{2}{10}$, 3/21—22 Sq. 33—35, 10—11; L. 1. hört vor d. Schwanz auf; San Lorenzo; Schlüssel für T. ih., lüt., maculatus (L.) = *microst.* Hensel nec Gth., *ruutilus* u. *obscurus*; ebd. S. 173—4.

Leptagoniates, g. n. Krp. gestreckt, stark compr.; D. kurz (10), hint. Krpmitte. A. weit vor D. (70), fast $\frac{2}{3}$ Krpl., Maul klein, Mx., Intmx. u. Mundb. mit einf. Reihe dreispitziger Z.; Kiemenöffn. weit; Sq. (7/7) mittelgross, L. 1. vollst. (47). Zunächst *Paragoniates* Std., bei dem aber Maul gross, A. kaum vor D. u. L. 1. unterbrochen. *L. steindachneri*, farblos mit silb. Lb., 95 mm; Sarayacu (Ecuador). Boulenger, Pr. Z. S. London, 87, S. 281, Tf. 23, F. 3.

Cyprinodontidae. Als westind. aufgeführt: 4 *Heterandria*, 1 *Lebistes*, 5 *Poec.*, 2 *Anableps*, 4 *Gambusia*, 1 *Belonesox*, 4 *Riv.*, 2 *Fund.*, 3 *Cyprin.*; Jordan, Pr. n. m. IX 563.

Cyprinodon calar., rothe Körp. d. Schwimmblase, Coggi, s. S. 294. — *C. dispar* bei Maskat, Boulenger, Pr. z. s. 666. — *C. variegatus*, n. f. Charleston; Jordan u. Eig., Pr. n. mus. X 269.

Goodea wird syn. zu *Characodon*, s. unten.

Characodon, dazu syn.: Goodea (atripinnis), da diese auch Sammetz. hinter den meisself. Z. besitzt. Ch. *variatus*, ähnl. later., aber D. weiter vorn (Anf. gleichweit v. Auge u. hinterer Schuppengrenze), D. 13—14, A. 15—16, V. länger, dunkle Punktstellen, Fig. 1; Ch. *bilineatus* 16, 18, Sq. 32, 11., Augd. 4 in Kpfl. 1 Ex., 4 cm l., Fig. 2; Ch. *ferrugineus*, 13, 15—16, Sq. 35, 14; Auge grösser als bei vor., ♂ mit unreg. Lgb., ♀ mit Punktl., Fig. 3, 4; alle 3 von Guanajato, Mex.; Bean, Pr. n. mus. X, 370—2.

Fundulus *dugèsi*, 15, 11, Sq. 30, 11, A.-Basis nur $\frac{1}{2}$ der D.-Basis!, 5—6 dunkle Qb., Mexico; Bean, Pr. n. mus. X 373, Tf. XX 5. — F. *zebrinus*, 4 Zoll l., D. beim Wb. weiter rückwärts, Hay, Pr. n. m. X 252.

Poecilia *vandepolli*, 8, 9; 25—7, 9; Zähne 4-reihig, einspitzig; schwarzes Schuppennetz, Nackenband u. Seitenlinie; Curaçao, u. var. *arubensis*, Vorderkörper niedriger, Schwanz höher als bei voriger, Aruba. Abb. auch d. Zähne u. des Copulationsorg. Lidth de Jende; Not. Leyd. Mus. IX 137—8, Tfl 2, F. 4—10.

Heteropygii. Dallidae. Umbridae.

Scombresocidae. Belone choram, Hemirh. duss. u. commers., Exoc. evolans u. brachysoma bei Maskat, Boul., Pr. z. s. 666.

Belone. Rothe Körper d. Schwimml.; Coggi, s. S. 294. — 12 westind. Sp. von Tylosurus aufgeführt; Jordan, pr. n. m. IX 568. — B. belone, von April bis Juli in der Zuidersee um zu laichen, Fang etc., frisst junge Fische; J. F. van Bemmelen, Bijdr. tot Ansjovis, S. 44—45 (vergl. bei Engraulis). — B. *anastomella*, Tokio, ? abw. durch V. näher der C. als dem Kopf (wegen zufäll. Zerrung?); Steind. u. Död., F. Jap. IV 293. — B. *gracilis*, Bem.; Nyström, Jap. F. 44.

Scombreox saurus, Bem.; Nyström, Jap. F. 44. — Sc. saurus, var. *forsteri*, Mc Coy, Prodr. zool. Vict., Decas 14, Tf. 135, F. 2.

Hemiramphus, 3 westind. Sp., Jordan, Pr. n. m. IX 568. — Hem. intermedius, Abb. u. Besch., Mc Coy, Pr. zool. Vict., Tf. 135, F. 1.

Exocoetus, 12 westind. Sp., Jordan, Pr. n. m. IX 569. — Ex. *döderleini* St. (an agoo Schl.), P. bis zur Basismitte oder bis üb. d. Ende der D. hinausreichend (in der Zeichn. bei Schl. nur bis Anus); häufig bei Tokio; Steind. u. Död., F. Jap. IV 38.

Esocidae. Esoc lucius, Laichen, Brook, 5. ann. rep. Fish. Board Scotl. — Occiput, Gegenbaur s. S. 279; Chorda dors., Lwoff s. S. 280; Auge, Schiefferdecker s. S. 290. — E. *reticulatus*, Entwickl.; Ryder, s. S. 306.

Galaxidae. Galaxias *campbelli* von der Campbell-I.; Sauvage in: Filhol, Miss. Campb., Mém. passage de Vénus III, pt. 2, p. 345 (1885).

Mormyridae. Mormyrus (Petroceph.) *sauvagi*; 29, 36; L. l. 40; ähnl. bane, aber kürz. Schnauze, gröss. Maul u. stärk. Zähne; n. ind. Tembé; Zuflüsse des unt. Congo; Boulenger, Ann. Mg., Febr. 87, S. 149.

Sternoptychidae. Argyropelecus olfersi zwar in e. Netze, welches auf 1125 Fd. schleppte, gefunden, aber wahrscheinlich aus viel geringerer Tiefe; A. hemigymnus, Tiefsf. (245 Fd.), bei Nacht an der Oberfläche; Günther, Chall. XXII 167.

Sternoptyx, ausf. Charakteristik d. Gatt.; St. diaph. D. 10—12, A. 12; eine grosskugelige u. kleinsüg. Form unterschieden (Abb.), beide im atl. u. indo-pac. O.; Expl. von 15 mm schon ausgebildet; wenn auch viell. tiefer als 100 Fd. hinabgehend, doch wohl bei tiefen Netzzügen (2500 Fd.) nur zufällig erst beim Auf-

holen gefangen. Günther, Chall. XXII 168, Tf. 45, D. u. D'. — Vergl. üb. Leuchtorgane ebd. v. Lendenfeld, Taf. 70, s. auch oben S. 274.

Polyipnus g. n. Von *Sternoptyx* abw. durch Auftreten von Schuppen und Mangel der dornartigen Platte vor der D. — *P. spinosus*, die Leuchtorgane sind noch grösser und zahlreicher als bei Stern., Sq. sehr dünn u. lose; A. 15; Philippinen, 250 Fd., 6 cm; Günther, Chall. XXII 170, Tf. 51, B. —

Gonostoma denudatum, Bem., als Tiefsf. (Nachts Oberfläche) erw., (Schwimmb. u. Darm s. S. 295); *G. elongatum* 78, Beschr., Abb. (Tf. 45, B), Tiefsf. (360 Fd.); *G. gracile* 78, Japan, Tiefsf. (345 u. 2425 Fd.), Beschr., Abb. (Tf. 45, C); *G. microdon* 78 (syn.: *Cyclothone lusca* G. B. 83) als Tiefsf. (bis 2900 Fd.) weit verbreitet u. zahlreich, Beschr. Günther, Chall. XXII 172. — *G. denud.*, die rothen Körp. d. Schwimmb.; Coggi, s. S. 294.

Neostoma bathyphillum Vaill. 84, Oestl. atl. Oc. 2220 m, scheint ein *Gonostoma* zu sein u.

Sigmops stigmaticus 84, Tiefsf., nahe *Gonostoma*?, ungenügend beschrieben; Günther, Chall. XXII 172.

Photichthys argenteus Hct. (als Phosi.), Beschr. der Gatt. u. Sp. (Schwimmb. einfach u. dickwandig mit Muskelapparat), Tiefsf.; Günther, Chall. XXII 177, Tf. 45, A.

Chauliodon sloani vom Chall. auch bei Bermudas, Neuguinea, Japan gesammelt, Tiefsee 565–2575 Fd.; Günther, Chall. XXII 179.

Stomiidae. *Astronesthes niger*, 2 Expl. wohl erst in höherm Wasser beim Aufholen des Schleppnetzes (aus 2500 Fd.) in dieses gerathen, wahrsch. aber zur Tageszeit unter 100 Fd. hinabsinkend; unbek. ist die Tiefe der 4 andern bek. Sp.: rich., barb. (= *St. leucopterus* Eyd. Soul.), *martensi* Klz., *chrysophek.* Blk.; zu *Astr.* scheint Vf. auch (nach der Fig.) zu stellen: *Eustomias obscurus* Vaill. 2700 m, publ. in la Nature 1884 p. 185. Günther, Chall. XXII 203.

Stomias boa?, 1 Ex. aus südl. Pacif. Oc., 1800 Fd. beschr.; *St. affinis*, D. 17, A. 20, Leuchtorg. der abdom. Reihe jederseits 43 + 6 + 15, Sombrero-I., 450 Fd., 13 cm (Tf. 54, A); *St. ferox*, als Tiefsf. (524 Fd.) erw.; Günther, Chall. XXII 205.

Echiostoma barbatum, ausf. Beschr., als Tiefsf. aufgezählt (?300 Fd.). Zu *Ech.* scheint syn.: *Hyperchoristus* Gill 84, welcher Fisch, weil noch sehr lebhaft nach dem Fang, schwerlich aus 956 Fd. stammt. Günther, Chall. XXII 206, Tf. 53, B. — Histologie der Leuchtorg. s. v. Lendenfeld, S. 274.

Hyperchoristus tanneri vergl. *Echiostoma*.

Opotomias g. n. Durch Bezahnung abw. von *Echiostoma*: Die langen Z. sind nicht zurückklappbar sondern werden in Gruben des gegenüberstehenden Kiefers aufgenommen, Maxillar- u. Palatz. fehlen. Ein Bartfaden. — *O. micripnus* (*Echiost. micr.* Gthr. 78), ausf. Beschr., Tiefsf. 2150 Fd., Südastralien. Günther, Chall. XXII 208, Tf. 53, A. — Histol. d. Leuchtorg., s. v. Lendenfeld, S. 277.

Pachystomias g. n. Von *Echiostoma* versch. durch Mangel eines abgesonderten Strahls der Brustflosse, u. der Zähne auf Vomer u. Palatinum. — *P. microdon* (= *Echiost. micr.* Gth. 78), ausf. Beschr., nordw. v. Australien (?2440 Fd.), Günther, Chall. XXII 210, Tf. 53, C. — Histol. d. Leuchtorg., s. v. Lendenfeld, S. 274.

Photonectes n. nom. für *Lucifer* Döb. 82, praecoc.; *Ph. albiginnis*, als Tiefsf. erw. (?F.): Günther, Chall. XXII 212.

Lucifer (s. *Photon.*) *albiginnis* Döb., Beschr.; Steind. u. D., F. Jap. IV 291.

Malacosteus, eine der auffälligsten Tiefseeformen, die Kopfknochen von sehr geringer Grösse u. Festigkeit, nur die Kiefer enorm verlängert. Von der Symphyse der Mandibeln zur Spitze des Hyoids ein Muskelband, von Ayres richtig so gedeutet, später irrth. für einen Bartfaden erklärt ein solcher kommt bei *Mal.* nicht vor. Dieser Muskel ist aus den 2 seitlichen zu 1 mittleren verwachsen zu denken u. dient zur Sicherung des Kieferapparats bei Bewältigung grosser Thiere — *M. niger*, Bem. u. Abb. der Kiefer (Tf. 54, C) nach Ayres, Tiefsf. (?Fd.). *M. indicus* Gth. 78, D. 18, A. 20, P. 2, der Zahn an der Spitze der Mandib. so gross als die hinteren Fangz., hinter ihm 4 kleine, gedrängte Z., Schwanzstiel breiter als bei *niger*, welchem sehr ähnl., Philippinen, Tiefsf. 500 Fd.; Günther, Chall. XXII 214, Tfl. 54, B. — Histol. d. Leuchtorg., s. v. Lendenfeld, S. 274. [Da *Malac.* keinen Bartfaden besitzt, so würde diese Gatt. wohl zu den Sternoptychidae zu bringen sein. Ref.]

Bathophilus nigerrimus Gigl., Tiefsf. (?Fd.); Günther, Chall. XXII 215.

Idiacanthus Peters 76, dazu syn.: *Bathypophis* Gth. 78; Gattungsdiagn.; *I. fasciola* P. als Tiefsf. (?Fd.) erw.; *I. ferox* (B. *ferox* Gth. 78), Besch., Abb. (Tf. 52, D.), Atl. Oc. 2750 Fd.; Günther, Chall. XXII 215.

Salmonidae. *Salmo*. Haut (von jungen lacustris), Sacchi, s. S. 274; Osteologie (Occiput), von lacustris u. *salar*, Gegenbaur, s. S. 279; Chorda dorsalis Lwoff, s. S. 280; Occipitalgelenk, Strecker, s. S. 280; Muskelphysiol., Krukenberg, s. S. 283; Todtenstarre (*S. fario*), Ewart, s. S. 284; Gehirn, Fusari, s. S. 286; Entw. des Gehirns (torus longitud.), Rabl-Rückh., s. S. 286; Entw. der Venen (*S. salvelinus*), Hochstetter, s. S. 292; Bauchhöhle bei *S. fario* frei von Bacterien, Ewart, s. S. 291; Ei (v. *S. salar*), Scharff, s. S. 298; Entwickl. (v. *S. levenensis*), Cunningham, s. S. 297; Entw. d. Segmentalgangs, Brook, s. S. 307; Entwickl., Henneguy, s. S. 305; Eier (v. *S. salar*) entwickeln sich nicht in Salzwasser, Kerbert, s. S. 311.

F. Day, British and Irish Salmonidae, behandelt sehr ausführlich *Salmo salar*, p. 51—142, Schädel Taf. 1, Altersstufen (col.) Tf. 3, 4, ausserdem Xyl.; *S. trutta* 149—181, Xyl., ♂ (col.) Tf. 5 (auch *S. cambricus*); *S. fario* S. 182—236, Xyl., Skelett Tf. 2, col. Abb. mehrerer brit. Varietäten Tf. 5—8, 10; *S. alpinus* S. 237, col. Abb. Tf. 9; *S. fontinalis* 247, Tf. 9; Coeca pyl. (passim); Bastarde, S. 254, col. Abb. Tf. 10, 11; Monstrositäten, S. 271, Tf. 12.

S. Salar, weit südlich (im Potomac-R.) gefangen, Smiley, Bull. U. S. Fish Comm. VI 453. — *S. salar* u. *trutta* fressen im Meere haupts. Heringe; W. Anderson Smith, Journ. Nat. Fish Cult. Ass. Engl., I Nr. 1 (87), Abdr.: Bull. F. C. VII 41. — *S. salar* sebago, s. unten bei *S. purp.* — *S. salar* u. *alpinus* künstl. gezüchtet in Island, Thorar., s. S. 314. —

Der Name „Lachsforelle“ in Deutschl. missbräuchlich für alte *S. fario* angewandt, „Seelachs“ im Handel für *Gadus*-Arten, „Silberlachs“ für *Coregonus*; Circul. des D. Fisch. Vereins, S. 115.

S. trutta, scheint in Belgien zu fehlen, Selys L., s. S. 318; in Australien, Smiley s. S. 323.

S. fario in Australien, Smiley, s. S. 323. — Nach Nordamerika (als Eier von Deutschl.); McDonald, Bull. U. S. Fish Comm. VII 34. — *S. levenensis*, das Gedeihen der Anf. 85 in Nordam. eingeführten Eier festgestellt; Smiley, ebd. 28—32. — *S. fario*, Notizen, J. W. W. Bund, J. Nat. Fish Cult. Ass., London, I 129, 289, 433.

S. irideus, gedeiht (seit 83) in Virginia, [Smiley], Bull. F. C. VII 39; desgl. in Missouri (seit 82) Maynard, ebd. S. 55; in Missouri (Ozark-Geb.), McDonald, ebd. VI 447. — Eingewöhnung in Deutschland (Elsass, Thüringen, Harz); Circ. Deutsch. Fisch.-Ver. 1887, S. 73; sehr passend für Teichbesatz u. Mästung, hat eine tiefere Flussregion als *S. fario*, C. Arens, Circ. d. Deutsch. Fisch.-Ver. 87. S. 115. — Im Départ. Seine inférieure erfolgreich acclimatisirt. Smiley, Bull. Fish Comm. VI 408. *Salmo irideus* u. *fontinalis*, sowie *Coregonus albus* 1887 erneut nach England importirt. *S. font.* scheint wegen seiner Neigung zu entfliehen wenig günstig. W. O. Chambers, Journ. Nation. Fish Culture Ass. London, April 87, p. 137. *S. irideus* gedeiht in England; ders., ebd., Jan. 87 Abdr. in: Bull. U. S. F. Comm. VII S. 17 bez. 39.

Salmo purpuratus. Ursprünglich als *S. salar* var. *sebago* (als Laich) aus Canada eingeführte und in die Themse gebrachte Fische waren *S. purp.*; Day, Pr. Zool. Soc. London, 87, S. 130 (On a supposed Hybrid betw. Pilchard and Herring, and on a spec. of *S. purp.*).

S. salvelinus, Eier in N. Amerika aus Deutschl. eingeführt; Mc Donald, Bull. U. S. F. Comm. VII 34.

S. (Salvel.) fontinalis nach Norwegen 1882 importirt, sind gut gediehen; Smiley (nach „Nature“), Bull. U. S. Fish Comm. VI 453. — In Neuseeland in geschützten Teichen; Smiley, ebd. 464. — *S. font.* gedeiht in Baiern u. Böhmen; Circ. D. Fisch.-V. 1887, S. 47 u. 73; ist eher laichreif, fressgewandter, in ruhigerem Wasser mit schlechteren Verstecken erziehbar, zeigt sich (als Zierfisch) mehr als *S. fario*, künstliche Mästung aber schwierig, C. Arens ebd. 113. — Ueb. Einführ. in Engl., s. bei *S. irideus*.

Oncorhynchus quinat. Am 17. Nov. 87 wurden 6 Jahre vorher in den Würmsee gesetzte calif. Lachse zum ersten Male im Laichaufstieg beobachtet. Circ. Deutsch. Fisch.-V. 1887. p. 133. — *O. tshawytscha* (= *quinnat*) in Australien; Smiley, s. S. 323.

Osmerus, Entwickl.; Cunningham, s. S. 297.

Coregonus, künstl. Zücht. v. *C. oxyrh.*; Wiederauftauchen grosser Mengen von *C. albus* nach 70jähriger Seltenheit im Werbellin-See [nördl. v. Berlin] Circ. D. Fisch.-Verein, 1887 S. 134.

C. wartmanni der 1881 nach Holstein verpflanzt war (Plöner- u. Schöb-See), dort 1887 in 14 Expl. gefangen; ist in den Obingersee eingeführt; *C. maraena* nach Böhmen (Wittingen) verpflanzt, ebd. S. 71. — Fütterung von Coregonen-Brut, Pancritius, ebd. S. 111. — *C. albus* in Engl., s. bei *S. irideus*.

Thymallus thymallus, Day, brit. Salm. S. 278—86. col. Abb. Tf. 10.

Argentina silus (syn. *syrtensium* 79) 200 Fd., *sphyraena* (syn. *hebrid.* u. *decagon* 79 v. Neuseeland) 200 Fd., *lioglossa* ? Fd., *elongata* 79 (Besch. u. Abb. Tf. 55, B), ? Fd., alle als Tiefsf. erwähnt; Günther, Chall. XXII. 217.

Microstoma arg. C. V., in 2 subsp. zerlegt: 1. *rotundatum* Risso, 2. *oblitum* n. subsp., letztere nur 70 mm l., dicker, V. unter d. Hinterende der D. (bei rot. vor D.), eine Fettfl. (fehlt bei rot.), Op. schliesst oben die Kiemenspalte (bei r. nicht); es wurden Expl. gleicher Grösse von beiden verglichen (22—72 mm), Facciola, Nat. sic. VI 193. — *Microst.* rotund. u. groenl. wohl keine Tiefsf.; Günther, Chall. XXII 218.

Bathylagus, nahe *Microstoma*, Diagnose; *B. atlanticus* 78 (? 2000 Fd.) u.

antarcticus 78 (1950 Fd.), Beschreib., als Tiefsf. erw.; Günther, Chall. XXII 219.

Percopsidae. Haplochitonidae. Gonorhynchidae. Hyodontidae. Pantodontidae. Osteoglossidae.

Clupeidae. Von Maskat (Arabien) werden aufgezählt: *Engraulis commers.*, *Chatoë. nasus*, *Clupea venenosa*, *Elops saurus* u. *Chanos salmonens*; Boulenger, Pr. z. s. 1887, S. 666.

Engraulis. Als westind. 9 *Stoleph.*, 1 *Pterengr.*, 1 *Lycengr.* aufgeführt; Jordan, Pr. nat. mus. IX 562 — Entwickl. v. *Engr.*; Raffaele, s. S. 298.

Engraulis encrasicolus. — Bijdragen tot de kennis der levenswijze en der voortplanting van de Ansjovis etc. (Verslag van den staat der Nederlandsche Zeeviasscherijen over 1886) 4°. Enthält S. 12—15: C. K. Hoffmann, Anshovis-Fischerei im Sommer 86, ein warmer Sommer liefert reiche Ernte für das nächste Jahr. — S. 16—17: Hoffm., das Larvenstadium der Anshovis. (Ende Juli gefischte Larven, 10—36 mm l., wurden nach Wirbelzahl, 48, und Laichzeit als *E. encr.* erkannt; Abb. von Larve u. adult.). — S. 18—41: Bericht üb. die auf Anchovis bezügl. Arbeiten der zool. Station der Nederl. Dierk. Vereeniging. 1. Wenckebach und Hubrecht, Unters. der frischen Ovarien mit Tf. 2. (Jedes Ei hat ein Gefäßnetz, das beim Reifen schwindet; gleichzeitig wird der Dotter durchsichtig.) 2. Weber, Unts. d. präpar. Ovar. Die Lamellen des Keimepithels laufen quer, der Ovarialcanal liegt seitlich, während bei *Clupea central*; das Ovar des abgelaichten Wb. zeichnet sich durch weiten, schlaffen Canal aus, es wird kleiner, vom unreifen Ov. unterscheidet es sich durch Vorkommen einzelner reifer Eier u. *Corpora lutea*, das reife ist an den ovalen, durchsichtigen Eiern kenntlich. Der Laich scheint successive abgelegt zu werden. 3. Wenckebach, Fortpfl. u. Entw. S. 27 mit Taf. 1. Laichen, im südl. Züider-See, bis 19. Juli; Eier mit Schwebnetz gefischt, 1,1 mm l., 0,7 br., schon unbefruchtet mit durchgehend segmentirtem Dotter. Erste Entw. nur am Morgen, am untern Eipol. Am Abend schon Hypoblast und Furchungshöhle entw., das Blastoderm bis zum Aequator. Am nächsten Morgen Kupff. Blase, Segmente, Augen u. Ohr sichtbar, auch am Kopfe e. Embryonalsaum, von dem amöboide Z. auf die Dotteroberfläche wandern. Am Mittag des 2. T. im Kupff. Bl. öfter ein crystallinisches Concrement in rotirender Bewegung; ca. 20 Somiten gebildet. Am Anf. des 3. Tages schon Herz, Nase, Urnierengänge u. Seitenorgane geformt, aber Pigmentflecke fehlen noch; am Ende des 3. T. schlüpft der Embryo aus, 4 mm l., sehr durchsichtig. Den 2. u. 3. Tag darauf die Chordaspitze rechtwinklig abwärts gebogen, auf die Hypophysis treffend. Am 5. Tg. Auge mit Pigment, noch keine Blutkörperchen, Dotter ist resorbiert; alle todt. Nebenbei 2 andere Eier beschrieben, *Rhombus max.*? und sp. indet. 4. Weber u. Hoek, S. 34. Allg. Naturgesch. 5. Weber, S. 38. Nahrung. Ausser kleinen Crust. auch Mysis, Cuma, Tellina u. Gastropoden, in der Nordsee aber Fischbrut. Auch währ. d. Laichzeit wird gefressen, daher die Wanderung viell. mit der Nahrung in Zusammenhang. (Van Bemmelen, Wahrnehmungen üb. Raja u. *Belone* S. 42 s. unten).

Clupea. Es wurden die in den Karpfenteichen der Verein. St. N. Am. während Nov. u. Dec. gefangenen Arten untersucht, ebenso „White bait“ (Mai) von New York; *aestivalis*, *vernalis*, *sapidissima* gefunden. Es zeigte sich, dass die Zeit, zu welcher *sapid.* im Salzw. zu treffen, sehr variirt. Bean, Bull. U. S.

Fish Comm. VI 441—2. — 8 *Clupea*-Arten als westind. mit einigen Synon. genannt; Jordan, Pr. n. m. IX 561.

Clupea harengus. Bastard mit *Cl. pilchardus*, Day, siehe unten; Entwicklung, Cunningham, s. S. 297; Brook, s. S. 301. — Ein Zwitter von Kiel ist eine pathol. Doppelmisbildung, wo im ♂ ein rudim. Ovarium ohne Ausführungsgang sich entwickelt hat. Weber (nach Mitth. von Möbius), s. S. 299. — Bau des Herings u. Varietäten in Schottland, Duncan, 5. ann. rep. Fish. Board Scotl. — Laich von *Cl. har.* im März 86 von Schottland nach Neu-Seeland transportirt unter Kühlung auf 33° F. — The Field, 15 Jan. 87, Zool. Gart. Jg. 28, S. 31.

Clupea sprattus, Entw. des Oviducts, Cunningham, s. S. 297.

Clupea pilchardus, Bastarde mit *Cl. harengus*, Sept. 86 bei Cornwall gefangen; der Kopf ähnl. pilch., die Schuppen ähnl. har., auf der linken Seite (L. I. 51, tr. 10) mehr als auf der rechten (32, 8)! Day, Proc. Zool. Soc. London, 87, p. 50 u. 129, Tf. 15.

Die Nahrung der Sardine variiert sehr, auch mikroskop. Pflanzen u. einige Male fast ausschliesslich Peridinium wurden im Darm beobachtet; sonst Copepoden häufig. Das Ausbleiben der S. an den französ. Küsten daher wohl nicht auf Mangel bestimmter Thierarten zurückzuführen. G. Pouchet et J. de Guerne, „nourriture de la Sardine“ C. r. ac. Paris, T. 104 p. 712—5; Uebers. in Ann. Mg. (5) XIX 323. — *Cl. pilch.*, Nahrung im Mittelmeer pelagische kleine Thiere ohne Wahl, auch Peteropoden u. Heterop., aber Peridinium vermisst. *Distoma ocreatum* im Magen, Larven v. *Phyllobothrium*? im Darm; Monticelli, Boll. soc. natur. Napoli (1) I, fasc. 2, 85—88. — Entwickl. von *Cl. p.*; Raffaele s. S. 298.

Clupea vernalis u. *sapidissima*, Entwickl.; Ryder, s. S. 306, 307. *Cl. sap.*, Knorpelplättchen in den Muskeln der Seitenlinie; Hitchcock, s. S. 283. *Cl. alosa*, Auge; Schiefferd, s. S. 290.

Clupea melanosticta, Zähne fehlen auf Vom., Pal. u. Zunge; Nyström, Jap. F. 45.

Clupea. Von den 4 Heringen des Kaspi-Meeres gehen *Cl. delicatula* u. *sapozchnikowi* nie in die Flüsse, dagegen bilden die anderen, *Cl. pontica* u. *Alosa caspia* (beide auch im Schwarzen M. gefunden), die bekannten grossen Züge in der Wolga, in der sie zw. Sarepta u. Kazan laichen; sie hungern während des Aufstiegs und kommen später grossentheils um, ebenso wie die erbrüteten Jungen. Die weitaus grösste Masse der Individuen bleibt aber auch von *pont. u. caspia* im Meer; jene Wanderungen sind nicht als normale biol. Erscheinungen aufzufassen. E. Pölsam, „Biol. Skizze der caspischen Heringe“, Trudui Kazan obsch. iest., XV, fasc. 5, 1886, 43 S. (russisch); Ausz.: Deniker, Arch. slaves biol. IV 103—7.

Clupea sapozchnikowi Grimm, Kaspi See; ebd. S. 15.

Etrumens teres (De Kay) wird *E. sadina* (Mitch. 1815 als *Clupea*); C. H. Eigenmann, Pr. ac. nat. sc. Philad., 87 II, p. 295.

Bathythrissidae. „Unterscheiden sich von den Clupeidae u. den verwandten Formen hauptsächlich durch die Entwicklung der Rückenflosse.“ Günther, Chall XXII 221.

Pterothrissus. Günther, ebd., versucht die Priorität des Namens *Bathythrissa* aufrecht zu erhalten; *B. dorsalis* Beschr., Abb. Tfl. 56, A. — Hilgen-

dorf, Sitzb. Ges. natf. Fr. Berlin 1887, S. 187, stellt fest, dass der Name *Pterothrissus* 2 Monate vor *Bathyrhissa* publicirt wurde; die Sp. heisst demnach: *Pter. gissu* Hf. Die Rückenf. varriert von 65 bis 56 Strahlen.

Chirocentridae. *Chir. dorab* bei Maskat; Boul., Pr. s. z. 666.

Alepocephalidae. *Alepocephalus*, alle 5 bek. Sp. sind Tiefsf.: rostr. (300 Fd.), agass. 83 (922 Fd.), productus 84 (1362), bairdi 80 (200), niger Gth. 78 (1400), Beschr. u. Abb. (Tf. 56, B); Günther, Chall. XXII 222.

Bathytroctes, Tiefseegatt., Diagn. d. Gatt.; *B. macrolepis*, 15, 11, L. l. 42, Mxl. reicht bis unter das hint. Drittel der Orbita, Celebes 2150 Fd., 24 cm (ohne C.), (Taf. 57 B, Kopf); *B. microlepis* 78, 1090 Fd., Beschr. (auch Eingeweide) u. Abb. (Tf. 57, A); *rostratus* 78, Beschr. u. Abb. (Tf. 48, B), 675 Fd.; Günther, Chall. XXII 225—8.

Platytröctes, Diagn. d. Gatt.; *Pl. apus* 78, Tiefseef. (1500 Fd.), Beschr. Abb., Günther, Chall. XXII 229, Tf. 58, A.

Xenodermichthys, Gattidiagn.; *X. nodulosus* 78, Tiefsf. 345 Fd., Beschr., Abb.; Günther, Chall. XXII 230, Tf. 58, C. — Histol. der leuchtenden Hautknötchen, s. v. Lendenfeld, S. 274.

Notopteridae.

Halosauridae. Die Ovarien sind nicht geschlossen (vergl. Gth., Cat. VII 482 u. Introd. study f.), sondern bandförmig mit Eiern auf der lateralen Fläche; die Eier fallen in die Bauchhöhle. Günther, Chall. XXII 232.

Halosaurus, auch die Diagn. d. Gatt. wird etwas modificirt: Nicht das Praeop. (dieses ist rudimentär, wie auch das membranöse Intop.), sondern das Subop. ist vergrößert; P. nicht immer hoch am Körper. Beschr. der Eingeweide (*H. macrochir*): statt des Schwimmblasengangs ein anscheinend undurchbohrter *Strang zum Oesoph.; Schwbl. aussen mit Muskelapparat. Ovarien (s. oben), das rechte in einen vord. u. hinteren Theil weit getrennt. Osteologie ausführlich mit Abb. (Tf. 60); üb. die Kiemendeckel s. oben. Der Knorpel tritt am Hirntheil sehr zurück, die Knochen dünn, aber ziemlich fest; zur Stütze der langen Schnauze ein knöchernes Rostrale, Palatinum sehr klein, Intmax. ohne die aufsteig. Fortsätze, Max. mit einem einfachen, lanzettf. Supramaxillare, Angulare nicht abgetrennt. Die 2 Parietalia zusammenstossend; die Beschreibung, der hinteren Schädelpartie unklar. Chorda dors. auf Kosten der (60) Wirbelkörper sehr entwickelt, mit schwachen Fortsätzen und Rippen, die Wrb. am Schwanzende gestreckt ohne Forts.; das 1. Interneurale eine breite Platte, dem 31.—33. Wirbel ansitzend. Becken u. Schultergürtel schwach, Postclav. fehlt. — *Hal. oweni*, Beschr. (nur 1 Ex. bek.), Tiefsf. (? Fd.); *H. macrochir* 78 (syn. *goodei* 81), Beschr., Abb. (Tf. 59, A), im Atl. Oc. sehr verbreitet (647—1730 Fd.), die Leuchtorg. am besten entwickelt, mit der L. l. in enger Verbindung, nach ihrer Lage u. makrosk. Verhalten geschildert; *H. mediorostris*, Br. 11, D. 11, L. tr. 11½, nahe macr., aber P. kürzer, Philippinen 700 Fd., 47 cm (Tf. 59, C); *H. rostratus* 78, Beschr., Abb. (Tf. 49, D), 2750 Fd., affinis 78, Beschr., Abb. (Tf. 49, B). Günther, Chall. XXII 236—242. — Die Histol. der Leuchtorg. v. *H. macrochir* s. v. Lendenfeld, S. 274.

Gymnotidae. *Sternarchus* (*Rhamphost.*) *curvirostris*, A. 185—8, beginnt vor dem Auge; Krph. 1½ mal in Kpfl. u. 5 in Krpl.; 125 mm.; Canelos (Ecuador). Boulenger, Pr. Z. S. Lond., 87, p. 282, Tf. 24. Derselbe erwähnt von Canelos: *Sterna. albifr.* u. *Sternopygus carapus*, von Ecuador: *Carapus fasc.*, ebd.

- Giton (Kaup) Dum. statt Carapus autt. nec Raf., Jordan Pr. n. m. IX 565.
 Gymnotus electr., Wirkung der el. Schläge auf andere Fische; Ewart, s. S. 284.

Symbranchidae.

- Muraenidae.** Ueber Verwandtschaft mit den Notacanthi; Günther, s. S. 345.

Leptocephali, sind keine abnormen, sondern normale Larven, Gad. pollachius frisst sie; Yves Delage, Amer. Natur. XXI 92 (6 Zeilen.)

Von Muraeniden werden als westindisch aufgeführt (mehrfache Bem. zur Synon.): 1 Enchelycore, 1 Channom., 1 Echidna, 1 Pythoni., 17 Sidera, 1 Muraena, 1 Ichthyapus, 1 Caecula, 3 Ophisurus, 13 Ophichthys, (1 Letharchus, 4 Callechelys), 1 Chilorh., 1 (+1) Myro., 1 Hoplunnis, 1 Leptoconger, 1 Muraenes., 2 Congrom., 3 (+1) Conger, (1 Neoc.), 1 Anguilla; Jordan, Pr. n. m. IX 565, 606.

1. Nemichthyina. Nemichthys scolopacea, Diagn., Tiefsf. 304—1047 Fd.; avocetta (? = scol.), Diagn. cop., ob Tiefsf.??; infans 78, Beschr. nach 3 Expl., Ost-Amer. 500—2500 Fd. (Tf. 63, B); Günther, Chall. XXII 263.

Cyema, Diagnose; C. atrum Gth. 78, Beschr., Abb. (Tf. 54, D), Tiefsf. 1800 Fd., sehr e. Leptocephalus ähnl., ob. viell. Jugendzust. von Nem. infans?, aber Augen sehr klein; Günther, Chall. XXII 265.

Serrivomer, Spinivomer u. Labichthys, weil ungenügend bekannt, in die Liste der Tiefseef. noch nicht aufgenommen; Günther, Chall. XXII 263.

2. Saccopharyngina. Saccopharynx (syn. Euryphar. u. Gastrostomus), Charakteristik d. Gatt. — S. ampullaceus, Beschr. u. Abb. (Tf. 66) des Johnson'schen Expls. (1862) und eines jüngern, sowohl Mitchell's (1824) als Harwood's Expl. dürften zur gleichen Sp. gehören; S. pelecyanoides (Eur. pelec. Vaill. 82, Abb. in: La Nature 83), ein 2. Expl. 1886 entdeckt, Beschr., 2300 m tief; S. bairdi (S. flag. Goode u. Gastr. bairdii G. et R.), viell. syn. zu pelec., 4 Expl. bek., 389—1467 Fd. Günther, Chall. XXII 255—62.

3. Synaphobranchina. Synaphobranchus pinnatus (syn.: affinis Gth. 77), Beschr., Abb. (Tf. 62, A), Tiefsf. (200—740 Fd.), Madeira, Brasil., Japan, Philipp.; bathybius 77, Beschr., Abb. (Tf. 62, B), Tiefsf. 1875 Fd., 1 Albino; infernalis (? = bathyb.; syn. Histiobr. infern. 84), Tiefsf.??; brevidorsalis, (Tf. 63, C.) Maul u. Zähne wie pinn., D. beginnt 1 Kpfl. hinter d. Anus, Neuguinea; Japan, 1070 Fd., 23 Zoll; Günther, Chall. XXII 255.

Histiobranchus, s. Synaphobr.

4. Anguillina. Anguilla anguilla. K. Möbius untersucht möglichst reife Aale, die zum Meere wanderten, andre Wanderaale wurden in Seewasser-aquarien versetzt u. später untersucht, ferner in der Ostsee gefangene in der Tiefe des Kieler Hafens in Fischkasten gehalten, endl. wurden zahlr. Expl., die im Winter (bis 5. März) in der Nordsee gefangen waren, studiert. Es zeigte sich, dass auch im Meerwasser gefangen gehaltene Aale nicht reif werden. Die Eier aller Ex. kamen nicht über 0,227 mm hinaus, Spermatozoen fanden sich nicht. — Unter 21 kleinen Aalen (bis 50 cm), in der Windau (Schleswig) am 20. Oct. 84 gef., waren 18 ♂ (36—41 cm) u. 3 ♀ (49—50 cm l.). — Beim Reifen erhalten die ♀ eine Paarungsfarbe: graue verwaschene Flecken. V. Ber. d. Comm. z. wiss. Unts. deutscher M., Kiel, S. 127—134. — Rothe Körper d. Schwimml.; Coggi, s. S. 294. — Rigor mortis beim Aal; Ewart, s. S. 284. — „On the

mode of propagation of the Common Eel“, F. Day, Proc. of the Cotteswold Naturalists' Field Club (Gloucester) 1885/6, p. 44—51.

A. anguilla, haben 18 Tage im Trocknen zugebracht nach Abreißen eines Behälters im South Kensington-Aquarium; Nature 24. Febr. 87, ref. im Zool. Gart. Jg. 28, S. 221. — Zur Einführung des Aals in die Donau wird Brut bei Budapest etc. eingesetzt, männliche Aale bei Galatz; Circ. Deutsch. Fisch.-Ver. 1887, S. 13, 51, 72, 108. — Aufstieg des Aals in Baden, ebd. 52.

Conger marginatus, Bem.; Nyström, Jap. F. 46. — *C. conger*, Ei; Scharff s. S. 298.

Congromuraena guttulata, ähnl. *habenata*, aber Krpl. $1\frac{3}{4}$ mal in Schwanzlänge; weisslich, 1 Reihe schwarzer Punkte über u. 1 R. unter der L. l.; Viti-I. 315 Fd.; Günther, Chall. XXII 252.

Simenchelys parasiticus 79, Tiefsf. (200 Fd.); Günther, Chall. XXII 252.

5. *Heterocongrina*.

6. *Muraenesocina*. *Nettastoma*, alle 3 bek. Sp. Tiefsf.: melan. (♀Fd.); *parviceps* 77 (Abb., Tf. 63, A), Japan 345 Fd.; *procerum* 83, 647 Fd., Günther, Chall. XXII 253. — *Nett. brevirostre*, Schnauze dick [nach d. Abb. $\frac{1}{4}$ der Kpfl.], 2 Zähne vorn oben, 3 Vomz., jederseits 2 Mandibz., alle lang; Kopfl. 12 mal in Totall.; 17 cm., Messina; Facciola, Natur. sicil. VI 166, Tf. 3, Fig. 3.

7. *Myrina*, 8. *Ophichthyina*, 9. *Ptyobranchina*.

10. *Muraenina*. *Muraena undulata* von Maskat (einzige Art der Fam.) erw., Boulenger, Pr. z. s. 666. — *Muraena*, rothe Körp. d. Schwimml.; Coggi, s. S. 294.

Leptocephalus, siehe oben Ives Delage.

Eurypharyngidae s. oben bei *Saccopharynx*.

Lophobranchii.

Solenostomidae.

Syngnathidae. *Siphonostoma typhle*, rothe K. der Schwimml.; Coggi, s. S. 294.

(*Syngnathus*.) 15 westind. Sp. (als *Siphostoma*) aufgeführt, Jordan, Pr. n. m. IX 569. — *Syngn. fuscus*, Entwickl.; Ryder, s. S. 306.

(*Nerophia*.) 2 westind. Sp. (als *Syngnathus* L. nec Raf.), Jordan, Pr. n. m. IX 270.

Gastrotokens, ein Tastkissen am After, Brock, s. S. 274.

Hippocampus, als westind. bez.: *punctul. Guich.*, margin. *Hck.*, fascicul. *Hck.*, stylifer J. G. 82; Jordan, Pr. n. m. IX 570. — *H. punctul. Gui.*, n. f. Charleston, Beschr.; Jord. u. Eig. Pr. n. mus. X 269. — *H. hexagonus*, Lebensweise in d. Gefangsch., Zusammenhang des Fehlens der A. beim ♂ mit der Brutpflege, S. Lockwood, „More about the Sea-horse“, Amer. Natur. XXI 111—4. — *H. guttul.* als einzige Species der Lophobr. von Maskat erw.; Boulenger, P. z. s. 666.

Plectognathi.

Sclerodermi. *Triacanthodes anomalus*, diese Sp. scheint der einzige sichere Tiefsf. unter den Plectogn. zu sein, indess auch sie als Tiefsf. nicht besonders charakteristisch organisirt; 140 Fd. bei den Ki-I.; Günther, Chall. XXII 266.

Balistes capr., rothe K. der Schwimmb.; Coggi, s. S. 294.

Balistes macrolepis, 3/26, 23; Sq. 38—40, 24 zw. D. II u. Anus; Z. weiss, ungleich, gekerbt; Grube vor Au.; Schwanz compr., ohne Dornen; keine grös. Scuta hinter Kiemöff.; D. II u. A. vorn stark erhöht; braun, Schuppentuberkel weiss; Maskat, wo auch *B. niger*, *mitis*, *assasi* (u. *Triac. strigilifer*, *Monac. setifer*, *Ostracion gibb.*, *cub.*, *cyanurus*, *cornutus*); Boulenger, Pr. z. soc. L., 87 p. 666.

(*Balistes*.) *Canthidermis sufflamen* Mtch., syn.: *B. sobaco* P.; *C. longus* (Gron.), syn.: *B. macrops* P., ?*macul.* Bl., Gth.; *Xanthichthys ringens*, syn.: *X. cicatr.* P.; *Meli. piceus* P., syn.: *buniva* Gth., ?*bun.* Lac.; 9 westind Sp.; Jordan, Pr. n. m. IX 604.

Monacanthus broccus, das Ei; Ryder, s. S. 306. — *Mon. irror.* P., syn.: *punct.* P., aber *pullus* Rz. versch.; *ciliatus* Mtch., syn.: *occidentalis* Gth., *piraaca* Kn., *davidsoni* Cp.; *hispidus* (L.), syn. *setifer* Gth., Poey; 13 westind. Sp. aufgeführt; Jordan, Pr. n. m. IX 604. — *Mon. peronii*, Abb., Besch.; Mc Coy, Prod. zool. Vict., Decas 15, Taf. 143 (2 Expl. mit abnorm verdopp. Dorsalstachel erw.). — *Mon. tessellatus* Gth. 80, 1 Ex. in einem Netz, welches in 115 Fd. schleppte, bei den Philippinen gefangen, wohl aber erst in den oberen Schichten zufällig hineingerathen, u. die Sp. viell. kein Tiefsf.; Günther, Chall. XXII 267.

Ostracion tricornis L., syn.: *quadric.* L. u. *Acanthostr. polygonius* P.; *O. trigonum*, syn.: *undul.* P. u. *expansum* Cope; 4 westind. Sp.; Jordan, Pr. n. m. IX 604. — *Ostr. stictonotus*, juv. (33 mm) dornenlos, Körper u. C. kürzer, als ad. (82 mm.); Nyström, Jap. F., 48.

Gymnodontes. Geruchsorgan von *Tetrodon* u. *Diodon*, auch Gehirn u. Muskulatur; Wiedersheim, s. S. 289, 285. — Die verbreiterten Rad. branchiost. theoretisch wichtig; Albrecht, s. S. 282.

Tetrodon setosus, nach e. trocknen Haut von Mexico, Rosa Smith, „*Tetraodon set.*, a new sp. allied to *T. meleagris*“, Bull. Calif. Ac. Sc. II Nr. 6, S. 155—6, u. Amer. Natur. XXI 861. — Bem. über *T. pardalis*, *xanthopt.*, *rubripes*, *porph.*, *stictonotus*, *lunaris*; Nyström, Jap. F. 48. — *T. stellatus* u. *hisp.* bei Maskat; Boul., Pr. z. s. 667. — *T. (Cheilichthys) psittacus*, Surinam, Färb.; Lidth de J., Not. Leyd. Mus. IX 138.

Diodon, 2 westind. Sp.: *hystrix* L. (*atinga* Bl. nec L., ?*holac.* L. = *spinosiss.* C. = *macul.* Gth.) u. *maculifer* Kp.; Jordan; Pr. n. m. IX 606.

Chilomycterus, 4 westind. Sp.: *schoepfi* Walb., syn. *geometr.* autt. nec Bl. Schn.; *spinosus* L., syn. *cornutus* Kp., *orbitosus* P. u. *geometr.* var. 3 Gthr.; antenn. C., syn. *puncticul.* P.; *reticul.* L.; Jordan, ebd.

Ganoidet.

Ueber die Systematik der Ganoiden vergl. Cope, S. 328.

Amlidae. Osteologie, Rippen; Baur s. S. 281; Wirbelsäule, Cope, s. S. 280.

Amia L. 1766 nec Gron. 1763 wird *Amiatus* Raf., Jordan, Pr. n. m. IX 542 (1886.).

Polypteridae. Occiput, Gegenbaur, s. S. 279; Bau der Dors., Zograff, s. unten bei *Acip.*; Flossen, Cope, s. S. 280; Skel. der paar. Flossen, Howes, s. S. 281; desgl. Emery, ebd.; Geruchsorg. u. Gehirn, Waldschmidt, S. 289.

Lepidosteidae. Occiput, Gegenbaur, s. S. 279.

Acipenseridae. Acipenser, Occiput, Gegenbaur, s. S. 279; Venen, Hochstetter, s. S. 292; Chorda, L'voff, s. S. 280.

Nik. Zograff, „Zähne der Knorpelganoiden“. Bei Polyodon ist die Pulpaöhle weit, die Zahnwandung dünn; Schmelzschicht sehr dünn, Dentin innen mit größern, aussen mit sehr feinen Zahncanälen. Schm. u. Dent. wies Vf. auch bei den Z. von jungen Ac. ruth. nach. Auch andre Acip.-Arten u. Scaphirhynchus besitzen Z., um so länger u. dauerhafter je mehr sie (durch Schnauzenform) dem Polyo. ähnlich sind. Der Hinterrand des Gaumen hat sie deutlicher u. öfter als die Kiefer. Bei Sc. kaufm. von 728 cm noch da (0,2 mm l.). Bei Ac. stell. (152 mm l.) die Z. mit e. basalen Zahnplatte. Biol. Centrbl. VII 178—183 u. 224. Vergl. auch: „On some of the affinities between the Ganoidei chondrostei and other fishes“, Nature (London) Vol. 37 p. 70 (Nov. 87): Formen mit beständigen Zähnen sind die älteren. Die Acip. scheinen auch nach Entwickl. des Herzens (bei Jungen zahlreichere Klappen) u. des Gehirns (Scaphirh.) den Polypterus, Lepidosteus u. den Dipnoi näher zu stehen, als sonst angenommen.

N. Zograff, „die embryonale Rückenflosse des Sterlet (Ac. ruth.)“. Die Vermuthung Salensky's (1877), dass die Rückenschilder transformirte Strahlen der embr. D. seien bestätigt Vf. durch Beob. eines A. ruth. 2 Monate alt, wo die Stacheln in der Flossenhaut liegen u. noch meist knorplig sind u. e. grosse Centralhöhle besitzen; die Hornfäden der Flossenhaut drängen sich gegen die Hinterseite der Stacheln. Auch bei erwachs. Ac. u. Scaphirh. fand Vf. in den Schildern noch den Centralcanal der embr. Stach. wieder. Selbst Muskeln für die Strahlen finden sich bei jungen Ac. noch. Die D. von Polypterus wird verglichen u. als einheitliche Flosse erklärt (schon früher von Stöckn. so angenommen). Biol. Centrbl. VII 517—521. — Eine russische Arbeit desselben Vf.'s üb. anatom. Verhältnisse u. äussere Charaktere des Ac. ruthenus in: Tr. soc. nat. Moscou, Bd. 52, Theil 3, 72 Seiten, 2 Taf., Xyl.

Acip. ruthenus, ein missglückter Versuch durch Brut aus der Wolga den Sterlett nach Deutschl. zu verpflanzen; v. d. Borne, Circ. Deutsch. Fisch.-Ver. 1887, S. 49 u. 73.

„Der Scaphirhynchus. Vergleichend-anat. Beschreib.“ Schlüssel der 4 bek. Sp., Schnauzenlänge variabel. Die Kopfschilder sind nicht als Fortsetzung der 5 Schilderreiben des Rumpfes zu betrachten, sondern als Quergürtel, von denen die hintersten 3 den 3 Hirnabtheilung., aber nicht der neuern Wirbeltheorie des Schädels entsprechen. Die Beschr. des Skeletts bezieht sich meist auf Sc. rafinesci, die der Eingeweide auf fetschenkoi, Rippen hat raf. 10, fed. aber 25. Die Schwimmblase ist bei Fedsch. rudimentär, mehr entwickelt bei hermanni, noch mehr bei kaufm., am stärksten bei rafin.; Kritik über die phylog. Skizze, die auf Grund der Schwbl.-Entw. für Vertebrata von Bridge (79) aufgestellt wurde. (Musk., Nervens., Sinnesorg., Gefässe nicht berücks.) N. Iwanzow, Bull. soc. natur. Moscou, 87 Nr. 1, p. 1—41, Taf. 1, 2.

Polyodontidae. Zähne von Polyodon; Zograff, s. oben (Ac. ruth.).

Dipnoi.

Sirenidae. Aortenbogen von Ceratodus, Boas, s. S. 291; Skelett d. paar. Flossen, Howes, s. S. 281, desgl. Emery, ebd.; Chorda, L'voff, s. S. 280.

„Die Speciesunterschiede der Dipneumones“ siehe Ber. 86 S. 340 (Protopt. ann. hat an der V. keinen Flossensaum); [bez. der Rippenzahl u. Ausbild. der

paar. Flossen entspricht die geogr. Reihenfolge, Austr., Ostaf., Westaf., Am. auch der morpholog. Folge; Cerat. hat die wenigsten (27) R. u. grössten Fl., Lepid. die meisten R. u. kleinsten Fl.]. „Die Flossen der Dipnoi“; sie stehen wie die Extremitäten der luftathmenden Wirbelth., d. h. der Humerus ist um 180° torquirt, bei echten Fischen ist die Stellung der P. u. V. eine parallele. Vf. unterscheidet bei Cerat. humerus, femur (das 1. Glied des Axenstrahls), ulna nebst radius u. tibia nebst fibula (das mehr oder weniger deutl. getheilte 2. Gl. des Axstr.). Beschr. u. Abb. der Muskulatur der Fl. „Die Stellung der Dipnoi im System“, sie gehören, weil sie eine Lunge (d. h. ein mit venösem Blut gespeistes Organ) besitzen, u. haupts. weil der Nasengang den Gaumen durchbohrt, zu den Amphibien; aus letzterem Grunde ist auch Myxine (nicht aber Petromyzon) den Amphibien zuzuordnen. Hand und Fuss kommen dann allen lungenathm. Wirbelth., aber keinem Fische zu. „Ueb. d. Wachsthum der Ceratodus- u. Protopterusflosse“, ontogen. Umformungen werden aus den Angaben von Howes (s. unten) für Cerat. hergeleitet, der jüngere Flossen untersuchte als Vf. u. als Günther. — Die Abb. erläutern Skelett u. Musk. der Flossen von Cer. u. Prot., sodann aber auch (nur mit Tafelerklärung) die Musk. von Kehle u. Bauch des Cerat. Ant. Schneider, Zool. Beitr. herausg. von Schneider, Bd. 2, Heft 1, S. 97—105, Tf. 11. (A. Schneider † 1890.) [Dass bei Protop. der Flossensaum an der P. ventralwärts (dabei etwas nach hinten), an der V. dagegen dorsalw. (u. etwas nach vorn) gerichtet wird, beobachtete Ref. an lebenden Expl.]

R. Wiedersheim, „zur Biologie von Protopterus“. Vf. sah den Schwanz eines im Sommerschlaf befindl., eingekapselten Pr. zuerst nach vorn gebogen u. dem Rumpf angelegt, dann über die Stirn fortgeschlagen und auf die andere Körperseite zurücklaufend. Das Maul bleibt unbedeckt und ist der Schlussplatte der Hülle zugewandt, durch deren Porus ein Gasaustausch stattfinden kann. Zw. der Hülle u. der Haut findet sich eine zähe Flüssigkeit, nahe am Kapseldeckel aber eine weissliche breiige Masse, in der Vf. eine Ausscheidung des Pr. sieht, u. für die der Porus ein Ausweg sein könnte. Die Athmung wird nach Vf. durch den Ruderschwanz bewirkt, dessen Oberfläche durch stark gefüllte Hautgefässe eine rothe Farbe zeigte, ähnl. wie bei Amphib. (Hylodes) die Schwanzflosse der Respiration dient. [Näher noch liegt der Vergleich mit d. Flossen der Embiotociden-Larven Ref.]. Anat. Anz. II 707—13, 1 Xyl.

„Ueber Lepidosiren paradoxa Fitz.“, kurze Uebersicht der Litteratur; bekannt sind nur 2 Ex. in Wien, 2 in Paris; G. Baur, Zool. Jahrb. v. Spengel, II 575—583. — Lep. paradoxa, ein Weibchen in der Nähe von Manaus, Prov. Amazonas, im Aug. 86 gefangen, u. von dem Finder (Dr. J. Barbosa Rodrigues) in e. wiss. Zeitschrift zu Rio als *L. gigliolina* publicirt, wahrsch. aber nicht abweichend von parad.; die Char. d. Gatt. Lep. gegenüber Protopt. sind vorhanden; H. H. Giglioli, Nature (London) Vol. 35, 343,

Ceratodus, vergl. Böcklen, S. 326; Flossen, Howes, s. S. 281.

Burt G. Wilder, „The Dipnoan Brain“. Beschreibt das Gehirn von Ceratodus; dieses stimmt mit Protopt. darin, dass das Prosencephalon wesentlich aus einem Paar grosser Lobi besteht, deren Höhlen (Procoelen od. Seitenventr.) nur durch e. verhältnissm. kleine Aula (wie bei Amphib. u. höh. Vert.) verbunden sind. Es weicht aber darin von Pr. ab, dass es zw. den dorsalen Theilen dieser

Lobi einen langen u. dicken Supraplexus besitzt, der durch eine nur bei Cer. vorkommende vordere Verlängerung (Praerima) der Fissura transversa magna (rima) in beide Procoelen eindringt (von Hxl., Pr. zool. soc. 76 übersehen u. für e. Tela vasc., d. i. die Aulatela W.'s, gehalten). Von unten sind die Lobi durch e. tiefen Spalt, in welchem eine „Quasifalx“ aufsteigt, getrennt. Eine „Praecommissur“ u. eine Valvula (zw. Epi- u. Mesocoelen) sind bislang unbeschrieben. Vf. hält die Lobi öf. für den Haupttheil des Vorderhirns, dessen Anhängsel, die Hemisphären, sind bei Cer. noch ventral, drehen sich aber bei höh. Vert. nach der Dorsalseite. Cer. gehört eher zu den Amphibien als zu den Fischen. — Amer. Naturalist, XXI 544—8, 3 Xyl.

Selachii.

Allgemeines. Skelett d. paar. Flossen, Howes, s. S. 281; Gehirn, Sanders, s. S. 285; Harnstoff in verschied. Organen, Krukenberg, s. S. 295.

Chimaeridae. Skelett, Howes, s. S. 281; Chorda, Lvoff, s. S. 280; Histologie der Seitenorg., Solger, s. S. 274; Blutgefäße (von Callorh.), Parker, s. S. 293.

Chimaera monstrosa, junges ♂, Körper 1½, Schwanz nur 3 Zoll, Stirnhaken hier (u. auch bei grösseren) noch unter der Haut, wohl erst bei reifen ♂ frei; Pterygop. nur 2 mm l., gablig; 505 Fd., Fortpflanz. wohl in der Tiefe, daher Ei noch unbekannt; Ch. affinis ebenfalls Tiefseefisch; Günther, Chall. XXII p. 12, 13.

Squali. Gehirnganglien, Beard, s. S. 287.

Carchariidae. *Carcharias*, Occiput, Gegenbaur, s. S. 279; Ganglion ciliare, Onodi, s. S. 287.

Carcharias C. nec Raf. wird *Carcharhinus Blainv.* (schon 85 im Cat.); 17 westind. Sp.; Jordan, Pr. n. m. IX 555.

Carcharias macrurus, bei N. S. Wales wohl bekannt als „Whaler“, von *C. brachyurus*, womit verwechselt, durch Mundform u. stumpfere Schnauze versch.; E. P. Ramsay u. Douglas-Og., Pr. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II S. 163. [ibid. S. 1024 (1888)]. — *C. valbeehmii*, Bem., Nyström, Jap. F. 50. — *Carch. tricuspid.*, vergl. unten bei *Lamna güntheri*. — *Carch. leucas*, siehe bei *Carcharodon*. —

Carcharias (Prionodon) pugae Perez, estudios p. 2; [=? *C. glaucus* Gay nec autt.]; „Azulejo“ der Fischer (cf. *Lamna*), Besch. bei Philippi, Tiburones de Chile, An. Univ. Chile, T. 71, p. 6 u. Abb. Taf. 1, Fig. 2. *C. gracilis* Phil., nach Perez's Auffassung = *pugae* juv., aber *C.* kürzer, P. schmalere, die Zähne des Untkf. verschieden [u. die D. I der P. sehr genähert]; Philippi ebd. p. 7, Tf. 2, F. 1. *C. brachyrrhynchus* Ph., breitschnauzig, oben bräunlich grau, unten weisslich, Zähne unbekannt; ebd. p. 8, Tf. 1, F. 1. — „Hypoprion? Hemigaleus? *heterodus* u. *isodus*“, Philippi ebd. p. 9 bez. 10, Tf. 2, F. 6 bez. 5, beide nach Gebissen charakterisirt.

Hemigaleus, vergl. *Carcharias*!

Galeus, Ganglion ciliare, Onodi, s. S. 287.

Galeus chilensis, Perez, estudios p. 3; Besch. bei Philippi Tibur. p. 11, Tf. 4, Fig. 1. 2, nom. indig.: Pejezalzon; von *G. canis* durch die Zahnform versch., Zool. Gart. S. 86. —

Galeus japonicus, Bem.; Nyström, Jap. F. 50.

(Sphyrna.). *Zygaena peruana*, Gestalt des Kopfes wie tudes, aber mit lauter spitzen Ecken; in Peru häufig. Philippi, Tiburones p. 12, Tf. 2, Fig. 2; Zool. G. S. 86. — *Zygaena dissimilis*, wegen der gesägten Z. u. Mangels der Grube am Vorderrand des Kopfes von allen bek. Sp. versch., Karrachee, üb. 10 Fuss l.; J. A. Murray, „n. sp. of *Zygaena* from Kurr. Harbour“, Ann. Mg. N. H. (2) XX 304 (Abdr. aus: Indian Ann. Mag. N. Sc. Juni 87, p. 90 u. Journ. Bombay Nat. Hist. Soc.). *Z. diss.* Murr. ist *Z. mokarran* Rüpp., diese Sp. aber neu für Indien; F. Day ebd. S. 389 (kurze briefliche Notiz).

Mustelus, Occiput, Gegenbaur, s. S. 279; Muskelphysiol., Krukenberg, s. S. 283; Gefäßsystem, Parker, s. S. 293 u. Hochstetter, S. 292; Ganglion ciliare, Onodi, S. 287.

Mustelus edulis, Perez, estudios p. 4. Ungefleckt; ob vom europ. versch.? „tollo“ der Fischer; Philippi, Tiburones chil., p. 15, Tb. 6, Fig. 5.

Lamnidae. *Lamna cornub.*, Schädel s. Parker, unten bei *Carcharodon*.

Lamna güntneri Murray (84), ist *Carcharias tricuspidatus*, Day, Ann. Mg. (2) XX 389 (kurze briefl. Mitth.).

Lamna huidobrii, ohne Nebenzacke an den Zähnen, ob von *spallanzani* versch.?, 3 m lang; Philippi, Tiburones chil., p. 16, Tf. 3, F. 1 und Zool. G., S. 86. — *L. philippii* Perez, estudio p. 1; „azulejo“ der Fischer (cf. *Carchar. pugae*), von *huidobrii* versch. durch viel dickern Körper, concave Frontalregion, längern u. dünnern Schwanz, breitere D. u. P., Philippi, ebd. p. 17, Tf. 3, F. 2.

Oxyrhina Ag. wird *Isurus* Raf. (schon in Synopsis 83); westind. ist *I. dekayi*; Jordan, Pr. n. m. IX 556.

Carcharodon rondeleti, synon.: *Carcharias leucas* Benn. 59; Dougl.-Og., Pr. Z. Soc. Lond. 87, p. 615, Anm. — Ein Oberkfr. von Südhile hat 110 cm Umfang. Philippi, Tibur. chil., p. 18, Tf. IV F. 4 (Zähne). — Abb. des Skeletts; Günther, Guide Brit. Mus. p. 55, 56. — Bei Neuseeland constatirte T. J. Parker von 1881—6 den Fang von 5 Expl., 10—30 Fuss l. Maasse und Aeusseres von e. Ex. 577 cm l., Schwanz stark deprimirt. Ergänz. der Beschreibung des Skeletts (Hasse 79 u. Haswell 84), meist mit *Lamna corn.* verglichen, die Schädel beider Gatt. deutlich verschieden, in die Basis des Sch. von *Carch.* treten 2 Wirbelkörper ein, das Neuralrohr sehr unregelm. segmentirt, Zahl d. Wirbelkörp. 182, der 107. ist der 1. Wrb. der Schwanzfl. An dem Beckengürtel ein Knorpelstück, entsprechend einem Propterygium, abgesondert; D. II u. A. besitzen eine basale Knorpelplatte (geg. Hasw.), d. h. verwachsene Pterygiophoren; alles mit reichl. Abb. Ferner Abb. u. Beschr. vom Darmtractus, (Herz (3×3 Klappen im Con. art.), Gehirn u. dessen Nerven. Ein Ex. von 15 Fuss hatte noch keine entwick. Ovarien. Auch ein Fötus 55 cm l. untersucht, die Spitze des dreischenkligigen Rostralknorpels ist hier durch eine Oeffnung gefenstert; am Hirnthell ein Spiracular(?)-Knorpel; am Gehirn der Tractus olf. u. Nachhirn noch ganz kurz. Proc. Zool. Soc. London, 1887, S. 27—40, Tf. 4—8.

Alopecias, Gehirn, Léger, s. S. 287. — *Alopias* in Chile „peje-zorro“ genannt, *A. vulpes*?, ob vom europ. verschieden?; *A. barrae* Perez, estud. p. 6, mit spitzem Kopfe, alle Zähne d. Obkf. von verschiedener Grösse; Philippi, Tiburones p. 19 bez. 21, Tf. 5, Fig. 1, 1a, 1b, bez. 2. — *Al. vulpes*, Bem. über Expl. v. Sardinien; Parona, Atti soc. Modena, Rend. (3) I p. 99.

Rhinodontidae.

Notidanidae. Occiput von Notid., Gegenbaur, s. S. 279.

Notidanus [Hex.] *vulgaris* Perez, estudios p. 8, u. N. [Hept.] *ferox* Perez est. p. 7. — *N. vulg.* hat im Untkf. nur 6 Spitzen an den Zähnen; *N. ferox* hat längern Schwanz u. grösseren Abstand zwischen P. u. V. als *indicus*, Philippi, Tib. de Chile p. 22 bez. 23, Taf. 6, Fig. 1 bez. 2.

Ohlamydoselachidae. Ohlamydoselache anguinea, 1 ♀ 2 ♂ aus der Yedo-Bay [angebl. Tiefsee gegenüber Tokio, wo aber kein tiefes Wasser; stammt also wohl aus dem Ocean weiter südlich, woher die Tiefseef. des Fischmarkts in Tokio überhaupt kommen]. Die Pterygopodien ähnl. wie *Acanthias*, die Ventralis heftet sich aussen weit an das Pt. an, wie bei *Notidanus* (Abb.); während bei einem ♂ die Urogenitalgänge symmetrisch sind, ist bei d. andern der linke stark, der r. schwach entwickelt u. der r. Porus abd. fehlt ganz (Abb.). Abb. der Darmspiralklappe, der Zähne u. des Herzens, in dem Connus arter. 3 Längsreihen jede zu 5–6 Klappen, regelmässiger als bei Garman. Günther, Chall. XXII 2–4, Tf. 64, 65. — Referat üb. Garman's Arbeit (85); Fr. Eilh. Schulze, Sitzb. G. natf. Fr. Berlin 87 S. 59. — Fossile Zähne von Ohlam., Davis, siehe S. 327.

Scylliidae. *Scyllium*, Venen, Hochstetter, s. S. 292; Gefässentwickl., P. Mayer, S. 291; Muskelstruktur, Marshall, S. 283.

Scyllium canescens Gth. 78, einz. Tiefsee-Art, Günther, Chall. XXII p. 1, Tf. 1. — *Sc. laticeps* u. *indicum*, Bem.; Nyström, Jap. F. 49.

Scyllium chilense Gay nec Gth., nom. ind. „pintaroja“, mit bräunlichen Flecken wie *Sc. catulus*. Philippi, Tib. p. 24 Tf. 7, Fig. 4, *Sc. brevicolle* = chil. Gth., Perez, nec Gay, mit schwärzlichen Qbd. über den Rücken, Zähne unten kaum kleiner als oben, Genitalanhänge die V. nicht überragend, Kopf breiter u. runder als bei chil.; ebd. p. 26, Fig. 5, im Zool. Gart. p. 86 als *S. Gayi* Ph.

Pristiurus, Gefässentw., P. Mayer, s. S. 291. — *Pr. melan.* als Tiefsef. erw., Günther, Chall. XXII p. 2.

Cestraclontidae. Skelett d. paar. Flossen, Howes, s. S. 281.

Spinacidae. *Acanthias*, Chorda, Lvoff, s. S. 280; Entw. des Ganglion ciliare, Beard, S. 287; Venensystem, Hochstetter, S. 292; Bauchhöhle frei von Bacterien, Ewart, S. 291.

Acanthias vulg., 66° N. bei Westgrönland; Lütken, Vid. Medd. n. For. Kjob. 1887. S. 4.

Acanthias fernandezianus, Abb. u. Beschr., viell. doch versch. von *A. vulg.*; Philippi, Tib. p. 27, Tf. 4, F. 3, u. Zool. Gart., Bd. 28, S. 87.

Spinax C. wird *Etmopterus* Raf., Jordan, W. Ind., Pr. n. m. IX 555.

Spinax granulosus u. *spinax* als Tiefsef. erw., Günther, Chall. XXII p. 4.

Centrophorus, alle Sp. Tiefsef., bisherige Fundorte Japan, Ostind. Archip., Mittelmeer, Portugal, Massachusetts. *C. foliacus*, Maul näher der 1. Kiemenpalte als der Schnauzsp., Schuppen gross, einkiebig; grau; *Enosina* (Japan), 345 Fd., 1 mas juv., 16 Zoll; *C. squamulosus*, Maul fast mitten zw. 1. Ksp. u. Schnsp., Schuppen klein; schwarz; mit vorigem, 27 Z., 1 fem. ad.; Beschr. von Darmkanal, Generationsorg., Herz. *C. coelol.* als Tfsf. erw., Günther, Chall. XXII, 5, Tf. II, Fig. A (*foliac.*) u. B. (*squam.*)

Centroscyllium granulatum, ähnl. *fabricii*, Chagrin gröber, Falkland-I., 245 Fd., 11 Zoll l. Günther, Chall. XXII p. 7.

Scymnus lichia, Blutgefässe Parker, s. S. 293.

Laemargus bor. als Tiefsf. erw., Günther, Chall. XXII 7.

Echinorhinus spinosus, Abb., Beschr., Zähne $\frac{10.10}{10.1.10}$; Mc Coy, Prod.

zool. Victoriae, Tf. 144.

Rhinidae. Rhina, Venensystem, Hochstetter, s. S. 292.

Rhina armata, nom. indig. „Anjel de mar“, Körperform von der einer brasilianischen Rh. squat. versch., die Medianlinie des Rückens mit Stacheln, noch grössere, 4 mm l. [nicht cm!], in einer Binde auf dem Rande der P.; 1,03 m l.; Philippi, Tib. de Chile p. 29, Tf. VII 1 (wo in Fig. 2 auch das bras. Expl.) u. Zool. Gart. Bd. 28, S. 87.

Pristiophoridae.

Rajae. Pristidae. Rhinobatidae.

Torpedinidae. Torpedo, Muskelphysiol., Krukenberg, s. S. 283; Physiol. d. elektr. Org., Gotch, S. 285; Nervus fac., Froriep, S. 288; Entw. des Gangl. ciliare, Beard, S. 287; Venen, Hochstetter, S. 292; Gefäßsystem, Mayer, S. 291; Entw. des Vornierengangs, Beard, S. 308; Entwickl., Swaen 302 u. Rückert 302.

Rajidae. Raja, Venen, Hochstetter, s. S. 292; *R. batis*, selbst die Bauchhöhle frei von Bakterien, Ewart, S. 291.

[*Raja clavata*]. Zieht im Frührl. u. Sommer in die Zuiderzee, wahrsch. des Laichens halber; Entw. ausserhalb d. Mutter dauert über 1 Woche; J. F. van Bemmelen, Bijdragen tot Ansjovis, S. 42 (siehe bei *Engraulis*).

Raja fyllae, Scheibe fast kreisförmig, von erinac. u. ocell. versch. durch nur 30 Zahnreihen in jedem Kiefer (statt 50 bez. 90), von plutonia durch Mundbreite $1\frac{1}{2}$ mal in dem Abstand v. der Schnauzsp. (statt $\frac{1}{2}$), kürzeren Schwanz, weniger Schulterdornen; Davis-Str., 80 Fd., 1 ♀ juv. 101 mm br. vom Schiff „Fylla“, eine unbekannte Eikapsel viell. dazugehörig; Lütken, Vid. Medd. nat. For. Kjoeb. 1887, S. 1—4, Taf. 1.

Raja isotrachs, Rostrum rechtwinklig, P. gerundet-rechth.; Oberseite durchweg rauh, die Schüppchen mit 4—5 strahliger Basis, Stacheln nur mediane, 1 am Schultergürtel, 18 stärk. auf d. Schwanz; oben braungrau, unten braunschwarz; stüdl. v. Japan, 365 Fd., 1 ♀, 13 Zoll br. Günther, Chall. XXII 8, Tf. 3. *R. circularis* im Farøe-Canal, 516 Fd.: *R. radiata*, *batis*, vomer, full., als Tiefsf. erw.; *R. hyperborea*, desgl., Bemerk., Abb. Tf. 4; *R. plutonia*, granul. u. nidrosiensis, Tiefsf., Beschreib. copirt; Günther, ebd., p. 8—11.

Raja japonica, Schnauze (bis zur Augenmitte) kürzer als halbe Kopfbreite (ebenda), Stirnbreite = Augd. (bei undul. grösser); Entfernen d. äuss. Nasenloch-ränder etwas kleiner, als deren Abstand von der Schnauzenspitze (wodurch von maderensis versch., welche sonst nahe); Dornen nur 1 starker hinter dem Kopf u. 1 Reihe auf dem Schwanz; dunkelbraun, gelblich gefleckt, 21 cm [Nagasaki]; Nyström, Jap. F. 52. Bem. üb. *R. kenoei*, ebd.

Trygonidae. Die Fam. als Dasyatidae, u. die Gatt.

Trygon als Dasyatis Raf., sayi, hast. u. tuberc. westind., Jordan, Pr. n. m. IX 557. — Tr. uarnak als einz. Rochenart von Maskat erw.: Boulenger, Pr. z. s. 667 — Tr. violacea, n. für d. Adriat.-Meer, Aug. 86 bei Venedig gef.; kurze Bem. üb. Färb. u. Eingeweide; E. F. Trois, „annot. sopra Tr. viol. preso nel Adr.“, Atti r. istit. Veneto (6) V 31—33.

Urolophus tullbergi, hat zwei mit Widerhaken versehene Stacheln auf d. Schwanz, Rückenfl. fehlt, Körper ohne Dornen, braungrau; [Nagasaki] 22 cm; Nyström, Jap. F. 53. — Ur. kaianns als Tiefsf. (140 Fd.) erw.; Günther, Chall. XXII 12.

Myliobatidae. *Mobula* Raf. statt *Dicerobatis*; *M. hypost.* westindisch; Jordan, Pr. n. m. IX 558.

Cyclostomi.

Petromyzontidae. *Petromyzon*, *Chorda dorsalis*, Lvoff, s. S. 280; *Parietalauge*, Baird, S. 287 (oben); *sympath.* Nervensystem, Julin, S. 288; Entw. d. Auges, Nuel, S. 290; Gefässe, Julin 291; Blut, Thompson 290; Entwicklung, Böhm, s. S. 300, Shipley S. 304, Kupffer S. 305, Dohrn S. 308, Scott S. 305.

Petr. fluviat u. *planeri* für dieselbe Art erklärt von Shipley, s. S. 304, — *Petr. (Bathym.) bairdi*, als Tiefsf.? (547) erw., Günther, Chall. XXII 267.

Lampetra spadicea ähnl. *plumbea*, aber Mandz. 9 (plb. 8), laterale zweispitz. Z. 4 (plb. 3) kastanienbraun, Guanajuato, Mex.; die dem Aequ. (21° N.) nächste Art der Subklasse. Hay, Pr. n. mus. X 374, Tf. XX 6.

Myxinidae. *Myxine*, Muskelstructur, Marschall, s. S. 283; *Parietalauge*, Beard, S. 287 (oben); Gefässe, Julin, S. 291; Blut, Thompson, S. 290.

[M.] Weber, „bouw der geslachtsorganen van *Myxine glut.*“, fand, dass die Reife der Eier im Süden früher eintritt; reife Weibchen u. noch weniger reife Männchen, hat er unter Hunderten von Exp. nicht erhalten. Tijdschr. nederl. dierk. veeren. (2) I. Afl. 3, 4. Verslag v. d. vergad., p. CCXIII—VII.

Myxine glut., Tiefsf. (70—524 Fd.); *M. australis* Jen. aus dem antarct. Amer. auch in Japan (= *Hepatr. cirr.*), die hinteren Oeffn. wahrsch. nur Poren der Seitenlinie), Tiefsf. 345 Fd.; Günther, Chall. XXII 267. *Bdellostoma*, Gefässe, Julin, s. S. 291.

Leptocardi.

Cirrostromi. *Amphioxus*, gehört nicht zu den Vertebraten, Beard, s. S. 308; morphol. Vergleichung mit den Tunicaten, Dohrn, S. 308.

Bericht

über die

**wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Malakologie
während des Jahres 1888.**

Von

Dr. Joh. Thiele und Dr. W. Kobelt.

I. Bericht über Allgemeines, Physiologie, Anatomie und Entwicklungsgeschichte.

Von

Dr. Joh. Thiele,
Assistent am Zoolog. Museum in Dresden.

Zeitschriften, Jahresberichte, Sammelwerke, Lehrbücher und Vermischtes.

Nachrichtenblatt der deutschen malakozoologischen Gesellschaft,
redigirt von W. Kobelt. Jahrgang XX, Frankfurt a. M.

Malakozoologische Blätter, herausgegeben von S. Clessin. Neue
Folge Band X, Cassel.

Journal of Conchology. Established in 1874 as the Quarterly
Journal of Conchology. Conduct. by John W. Taylor. Vol. V, No. 9
bis 12. Leeds.

Conchologists Exchange I, II. Philadelphia.

Annales de la Société Royale Malacologique de Belgique. Tome
XXII (4. Sér., Tome II) année 1887. Bruxelles.

Procès verbaux des séances de la Société Royale Malacologique
de Belgique. Tome XVII Année 1888. Bruxelles.

Journal de Conchyliologie, herausgegeben von H. Crosse und
P. Fischer. Vol. 36 (3. Ser., Tome 28). Paris.

Bulletins de la Société Malacologique de France sous la direction
de C. F. Ancey, J. R. Bourguignat etc. Tome V. Paris.

Bullettino della società malacologica Italiana. Vol. XIII. Pisa.

Hoyle, W. E. Mollusca in: The Zoological Record for 1888. London 1889.

Schiemenz, P. Mollusca in: Zoologischer Jahresbericht für 1888. Herausgegeben von der zoolog. Station zu Neapel. Berlin 1890.

Collin, A. und Kobelt, W. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Malakologie während des Jahres 1887. Archiv für Naturgeschichte Jahrg. 1888 Band II. Berlin.

Kobelt, W. Iconographie der schalentragenden europäischen Meeresconchylien. 8. Heft, p. 1—16.

Derselbe. Rossmässlers Iconographie der europäischen Land- und Süsswasser-Mollusken. Neue Folge, Band III Lief. 5, 6 und Band IV Lief. 1, 2. Wiesbaden.

Martini-Chemnitz. Systematisches Conchylien-Cabinet herausgegeben von W. Kobelt. Lief. 356—367. 4°. Nürnberg

Tryon, G. W. Manual of Conchology structural and systematic with Illustrations of the Species. Vol. X Pt. 37—40. Second series: Pulmonata. Helicidae II, Part 13—16. Philadelphia.

Brühl, C. B. Zootomie aller Thierklassen für Lernende nach Autopsieen skizzirt. Schnecken-Anatomie 1. Heft mit 5 Taf. 4°. Wien.

Vogt, C. und E. Yung. Lehrbuch der praktischen vergleichenden Anatomie. Lief. 13—14. Mollusken p. 734—906 Fig. 337—425. Braunschweig.

Dieselben. Traité d'anatomie comparée pratique. Paris. Mollusca p. 724—897. Monographien von Anodonta anatina, Helix pomatia, Hyalaea tridentata und Sepia officinalis.

Graber, V. Leitfaden der Zoologie. Leipzig. 8°.

Rolleston, G. Forms of Animal Life. A. Manual of comparat. Anatomy with descriptions of selected Types. Second edition. Oxford 8°. Mollusca p. 107—138 und 448—499.

W. Marshall: Die Tiefsee und ihr Leben. Nach den neuesten Quellen gemeinfasslich dargestellt. Leipzig. Mollusken p. 283—296.

F. Richters: Die Tiefsee und ihr Leben. Zoolog. Garten 29. p. 333—341. Auszug des vorigen.

Arnold Lang: Ueber den Einfluss der festsitzenden Lebensweise auf die Thiere und über den Ursprung der ungeschlechtlichen Fortpflanzung durch Theilung und Knospung. Jena.

Die Mollusken sind an zahlreichen Stellen bei den Erörterungen über die Anpassung an festsitzende Lebensweise erwähnt.

Lobianco, Salv. Notizie biologiche riguardanti specialmente il periodo di maturità sessuale degli animali del golfo di Napoli. Mittheilungen aus der zoolog. Station zu Neapel Bd. 8. Mollusken p. 414—424.

Lacaze-Duthiers: Sur les avantages de l'emploi de la lumière électrique dans les observations de zoologie marine. Comptes rendus hebdom. des séances de l'Acad. des Sciences 107 p. 718—20.

Die Cephalopoden verlieren in den Aquarien allmählich ihre Reizbarkeit. Bei elektrischer Beleuchtung werden sie dunkler, ihre Hauttuberkeln, namentlich am Kopfe, deutlicher.

Suchetet, A. L'hybridité dans la nature. Rev. Quest. Sc. 24. Mollusken p. 178—80.

Verschiedene Mollusken.

Leydig: Altes und Neues über Zellen und Gewebe. Zool. Anzeiger No. 279 ff.

Leydig macht unter Anderem Angaben über histiologische Verhältnisse einiger Mollusken: p. 259 über Cuticularisirung des ganzen Zellkörpers der die Kiefer zusammensetzenden Zellen von Paludina, Ancyclus, Lymnaeus, p. 277 über Inhalt von Hautdrüsen, „Duft“ der Schalen, p. 278, 79 über Byssus, p. 314 über Struktur der Ganglien von Limax, doch beziehen sich diese Angaben nur auf frühere Untersuchungen des Verfassers.

Frenzel, J. Zum feineren Bau des Wimperapparates. Arch. mikr. Anat. 28 p. 53—80, 1886. Abbildungen von flimmernden Darmepithelzellen verschiedener Mollusken.

Chatin, J. Sur les myélocytes chez les Invertébrés. Mém. Soc. philom. Cent. p. 100—102. Bei Cephalopoden zeigt der Theil der Cerebralganglien, von welchem die höheren Sinnesnerven abgehen, eine Zusammensetzung aus kleinen Zellen, vermischt mit Myelocyten; diese haben einen sehr dünnen Protoplasmamantel um die grossen (9—15 μ) Kerne, gewöhnlich mit nur einem Fortsatze. Entsprechende Elemente wurden auch bei Pulmonaten und Cyclostomen beobachtet; dieselben fehlen in den Eingeweideganglien.

Fol, H. Sur la structure microscopique des muscles des Mollusques. Comptes rend. 106, p. 306—8, auch in Journ. Micr. 12, p. 91, 92. Ref.: Le Naturaliste 10, p. 63; Journ. R. M. S. 88, p. 199; Amer. Natur. 22, p. 356.

Gegen Blanchard und Paneth behauptet Fol, dass wahre Querstreifung der Muskelfasern bei Mollusken nicht vorkomme; die Herzmuskeln und Siphomuskeln der Cephalopoden, die Buccalmuskeln der Cephalophoren, die der Flossen von Ptero- und Heteropoden, ebenso die Schliessmuskeln der Lamellibranchier bestehen vielmehr aus glatten Fasern mit spiraligen Fibrillen. Diese Art von Fasern

ist bei Mollusken mindestens ebenso häufig wie die mit geraden Fibrillen (vgl. später).

Krukenberg, C. F. W. Fortgesetzte Untersuchungen zur vergleichenden Muskelphysiologie. Vergl. physiolog. Studien, II. Reihe 4. Abth. p. 143—71, 1887.

Krukenberg erhielt bei der Prüfung kalt bereiteter Extracte aus dem Muskelfleisch oder der Leber von Fischen und Wirbellosen, darunter *Eledone moschata*, *Doris tuberculata*, *Fissurella costaria*, auf Indol und Indican negative Resultate; dagegen zeigten die Auszüge der Leber und Venenanhänge von *Eledone* bei Zusatz von Nitroprussidnatrium typische Purpurfärbung. Der dieselbe verursachende Stoff war aber nicht festzustellen. — Ebenda p. 93, 94 Anm. Hautstücke und ein abgetrennter Arm von *Octopus* wurden in Wasser erwärmt; dabei zeigten die Chromatophoren mittlere Ausdehnung. Bei 41° C. trat der Tod ein.

Griffiths. Researches on the problematical organs of the Invertebrata — especially those of the Cephalopoda, Gasteropoda, Lamellibranchiata, Crustacea, Insecta and Oligochaeta. Proc. R. Soc. Edinburgh. 14. Ed. Nov. 86 bis Juli 87, p. 230 ff.

Die Nephridien der Cephalopoden sind echte Nieren, ihre Abscheidungen enthalten Harnsäure und Calciumphosphat. Aus den Excreten der Bojanusschen Organe von *Anodonta cygnea* wurde Harnsäure und Harnstoff gewonnen, von *Helix aspersa* und *Limax flavus* wurde die Nierennatur der Nephridien nachgewiesen; die von *Mya arenaria* enthielten Harnsäure, Harnstoff und etwas Calciumphosphat. Die Speicheldrüsen von *Helix aspersa* enthielten ein lösliches Ferment, das Stärke in Zucker umwandelt, sowie Calcium und Chlor, während Phosphate und Carbonate zu fehlen schienen; diese Drüsen sind in physiologischer Hinsicht denen höherer Thiere ähnlich. Die sog. Leber von Cephalopoden ist ein richtiges Pancreas, auch die von Gastropoden und Lamellibranchiern liefern pancreasähnliche Secrete.

Griffiths, Further researches on the physiology of the Invertebrata. Proc. R. Soc. London 44, p. 327, 28. Das Secret der Speicheldrüsen von *Sepia officinalis* enthält lösliches diastatisches Ferment, Mucin, Sulphocyanate und phosphorsauren Kalk, ganz ähnlich die Speicheldrüsen von *Patella vulgata*.

Mac Munn, C. A. Further observations on some of the applications of the spectroscope in Biology, with special reference to the presence of chlorophyll in animals. Proc. Birmingham. Soc. 5, 1887. Mollusken Taf. 9 Fig. 4.

Schiemenz, P. Ueber die Wasseraufnahme bei Lamellibranchiaten und Gastropoden (einschliesslich der Pteropoden). II. Mitth. zool. Stat. Neapel 7 p. 423—72 (s. Ber. f. 1887 p. 278).

Schiemenz macht zunächst einige Bemerkungen über die doppelte Niere einiger Prosobranchier und bestätigt das Vorhandensein eines Sphinkters im Fusse nicht nur bei Lamellibranchiern, sondern auch bei Gastropoden. Es folgt eine eingehende Be-

schreibung der Wassergefäße von *Natica*. Diese stehen mit dem Blute in keiner Verbindung, sondern sind gegen die Gewebe durch eine Grenzmembran abgeschlossen. Mehrere Längskanäle, die in einen Querkanal münden, durchziehen den Vorder- und Hinterfuss, sowie die der Schale aufliegenden Lappen. Sodann geht Verf. auf das Blutgefäßsystem des Fusses ein. Die Schwellung des letzteren wird durch Abschluss der Venen und Einpumpen von Blut in das Adernetz des Fusses hervorgebracht; indem die Muskeln auseinanderdrücken, strömt durch die Wasserspalte zwischen diese Meerwasser ein; nach Abschluss der Spalte wird der Verschluss der Vene aufgehoben, sodass das Blut in gewöhnlicher Weise circulieren kann. — Die meisten Mollusken, welche keine Venen, sondern nur Lacunen im Fusse haben, können keine Wassergefäße besitzen.

Fleischmann, A. Die Wasseraufnahme bei Mollusken. *Biolog. Centralblatt* 7, p. 713—17. Ausz.: *J. R. M. S.* 88, p. 563.

Bericht über Schiemenz' Arbeit über die Schwellung des Fusses von *Natica* mit einigen Bemerkungen über die Schwellung bei *Lamellibranchiern* (gegen Roule).

Lankester, E. Ray. The coelum and the vascular system of *Mollusca* and *Arthropoda*. *Nature* Vol. 37, p. 498. Ausz.: *Journ. R. Micr. Soc.* 1888 p. 395, 96.

Das Blutgefäßsystem der Mollusken ist nicht ein Coelom, es wird als Haemocoel bezeichnet; das Coelom wird hauptsächlich durch das Pericard dargestellt, das ursprünglich mit der Höhle der Keimdrüse zusammenhing. Lankester nimmt an, dass das Haemocoel ursprünglich mehr röhrenförmig war und aus richtigen Gefäßen bestand, während das Coelom grössere Dimensionen zeigte als bei den später lebenden Mollusken.

Kalide, G. Beitrag zur Kenntniss der Muskulatur der Heteropoden und Pteropoden, zugleich ein Beitrag zur Morphologie des Molluskenfusses. *Zeitschr. f. wiss. Zool.* 46, p. 337—77. Sep. Inaug.-Diss. Ausz.: *Journ. R. Micr. Soc.* 88, p. 560, 61.

Kalide beschreibt die Muskulatur von *Pterotrachea* und *Carinaria*. Dieselbe besteht aus zwei über einander gelegenen Schichten, welche sich in den Rüssel, den Eingeweidessack und den Schwanztheil in Längsrichtung fortsetzt, während eine äussere Ringmuskelschicht bald mehr bald weniger entwickelt ist. Die Muskulatur der Flosse ist von der des Körpers ganz getrennt und steht zum Spindelmuskel in enger Beziehung. Bei *Carinaria* sind die einzelnen Bänder meist getrennt, bei *Pterotrachea* mehr in Bündeln, namentlich 2 dorsalen und 2 ventralen Längszügen, vereinigt. Sodann wird die Muskulatur von Pteropoden beschrieben, im Ganzen übereinstimmend mit den älteren Angaben Eschrichts. Die Muskulatur der Flossen ist sehr ähnlich wie bei Heteropoden und ganz von der Leibesmuskulatur getrennt, steht aber mit dem Spindelmuskel in Zusammenhang. Indem Kalide die Flossenmuskulatur von Heteropoden und Pteropoden vergleicht, kommt er zu dem Schlusse, dass

die Flossen beider Gruppen homolog sind. Dem Protopodium der Gastropoden soll nur der Schwanztheil der Heteropoden und der zipfelförmige Theil der Pteropoden homolog sein, während die Flossen als Hervorsprossung des Spindelmuskels entstanden sind unter Durchbrechung der Körperwand, von der nur die Epidermis und die gallertige Cuticula sich auf das neue Gebilde fortsetzen. — In einem Nachtrage wird Grobbens Homologisirung — der Saugnapf der Heteropoden entspr. der Kriechsohle von Gastropoden (s. später) — theilweise anerkannt.

Kalide, G. Vorläufige Mittheilungen über Studien am Gastropoden- und am Pectenauge. Zool. Anz. p. 679—83 und 698—703. Ausz.: Journ. B. Micr. Soc. 1889 p. 38, 39.

Die Retinazellen sind fast durchweg mehr oder weniger pigmentirt, die keulenförmigen Pigmentzellen sitzen mittels eines fadenförmigen Stiels der Basalmembran auf. Die Stäbchen, welche von den Retinazellen ausgehen, sind am inneren Ende abgerundete, polygonale Säulen von einer wasserhellen, zähflüssigen, mit Pigmentkörnchen untermischten Substanz, in deren Centrum eine Nervenfaser verläuft. Zwischen den Epithelzellen sind sternförmige Zellen eingeschaltet, deren Fortsätze jene umspinnen; mit diesen Elementen hängen Fasern mit eingestreuten Kernen zusammen, welche den Glaskörper sowie die Linse durchziehen, daher sind diese Gebilde bindegewebiger Natur. In ähnlicher Weise wurde auch am Fühler von Tritonium ein Netzwerk zwischen den Epithelzellen beobachtet, das bis in die Cuticula reicht, in welcher zahlreiche Kerne wahrgenommen wurden. Die Augen der Heteropoden und Pectiniden zeigen entsprechende Verhältnisse, nur ist bei den letzteren wegen der vor der Augenblase aufgetretenen Linse die Retina an der Vorderseite des Auges entwickelt.

Beard, J. Morphological Studies. — 1. The parietal eye of the Cyclostome fishes. Quart. Journ. Micr. Sc. II 29. p. 68. Beard hat die Augen von Onchidium untersucht und bestätigt Sempers Angabe, dass dieselben nach dem Vertebratentypus gebaut sind.

Der Nerv ist doppelt und tritt an 2 Stellen zum Auge. Beard glaubt, dass ursprünglich wie beim Pecten-Auge der Nerv an der Vorderwand ins Auge getreten und dass die Durchbohrung der Hinterwand erst später durch Abkürzung des Verlaufes zu Stande gekommen sei.

Pelseneer, P. Report on the anatomy of the deep-sea Mollusca collected by H. M. S. Challenger during the years 1873—76. Ausz.: J. R. M. S. 89. p. 369.

Pelseneer beschreibt zunächst einige Eigenthümlichkeiten von Tiefseegastropoden und Muscheln, so die rudimentären Augen von Guivillea, die Lippententakel von Trochus infundibulum Watson etc. Sodann wird die Frage erörtert, ob das Rudimentärwerden der Augen für die Tiefseeschnecken charakteristisch sei; diese Frage wird im Ganzen verneint, weil einerseits gewisse dieser Thiere völlig

ausgebildete Augen besitzen, andererseits bei anderen Schnecken gleichfalls rudimentäre oder fehlende Augen bekannt sind (*Ianthina* etc.), wenn auch nicht gelehrt werden kann, dass die Augen stark zum Atrophieren neigen. Kiemen sind öfters rückgebildet (*Poromyidae*, *Cuspidariidae*, *Cryptodon*) oder auf einem niederen Zustande stehen geblieben (*Malletia*). Pelseneer hat die Kiemen der Muscheln vergleichend untersucht und basirt auf ihre Verhältnisse einen Stammbaum, welcher mit *Malletia*, der sich *Nucula* zunächst anschliesst, beginnt.

Pelseneer, P. Sur la valeur morphologique de l'épipodium des gastropodes rhipidoglosses (*Streptoneura aspidobranchia*). Bull. scientif. France Belg. III 1. p. 107—9. Vorl. Mitth. z. Folgenden.

Pelseneer. Sur l'épipodium des Mollusques. *ibid.* p. 182—200.

Die Pedalstränge von *Haliotis*, *Fissurella* und *Trochus* sind zwar mit einer lateralen Furche versehen, aber nicht in zwei getrennte Theile gespalten, wie Lacaze-Duthiers behauptet hat; daraus glaubt Pelseneer schliessen zu dürfen, dass das Epipodium zum Fusse gehört. Eine homologe Bildung findet sich auch bei *Ianthina* und *Litiopa*, sowie einer grossen Zahl von Rissoiden; bei *Ianthina* wird dieselbe von den Pedalganglien innervirt. Was Fischer bei *Hipponyx* für ein Epipodium gehalten hat, ist vielmehr der eigentliche Fuss, dessen Ränder mit denen des Mantels verwachsen sind. Bei einigen niederen Tanioglossen (*Lacuna*, *Fossarus*, *Paludina*, *Ampullaria*, *Calyptraea*, *Narica*) finden sich auch Reste des Epipodiums erhalten, namentlich sind es die sog. Cervicallappen, die allerdings von den Pleuralganglien (*Ampullaria*) innervirt werden, woraus jedoch nicht geschlossen werden darf, dass sie zum Mantel gehören (Bouvier).

Sodann wird der Trichter der Cephalopoden als Homologon des Epipodiums angesehen, indem Pelseneer die Umgebung des Mundes für die Ventralseite und die Fläche, welche Trichter und Enddarm trägt, für die Hinterseite nimmt; es sollen dann die Pedalganglien der Cephalopoden der oberen Hälfte der Pedalstränge von Rhipidoglossen, die Brachialganglien der unteren Hälfte der letzteren, d. h. den eigentlichen Pedalganglien entsprechen.

Pelseneer. Sur le pied et la position systématique des Pteropodes. *Mém. Soc. R. Malacol. Belg.* 23. 7 pp. Die Flossen der Pteropoden entsprechen vollkommen den „Parapodien“ von Tectibranchiern (vgl. Kalide), keineswegs einem Epipodium (Grobben). Bei *Pectunculus* will Pelseneer eine Falte gefunden haben, welche dem Epipodium homolog sein soll (Ref. bestreitet das Vorhandensein einer solchen). Gegen v. Jhering hebt Pelseneer das Vorhandensein von Pleuropedalconnectiven bei Cephalopoden hervor.

Jhering, H. v. Die Stellung der Pteropoden. *Nachrbl. mal. Ges.* 20. p. 30—32.

Enthält nichts Neues von Bedeutung.

Agassiz, A. The cruises of the Un. St. coast and geodetic survey steamer „Blake“. Bull. Mus. Harv. Coll. 14, 15. Mollusken 15, p. 58—75. Allgemeines über Tiefseemollusken.

Call, R. Ellsworth. Sixth Contribution to a Knowledge of the Fresh-water Mollusca of Kansas. Bull. Washb. Coll. Labor. Nat. Hist. 2, No. 8 p. 11—25, 1887. Ausser faunistischen Angaben Notiz über die zur Bruttasche umgebildete Kieme von *Unio aberti* Conr. (vgl. vor. Ber. p. 277).

Locard, Arn. Histoire des Mollusques dans l'antiquité. Mém. Acad. Sc. Lyon 1885 vol. 27. p. 75—312. Ref. von W. Stricker. Zool. Garten 29. p. 329—33.

Beauchamp, W. M. Erosion of Freshwater Shells. Conchol. Exch. 1 p. 49.

Ford, J. Some Remarks on the Migration of Mollusks. ibid 2. p. 71, 72.

Jackson, R. T. Catching fixed forms of animal life on transparent media for study. Scienze 11. p. 230. Bericht über Versuche, junge Thiere (*Ostrea*, *Anomia*, *Crepidula* etc.) aus dem Meere zur Beobachtung auf Glasstücken festgeheftet und in möglichst reinem Zustande zu erhalten.

Jukes-Browne, A. J. Rock-boring Mollusca: a subject for leaside Study. Life Lore I. p. 34—35 und 53—55.

Amphicura.

A. A. W. Hubrecht: *Dondersia festiva*, gen. et sp. nov. Feestbundel aan Donders door het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, p. 324—339.

Das aus Neapel stammende Thier hat eine Länge von 10 mm, eine Breite von ungefähr 1 mm; es zeigt eine violette Färbung mit einem Silberglanz. Ähnlich wie bei *Proneomenia* ist eine ventrale Furche vorhanden, mit einer längsverlaufenden Falte darin, und am Vorderende derselben eine Drüse. Die Spicula haben verschiedene Form: die einen sind an dem Ende, mit welchem sie nach aussen gerichtet sind, stark verbreitert, die anderen nadelförmig, oft etwas gebogen; in der Mundspalte und an der ventralen Furche sind die Spicula merklich grösser. Der Enddarm ist im dorsalen Theile bewimpert, seine ventrale Wandung stark verdickt; der Mitteldarm zeigt seitliche Ausbuchtungen und in der dorsalen Medianlinie starke Cilien, vorn entsendet er einen dorsalen Blindsack.

In den Vorderdarm münden zwei Speicheldrüsen durch einen gemeinsamen Gang aus, die Radula kommt in der ventralen Darmwand zum Vorschein. (Hubrecht hat auch bei *Chaetoderma* eine äusserst kleine Radula wahrgenommen). Vorn findet sich eine dorsomediane zweilappige Drüse, und ausserdem wurden noch andere Buccaldrüsen beobachtet. Das Nervensystem ist ähnlich wie bei

Proneomenia, doch zeigen die Pedalstränge deutliche Anschwellungen, von denen die Commissuren abgehn. Das Circulationssystem besteht aus einem ventralen und einem dorsalen Stamme; das Herz, vom Pericard umgeben, bildet einen dickwandigen Theil des letzteren; zwei Erweiterungen werden als Vorhöfe angesehen. Die zwittrige Keimdrüse ist ein langgestreckter paariger Sack, hinten mit Oeffnungen ins Pericardium; in diesem wurden Eier angetroffen.

Aus dem Pericard führen zwei nach vorn gerichtete und mit je einem gebogenen, nach vorn gerichteten Blindsack versehene Gänge in einen grossen, nach vorn zweitheiligen Raum, der in die Kloake mündet; in diesen Raum führen auch die stark bewimperten Ausführungsgänge zweier Blasen, die mit hohem Epithel bekleidet sind.

In die Kloake öffnet sich eine dreilappige (*Byssus*?) Drüse.

Marion u. Kowalevsky: Sur les espèces de *Proneomenia* des côtes de Provence. Comptes rend. hebdomadaires. Ac. Sc. Paris. T. 106 p. 529—32.

Die Arten der Gattung, welche an den Küsten der Provence gefunden wurden, sind klein, kaum 15 mm lang. Es wurden 4 Arten beobachtet, *Proneomenia vagans* auf Rhizomen von *Posidonia caulini*, in 25—30 m Tiefe, *Pron. desiderata* (ohne Analröhren) von demselben Fundorte, *Pron. aglaopheniae* auf *Aglaophenia myriophyllum* aus 70—100 m Tiefe; ein Exemplar von *Pron. gorgonophila* wurde an der algerischen Küste auf einer *Muricea* gefunden. Ihre Bekleidung besteht aus einer dicken cuticularen Schicht, welche die Spicula enthält, während von der Hypodermis mehrzellige Fortsätze in sie eindringen, welche drüsiger Natur zu sein scheinen, mit der Erzeugung der Spicula indessen nichts zu thun haben; die letzteren wurden in jungem Zustande in Berührung mit der eigentlichen Hypodermis gesehen.

Eine weite Buccalhöhle mit epithelialen Papillen, durch Muskeln an der Dorsalwand befestigt, bildet den Anfang des Verdauungstractes; weiter verengert sich der Pharynx; durch eine muskulöse Verdickung wird der Theil abgegrenzt, in welchem die Radula auf einem hyalinen knorpligen Stück liegt; die Radulascheide ist klein, die Zähne sehr stark. Ueber den Cerebralganglien zieht ein Blindsack nach vorn. Hinter diesen Ganglien liegt eine Masse von grossen Zellen; die mit der vorderen Fussdrüse zusammenzuhängen scheinen. Die Blindsäcke des Darmes sind gross und regelmässig, durch Muskelzüge getrennt; im Enddarm flimmert das Epithel. Die Nephridien münden in die Kloake; *Pron. vagans* hat zwei starke Analtuben (Copulationsorgane). Das Herz besteht aus zwei hinter einander gelegenen Taschen im Pericardium; in diesem wurden reife Eier gefunden. Das Nervensystem enthält je zwei Cerebral-, Buccal-, vordere und hintere Pedalganglien und unter dem Pericard ein hinteres Ganglion, zu welchem die Lateralstränge ziehen. Die Commissuren sind ähnlich wie bei *Proneomenia Sluiteri*.

Garnault: Recherches sur la structure et le développement de l'oeuf et de son follicule chez les Chitonides. Arch. Zool. exp. et gén. II 6, p. 83—116. Ausz.: Journ. R. Micr. Soc. 1888 p. 933.

Die Eier entwickeln sich im Epithel des Eierstockes und sind anfangs von den umgebenden Zellen wenig verschieden; diese bilden um jedes Ei einen Follikel. Dass die Kerne des letzteren aus den Chromatintheilen des Eies entstehen, ist unrichtig. Der Nucleolus enthält zuerst mehrere Chromatinkörper, später ist er gleichmässig gefärbt. In gewissen Stadien zeigen die Eier starke Vorbuchtungen (amöboide Fortsätze), und zwar so, dass jede an ihrem Ende den Kern einer Follikelzelle trägt. Später ziehen sich diese Fortsätze zurück, wodurch die folliculäre Hülle faltig wird.

Scaphopoda.

Plate: Bemerkungen zur Organisation der Dentalien. Zoolog. Anzeiger p. 509—15. Ausz.: Journ. R. Micr. Soc. 1888 p. 933—35.

Am vorderen Mantelrande sind 2 Arten von Drüsen in einem gallertigen Bindegewebe gelegen. Neben den Cerebralganglien liegen gesonderte Pleuralganglien, mit den Pedalganglien durch Connective verbunden, die sich bald mit den Cerebropedalconnectiven vereinigen. Die Ganglienzellen sind meist multipolar. Der Tentakelapparat soll aus eigentlichen und rudimentären Tentakeln bestehen; die ersteren sollen am Ende, in der Nähe eines Ganglions, eigenthümliche grosse Sinneszellen enthalten. Die Nieren entbehren einer inneren Oeffnung, hinten hängen sie unter einander zusammen. Die Keimdrüse hat keinen Ausführungsgang, sondern entleert sich durch Platzen der Wandung in die rechte Niere. Bluträume mit eigener Wandung sollen fehlen. Die neben dem After gelegenen Oeffnungen sind wirklich vorhanden. Am nächsten verwandt sind die Dentalien mit den Gastropoden.

Cephalopoda.

Lendenfeld, R. von. Bemerkungen zu Riefstahls Wachstumstheorie der Cephalopodenschalen. Zoolog. Jahrb. Systemat. 3. p. 317, 18.

Verf. hat sich überzeugt, dass gegen Riefstahls Annahme bei jungen Schalen von Nautilus die letzte Kammer nicht kleiner ist als die vorhergehende. Bei grossen Thieren sind die letzten Septen oft einander mehr genähert als die früheren, weil ihr Wachstum überhaupt geringer geworden ist. Eine Intussusception braucht man nicht anzunehmen.

Bather, F. A. Shell-growth in Cephalopoda (Siphonopoda). Ann. Mag. nat. hist. VI, 1. p. 298—310. Ausz.: Journ. R. Micr. Soc. 1888, p. 397.

Die dorsal von der Schale gelegenen Zellen des secernirenden Epithels von *Sepia* sind deutlich, dagegen ist ventral nur eine Schicht langgestreckter Kerne in einem Syncytium wahrzunehmen; dieselben rufen den Eindruck hervor, als stammten sie aus dem darunter befindlichen Bindegewebe. Die äusserste Lage dieses Zellstratum scheint zu verwachsen und als Chitinmembran abgestossen zu werden; eine Intussusception der Schale findet nicht statt. Bei allen Cephalopoden werden zuerst Chitinmembranen abgeschieden; diese bilden ein Gerüstwerk, in welchem Kalk abgelagert werden kann, und von dessen Anordnung die Schalenstructur abhängt. Die Membranen des äusseren Theiles, welche durch die Mantellappen secernirt werden und welche den Kalk als Calcit enthalten, sind von den inneren, die durch den Eingeweidehöcker abgeschieden werden und auf welchen der Kalk als Aragonit niedergeschlagen wird, verschieden. Die Secretion an der Innenseite beginnt vorn und schreitet nach hinten vor; die Membranen der Septen hängen mit denen der Schalenwand zusammen, und jede vollständige Membran ist trichterförmig.

Blake, J. F. Remarks on Shell-growth in Cephalopoda. Ann. Mag. nat. hist. VI, 1. p. 376—80. Ausz.: Journ. R. Micr. Soc. 1888, p. 559.

Blake, der schon früher die Structur der Nautilus-Schale beschrieben, bestreitet, dass die inneren Lagen der Sepienschale den Septen von Nautilus entsprechen, da dort keine Durchbohrung, kein Siphon und keine Protoconcha vorhanden sei; dieselben entsprechen vielmehr der mittleren Perlmutter-schicht der Nautilus-Schale.

Bather: Professor Blake and Shell-growth in Cephalopoda. Ann. Mag. nat. hist. VI, 1. p. 421—27. B. behauptet gegen Blake den organischen Zusammenhang zwischen Septum und Schale und hält an seiner früheren Auffassung bezügl. der Homologisirung der Schalentheile von Nautilus und *Sepia* fest, da die von Blake angegebenen Unterschiede nicht stichhaltig seien.

Brooks, H. Preliminary remarks on the structure of the siphon and funnel of *Nautilus pompilius*. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 23. p. 380—82.

Der Trichter der Nautilus-Schale besteht aus mehreren Lagen von verschiedenartigem Bau. Die Scheide enthält grosse Kalkspicula, welche aus kleinen Nadelchen zusammengesetzt sind, und welche locker zusammenschliessen, sodass sie Poren zwischen sich freilassen. Die älteren Trichter bestehen aus 5 übereinander gelegenen Schichten, von denen die äussersten zum hinteren, die inneren zum vorderen Trichter gehören.

Hyatt, A. Values in classification of the stages of growth and decline, with propositions for a new nomenclature. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 23. p. 396—407 und Amer. Natur. 22, p. 872—84.

Die Protoconcha der Cephalopodenembryonen ist nicht völlig den Schalen anderer Mollusken äquivalent. Bei fossilen Nautiloiden scheint dieselbe hornig gewesen zu sein; sie mag vorsilurisch ihr Äquivalent bei erwachsenen Thieren gehabt haben, von denen sie auf die Cephalopoden sowie die Pteropoden, die eine ähnliche Protoconcha haben, übergegangen ist. Mit der Entstehung der ersten Wohnkammer entsteht die Asiphonula, ein „silphologisches“ Stadium, welches einige Characteristica des Veligerstadium und der Scaphopoden zeigt. Die weiteren Stadien mit einem Septum und mit zwei solchen werden Caecosiphonula und Macrosiphonula genannt. Bei Ammoniten und Belemniten ist die Caecosiphonula an die Stelle der Asiphonula getreten. Nach der Bildung des dritten Septums und eines engeren Trichters begann das Microsiphonulastadium. Eine entsprechende Gestaltung haben die fossilen Formen erworben, und sie ging dann allmählich auf die silphologischen Stadien über. Die Beziehung der erwachsenen Thiere wird als Ephebologie, die von aberranten und degenerirenden Formen als Geratologie bezeichnet; in dieser wird noch ein früheres Stadium (Clinologie) von dem letzten (Nostologie) auseinandergehalten.

Laurie, Malcolm. The organ of Verrill in Loligo. Quart. Journ. Micr. Sc. II, 29. p. 97—99. Ausz.: Journ. R. Micr. Soc. 1888 p. 932.

Bei jungen, etwa 6 mm langen Individuen von Loligo ist das Verrillsche Organ vorhanden und besteht, ähnlich wie es durch Verrill bei Desmoteuthis beschrieben ist, aus einem medianen Theile, der an der oberen Wand des Siphos liegt und der vorn eine Papille trägt, während er nach hinten in 2 Fortsätze ausläuft, und aus 2 lateralen Theilen, welche in der unteren Wand des Siphos gelegen sind. Dieses Organ producirt mukösen Schleim. Ausser demselben ist eine gut entwickelte Klappe vorhanden. Bei erwachsenen Exemplaren soll das Organ fehlen. Bei 8 mm langen Thieren von Ommastrephes wurde es auch gefunden, nicht bei den erwachsenen. Verrills Annahme, dass der dorsale Theil dem Fusse der Gastropoden entspricht, ist nicht genügend begründet.

Brock, J. Ueber das sogenannte Verrill'sche Organ der Cephalopoden. Nachr. Koen. Ges. d. Wissensch. z. Göttingen. 1888, p. 476—78.

Brock zeigt, dass bereits 1853 von Heinr. Müller das Trichterorgan, welches Verrill angeblich neu entdeckt hat, beschrieben worden ist. Lauries Angabe, dass es bei dem erwachsenen Loligo fehle, ist unrichtig und dadurch zu erklären, dass es durch die Conservirung leicht zerstört wird. Es kommt wahrscheinlich allen Cephalopoden zu. H. Müller hatte in ihnen den Nessel-fäden ähnliche Körper gefunden; Lauries Ansicht von der Schleimnatur des

Secretes mag dadurch zu erklären sein, dass die Zellen durch die Conservirung verändert worden sind.

Joubin, L. Recherches sur les glandes salivaires des Céphalopodes. Assoc. franç. pour l'avanc. des sciences. Compte rendu 16. sess. 1887. p. 258—59.

Das obere Paar von Speicheldrüsen ist ebenso wie die Sublingualdrüse nicht nur bei Octopoden, sondern auch bei Decapoden vorhanden. Die Abdominaldrüse der Octopoden zeigt tubulösen Bau und ist muköser Natur. Das Blut gelangt von den Drüsen bei Octopoden durch zahlreiche Oeffnungen in den Perivisceralsinus, während es bei Decapoden durch ein Venennetz gesammelt wird. J. hat auch die Entwicklung der Speicheldrüsen untersucht.

Carrieu. Note sur le développement des cellules ramifiées du cartilage des Céphalopodes et de leur rapports avec certains éléments des chondromes. Comptes rend. Soc. Biol. VIII 5 p. 181—88.

Die Knorpelzellen der Cephalopoden entwickeln sich aus eckigen, unregelmässig geformten Elementen durch Verlängerung und Verzweigung der Fortsätze, die mit einander Anastomosen bilden.

Pelseneer, P. Sur la valeur morphologique des bras et la composition du système nerveux central des Céphalopodes. Archives de Biologie 8 p. 723—56.

Die Brachialganglien der Cephalopoden sind bei den älteren Formen vollkommen mit den Pedalganglien vereinigt und trennen sich von diesen erst allmählich. Die Connective zu den Cerebralganglien sind secundär entstanden und sie beweisen nicht, dass die Brachialganglien ursprünglich ein Theil der Cerebralganglien waren; auch die über dem Schlunde gelegene Commissur ist von geringer morphologischer Bedeutung, sie ist mit dem Zusammenwachsen der Arme über dem Kopfe entstanden und sie spricht ebensowenig für eine ursprünglich dorsale Lage der Brachialganglien wie die untere Schlundcommissur vieler Gastropoden ein Beweis dafür ist, dass die Cerebralganglien ursprünglich unter dem Schlunde lagen. Aus diesen Gründen stellen die Arme ein Aequivalent eines Fusstheiles von Gastropoden dar, und zwar glaubt Pelseneer, dass sie fast dem ganzen Fusse zu homologisiren sind, während der Trichter dem Epipodium von Rhipidoglossen entspricht. Auch ontogenetisch liegen die Arme ursprünglich hinter und neben dem Munde, über dem sie sich erst später vereinigen, und die Brachialganglien trennen sich von den Pedalganglien, ähnlich wie die oberen Buccalganglien von den Cerebralganglien. Endlich giebt Pelseneer eine Beschreibung der Ganglienmasse von Octopus, hauptsächlich bezüglich der Pleuralganglien, welche deutlich von den Visceralganglien getrennt sind; von den „vorderen Visceralganglien“ gehen die Mantelnerven, von den hinteren die Eingeweidennerven ab. Durch Connective sind die Pleuralganglien mit allen anderen Ganglien, auch den Brachialganglien, verbunden (vgl. p. 384).

Bather, F. A. Pre-cambrian Cephalopods: an essay in reconstructive palaeontology. (Discuss, von Blake, Woodward, Gregory, Hardy). Proc. Metrop. Sc. Assoc. London Nr. 30.

Der Urcephalode mag einen gelappten, mit Tentakeln besetzten Ring um den Mund gehabt haben, der von den Cerebralganglien innervirt wurde und zum Kriechen diente, während der Trichter aus 2 Lappen gebildet wurde. Genital- und Nierenöffnungen paarig, 2 Vorhöfe am Herzen und 2 Kiemen mit Spengel'schen Organen in der noch unvollkommen abgeschlossenen Mantelhöhle. Der dorsale nach hinten verlängerte Visceralsack war von einer konischen Schale bedeckt mit schwach entwickelten Septen; in dem weiten Siphon lagen noch Eingeweide.

Weiss, F. E. On some Oigopsid Cuttle Fishes. Quart. Journ. Micr. Sc. II 29. p. 75—96. Aus den Beschreibungen sei Folgendes hervorgehoben. *Chroteuthis Veranyi* d'Orb. zeigt zwischen den Augen und dem Trichter zwei gestielte Geruchsorgane. Der kurze Tintenbeutel trägt auf seiner Oberfläche zwei accessorische Nidamentaldrüsen. Zwei Renalpapillen sind stark entwickelt. Die Oviducte haben in der Mitte eine Drüse und münden mit kleinen Oeffnungen in die Leibeshöhle; der rechte Oviduct ist vorhanden (gegen Brock). Weiter hinten liegen 2 lange und schmale Nidamentaldrüsen (gegen Brocks Angabe, das sie fehlen). Der Mantelnerv entspringt aus dem Ganglion stellatum. *Doratopsis vermicularis* de Rochebrune. *Vérany's* Abbildungen sind nicht genau. Das 4. Armpaar ist bedeutend länger als die 3 anderen mit nur einer Reihe von Saugnapfen besetzt (gegen Pfeffer). Die Geruchsorgane haben kurze Stiele. Die durchscheinende Nackenregion sieht wie segmentirt aus. Im Nacken liegt eine schmale Knorpelplatte. Der Trichter ist mit einer Klappe und 2 drüsigen Wülsten (*Verrill's* Organ) versehen. Renalpapillen sehr kurz. Die Genitalorgane des untersuchten Thieres waren erst wenig entwickelt. Der hintere dünne Theil zeigt mehrere vermuthlich drüsige Anschwellungen. — *Histoteuthis Rüppelli* *Vérany*. Beschreibung der Arme mit ihren Saugnapfen. Die Geruchsorgane haben die Form von Lappchen. Der Siphon zeigt eine starke Klappe, die Kiemen sind mächtig entwickelt; zwischen ihnen liegen die Nidamentaldrüsen. Die Eileiter haben terminale Drüsen, ferner eine Drüse, welche der Nidamentaldrüse ähnlich gebaut ist, und sind auch im Anfange drüsig. Die Nierenkammer ist lang, durch sehr deutliche membranöse Trichter mit der Leibeshöhle verbunden. — *Tracheloteuthis Behnii* Steenstrup. Die Gattung ist wahrscheinlich identisch mit *Verrilliola*. Das zweite Armpaar ist am längsten; die Keule der Tentakelarme trägt eine laterale Falte und am Ende 4 Reihen grösserer Saugnapfe, welche proximal kleiner und zahlreicher werden. Geruchsorgane ähnlich wie bei *Sepiolo*. Im Trichter findet sich eine kleine Klappe und das *Verrill'sche* Organ. Die Kiemen sind dünn und mit wenigen Blättchen versehen. — *Verania sicula* Krohn. Die Tentakelarme

sind sehr schwach entwickelt, mit wenigen Saugnäpfen, die Geruchsorgane klein. Kurze Beschreibung des Epithels und vergleichende Angaben über die Geruchsorgane der Cephalopoden; aus ähnlichen Verhältnissen wie bei *Verania* haben sich einerseits die tentakelartigen Organe von *Chiroteuthis*, andererseits die Einstülpungen von *Sepia* und *Octopus* entwickelt. — Weiss will Steenstrups Familie *Taonoteuthidae* nicht annehmen, sondern die *Chiroteuthidae* neben den *Thysanoteuthidae*, *Ommastrephidae* und *Mastigoteuthidae* als Unterfamilie der *Ommastrephini* ansehen.

Orthmann, A. Japanische Cephalopoden. Zool. Jahrb. Syst. 3. p. 639—70.

Beschreibung und Abbildung japanischer Cephalopoden, darunter 9 neue Arten.

Robson, C. W. On a new species of giant cuttlefish, stranded at cape Campbell, June 30. 1886. (*Architeuthis Kirkii*). Trans. N. Zeal. Inst. Wellington 1887, 19. p. 155—57.

Beschreibung eines riesigen Decapoden, der gestrandet war, derselbe hatte eine Länge von 29 Fuss. Robson vermuthet, dass alle gestrandete Cephalopoden Decapoden sind, weil diese nicht im Stande sind, ins Wasser zurückzukriechen.

Kirk, T. W. Brief description of a new species of large Decapod (*Architeuthis longimanus*). Trans. N. Zeal. Inst. Wellington 20. p. 34—39.

Beschreibung eines mit den Armen 57 englische Fuss langen Decapoden; Abbildungen der Saugnäpfe, Mundtheile u. dergl.

Anonymus. Ueber riesenhafte Tintenfische. Naturforscher 21. p. 231—33. Ausz.: J. R. Micr. S. 88, p. 930.

Varigny, H. de. Contribution à l'étude de l'influence exercée par l'ergotine sur les fibres musculaires lisses. Mem. Accad. Bologna IV 8. p. 105—6.

Ergotin wirkt auf die Muskeln des Kropfes von *Eledone* stimulirend.

Hoyle, W. E. Note on the Hectocotyliation of the Cephalopoda. Rep. 57. Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. 1887. p. 768—69. Ein weibliches Exemplar von *Rossia oweni* zeigte eine Anzahl von Spermatophoren unter dem linken Auge befestigt; dieselben waren etwa 5 mm lang, mit dem verdickten Theile, der einen eigenthümlichen Klappenapparat zeigte, in die Haut eingesenkt; der Samen muss daher aus dem dünnen Ende hervordringen, um die Eier während der Ablage zu befruchten.

Sabatier, A. Sur les formes de spermatozoides de l'*Éledone* musquée. Comptes rend. 106. p. 954—56. Ref. Le Naturaliste 10. p. 111. Journ. R. M. Soc. 1888, p. 560.

Es sind bei *Eledone* zwei Formen von Spermatozoen vorhanden, die einen mit einem spiraligen Kopfe, die anderen mit einem geraden Faden; beide haben sehr lange Schwänze. Ihre Entwicklung ist verschieden; die Köpfe der ersteren entstehen durch Streckung aus

dem Chromatin des Kernes, das sich in der Mitte verdichtet, die letzteren in der Peripherie an der Kernmembran, wo sie sich aufrollen. Erst später werden sie frei und strecken sich gerade, Sabatier hat grosse Köpfe mit 3—4 Schwänzen gefunden, welche den wurmförmigen Spermatozoen von *Paludina* sehr ähnlich sind, und glaubt daher, dass diese letzteren Cermen von Spermatozoen darstellen.

Joubin, L. Sur la ponte de l'Élédone et de la Sèche. Arch. zool. exp. et gén. II 6. p. 155—63. Die Thiere konnten bei der Eiablage beobachtet werden. Elédone legt die weissen Eier, etwa 15, in kleinen Trauben ab, welche an einen festen Körper angeheftet werden, was durch die kleinen Saugnäpfe am Grunde der Arme bewirkt wird. *Sepia* legt die Eier, welche von schwarzer Farbe sind, in grösseren Häufchen ab, die Spitzen der Arme heften sie fest. Bei Reizung verliess das Thier nicht die Stelle, an welcher es mit dem Ablegen beschäftigt war.

Vialleton, L. Recherches sur les premières phases du développement de la seiche. Ann. Sc. nat. Zool. VII 6. p. 165—280. Ausz.: Arch. Zool. exp. et gén. II 6 und Journ. R. M. S. 89, p. 370 bis 71. Nach Angaben über Präparationsmethoden berichtet Verf. zunächst über die Eier vor der Ablage. Sie zeigen ursprünglich deutliche Kerne und sind von abgeplatteten Zellen umgeben, welche einen Follikel bilden. Dieser besteht weiterhin aus einer inneren epithelialen und einer äusseren bindegewebigen Lage; die erstere bildet Falten und scheidet Nahrungsdotter ab, der das Eiplasma nach dem spitzen Pol hindrängt. Während das Ei wächst, theilen sich die Chromatinkörper des Kernes, welcher sich rasch vergrössert und nur noch feine Körnchen enthält. Nachdem die Follikelzellen noch eine Schutzmembran (Chorion) erzeugt, verschwindet die Keimblase und die Chromatinkörper ordnen sich zu einer Theilungsfigur an. Jetzt wird das Ei frei. Die Bildung von Richtungskörpern wurde nicht beobachtet. — Die Befruchtung erfolgt nach der Ablage, und dann werden die Eier an feste Körper angeheftet. Soeben gelegte Eier zeigen die Richtungskörper und die beiden Vorkerne, die gegen einander rücken. Diese haben nur feine Hüllen von Chromatin, der kleinere von ihnen liegt immer den Richtungskörpern zunächst; im Zusammenrücken vergrössern sie sich. Sie verschmelzen dann zum ersten Theilungskern. — Das Protoplasma bildet eine Keimscheibe, an deren Rande die zwei Polkörper liegen. Die erste Furche, welche zur Axe des Blastoderms wird, ist meridian und theilt die Keimscheibe in 2 gleiche Theile, darauf folgen zwei weitere meridiane Furchen symmetrisch zur ersten. Die dadurch entstandenen 8 ungleichen Stücke werden als Macromeren bezeichnet. Die 6 grösseren Theile zerfallen durch meridiane Furchen in je zwei, die zwei unteren durch äquatoriale Furchen, wodurch 2 innere Micromeren entstehen. Im nächsten Stadium schnüren sich von den 8 „Blastoconen“ ebensoviele Micromeren ab, während die zwei vor-

handenen sich theilen, so sind 12 Micromeren entstanden, während die Macromeren sich auf 20 vermehrt haben. Durch weitere Theilungen wächst die Zahl, namentlich der Micromeren (Blastomeren), welche in der Mitte eine Scheibe bilden, die inneren sind kleiner als die äusseren, und an diese schliessen sich aussen die Blastocoenen an. — Aus diesen Elementen entstehen die Keimblätter: das Ectoderm, das in der Mitte einschichtig ist, am Rande dagegen mehrschichtig wird, das Mesoderm, durch die tieferen Schichten des Randes dargestellt, und die Dottermembran als primitives Entoderm. Von den Organen zeigt sich sehr frühzeitig die Anlage der Schalentasche in dem mittelsten hellen Theile, der von einer symmetrischen dunkeln Zone umgeben wird. Die Axe der Embryonalanlage fällt wahrscheinlich mit der des Blastoderms zusammen. Die Arme entstehen nicht aus gesonderten Anlagen, sondern aus dem unteren Rande der Keimscheibe, die seitlichen Theile des Kopfes mit den Augen aus 2 Verdickungen im oberen Theile der einheitlichen Anlage, daneben zeigen sich Andeutungen des Trichters und Mantels mehr nach der Mitte hin. Die Anordnung der einzelnen Arme ist dieselbe wie im erwachsenen Thiere. Das Stomodäum tritt erst spät auf. Die Otcysten gehen Beziehungen zum Trichter ein. Unterhalb der Mitte findet sich schon frühzeitig eine kleine Verdickung, welche durch eigenthümlich differente Mesodermzellen hervorgerufen wird; Verf. glaubt, dass aus dieser Anlage die inneren Organe (Verdauungstract (? Ref.), Nieren, Herz) entstehen (vielleicht hauptsächlich auch die Keimdrüsen. Ref.) Das Ectoderm geht an manchen Stellen ohne Grenze in das Mesoderm über, die tieferen Lagen, welche durch Delamination des Randes der mittleren Zone entstanden, bilden nur einen Theil des Mesoderms, Nerven- und Muskelgewebe entstehen durch secundäre Wucherungen des Ectoderms. Ob das „definitive Entoderm“ aus dem Mesoderm entsteht, wie meist angenommen wurde, oder aus der Dottermembran, konnte nicht entschieden werden.

Watase, S. Homology of the germinal layers of Cephalopods. John Hopk. Univ. Circ. 7. p. 33, 34. Ausz.: Journ. R. Micr. S. 88, p. 396—97 und Amer. Natur. 22. p. 256.

Vorläufige Mittheilung zum Folgenden.

Watase, S. Observations on the development of Cephalopods; homology of the germ layers. Stud. Biol. Lab. J. Hopk. Univ. 4 p. 163—83. Ausz.: J. R. M. S. 88 p. 931.

Watase findet schon im Anfange der Furchung, dass die Zellen in der Mitte der Keimscheibe dünner sind als in einiger Entfernung von derselben, nach aussen werden sie wieder dünner. Das Mesoderm entsteht an der dicken Stelle durch tangential Theilungen, und aus ihm gehen wahrscheinlich auch die Zellen hervor, welche die Dottermembran bilden, jedenfalls entstehen diese nicht aus dem Dotter. Die Dottermembran stellt das primäre Entoderm dar, das zu dem Verdauungstract in gar keine Beziehung tritt; dieser ent-

steht vollständig aus den beiden Einstülpungen des Ectoderms, dem Stomodäum und dem Proctodäum. Mit der Aufsaugung des Dotters verschwindet die Dottermembran. So ist das Verdauungssystem der Cephalopoden dem der anderen Mollusken, bei denen das Entoderm persistirt, nicht homolog, jedenfalls eine Folge des reichlichen Nahrungsdotters.

Lamellibranchiata.

Rawitz, B. Das zentrale Nervensystem der Acephalen. Jen. Zeitschr. Naturw. 20. 1887, (s. vor. Ber. p. 274). Rawitz macht zunächst Angaben über die macroscop. Verhältnisse des Centralnervensystems, über Form, Lage und die Hauptnerven, welche aus den Ganglien abtreten (leider wird p. 2 und 8 nicht mitgetheilt, bei welchem Thiere sich die Nerven der Cerebral- resp. Visceralganglien so verhalten, wie es angegeben ist). Das Visceralganglion von Pecten zeigt eine Sonderung mehrerer Abschnitte, welche mit Namen belegt werden. Bei den dunkelgefärbten Asiphonia sind die Ganglien orangefarbig, bei Siphoniaten pigmentlos; bei ersteren enthalten die Zellen das Pigment concentrisch um den Kern oder an einem der Pole. Die Zellen sind membranlos und bestehen aus einem Netzwerk und einer darin suspendirten zähen Flüssigkeit. Die Kerne haben eine deutliche Membran. Apolare Ganglienzellen kommen nicht vor, dagegen wurden unipolare, deren Fortsatz ungetheilt in den aus dem Ganglion entspringenden peripheren Nervenstamm übergeht, unzweifelhaft beobachtet. Bipolare Zellen sind am seltensten; die multipolaren haben einen Hauptfortsatz und zahlreiche Nebenfortsätze, während die „Schaltzellen“ nur Nebenfortsätze zeigen. Kernkörperfortsätze wurden nie beobachtet. Zellen mit Stammfortsatz, stets unipolar, sind selten. Alle andern Zellen haben Markfortsätze, und zwar jede nur einen. In der Rinde der Ganglien liegen zu äusserst unipolare Zellen, deren Fortsätze zu multipolaren Zellen, die sich weiter nach innen hin finden, begeben; von den ersteren geht die Erregung aus, während die letzteren „Sammelorte für die Reize sind, die oppositipolen nur als Faseranschwellungen betrachtet werden können.“ Das Centrum der Ganglien besteht aus einem Netzwerke, das durch die Fortsätze der Zellen gebildet wird und eine myelinartige Masse enthält. Die Fasern (Stammfortsätze), welche in die peripheren Nerven eintreten, ziehen durch die Maschen des Netzes hindurch; die Hauptmasse der Nervenstämme besteht aber aus den Producten des centralen Nervennetzes. Die Ganglien sind von einer inneren membranösen und einer äusseren zelligen Hülle umgeben. Sodann giebt Verf. eine Topographie der Ganglien, deren Einzelheiten nicht referirt werden können. Die Pedalganglien von Unioniden sind durch 12—18 Commissuren verbunden (innere Strickleiterform), bei denselben biegt der äussere Theil des Cerebrovisceralconnectivs in den Kiemennerv um. Es

folgen specielle Angaben über *Pecten jacobaeus* und zum Schlusse Betrachtungen über die Bedeutung der Visceralganglien. Diese stehen in keinem Zusammenhang mit der Kiemenausbildung, sondern mit der Ausbildung des Mantelrandes, daher sind sie bei Pectiniden am höchsten entwickelt.

Rawitz, B. Der Mantelrand der Acephalen. I. Ostreacea. Jen. Zeitschr. Nat. 22. p. 415—556.

R. beschreibt das Nervensystem von *Pecten Jacobaeus*; dasselbe zeigt in der ganzen Gruppe keine wesentliche Differenz. Zum Mantelringnerven ziehen jederseits 2 Nerven vom Visceralganglion und einer vom Cerebralganglion. Sodann wird die Anordnung der Tentakel beschrieben, sowie deren feinerer Bau. An der Spitze dieser Fühler sollen die Sinneszellen häufig ohne Stützzellen neben einander liegen, was sonst bei Mollusken nie beobachtet ist. Die Sinneszellen zeigen 2 verschiedene Formen, die einen hängen nur an der Nervenfasern, die anderen stecken mit einem kurzen Fortsatze im subepithelialen Gewebe, während der Nerv seitlich zum Kern tritt. Die Drüsenzellen sind auch verschieden, die eine Art (*Ostrea*) ist epithelial, die andere subepithelial, mehrzellig, mit kleinen runden Kernen. Rawitz sieht die Gesamtheit der Drüsen am Mantelrande als ein Vertheidigungsorgan an, indem Fremdkörper von ihrem Sekret umhüllt werden; die Becherzellen an der Aussenseite des Mantelrandes sollen den Zwischenraum zwischen Mantel und Schale schlüpfrig erhalten. Die Drüsenzellen in den Fäden von *Lima* werden von besonderen Zellen als Stielen getragen. Die Zöttchen der Tentakel von *Pecten* bestehen aus 3 Zellen, einer Sinneszelle und 2 Stützzellen, die von einer gemeinsamen Membran umhüllt werden. Die Oberfläche zeigt eine Felderung mit sehr kleinen runden Kernen; Rawitz glaubt, dass diese Organe zum Tasten dienen. Verf. beschreibt bei *Pecten* einen „Seitenwulst“, den er merkwürdiger Weise für ein Sinnesorgan ansieht, während er von anderen Forschern für den Erzeuger des Periostracums gehalten wird. Auf der Mitte der Mantelklappe (*Pecten flexuosus*) befinden sich neben einander zwei Sinneshögel (Haupt- und Nebenhögel), die vermuthlich in grosser Zahl auf einander folgen; Rawitz hält sie für analog den Seitenorganen von *Rhipidoglossus*, Würmern und Fischen und bezeichnet sie als Seitenhögel. Geruchsorgane sind wahrscheinlich am Mantelrande vorhanden (Tentakel der vorletzten Reihe), dagegen kann das von Spengel beschriebene Organ nicht dem Geruche dienen, es mag den abdominalen Sinnesorganen analog sein (Rawitz scheint nicht zu wissen, dass diese beiden Sinnesorgane neben einander vorkommen, auch kann von einer „Aehnlichkeit des Baues“ keine Rede sein). Bei der Beschreibung der Augen von *Pecten* sind mehrere Abweichungen von Patters Darstellung hervorgehoben. Meist folgt auf ein grösseres Auge ein kleineres. Ein Ciliarmuskel existirt nicht, die äussere Pigmenthülle des Auges wird daher nicht als Iris bezeichnet. Die in der Mitte der Vorder-

seite befindlichen durchsichtigen Zellen werden Pellucida genannt; diese ist bei den Arten verschieden hoch. Die darunter gelegene dünne Bindegewebsschicht ist eine Fortsetzung des Bindegewebes im Stiele. Hinter der Linse ist ein queres Septum vorhanden, das gleichfalls mit dem umgebenden Bindegewebe zusammenhängt. Der Bau der Retina ist von Patten im Ganzen richtig beschrieben; die Stäbchenzellen werden von einem feinen Canal durchzogen, der eine Faser enthält, welche in das Stäbchen hineinragt; dieses besteht aus einer stark lichtbrechenden Substanz und wird von einem schwächer brechenden Mantel umgeben. Die Ganglienzellen werden von dem äusseren Nerv, die Stäbchenzellen vom inneren Nerv versorgt. Das Tapetum ist eine einfache Lage und wird aussen von einer Pigmenthaut umgeben, welche direct in die Nebenzellen der Retina übergeht. Das Tapetum vermehrt die Lichtempfindlichkeit des Auges, welches grosse Gegenstände auch in der Entfernung, kleine nur bei Bewegung wahrnimmt. Jedes Auge hat nur ein centrales Gesichtsfeld, daher müssen ihrer viele vorhanden sein, deren Einzelbilder sich summiren, wodurch eine Art „linear musivischen Sehens“ zu Stande kommt.

Brock, J. Ueber die sogenannten Augen von Tridacna und das Vorkommen von Pseudochlorophyllkörpern im Gefässsystem der Muscheln. Zeitschr. f. wiss. Zool. 46. p. 270—88. Am Mantelrande von Tridacna befinden sich zahlreiche Hügel, die an der ventralen Seite von einer halbkreisförmigen Furche umgeben sind. Diese Warzen sind keine Augen, wie es L. Vaillant angegeben hatte, sie enthalten indessen eine Anzahl eigenthümlicher flaschenförmiger Organe. Diese sind von einer dünnen Membran umgeben, die stellenweise spindelförmige Kerne enthält. Die Hauptmasse bilden grosse, rundliche, transparente Zellen mit kleinem, runden, excentrischen Kern; diese werden, namentlich im unteren Theile, von einer unregelmässigen Schicht kleinerer polygonaler Zellen mit grobkörnigem Protoplasma und medianem Kern umgeben. Nerven zu diesen Organen wurden nie beobachtet, daher ist ihre Deutung als Augen ausgeschlossen; ob sie Leuchtorgane darstellen, ist zweifelhaft. — Brock beschreibt ferner chlorophyllhaltige Zellen in den Bluträumen des Mantelrandes; der Farbstoff ist nicht diffus im Protoplasma vertheilt, sondern in runden Körpern enthalten. Die Blutkörperchen zeigten in den Schnitten ein eigenthümliches Ansehn, der Kern lag in einem vollkommen hyalinen Theil, während der Rest der Zelle eine ausgesprochen fäsrige Gerinnung aufwies; ausserdem wurden Zellen beobachtet, welche mit fettähnlich glänzenden, stark lichtbrechenden Körnchen vollgepfropft waren.

Chatin, J. Nerfs qui naissent du ganglion postérieur chez les Anodontes. C. rend. Soc. Biol. VIII 3, 1886. p. 57—60. Aus den hinteren Ganglien von Anodonta anatina entspringt jederseits der Nerv des hinteren Adductors, das Connectiv zum Cerebralganglion, welches kleine Ganglien enthält, zwei kleine und ein

grosser, sowie ein accessorischer Kiemennerv mit Zweigen zum Bojanus'schen Organ, zwei hintere Mantelnerven, ein Nerv, dessen einer Zweig das Herz, dessen anderer das Rectum versorgt, endlich ein accessorischer Rectalnerv. Bei *Anodonta cygnea* fehlt der letzte.

Chatin. Nerfs qui naissent du ganglion postérieur chez les Unios. *ibid.* p. 242—43. Bei Unionen tritt der Nerv des hinteren Adductors, sodann das Connectiv aus dem hinteren Ganglion hervor; es ist nur ein kleiner und der grosse Kiemennerv vorhanden, sodann zwei Mantelnerven und der Cardiorectalnerv, während der accessorische Nerv zum Enddarm fehlt.

Reichel, L. Ueber die Bildung des Byssus der Lamelli-branchiaten. *Zoolog. Beiträge A. Schneider*, 2. p. 107—32 (vgl. vor. Bericht p. 271). Verf. beschreibt die Epithelzellen im halbmondförmigen Canal und in der Byssushöhle von *Dreissensia*, nach seiner Ansicht die Erzeuger des Byssus. Die Anwesenheit von Byssusdrüsen wird geleugnet, weil der Byssus kein Secret, sondern eine Cuticularbildung sei. Ein Thier, dessen Byssushöhle verletzt war, erzeugte trotzdem in der Fussrinne Fäden, ohne sich indessen mit diesen befestigen zu können. Nach dem Abwerfen des Byssus, was bei *Dreissensia* wahrscheinlich zweimal im Jahre geschieht, nimmt die Byssushöhle eine einfachere Gestalt an durch Reduction der vorspringenden Falten, welche sich erst allmählich wieder Neubilden — Reichel wirft der Secretionstheorie mit Recht vor, dass sie die Befestigung des Byssus in der Höhle nicht erklären könne.

M'Alpine, D. Observations on the movements of the entire detached animal, and of detached ciliated parts of bivalve molluscs, viz. gills, mantle-lobes, labial palps and foot. *Proc. R. Soc. Fdinb.* 15. p. 173—204. Das ganze aus der Schale genommene Thier (*Mytilus*) zeigt auf einer Platte ebenso eine Weiterbewegung durch die Cilien, wie die Mantellappen, Kiemen und Mundlappen, meist ist die Bewegung eine rotirende. Durch directe mechanische Reizung und durch Erhöhung der Temperatur bis auf ca. 20° C. wird die Cilienbewegung beschleunigt. Verf. sucht die Bewegung der Fremdkörper und Nahrungstheile festzustellen; er meint, dass diese durch die Mundlappen nicht zum Munde geführt werden, sondern dass die Mundlippen die Nahrung aufnehmen (diese sind indessen bei vielen Lamellibranchiaten so beschaffen, dass von einer directen Nahrungsaufnahme gar keine Rede sein kann, so ist bei *Lima* die vordere mit der hinteren zu einer queren Röhre verwachsen. Ref.). Die Mundlappen dienen als „guards“, nicht als „guides“ zum Munde. Durch Schliessen und Oeffnen des Mundes kann das Thier die Nahrungsaufnahme reguliren. Diatomeen bilden hauptsächlich die Nahrung; es wurden aber unter Anderem auch Eier desselben Thieres im Magen gefunden.

Vvedenskii, N. E. Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Cilienbewegung bei *Anodonta*. *Trudui St. Petersburg. Nat., Zool.* 19, Protok 112.

Pelseneer, P. Les Pélécy-podes (ou Lamellibranches) sans branchies. C. rend. 106 p. 1029—31. Ref.: Le Naturaliste X p. 112, J. R. M. S. 88, p. 564.

Cuspidaria besitzt keine Kieme, an ihrer Stelle findet sich eine muskulöse Scheidewand, welche einen dorsalen Raum von dem ventralen Mantelraume trennt. Cuspidaria stellt das Ende einer phylogenetischen Reihe dar, in der sich die Kiemen rückbilden. Lyonsiella zeigt die Kiemen noch gut entwickelt, bei Poromya und Silenia bilden sie sich zurück, während die muskulöse Scheidewand, welche Gruppen von Durchbohrungen aufweist, sich ausbildet; hier schliesst sich Cuspidaria an. Pelseneer will unter dem Namen Septibranchia die 3 letzten Gattungen von den übrigen Lamellibranchiern absondern und schlägt für dieselben die Eintheilung in die 2 Familien Poromyidae (Poromya und Silenia) und Cuspidariidae (Cuspidaria) vor.

Dall. Lamellibranches sans branchies. Bull. Soc. zool. France 13. p. 207—9.

Dall hebt hervor, dass er schon früher die von Pelseneer beschriebenen That-sachen mitgetheilt habe. Das von diesem Autor als Lyonsiella beschriebene Thier gehört wahrscheinlich zu den Anatinidae. Das Septum findet sich in einigen Fällen (Verticordia) wohlentwickelt neben den Kiemen, es kann daher nicht aus diesen entstanden sein. Dall hat keine Durchbohrungen des Septums wahrgenommen und hält solche für Kunstprodukte.

Blanchard, R. De la présence des muscles striés chez les Mollusques. C. rend. 106. p. 425—27. Ref.: Le Naturaliste X p. 76, J. R. M. Soc. 88, p. 402.

Blanchard hält Fol gegenüber (s. p. 380) daran fest, dass die Fasern, welche den grösseren Theil des Adductormuskels von Pecten, zusammensetzen, wahre Querstreifung zeigen.

Ders. Sur les muscles striés des Mollusques. C. rend. Soc. Biol. Paris VIII 5. p. 125—27. Aehnlich wie das Vorige.

Roule, L. Sur la structure des fibres musculaires appartenant aux muscles rétracteurs des valves des Mollusques lamellibranches. ibid. p. 872—74. Ausz.: Journ. R. M. Soc. 88 p. 402, Centralbl. Physiol. II p. 175. Roule findet, dass die Muskeln mit grosser Amplitude im Zustande der Contraction eine spiralförmige Anordnung der Fibrillen zeigen, dass diese aber im Zustande der Ausdehnung parallel sind; echte Querstreifung sollen nur die Muskeln der Arthropoden und Vertebraten zeigen.

Fol, H. Sur la répartition du tissu musculaire strié chez divers Invertébrés. ibid. p. 1178—80. Ref.: Le Naturaliste X p. 123, Journ. R. M. S. 88 p. 714, Centralbl. Phys. II p. 175. Fol hat erkannt, dass die Fasern des Schliessmuskels von Pecten und Lima, wie Blanchard angegeben, wirklich quergestreift sind, für die anderen Fälle hält er an seiner früheren Auffassung fest.

Blanchard, R. A propos des muscles striés des Mollusques lamellibranches. Bull. Soc. zool. France 13. p. 48—55. Aufzählung früherer Arbeiten über quergestreifte Muskelfasern von Mollusken.

Derselbe. Sur la structure des muscles des Mollusques lamellibranches. *ibid.* p. 74—81.

Blanchard hat die Muskeln verschiedener Lamellibranchier untersucht und findet, dass das Element eine Faserzelle von 1—2 mm Länge und 4—38 μ Breite ist, mit oberflächlich gelegenen Kern, ohne Hüllmembran. Häufig ist Längsstreifung, die mehr oder weniger ausgeprägt sein kann. In einigen Fällen (Ostreaceen) zeigten sich oberflächliche schräge, zickzackförmige oder gekreuzte Linien, die mit Querstreifung nichts zu thun haben. Fols Angabe, dass die Muskelfasern eine granulöse Axe und centralen Kern haben, ist unrichtig.

Tourneux, F. u. Barrois, Th. Sur l'existence de fibres musculaires striées dans le muscle adducteur des valves chez les Pectinidés, et sur les mouvements natatoires qu'engendre leur contraction. C. rend. Soc. Biol. VIII 5. p. 181—88. Ref.: Centralbl. Physiol. 2, p. 118.

Verf. geben zuerst eine historische Uebersicht. Pecten und Lima haben im Adductormuskel, durch dessen Contractionen sie schwimmen, einen aus glatten Fasern bestehenden und einen quergestreiften Theil. Die glatten Fasern sind 1,3—1,5 mm lang und abgeplattet, ihre Fibrillen je nach dem Grade der Contraction parallel oder gekreuzt; die quergestreiften sind bandförmig, 1,5 bis 2 mm lang, in der Mitte mit einem Kern. Ein Lacunensystem durchzieht das Bindegewebe zwischen den Faserbündeln.

Galeazzi, R. Des éléments nerveux des muscles de fermeture ou adducteurs des bivalves. Atti R. Acc. Sc. Torino. 23 p. 556—61 und Arch. ital. Biol. 10. p. 388—93.

Galeazzi betrachtet die Muskelfasern der Schalenschliesser von Mytilus und Ostrea als Uebergangsformen zwischen glatten und quergestreiften Fasern. Sie zeigen feine Längsstreifung; meist liegt in der Mitte der Faser der ovale Kern, von dessen Enden granulirte Plasmastränge ausgehen. Das Bindegewebe zwischen den Faserbündeln ist reich an Nerven, welche sich vielfach verzweigen. Feinste Nervenfibrillen stehen mit den Plasmasträngen und dem Kern der Muskelfasern in Verbindung. In Folge des grossen Nervenreichthums glaubt Galeazzi, dass jede Muskelfaser von einem besonderen Nervenast versorgt wird. Die grosse Anzahl von uni- und bipolaren Ganglienzellen im Bindegewebe berechtigen zu der Annahme, dass die Schalenschliesser eigene automatische Nervencentra besitzen.

Grobbe, C. Ueber die Pericardialdrüse der Lamellibranchiaten. Verh. zool.-botan. Ges. Wien 38. Sitzb. p. 18. Auszug der folgenden Arbeit.

Derselbe. Die Pericardialdrüse der Lamellibranchiaten. Ein Beitrag zur Kenntniss der Anatomie dieser Molluskenklasse. Arb. zool. Inst. Wien 7. p. 355—444. Ausz.: J. R. M. S. 88, p. 720—21.

Grobbsen geht bei der Beschreibung der Pericardialdrüse von den einfachsten Verhältnissen, wie er sie bei *Arca Noae* findet, aus; trotzdem glaubt er die Duplicität des Herzens nicht als phyletisch alten Zustand ansehen zu dürfen, sondern als ein ontogenetisches Stadium, welches durch „Bildungshemmung“ erhalten ist in Folge der mächtigen Entwicklung der hinteren Fussretractoren. Dagegen soll die Paarigkeit des Pericardiums als ursprünglich anzusehen sein. Die Vorhofswand zeigt eine rostrothe, zuweilen mehr rothgelbe Färbung und eine geringe Faltenbildung; das Epithel ist drüsig, die einzelnen Zellen springen buckelförmig vor und tragen meist eine Geissel; ihr Inhalt zeigt gelbliche Körner und einen runden Kern. Aehnliche Zellen wurden auch in den Muskelschläuchen des Vorhofs gefunden, theilweise in Zusammenhang mit dem Epithel; von diesen Zellen nimmt Verf. an, dass sie vom Pericardialepithel herkommen. Bei *Pectunculus* ist die Vorhofswand mit höckerförmigen Vorsprüngen besetzt, die gruppenweise angeordnet sind und ähnlichen Bau zeigen wie bei *Arca*. Die Anhänge des Vorhofs von *Mytilus* sind mächtig entwickelt, von braungrüner oder schwärzlicher Farbe; die Epithelzellen stossen nur mit ihren basalen Theilen an einander, ihre Kerne liegen gewöhnlich nahe dem oberen Ende. Abgestossene Zellen trifft man häufig in den eingestülpten Schläuchen. Bei *Lithodomus* ist der Vorhof von parallelen Furchen durchzogen, die Wandung zeigt ähnliche Schläuche wie bei *Arca*. Die Vorhofsanhänge von *Dreissensia* sind schwach ausgebildet, dagegen finden sich an der Unterseite einer queren Falte im vorderen Theile des Pericardiums zahlreiche Oeffnungen, welche in baumförmig verästelte Drüsenschläuche führen; die Epithelzellen der letzteren sind niedrig, meist mit einem gelbbraunen Concrementkörper. Pinna besitzt keine Pericardialdrüse. Bei *Pecten* zeigt die Vorhofswand, besonders zunächst der Herzkammer, zottenförmige Aussackungen. Die Epithelzellen schliessen an einander, sie enthalten im oberen Theile kleine Körnchen. Im Innern des Vorhofs an den Muskeln liegen blasse Zellen, welche Vacuolen und eine gelbe Concretion enthalten; ein Zusammenhang mit dem Epithel wurde nicht beobachtet. Bei *Spondylus* ist die Vorhofswand wellig und zeigt eine Vergrösserung durch Einstülpungen; das Epithel enthält vereinzelte Schleimdrüsen und im Innern liegen Zellen mit grossen Concrementen. Die Vorhofsanhänge von *Lima* sind schwach entwickelt. Bei *Ostrea* zeigen die dunkel gefärbten Vorhöfe eine Bekleidung mit kleineren und grösseren körnchenführenden Zellen, von denen die letzteren Aehnlichkeit mit den an den Muskeln gelegenen Elementen zeigen, ohne doch nach Grobbsens Auffassung mit ihnen von gleicher Natur zu sein. Bei *Meleagrina*, die ein ventral vom Darm gelegenes undurchbohrtes Herz besitzt, enthalten die Vorhöfe reichliche Concrementzellen, ausserdem finden sich gelppte Krausen, welche von der ventralen

Wandung in den Pericardialraum vorspringen und welche möglicherweise mit der Niere in Verbindung stehen. Eine andere Ausbildung zeigt die Pericardialdrüse von *Unio* und *Anodonta* (Kebersches rothbraunes Organ), wo sie eine reich verzweigte Drüsenmasse vor dem Pericard, mit welchem die Hohlräume in Zusammenhang stehen, darstellt. Die Auskleidung derselben bilden concrementhaltige Zellen, und zwischen den Lappchen ist ein Netz von lacunären Blutbahnen. Reste der Drüse am Vorhofe sind als Fältchen wahrnehmbar. Aehnliche Verhältnisse finden sich bei *Venus*, *Solen*, *Scrobicularia*. Bei *Pholas* ist die im Mantel gelegene Drüse vom Pericard abgeschnürt, die an den Vorhöfen deutlich ausgebildet. *Teredo* endlich zeigt einen Belag secernirender Zellen auf den langgestreckten Vorhöfen, während eine Drüse im Mantel fehlt; es wird die eigenartige Lage unter dem Adductor und die langgestreckte Form des Herzens beschrieben, von welchen die beiden Aorten als ein nach vorn gerichteter Stamm abgehen. — Die Pericardialdrüse mag zunächst das dem Blute reichlich beigemischte Wasser und damit dann auch Excretstoffe abscheiden, welche durch das Pericardium und die Niere entleert werden.

Haseloff, B. Ueber den Krystallstiel der Muscheln nach Untersuchungen verschiedener Arten der Kieler Bucht. *Biolog. Centralbl.* 7. p. 683—84. (Vorläuf. Mitth.).

Dasselbe. *Inaug.-Diss. Kiel. Ausz.: Journ. R. Micr.* S. 88, p. 566 und *Amer. Natur.* 22. p. 936.

Der Krystallstiel besteht aus einer eiweissartigen Substanz. Es wurden Versuche angestellt, um über die Function des Krystallstiels ins Reine zu kommen; Thiere, welche mehrere Tage lang ohne Nahrung gehalten waren, hatten ihn verloren, während andere mit Nahrungsstoffen versehene ihn behielten. Exemplare, denen nach einer Hungerperiode wiederum Nahrung gegeben wurde, zeigten dünne Krystallstiele. Dadurch dürfte nachgewiesen sein, dass der Krystallstiel der Muscheln ein Reservematerial repräsentirt.

Lindner. Ueber giftige Miesmuscheln. *Centralbl. Bakteriolog. Parasitenk.* 3. p. 352—58. Verf. kommt zu der Annahme, dass die Giftbildung in den Muscheln auf einer durch gestörte Ernährung — in Folge der im stagnirenden Seewasser enthaltenen naturwidrigen Stoffe — herbeigeführten Krankheit ihrer Leber beruhe. Die Atrophie und Farbenveränderung der Schale scheint ein gleichfalls durch die parasitischen Protozoen veranlasster Schwächezustand zu sein.

Lustig, A. Les Microorganismes du *Mytilus edulis*. *Arch. Scienze med.* 12. p. 323 und *Arch. ital. Biol.* 10 p. 393—400. Lustig züchtete aus der Leber giftiger Miesmuscheln Reinculturen zweier Bacterienarten, deren eine pathogen wirkt, die andere sich indifferent verhält. Fütterungsversuche mit der ersteren hatten den baldigen Tod der Versuchsthiere (Kaninchen und Meerschweinchen) unter starkem Durchfall zur Folge. In ungiftigen Muscheln konnte dieser *Bacillus* nicht aufgefunden werden.

Permewan, W. B. Fatal case of poisoning by mussels, with remarks on the action of the poison. *Lancet* No. 3395. Ref.: *Centralbl. med. Wiss.* 26. p. 856—57.

Ein Mann, der rohe Muscheln in grösserer Anzahl gegessen, zeigte hauptsächlich Paralyse der willkürlichen Muskulatur und völlige Bewusstlosigkeit; er starb trotz künstlicher Respiration. Das Gift wirkt direct auf das Gehirn, womit auch die Lähmung des Athmungscentrums zusammenhängt.

Dubois, R. Sur la production de la lumière chez le *Pholas dactylus*. *C. rend. Soc. Biol.* VIII 5. p. 451—53. Ausz.: *Centralbl. Physiol.* 2., p. 355.

Derselbe. Sur le rôle de la symbiose chez certains animaux marins lumineux. *C. rend.* 107. p. 502—4. In den Wänden des Siphon von *Pholas* leben symbiotisch Bacterien (*Bacterium Pholas*), welche das Leuchten bewirken. Dieselben können auch in Abkochungen der phosphorescirenden Theile gezüchtet werden.

Derselbe. Mensuration, par la méthode graphique, des impressions lumineuses produites sur certains mollusques lamellibranches par des sources d'intensité et de longueurs d'onde différentes. *C. rend. Soc. Biol.* VIII 5. p. 714—16. Ausz.: *J. R. M. Soc.* 89 p. 39—40.

Beschreibung einer Vorrichtung, um den Einfluss von Lichtstrahlen, welche auf den lichtempfindlichen Siphon von *Pholas dactylus* fallen, durch die Muskelcontraction graphisch darzustellen.

Schröder, H. Ueber die Bourguignat'sche Methode der Messung der Acephalen. *Schr. Ver. Harz* 3. p. 11—18. Schröder zeigt durch Nebeneinanderstellung der Maasse verschiedener Muscheln, dass Bourguignat's Behauptung, durch seine Messungsweise würden die Arten „mit fast mathematischer Genauigkeit“ fixirt, nicht zutreffen; es kommen immer individuelle Verschiedenheiten vor, auch sei die Messungsmethode verbesserungsfähig.

Germain, R. Les perles en Nouvelle-Calédonie. *Bull. Mens. Acclim. Paris* IV 5. p. 710—11. Berichtet hauptsächlich über den Fund einer werthvollen schwarzen Perle bei einer Pinna.

Harley, G. und Harald S. The chemical composition of pearls. *Proc. R. Soc. London* 43. p. 461—65. Die Perlen enthalten 91,72% kohlen-sauren Kalk, 5,94% organische Bestandtheile und 2,23% Wasser. Sie lösen sich in Essig sehr schwer auf.

Möbius K. Die Schwellung des Fusses der Muschel *Solen pellucidus* Penn. *Sitzb. Ges. nat. Fr.* p. 34. Ref.: *J. R. M. S.* 89, p. 201. Bei einem kleinen Thiere wurde unter dem Microscop das Einströmen des Blutes in den sich ausstreckenden Fuss beobachtet.

Letellier, A. La fonction urinaire chez les Mollusques acéphales. Thèse. Ref.: *Le Naturaliste* 10, p. 78—79. Letellier findet im Bojanus'schen Organ von *Mytilus* eine Eiweissverbindung, die im Blute nicht vorkommt, ferner Fette (Stearin, Margarin, Olein

und ein in Alkohol und Wasser lösliches Fett), Säuren spurenweise, endlich, was am wichtigsten ist, keine Harnsäure oder Hippursäure, auch kein Guanin, dagegen Harnstoff, Creatin und Creatinin mit Spuren von Taurin, Leucin und Tyrosin. Jedes Thier dürfte im Mittel 0,00045 Gr. Harnstoff in den Bojanus'schen Organen enthalten. Daher ist dieses Organ eine wahre Niere, der der höheren Thiere vergleichbar. Auch bei anderen Lamellibranchiern wurde Harnstoff gefunden, Harnsäure vermisst. — Das Secret bildet im Anfange eine Vacuole in der Zelle, sodann schlägt sich ein fester Körper nieder, der allmählich bedeutende Grösse erlangen kann; namentlich bei *Cytherea chione* wurden Körner bis zu 3,5 mm Durchmesser aufgefunden, diese gelangen in die Mantelhöhle oder unter die Schale, wo sie nach Entfernung der letzteren sogleich bemerkbar sind.

Durand, W. F. Internal parasites of *Teredo navalis*. Amer. Monthl. Micr. Journ. 8. p. 224—26.

Nassonoff, N. W. O. Ueber Bohrschwämme aus der Familie Clionidae. Nachr. Kön. Ges. Moskau. I. p. 236—48. Ausz.: Arch. slav. biol. 4. p. 362—66. Clionis stationis bohrt in Ostrea- und Mytilus-Schalen.

Pidgeon, W. R. A mussel living in the branchiae of a Crab. Nature 39. p. 127—28.

Kew, H. W. Sphaerium corneum upon the tarsus of *Dytiscus marginalis*. Journ. Conch. 5. p. 263.

Westgate, W. Notes on *Teredo*. Conch. Exch. II. p. 84.

Sharp, Benj. Remarks on the Phylogeny of the Lamellibranchiata. Ann. Mag. nat. hist. VI, 2. p. 125—28 und Proc. Acad. nat. sc. Philad. 88. p. 121—24.

Die Lamellibranchier haben sich von Formen wie *Nucula* und *Trigonia* aus nach 2 Seiten entwickelt; in der einen Reihe, welche zu *Ostrea* hinführt, sind die Wirbel nach vorn gerückt, wodurch der vordere Adductor seine Bedeutung verlor und verschwunden ist; die Thiere sind an festsitzende Lebensweise gewöhnt (Anheftung durch Byssus oder die Schale). In der anderen Reihe verwachsen die Mantelränder und bilden hinten die allmählich sich mächtig entwickelnden Siphonen, das Ligament verschwindet schliesslich, es entstehen accessorische Schalenstücke und die beiden ursprünglichen Schalen werden in eine einheitliche Kalkmasse eingeschlossen; *Aspergillum* ist die extremste Form dieser Reihe.

Mac Intosh, W. C. Notes from the St. Andrews Marine Laboratory. IX 2. On the development of *Mytilus edulis*. Ann. Mag. nat. hist. VI 2. p. 467—69. Ausz.: J. R. M. S. 89, p. 40.

Verf. berichtet über die Festsetzung der jungen Thiere an den Schalen der erwachsenen, an *Obelia* und *Gonothyrea*, auch Anheftung an *Carcinus* und den Kiemen von Dorschen wurde beobachtet. Die grösseren Thiere können ihren Byssus abwerfen und sich an anderer Stelle (z. B. an Schiffen) anheften.

Jackson, R. T. The development of the oyster with remarks on allied genera. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. 23. p. 531—56. Ausz.: J. R. M. S. 89, p. 375.

Es wurde zunächst ein Stadium mit einem Adductormuskel, welcher dem vorderen der Dimyariar entspricht (vgl. die folg. Arbeit), sodann ein solches mit 2 ungefähr gleichgrossen Schalenschliessern beobachtet; der erstere verschwindet bald, während der letztere sich vom Schlosse entfernt und vergrössert. Die jugendliche Schale (*Prodissoconcha*) hat nach hinten gewendete Wirbel, die linke Klappe ist etwas grösser und tiefer als die rechte; der Bau dieser jungen Schale ist prismatisch, die weisse Blätterschicht legt sich später an die Innenseite derselben an. Es werden 5 „silphologische“ Stadien nach dem Schalenwachstum unterschieden; der Theil, welcher bis zum Ende dieser Stadien gebildet wird, ist an allen Schalen durch die glatte convexe Oberfläche kenntlich.

Schierholz, C. Ueber Entwicklung der Unioniden, Anz. Akad. Wien 25. p. 126—27. Auszug der folgenden Arbeit.

Derselbe. Ueber Entwicklung der Unioniden. Denkschr. math.-nat. Kl. K. Akad. Wien 55. p. 183—216. Nach einigen Angaben über die Zeit und Dauer der Brut von Unioniden berichtet Verf., dass die Eier gewöhnlich einzeln ausgestossen werden, die Hüllen platzen beim Niederfallen und darauf verflechten sich mehrere der jungen Thiere mit ihren Fäden, wodurch sie besser gegen das Verschwinden in kleinen Unebenheiten des Bodens geschützt sind, bei *Anodonta complanata* fehlen indessen die Fäden. Die Anodonten-Larven heften sich meist an die Flossen, die der Unionen nur an die Kiemen der Fische. Die Dauer der parasitischen Lebensweise ist nach den Temperaturgraden verschieden. — Von *Anodonta piscinalis* wird die Eifurchung beschrieben; das Entoderm stülpt sich ein und wird später abgeschnürt, das Ectoderm bildet ein hinteres Wimperschield. Jederseits fällt eine Zelle auf, aus der die sog. Seitenzellen hervorgehen. Die Sinnesorgane, welche die Anheftung an den Fisch reguliren, zeigen bei den Arten verschiedene Stellung, eins steht jederseits isolirt nach der Mitte hin, die 3 anderen in der Nähe des Schalenhakens. Verf. unterscheidet ausser dem hinteren bewimperten Wulst noch einen vor und einen hinter der Mund-einstülpung. Das Entoderm erhält erst spät die vordere und hintere Oeffnung. Anlagen der Niere, der Leber und der hinteren Ganglien wurden schon frühe wahrgenommen. Der embryonale Adductor lässt aus seinem dorsalen Theile den vorderen definitiven Schalenschliesser hervorgehen. Die Gehörbläschen will Schierholz frühzeitig in 2 auffallenden Zellen wahrgenommen haben. Die Pedalganglien entstehen wahrscheinlich aus den vorderen Seitenzellen. Im Fusse ist eine rudimentäre Byssusdrüse vorhanden, während der Larvenfaden wegen seiner Lage vor dem Munde nicht den Byssusorganen homolog sein kann, zumal ca er eine ganz andere Ausbildung zeigt und sich gewöhnlich dreimal um den larvalen Adductor herumschlingt.

Gastropoda.

Willem, V. Note sur le procédé employé par les Gastéropodes d'eau douce pour glisser à la surface du liquide. Bull. Acad. r. sc., lettr. beaux-arts Belg. Brux. III 15, p. 421—30. Ausz.: Journ. R. M. Soc. 88, p. 718. Die Schnecken scheiden während ihres Kriechens an der Oberfläche ein Band von Schleim ab; die meisten sind, wenn sie in der Lungenhöhle Luft bei sich führen, leichter als Wasser, indessen genügt auch bei anderen die Anheftung an dem schwimmenden Schleimbande und die Capillarität, um sie an der Oberfläche zu halten. Um aber an derselben Fuss fassen zu können, muss diese, wie es in der Natur immer der Fall ist, von einem aus kleinen festen Körnern bestehenden Häutchen bedeckt sein.

Lacaze-Duthiers, H. de. La classification des Gastéropodes, basée sur les dispositions du système nerveux. C. rend. 106 p. 716 bis 24. Ausz.: Journ. R. M. S. 88. p. 401. Nach den Unterschieden, welche die Visceralcommissur zeigt, unterscheidet Lacaze-Duthiers 1. Gastroneuren (Pulmonaten und Verwandte), 2. Notoneuren (Tritonium, Doris, Umbrella, Aeolidier, Tethys), 3. Pleuroneuren (Aplysia, Bulla, Philine), 4. Strepsineuren = Pectinibranchier, welche in 2 Abtheilungen zerfallen, die Aponotoneuren (Cyclostoma etc.) und Epipodoneuren (Haliotis, Fissurella, Trochus).

Pelseneer, P. Sur la classification des Gastropodes d'après le système nerveux. Bull. Soc. zool. France. 13. p. 113—15, auch in Proc. verb. Soc. mal. Belg. 17. p. 48—51 und Bull. Sc. Fr. Belg. III 1. p. 293—95. Ausz.: J. R. M. S. 88, p. 933. Lacaze-Duthiers' Namen Astrepsineuren, Strepsineuren und Gastroneuren sind gleichbedeutend mit den älteren Euthyneura, Streptoneura (Spengel) und Pulmonata. Notarchus und Dolabella, welche zu den Pleuroneuren Lacaze-Duthiers gehören sollen, müssten zu den Gastroneuren gestellt werden. Auch die Eintheilung der Streptoneuren in Epipodo- und Aponotoneuren lässt sich mit mehreren Thatsachen nicht in Einklang bringen, die Namen Aspidobranchia und Ctenobranchia sind besser passend. Die Vereinigung der Nudibranchier und Umbrellen (Notoneuren) ist unnatürlich. Die Pleuralganglien gehören nicht zu dem unsymmetrischen Theile des Nervensystems (Visceralcommissur), sondern zu der symmetrischen Gangliengruppe, daher sind sie auch öfters mit den Cerebral- oder Pedalganglien verschmolzen.

Schiemenz, P. Die Entwicklung der Genitalorgane bei den Gastropoden. Biol. Centralbl. 7. p. 748—61. Verf. vergleicht die sehr verschiedenen Ansichten über die Entwicklung der Genitalorgane, hauptsächlich bei Pulmonaten, und gelangt aus phylogenetischen Gründen zu der Anschauung, dass das Keimorgan mesodermalen Ursprungs sei, während der Penis und die ausführenden Organe aus dem Ectoderm stammen dürften.

Voigt, W. *Entocolax Ludwigii*, ein neuer seltsamer Parasit aus einer Holothurie. Zeitschr. f. wiss. Zool. 47. p. 658—88. Ausz.: J. R. M. S. 89. p. 197. In *Myriotrochus Rinkii* wurde innen an der Leibeswand befestigt ein Thier gefunden von schlauchförmiger Gestalt, hinter dem Vorderende mit einer kuglichen Auftreibung. An der Oberfläche desselben wurde kein Epithel wahrgenommen, vielleicht war dasselbe abmacerirt. Die Leibeswand besteht aus dünnen Muskellagen mit Bindegewebe untermischt. In der kuglichen Auftreibung wurde eine kleine Oeffnung, umgeben von Ringmuskeln, wahrgenommen. Der vordere Theil enthält eine Mundöffnung und einen Oesophagus, von Wimperepithel bekleidet; an der kuglichen Auftreibung endet der Kanal mit weiter Oeffnung. Im hinteren Theile findet sich ein Sack, dessen Epithel ringförmig verlaufende Falten bildet, durch einen enddarmartigen Kanal mündet derselbe am hinteren Körperende nach aussen. In den hintern Theil des Raumes, der vorn in die Höhlung der kuglichen Auftreibung übergeht, mündet eine Tasche von zweifelhafter Bedeutung. Etwas weiter vorn öffnet sich der Uterus, an dessen Grunde die Oeffnungen der gewundenen Samentasche und des Eileiters wahrnehmbar sind. Der Eierstock besteht aus einer Anzahl von Schläuchen, deren Epithelzellen sich in die Eier umwandeln. Die Hüllen des Ovariums werden durch die reifen Eier gesprengt und diese erfüllen das Innere der kuglichen Auftreibung, von wo sie jedenfalls durch Platzen der Leibeswand entleert werden. Bis auf die Fortpflanzungsorgane ist die Deutung der meisten Organe zweifelhaft. Verf. hält den Brutraum für eine Mantelhöhle, indessen konnten der am Hinterende ausmündende Sack und die in den Brutraum führende Tasche nicht mit einiger Sicherheit gedeutet werden. — Dieser Parasit soll sich den Prosobranchiern anschliessen, und Verf. will ihn in eine Unterordnung: *Cochlosyringia* einschieben, während die hermaphroditische *Entoconcha* zu den Opistobranchiern (Unterordnung *Cochlosolenia*) gehören dürfte.

Derselbe. Ueber parasitische Schnecken und *Entocolax Ludwigii*. S. B. niederrhein. Ges. 88. p. 53—55. Kurzer vergleichender Bericht (*Thyca* und *Stilifer*, *Entoconcha*, *Entocolax*).

Beecher, C. E. A method of preparing, for microscop. study, the radulae of small species of Mollusca. J. New-York Micr. Soc. 4. p. 7—12, auch J. Micr. and Nat. Sc. I. p. 123—31.

a) *Prosobranchiata*.

Bouvier, E. L. Système nerveux, morphologie générale et classification des Gastéropodes prosobranches. Ann. Sc. nat. VII 3. 1887 p. 1—510. (s. vor. Ber. p. 269). Verf. hat die Gestaltung des Nervensystems durch die Reihe der Prosobranchier verfolgt und gelegentlich auch über einige andere Organe Angaben gemacht. Es ist unmöglich, über die zahlreichen Einzelheiten zu berichten, es sollen nur die allgemeineren Gesichtspunkte, zu denen Bouvier ge-

langt ist, kurz mitgetheilt werden. Alle Prosobranchier mit Ausnahme der Neriten und deren Verwandten (Orthoneuroiden) haben eine gedrehte Visceralcommissur und zwei Anastomosen derselben mit den Mantelnerven. Wenn der rechte Mantelnerv das Subintestinalganglion berührt, so ist eine rechte Zygoneurie vorhanden, welche am häufigsten vorkommt, die entsprechende linke ist selten. In den anderen Fällen ohne Zygoneurie wird das Nervensystem als dialyneur bezeichnet, ein solches kommt bei den niederen Formen vor. In den Familien der Cerithiiden, Melaniiden und Cypraeiden findet man verschiedene Stadien der Entstehung von Zygoneurie. Durch diese wird der rechte Mantelnerv zum Connectiv zwischen dem rechten Pleuralganglien (Mantelganglion Bouv.) und dem Subintestinalganglion, und dieses Connectiv verkürzt sich bei den höheren Formen bis aufs Aeusserste. Die niedersten Prosobranchier haben ein diffuses Nervensystem, besonders gekennzeichnet durch die Länge der Cerebralcommissur, eine Labialcommissur und die Verschmelzung der Pleuralganglien mit den leiterförmigen Pedalsträngen. Uebergänge zu den höheren Formen zeigen hauptsächlich die älteren Taenioglossen, von denen einige noch leiterförmige Pedalganglien haben (Cypraea, Paludina), während andere an den Pedalganglien zwei kleine Knoten zeigen, die bei den höchsten Typen noch ontogenetisch nachweisbar sind. Die Cerebralganglien und mit ihnen die vorderen Eingeweide- (Buccal)ganglien concentriren sich mehr und mehr rückwärts von dem Schlundkopfe. Bei den primitiven Formen wird der Vordertheil des Mantels fast allein von den Pleuralganglien annähernd symmetrisch innervirt, während die Sub- und Supraintestinalganglien hauptsächlich die Kiemen mit den Spengel'schen Organen versorgen; höher hinauf gewinnt, namentlich auf der rechten Seite, die Innervierung des Mantels von der Visceralcommissur aus an Bedeutung. Die Nebenkienne (Spengels Organ) entwickelt sich gleichfalls von den Rhipidoglossen hinauf zu der Ausdehnung, die sie bei Stenoglossen (Rhachiglossen und Toxioglossen) erreicht. Die Docoglossen haben 2 rudimentäre Nebenkienne; die Kieme der Acmaeiden ist eine linke, da sie vom Supraintestinalganglion innervirt wird. Die Zahl der Visceralganglien ist schwankend, bei den niederen Formen kommt eins vor, bei den höheren finden sich meist 2, seltener 3. Die Schnauze wird immer von den Cerebralganglien, der Schlund von den Buccal- (vord. Eingeweide-)ganglien versorgt. Die Otocysten haben bei niederen Formen Otoconien, bei höheren je einen Otolithen; bei vielen Stenoglossen sind die beiden Otocysten verschieden weit von den Ganglien entfernt. Der Penis ist auf verschiedene Weise entstanden; man kann unterscheiden: Penis, der zum Fusse gehört (die höchsten Formen), Penis am Kopfe (Nerita, Paludina, Calyptraea), Dorsalpenis vom Subintestinalganglion innervirt (Cyclostoma, Bithynia), Mantelpenis (Ampullaria). Die Drehung des Körpers ist bei Prosobranchiern ohne Einfluss auf die Lage der Organe, da rechts- und links-gewundene Formen ein in demselben Sinne gedrehtes Nervensystem

zeigen (Ampullariiden). Die Schnauze verlängert sich in der Entwicklungsreihe und wird retractil, die Buccalmasse reducirt sich indessen. Die Speicheldrüsen haben bei den niederen Formen kurze Ausführungsgänge; bei Taenioglossen sind diese länger und durchsetzen den Schlundring, bei den Stenoglossen ist das nicht mehr der Fall wegen der Verlängerung des Rüssels, mit der die Länge der Ausführungsgänge nicht gleichen Schritt hält. Die Toxioglossen haben die gewöhnlich vorkommenden Speicheldrüsen, die sog. Gift-drüse ist stark muskulös geworden. — Die Ptenoglossen werden zu den Taenioglossen gestellt; die Gattungen *Scalaria* und *Solarium* nähern sich den Pyramidelliden. Die Docoglossen werden mit den Haliotiden und Fissurelliden zu den zygobranchiaten *Diotocardia* gestellt; die Bezeichnung *Diotocardia* wird übrigens für die Rhipidoglossen gebraucht, entsprechend den *Monotocardia*, welche in die Taenioglossen und Stenoglossen eingetheilt werden.

Haller, B. Die Morphologie der Prosobranchier, gesammelt auf einer Erdumseglung durch die Kön. italienische Korvette „Vettor Pisani“. Morph. Jahrb. 14. p. 54—169.

Eingehende Beschreibung der Morphologie mehrerer Rhachiglossen. — *Concholepas* hat statt des Spindelmuskels ähnlich den niederen Prosobranchiern einen Schalenmuskel erhalten; der letztere ist kein einheitlicher Muskel, er ist hervorgegangen aus den Bündeln, die bei Amphineuren vorkommen, während der Spindelmuskel aus dem rechten Schalenmuskel entstanden sein soll. Das Nervensystem ist sehr concentrirt, Sub- und Supraintestinalganglien sind mit den angrenzenden Theilen zu einem einheitlichen Halbringe verschmolzen. Die Spindelmuskelnerven, entstanden aus den vordersten Lateralnerven der Pedalganglien, sollen sich in der Subintestinalcommissur kreuzen. Die Connective der vorderen Eingeweideganglien entspringen aus den Pleuralganglien. Die Otocysten liegen vor den Cerebralganglien. — Die Buccaldrüsen bilden zwei compacte Massen von acinösem Bau. Das secernirende Epithel ist kubisch, die Zellen in den verschiedenen Phasen ihrer Thätigkeit von verschiedenem Aussehen (allgemeine Bemerkungen über Drüsenzellen). Der lange Vorderdarm zeigt eine birnförmige Erweiterung (vielleicht ein Saugorgan) mit einer kleinen ventralen Drüse, dahinter findet sich eine grössere unpaare Drüse, endlich die compacte „grosse Vorderdarmdrüse“. Der Mitteldarm zeigt eine Erweiterung mit dicker drüsiger Wandung; in diesen Raum ergiesst sich die kurze und sehr breite Mitteldarmdrüse durch einen sehr kurzen Gang. Weiterhin erweitert sich der Darm, um erst kurz vor seinem Ende enger zu werden. Im Vorderdarm ist Verdauung und Stoffaufnahme nachweisbar. Die Niere ist wie gewöhnlich aus zwei Lappen von verschiedenem Bau zusammengesetzt, der vordere Lappen ist im Verhältnis zum hinteren klein. — Die männliche Keimdrüse besteht aus einem centralen vielfach gewundenen Sammelgange und radiären Tubuli, die weibliche hat

dendritisch verzweigte Sammelgänge; der Eileiter zeigt eine ovoide Aussackung, der Uterus ist ein sehr mächtiges Gebilde mit dicker Wandung, welche zwei Arten von Drüsen enthält. Die Herzkammer nimmt die Kiemenvene, die einen muskulösen Abschnitt enthält, und die Körpervene getrennt auf. Das Herz wird auf doppelte Weise innerviert (accelerirender und retardirender Nerv). — Es folgen vergleichende Angaben über *Monoceros*, *Purpura* und *Muriciden* (*Murex*, *Fusus*, *Pyrula*.)

Bouvier. Sur les glandes salivaires annexes des Muricidés. Bull. soc. philom. VII 12. p. 118—25. Auszug der folgenden Arbeit.

Derselbe. Observations anatomiques et systématiques sur quelques familles de mollusques sténoglosses. Bull. Soc. malac. France t. 5 p. 251—86.

Die von B. Haller bei *Murex* als Otocysten gedeuteten birnförmigen Gebilde sind kleine Drüsen, deren Ausführungsgänge sich mit einander vereinigen und in der Unterlippe ausmünden, während die Otocysten wie gewöhnlich an den Pedalganglien gelegen sind. Solche Nebenspeicheldrüsen wurden bei anderen Gattungen (*Purpura*, *Concholepas*) in stärkerer Ausbildung gefunden, fehlen aber den Bucciniden. Bouvier erwähnt sodann die Anschwellung des Oesophagus (= birnförmige Erweiterung), sowie die grosse Vorderdarmdrüse, welcher die sog. Giftdrüse der Toxioglossen entspricht, während sie bei Taenioglossen noch fehlt und bei Fusiden schwach entwickelt ist. Bei *Magilus* zeigt diese Drüse einen blättrigen Bau; die Geschlechter sind getrennt, beim Männchen findet sich ein kleiner Penis, der durch eine Rinne mit der Ausmündung des Hodens zusammenhängt wie bei Taenioglossen. *Halia* hat ziemlich grosse Nebenspeicheldrüsen mit getrennten Mündungen.

Derselbe. Sur l'anatomie de l'Ampullaire. Bull. Soc. philom. VII 12. p. 5—7.

Derselbe. Sur l'anatomie et les affinités zoologiques des Ampullaires. C. rend. 106. p. 370—72. Beide Arbeiten sind vorläuf. Mitth. zur folgenden.

Derselbe. Etude sur l'organisation des Ampullaires. Mém. soc. philom. Cent. p. 63—85.

Die Ampullarien haben zwei verschiedene Nierenkammern, eine vordere dreieckige (rechte) von blättrigem Bau und eine hintere (linke), deren Wandung ein Gefässnetz enthält; die letztere hängt durch einen Gang mit der ersten zusammen und diese öffnet sich allein in den Mantelraum durch eine weite Mündung, an die sich eine Furche anschliesst, welche rechts durch den Genitalgang, links durch einen dorsalen Wulst begrenzt ist. Ein Zusammenhang mit dem Pericardium wurde nicht gefunden. Der Oesophagus erweitert sich dicht hinter dem Schlundkopfe bedeutend, wird dann allmählich enger und führt in den Magen, in welchen weite Gallengänge ausmünden; am Uebergange in den gewundenen Darm befindet sich ein Blindsack. Wie Bouvier schon früher ausgesprochen hat, ist

die sog. linke Kieme das Spengel'sche Organ, während die rechtsgelegene der linken anderer Prosobranchier entspricht, welche durch die Ausbildung der Lunge verschoben ist. Die Circulation in den Nieren ist wie bei *Haliotis*: aus der einen Kammer geht das Blut in die Kiemen, aus der anderen direct ins Herz. Aus der Herzkammer entspringt ein Stamm, der sich in die hintere und die vordere Aorta theilt; am Anfange der letzteren findet sich eine starke Erweiterung. Die vordere Aorta zieht über den Oesophagus nach rechts und kreuzt die Hauptschlundringe. Die männlichen Fortpflanzungsorgane bestehen aus dem Hoden, einem engen Ausführungsgange, der sich zu einem Samenbehälter erweitert; in einiger Entfernung von deren äusserer Mündung ist ein aus einem Penis und einer scheidenartigen Bildung bestehendes Copulationsorgan gelegen, das vom Mantel aus gebildet ist. Das Ovarium ist mit der grossen Eiweissdrüse in die Höhlung der linken Nierenkammer eingebettet. Das vom Verf. schon früher beschriebene Nervensystem ist durch eine lange Cerebralcommissur, eine Labial- (untere Schlund-)commissur und die doppelte Zygoneurie ausgezeichnet, indem das rechte Pleuralganglion mit dem Subintestinalganglion verschmolzen, während das linke mit dem Supraintestinalganglion durch den linken Mantelnerv verbunden ist.

Pelseneer, P. Gibt es Orthoneuren? Bull. scient. Fr. Belg. III 1. p. 46—52.

v. Ihering hat bei *Cerithium* sowie bei *Ampullaria* nicht die ganze Visceralcommissur richtig verfolgt, beide Gattungen sind chiastoneur, und die Neritiden zeigen auch nur eine falsche Orthoneurie, wahre Orthoneuren giebt es unter den Prosobranchiern nicht.

Boutan, L. Contribution à l'étude de la masse nerveuse ventrale (cordons palléaux-viscéraux) et de la collerette de la Fissurelle. Arch. Zool. exp. gén. II, 6. p. 375—421.

Gegen B. Haller hält Boutan an seiner Ansicht fest, dass die ventrale Nervenmasse von *Fissurella* aus der Verschmelzung zweier verschiedener Theile hervorgegangen sei, Pedalganglien und erste asymmetrische Ganglien. Es werden, um das zu beweisen, Querschnitte durch Jugendstadien von *Fissurella gibba* abgebildet. Die Krause (*Epipodium*) soll hier so nahe Beziehungen zum Mantel zeigen, dass man sie als einen Theil des letzteren ansehen könne, und sie ist daher als „unterer Mantel“ zu bezeichnen (vgl. Pelseneer p. 384 dieses Berichtes).

Derselbe. Réponse à Mr. Pelseneer. Lille 88. 6 pp. (Polemisch).

Haller, B. und Pelseneer, P. Replique à Mr. Boutan. Bull. sc. Fr. Belg. III 1 p. 514. (Polemisch).

Garnault, P. Recherches anatomiques et histologiques sur le *Cyclostoma elegans*. Act. Soc. Linn. Bordeaux 41, 1887. p. 11—158 (s. vor. Ber. p. 268). Eine Kieme ist noch spurweise vorhanden; Athmung findet auch in retrahirtem Zustande durch die Schale hindurch statt. Die Schnauze und Mundhöhle enthalten Sinneszellen;

an den Seiten der Mundhöhle ist das Epithel drüsig. Der Magen wird durch Falten in 2 Abschnitte getheilt, sein Epithel trägt keine Cilien. Im Anfange des Darmes steckt ein gelatinöser Pfropf. Das Epithel des Darmes ist im Anfange bewimpert, weiterhin körnig, ohne Cilien und durch verschiedene Höhe faltig, am Ende körnig, bewimpert und enthält Becherzellen. Die Leber besteht aus zwei Lappen; das Epithel der Läppchen ist mehrschichtig und wimperlos. Die Muskeln des Herzens sind pigmentirt, eine Klappe zwischen Vorhof und Herzkammer ist nicht vorhanden, sondern mehrere muskulöse Fortsätze. Die Arterien sind von einem Endothel bekleidet, sie münden in Lacunen aus. Einzelheiten über den Verlauf der Gefässe. Das Epithel des Pericardiums ist excretorisch, das der Niere mehrschichtig, nur zum kleineren Theil bewimpert. Eine Concrementdrüse, welche eine specielle Eigenthümlichkeit von *Cyclostoma* ist, dient zeitweise zur Ablagerung von Harnsäure. Die obere Fussdrüse ist ein Sack, dessen Wandung Drüsenzellen enthält und in welchen Canäle führen, die mit den Bluträumen in Verbindung stehen sollen; die untere Fussdrüse zeigt tubulösen Bau. Die Mantelnerven der Pleuralganglien, die indessen — namentlich auf der rechten Seite — den grössten Theil ihrer Fasern aus den Pedalganglien erhalten, verbinden sich mit denen aus den Sub- und Supraintestinalganglien. Die Ganglienzellen zerfallen in grössere, wahrscheinlich motorische an der Peripherie der Ganglien, und kleinere, wohl sensibler Natur, mehr im Innern gelegen. Verbindung der Fortsätze mit dem Kerne kommt nicht vor. Die motorische Endigung der Nervenfasern ist baumförmig verzweigt. Die Fühler sind fähig, Gerüche wahrzunehmen. Eingehende Beschreibung des Baues der Augen, die Stäbchen- und Pigmentzellen sollen sensibel sein. Das Pigment der Haut ist bindegewebigen Ursprungs. Die Zellen, welche die Geschlechtsprodukte liefern, zeigen embryonale Eigenschaften. Der Eierstock ist ziemlich klein, einfach oder wenig verzweigt. Am Eileiter findet sich eine Samenblase, der Uterus besteht aus zwei verschieden gefärbten Theilen. Der Hoden zeigt eine Zusammensetzung aus Schläuchen; der Endtheil des Vas deferens ist stark muskulös. Im Penis liegt ein Nervenplexus. Aus den Kernen der männlichen Keimzellen entstehen durch Theilung die Köpfe der Spermatozoen.

Derselbe. Rectification. Zool. Anz. Nr. 292. p. 623, 24. Die vordere Aorta von *Cyclostoma* verläuft unter dem Connectiv zwischen Supraintestinal- und Abdominalganglion.

Derselbe. Note sur l'organisation de la *Valvata piscinalis*. C. r. Soc. Linn. Bord. 1888. p. 22—25.

Derselbe. Sur l'organisation de la *Valvata piscinalis*. Comptes rend. 106, p. 1813—15. Ref.: Le Naturaliste 10. p. 171. Die Niere besteht aus einem langen Gange, der durch einen Vorsprung in zwei Räume getrennt ist, der rechte hängt mit dem Pericard durch einen weiten Kanal zusammen, der von einem Epithel mit langen

Cilien bekleidet ist, während der Ausführungsgang vom unteren Ende der Niere entspringt. Das Epithel der letzteren besteht aus einer Art von Zellen, welche bei der Secretion im Ganzen abgestossen werden sollen. Das Pericard ist nicht drüsig, wohl aber die Wandung des Vorhofes. Vom Kiemennerv wird das wenig hervortretende Spengel'sche Organ versorgt. Das Filament am Mantel soll den Gebilden, welche bei jungen Paludinen vorkommen, homolog sein.

Bernard, F. *Recherches anatomiques sur la Valvata piscinalis*. C. rend. 107. p. 191—94.

Angaben über das Circulationssystem — im Venensystem wird ein vorderer Abdominalsinus, ein querer Mantelsinus und ein Mantelrandsinus beschrieben, — die Kieme, die Niere, welche durch einen links vom Rectum zwischen Mantelrand und Kieme gelegenen Ausführungsgang ausmündet; rechts von diesem liegt ein Blindsack mit der Oeffnung ins Pericard. Das Nervensystem ist ähnlich wie bei *Bithynia*. Die Zwitterdrüse liefert peripher Eier, in der Mitte den Samen; das Vas deferens folgt dem Eileiter, es zeigt eine kleine Erweiterung und eine Anhangsdrüse; nahe dem Auge tritt es zum Penis. Der Eileiter nimmt die Erzeugnisse zweier Eiweissdrüsen auf und zeigt ein kleines Divertikel.

Derselbe. Sur le manteau des Gastéropodes prosobranches et les organes qui en dépendent. C. rend. 106. p. 681—83. Ausz.: Journ. R. Micr. S. 88, p. 399. In der Nebenkieme der Monotocardier verbinden sich die letzten Verzweigungen der Nerven ausserhalb der Basalmembran mit einem Netze multipolarer Zellen mit granulirten Kernen, die fast die ganzen Zellen erfüllen. Die äussersten dieser Zellen tragen Stäbchen, die oft auf kleine Köpfchen reducirt sind und die zwischen die pigmentirten, wimperlosen Epithelzellen eindringen. Bei einigen Formen (*Vermetus*, *Littorina*, *Bithynia*) findet sich ein Ganglion, das zahlreiche Nerven zum Epithel entsendet. Die Nebenkieme von *Paludina* zeigt etwa 20 schräge Blindsäcke, die sich an der Seite der Kieme öffnen; ihr Epithel ruht direkt auf dem Ganglion, von dem sie eine kleine Zahl von Fasern erhalten. Bei Diotocardiern verhält sich das Ganglion sowie die Nerven vollkommen wie bei *Littorina*. An den sensiblen Zellen der Nebenkieme wurden keine Borsten wahrgenommen. Die Mucusdrüse enthält ein reiches Netz von Nervenfasern und Sinneszellen. — Das Epithel besteht durchweg aus indifferenten, pigmentirten, sensiblen und secretorischen Zellen, von denen bald die eine, bald die andere Art überwiegen kann, wodurch dann bald Sinnesorgane, bald Drüsen entstehen.

Perrier, R. Sur le rein des Gastéropodes prosobranches monotocardes. C. rend. 106. p. 766—68. Ausz.: J. R. M. S. 88 p. 399 bis 400 und Centralbl. Physiol. 2 p. 100.

Die Niere von *Littorina* ist eine weite Tasche rechts vom Pericard und hinter der Mantelhöhle, mit beiden in Zusammenhang.

Verzweigte Lamellen springen ins Innere vor, in denen Gefässe mit deutlichen Wandungen verlaufen. Das Epithel, welches diese Lamellen bekleidet, ist einschichtig und besteht aus secernirenden und Wimperzellen, von denen die letzteren auf den Rändern, die ersteren in den Vertiefungen stehen. Die secernirenden Zellen verbleiben an ihrem Orte und stossen nur Bläschen aus, welche man früher für Zellen gehalten hat (B. Haller). Am Pericardium liegt ein von der Niere verschiedenes und getrenntes Organ, das B. Haller als Nierenlappen angesehen hat; grosse verzweigte Kanäle, welche in die Niere münden, dringen in diesen Kanal ein, der mit dem Vorhofe in Verbindung steht.

Derselbe. Sur l'histologie comparée de l'épithélium glandulaire du rein des Gastéropodes prosobranches. C. rend. 107. p. 188—91. Die Nierenzellen von Fissurella sind von einer Art, gross, mit rundem, mehr oder weniger basalen Kern; sie schliessen keine Excretionsblasen ein, aber können Concremente enthalten, die wahrscheinlich durch Osmose abgegeben werden. Dagegen besteht die Niere höherer Taenioglossen (Cassidaria) aus einem complicirten Netzwerk von Bindegewebsbalken, welche Blutlakunen enthalten und mit Epithel bekleidet sind, das aus Wimperzellen und Drüsenzellen besteht, die in den tieferen Theilen von gewöhnlicher Art sind; ausserdem aber finden sich noch andere mit einer Vacuole und Granulationen ähnlich den mukösen Drüsen. Garnault gegenüber hält Perrier an seiner Behauptung fest, dass bei der Secretion die Epithelzellen erhalten bleiben.

Derselbe. Sur un organe nouveau des Prosobranches. C. rend. Soc. Biol. VIII 5 p. 569—71.

Der „vordere Nierenlappen“ B. Hallers ist ein besonderes Organ, vielleicht eine „Blutdrüse“, das bei vielen Taenioglossen (s. oben v. Littorina) und bei allen Stenoglossen vorhanden ist. Bei Paludina, Vermetus und Cerithium wird es wahrscheinlich durch die verdickte Wand des Vorhofs ersetzt, die ähnliche Structur zeigt. Vermuthlich ist es durch Divertikelbildung des Vorhofes entstanden. Die Pericardialdrüse (Grobben) der Rhipidoglossen ist eine andere Bildung. Cuénots „Blutdrüse“ bei Paludina (s. vor. Ber. p. 277) ist keine solche, vielmehr die mit Wimperepithel bekleidete äussere Wandung der Kiemenarterie.

Fischer, P. Note sur l'animal du genre Cyclosurus Morelet. Journ. Conchyl. III 28. p. 293—96. Beschreibung des Aeusseren und der Radula, sowie Abbildung der letzteren, welche durch die grössere Zahl der Zähne an den Seitenplatten von anderen Gattungen der Cyclophoriden verschieden ist.

Call, R. E. On the gross anatomy of Campeloma. Amer. Natur. 22 p. 491—97.

Zabriskie, J. L. The Radula of the Conch, Sycotypus canaliculatus. Journ. N. Y. Micr. Soc. 4 p. 1—7.

Smith, Edg. A. Notice of an abnormal growth in a species of Haliotis. Ann. Mag. nat. hist. VI 1 p. 419—21. Ausz.: J. R. M. S.

88 p. 59. Ueber das abnorme Vorkommen einer zweiten Reihe von Schalenlöchern bei einer *Haliotis gigantea*. — Bei *Haliotis tuberculata* sind nicht soviel Tentakel am Mantelschlitz vorhanden, wie in Fischers Manuel de Conchyliologie gezeichnet sind, sondern nur drei, einer über dem After, einer am linken und einer am rechten Mantellappen.

Amans, P. C. Comparaisons des organes de la locomotion aquatique. Ann. Sc. nat. VII. 6. p. 130—32.

Beschreibung der Bauchflosse und des Schwanzes von *Pterotrachea*, mit den bewegenden Muskeln. Die Bauchflosse, welche das Thier nach oben wendet, wird der Rückenflosse von *Hippocampus* verglichen. Die Schwanzflosse ist zum grössten Theil vertical, eine herzförmige Flosse am Ende horizontal, dadurch entspricht sie dem Schwanz der Fische ebensowohl wie dem der Cetaceen.

Maltzan, Gr. von. *Ovula acicularis* Lam. an *Gorgonia flabellum* L. lebend. Sitzb. Ges. nat. Fr. p. 53. Anpassung in der Färbung.

B., L. Les balayeurs de la plage: la Nasse. Rev. biol. Nord France. 1. p. 34—38. Ueber die Lebensgewohnheiten, besonders das Fressen, von *Nassa reticulata*.

Giard, A. Fragments biologiques. 12. Castration parasitaire probable chez les *Pterotrachea*. Bull. sc. Fr. Belg. III 1. p. 309, 10. Barrois hat unter 30 Exemplaren 2—3 mit Hoden und Saugnapf gefunden, die keinen Penis besaßen. Dieser mag durch Crustaceen abgebissen oder durch innere Parasiten unterdrückt sein, ähnlich wie Giard bei Paludinen, die mit *Distomum militare* inficirt waren, den Penis oft sehr reducirt gefunden hat.

Köhler, S. Sur la double forme des spermatozoides chez les *Murex brandaris* et *trunculus* et le développement de ces spermatozoides. C. rend. 106. p. 299—301. Ref. Le Naturaliste 10 Nro. 24 p. 63, Journ. R. M. S. 88 p. 200. Vorläuf. Mitth. zur folg. Arbeit.

Derselbe. Recherches sur la double forme des spermatozoides chez le *Murex brandaris* et le *Murex trunculus*. Rec. Zool. Suisse 5. p. 101—50. Ausz.: J. R. M. S. 89 p. 371—72.

Köhler findet bei *Murex* ähnlich wie bei Pulmonaten die Schicht, welche den Hoden auskleidet, aus einer Protoplasmalage mit eingestreuten Kernen gebildet. Aus diesen entstehen zwei von ihrem ersten Erscheinen an deutlich verschiedene Elemente: grosse Zellen mit bestimmten Umrissen, die Mutterzellen der wurmförmigen Spermatozoen, und kleinere membranlose Zellen, die Mutterzellen der fadenförmigen Spermatozoen. Die ersteren gehen in grosse vielkernige Zellen über; aus einem Kerne entsteht sodann ein Faserbündel, dessen eines Ende ein Cilienbüschel, dessen anderes das Kopfende des wurmförmigen Spermatozoons aus sich hervorgehen lässt. Die anderen Kerne verschwinden alsdann grösstentheils und gehen in Körnchen über. Während die wurmförmigen Spermatozoen bei *Murex brandaris* spindelförmig und fast unbeweglich sind, sind

die von *M. trunculus* wurmförmig und sehr beweglich, worin sich ein ursprünglicherer Zustand ausspricht. Sie haben weder terminale Cilien noch einen centralen Faden wie bei *Paludina*. — Eine physiologische Bedeutung haben diese Gebilde der Prosobranchier nicht, morphologisch sind sie Eiern gleichwertig, sodass sie dem Hoden den Charakter einer Zwitterdrüse verleihen.

Herdmann, W. A. Egg masses on *Hydrobia ulvae*. *Nature* 38. p. 197. Auf den Schalen der Schnecken wurden Eierhäufchen gefunden, die wahrscheinlich von anderen Exemplaren der Art herührten.

Osborn, H. L. On the early history of the foot in Prosobranch Gasteropods. *Proc. Amer. Ass. Advanc. Sc.* 36, Meeting 1887. An *Fasciolaria* und *Fulgur* wurde die Entstehung des Fusses als paarige Erhebung des Ectoderms beobachtet, deren Hälften frühzeitig mit einander verwachsen. Verf. ist unsicher, ob dieser Thatsache phylogenetische Bedeutung zukommt.

Grobben, C. Zur Morphologie des Fusses der Heteropoden. *Arb. Inst. Wien* 7. 1887 p. 221—32. (vgl. vor. Ber. p. 266). Grobben schliesst sich ebenso, wie es bereits Gegenbaur gethan, an die von Souleyet vertretene Auffassung bezügl. des Heteropodenfusses an; er nimmt *Oxygyrus Keraudrenii* zum Ausgangspunkte, wo der Saugnapf von bedeutender Grösse und mit dem vorderen flossenförmigen Abschnitte mit gemeinsamem Stamme am Körper entspringt. Bei *Atlanta Peronii* ist der Saugnapf mehr reducirt und erscheint mehr als ein Anhang der breiter gewordenen Flosse; in beiden Gattungen findet sich auf einem hinteren Abschnitte ein Deckel. Bei *Carinaria* ist die Flosse sehr vergrössert und der Saugnapf an ihrem Hinterrande herabgerückt; der Deckel ist verloren gegangen und der ihn früher tragende Abschnitt bildet das schwanzartige Hinterende des Körpers. Aehnlich verhält sich *Pterotrachea*, wo der Saugnapf gewöhnlich nur den Männchen zukommt. — Der Saugnapf der Heteropoden ist ein „Homologon des söhligen Fusses der Prosobranchier“, der Kielfuss dagegen ursprünglich ein Schwimmlappen, der am vorderen Rande des Protopodiums entstand und sich allmählich zwischen Körper und Sohle hineingrängte. Die Strombiden zeigen ähnliche Verhältnisse wie die älteren Heteropoden. — Der Schwimmlappen wird als *Pterygopodium* bezeichnet (vgl. Kalide p. 383 d. Ref.).

Fewkes, W. The sucker on the fin of *Pterotrachea*. *Zool. Anz.* Nr. 271. p. 64—65. Ref.: *Journ. R. M. S.* 88. p. 205. Verf. bestätigt das Vorkommen des Saugnapfes auch am Fusse der Weibchen, was er bereits vor Paneth und Grobben beschrieben hat (vgl. Giard p. 415 d. Ref.).

Joseph, M. Die vitale Methylenblau-Nervenfärbungsmethode bei Heteropoden. *Anatom. Anz.* 3. p. 420—24. An den grösseren Nervenstämmen sieht man tiefblau gefärbte Fasern, umgeben von einem helleren Mantel, der dem Neurilemm angehört und dunkelblau ge-

färbte Kerne enthält. Die Varicositäten sind wahrscheinlich als Zeichen beginnenden Absterbens anzusehen. Beim Eintritt der Nerven in ein Muskelbündel ist eine kernhaltige protoplasmatische Anschwellung vorhanden, im weiteren Verlauf durch den Muskel war ein Netzwerk wahrnehmbar, von welchem feine Stränge abgingen, die mit dem Muskelprotoplasma in Zusammenhang standen.

b) *Opisthobranchiata.*

Bergh, R. Malacologische Untersuchungen. Nudibranchien vom Meere der Insel Mauritius. Semper, Reisen im Archipel der Philippinen. Bd. 2. Heft 16, erste Hälfte p. 755—814.

Beschreibung der Morphologie zahlreicher neuer Arten, welche durch Moebius gesammelt sind; dieselben gehören zu den Familien der Plakobranchidae, Phyllobranchidae, Hermaeidae; Aeolidiadae (Baeolidia n. g.), Melibidae, Dotonidae, Tritoniadae; Dorididae.

Derselbe. Beiträge zur Kenntniss der Aeolidiaden. IX. Verhandl. zool.-botan. Ges. Wien 38. p. 673—706. Aehnliche Beschreibungen von Arten der Gattungen Aeolidiella, Glaucus, Hervia, Moridilla, Cerberilla, Melibe, Doto, Hero.

Derselbe. Die Pleuroleuriden, eine Familie der nudibranchiaten Gastraeopoden. Zool. Jahrb. Abth. System. 3. p. 348—64. Bergh weist auf die Unterschiede zwischen Phyllidiaden und Pleurophyllidien hin, von denen die ersteren mit Dorididen (Doriopsen), die letzteren mit Aeolidiaden stammverwandt sind. Den Pleurophyllidien steht die Gruppe der Pleuroleuriden sehr nahe, der Hauptunterschied besteht im Mangel an Kiemen und Seitenlamellen bei diesen. Sodann giebt Verf. eine Beschreibung der bekannten Arten.

Vayssière, A. Recherches zoologiques et anatomiques sur les Mollusques opisthobranches du golfe de Marseille. II. Nudibranches (Cirrobranches) et Ascoglosses. Ann. Mus. Hist. Nat. Marseille 3, Mém. 4. 160 pp. Berghs Cladohepatica werden in Dendrobranchia mit compacter Leber und Cirrobranchia, bei denen die Leber in die Cirren sich fortsetzt, eingetheilt. Facelina marioni hat ein eigenthümliches Copulationsorgan. Beschreibung der Nesselapparate von Doto cinerea. Die Ascoglossen theilt Verf. in Cirrobranchia, Pterobranchia, Abranchia und Steganobranchia. Specielle Beschreibungen der Thiere.

Derselbe. Sur la position systématique du genre Héro. C. rend. 107. p. 136—38. Ref.: Le Naturaliste 10 Nr. 34 p. 183. Ann. Mag. Nat. Hist. VI 2 p. 196—97. Die Gattung Hero ist nicht in die Nähe der Dendronotidae, sondern zu den Aeolididae zu stellen, wofür schon die Form der Kiefer und der Radula spricht. Vor den Rhinophorien steht jederseits eine Gruppe von Anhängen mit deutlichen Cirren, während die hinteren nur mit 2—3 rudimentären Cirren versehen sind.

Fischer, P. Note sur une monstruosité du *Triopa clavigera* Lovén. Journ. Conchyl. 28. p. 131—32.

Fischer beobachtete einen dreiästigen rechten Rhinophor, während der linke normal war.

Trinchese, S. Ricerche anatomiche sul genere *Govia*. Mem. Accad. Bologna IV 7, 1886. p. 183—191. Beschreibung des Aeusseren sowie der Anatomie, besonders Angaben über den Darmtract, das Nervensystem und die Genitalorgane.

Saint-Loup, R. Observations anatomiques sur les *Aplysies*. C. rend. 107, p. 1010—12. Ausz.: Journ. R. Micr. S. 89. p. 195—96. Die männlichen und weiblichen Fortpflanzungsorgane sind nicht gleichzeitig functionsfähig. Das venöse Blut aus dem linken seitlichen Venensinus und aus dem Bojanus'schen Organ mischt sich mit dem arteriellen Blute aus der Kieme, die sich häufig contrahirt, um das Blut ins Herz zu treiben. Die Purpurdrüse hat eine nierenähnliche Function (Excretion).

Robert, Éd. Sur la spermatogénèse chez les *Aplysies*. C. rend. 106. p. 422—25. Ausz.: Rev. scient. 41 p. 218—19 und Journ. R. M. S. 88 p. 397—98. Die Spermatoblasten haben einen runden, stark färbbaren Kern, dieselben theilen sich karyokinetisch. Später wird das Protoplasma der Zelle vom Kern resorbiert, während dieser in eine grosse Zahl von Stücken zerfällt, die sich verlängern und Spiralform annehmen, bis sie durch Platzen der Membran frei werden; in anderen Fällen theilen sich die Kerne nicht, sondern erzeugen nur ein Spermatozoon. Robert sieht diesen Fall nicht als principieell vom andern verschieden an.

Lacaze-Duthiers et Pruvot. Sur le développement de la *Philine aperta*. C. rend. 16 sess. Assoc. Franç. avanc. sc. 1887. p. 260. Der Blastoporus bildet eine Spalte, er lässt den Mund und die Schalendrüse aus sich hervorgehn. Während Augen am Kopfe fehlen, wurde ein unpaares Auge an der rechten Seite in der Nähe des Afters beobachtet (vgl. vor. Ber. p. 282). Das Mesoderm entsteht aus der untersten der 4 grossen Dotterzellen. Der Embryo verändert sich nach dem Ausschlüpfen nur wenig. Fuss und Velum atrophiren, während die Schale wächst. Wenn das Thier anfängt zu kriechen, wird wahrscheinlich die Larvenschale abgeworfen.

Rho, Fil. Studiî sullo svilnppo della *Chromodoris elegans*. Atti Acc. Napoli II 1, App. No. 3. 7 pp. Der Blastoporus schliesst sich, während die Mundöffnung am entgegengesetzten Pole entsteht. Aus dem Entoderm entsteht der Magen und zwei ursprünglich dorsal gelegene Säcke. An der rechten Seite entsteht eine Larvenniere, während eine entsprechende linke fehlt. Ausserdem wurde eine birnförmige Kapsel beobachtet, die neben dem After ausmündet und die wahrscheinlich auch eine innere Oeffnung besitzt; sie ist jedenfalls ein Excretionsorgan. Das Nervensystem entsteht aus einer hufeisenförmigen ectodermalen Anlage, von der aus die Nerven wahrscheinlich durch Auswachsen hervorgehen.

Pelseneer, P. Report on the Pteropoda collected by H. M. S. Challenger during the years 1873—76. Pt. 2. Thecosomata. Rep. Chall. Part 65. 132 pp. Part 3. Anatomy. *ibid.* Part 56. 97 pp. Ref.: Amer. Natur. 22, p. 841. Anatomische Details von den einzelnen Formen. — Die Thecosomen sind ausgezeichnet durch ein paar Kopftentakel, eine grosse Manteldrüse, die Flossen umgeben den Kopf, die Radula zeigt in jedem Gliede 3 Zahnplatten (bis auf Gleba und Cymbuliopsis), zwei seitliche Kiefer und kurze Speicheldrüsen; der Kaumagen enthält 4 symmetrische und eine hintere Kauplatte und gewöhnlich 8 kleine vordere Platten; die Leber ergiesst sich durch wenige Oeffnungen in den vorderen Theil des Magens. Gewöhnlich ist eine Analdrüse vorhanden. Ein Copulationsorgan findet sich am Kopfe in der Nähe der Tentakel. Die Cerebralganglien liegen seitlich vom Oesophagus, die Pleuralganglien dicht neben denselben. Dagegen haben die Gymnosomen 2 paar Tentakel, die Flossen sind vom Mittelfusse getrennt und umgeben nicht den Kopf; Mantel und Schale fehlen. Am vorderen Theile des ausstülpbaren Rüssels finden sich Anhänge mit Drüsen und Sinnesorganen. Ausstülpbare Säcke mit hornigen Haken, ventral vereinigte Kiefer, lange Speicheldrüsen, unbewaffneter Magen umgeben von der Leber, die zahlreiche Oeffnungen besitzt, kurzer gestreckter Darm mit rechtsseitigem After kennzeichnen den Verdauungstractus. Penis rechts vom Fusse. Das Nervensystem besteht aus 8 Ganglien; die Cerebralganglien liegen über dem Schlunde dicht zusammen, die Pleuralganglien befinden sich in der Nähe der Pedalganglien. — Unter den Thecosomen sind die Cavoliniiden und Cymbuliiden, jede Gruppe für sich, mit den Limaciniden verwandt. Bei den gestreckten Formen zeigt der vordere Theil der Körpers eine Drehung von 180° um die Axe, verglichen mit den Limaciniden. In der Entwicklung der Cymbuliiden giebt es Stadien, welche den erwachsenen Limaciniden ähnlich sind, daher stehen die letzteren der Urform nahe, besonders *Peraclis*. An die Stelle der äusseren Kalkschale ist die Knorpelschale getreten. Aus den Limaciniden haben sich auch die Cavoliniiden mit symmetrischer Schale entwickelt. — Zwischen Pteropoden und Cephalopoden existirt kein verwandtschaftlicher Zusammenhang, die ersteren schliessen sich vielmehr an die Tectibranchier an. Der Deckel von *Limacina* ist dem von *Actaeon* sehr ähnlich, das „Schild“ der Thecosomen entspricht vollkommen der Hypobranchialdrüse von *Actaeon*. Die Radula, die Speicheldrüsen, Magenplatten, Gallengänge sind bei Thecosomen und Tectibranchiern sehr ähnlich; in beiden Gruppen findet sich eine Analdrüse, die bei *Actaeon* langgestreckt ist; die Pleuralganglien sind bei *Actaeon* wie bei den Thecosomen mit den Cerebralganglien verschmolzen. In ähnlicher Weise zeigen die Gymnosomen Beziehungen zu den Tectibranchiern, besonders zu *Notarchus* (Hakenbildung in der Mundhöhle entsprechend den Hakensäcken der Gymnosomen, Kieme auf der rechten Seite, Fortpflanzungsorgane, Nervensystem). Die Pteropoden sind nicht primitive Formen, sondern

von geringem Alter, sie leiten sich von den Tectibranchiern ab, und zwar die Thecosomen von Thieren, die zwischen Actaeon und Bulla standen und eine linksgewundene Schale besaßen, die Gymnosomen von Notarchus ähnlichen Thieren, deren Fussränder noch frei waren.

Grobben, C. Zur Morphologie des Pteropodenkörpers. Arb. zool. Inst. Wien 8 p. 155—57. Ausz: J. R. M. S. 89. p. 194.

Die Pteropoden sind pelagische Gastropoden (Opisthobranchier). Das Protopodium ist bei Gymnosomen deutlich erhalten und kann zur Festheftung verwendet werden; die „Epipodien“ (Flügel) sind am Protopodium „in beschränktem Sinne neugebildet.“ — Eine missverständene Stelle einer früheren Arbeit des Verf. über die „Rückdrehung des Eingeweidesackes“ wird erklärt.

c) *Pulmonata*.

Poirier, J. Observations anatomiques sur le genre Urocyclus. Bull. Soc. malac. France 4. 1887. p. 195—232 (s. vor. Ber. p. 269). Von mehreren Arten wird die Anatomie beschrieben. Der Kiefer hat einen medianen Zahn, die Radulaplatten sind dreispitzig, der langgestreckte Magen empfängt das Sekret der Leber durch 2 weit von einander entfernte Mündungen. Die Fussdrüse ist ziemlich kurz, die Schwanzdrüse hat einen verschieden geformten Vorderrand, ihre Höhlung zeigt runzlige Wandungen. Die Semper'schen Drüsen werden von einer Abzweigung des kleinen Tentakelnervs versorgt. Die Niere ist gut entwickelt, die Lunge ziemlich klein. Die Vagina ist mit einer grossen Samentasche versehen, während der männliche Ausführungsgang eine kleine Kalkdrüse trägt und in das lange Flagellum mündet, welches einen Anhang des Penis darstellt; eine grosse muköse Drüse ist besonders auffällig. Die Cerebralganglien haben eine kurze starke Commissur, die Connective zur ventralen Ganglienmasse sind beiderseits verschieden lang; den vorderen Theil der letzteren nehmen die Visceralganglien ein mit einer mittleren und zwei seitlichen Anschwellungen, während hinter der Durchbohrung für die vordere Aorta die grossen Pedalganglien liegen.

Derselbe. Description de l'*Estria alluaudi*, nouveau genre de limacien. Bull. Soc. philom. VII 11, p. 181—82. 1887. Vorläuf. Mitth. zur folg. Arbeit.

Derselbe. Étude anatomique de l'*Estria alluaudi*, nouvelle espèce de limacien africain. Mém. Soc. philom. Cent. p. 135—53. Die äussere Schale ist vorn und seitlich durch Mantellappen bedeckt; das Athemloch liegt etwas hinter der Mitte des rechten Mantelrandes. Die Fussdrüse ist langgestreckt; die Mündung der starken Schwanzdrüse bildet eine verticale Spalte, deren Vordergrenze stark vorspringt. Die Radula ist limaxartig, der Kiefer mit einem mittleren Vorsprunge versehen. Die vordere Lage der Zwitterdrüse, die Form der Vaginaltasche, der Kalkdrüse und eine muköse Drüse, die in den Penis mündet, unterscheiden die Gattung von ihren Verwandten.

Simroth, H. Ueber die azorisch-portugiesische Nacktschneckenfauna und ihre Bezeichnungen. Vorläuf. Mitth. Zool. Anz. p. 66 bis 70, 86—90. Bezüglich der thiergeographischen Angaben sei auf die Arbeit selbst verwiesen. Die palaearktischen Raublungenschnecken werden in 4 Familien getheilt: a) vitrinenähnliche (*Plutonia*), b) hyalinenähnliche (*Daudebardia*, *Testacella*), c) Glandiniden (*Glandina*), d) limaxähnliche (*Trigonochlams*). Angaben über die Morphologie dieser Gruppen. Die Vitrinen sind an die Wurzel eines sehr grossen Theiles der Pulmonaten zu stellen.

Derselbe. Ueber einige Themata aus der Malakologie. I. Ueber die Vitrinen. Sitzungsber. naturf. Ges. Leipzig 13, 14. p. 40—45. Simroth giebt eine vergleichende Beschreibung der Pfeildrüse und der benachbarten Organe bei verschiedenen Vitrinen und hält gegen Wiegmann daran fest, dass die letzteren primitive Zustände zeigen (Fussdrüse einfach, diffus, Fusssole dreitheilig, der die Schale bedeckende Mantel). An sie schliessen sich die Hyalinen und Limaciden, die Parmacellen und Zonitiden; die Heliceen stehen am höchsten.

Derselbe. *ibid.* IV. Ueber das Alter und die Verwandtschaft der Lungenschnecken. p. 48—50. Aehnliche Entwicklungsreihe — die Arioniden zeigen sehr alterthümliche Züge.

Derselbe. *ibid.* II. Ueber afrikanische Nacktschnecken. p. 45 bis 48. Die untersuchten gehören fast alle zu den Zonitiden und zeigen nur in den Genitalorganen tiefgreifende Unterschiede.

Hanitsch, R. Contributions to the anatomy and histology of *Limax agrestis*. Proc. biol. Soc. Liverpool 2, p. 152—70. Die Niere besitzt kein Flimmerepithel; indem die Falten mit der gegenüber liegenden Wand verwachsen, können sie zu Scheidewänden werden. Das Lacaze'sche Organ wurde nicht aufgefunden. Das Semper'sche Organ ist nicht ein Sinnesorgan, sondern eine Anhäufung grosser Drüsenzellen, welche in die Lippen ausmünden; die Nerven, welche scheinbar in das Organ treten, gehen vielmehr durch dasselbe hindurch zu den Lippen. Die letzteren sind von sehr hohem Epithel bekleidet. In der Fussdrüse wurden nur wenig Drüsenzellen, und in den seitlichen Theilen einige Sinneszellen wahrgenommen.

Uličný, Jos. Ueber die Mundwerkzeuge von *Ancylus fluviatilis* und *Velletia lacustris*. Verh. naturf. Vereines Brünn 26, 1887 p. 120 bis 23. Ausz.: J. R. M. S. 89 p. 197.

Der Kiefer von *Ancylus* besteht aus etwa 100 rechteckigen, völlig getrennten Stücken, die einen tiefen Bogen bilden; an den Seiten liegen sie zu 4—6 neben einander, während eine schmale Brücke beide Hälften verbindet. Auch der Kiefer von *Velletia* besteht aus zahlreichen Stücken, die mehr in die Länge gestreckt sind und eine einfache bogenförmige Reihe bilden. Es werden auch die Reibplatten beschrieben; die von *Velletia* zeigt an den Seiten eine Anzahl hakenloser Platten, hierdurch und durch die geringere Anzahl von Platten unterscheidet sich die Radula von derjenigen von

Ancylus. Wegen der Verschiedenheiten des Kiefers sowie der Radula glaubt Verf., dass die Familie der Limnäiden in mehrere selbständige Familien zu trennen sein wird.

Pollonera, C. Molluschi della Scioa e della valle dell'Havash. Bull. Soc. mal. Ital. 13. p. 49—86. Die übrigens systematische Arbeit bringt Abbildungen der Geschlechtsorgane, Kiefer und Radulazähne von *Fruticicola lejeana* Bourg., *F. scioana* Poll. und *Sitala trochulus* Poll.

Petit, L. Sur les mouvements de rotation provoqués par la lésion des ganglions susösophagiens chez les escargots. C. rend 106 p. 1809—11. Ref.: Le Naturaliste 10 No. 33 p. 171 und J. R. M. S. 88 p. 717—18, sowie Centralbl. Phys. 2 p. 402—03. Abtragung eines oberen Schlundganglions von *Helix aspersa* bewirkt, dass das Thier in Spiralen nach der verletzten Seite hin kriecht; bei Durchschneidung der Pleuropedalconnective einer Seite beschrieb das Thier gekrümmte Linien, die durch Schleifen verbunden waren, allmählich aber nahm es mehr seine normale Bewegung an. Die Zerschneidung der Cerebralcommissur bewirkte eine ähnliche Bewegungsart. Bei Zerstörung der oberen Schlundganglien war das Thier nicht im Stande, aus der Schale herauszukommen, wogegen die Abtragung der Pleuropedalganglien das Zurückziehen verhinderte und in kurzer Zeit den Tod herbeiführte. *Limax*-Arten zeigen bei einseitiger Verletzung eine entgegengesetzte Bewegung als *Helix*; vielleicht liegt der Grund darin, dass die ersteren gleich nach der Operation, die letzteren erst nach längerer Zeit beobachtet wurden.

Biedermann, W. Beiträge zur allgemeinen Nerven- und Muskelphysiologie. 14. Ueber das Herz von *Helix pomatia*. Sitzber. Akad. Wien. Bd. 89, 3. Abth. 1884. p. 19—55. Verf. berichtet über das Verhalten des Herzens bei mechanischer und electricischer Reizung (vgl. dazu B. Haller).

Folin, de. A propos du *Rumina decollata*. Naturaliste 10 p. 79. Ausz.: Nachrichtsbl. mal. Ges. 20. p. 120. Die Poren des Septums, welches *Rumina* nach dem Abbrechen der obersten Windungen an der Bruchstelle bildet, vermitteln die Athmung, während das Thier sich bei der Eiablage mit der Mündung und den letzten Windungen in die Erde eingräbt. Bei einem Versuche mit der Luftpumpe an einem Thier, dessen Mündung durch Wachs fest verschlossen war, strömten unter Wasser Luftbläschen durch das Septum aus.

Gain, W. A. Respiration of *Ancylus fluviatilis*. Journ. Conchol. 5. p. 331. Bei *Ancylus* findet die Athmung durch Aufnahme der von den Nährpflanzen producirtcn Luftbläschen statt, welche fünfmal soviel Sauerstoff enthalten als die atmosphärische Luft.

Williams, J. W. The red fluid emitted by *Planorbis corneus*. ibid. p. 363. Verf. schliesst aus dem Vorhandensein von Haemoglobin in der von *Planorbis corneus* beim Abtöden aus der Lunge abgeschiedenen rothen Flüssigkeit, dass letztere Hämolymphe sei, welche

durch Bruch der Venenwandungen infolge heftiger Muskelcontractionen in die Lunge gelangt.

Bretonnière, J. Perforation de roches calcaires par des escargots. C. rend. 107. p. 566—67. Ref.: Le Natural. 10 No. 39. p. 243. Berichtet über Löcher in den Felsen, in denen die Schnecken an den Wänden sitzen; es ist anzunehmen, dass die Thiere die Löcher selbst gemacht haben.

Forel, F. A. Calcaire perforé par l'*Helix aspersa*. Arch. Sc. nat. III 20. p. 576. Sehr harter Kalk aus Algier zeigte bis 12 cm. tiefe Löcher, in denen Thiere der genannten Art sich aufhielten.

Stahl, E. Pflanzen und Schnecken. Biologische Studie über die Schutzmittel der Pflanzen gegen Schneckenfrass. Jen. Zeitschr. Nat. 22. p. 557—684. Viele Pflanzen sind durch chemische oder mechanische Schutzmittel (Raphiden, Behaarung) gegen Schneckenfrass geschützt, und manche dieser Mittel mögen durch die Schnecken gezüchtet sein.

Braun, M. Ueber den Harnleiter bei *Helix*. Nachrichtenblatt malak. Ges. 20. p. 109—13.

Braun fand nur bei einem vielleicht kleineren Theile der *Helix*-Arten einen geschlossenen Harnleiter, während derselbe bei anderen eine ganz offene Rinne bildet; auch wurden bei noch anderen einzelne Stadien des successiven Verschlusses der Harnleiterrinne beobachtet. Vielleicht ist der Verschluss der primären Rinne zum secundären Rohr innerhalb einzelner *Helix*-Gruppen selbständig aufgetreten.

Derselbe. Ueber die Entwicklung des Harnleiters bei *Helix pomatia* L. Ebenda p. 129—33.

Die Niere stellt in einem sehr frühen Stadium einen kleinen Blindsack mit spaltförmigen Lumen dar, der in die Lungenhöhle neben der rechten Urniere mündet. Später besteht der Harnapparat aus zwei Abschnitten, einem einfachen Drüsenkörper (Niere) und einem kurzen Ausführungsgange (primärer Harnleiter v. Ihering). Letzterer setzt sich in eine breite mit Cyliinderepithel bekleidete Rinne fort, welche fast die Hälfte der Lungenhöhlenwandung einnimmt und durch Längsfalten jederseits begrenzt ist. Bei der nun erfolgenden Knickung der bisher geradlinigen Anlage legt sich der primäre Harnleiter über den Drüsenkörper und wendet sich nach hinten; der Hohlraum des Drüsenkörpers vergrößert sich und tritt mit dem Herzbeutel in Verbindung, während in den Zellen die ersten Concretionen auftreten. In einem späteren Stadium legen sich die Ränder der Rinne zu einem geschlossenen Rohr zusammen (secundärer Harnleiter), welches neben dem After ausmündet. Dadurch ist v. Iherings Annahme bestätigt. Bei den Süßwasserpulmonaten erhält sich der Harnapparat auf dem primären Stadium ohne secundären Harnleiter. — Trotzdem ist von Iherings hierauf basirte Theilung der Pulmonaten in Nephropneusten und Branchiopneusten nicht haltbar, da bei 2 dieser

Nephropneusten (*Bulimus pupa* und *Pupa avenacea*) von Behme ein den Branchiopneusten entsprechenden Harnapparat gefunden wurde; hier verläuft nämlich von der vorderen Nierenspritze ab in der Entfernung von 2—3 mm. vom Enddarm ein geschlossener Harnleiter und mündet vorn in die Lungenhöhle etwas hinter dem After. Dieser Harnleiter dürfte nur dem primären von *Helix* und dem von *Limnaeus* entsprechen, während ein sekundärer fehlt.

Williams, J. W. *Limnaea auricularis* floating. Journ. Conchol. 5. p. 369.

Martens, E. v. Schnecken an Nadelhölzern. Sitzb. naturf. Fr. An Nadelholz sind Schnecken selten, es sind *Clausilia abietina* und *dubia*, *Pupa secale* und *Helix ciliata* gefunden.

Maltzan, H. v. *Helix Rossmassleri* und *Clausilia rupestris* an Nadelholz. ebenda, 63.

Kobelt, W. Schnecken an Nadelhölzern. Nachrichtsbl. malak. Ges. 20. p. 120—21. Kobelt fügt den genannten Schnecken einige hinzu, er fand *Helix Julieti* auf nadelbedecktem Boden, *Helix punica* an Wachholderbüschen.

Schröder, H. Schnecken an Nadelhölzern. Schr. Ver. Harz 3. p. 18—19. Unter der Borke gefällter Fichten wurden *Hyalina alliaria* Millet und *Patula ruderata* Studer, die sonst nicht in der Nähe vorkamen, gesammelt; einige *Helix*- und *Clausilia*-Arten werden nur zufällig an Nadelhölzer gerathen sein.

Grassi, B. u. Rovelli, G. Bandwurmentwicklung. I. Centralbl. Bacteriol. Paras. 3. p. 173. In *Limax cinereus* entwickeln sich die Eier von *Taenia proglottidina* Dav. aus Hühnern zu *Cysticercoiden*; durch Fressen der so inficirten Schnecken werden die Hühner angesteckt.

Semper, C. Ueber Brocks Ansichten über Entwicklung des Molluskengentialsystems. Arb. zool. Inst. Würzb. 8. p. 213—22 (vgl. vor. Ber. p. 280). Semper hebt hervor, dass Brocks „männlicher Gang“ nach seinen Zeichnungen zum *Receptaculum seminis* wird, während das sog. *Receptaculum seminis* Brocks den büschelförmigen Drüsen und dem Pfeilsack homolog ist. Eine *Helix pomatia* zeigte abnormer Weise eine Verbindung des *Receptaculum seminis* mit dem Zwittergange, wie sie bei *Vaginulus* und *Onchidium* normal vorhanden ist. Brocks Anschauungen sind daher unhaltbar.

Simroth, H. Ueber die Genitalentwicklung der Pulmonaten und die Fortpflanzung des *Agriolimax laevis*. Zeitschr. wiss. Zool. 45. p. 646—63 (vgl. vor. Ber. p. 280). Simroth bestreitet Brocks Auffassung bezügl. des sog. männlichen Ganges, dieser wird zum *Receptaculum seminis*. Penis und Vas deferens sind erst in der Reihe der Pulmonaten aufgetreten, ursprünglich waren die Fortpflanzungsorgane einfach. *Agriolimax* soll der Urform nahe stehen.

Klotz, J. Beitrag zur Entwicklungsgeschichte und Anatomie des Geschlechtsapparates von *Limnaeus*. Inaug.-Diss. 40 pp.

Der Penis von *Limnaeus* entsteht aus einer besonderen Anlage hinter dem Tentakel als eine hohle Einstülpung des Ectoderms. Für Uterus und Prostata ist eine weitere selbständige Anlage vorhanden, die hohl ist und jedenfalls dem Mesoderm entstammt. Der Penis wird mit der Uterus- und Prostata-Anlage secundär durch den cylindrischen Theil des Vas deferens verbunden; dieser entsteht vielleicht aus einer ectodermalen Rinne zwischen den Geschlechtsöffnungen. Die Anlage der Zwitterdrüse ist mesodermal; der Zwittergang entsteht theils von dieser, theils von der mittleren Anlage aus. Durch Faltungen trennen sich zunächst Uterus und Prostata, sodann der birnförmige Körper und das Receptaculum seminis. Durch Ausstülpung des Eileiters entsteht die Eiweissdrüse. Die Drüsenzellen im Uterus und in der Eiweissdrüse sind epithelial, in der Prostata dagegen nicht. Zum Schlusse giebt Klotz noch einige Notizen über gegenseitige Begattung von *Limnaea* und über Eiablage von *Helix*-Arten in Gefangenschaft.

Williams, J. W. On the Morphology of the Gonads in *Limnaea stagnalis* (L.) und *L. peregra* (Müll.). Journ. Conchol. 5. p. 364—69.

Bei *Limnaea stagnalis* ist die Zwitterdrüse eine Anhäufung von Follikeln, in der Mitteldarmdrüse gelegen, die Eiweissdrüse zungenförmig; es finden sich 2, selten 3 accessorische Eiweissdrüsen und an der Vagina eine Samentasche. Der Penis ist ein flaschenförmiger Sack, die Prostata eine kugelige Erweiterung vom Anfange des Vas deferens. *Limnaea peregra* hat einen langen dünnen Penis, eine viereckige Eiweissdrüse und nur eine accessorische Eiweissdrüse. Von den Fortpflanzungsorganen der *Helix*-Arten unterscheiden sich die der *Limnaea* durch die starke Trennung der männlichen und weiblichen Theile, das Vorhandensein einer deutlichen Prostata und der accessorischen Eiweissdrüsen, während die Mukusdrüsen, der Pfeilsack und das Flagellum fehlen.

Garnault, P. Sur la structure des organes génitaux, l'ovogénèse et les premiers stades de la fécondation chez l'*Helix aspersa*. C. rend. Soc. Linn. Bordeaux 88 p. 18—22. Vorläuf. Mittheilung zur folg. Arbeit.

Derselbe. Dasselbe. C. rend. 106 p. 675—78. Ref.: Le Naturaliste 10 No. 27 p. 100, Journ. R. M. S. 88 p. 398—99. Abstr. Rev. scient. 41 p. 315. Der Genitalgang zeigt eine Aussackung mit mehreren Blindsäcken, die während der Eiablage Eier und Samenfäden enthält. Die Eifollikel werden vom Keimepithel erzeugt. Zur Zeit der Ablage zeigen die Eier Fortsätze, hauptsächlich an der Seite, welche den Spermatozoen ausgesetzt ist. Bei der Auflösung des Keimbläschens werden die feinen chromatischen Theile desselben in das Eioplasma aufgenommen. Die männlichen Vorkerne, deren bis 3 in demselben Ei gefunden wurden, wachsen durch Anfügung von chromatischen Bestandtheilen des Eies und werden sternförmig, jedoch wurde in solchem Zustande stets nur einer beobachtet.

Prenant, A. Observations cytologiques sur les éléments séminaux des Gastéropodes pulmonés. La cellule, Rec. Cytologie Histol. gén. 4. p. 137—77. Vorläuf. Notiz dazu: Bull. Soc. Nancy II 9 p. 23—24. Ausz.: J.R.M.S. 88, p. 932. Das Protoplasma der Spermatogonien enthält Cytomicrosomen, die Rudimente des Nebenkerns, oder einen ausgebildeten Nebenkern. Bei den Theilungen entstehen wahrscheinlich aus den Resten der Spindel Cytomicrosomen und aus diesen der Nebenkern.

Bei der Entstehung der Spermatiden giebt ein äusserer fadenförmiger Fortsatz und ein intracellulärer Strang dem Schwanztheil seine Entstehung. Derjenige Abschnitt, welcher aus diesem inneren Strange hervorgeht und welcher in fertigem Zustande mit Spiralbändern ausgestattet ist, stellt ein Mittelstück dar. Der Nebenkern spielt nur eine untergeordnete Rolle bei der Bildung der Spiralfäden. Der Axenfaden zeigt am Vorderende, wo er sich mit dem Kerne verbindet, zwei über einander gelegene Knöpfchen, die aber später verschwinden. Der Kern nimmt in gewissen Stadien eine querovale Form an, während er sich weiterhin in die Länge streckt; er bleibt manchmal von einer geringen Protoplasamenge eingehüllt.

Braun, M. Zur Frage der Selbstbefruchtung bei Zwitter-schnecken. Nachrichtsbl. malak. Ges. 20. p. 146—48. Frisch ausgeschlüppte Junge von *Limnaeus* wurden isolirt aufgezogen und legten nach 14 Monaten Laich ab, aus dem sich wieder Junge entwickelten; dadurch ist die Möglichkeit der Selbstbefruchtung erwiesen. Die Thiere gediehen auch in einer 0,3% Seesalzlösung, ohne ihre Gestalt zu ändern. Die Zuchtversuche bestätigten auch Sempers Ansicht von der Abhängigkeit des Grössenwachstums von dem vorhandenen Raume.

Hartwig, W. Zur Fortpflanzung einiger Landschnecken, *Helix lactea* L. und *Helix nemoralis* L. Zoolog. Garten 29. p. 148—51. Sehr bald nach dem Erwachen aus der Erstarrung im Winter copulirten sich zwei Exemplare von *Helix lactea* wiederholt und legten Eier. Junge von *Helix nemoralis*, und zwar von einem gelben Exemplar mit einer schwarzen Binde und von einem einfarbig rotbraunen, zeigten nach einem Vierteljahre mehr oder weniger zahlreiche dunkle Flecke, die bei einigen schon anfangen, sich zu Binden anzuordnen. Durch Entziehen resp. reichliches Verabfolgen von Kalk kann man Deformitäten im Gehäuse der Schnecken hervorbringen.

Brockmeier, H. Zur Fortpflanzung von *Helix nemoralis* und *Helix hortensis*, nach Beobachtungen in der Gefangenschaft. Nachrichtsbl. malak. Ges. 20 p. 113—16 und 158. Brockmeyer stellte, um über die Art der Vererbung der Bänder Aufschluss zu erhalten, mit den gen. Arten Züchtungsversuche an, aus denen sich ergab, dass stets mehrere von den Jungen eine von der der Eltern abweichende Bändercombination zeigten. — Einmal befruchtete Indi-

viduen von beiden Arten können mehrere Jahre hintereinander ohne weitere Befruchtung Eier legen.

Gredler, P. V. Beobachtungen im Terrarium. Nachrichtsbl. malak. Ges. 20 p. 133—37.

Bei Zuchtversuchen mit chinesischen und tiroler Landpulmonaten verloren die Farben der Gehäuse allmählich an Frische und die nachfolgende Generation wurde schwächlich und krüppelhaft.

Die Thiere begaben sich meist an der Schattenseite zu längerer Ruhe oder wandten wenigstens die Mündung vom Tageslicht ab. Gredler beobachtete auch, dass dieselben wiederholt an ihren früheren Aufenthaltsort zurückkehrten, so dass ihnen Ortsgedächtnis zuerkannt werden muss.

Hele, F. M. *Bulimus decollatus* in captivity. Journ. Conchol. 5 p. 362.

Acht Exemplare haben sich in Jahresfrist auf etwa 1000 vermehrt.

Garnault, P. Un cas de castration parasitaire chez l'*Helix aspersa*. C. rend. Soc. Linn. Bordeaux 88. p. 54—57.

Sarasin, P. und F. Aus der Entwicklungsgeschichte der *Helix Waltoni* Rv. Ergebnisse naturwiss. Forsch. Ceylon. I, 2. p. 35 bis 69. vgl. vor. Ber. p. 281. Obwohl *Helix Waltoni* nur wenig grösser ist, als *Helix pomatia*, legt sie sehr viel grössere kalkschalige Eier (22mm lang). Zusammenstellung der Angaben über grosse Schneckeneier. Die eigentliche Eizelle ist im Vergleich zu der umgebenden Eiweissmasse sehr klein, welche ein Secret des Eileiters ist. — Der Embryo von 1mm Länge besitzt eine Kopf- und Schwanzblase, an den Seiten des Kopfes die Sinnesplatten, die Urnieren und die Anlagen der Lungenhöhle und Schale. Das nächste beobachtete Stadium zeigt die Anlagen der Sinnesorgane, welche aus den Sinnesplatten entstehen, und eine sehr mächtige Schwanzblase (*Podocyste*), die weiterhin sich noch mehr vergrössert. Sie stellt dann eine Haut dar, welche sich über die Schale legt; dieselbe ist als embryonale Kieme aufzufassen, welche durch pumpende Bewegungen die Circulation des Blutes unterstützt. Später, wenn die Lunge in Thätigkeit tritt, bildet sich die *Podocyste* ähnlich dem Schwanz der Froschlarven zurück. Mit ihr gleichzeitig entsteht und vergeht ein anderes Larvenorgan, das Urnierenpaar. Dieses stellt ursprünglich einen gebogenen Schlauch dar, dessen innerer Theil allmählich durch Vacuolenbildung des Epithels anschwillt. Innere Oeffnungen in die Leibeshöhle wurden wahrgenommen. Sodann bildet sich der Ausführungsgang zurück und das ganze Organ verschwindet, während die definitive Niere zu voller Entwicklung gelangt ist. Die Urnieren werden von d. Verf. als ein erstes Paar von Segmentalorganen angesehen, während die definitive Niere den einen mächtig entwickelten Schleifenkanal eines zweiten Paares darstellt. Larvenorgane sind auch die „Seitenorgane“, welche hauptsächlich auf den sog. Sinnesplatten liegen und von hier sich

gegen den Mund hin und auf den Fuss, besonders die Sohle, verbreiten. Für die Bezeichnung als Seitenorgane war den Verf. die Aehnlichkeit mit den Seitenorganen der niederen Vertebraten bestimmend. — Die Cerebralganglien entstehen einestheils aus Wucherungen von den Anlagen der Sinnesorgane am Kopfe aus (Tentakel, Augen), anderentheils aus Einstülpungen der Sinnesplatten. Diese zeigen zwei vielleicht aus Seitenorganen entstandene über einander gelegene tiefe Gruben, die sog. Cerebraltuben, die in ihrem tiefsten Theile Wucherungen bilden und die später abgeschnürt werden, um die Lobi accessorii der Cerebralganglien zu bilden, die bei Pulmonaten schon früher (Böhmig) beschrieben sind. Bezüglich der Cerebraltuben sprechen Verf. die Vermuthung aus, dass sie den Geruchsorganen von Anneliden entsprechen.

Schimkewitz, W. Sur le développement du coeur des Mollusques pulmonés d'après les observations de M. Schalfeew. (Oazvitic *Limax agrestis* v yaitzye. Trudui St. Petersb. Nat. Zool. 19 Protok. p. 86—88). Zool. Anz. 11 p. 65—66. Ausz.: J. R. M. S. 88 p. 204—5.

Das Pericardium entsteht aus einer anfangs soliden Masse von Mesodermzellen durch Delamination; in der unteren Wandung dieser Blase springt eine Wulst vor, aus welchem das Herz hervorgeht, das nur vorn und hinten mit dem Pericard in Zusammenhang bleibt. Von der dorsalen Wand des letzteren erhebt sich eine Falte, wodurch rechts der Drüsentheil des Bojanus'schen Organs entsteht, während der Ausführungsgang ectodermalen Ursprungs ist (Vergleich mit den symmetrischen Acephalen und den Anneliden).

—•—

II. Bericht über die geographische Verbreitung, die Systematik und die Biologie etc. der Mollusken.

Von

Dr. W. Kobelt.

Verzeichniss der Publikationen.

- Agassiz, A., a Contribution to American Thalassography. Three Cruises of the U. S. Coast and Geodetic Survey Steamer „Blake“ in the Gulf of Mexico, in the Caribbean Sea and along the Atlantic Coast of the United States, from 1877 to 1880. (Sep. Abdr. aus Bull. Mus. Cambridge XIV u. XV.) Boston 1888. 8°.
- Ancey, C. F., Mollusques du Haut-Tonkin. Recoltes de M. Villedary. In le Naturaliste (2) vol. X 70.
- Descriptions de Mollusques terrestres. Ibid. p. 188, 189, 213.
 - Etude monographique sur le genre Pyrgulopsis. In Bull. Soc. Mal. France vol. 5 p. 185—202.
 - Nouvelles Contributions malacologiques. VII. Note sur l'état jeune de certains Ennea. VIII. Mollusques nouveaux de l'extrême Orient. IX. Catalogue raisonné des Mollusques Néocaledoniens publiés jusqu'à ce jour et compris par les auteurs dans les genres Hyalinia, Helix, Diplomphalus etc. — Ibid. p. 341—376.
 - a Catalogue of the Bulimini found in Central-Asia. In Conch. Exchange II. p. 5. 6.
 - on the generic names of a remarkable Bivalve Shell found in the Congo. — Ibid. p. 22.
 - Description of North-American Shells. Ibid. p. 63, 64, 70, 80.
 - Notes sur les Bulimes français. In le Naturaliste p. 120, 121.
- Ashford, C., another Yorkshire Locality for *Vertigo angustior*. In the Naturalist 1888 p. 89.
- the Land and Freshwater Mollusca round Christchurch. In P. P. Hampshire Field Club I p. 41, 42.
- Beauchamp, W. M., Erosion of Freshwater Shells. In Conch. Exch. I. p. 49.
- Notes on American Shells. Ibid. II p. 114, 115.
- Beaudouin, J., Faune malacologique vivante de l'arrondissement de Chatillou-sur-Seine (Cote d'or). In Bull. Soc. mal. France V p. 377—423.

- Bergevin, E. de, Compte rendu de l'excursion à Caudebec-en-Caux. In Bull. Soc. Rouen (3) vol. 24 p. 123—131. —
- Bergh, D. R., Malacologische Untersuchungen. XII. Nudibranchien vom Meere der Insel Mauritius. — In C. Semper Reisen im Archipel der Philippinen. Wissenschaftliche Resultate II. Wiesbaden, Kreidel gr. 4^o 49 S. mit 5 Tafeln.
- die Pleuroleuriden, eine Familie der nudibranchiaten Gastraeopoden. Mit 2 Tafeln. In Zool. Jahrb. III 3 p. 348—364.
 - Beiträge zur Kenntniss der Aeoladiaden IX. In Verh. zool. botan. Ges. Wien Bd. 38 p. 673—706 S. 16—20. —
- Blum, J., einige Schnecken aus dem nördlichen Gebiete des adriatischen Meeres. In Nachr. Bl. D. Mal. Ges. XX p. 138.
- Boettger, Dr. O., über einige neue oder bemerkenswerthe Landschnecken aus Griechenland. In Nachr. Bl. D. M.-Ges. XX p. 51—58.
- Diagnosen neuer kaukasischer Arten. Ibid. p. 149—155.
- Borcherding, Fr., Dritter Nachtrag zur Molluskenfauna der norddeutschen Tiefebene. Nebst Bemerkungen über die Fauna, insbesondere die Mollusken, des Zwischenahner Meers, des Dümmer Sees und des Steinhuder Meers. In Abh. naturw. Verein. Bremen X. 1888 p. 335—367 t. 4 u. 5. —
- Bourguignat, J. R., Histoire des Helices campyléennes du groupe des Dinariques (olim Helix Pouzolzi). — In Bull. Soc. Mál. France vol. 5 p. 203—245 pl. 2—4.
- Brancsik, Dr., Daudebardia rufa Drp. gezogen. In Nachr. Bl. D. M.-Ges. XX p. 50. —
- eine neue Varietät von Helix pomatia. Ibid. p. 117, 118.
 - Nachträge zur Conchylienfauna Bosniens. Ibid. p. 161.
- Braun, Dr. M., Faunistische Untersuchungen in der Bucht von Wismar. In Mecklenb. Archiv 1888 vol. 42.
- Brazier, J., Mollusca. In Report on a small zoological Collection from Norfolk Island. In Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II p. 993—1001. —
- Brockmeyer, Dr. H., zur Fortpflanzung von Helix nemoralis und Helix hortensis, nach Beobachtungen in der Gefangenschaft. In Nachr. Bl. D. M.-Ges. XX p. 113—116.
- Bucquoy, E., Dautzenberg, P. et G. Dollfus, les Mollusques marins du Roussillon. Fasc. XV. Paris. p. 80 avec. 5 pl.
- Call, R. E., Descriptions of two new species of the genus Union from the Ozark Region of Missouri. In Pr. U. S. Nat. Museum 1887 p. 498—500 pl. 27, 28.
- Carpenter, H. F., the Shell-bearing Mollusca of Rhode Island. In the Conchol. Exchange II.

- Clessin, S., Binnenmollusken aus Südbrasilien. In *Mal. Bl. N. F.* vol. 10 p. 165—174.
- die Binnenmollusken von Neuseeland. *Ibid.* p. 175—183.
 - die Molluskenfauna Oesterreich-Ungarns und der Schweiz Lf. 3.
 - über zwei neue Lamellibranchiaten aus den postglazialen Schichten Schonens. In *Ofvers. kgl. Vetensk. Akad. Forhandl.* 45 Arg. p. 339—342.
 - vide Martini-Chemnitz.
- Coates, H., the Natural History of Kinnoul Hill. VI. The Mollusca. In *Pr. Perth. Soc.* I 1886 p. 247.
- Cockerell, Sydney C., Conchological Notes from Picardy. In *Journal of Conchol.* Leeds V p. 356. —
- Cockerell, T. D. A., *Helix Raffrayi*. In *Journal of Conchol.* Leeds V. p. 201. —
- on *Agriolimax montanus* in Colorado. *Ibid.* p. 358.
 - the Gibraltar and Tangier Forms of *Parmacella*. In *Conch. Exchange* II p. 67, 68.
- Collier, Edward, Land and Freshwater Mollusca of Cardiganshire. In *Journal of Conchol.* Leeds V. p. 353.
- Cooke, Alfred Hands, on the article *Purpura* in Tryons Manual of Conchology. — In *Journal of Conchology* V p. 321—329. —
- Cox, J., Contributions to Conchology I. In *Pr. Z. S. N. S. Wales* (2) II p. 1001—1064 pl. 20—21.
- Crosse, H., Nouveau Catalogue des Mollusques terrestres de l'île de San-Thomé. — In *Journal de Conchyl.* Paris vol. 50 p. 12 bis 30, pl. 1. —
- Faune malacologique terrestre et fluviatile de l'île du Prince (côte occidentale d'Afrique). *ibid* p. 296—305.
- Crosse, H., et P. Fischer, Observations sur le *Bulimus exaratus*, Müller. In *Journal de Conchyl.* Paris vol. 36 p. 5—12.
- Description d'un *Cyclostoma* inedit, provenant de Madagascar. *Ibid.* p. 100.
 - Note sur les Cyclostomes des Antilles et description du nouveau genre *Colobostylus*. *Ibid.* p. 229.
 - Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique centrale. Recherches zoologiques. VII. Etudes sur les Mollusques terrestres et fluviatiles Livr. X. Paris 1888. 48 p. et 4 pl. gr. 4°.
- Craven, A. E., Note sur l'*Helix harpa*, Say. In *Journal de Conchyl.* vol. 36 p. 101. —
- Dall, W. H., Description of a new species of *Hyalina*. In *Proc. U. S. Nat. Mus.* 1888 p. 214. With 3 figures. —
- Gasteropods and Lamellibranchs, in Agassiz, Three Cruises of the Blake p. 62—75.

- Darbishire, R. D., Note on Shells of Argonauta Argo. In Journal of Conchology, vol. 5 p. 371—373 pl. 3.
- Dautzenberg, P., vide Bucquoy. —
- Dollfus, C. F., les plages du Croissic. Recoltes Zoologiques III. La Presquile de Penbron. In Feuille jeunes Naturalistes XVII p. 93—97.
- vide Bucquoy.
- Donald, J., Notes on the Land and Freshwater Shells of Cumberland. In Transact. Cumberl. Westmorel. Assoc. No. XI. 1886 p. 150. 151.
- Drouet, H., Unionidae nouveaux ou peu connus. (5^e Article). In Journal de Conchyl. vol. 36 p. 103. —
- Fagot, P., Contribuciones a la Fauna malacologica de Aragon. Catalogo razonata de los Moluscos del Valle de Essera. In Cronaca Cientif. 1888.
- Catalogo de los Moluscos del Valle de Aran. — Ibid.
- Faussek, V. A., die Molluskenfauna des nördlichen Caucasus. In Trud. St. Petersburg Nat. Zool. XIX Protok. p. 62. 63 (russisch).
- Fischer, K., die Flussperlenmuschel im Regierungsbezirk Trier. In Verh. naturh. Ver. Rheinland XIV p. 292—294.
- Fischer, P., Note sur une monstruosité du Triopa clavigera, Loven. In Journal de Conchyl. vol. 36 p. 131.
- sur la classification du genre Lachesis, Risso. — Ibid. p. 132.
- Note sur l'animal du genre Cyclosurus, Morel. — Ibid. p. 293.
- Note sur la structure interne de la coquille du Pupa candida, Lam. — Ibid. p. 316. —
- Note sur la présence du genre Corambe Bergh dans le bassin d'Arcachon (Gironde). In Bull. Soc. Zool. France XIII p. 215. 216.
- vide Crosse.
- Fitz-Gerald, H. P., the Mollusca of North Hants. In Pr. Hamps. Field Club II p. 26—30. —
- Folin, Marquis de, Observations sur une espèce nouvelle d'Unio de France. — In le Naturaliste p. 273. —
- Observations sur l'Helix Quimperiana. Ibid. p. 174.
- Observations sur l'Helix constricta Boubée. Ibid. p. 240.
- Observations sur une espèce nouvelle du genre Unio de France. Ibid. p. 273. 274.
- Ford, John, Description of a new species of Ocinebra. — In Proc. Acad. Philad. 1888 p. 188. —
- Helices in Fairmont Park, Philadelphia, with some remarks regarding the relationship of Succinea Totteniana, Lea. Ibid. p. 23 u. 24.

- Ford, John, some remarks on the Migration of Mollusks. Ibid. p. 71.
- the Freshwater Mollusks of Fairmont Park. Ibid. p. 39—41.
- French, J. F., Preliminary List of the Land- and Freshwater Mollusca occurring in the Neighbourhood of Felstead, Essex. In Essex Natural II p. 1—3. p. 46—47.
- on the Alluvial and other Recent Deposits at Felstead, Essex. Ibid. p. 55—60. —
- Furtado, Arrudo, sur le *Bulimus exaratus*, Müller. In Journal de Conchyl. vol. 28 p. 5—10.
- Galway, Miss H., on the Marine Shells of Magilligan Strand, County Tyrone. In Journal of Conchol. V p. 267—270.
- Ganong, W. F., the Marine Mollusca of New Brunswick. In Bull. Nat. Hist. Soc. New Brunswick VI. p. 17—61.
- Gehrs, C., Nachträge zu seinem im 32 Jahresbericht veröffentlichten Verzeichniss der hier vorkommenden Mollusken. In Jahresb. Naturf. Ges. Hannover XXXIV—XXXVII p. 34—37 p. 68—69.
- Girard, Alb., Note sur les *Helix catocyphia* Bgt., *hyperplataea*, *Servaini* et *pisana* de Portugal. Avec 1 pl. In Journ. Sc. Math. Lisboa XII p. 100—106.
- Godet, P., Mollusques du lac Tanganyika. In Bull. Soc. Neuchatel XVI p. 298.
- Godwin-Austen, H. H., Land- and Freshwater Mollusca of India, including South Arabia, Baluchistan, Afghanistan, Kashmir, Nepal, Burma, Pegu, Tenasserim, Malay Peninsula, Ceylon and other Islands of the Indian Ocean. Part VI. (Text) p. 207—287. London 1888.
- Description of new Landshells from the Andaman and Nicobar group of Islands in the Bay of Bengal. In Ann. N. H. (6) II p. 55—59.
- on some Land-Mollusks from Burmah, with Descriptions of some new species. Pt I. In Pr. Z. Soc. London 1888 p. 240—245. —
- Goldfuss, O., *Helix hortensis* in heidnischen Wohnstätten. In Zeitschr. f. ges. Naturw. Ihy 61 p. 213.
- Gefälschte Conchylien von den Philippinen. Ibid. p. 430.
- Conchylien der Keller. Ibid. p. 628—629.
- Granger, A., les *Bulimes* de France. In le Naturaliste X. p. 59. 60. —
- Grant, U. S., Notes on the Molluscan Fauna of Minnesota. In Geol. and Nat. Survey Minnesota XVI p. 481—484.
- Gredler, P. Vincenz, Beobachtungen im Terrarium. In Nachr. Bl. D. M. Ges. XX p. 133. —
- Grieg, J. A., Undersogelser over dyrelivet i de vestlandske fjorde I. Møster. — In Bergens Mus. Aarsber. 1887.

- Guerne, J. de, Campagnes scientifiques du yacht monégasque l'Hirondelle. Troisième Année 1887. Excursions zoologiques dans les îles Fayal et de San Miguel (Açores) Paris 1888 8° 111 p. 1 pl.
- Hagenmüller, P., Matériaux pour servir à l'histoire de la malacologie de la Corse et de la Sardaigne. In Bull. Soc. Mal. France V p. 1—54.
- Haller, B., die Morphologie der Prosobranchier gesammelt auf einer Erdumseglung durch die Kgl. italienische Corvette „Vettor Pisani“. — In Morphol. Jahrb. XIV p. 54—109 t. 3.
- Hartmann, W. D., new species of Shells from the New Hebrids and Sandwichs Islands. In Proc. Acad. Philad. 1888 p. 250—253 pl. 13.
- a bibliographic and synonymic Catalogue of the Genus *Auriclella* Pfr. Ibid. p. 14—15.
- a bibliographic and synonymic Catalogue of the Genus *Achatinella*. Ibid. p. 16 with pl. I.
- Heape, W., Preliminary Report upon the Fauna and Flora of Plymouth Sound. In Journ. Mar. Biol. Assoc. II p. 153—193.
- Hedley, C., Description of a new slug, with notes on other terrestrial mollusca. In Pr. Soc. Queensland V 1888 p. 150—153.
- Heilprin, Angelo, the Animal Life on our Sea-Shore. With special reference to the New Jersey coast and the southern shore of Long Island. Philadelphia 1888 12°. — 130 p. with illustrations. —
- Contributions to the Natural History of the Bermudas. In Proc. Acad. Philadelphia 1888 p. 302—328 pl. 16. —
- Hele, Miss F. M., *Bulimus decollatus* in Captivity. In Journ. of Conch. V p. 362.
- Heude, P. M., Diagnoses Molluscorum novorum in Sinis collectorum. In Journal de Conchyl. vol. 36 p. 235—243, p. 305—309. —
- Hidalgo, Dr. J. G., Recherches malacologiques de M. Quadras aux îles Philippines. In Journal de Conchyl. vol. 36 p. 30.
- Description d'espèces nouvelles des Philippines. Ibid. p. 310. —
- Hinckley, A. A., Record of a short Collecting Tour in White Hardin and Gallatin Counties, Ill. — In the Conchol-Exchange I p. 56.
- Notes on the Strepomatidae of Illinois. Ibid. II p. 93. 94.
- Holm, T., Beretning om de paa Fyllas Togt i 1884 foretagne zoologiske Undersøgelser i Groenland. 8°. 19 p.
- Hohinger, J. W., Notes on the Mollusca of Winona County. In Geol. Survey Minnesota XVI p. 485—491.
- Hoyle, W. E., Report on the Biological Investigations carried on into the Waters of the West of Lewis in July and August 1887. In Rep. Fisher. Scotland VI p. 215—222 pl. 15.

- Hubrecht, A. A. W., *Dondersia festiva* n. gen. et sp. — In Doonders-Festbündel p. 324—339 pl. 8. 9.
- Ihering, H. von, die Stellung der Pteropoden. In Nachr. Bl. D. mal. Gesellsch. XX p. 30—32.
- Jones, J. M., the Conchologist in Bermuda. In Conchol. Exchange II p. 118.
- Jousseau, F., Description des Mollusques recueillis par Mr. le Dr. Faurot dans la Mer rouge et le Golfe d'Aden. In Mem. Soc. zool. France I p. 165—223.
- Kew, H. Wallis, *Sphaerium corneum* upon the tarsus of *Dytiscus marginatus*. In Journ. of Conchol. Leeds V p. 363. —
- Keep, J., West Coast Shells. A familiar Description of the Marine, Freshwater and Land-Mollusks of the United States, found west the Rocky Mountains. San Francisco 1888. 8° 230 pp. 1 pl. 181 cuts.
- Kobelt, Dr. W., Iconographie der schalentragenden europaischen Meeresconchylien. Heft VIII Kassel, Fischer.
- Rossmasslers Iconographie der Land- und Süsswasser-Mollusken, mit besonderer Berücksichtigung der europaischen noch nicht abgebildeten Arten. Neue Folge Bd. III Lfg. 5. 6. Bd. IV Lfg. 1. 2. —
 - die Bivalven Niederandalusiens. In Nachr. Bl. D. Mal. Ges. XX p. 16—30.
 - die deutschen Bivalven. Ein Vorschlag zu gemeinsamer Arbeit. In Nachr. Bl. D. Mal. Ges. XX p. 47—50.
 - Diagnose einer neuen Xerophile. Ibid. p. 119. —
 - Melvill, a survey of the genus *Cypraea* L. Ibid. p. 155.
 - Diagnose einer neuen *Arca*. Ibid. p. 176.
- vide Martini-Chemnitz.
- Krukenberg, C. F. W., die Durchfluthung des Jsthmus von Suez in chorologischer, hydrographischer und historischer Beziehung. Wissenschaftliche Ergebnisse meiner Reise vom Etang de Berre über Marseille und Triest nach Suakin und Massaua. Heidelberg 1888 8°. 156 p. 2 pl.
- Locard, Arnould, Contributions à la Malacologie française. XI. Etudes critiques sur les *Helix* du Groupe de l'*Helix rufescens* Penn. — Lyon 1888 gr. 8°. 66 p. XII. Genre *Pecten* g 8° 160 p.
- Revision des espèces françaises appartenant au genre *Modiola*. In Bull. Soc. Mal. France V p. 77—119 pl. 1.
 - Recherches sur la coquille des pélégrins. — Lyon 1888 8°. 78 pp.
- Layard, E. L., on the distribution of some Land-Shell of the Genus *Stenogyra*. In Proc. Zool. Soc. London p. 358. —
- Leidy, Dr. Jos., Remarks on the fauna of Beach Haven, N. J. In Proc. Acad. Philadelphia 1888 p. 329—333. —

- Letourneux, A., des Hydrocènes de Dalmatie. In Bull. Soc. Mal. France V. p. 247—250.
- Mabille, J., de quelques coquilles nouvelles. In Bull. Soc. Philom. (7) Vol. XII p. 73—82.
- Madison, J., Notes on *Limnaea peregra* vars. *Burnetti* and *lacustris*. In Journal of Conchology V p. 260. —
- Maltzan, H. von, Diagnosen neuer Landschnecken von Haiti, gesammelt von Hermann Rolle 1887—1888. — In Nachr. Bl. D. Mal. Ges. XX. p. 177. —
- Marion, A. F., et A. Kowalewsky, sur les espèces de *Proneomenia* des côtes de Provence. In Comptes Rendus CVI. p. 529—532.
- Marschall W., die Tiefsee und ihr Leben. Nach den neuesten Quellen gemeinfasslich dargestellt. Leipzig 1888 8°. 343 S. 4 Tafeln und 114 Holzschnitte.
- Martens, Ed. von, *Anodonta legumen* n. sp. aus Rio Grande. In Sitz. Ber. Ges. naturf. Freunde 1888 p. 65.
- *Bulimus proclivis* n. sp. aus Rio Grande. Ibid. p. 64. 65.
 - über *Conus Prometheus* von Camerun. Ibid. p. 63.
 - ist *Helix pomatia* in Norddeutschland einheimisch? In Nachr. Bl. D. Mal. Ges. XX p. 169.
 - Conchylien aus Kamerun von Zeuner gesammelt. In Sitz. Ber. Ges. naturf. Fr. Berlin 1888 p. 148.
 - das Vorkommen von *Helix pomatia* im nördlicheren Europa. Ibid. p. 149.
- Martini-Chemnitz, Systematisches Conchylien-Cabinet. Neue Ausgabe, fortgesetzt, von Kobelt. — Lfg. 356. *Cardita* von Clessin; — Lfg. 357. 358. *Pecten*, von Kobelt; — Lfg. 359. *Cerithium*, von Kobelt; — Lfg. 360. *Cardita* und *Chama*, von Clessin; — Lfg. 361. *Solen*, *Modiola*, von Clessin. — Lfg. 362. *Solenacea*, von Clessin. — Lfg. 363. *Arca*, von Kobelt. — Lfg. 364. *Solenacea* und *Chama*, von Clessin. — Lfg. 365. *Nerita*, von Martens. — Lfg. 366. *Solenacea* und *Chama*, von Clessin. — Lfg. 367. *Arca*, von Kobelt.
- Melvill, J. C., Descriptions of six new species of *Pecten*. In Journal of Conchol V. p. 279.
- Descriptions of fifteen new species of *Mitra*. Ibid. p. 281.
 - Description of a new species of *Cypraea*. Ibid. p. 288.
 - Notes on *Mitra* (*Costellaria*) *rugosa* Swainson. Ibid. p. 332.
 - two new *Siphonaliae* from Japan. Ibid. p. 348, with figg.
 - a Survey of the genus *Cypraea* (L.), its Nomenclature, geographical Distribution and distinctive Affinities. — From Memoirs Proc. Manchester Lit. Phil. Soc. (IV) I. 8°. 70 pp. 2 plates.
- Milne, J. G., *Amalia gagates* in Cheshire. In the Naturalist p. 48.

- Möllendorff, Dr. O. von, Bemerkungen zu Hídalgos Aufzählung der philippinischen Landschnecken. In *Malacozool* Bl. N. F. vol. 10 p. 115—131.
- Materialien zur Fauna von China. *Ibid.* p. 122—143.
- Von den Philippinen. IV. Nachträge und Berichtigungen zur Fauna von Cebu. *Ibid.* p. 144—163. pl. 4.
- Diagnoses specierum novarum sinensium. In *Nachr. Bl. D. M. Ges.* XX p. 38—44.
- Diagnoses novarum specierum ex insulis Philippinis. *Ibid.* p. 141—145.
- Von den Philippinen V. *Ibid.* p. 65.
- Monterosato, T. di, Molluschi del Porto di Palermo, specie e varietà. In *Bull. Soc. Mal. Ital.* vol. XIII p. 161—180.
- Morelet, A., Description d'une espèce nouvelle d'Achatina d'Assinie. In *Journal de Conchyliol* vol. 28 p. 97—99, pl. 1 fig. 4.
- Munthe, H., Pteropoder i Upsala Universitets Zoologiska Museum samlade af Kapt. G. von Scheele. In *Bih. Sv. Ak. Handl.* XII 33 p.
- Nehring, A., einige Notizen über das Vorkommen resp. Nichtvorkommen der *Helix pomatia* im Diluvium Deutschlands. In *Sitz. Ber. Ges. naturf. Fr. Berlin* p. 150. 151.
- Nelson, W., a days Collecting near Howden, Yorkshire. In *Journal of Conchology* vol. V p. 262—267.
- Norman, A. M., Museum Normanianum, or a Catalogue of the Invertebrate of Europe and the Arctic and North Atlantic Oceans, which are contained in the collection of A. M. Norman. IV *Mollusca marina*. Durham 1888. 8°. Printed for private Distribution.
- Ortmann, A., Japanische Cephalopoden. In *Zoolog. Jahrb. syst.* Abth. III p. 639—670 t. 20—25.
- Paetel, Fr., Catalog der Conchylien-Sammlung von Berlin Gebr. Paetel, Lfg. 8—9.
- Pelseneer, P., Report on the Pteropoda collected by H. M. S. Challenger, during the years 1873—76. Part II. The Thecosomata. In *Rep. Scient. Res. Voy. Challenger* vol. 23 132 p.
- Petersen, C. G. J. om de skalbaerende Molluskers Udbredningsforhold i de Danske Have indenfor Skagen. Kjøbenhavn 1888 8°. 174 S. mit 2 Karten.
- Petterd, W. F., Contributions for a systematic Catalogue of the Aquatic Shells of Tasmania. Part. I. In *Proc. R. Soc. Tasmania* 1887.
- Descriptions of two new species of Tasmanian Freshwater Shells. *Ibid.* p. 40—41 pl. 44.

- Pilsbry, H. A., on the Helicoid Land Mollusca of Bermuda. In Proc. Acad. Philadelph. 1888 p. 285—291. pl. 17.
- vide Tryon.
 - Liogyrus, Gill, and other American Shells. In Conchol Exchange II. p. 113.
- Pollonera, Carlo, Appunti di Malacologia. I. Di alcune Testacelle raccolte presso Torino. — II. Di alcune Testacelle spagnuole. III. Un nuove Limacide dell Asia minore. — In Boll. Mus. Zool. Anat. Torino III No. 43.
- Nuove specie di Molluschi terrestre raccolte nella Scioa dal Dottor V. Ragazzi. Ibid. No. 37.
 - Molluschi delle Scioa o delle valle delle Havash. — In Bullettino Soc. Mal. italiana vol. 13 No. 2 p. 49—85 pl. 2. 3.
 - Esame critico delle specie descritte come nuove dall' abbate G. Olivi. Ibid. p. 9—16.
 - Molluschi fossili postpliocenici del contorno di Torino. In Mem. Accad. Torino (2) vol. 28 p. 25—56.
- Quilter, H. E. Note on a parasitic mite of Testacella scutulum Sow. — In Journal of Conchol. Leeds V p. 314.
- Note on the occurrence of Testacella scutulum Sow. in Leicestershire. — ibid. p. 320.
 - Land and Freshwater Mollusca collected in Leicestershire during 1885—87. — In Trans. Leic. Soc. VII p. 17—21.
- Reinhardt, Dr. O., Helix (Campylaea) cingulata Stud. vom Staffelferge in Oberfranken. In Sitz. Ber. Ges. naturf. Freunde 1888 p. 75. —
- Retowski O. Beiträge zur Molluskenfauna des Caucasus. In Bull. Moscou 1888 p. 277—288.
- Reuleaux, Carl, über interessante Funde auf deutschem Gebiet II. In Nachr. Bl. D. M. Ges. XX p. 10—15.
- Roberts, G., Helix hortensis and its Variation. In the Naturalist 1888 p. 232.
- Reappearance of Canal Shells at Agbrigg near Wakefield. Ibid.
 - Observations on the Unionidae. In Science Gossip p. 127—129.
 - Anodonta cygnea and anatina. Ibid. p. 280.
- Robertson, D., Jottings from my Note Book. Purpura lapillus, L.; Mytilus edulis L.; — on some marine Mollusca. In Proc. N. H. Soc. Glasgow II p. 139—153.
- Rogers, T., Planorbis dilatatus Gould in England. In Conchol. Exchange I p. 63.
- Simpson, Charles T., Notes on some Indian territory land- and freshwater-shells. In Proc. U. S. Nat. Mus. 1888 p. 449—454.
- Sacco, Federico, Nuove specie terziarie di Molluschi terrestri, d'acqua dolce e salinastra del Piemonte. Con 3 tav. In Atti Soc. Ital. Sc. nat. vol. 29 p. 427—476.

- Salvana, Don Joaquin Mariano, Contribución a la Fauna malacologica de los Pirineos Catalanes ó sea Descripcion de la Comarca de Olot en relacion con la Faunula malacologica local y Monografia de los Moluscos terrestres y fluviatiles de aquel territorio. — In *Anales Soc. Espan. Hist. Nat.* XVII. 1. 1888 p. 75—132.
- Saunders, J., Conchological Notes from South Beds. In *Midl. Nat.* p. 152—154.
- Sander, G., über einige für Böhmen neue oder unbekannte Mollusken. In *Sitzungsber. böhm. Gesellsch.* 1888 (tschechisch).
- Schepman, M. M., Een nieuwe Paludina van Borneo. Met hontont. *Tijdschr. Nederl. dierk. Vereenig.* (2) D. 2 Afl. 1/2 p. 143—144.
- Zoological Researches in Liberia. List of Mollusca with description of new species. In *Notes Leyd. Mus.* X p. 245 bis 252 pl. 10.
- Servain, G., Catalogue des Coquilles marines recueillies à Concarneau et dans la baie du Forest (Finistère) Lyon. gr. 8°. 129 Seiten.
- Aperçu sur la faune des Mollusques fluviatiles des environs de Hambourg. In *Bull. Soc. mal. France* V p. 287—340 t. 8—9.
- Scott, F., Notes on some species of Land and Freshwater Mollusca and Land-Isopoda from Bute. In *Pr. N. H. Soc. Glasgow* II p. 125—127.
- Remarks on some Land and Freshwater Mollusca from Tarbert, Loch Fyne. *Ibid.* p. 129—132.
- Segrave, E. S., Report on the Oyster Fisheries of Maryland. London, Foreign office Mis. series No. 8.
- Simroth, H., über die azorisch-portugiesische Nacktschneckenfauna und ihre Beziehungen. In *Zool. Anzeiger* XI. p. 66—70, 86—90.
- zur Kenntniss der Azorenfauna. Mit Beiträgen von Prof. Dr. von Martens, Dr. F. Hilgendorff und S. Clessin. In *Archiv für Naturgesch.* 1888 p. 179—234. Mit 2 Tafeln.
- Ueber einige Themata aus der Malakozoologie. I. Ueber die Vitrinen. — 2. Ueber Mimicry nach Lungenschnecken. — 3. Ueber afrikanische Nacktschnecken. — 4. Ueber das Alter und die Verwandtschaft der Lungenschnecken.
- Ueber die geologische und geographische Verbreitung der Pulmonaten, insbesondere der Nacktschnecken. Inauguraldissertation. 8° 36 pp.
- Shimek, B. *Margaritana hildrethiana* (Lea). In the *Conchol Exchange* II. p. 114.
- Simpson, C. T., on the distribution of Land and Freshwater Shells in the Tropics. In the *Conchol Exchange* II. p. 37—50.
- on a new Floridian *Natica* (Fordiana) *Ibid.* p. 51.

- *Gundlachia ancyliiformis* Pfr. in Florida. Ibid. p. 96.
- Notes on some Indian Territory Land and Freshwater shells. In Proc. U. S. Nat. Museum 1888 p. 449—454.
- Smith, Edgar A., Note sur le *Cyprea Bregeriana* Crosse. In Journal de Conchyl. vol. 36 p. 313.
- on the shells of the Albert Nyanza, Central Africa, obtained by Dr. Emin Pacha. In Proc. Zool. Soc. London p. 52—56.
- on the terrestrial Mollusca of Christmas Island. Ibid. p. 536 bis 537.
- Report on the Heteropoda collected by H. M. S. Challenger during the years 1873—76. In Scient. Res. Voy. Challenger vol. 23. 51 pp., 5 cuts.
- Mollusca. In Collections from the Western Indian Ocean, made by H. M. S. Alert p. 487—508 pl. 44.
- Notice of a Monstrosity of *Bythinia tentaculata*. In Journal of Conchology Leeds V p. 315.
- Catalog der Gattung *Chilina*. In Nachr. Bl. D. Mal. Ges. XX. p. 44—46.
- on the Mollusca collected by Mr. G. A. Ramage at the Island of Dominica. Report II. In Ann. Mag. N. H. Nov. 1888 p. 419.
- Diagnoses of new Species of *Pleurotomidae* in the British Museum. Ibid. p. 300 - 317.
- Description de quelques espèces de Coquilles terrestres de Sumatra, Java et Borneo. — In Ann. Soc. Mal. Belg. XXII p. 215—222 pl. IX.
- Somerville, A., *Trophon truncatus* Ström var. *scalaris* Jeffr. on the West coast of Scotland. In Journal of Conchol. Leeds V. p. 319.
- *Lacuna pallida* da Costa. In Science Gossip XXIV p. 91.
- Soppitt, H. T. and J. W. Carter, Land- and Freshwater Mollusca of Upper Airedale, Yorkshire. In the Naturalist 1888 p. 91 bis 102.
- Sowerby, G. B., 1. Descriptions of sixteen new species of Shells. In Proc. Zool. Soc. London p. 207—213 pl. II.
- Description of a gigantic new species of *Aspergillum*. Ibid. p. 290.
- Descriptions of fourteen new species of Shells from China, Japan and the Andaman Islands, chiefly collected by Deputy — Surgeon Gen. R. Hungerford. Ibid. p. 570—580 pl. 29. —
- Stahl, E., Pflanzen und Schnecken. Eine biologische Studie über die Schutzmittel der Pflanzen gegen Schneckenfrass. — In Jenaische Zeitschr. f. Naturw. vol. 22 p. 557—684.
- Sterki, Dr. V., a study of the American Species of *Vertigo* contained in the U. S. National Museum, with the description of a new subgenus of *Pupidae*. — In Proc. U. S. Nat. Mus. 1888 p. 369 bis 580 p. 42.

- Stricker, W., Zur Geschichte der Mollusken. — Im Zoolog. Garten Jahrg. 29 p. 329—333.
- Stuhlmann, F., Vorläufiger Bericht über eine mit Unterstützung der Kgl. Akademie der Wissenschaften unternommene Reise nach Ostafrika zur Untersuchung der Süßwasserfauna. — In Sitzungsber. Akad. Wissensch. Berlin 1888 p. 1255—1269. —
- Taylor, John W., on the variation of British Land- and Freshwater Mollusca. In Journal of Conchology V p. 289. —
- on the specific distinctness and the geographical distribution of *Testacella scutulum* G. B. Sow. — Ibid. p. 337.
 - Note on *Vertigo tumida* Westerl. — Ibid. p. 357.
 - Discovery of *Helix harpa* in Switzerland. Ibid. p. 335.
 - *Amalia gagates* in Cardiganshire. Ibid. p. 360.
- Taylor, John W., and Roebuck, W. D., Authentical Materials towards a Land- and Freshwater Molluscan Fauna of Ireland. — In Proc. Roy. Irish Ac. (2) IV p. 672—692.
- Tenison-Woods, J. E., Malaysian Land- and Freshwater Mollusca. In Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III p. 1093—1095 pl. 27 bis 30. —
- Thomas, P., Sur une forme ancestrale de l'*Helix* (*Leucochroa*) *candidissima*, Drp. — In Bull. Soc. Nancy (2) IX p. 80—88, avec pl.
- Tomlin, J. R. B., *Helix arbustorum* mut. *sinistrorsum*. — *Odostomias* at Herm. — *Achatina octona*. — *Helix virgata* var. *alba*. — In Science Gossip vol. XXIV.
- Tryon, G. W. Manual of Conchology, structural and systematic. First Series vol X. Philadelphia (*Neritidae*, *Adeorbidae*, *Cyclostrematidae*, *Liotidae* by Tryon, *Phasianellinae*, *Turbinidae*, *Delphinulinae* by H. A. Pilsbry). —
- The same, second Series, *Pulmonata* vol IV. — (pt. 1 by Tryon, pt. 2—4 by Pilsbry). —
- Tryon, H., Errata contained in a list of Land Shells recorded from Queensland. In Proc. Roy. Soc. Queensland V p. 131—137.
- Ulicny, Jos. *Hyalina inopinata* n. sp. — In Malacozool. Bl. N. F. Bd. 10 p. 112—114. —
- Vayssière, A., Description de la *Facelina Marioni* et de la *Coryphella Berghii*. — In Journal de Conchyl. vol 36 p. 125. —
- Vignon, Capt., Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles recoltés sur la côte occidentale de l'Afrique. In Bull. Soc. Mal. France V p. 65—76.
- Voigt, W., *Entocolax Ludwigii*, ein neuer seltsamer Parasit aus einer Holothurie. In Zeitschr. f. wissensch. Zoologie vol 47 p. 638 bis 688 S. 41—43.
- Ueber parasitische Schnecken und *Entocolax Ludwigii*. In Sitz.-Ber. Niederrh. Ges. Bonn 1888 p. 53—55.

- Walker, Bryant, on the Re-discovery of *Planorbis multivalvis* Case and *Planorbis truncatus* Mills. In *Journal of Conchology Leeds* V p. 330.
- Webb, W. M., *Anodonta cygnea*, L. — In *Science Gossip* XXIV p. 235.
- Westerlund, C. Ag., *Species et varietates nonnullae minus cognitae vel novae*. In *Bull. Soc. Mal. France* V p. 55—64.
- Westgate, W. W., Notes on *Teredo*. In the *Conchol. Exch.* p. 84.
- Williams, J. W., *Land- and Freshwater Shells, an introduction to the study of Conchology, with a chapter on the distribution of the British Land- and Freshwater-Mollusca* by Taylor and Roebuck. London 8°. 112 p.
- *The Shell Collectors Handbook for the Field*. London 1888. 12°. 148 pp.
- *Vertigo minutissima* Hartm. in Gloucestershire. In *Journ. of Conchol. Leeds* V p. 357.
- on Collecting and Preserving Land- and Freshwater Shells. In the *Wesley Nat.* I p. 354—356.
- Winckley, W. H., *Mollusca found in the Oyster Beds of Cognac*, N. B., Bedeque and Summerside, P. E. J. — In *Bull. Nat. Hist. Soc. New Brunswick* No. 7 p. 69—71.
- Woodward, B. B., Note on the pleistocene Land- and Freshwater Mollusca from the Harnwall Gravels. In *Proc. Geol. Assoc.* X. p. 355—360.
- Wotton, F. W., *The Land- and Freshwater Shells of Cardiff*. In *Cardiff Nat. Soc.* XX p. 32—39, with pl.
- Wright, B. H., Check List of North American Unionidae and other Freshwater Bivalves. Portland, Oregon 8° 8 py.
- Descriptions of new species of Uniones from Florida. In *Proc. Acad. Philad.* 1888 p. 113—120 pl. 2—6.
- Wright, S. H., A new *Unio* (Orcutti). In *West Amer. Scient.* 1888 p. 60, pl. —
- Wright, S. H. and B. H., Remarks upon the Unionidae of Southern Florida. In the *Conchol. Exchange* II. p. 67, 95, 111 bis 112. —

Fachzeitschriften.

- Annales de la Société royale malacologique de Belgique*: Vol. 22 (Ser. 4, vol. 2) Année 1887. Bruxelles 1888. 8°.
- Bulletin della Società malacologica Italiana*. Vol. XIII. Pisa 8° 281 pp. 10 tav.
- Bulletin de la Société malacologique de France, sous la direction de Mss. C. F. Ancey etc.* Vol. V. Paris 8°. 449 pp. 9 pl.
- The Conchologists Exchange*. A Publication designed for Conchologists and Scientists generally. By Wm. D. Averell, Editor and Publisher, Vol. I and II. Philadelphia 1887/1888. 16°.

Journal de Conchyliologie, publié sous la direction de H. Crosse et P. Fischer. Vol. 36 (Sér. 3 Vol. 28) Paris 1888.

Journal of Conchology established in 1874 as the Quarterly Journal of Conchology. Vol. V No. 9—12. Leeds 1888.

Malakozoologische Blätter, herausgegeben von S. Clessin. Neue Folge Bd. 10.

Nachrichtenblatt der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, herausgegeben von Dr. W. Kobelt. Vol. 20. Frankfurt a. Main.

Procès-verbaux des Séances de la Société royale Malacologique Belgique XVII (1888). Bruxelles 8°.

1. Geographische Verbreitung.

A. Binnenconchylien.

Allgemeines.

Simroth (4) erörtert eingehend die geographische (und geologische) Verbreitung der Pulmonaten und besonders der Nacktschnecken.

Palaearktisches Reich.

Arktische Region. Holm berichtet über die von der Fylla 1884 gesammelten Mollusken. (Mir nicht zugänglich geworden).

Grossbritannien. Von Williams sind zwei grössere Arbeiten über die englische Fauna erschienen, beide, anscheinend für das grössere Publikum bestimmt, sind dem Referenten nicht zugänglich geworden; das eine enthält eine Uebersicht der geographischen Verbreitung der englischen Mollusken von den Herrn Taylor und Roebuck. — Diese beiden Autoren geben auch eine Zusammenstellung der aus Irland bekannt gewordenen sicheren Fundortsangaben, durch welche die Fauna der Insel um drei Arten vermehrt wird. — Woodward hat die Fauna von England durch die Entdeckung von *Claus. pumila* Zgl. bereichert. — Ashford gibt eine 93 Arten umfassende Fauna von Yorkshire.

Kleinere Beiträge zur Kenntniss der englischen Fauna, sowie einzelne Fundortsangaben lieferten Ashford, Collier, Cooke, Donald, Fitzgerald, Hele, Madison, Milne, Nelson, Quilter, Roberts, Rogers, Saunders, Scott, Taylor, Tomlin, Soppit and Carter, Wolker, Williams, Wotton.

Frankreich. Cockerell zählt 37 von ihm in der Picardie gesammelte Arten auf (keine n. sp.). — Drouët beschreibt 6 n. sp. *Unio* und 4 n. sp. *Anodonta* aus Frankreich. — Beaudouin zählt die Fauna der Côte d'or auf, Bergevin eine Anzahl Arten von Caudebec-en-Caux. — Einzelne neue Arten beschreiben Folin und Servain. — Ancey macht einige unwichtige Bemerkungen über bekannte Arten.

Deutschland. Borcharding gibt einen dritten Nachtrag zur Fauna der norddeutschen Tiefebene, welcher sich besonders mit den

Bivalven einiger norddeutschen Seen beschäftigt. Servain bereichert die Fauna von Hamburg um 22 neue Arten, welche den dortigen Sammlern unbekannt geblieben sind. Gehrs gibt einige kleine Nachträge zur Fauna der Gegend von Hannover. Zacharias behandelt die Faunen der beiden Mansfelder Seen. Fischer bespricht das Vorkommen der Flussperlenmuschel in der Gegend von Trier. — Kobelt erlässt einen Aufruf zur gemeinsamen, nach Flussgebieten geordneten Bearbeitung der deutschen Najadeen. Martens erörtert das Vorkommen von *Helix pomatia* L. in Norddeutschland und Nordeuropa überhaupt; Nehring fügt einige Notizen über deren Vorkommen im Diluvium hinzu. Reinhardt berichtet über das isolirte Vorkommen von *Helix cingulata* Stud. am Staffelstein in Oberfranken, wo diese Art entweder von den Mönchen des Klosters Banz, oder von Prof. Küster angesiedelt worden sein dürfte. — Reuleaux beschreibt einige neue Formen aus der Gegend von München.

Schweiz. Taylor und Craven besprechen die Entdeckung der seither für ausschliesslich hochnordisch geltenden *Helix harpa* Say auf der Riffelalp, ein für die Lehre von der Eiszeit sehr wichtiges Vorkommen. — Schardt hat *Unio batavus* lebend im Genfer See gefunden. — Imhof erwähnt bei der Behandlung der Tiefseefauna der Alpenseen auch die Mollusken. — Die im Berichtsjahr erschienene Lieferung von Clessin behandelt die Clausilien.

Oesterreich-Ungarn. Ulicny beschreibt eine neue *Hyalina* aus Mähren. Sandor gibt zahlreiche Nachträge zu Slaviks Molluskenfauna von Böhmen. — Clessin zählt die Clausilien der Monarchie auf. — Bourguignat erhebt *Helix Pouzolzi* zu einer eignen Gruppe *Dinarica* und beschreibt aus dieser Gruppe 13 neue Arten. Letourneux beschreibt zwei neue Arten *Hydrocaena* aus Dalmatien. Blum zählt einige Funde aus dem istrischen Küstenlande auf. — Westerlund beschreibt eine neue *Helix* aus Steyermark.

Brancsik schildert einen Sammelausflug nach Bosnien.

Iberische Halbinsel. — Salvaña zählt die Fauna der Gegend von Olot in den Ostpyrenäen auf, im allgemeinen den Grundsätzen der Nouvelle Ecole folgend, doch mit erheblichem Zweifel gegen die Berechtigung vieler Arten. Es werden 116 Einschaler und 7 Zweischaler aufgeführt.

Kobelt behandelt die Zweischaler Niederandalusiens nach dem von Prof. Calderon in Sevilla gesammelten Material (6 sp. 5 n. sp.).

Simroth (1) behandelt das Verhältniss zwischen der portugiesischen und der azorischen Nacktschneckenfauna.

Hierher die mir unbekannt gebliebenen Arbeiten von Fagot über die Faunen des Valle de Essera in Arragonien und des Valle de Aran in Catalonien.

Zwei neue *Testacella* von Barcelona beschreibt Pollonera.

Girard bespricht einige Arten der *pisana*-Gruppe aus Portugal. Drouet beschreibt einen neuen *Unio* aus Spanien.

Italien. Hagenmüller vermehrt den Formenkreis der *Helix Raspailii* um acht neue Arten. — Pollonera beschreibt einen neuen *Limax* und zwei *Testacella* aus Italien. — Einzelne italienische Arten beschreiben Westerlund und Kobelt.

Nordafrika. Ancey beschreibt vier neue Arten aus Tunis. Neue Arten aus Nordafrika beschreiben auch Westerlund, Sowerby und Kobelt.

Balkanhalbinsel. Zwei neue Arten aus Griechenland beschreibt Böttger.

Neumayer erörtert das Vorkommen der fossilen *Paludina diluviana* Kunth an der Donaumündung; sie fällt wahrscheinlich mit einer der von Bourguignat beschriebenen neuen *Vivipara*-Arten zusammen. — *Balea fragilis* kommt nach Böttger p. 56 bei Steni auf Euböa vor; der Autor nimmt nach der geographischen Verbreitung der Art an, dass sie zu den ältesten europäischen Landschnecken gehört und besonders schon vor der allgemeinen Ausbreitung der Clausilien verbreitet war.

Vorderasien. Westerlund beschreibt zwei neue *Helix* von dort, Pollonera eine neue Nacktschneckengattung (*Mesolimax*).

Caucasus. Böttger zählt 11 neue Arten und Varietäten auf. Die Arbeiten von Retowski und Faussek sind ihrem wesentlichen Inhalte noch schon früher veröffentlicht und besprochen.

Innerasien. Kobelt (2) beginnt die Bearbeitung der turkestanischen *Buliminus*. — Auch Ancey gibt ein Verzeichniss der Arten dieser Gruppe.

China. Heude beschreibt 26 n. sp. und ein n. gen. aus China (*Clausilia*, *Helix* *Nanina*, *Buliminus*, *Funiculus*, *Myxostoma* und *Cyclophorus*); Derselbe ferner 14 n. sp. *Melania*. — Auch Möllendorff hat seine Arbeiten über die chinesische Fauna fortgesetzt und behandelt *Bythinia* (2 n. sp.) *Fossarulus*, *Stenothyra*, *Hydrobia*, *Lithoglyphus* und *Prososthenia*. — Das Vorkommen von *Bythinien*, welche zu der von Brusina auf Formen aus den slavonischen Paludinenschichten errichteten Gattung *Tylopoma* gehört, sowie eines echten *Fossarulus* und zweier *Prososthenia* ist in hohem Grade interessant für die Lehre von der Abstammung der tertiären Binnenmollusken. — Ancey beschreibt drei neue *Buliminus*.

Japan. Mabilie beschreibt eine neue *Helix*.

Atlantische Inseln. Guerne zählt einige Arten aus der Caldera von Fayal auf. Simroth behandelt die Nacktschnecken der Azoren, besonders in Beziehung auf ihre Herkunft.

Afrikantisches Reich.

Centralafrika. Smith zählt gelegentlich der Besprechung einiger von Emin Pascha eingesendeten Arten aus dem Albert Nyanza alle bis jetzt von dort bekannten Arten auf (15 sp., 5 n. sp.). Sieben Arten erscheinen bis jetzt eigenthümlich. —

Simroth gibt eine Uebersicht über die Verbreitung der innerafrikanischen Nacktschnecken und stellt vier neue Gattungen auf.

Stuhlmann erwähnt nur flüchtig die von ihm in Ostafrika und auf dem Weg nach den Seen gesammelten Arten.

Pollonera gibt nach den Sammlungen von Dr. Ragazzi einen wichtigen Beitrag zur Fauna von Schoa, zusammen 32 Arten, davon 19 neu. Der Charakter der Fauna ist, obschon die Arten meist verschieden sind, ein vorwiegend abessynischer mit zahlreichen Vitrinen, Buliminus und zwei sich an Fruticicola anschliessenden Helices. —

Westafrika. Vignon zählt 104 an der Westküste gesammelte Arten auf. — Eine Uebersicht der Fauna von Liberia gibt Schepman (27 sp., 4 n. sp.). — Eine neue Achatina von Assinie beschreibt Morelet.

Guinea-Inseln. Die Fauna von San Thomé zählt nach der neuesten Zusammenstellung von Crosse 22 Arten Landschnecken; Süßwasserschnecken sind eigenthümlicher Weise noch nicht bekannt. Vier Arten sind mit der Ilha do Principe gemeinsam, die übrigen eigenthümlich, darunter die Gattungen *Pyrgina* Greeff und *Thyrophorella* Greeff, welche aber nicht zu den Operculaten, sondern zu den Pulmonaten gehört, und die für den eigenthümlichen *Bulimus exaratus* Müll. bei *Perideris* neu errichtete Untergattung *Atopocochlis* Crosse et Fischer. Die beiden winzigen Cyclophoriden haben ihre nächsten Verwandten am Gabun und in Sierra Leone. Der Gesamtcharakter der Fauna ist tropisch afrikanisch; besonders charakteristisch sind die Homorus und die Naninen aus der Gruppe der hepatisation.

Auch für Ilha do Principe gibt Crosse eine neue Zusammenstellung. Die Molluskenfauna zählt demnach einschliesslich zweier Brak- und zweier Süßwasserarten 26 Arten, wobei allerdings *Columna* mit drei Arten gezählt ist. Diese Gattung, sowie die Testacellidengattung *Streptostele* sind der Insel wahrscheinlich eigenthümlich, zwei *Ennea* und eine echte *Perideris* lassen die Fauna noch ausgesprochener afrikanisch erscheinen. Mit dem Festland gemeinsam sind nur eine kleine *Stenogyra* und eine auch auf S. Thomé vorkommende *Succinea*.

Südafrika. Ancey beschreibt zwei neue Arten vom Cap und eine aus Damaraland. —

Madagascar. Ein neues *Cyclostoma* beschreiben Crosse et Fischer.

Tropisches Asien.

Englisches Indien. Godwin-Austen behandelt die indischen Arten der Gattungen *Macrochlamys*, *Girasia*, *Africaria*, *Oxytes* und beschreibt zahlreiche neue Formen aus Vorderindien, Burmah, den Shanstaaten, Siam sowie von den Andamanen und Nicobaren.

Sunda-Inseln. Smith beschreibt drei neue Arten und bespricht einige ältere von Sumatra, Java und Borneo. Schepman beschreibt eine neue Paludina von Borneo.

Philippinen. Hidalgo setzt seine Bearbeitung der Quadras'schen Ausbeute fort und behandelt in diesem Abschnitt die Gattungen *Amphidromus* (5 sp.), *Stenogyra* (3 sp.), *Pupa*, *Clausilia*, *Succinea*, *Vaginula*, *Oncidium*, *Melampus* (9 sp.), *Laimodonta*, *Marinula*, *Scarabus* (5 sp.), *Plecotrema* (4 sp.), *Cassidula* (7 sp., 2 n. sp.), *Auricula* (4 sp.), *Cyathopoma* (1 sp.), *Cyclotus* (5 sp.), *Opisthoporus* (1 n. sp.), *Diplommata* (5 sp., 1 n. sp.), *Cyclophorus* (23 sp., 6 n. sp.), *Leptopoma* (15 sp.). — Ausserdem beschreibt Derselbe noch eine neue *Obba* und 3 neue *Cochlostyla*.

Möllendorff gibt eine eingehende Revision der Hidalgo'schen Arbeiten. — Derselbe gibt Nachträge zu seiner ersten Veröffentlichung über Cebu, wo durch einen einheimischen Sammler besonders am Berge Mangilao 8 n. sp. gefunden wurden.

Sowerby beschreibt eine neue *Helix* von Mindanao.

Christmas-Island. Smith (3) bringt nach den Sammlungen von Lister, welcher dem Schiff *Egeria* als Naturforscher beigegeben war, die Binnenconchylienfauna dieser einsamen Insel auf 11 Arten, davon 6 eigenthümlich, 4 weit verbreitete Strandarten und ein *Leptopoma*, angeblich mit einer hinterindischen Art gemeinsam.

Australien.

Melanesien. Hartmann beschreibt von Aura Island, zur Gruppe der Neuen Hebriden gehörend, und im Malo Pass in der Nähe von Espiritu Santo gelegen (wohl Aragh der deutschen Karten) 4 *Partula*, 1 *Trochomorpha* und 1 *Helicina*, sowie von Vati in derselben Gruppe eine neue *Melania*. — Cox beschreibt eine *Cochlostyla* (?) von Neu-Irland. —

Neu Caledonien. Ancey (4) bespricht die systematische Stellung einiger Gattungen von dieser Insel.

Tasmanien. Petterd beschreibt 14 neue Arten Süsswasserconchylien und errichtet zwei neue Gattungen *Brazieria* und *Beddomeia*.

Neuseeland. Clessin gibt einen Abdruck des Hutton'schen Verzeichnisses der neuseeländischen Binnenconchylien.

Sandwichs-Inseln. Hartmann beschreibt eine neue *Amastra* von Molokai und vier neue *Achatinella*.

Amerika.

Vereinigte Staaten. Dall beschreibt eine neue *Hyalina* aus Ohio. — Sterki untersucht die amerikanischen *Vertigo* genauer und vergleicht sie sorgfältig mit den altweltlichen. — Simpson zählt die bei Fort Gibson und Enfaula im Indianerterritorium gesammelten Arten auf (1 n. sp.).

Grant führt 32 Arten aus Minnesota auf, Holzinger 89 aus Winona Cty., Marsh 96 Arten aus Illinois:

B. H. Wright beschreibt 11 neue Unioniden aus Florida. Call zwei aus der Ozark-Region. Hinckley zählt 14 Strepomatiden aus Illinois auf. — Kleine Beiträge zur nordamerikanischen Molluskenfauna lieferten Cockerell, Simpson, Shimek, Walker, Ford, Beauchamp.

Eine für das grössere Publikum berechnete Aufzählung der westlich der Felsengebirge lebenden Mollusken von Keep ist dem Referenten nicht zugänglich geworden.

Bermudas. Die anatomische Untersuchung der den Bermudas eigenthümlichen helixartigen Landschnecken (nach Ausschluss der eingeschleppten Europäer und Westindier) durch Pilsbry hat das überraschende Resultat ergeben, dass die fünf Arten (*Helix bermudensis*, *Nelsoni*, *Reiniana*, *circumfirmata* und *discrepans*) welche der verschiedenen Schalen wegen seither in zwei verschiedene Familien gestellt und in den verschiedensten Untergattungen und Gattungen herumgeworfen wurden, zu einer einzigen Gattung gehören, für welche der Autor den Namen *Poecilozonites* Böttger, der auf *Helix bermudensis* Pfr. einerseits, die tertiäre *Helix imbricata* Al. Braun andererseits begründet ist, annimmt. Die sämmtlichen Arten haben einen glatten Kiefer und keine Schwanzpore. Ihre grosse Verschiedenheit im Gehäuse beweist, dass die Absonderung der Bermudas schon sehr alt ist. Die Einwanderung kann nur von Westindien her durch den Golfstrom erfolgt sein, doch sind bis jetzt Arten von *Poecilozonites* aus Westindien noch nicht bekannt.

Jones gibt einen Sammelbericht, ohne über die Binnenconchylien Neues beizubringen.

Centralamerika. Die zehnte Lieferung des grossen Werkes von Fischer und Crosse über die Mollusken von Mexiko und Centralamerika behandelt die Deckelschnecken, *Habropoma* n. = *Cyrtotoma* Mörch. für *Cycl. mexicanus* und *Salleanus*; — *Amphicyclotus* n. gen. für die neuweltlichen *Cyclophorus* (5 sp.); — *Neocyclotus* n. gen. für die neuweltlichen *Cyclotus* und *Aperostoma* (4 sp.); und *Adamsiella* (2 sp.). Die genaue Anatomie spaltet auch hier wie überall die über die ganze Erde verbreiteten Gattungen in geographisch scharf umgränzte Gattungen oder Untergattungen.

Ancey beschreibt eine neue Art aus Mexiko (*Helix*).

Westindien. Crosse und Fischer trennen die westindischen, von Pfeiffer zu *Cyclostoma* im engeren Sinne gerechneten Arten von dieser Gattung und errichten für sie eine eigene Gattung *Colobostylus*; damit schwindet wieder ein geographisches Räthsel aus der Welt. Die neue Gattung hat ihren Hauptsitz mit 14 Arten auf Jamaica; dann folgen Haiti mit 5, Cuba mit 4, einzelne Arten finden sich auf Bahama und Trinidad. Sie steht *Diplopoma* und *Chondropoma* näher, als den altweltlichen *Cyclostoma*.

Smith zählt die Fauna der Insel Dominica auf, nach den Sammlungen von Ramage. Die Artenzahl steigt dadurch auf 33 (1 n. sp.), davon 10 der Insel eigenthümlich, 5 auch auf Portorico, 8—10 auf den Nachbarinseln vorkommend, die übrigen weiter verbreitet. Charakteristisch sind unter *Helix* die *Dentellaria* (4 sp.), unter *Bulimulus* die *Leiostracus* (4 sp.), *Amphibulina* (3 sp.) und die zahlreichen *Helicina* (9 sp.).

Maltzan beschreibt 12 n. sp. von Haiti.

Brasilien. Clessin zählt eine grössere Anzahl von Ihering theils bei Bahia, theils bei Taguara del mondo nuovo und im Auswurf des Guahyba gesammelte Arten auf (49 sp., 5 n. sp.)

Martens beschreibt ebenfalls zwei neue Arten aus Rio grande.

B. Marine Conchylien.

Allgemeines.

Pilsbry hält die Existenz einer Atlantis zur Eocän- und frühen Miocänzeit für sehr unwahrscheinlich; er nimmt an, dass zur Miocänzeit in Folge der anderen Vertheilung von Land und Wasser der Aequatorialstrom des indischen Oceans quer durch Nordafrika (?) ging, sich mit dem nördlichen Zweig des atlantischen Aequatorialstromes vereinigte und so eine mächtige Strömung bildete, welche die Ueberführung der europäischen Miocänfauna nach Westindien und von da noch Zentralamerika bewirken konnte. Der Strom drang wahrscheinlich auch durch den damals offenen Isthmus von Panama in den stillen Ocean und die heute an der Westküste Amerikas lebenden, mit westindischen identischen oder ihnen sehr nahe verwandten Arten wären somit alle atlantischen Ursprungs.

Agassiz und Dall erörtern ausführlich die Tiefseefauna besonders die der amerikanischen Küste. — Eine ähnliche, aber umfassendere, deutsche Arbeit gab Marshall.

Munthe und in geringerem Massstab Pelseneer behandeln die Verbreitung der Pteropoden durch die verschiedenen Oeane.

Arctisches Reich.

Holm zählt die von der Fylla an Grönland gesammelten Arten auf (keine n. sp.), Ganong ebenso die Fauna von Neu-Braunschweig, und Winckley die auf den Austerbänken von Neu-Braunschweig vorkommenden Arten.

Ostatlantisches Reich.

Von Kobelt's Iconographie der europäischen Meeresmollusken ist das achte Heft (das erste des zweiten Bandes) erschienen; es enthält die Gattungen *Cymbium*, *Volutomitra*, *Halia* und den Anfang der *Tritoniidae*. —

Normann hat (zu Tauschzwecken) einen Catalog seiner reichen Sammlung nordatlantischer Meeresconchylien drucken lassen.

Celtische Provinz. Kleinere faunistische Aufzählungen und einzelnen Bemerkungen zur Fauna von England gaben Robertson, Somerville, Heap, Galway. —

Petersen zählt aus dem Kattegat 113 Gastropoden und 86 Pelecypoden auf und erörtert ausführlich deren geographische Verbreitung.

Ostsee. Braun hat die Bucht von Wismar auf das Genaueste untersucht; die Mollusken sind lauter schon von der Mecklenburgischen Küste bekannte Arten.

Nordfrankreich. Servain zählt die Fauna von Concarneau auf, Dollfus die von Croisic.

Lusitanische Provinz. Simroth gibt Verzeichnisse der von ihm bei Porto in Portugal und an der Mündung des Guadiana gesammelten Meeresconchylien.

Fischer hat eine Corambe in der Bucht von Arcachon gefunden.

Mittelmeer. Monterosato gibt eine detaillirte Aufzählung der in der Bucht von Palermo vorkommenden Mollusken, mit zahlreichen neuen Varietäten.

Bucquoy, Dautzenberg und Dollfus haben ihre Fauna von Roussillon fortgesetzt; die erschienene Lieferung enthält Pelecypoden. — Locard bringt die Zahl der französischen Pecten auf 35 und beschreibt drei neue Modiola. — Vayssiére beschreibt zwei neue Nudibranchien aus dem Golf von Marseille, Marion und Kowalewsky zwei neue Proneomenia von dort, Hubrecht eine neue Nacktschneckengattung von Neapel.

Azoren. Simroth gibt ein Verzeichniss der von ihm selbst gesammelten, sowie der im Museum von Punta Delgada auf San Miguel befindlichen marinen Mollusken nach Bestimmungen von Ed. von Martens. Der Grundzug ist lusitanisch; nicht zur europäischen Fauna gehören Litorina striata, Janthina balteata, Haliotis coccinea, Pecten corallinoides, ferner Olivella mutica und eine Narica, die aber nur in schlechten Exemplaren vorliegen und wohl mit Ballast eingeschleppt sind. Die einer südlicheren Fauna angehörende Strand- schnecke Pedipes afer hat sich, durch warme Quellen im Meere begünstigt, hier ansiedeln können.

Westatlantisches Reich.

Vereinigte Staaten. Leidy zählt die in Beach Haven, N. J. gesammelten Arten auf. (Keine n. sp.) — Carpenter bringt die Fauna von Rhode Island auf 169 sp. (1 n. sp.).

Simpson liefert einige Beiträge zur Fauna von Florida (1 n. sp.).

Bermudas. Heilprin hat 110—120 Arten dort gesammelt, von denen die meisten, abgerechnet die kosmopolitischen Tritoniden, westindisch sind; ostamerikanische Arten kommen überhaupt nicht

vor, da der Golfstrom eine Ueberwanderung unmöglich macht, dagegen zwei westamerikanische, *Chama exogyra* und *Tellina Gouldii*, in von den californischen ununterscheidbaren Exemplaren. Die eigentliche Bearbeitung der Bermudafauna soll später in einem selbständigen Werke erfolgen. — Auch Jones zählt einige Arten von den Bermudas auf.

Westafrikantisches Reich.

Schepman zählt 17 bekannte Arten von *Liberia* auf; Martens erwähnt *Conus Prometheus* und *Strombus fasciatus* von Kamerun.

Indischer Ocean.

Jousseume zählt 218 Arten auf, die Dr. Faurot im rothen Meer und im Golf von Aden gesammelt hat (17 n. sp., 4 n. g.) — Caramagna zählt die von ihm im Golf von Assab gesammelten Arten auf (10 n. sp.). — Krukenberg erörtert nach eigenen Beobachtungen sorgfältigst den Einfluss des Kanals von Suez.

Bergh beschreibt von Mauritius 13 n. sp. und 3 n. gen. Nudibranchien, sowie eine Anzahl anderer Arten von weiteren Fundorten des indischen Oceans.

Tenison Woods zählt ca. 400 Arten aus der malayischen Region auf (keine n. sp.).

Ortmann beschreibt von Japan neun neue Cephalopoden und eine neue Gattung. —

Australisches Gebiet.

Tenison Woods erörtert ausführlich die Fauna von Südaustralien und Neuseeland und ihr Verhältniss zu anderen Faunen. Mit Europa gemeinsam sind 5 Arten. —

Brazier sammelte an Norfolk Island 36 Arten, davon keine neu. —

Verbreitung einzelner Gruppen etc.

Melvill erörtert eingehend die Verbreitung der Cypraeen. Er findet in der nearktischen Region 8 sp., in der neotropischen 28, in der paläarktischen 32, in der äthiopischen, zu der er aber auch das Cap und die maskarenischen Gebiete rechnet, 32, in der australischen (Australien, Tasmanien, Neuseeland und die Viti-Inseln) 48, in der orientalischen Region einschliesslich Polynesien 105 Arten. Die reichste einzelne Lokalität ist das Gebiet der polynesischen Inseln, wo Garret 75 Arten zusammenbrachte.

2. Systematik.

a. Cephalopoda.

a. Octopoda.

Octopodidae.

Octopus (L.) *chromatus* n. Bermudas; Heilprin p. 324 t. 16 fig. 1; — *kagoshimensis* n. p. 644 t. 21 fig. 2; — *Brocki* n. p. 645 t. 21 fig. 4 t. 22 fig. 1, beide aus Japan; Ortmann.

Tremoctopodidae.

Tremoctopus (delle Ch.) *Döderleini* n. Tokio, Japan; Ortmann p. 642 t. 20.

b. Dekapoda.

α. Myopsidae.

Sepiolini.

Microtenthis n. gen., zunächst mit *Rossia* verwandt, aber ohne Innenschale, die Flossen nierenförmig und hinter der Körpermitte stehend; der ebenfalls auf der Rückseite liegende Mantel in andere Weise befestigt, für *M. paradoxa* n. von Kadysiyama, Japan; Ortmann p. 648 t. 22 fig. 4.

Sepiarii.

Sepia (L.) *Hoylei* n. Ortmann p. 650 t. 22 fig. 5, t. 23 fig. 1; — *torosa* n. id. p. 652 t. 23 fig. 2; — *tokioënsis* n. id. p. 653 t. 23 fig. 3, sämtlich von Japan.

Loliginei.

Loligo (L.) *tetradynamia* n. Ortmann p. 659 t. 23 fig. 4, t. 25 fig. 1; — *aspera* n. id. p. 661 t. 25 fig. 1, beide von Japan.

b. Aegopsidae.

Ommastrephini.

Ommastrephes (d'Arb.) *Gouldi* n. Victoria; M. Coy.

b. Pteropoda.

Ihering restimirt kurz die Frage nach der systematischen Stellung der Pteropoden und beansprucht die Priorität für die Erkennung der Gastropoden-natur derselben.

Pelseneer schliesst sich dem Vorschlage von Boas (cfr. Bericht 1886 p. 411) diese Klasse ganz aufzugeben an, stellt aber die *Gymmosomata* nicht wie dies, Boas vorschlägt, zu den *Bulliden*, sondern neben *Aplysia*. Er reduziert sämtliche für die *Thecosomata* vorgeschlagenen Gattungen (34) auf 8 und vertheilt diese in drei Familien.

α. Thecosomata.

Limacinidae.

Peraclis (Fbs.) *bispinosa* n., mittlerer atlantischer Ocean; Pelseneer p. 36 t. 1 fig. 9, 10.

Agadina (Gould) ist nach Pelseneer p. 37 auf eine Gastropodenlarve gegründet.

Cavoliniidae.

Clio (L.) *polita* n. atlantischer Ocean; Pelseneer p. 60 t. 2 fig. 4—6.

Cleodora (Per.) *Scheelei* n. Westküste von Patagonien; Munthe p. 18 fig. 15—19.

Cymbuliidae.

Cymbulia (Per. et Les.) *parvidentata* n. Neuseeland; Pelseneer p. 99 t. 2 fig. 12, 13.

Cymbuliopsis n. gen. für *Cymbulia ovata* Quoy und *calceola* Verrill; Pelseneer p. 100.

c. Gastropoda.

I. Prosobranchia.

A. Pectinibranchia.

a. Proboscidifera.

Muricidae.

Ocenebra (Leach) *Michaeli* n. Südkalifornien; Ford p. 188 (fig.). —

Murex (*Homalocantha*) *Fauroti* n. Rothes Meer, Jousseume p. 180.

Buccinidae.

Lachesis (Risso). Die seither zu den Pleurotomiden gestellte Gattung gehört nach der Untersuchung der Zungenbewaffnung durch Fischer zu den Bucciniden.

Siphonalia (Ad.) *mikado* n. und *pseudobuccinum* n., beide von Japan; Melvill p. 348, mit Holzschnitten.

Tritonidea (Sw.) *rufina* n. Rothes Meer; Jousseume p. 178. —

Nassidae.

Nassa (*Phrontia*) *obockensis* n. rothes Meer; Jousseume p. 184. — (*Tritia*) *Fauroti* n. id. p. 186, *ibid.* —

Columbellidae.

Columbella (*Atilia*) *Fauroti* n. rothes Meer; Jousseume p. 177; — *Filbyi* n. Südsee; Sowerby p. 208 t. 11 fig. 8, 9.

Engina (Gray) *angulata* n. Hongkong; Sowerby p. 210 t. 11 fig. 10.

Purpuridae.

Cooke gibt eine eingehende Kritik der Tryon'schen Bearbeitung der Gattung *Purpura* Lam. und verwirft zahlreiche von diesem Autor auf ungefähre Aehnlichkeiten hin vorgenommene Zusammenziehungen.

Concholepas (Lam.) gehört nach Haller nicht zu den Purpuriden, sondern zu den Buccinidae.

Coralliophilidae.

Coralliophila (Ad.) *turrita* n. Mauritius; Sowerby p. 209 t. 11 fig. 11.

Mitridae.

Mitra (L.) *Marionae* n. unbekannten Fundortes; Melvill p. 281 t. 2 fig. 11; *aerumnosa* n. Algoabai; id. p. 282 t. 2 fig. 12; — *astyridiformis* n. unbekannten Fundortes, id. p. 282 t. 2 fig. 13; — *caloxesta* n. Andamanen; id. p. 283 t. 2 fig. 14; — *chariessa* n. unbekannten Fundortes, id. p. 283 t. 2 fig. 15; — *transenna* n. Ostindien; id. p. 283 t. 2 fig. 16; — *Sybillae* n. Andamanen; id. p. 284 t. 2 fig. 17; — *peronodictya* n. ?Philippinen; id. p. 284 t. 2 fig. 18; — *cerithina* n. unbekannten Fundortes; id. p. 285 t. 2 fig. 19; — *bela* n. desgleichen; id. p. 285 t. 2 fig. 20; — *tensa* n. desgleichen; id. p. 286 t. 2 fig. 21; — *abacophora* n. desgleichen; id. p. 286 t. 2 fig. 22; — *rhodinosphaera* n. Mauritius; id. p. 286 t. 2 fig. 23; — *zythochroa* n. unbekannten Fundortes; id. p. 287 t. 2 fig. 24; — *fulvosulcata* n. Mauritius; id. p. 287 t. 2 fig. 25. —

Die Synonymie und Verwandtschaft der immer noch auf einem einzigen Exemplar beruhenden *Mitra* (*Costellaria*) *rugosa* Swainson erörtert Melvill p. 332; wegen der älteren *M. rugosa* Gmelin wird sie in *Tankervillei* umgetauft.

b. *Toxoglossa*.

Pleurotomidae.

Bela (Leach) *incondita* n. unbekannten Fundortes; Smith (9) p. 316.

Clathurella (Carp.) *scabrata* n., *crassilirata* n., *pachychila* n., sämtlich unbekannten Fundortes; Smith (9) p. 314, 315; — *munda* n. persischer Meerbusen, China, id. p. 316.

Crassispira (Sw.) *bifurca* n. unbekannten Fundortes; Smith (9) p. 308.

Drillia (Gray) *unifasciata* n. Ceylon, China; Smith (9) p. 300; — *crassa* n. Bombay; id. p. 300; — *roseobasis* n. unbekannten Fundortes; id. p. 301; — *ventricosa* n. Queensland; id. p. 301; — *granularis* n. unbekannten Fundortes; id. p. 301; — *simata* n. ebenso, id. p. 302; — *essingtoniensis* n. Port Essington; id. p. 302; — *parva* n. Suez, id. p. 302, — *jucunda* n. unbekannten Fundortes, id. p. 303; — *consanguinea* n. desgleichen, id. p. 303; — *rubrofusca* n. China, id. p. 303; — *bilirata* n. unbekannten Fundortes, id. p. 304; — *suavis* n. Sydney, id. p. 304; — *cretata* n. Panama, id. p. 305; — *multicostellata* n. Philippinen, id. p. 305; — *fijiensis* n. Ovalau, Viti; id. p. 305; — *dejecta* n. Philippinen, id. p. 306; — *semipellucida* n. unbekannten Fundortes, id. p. 306; — *persica* n. persischer Golf; id. p. 307. — *paucistriata* n. Kalifornien, id. p. 307; — *disjecta* n. indischer Ocean; id. p. 307; — *Cookei* n. Jamaica; id. p. 308.

Lienardia (Ad.) *obockiensis* n. Rothes Meer; Jousseaume p. 183.

Mangilia (Risso) *fulgens* n., *notabilis* n. beide unbekannten Fundortes; Smith (9) p. 309; — *recta* n. persischer Meerbusen, id. p. 310; — *Fordii* n. unbekannten Fundortes, id. p. 310; — *parilis* n. Kalifornien, id. p. 310; — *lata* n. China, id. p. 311, — *decipiens* n. unbekannten Fundortes; id. p. 311, — *Lischkei* n. Japan, id. p. 311, — *costellata* n. unbekannten Fundortes, id. p. 312; *fortistriata* n. Bombay, id. p. 312; — *mamillata* n. unbekannten Fundortes; id. p. 313; — *subquadrata* n. St. Helena, id. p. 313; — *granilirata* n. unbekannten Fundortes; id. p. 314.

Pleurotoma (Lam.) *Fultoni* n. Port Elisabeth; Sowerby p. 210 t. 11 fig. 17; — *Bulowi* n. China id. p. 211 t. 11 fig. 16. — *contempta* ? n. unbekannten Fundortes; Smith (9) p. 316.

Surcula (Ad.) *fuegensis* n. Magellansstrasse; Smith (9) p. 300. —

c. *Rostrifera*.

Cypraeidae.

Cypraea (L) *Rashleighbana* n. unbekannten Fundortes; Melvill p. 283 t. 2 fig. 26. — *Hungerfordi* n. Japan? Sowerby p. 208 t. 11 fig. 1—3; — *caput draconis* n. Hongkong; Melvill (6) p. 33 fig. 1; — *amphithales* n. Port Elisabeth; id. p. 40 fig. 19.

Melvill (6) gibt einen Catalog der Gattung, in dem er zahlreiche Bemerkungen, besonders über die seltenen Formen, und die geographische Verbreitung macht, er erkennt 184 Arten an.

Cassidide.

Cassis (L.) *cernica* n. Mauritius, Sowerby p. 211 t. 11 fig. 19.

Faurotis n. gen., zunächst mit *Semicassis* verwandt, aber mit gefaltetem Mundrand, für *F. faurotis* n. aus dem rothen Meer; Jousseaume p. 188.

Cerithiidae.

Clypeomorus n. gen. für *Cl. clypeomorus* n. aus dem rothen Meer; Jousseaume p. 172.

Turritellidae.

Turritella (Lam.) *robusta* n. unbekannten Fundortes; Sowerby p. 211 t. 11 fig. 18.

Melaniidae.

Melania (Lam.) *pacificans* n., *aristarchorum* n., *textrix* n., *leprosa* n., *telenaria* n., *theaeopotes* n., *Oreadarum* n., *resinacea* n., *friniana* n., *Toucheana* n., *Aubryana* n., *Soriniana* n., *Delavayana* n., *erythrozona* n., alle aus China; Heude p. 305–309; — *liricincta* n. Albert Nyanza; Smith p. 52 (fig.); — *aberrans* n. Brot mss. Vati, Neue Hebriden; Hartmann p. 252 t. 13 fig. 8 (= *costata* Quoy et Gaym. teste Hoyle; — *Sancti Pauli* n. p. 248 t. 10 fig. 2; — *liberiensis* n. p. 248 t. 10 fig. 3, 4, — *Büttikoferi* n. p. 249 t. 10 fig. 5, sämtlich von Liberia; Schepman.

Paludinidae.

Bythinia (Leach) *grandis* n. Hunan, China; Möllendorff p. 132; — *Fuchsiana* n. *ibid.*, id. p. 134; — *robusta* v. *minor* n. Lo-fou-shan bei Canton; id. p. 134; — *Shuttleworthi* Ffld. = *longicornis* Benson prior, id. p. 135; — *Alberti* n. Albert Nyanza; Smith p. 54; — *Walleri* n. *ibid.*, id. p. 54 (fig.); — *ammoecia* n. Hamburg; Servain p. 304.

Cleopatra (Troschel) *Emini* n. Albert Nyanza; Smith (2) p. 54 (fig.).

Paludina (Lam.) *Semmelinki* n. Tabamo auf Borneo, Schepmann; — *liberiana* n. Liberia; id. p. 247 t. 10 fig. 1.

Hydrobiidae.

Amnicola (Gould) *alsteriana* n. Hamburg; Servain p. 306 pl. 8 fig. 11; — *hochburica* n. *ibid.*, id. p. 306 t. 8 fig. 10a; — *mulierum* n. *ibid.*; id. p. 307 t. 8 fig. 12.

Beddomeia n. subg. von *Potamopyryus* (der Name schon vergeben) für *Amnicola launcestonensis* Johnst., Petterd p. 15; — *Belli* n. id. p. 16 t. 5 fig. 7; — *Lodderae* n. id. p. 16 t. 3 fig. 1; — *Hulli* n. id. p. 17 t. 1 fig. 8, sämtlich aus Tasmanien.

Brazieria n. gen. für *Ampullaria tasmanica* Ten. Woods (der Name gleichzeitig von Ancey für eine Untergattung von *Helix* verwandt); Petterd p. 17. (Der Typus Taf. 1 fig. 1. abgebildet).

Bythinella *Clessini* n. Mähren; Rzehak p. 95 fig. 3.

Fossarulus (Neum.) *sinensis* n. Neumayr mss. Möllendorff p. 136 t. 4 fig. 3, die erste lebende Art eine seither nur aus dem Tertiär bekannten Gattung.

Frauenfeldia (Cless.) *Lacheineri* v. *Apfelbecki* n. Bosnien; Brancsik (3) p. 168.

Hydrobia (Hartm.) *turbinata* n. Tasmanien; Petterd p. 18 t. 2 fig. 3.

Lithoglyphus (Müblf.) *viridulus* n. Hunan; Möllendorff p. 141 t. 4 fig. 6; — *Fuchsianus* Möll. ebenda t. 4 fig. 5 zum erstenmal abgebildet.

Liogyrus (Gill) Lehnerti n. Washington, D. C., Ancey p. 79.

Potamopyrgus (Crosse) Woodsii n. Tasmanien; Petterd p. 12 t. 1 fig. 12 — Smithi n. ibid., id. p. 13 t. 1 fig. 10; — Browni n. ibid., id. p. 13 t. 3 fig. 14, — ? marginata n. ibid., id. p. 14 t. 1 fig. 9.

Prososthenia (Neum.). *Oncomelania* Gredler gehört nach Möllendorff p. 142 zu dieser auf slavonische Tertiärformen errichteten Gattung, kann aber als Sektion vielleicht beibehalten werden. — *Schmackeri* n. Shanghai, id. p. 143 t. 4 fig. 4. —

Pyrgophorus n. subg. *Pyrgulopsidis*, für die bythinienartigen Formen; Ancey p. 187.

Pyrgulopsis (Ancey) nicaraguanus n. Nicaragua; Ancey p. 194; — coronatus n. Vera Cruz; id. p. 197; — Wrighti n. Coatepeka, id. p. 199; — hydrobioides n. ibid., id. p. 201.

Valvatidae.

Valvata (Drp.) mergella Westerl. = sincera Say teste Pilsbry.

B. *Scutibranchia*.

a. *Rhipidoglossa*.

Turbinidae.

Collonia (Gray) Gestroi n. Assab am rothen Meer, Caramagna p. 132 t. 8 fig. 10 (nach Pilsbry p. 262 zu *Leptothyra* zu stellen).

Leptothyra (Migh.) Carpenteri n. Californien; Pilsbry-Tryon p. 247 t. 39a fig. 26—29; — Folini nom. nov. für *L. sanguinea* de Folin n. L.

Turbo (L.) subcastaneus n. unbekannten Fundortes; Pilsbry-Tryon p. 204 t. 46 fig. 10, 11; — heterocheilus n. desgl., id. p. 209 t. 49 fig. 22, 23.

Phasianellidae.

Pilsbry-Tryon vereinigen diese Familie als Unterfamilie mit den *Turbinidae* und errichten für *Ph. variegata* Lam. und Verwandte, welche im Gebiss verschieden sind, die Untergattung *Orthomesus* n.

Phasianella (Lam.) Deaniana n. Corisco, Westafrika; id. p. 169 t. 65 fig. 40—43. — Fordiana n. Singapore; id. p. 173 t. 40 fig. 5; — Peroni n. Australien; Mabile p. 77; — Marchei n. Philippinen; id. p. 77. —

Trochidae.

Clanculus (Mtf.) assabensis n. Assab; Caramagna p. 131 t. 8 fig. 8.

Euchelus (Phil.) Delpretei n. Assab; Caramagna p. 131 t. 8 fig. 9.

Gibbula (Mtf.)? Ponsonbyi n. Port Elisabeth, Sowerby p. 209 t. 11 fig. 5; — Doriae n. Assab; Caramagna p. 127 t. 8 fig. 3; — Pantanellii n. ibid., id. p. 128 t. 8 fig. 4. — Tapparonei n. ibid., id. p. 129 t. 8 fig. 5; — Isselii n. ibid., id. p. 129 t. 8 fig. 6; — Degregorii n. ibid., id. p. 130 t. 8 fig. 7.

Gibbulastra n. subg. für *Trochus divaricatus* L.; Monterosato p. 177.

Minolia (Ad.) Caifassii n. Assab.; Caramagna p. 126 t. 8 fig. 1. —

Zizyphinus (Leach) exquisitus n. unbekannten Fundortes; Sowerby p. 210 t. 11 fig. 6, 7.

Cyclostremidae.

Cyclostrema (Marr.) Archeri n. Singapore; Tryon p. 89 t. 33 fig. 84, 85; — Verrilli nom. nov. für *C. cingulatum* Verrill, id.; Dunkeri nom. nov. für *cingulatum* Dki., id.; — Watsoni nom. nov. für *sulcatum* Watson nec. A. Ad. id.

— subexcavatum nom. nov. für excavatum Wats. nec Carp.; — proximum. nom. nov. für affinis Verrill nec Jeffr. id.

Vitrinella (Ad.) Meneghinii u. Assab.; Caramagna p. 127 t. 8 fig. 2.

Haliotidae.

Haliotis (L.) Jousseaumei n. unbekannten Fundortes; Mabilie p. 81.

b. Dokoglossa.

Patellidae.

Mabilie beschreibt von der atlantischen Küste Frankreichs und den atlantischen Inseln folgende Formen als neue Arten: Taslei n. p. 78, — ordinaria n. Canaren p. 79, — Gondoti n. Tanger p. 79, — teneriffae n. Teneriffa p. 80, — Servaini n. Nordfrankreich, p. 80.

Monterosato schlägt für *P. lusitanica* Gmel. eine eigene Untergattung *Patellastra* vor.

II. Opisthobranchia.

a. Tectibranchiata.

Aplysiidae.

Aplysia (L.) aequorea n. Bermudas; Heilprin p. 325 t. 16 fig. 2.

b. Nudibranchiata.

Dorididae.

Baptodoris (Bergh) tuberculata n. Mauritius; Bergh p. 812 t. 84 fig. 1—4.

Chromodoris (Ald.) zebra n. Bermudas; Heilprin p. 327 t. 16 fig. 3.

Discodoris (Bgh.) coerulescens n. Mauritius; Bergh p. 805 t. 83 fig. 6—12; concinniformis n. ibid., id. p. 807 t. 83 fig. 1—5.

Phyllobranchidae.

Cyerce (Bgh.) pavonina n. Mauritius; Bergh p. 764 t. 77 fig. 3—5, t. 78 fig. 10—18, t. 79 fig. 22—25.

Hermaeidae.

Hermaea (Lov.) minor n. Mauritius; Bergh p. 774 t. 78 fig. 4—7, t. 79 fig. 21. —

Plakobranchidae.

Plakobranchus (v. Hass.) virgatus n. Mauritius; Bergh p. 758 t. 77 fig. 8, t. 78 fig. 20—22; — ? Moebii n. ibid., id. p. 759 t. 78 fig. 19. —

Aeolidiadae.

Aeolidiella (Bgh.) indica n. Mauritius; Bergh p. 781 t. 78 fig. 1. 2; — orientalis n. Indischer Ocean; id. p. 673 t. 16 fig. 8—13.

Coryphella (Gray) Berghii n. Golfe du Lion; Vayssière p. 128 t. 7 fig. 4. 5.

Facelina (Ald.) Marionii n. Golfe du Lion; Vayssière p. 126 t. 7 fig. 1—3.

Hervia (Bergh) rosea n. Indischer Ocean; Bergh p. 677 t. 16 fig. 1—7, t. 17 fig. 1—3.

Bergh stellt aus dieser Familie folgende neue Gattungen auf:

Boeolidia n. gen. „Forma corporis minus depressa quam in Aeolidiis propriis; rhinophoria annulata moriformia, tentacula digitiformia; papillae dorsales non numerosae, compressae, sat breves; margo anterior podarii profunde sulcatus; angulis fortiter productis. Penis inermis. Mandibulae applanatae; margo masticatorius sublaevis. Radula uniseriata, dentibus simpliciter pectinatis.“ Typus *B. Moebii* n. p. 777 t. 79 fig. 10—16, t. 80 fig. 1—4.

Facalana n. gen. „Forma corporis fere ut in *Facelinis*, elongata, gracilis; tentacula elongata, rhinophoria perfoliata; papillae dorsales sat facile caducae, elongatae, teretes, ut plurimum pulvinaribus hippocrepidiiformibus insertae; podarium antice angulis tentaculatim productis. Mandibulae fere ut in *Glaucis*, lamina horizontali supera, convexitate superiori et breviori, convexitate inferiori et longiori; margo masticatorius serie denticulorum minorum armatus. Radula non paucidentata; dentibus uniseriatis, cuspidatis, denticulatis. Glans penis foliacea, margine glandulis majoribus peculiaribus armata.“ Typus: *F. pallida* n. Mauritius p. 784 t. 78 fig. 3, t. 79 fig. 1—3.

Fenrisia n. gen. „Forma corporis subelongata; rhinophoria lateralia perfoliata; tentacula nulla; papillae dorsales pedamentis humilibus impositae, non caducae; podarium sat latum, margine antico sulco exaratum et angulis tentaculatim productis. Margo masticatorius mandibularum laevis. Radula dentibus uniseriatis paucis; dentes depressi, acie pectiniformi, dentibus longioribus iterum denticulatis. Glandulae ptyalinae. Penis inermis.“ — Typus: *F. Moebii* n. Mauritius, p. 788 t. 77 fig. 1, t. 79 fig. 17—20, t. 80 fig. 5—12.

Moridella n. gen. „Corpus gracilius, elongatum, subcompressum; rhinophoria quasi moriformia; tentacula sat elongata. Papillae (dorsales) vix caducae, elongatae, seriebus obliquis dispositae, antice areis confertis. Podarium sat angustum, antice angulis tentaculatim productis. Mandibulae non elongatae; processus masticatorius nonnihil curvatus, sine denticulorum grossiorum singula. Dentes linguae uniseriati, fere ut in *Facelinis*. Penis inermis.“ Typus: *M. Brockii* n. aus dem indischen Ocean; p. 690 t. 17 fig. 4, 5, t. 18 fig. 1—5.

Dotonidae.

Doto (Oken) *indica* n. Mauritius; Bergh p. 795 t. 78 fig. 23—27.

Melibidae.

Melibe (Rang) *ocellata* n. Indischer Ocean; Bergh p. 689 t. 17 fig. 13, 14, t. 19 fig. 3, 4.

Pleuroleuridae.

Pleuroleura (Bergh) *fortunata* n. Indischer Ocean; Bergh p. 353 t. 10, t. 11 fig. 1—9. Bergh gibt l. c. eine Monographie der Gattung.

Tritoniadae.

Candiella (Gray) *dubia* n. Mauritius; Bergh p. 797 t. 80 fig. 13—21.

Cochlosyringia.

Voigt errichtet eine neue Unterordnung für ein seltsames Geschöpf, das er auf *Myriotrochus Rinkii* aus dem Beringsmeer schmarotzend gefunden hat, *Entocolax Ludwigi* n. gen. et spec., und für ein verkümmertes Mollusk hält. Die Organisation des Thieres ist aber so rudimentär, dass die Zugehörigkeit zu den Mollusken durchaus nicht erwiesen ist; Radula, Kiefer, Circulations- und Respirationsorgane fehlen gänzlich, es ist nur eine Röhre übrig geblieben, die am vorderen Ende knopfartig verdickt ist und damit in den Wirth eindringt.

Heteropoda.

Smith hält in der Bearbeitung der Ausbeute der Challenger diese Ordnung aufrecht und theilt sie in die Unterabtheilungen *Pterotrachaeidae* mit den Gattungen *Pterotrachaea*, *Firoloida*, *Cardiopoda* und *Carinaria*; und *Atlantidae* mit den Gattungen *Atlanta* und *Oxygyra*. Je eine neue Art von *Pterotrachaea* und *Carinaria* werden beschrieben und abgebildet, aber nicht benannt.

III. Neurobranchia.

Assimineidae.

Assiminea (Gray) *bicincta* n. Tasmanien; Petterd p. 18 t. 2 fig. 4.

Cyclotidae.

Cyclotus (Guildg.) ? *Martensi* n. Haiti; Maltzan p. 179.

Myxostoma (Troschel) *Delavayanum* n. China, Heude p. 243.

Cyathopoma (Blfd.) *meridionale* n. Cebu; Möllendorff p. 146.

Alycaeus (Gray) *Spratti* n. Shan Hills; Godwin-Austen p. 245.

Opisthoporus (Bens.) *Quadrasi* n. Crosse mss., Balabak, Philippinen; Hidalgo p. 59 t. 5 fig. 6.

Diplommatinidae.

Diplommatina (Bens.) *gracilis* n. Cebu; Möllendorff p. 148 t. 4 fig. 9.
— *Tablasensis* n. Tablas; Hidalgo p. 62 t. 5 fig. 7. — *Schmackeri* n. Guangdong, China; Möllendorff (4) p. 38; — *palatalis* n. Morong; Möllendorff (6) p. 77; — *flubriosa* n. *ibid.*, id. p. 77. — *Schadenbergi* n. Luzon; id. p. 141.

Cyclophoridae.

Cyclophorus (Montf.) *Vandellii* Nobre, S. Thomé, zum ersten Mal abgebildet von Crosse J. C. p. 27 t. 1 fig. 2; — *daraganicus* n. Luzon, Philippinen; Hidalgo, p. 68 t. 4 fig. 2; — *benguetsensis* n. Nordluzon id. p. 69 t. 4 fig. 3; — *Quadrasi* n. Paragna; id. p. 70 t. 4 fig. 4; — *Prieto* n. Catanduanes; id. p. 71 t. 4 fig. 5; — *Fernandez* n. Calapan, Mindoro; id. p. 72 t. 4 fig. 6; — *Bustoi* n. Balaguan bei Mindanao; id. p. 78 t. 5 fig. 4; — *Sowerby* n. Jolo, Masbate, Marinduque Cebu; id. p. 80; — *cooptus* n. Tag-ninh, Cochinchina; Heude p. 243; — *aurantiacus* Schum.; eine Reihe hübscher Varietäten abgebildet bei Martens; — *sericatus* n. Sangirinseln; Ancey p. 213. —

Cyclosurus (Morelet). Fischer gibt die Anatomie dieser seltsamen Gattung; sie kann den Cyclophoriden zugerechnet werden, ist aber generisch gut verschieden.

Amphicyclotus n. gen. für die centralamerikanischen Cyclophoriden mit nicht zurückgeschlagenem Mundsaum und dünnem, vielgewundenem Deckel; Crosse et Fischer

Habropoma n. gen. (= *Cyrtotoma* Mörch) für *Cyclophorus mexicanus* Mke. und *Salleanus* Mts.; Crosse et Fischer.

Neocyclotus n. gen. für die amerikanischen Cyclophoriden mit Kalkdeckel mit Ausnahme der Jamaicaner *Platystoma*; Crosse et Fischer.

Lagochilus (Theob.) *mucronatus* n. Bulakan, Philippinen, Möllendorff (6) p. 76.

Leptopoma (Pfr.) *cuticulare* n. Manila; Möllendorff (6) p. 75; — *roseum* n. Manila; id. p. (5) p. 142.

Cyclostomidae.

Cyclostoma (Tropidophora) *eustolum* Crosse et Fischer zuerst abgebildet J. C. t. 1. Fig. 1.

Colobostylus n. g für die seither zu *Cyclostoma* gerechneten Westindier; Crosse et Fischer p. 233. Der Deckel unterscheidet sich von dem der europäischen *Cyclostoma* durch die Trennung der äusseren und der inneren Lage und gleicht mehr dem von *Diplopoma*; auch die Zungenbewaffnung, besonders die Bildung des Aussenzahnes, gleicht der der übrigen westindischen *Cyclostomiden*.

Choanopoma (Pfr.) Kobelti n., Bertini n., *strictecostatum* n., sämlich von Haiti; Maltzan p. 180. 181.

Chondropoma (Pfr.) *subreticulatum* n. Haiti; Maltzan p. 181.

Licina? (Gray) *Rollei* n. Haiti, Maltzan p. 179.

Pomatiidae.

Pomatias (Stud.) *bolosianus* n. Catalonien; Salvaña p. 118; — *euconus* n. et var. *platygyrus* n. Dschebel Ischkeul bei Bizerta, Tunis, Ancey p. 214.

Helicinidae.

Helicina (Lam.) *Layardi* n. Aura Island, Neue Hebriden; Hartmann p. 251 t. 13 fig. 6; — *haitensis* n. Haiti; Maltzan p. 182. — *siquijorica* n. Siquijor, Philippinen; Möllendorff p. 142. —

Hydrocenidae.

Hydrocena (Parr.) *Bourguignati* n. und *Tanousi* n., Dalmatien, Letourneux p. 247.

IV. Pulmonata.

I. Stylommatophora.

a. Agnatha.

Ennea (Ad.) *Kochiana* (*Diaphora*) n. Cebu; Möllendorff (6) p. 79. — (*Huttonella*) *Hidalgoi* n. Bulakan; Ancey p. 78. — Derselbe erklärt *E. perakensis* Nev. für auf eine unausgewachsene Schale gegründet.

Oleacina (Bolten) *Mülleri* n. Haiti; Maltzan p. 179.

Streptaxis (Gray) *Thebawi* n. Shan Hills; Godwin Austen p. 243.

Testacella (Cuv.) *dubia* n. Turin; Pollonera p. 2 t. 2 fig. 4–6; *subtrigona* n. *ibid.*, id. p. 3 t. 2 fig. 1–3; — *barcinonensis* n. Barcelona; id. p. 4 t. 2 fig. 13–16; — *catalonia* n. *ibid.*, id. p. 5 t. 2 fig. 7–9, 17. — Die Unterschiede zwischen *T. scutulum* und *haliotidea* und deren Verbreitung in England erörtert ausführlich Taylor.

b. Vitrinidae.

Africarion (Nev.) *ater* n. Travancore, Tinnevely Hills, Godwin-Austen p. 244 t. 57 fig. 1. 2.

Austenia (Bedd.) ?*khyoungensis* n. und ?*erratica* n. aus den Shan-Staaten; Godwin-Austen p. 241.

Euplecta (Pfr.) *carinaria* n. Manila, Möllendorff (5) p. 143. — *pringangensis* n. Schan-Staaten; Godwin-Austen p. 342.

Girasia (Gray) *Dalhousiae* n. Chamba Hills; Godwin-Austen p. 224 t. 61 fig. 1, t. 62 fig. 4. — *pankabariensis* n. Darjiling; id. p. 237 t. 52 fig. 4; — (*Austenia*?) *Theobaldi* n. Tschinabthal; id. p. 236 t. 52 fig. 5 G.-(A.) *serahanensis* n. Suttletschthal id. p. 237 t. 52 fig. 4; — (*Dekhania*) *Beddomei* n. Travancore; id. p. 243 t. 58 fig. 1, t. 62 fig. 7; — (*Ibycus*) *sikkimensis* n. Sikkim; id. p. 239 t. 59 fig. 2; — (*Ib.*) *cacharica* n. Kaschar; id. p. 62 fig. 5.

Helicarion (Fér.) *Ragazzii* n. Schoa; Pollonera p. 55 t. 2 fig. 12–15.

Hemiplecta (Alb.) *Hidalgoi* n. = *xanthotricha* Semper nec Pfr., Luzon; Möllendorff p. 119 (*velutina* Hid. = *Mörchii* Pfr., *xanthotricha* Pfr. = *velutina* Sow. (fide Möll.); — ?*rimmayensis* n. Siam; Godwin-Austen p. 241; — (*Plectopylis*) *Ponsonbyi* n. Mandalay; id. p. 243.

Hemitrichia n. gen. für die behaarten Arten aus der Gruppe der *Naenia velutina* Sow.; Möllendorff (6) p. 81; — *Hidalgoi* n. Manila, id. p. 85.

Hyalina (Alb.) *ischnusae* n. Sardinien; Westerland p. 55; — *Tschapeki* n. Steyermark; id. p. 56; — *misella* n. Algerien, id. p. 56; — *oxystoma* n. Algerien; id. p. 57; — *inopinata* n. Mähren; Ulicny p. 112; — *Sterkii* n. Vereinigte Staaten; Dall p. 214; — *Iheringi* n. Taguaro, Brasilien; Clessin p. 166; — (*Polita*) *subeutralis* n. Kaukasus; Böttger p. 149; — (*P.*) *oschtenica* n. ibid., id. p. 150, — (*Retinella*) *difficilis* n. ibid., id. p. 150.

Kaliella (Blfd.) *pseudositala* n. Cebu; Möllendorff p. 151 t. 4 fig. 12.

Lamprocystis (Müll.) *goniogyra* n. Siquijor, Philippinen; Möllendorff (5) p. 143.

Limax (L.) *polypunctatus* n. Monte Castello; Pollonera p. 2 t. 3 fig. 5; *montanus* Ingers. und *castaneus* Ing. nur Farbenvarietäten von *campestris* Binney; Cockerell; — *queenslandicus* n. Queensland; Hedley.

Macrochlamys (Benson) *apex* n. Guang-dung, China; Möllendorff (4) p. 39; — *subcarinata* n. Bulacan, Philippinen; id. (6) p. 80; — (*Macroceras*) *fasciata* n. ibid., id. p. 80; — ? *Woodmasoni* n. Kokosinsel; Godwin Austen p. 209 t. 53 fig. 2; — ? *latus* n. Khasi Hills; id. p. 209 t. 53 fig. 8; — *hepatizon* n. Habiang-Garo und Daflahills; id. p. 209 t. 53 fig. 3. 4; — *subpetasus* n. Daflahills, id. p. 210 t. 53 fig. 6; — *Fordiana* n. Andamanen; Derselbe p. 56; — ? *pseudaulacopsis* n. ibid., id. p. 57; — *perinconspicua* n. ibid., id. p. 57; — *battimalvensis* n. Battemalve Island, id. p. 58.

Mesolimax n. gen. Genitalapparat wie bei *Limax*, Radula wie bei *Agriolimax* Schale wie bei *Amalia*, Fuss mit einer schrägen Furche. Typus: *M. Braunii* n. Kleinasien; Pollonera p. 8 t. 2 fig. 19–23.

Microcystina (Mörch) *Hochstetteri* n. Nicobaren; Godwin Austen p. 57.

Microcystis (Beck) *Normani* n., *Mabelae* n., *Mildredae* n., Christmas-Inland; Smith p. 557.

Nanina (Beck) *fellea* n. Talifu in Yunnan; Heude p. 240.

Paralimax (Bttg.) *multirugatus* n. Kaukasus; Böttger p. 149.

Rhysota (Alb.) *nigrescens* n. Luzon; Möllendorff (6) p. 86.

Selenites (Fischer) *Vancouverensis* var. *hybrida* n. Oregon; Ancey p. 188.

Sitala (H. Ad.) *trochulus* n. Schoa; Pollonera p. 62 t. 2 fig. 32, t. 3 fig. 19–21.

Vitrina (Drp.) *Licatae* n. Schoa; Pollonera p. 56 t. 2 fig. 23, 24; — *Ragazzii* n. ibid., id. p. 56 t. 2 fig. 20–22; — *Bianchii* n. ibid., id. p. 57 t. 2 fig. 1–3, 17; — *Giulettii* n. ibid., id. p. 58 t. 2 fig. 4–6; — *Martinii*, n. ibid., id. p. 59 t. 2 fig. 5–9; — *Antonellii* n. ibid., id. p. 61 t. 2 fig. 11.

Vitrinopsis (Semper) *cebuana* n. Cebu; Möllendorff p. 152 t. 4 fig. 10. Es sind gegenwärtig 5 Arten der Gattung bekannt, sämtlich philippinisch, 3 davon auf die Anatomie geprüft.

Simroth (3) stellt aus Afrika folgende neue Nacktschneckengattungen auf anatomische Unterschiede auf, ohne die neuen Arten vorläufig zu beschreiben: *Trichotoxon*, n. gen. mit 2–3 Pfeilsäcken, von denen jeder zwei Pfeile enthält, für Tr. Heynemanni n. und Tr. Martensi n.; — *Atoxon* n. gen., ähnlich, doch ohne Pfeile, für At. Hildebrandti und At. Schulzei, — *Büttneria* n. gen. mit einer mit dem Penis verwachsenen Pfeildrüse, für B. Lenckarti; — und *Phaneroporus* n. gen. mit aussen sichtbarer Schale und ohne Kalkdrüse am vas deferens, für Ph. Reinhardtii.

Ancey schlägt eine neue Untergattung *Bertia* vor für *Nanina cambodgensis*, und *Chalepotaxis* für *N. infantilis* Gredler.

Helicidae.

Ancey errichtet auf einzelne Arten und ohne besondere Begründung folgende neue Gattungen od. Untergattungen:

Acanthoptyx für *Helix acanthinula* Crosse.

Atlantica für *Helix semiplicata* Pfr.

Bathyaxis für *Caeliaxis* Layardi Ad. et Ang.

Bermudia für *Helix bermudensis* Pfr. (deren Zugehörigkeit zu *Poecilozonites* gleichzeitig durch Pilsbry nachgewiesen worden ist);

Brazieria für *Helix velata* Hombron et Jacq.

Calostrophia für *Helix Raffrayi* Tapp.

Cavicola für *Streptaxis cavicola* Gredl.

Chrysodon für *Helix auridens* Rang.

Coliolus für *Helix arfakensis* Tapp.

Crystallopsis für *Helix Hunteri* und *Helix Allasteri* Cos.

Entodina für *Helix Reyrei* Sow.

Eurystyla für *Helix cerina* Morel. und *Helix viridis* Desh.

Möllendorffia für *Helix trisinuata* und Verwandte.

Nesobia für *Bulimus Helenae* Quoy.

Oligospira für *Helix Waltoni* Reeve und *Helix Skinneri* Rve.

Ophiospila für *Helix andicola* Pfr. und Verwandte.

Rhysotina für *Helix hepatizon* Gld. und *Welwitschii* Morel.

Rhysotopsis für *Helix Haughtoni* Bens.

Sheldonia für *Helix trotteriana* Benson.

Sphincterochila für *Leucochroa filia* Mouss. und *Boissieri* Charp.

Tetrodontina für *Helix yantaiensis* und *tetrodon*.

Traumatophora für *Helix triscalpta* Mts.

Trichelix für *Helix horrida* Pfr.

Pilsbry errichtet für die balearische *Helix Grateloupi* Graëlls ihrer abweichenden Radulabildung und ihres glatten Kiefers wegen die neue Sektion *Allognathus*.

Tryon-Pilsbry setzen die Monographie von *Helix* fort und behandeln folgende Untergattungen. XII. *Helicella* mit den Sektionen. 2. *Xerophila* mit *Candidula*, *Lemniscia*, *Xeroleuca*, *Turricula* und *Cochlicella*; — 3. *Ochthephila* mit *Geomitra*, *Heterostoma*, *Irus*, *Placentula*; — 4. *Actinella*; — 5. *Tectula*; 6. *Craspedaria*; — 7. *Discula*; — 8. *Callina*; — 9. *Acusta*. — VIII. *Plectotropis* mit den Sektionen. 1. *Plectotropis* mit *Pseudiberus*. — 2. *Aegista*; 3. *Trachia* mit *Angasella* (welche letztere Gruppe von Ancey p. 38 in *Pleuroxia* umgetauft wird). — IX. *Arionta* mit den Sectionen: 1 *Lysinoë* mit *Helminthoglypta*, *Odonatura*, *Leptarionta*, *Praticola*, *Micrarionta*, *Poecilostyla*, *Epiphragmophora*, *Eurycampta*; — 2. *Campylaea* mit *Xerocampylaea*, *Fruticocampylaea*, *Eucampylaea*, *Tacheocampylaea*, *Pseudocampylaea*, *Chilotrema*; — 3. *Arionta*; — 4. *Eurystoma*. X. *Pentataenia* mit den Sectionen 1. *Tachea*; — 2. *Eremina*; — 3. *Macularia*; — 4. *Allognathus* n.; — 5. *Hemicycla*; — 6. *Plebicula*; — 7. *Leptaxis*; — 8. *Iberus*; — 9. *Pomatia*.

Bulimus (*Borus*) *Iheringi* n. Taguara, Südbrasilien; Glessin p. 167; — (*Rhinus*) *Koseritzi* n. Brasilien, id. p. 108.

Buliminus (Ehrbg.) *daucopsis* n. Talifu, Yünnan; Heude p. 240, — *imbricatus* n. ibid., id. p. 241, — *gossypinus* n. Tschen-keou, id. p. 241; — *Schiedeanus* Pfr., *Mooreanus* Pfr. und *alternatus* Say = *dealbatus* Say var.; Simpson p. 452; — (Ena) *Krüperi* n. Veluchi in Aetolien; Böttger p. 54; — *Vigonii* n. Schoa; *Pollonera* p. 65 t. 3 fig. 7, — *Sacconi* n. ibid., id. p. 66 t. 3 fig. 8; — *scioanus* n. ibid., id. p. 67 t. 3 fig. 9; — *Antinorii* n. ibid., id. p. 68 t. 3 fig. 4—6; *Meneliki* n. ibid., id. p. 69 t. 3 fig. 1—3; — *Aristidis* n. und *Lecouffe* n. Tunis; Ancey p. 188.

Cochlostyla (Fér.) *mainitensis* n. Mainit auf Mindanao; Hidalgo p. 310; — *Luengoi* n. Philippinen; id. p. 311, — *Codoensis* n., Codon auf Catanduanes; id. p. 312; — (Corasia) *coerulea* n. Bulacan und Morong Prov. Manila; Müllendorff p. 98; — (*Callicochlias*) *lignicolor* n. Mainit, Mindanao, id. p. 100; — (*Helicostyla*) *Boettgeriana* n. Bulacan, id. p. 101; — *fuliginata* var. *nigrolabiata* n. Matuli, id. p. 104; — *juglans* var. *olivacea* n. Montalban, id. p. 107; var. *roseo labiata* n. Cuyapo id. p. 108; — *Hindei* n. Neu Irland, Cox p. 1003 t. 21 fig. 1, 2.

Für die zu *Cochlostyla* gehörende *Helix cepoides* Lea errichtet Müllendorff (6) p. 74 eine Untergattung *Ptychostylus*: t. *globosa*, *turbinata*, *multispira*, *anfractus* sensim *accrescentes*, *ultimus* sat *angustus*; *apertura* *coarctata*, *columella* *valde spiraliter torta*, *plica* *valida munita*.

Funiculus n. gen. vel subg. *Bulimini*, ausgezeichnet durch cylindrische Gestalt und zahlreiche fast gleiche Umgänge; bis jetzt auf das Kalkgebiet von Ta-li-fu in Yünnan beschränkt, Typus *Buliminus Delavayanus* Heude; Heude p. 241. Als neu beschrieben werden: *probatas* n. p. 241; — *asbestinus* n., *coriaceus* n., *debilis* n., *rudens* n. p. 242. —

Euryptyxis (Fischer). Fischer gibt J. C. pl. 13 die Abbildung der Spindel von *E. candida* Lam. und *labiosus* Müll., und zur Vergleichung die von *Petraeus labrosus*, *Zebrina Tournefortiana* und *Leptobysus spirifer*. Er ist nicht abgeneigt, *Euryptyxis* mit den fossilen *Rillia* aus dem Pariser Becken in Beziehung zu bringen, obwohl deren Spindelfalte einigermassen abweicht.

Helix (L.).

Palaearctisches Gebiet. — *abludens* n. England, Nordfrankreich, Locard p. 30; — *coelomphala* n. Frankreich, Schweiz; id. p. 48; — *caelatina* n. Frankreich, Schweiz, id. p. 51; — *plebicola* n. Frankreich; id. p. 62 (alle von rufescens abgetrennt); — (Xeroph.) *Bolosii* n. Fagot mss. Catalonien; Salvaña p. 100; — *pomatia* var. *lednicensis* n. Nordwestungarn; Brancsik p. 117; — (Xeroph.) *Caruanae* n. Malta; Kobelt p. 119; Icon. fig. 672. — (Xeroph.) *canina* n. Nahr el Kalb, Syrien; Ancey p. 188; — *segalaunica* n. Drome, Frankreich; Sayn p. 142; — *lenticia* n. ibid., id. p. 152; — *cyclostremoides* n. Marocco; Sowerby p. 212 t. 11 fig. 14; — *Lobethana* Deb. abgeb. bei Kobelt (2) fig. 468. 469; — *subjobaeanae* n. Sahara, id. p. 47, fig. 472. — *Bailloni* Deb. abgeb. fig. 474; — *Denansi* n. Nordafrika, id. p. 50 fig. 477; — *Ghazouana* n. Nemours, id. p. 50 fig. 478. — Bourguignat erhebt *Helix Ponzolzi* zum Rang einer Gruppe *Dinarica* und beschreibt aus derselben folgende neue Arten: *dinarica* p. 217 t. 2 fig. 1—3; — *Kuzmici* p. 219 t. 2 fig. 4—6; — *pellanica* n. p. 222 t. 2 fig. 7 bis 9; — *adriatica* n. p. 226; — *tschernagorica* n. p. 232 t. 3 fig. 3, 4; — *Dioeletiana* n. p. 234; — *Sabljari* n. p. 237 t. 4 fig. 1, 2; — *Horatii* n. p. 238 t. 4

fig. 3. 4., — Biagoi n. p. 240 t. 4 fig. 5. 6., — brenoica n. p. 242; — Daniloï n. p. 243. —

Ponsonbyi n. Tanger; Westerlund p. 57; — taeniata n. Mogador; id. p. 58; — invasa n. Nordafrika, id. p. 59; — hiericontina n. Jericho, p. 60; barmeyana n. Algerien, id. p. 61, — eminens n. Syra, id. p. 61. —

Hagenmüller beschreibt aus der Gruppe der Hel. Raspaili von Corsika und Sardinien: Garciae n. p. 27. — Deschampsiana n. p. 30, — Molliniana n. p. 52, — sciaphila n. p. 36, — montigena n. p. 40; — donata n. p. 42; — faucicola n. p. 44, — aursalensis n. p. 47. —

(Trichia) chrysotricha n. Caucasus; Boettger p. 151. Salvaña erhebt Helix barcinonensis zur Gruppe Barcinonensis und beschreibt aus derselben als neu: pallaraesica n., salvanica n., chia n., Moresi n., sämtlich aus Catalonien; — ferner Hel. Bolosi n. Olot p. 100.

Nordostafrika.

(Fruticicola) scioana n. Schoa; Pollonera p. 76 t. 2 fig. 28—30; — (Fr.) strigelloides n. ibid., id. p. 77 t. 2 fig. 25—27. —

Philippinen. — (Plectotropis) visayana n. Cebu; Möllendorff p. 157, — scalatella n. Luzon; id. p. 145; — bulacanensis n. Bulakan, Philippinen; Hidalgo p. 310; — (Chloraea) geotrochus n. Morong; Möllendorff (6) p. 89; — (Dorcasia) Schadenbergi n. Ilocos, id. (5) p. 144; — (Obbina) Kochiana n. Cebu; id. (6) p. 88. —

China. — baesitans n. Yunnan; Heude p. 237; — samarella n. ibid., id. p. 237; — subcincta n. ibid., id. p. 238; — subgriseola n. ibid., id. p. 238; — peraeruginosa n. ibid., id. p. 238; — mensalis n. ibid., id. p. 239; — talifouensis n. ibid., id. p. 239; — radulina n. ibid., id. p. 239; — mimicula n. Tschénkeou, id. p. 239, — subparasitica n. Talifu, Yünnan; id. p. 240; — Taberiana n. Sytschuan, China; Möllendorff (4) p. 40; — (Plectotropis) subconella n. Guangdong, id. p. 40; — (Plect.) lofouana n., ibid., id. p. 41 — Herziana n. Hunan; id. p. 41; — (Hadra) Leonhardti n. Guangdong; id. p. 42; — (H.) Schmackeri n. ibid., id. p. 42; — (H.) granulifera n. Hubei, id. p. 43. —

Vereinigte Staaten. — (Mesodon) kiowaensis n. Indianerterritorium; Simpson p. 450.

Mexico. — Verrilli n. Mexiko; A'ncey p. 63. — armigera n. ibid., id. p. 64; — commutanda nom. nov. für Harfordiana Binney nec Cooper (schon früher von Pilsbry in Helix salmonensis umgetauft).

Partula (Fér.) auraniana n., carnicolor n., fraterna n., albescens n., sämtlich von Aura Island, Neue Hebriden; Hartmann p. 250. 251 t. 13 fig. 1—4.

Patula (Held) aperta n. Manila; Möllendorff (6) p. 89.

Trochomorpha (Alb.) rubens n. Aura Island, Neue Hebriden; Hartmann p. 251 t. 13 fig. 5; — borealis n. Sytschuen, China; Möllendorff (4) p. 39.

Achatinidae.

Achatina (Lam.) Bayoli n. Assinie, Westafrika; Morelet p. 97 t. 1 fig. 4

Atopocochlis n. subg. Perideridis für Bulimus exaratus Müll., durch den kantigen letzten Umgang und den umgeschlagenen Mundsaum erheblich von Perideridis verschieden, aber in der Zungenbewaffnung ganz damit übereinstimmend; Crosse et Fischer p. 11. Die Anatomie gibt Arruda Furtado ibid. p. 5.

Sm
Zweiter Band. Zweites Heft

Bericht
über die wissenschaftlichen Leistungen
im Gebiete der Entomologie.

Bericht

über

die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während des Jahres 1888.

Von

Dr. Ph. Bertkau

in Bonn.

Die Ergebnisse der bisherigen und neuerdings angestellten Forschungen fasst B. Grassi in der VII. Mem.: *J. Progenitori dei Miriapodi e degli Insetti* zusammen zu einer *Anatomia comparata dei Tisanuri e considerazioni generali sull' organizzazione degli insetti*; Mem. R. Accad. dei Lincei (Classe di sci. fisiche, matematiche e naturali) Ser. 4., vol. IV. S. 543—606, Tav. I—V. — Die Angaben über die Hautbedeckung enthalten nichts von Bedeutung, nur dass bei *Machilis* zu jeder Schuppe die zugehörige Hypodermiszelle nachgewiesen wird. Auch die Angaben über die Muskulatur decken sich im wesentlichen mit den im vorigen Bericht (S. 63) mitgetheilten. — Die Athmungsorgane sind sehr verschieden entwickelt. Bei *Campodea* sind 3 Stigmenpaare vorhanden: eins am Vorderrande und eins nahe dem Hinterrande des zweiten Brustsegments, an der Einlenkung des zweiten Beinpaares; das dritte befindet sich am dritten Segment am dritten Beinpaare. Bei *Japyx solifugus* finden sich 11 Stigmenpaare. Das erste (entspricht dem ersten von *Campodea*.) ist (aber) vor den Hinterrand des ersten Brustsegmentes gerückt; das zweite entspricht auch in seiner Lage dem zweiten von *Campodea*, das dritte (in *Campodea* fehlende) liegt „benachbart dem Vorderrande des dritten Brustsegments“; das 4. entspricht genau dem dritten bei *Campodea*. Die 7 übrigen liegen am Hinterrande der 7 ersten Hinterleibssegmente. Bei *J. Isabellae* fehlen die dem 2. und 4. von *J. solifugus* entsprechenden Stigmen. — *Machilis* hat 9 Stigmenpaare, ein seitliches zwischen dem ersten und zweiten Brustsegment, ein ventrolaterales zwischen dem zweiten und dritten Brustsegment und 7 ventrolaterale am 2.—8. Hinterleibssegmente. — Bei *Nicoletia* sind 10 Stigmenpaare vorhanden. Das erste befindet sich im vorderen Theile des

zweiten, das zweite des dritten Bruststrings; die 8 folgenden liegen zwischen dem dritten Brust- und ersten Hinterleibsringe und zwischen den folgenden Hinterleibsringen. Die 7 letzten entsprechen den 7 hinteren von Japyx und Machilis, das dritte dem 4. von Jap. solifugus und dem 3. von Campodea; das zweite dem 3. von Jap. solif. und dem 2. von J. Isabellae und Machilis, das erste dem ersten der genannten. Lepisma und Lepisma verhalten sich wie Nicoletia. Die Zahl und Anordnung der Stigmen bei Japyx solif. hält Grassi für die primitivste (4 thorakale, 7 abdominale), und die ursprüngliche Anordnung der Thorakalstigmen ist nicht die rein segmentale gewesen. Bei Japyx, Nicoletia, Lepisma und Lepisma verbinden sich die von den Stigmen derselben Seite ausgehenden Stämme zu einem Längsstamme, der bei Japyx der Bauchseite, bei den übrigen genannten der Rückenseite genähert ist. Eine (dorsale) Quer-Verbindung findet sich bei Japyx auf der Grenze zwischen dem 8. und 9. Hinterleibssegment; bei den Lepismiden tritt eine (ventral gelegene) Queranastomose in jedem Segment auf. Bemerkenswerth ist dabei, dass in der Ontogenie der Thysanuren das Tracheensystem spät zur Entwicklung kommt, während es sich sonst sehr früh zeigt.

In dem Nervensystem herrscht grosse Uebereinstimmung: ausser einem g. supraoesoph. und infraoesoph. sind überall 3 thorakale und 8, nur bei Campodea 7, abdominale Ganglien vorhanden; die Ganglien der Bauchkette sind durch doppelte Kommissuren verbunden. Ein Eingeweidenervensystem liess sich überall nachweisen. Dasselbe entspringt aus dem Gehirn mit je einer Wurzel, die in ein g. frontale eintreten, aus welchem der rücklaufende Nerv seinen Ursprung nimmt; ausserdem kommen (mit Ausnahme von Campodea) paarige Eingeweidenerven mit paarigen Ganglien vor. — Chordotonalorgane wurden nicht aufgefunden. Augen kommen bei Lepisma und Machilis vor; sie sind durch den Mangel des gangl. periopticum ausgezeichnet, was sich auch bei Periplaneta, Forficula und Nepa wiederholt. Die von Oudemans (in dem mir nicht zugänglich gewesenem Bijdr. tot de Kennis etc., s. den vor. Ber. S. 63) ohne genügenden Beweis für Ocellen in Anspruch genommenen 3 Flecke vor den zusammengesetzten Augen sind nach Grassi's erneuten Untersuchungen wirklich Augen mit Zellen des Glaskörpers, Retina- und Pigmentzellen. Die Retinazellen schliessen ein 4theiliges Rhabdom ein, so dass diese Ocellen zu den zusammengesetzten Augen zu rechnen sind.

Der Verdauungsapparat zeigt von Campodea, durch Japyx, Machilis bis zu Lepisma eine fortschreitende Entwicklung. Die Anwesenheit der sog. Rektaldrüsen ist der Ansicht, dass dieselben degenerirte Kiemen seien, nicht günstig. Bei sämtlichen untersuchten Thysanuren wurden 2 schlauchförmige Speicheldrüsen beobachtet, deren Ausführungsgänge bei Japyx getrennt zu bleiben scheinen, während sie sich bei den übrigen zu einem unpaaren mittleren Gang vereinigen. Bei Lepisma treten an der Vereinigungsstelle zwei Ausstülpungen auf, die als das Homologon der Speichelbehälter der höheren Insekten anzusehen sind.

Die Zahl der Malpighi'schen Gefäße schwankt sehr. Bei Japyx fehlen sie gänzlich; bei Campodea sind ihrer 16, bei Machilis 6 zweifästige, bei Nicoletia und Lepisma 6 einfache, bei verschiedenen Lepisma-Arten 4—8 vorhanden. Diese Verschiedenheit der Zahl der Malpighi'schen Gefäße verträgt sich im Zusammenhang mit der verschiedenen Zahl der Abdominalstigmata sehr gut mit der Hypothese, dass die M. Gefäße den Tracheen homologe Organe sind.

Das Herz erstreckt sich bis zum Hinterrande des zweiten Brustsegmentes nach vorn, so dass die Aorta sehr kurz ist. Es sind 9 Paar venöser Ostien vorhanden, zwischen dem 2. und 3. Brustsegment und an den folgenden Zwischensegmenten. Flügelmuskeln fehlen, dagegen ist das perikardiale Diaphragma, wenn auch in unvollkommenem Zustande, vorhanden. — Die Geschlechtsorgane werden in Uebereinstimmung mit den früheren Mittheilungen beschrieben (vgl. dies. Ber. 1884 S. 79, 1886 S. 6); Grassi besteht darauf, dass die Geschlechtsdrüsen am 8. Hinterleibssegment münden.

In dem Abschnitt über die Körperanhänge werden zunächst die Mundtheile besprochen, an denen das Vorkommen eines äusseren Lappens (galea) der Maxillen beachtenswerth ist; diese galea kommt noch bei den Orthopteren, und einigen Neuropteren vor, fehlt aber den übrigen Insekten. Bei Japyx Isabellae fehlen die Lippentaster. Die Mundtheile von Campodea und Japyx sind der Aufnahme von pflanzlichem Detritus angepasst, die der übrigen rein kauend. Danach unterscheidet Grassi die ersteren als Entotrophi von den Ectotrophi. — Die Abdominalfüsse und ausstülpbaren Bläschen am Hinterleibe werden als Reste von ursprünglich funktionirenden Füßen angesehen. Diese Füße waren zweifästig; der eine Ast, der jetzt durch das Bläschen dargestellt wird, fungirte als Kieme.

Die jetzige Funktion der Füßchen ist nur in wenigen Fällen und in untergeordneter Weise die der Ortsbewegung; in erster Linie sind es Tastorgane. Für die Insekten ist demnach der Besitz von 18 Gliedmassenpaaren anzunehmen: 10 am Hinterleib, 3 an der Brust, 4 am Munde (das 4., vielleicht dem zweiten Fühlerpaar der Krebse entsprechend, ist nur beim Embryo vorhanden), und eins auf der dorsalen Seite des Kopfes, die Fühler; die 17 zuerst genannten sind sämmtlich ventral.

Die seitlichen und hinteren Ecken der Rückenschilder, die an den einzelnen Ringen bei verschiedenen Arten in verschiedener Stärke entwickelt sind, sieht Grassi als die Anfänge der Flügel an.

Homolog mit ihnen sind die dorsalen Kiemen, insofern sie gleichen Ursprung haben, ohne dass man deshalb annehmen müsste, die Flügel hätten sich aus Kiemen entwickelt. Die drei Stadien sind: 1. einfache Fortsätze an den 3 Rückenschienen des Thorax; 2. diese Fortsätze wachsen und gliedern sich ab; 3. sie werden zu echten Flügeln an den beiden hinteren Brustsegmenten.

Die Ordnung der Thysanuren beschränkt Grassi auf die Gattungen Campodea, Japyx, Machilis, Nicoletia, Lepisma und

Lepisma, so dass Scolopendrella bei den Myriapoden bleibt. Die beiden ersten Gattungen bilden je eine Familie der Entotrophi; Machilis bildet eine Familie für sich, und die drei zuletzt genannten Gattungen die Familie der Lepismidae, welche mit Machilis die Ectotrophi zusammensetzen.

Die Scheidung der Thysanuren in diese beiden Unterordnungen rechtfertigt Grassi durch die Gegenüberstellung der zahlreichen Unterschiede.

Für die Stellung der Thysanuren unter den Insekten zieht Grassi zunächst die Orth. genuin., namentlich die Blattiden in Betracht und zeigt die nahe Verwandtschaft beider. Die Abtrennung der Dermaptera und Corrodentia von den Orth. genuin. findet er nicht gerechtfertigt; und die Aehnlichkeiten sind zu gross und die Verschiedenheiten zu gering, um aus Dermaptera und Corrodentia eigene Ordnungen zu machen. Selbst die Ephemeriden, Odonaten und Perlarien möchte Grassi mit den oben genannten in einer Superordo Orthoptera s. l. vereinigt lassen, so dass dann die Thysanuren die tiefste Ordnung der Orthoptera s. l. bilden; die Ectotrophi stehen den Orth. s. str. näher als die Entotrophi, und von Insekten, die den Thysanuren sehr nahe standen, haben sich als divergente Zweige die übrigen Orthopteren entwickelt (Perlariae, Odonata, Ephemeridae, Orthoptera s. str., Corrodentia und Dermaptera).

Die Collembola sind Thysanuren (Entotrophi), die eine besondere Anpassung eingeschlagen haben: Der Ventraltubus und die Springgabel sind Vervollkommnungen, die Athemorgane, Segmentierung des Hinterleibes, Ganglienketten, Abdominalbläschen haben eine Rückbildung erlitten.

Ein Vergleich dieser Orth. s. l., die Grassi auch Protentoma nennt, mit den höheren Ordnungen (Metentoma) zeigt bei den Imagines nur wenige Punkte der Uebereinstimmung oder Aehnlichkeit; nur die Rhynchoten haben, wie schon Meinert bemerkte, Mundtheile, die sich ohne besondere Schwierigkeiten von denen der Thysanuren ableiten lassen. Dagegen haben die Jugendzustände zahlreicher Metentoma Aehnlichkeit mit Campodea oder Japyx.

Nach der anderen Seite haben die Thysanuren eine nahe Verwandtschaft mit den Symphylen und Chilopoden, selbst den Arachniden (Arthrogastra) und Crustaceen (Branchiopoda); dagegen sind die Beziehungen zu Peripatus entfernterer Natur. — Zum Schluss behandelt der Verfasser die Frage, ob die Thysanuren degenerierte oder ursprüngliche Insekten seien, mit mehr Ausführlichkeit und bejaht die zweite Frage mit mehr Rückhalt als nöthig ist, wie mir wenigstens scheint. — S. auch unter Oudemans, bei den Thysanuren.

Brauer macht Bemerkungen zur Abhandlung des Herrn Prof. Grassi über die Vorfahren der Insekten etc., die den Zweck haben, einige Punkte, in denen Brauer von Grassi falsch verstanden ist und Brauer ungerechtfertigter Weise irrige Ansichten zugeschrieben werden, richtig zu stellen; Zool. Anz., 1888, S. 598—600.

W. H. Ashmead möchte die Insekten, d. h. die durch Tracheen athmenden Arthropoden, in 2 Reihen, Cerata und Acerata, bringen, je nach dem Besitz oder Mangel von Fühlern. Die Cerata sind von Krustern abzuleiten und zerfallen in die Myriapoden, Thysanuren, Orthopteren, Neuropteren, Lepidopteren, Coleopteren, Hemipteren, Dipteren und Hymenopteren; die Aceraten sind auf einen wurm-ähnlichen Vorfahren zurückzuführen und enthalten die Linguatulinen, Tardigraden, Acarinen, Pedipalpen und Arachniden. Entomol. Americana, IV, S. 65f.

Entomologische Miszellen von Ph. Bertkau handeln über Mermis in Tarentula inquilina und die durch den Parasiten bedingte Sterilität des Wirthes und ein Japyx bei Bonn; Korrespbl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinlande, Westfalens u. d. Reg.-Bez. Osnabrück, 1888, S. 91—93.

Von dem U. S. Department of Agriculture, division of Entomology, ist eine neue in monatlichen Heften von 2 Bogen erscheinende Zeitschrift, Insect life, herausgegeben, die hauptsächlich die Lebensweise land- und forstwirtschaftlich schädlicher und nützlicher Insekten zum Gegenstand hat. Bis jetzt sind 6 Hefte (Juli—Dezember) erschienen.

An Introduction to Entomology: by J. H. Comstock, . . . Part I, 8 vo., 234 Ss.

Acariens, Crustacés, Myriapodes de France, par P. Groult; 250 Ss., 18 Taff. (15. Theil der Histoire naturelle de la France); Paris, 1888.

Entomology for Beginners, for the use of Young Folks, Fruit Grovers, Farmers and Gardeners; by A. S. Packard; New-York 1888; 12mo, 366 Ss.

Opuscula entomologica edidit C. G. Thomson. Fascic. duodec.; S. 1185—1318, Cap. XXXVI: Öfersigt af de i Sverige funna arter af Ophion och Paniscus; XXXVII: Bidrag till Sveriges insectfauna; XXXVIII: Försök till gruppering af slägtet Plectiscus Grav.

A. Otto theilt seine Beobachtungen über Alpenwanderungen von Insekten mit; Societ. Entom., III., S. 3f., 13, 20f., 26.

C. Fowler stellt die Aufzeichnungen von Beobachtern auf Leuchthürmen über grosse Schwärme von Insekten zusammen: Migration of insects, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 204f.

In einem Vortrag „Der Chamsin und sein Einfluss auf die niedere Thierwelt“ theilt O. Schneider die Erfahrungen mit, die er über den Chamsin in Aegypten gemacht hat. Während die Wirbelthiere durch den Chamsin erschlaft werden und bei Herannahen desselben sichere Verstecke zu gewinnen suchen, reizt namentlich der warme Chamsin die Insektenwelt zu gesteigerter Thätigkeit, und Massen von Ameisen, Schmetterlingen und Käfern zeigen sich beim Chamsin an Orten, wo man sonst vergeblich nach ihnen gesucht hatte, in voller Lebenskraft. Schneider vermuthet, dass die Wärme des Windes die Entwicklung der Puppen zur Imago gezeitigt habe,

was dadurch wahrscheinlich wird, dass das Massenaufreten gewöhnlich am zweiten Tage des Chamsin zu beobachten ist. Festschr. z. Jubelfeier des 25jährigen Bestehens des Vereins f. Erdkunde zu Dresden, S. 1—21 (Sonderabdr.).

Zu den über die Insekten (Coleopteren und Lepidopteren) handelnden Karten in W. Marshall's „Atlas der Thierverbreitung“ macht Kolbe einige berichtigende Zusätze und Bemerkungen; Entom. Nachr., 1888, S. 124—128.

Florida gehört nach Ausweis seiner Wanzen-, Schmetterlings- und Käferfauna mehr zu Westindien und Mittel-, als zu Nordamerika; C. Heidemann, Smith und Schwarz, Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 137.

Schwarz führt die Einwanderung der westindischen Bestandtheile der Käferfauna Floridas auf die Wirkung des Golfstromes zurück; so erklärt es sich auch, dass Familien, die den Seetransport nicht vertragen, wie Carabiden, Scarabaeiden, Lampyriden, Chrysomeliden, nicht vertreten sind, wohl aber die Curculioniden, Cerambyciden, Ptiniden u. a., die unter Rinde oder am Holze leben; ebenda S. 145f. —

Derselbe handelt on a collection of Coleoptera from St. Augustine, Florida; die Zahl der bekannten Arten Florida's beläuft sich jetzt ungefähr auf 2400; ebenda S. 169—171.

Kolbe schreibt über lokale Abänderungen weit verbreiteter Thiere, dabei von Insekten *Aphodius lividus* Oliv., *granarius* L.; *Taeniotes scalaris* F.; *Gibbium psyllodes* *Czenpinski* (= *scotias*) in Betracht ziehend; Entom. Nachr., 1888, S. 177—186.

Als a commencement of a study of the parasites of cosmopolitan insects stellt L. O. Howard ein Verzeichniss der in Europa und Amerika beobachteten Parasiten von Insekten zusammen, die beiden Erdtheilen gemeinsam sind. Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 118—135.

Die Parasiten der Hessenfliege in England sind dieselben wie in Russland, und mit einer Ausnahme, die einen Russland und Amerika gemeinsamen Parasiten betrifft, verschieden von den Amerikanischen Parasiten; die Hessenfliege ist nach England demnach aus Russland und nicht aus Amerika eingeschleppt; L. O. Howard, a. a. O., S. 119.

In die Beschreibung seiner Reise in das Territorium der Missionen, Bolet. Acad. Nacion. Ciencias en Córdoba, T. X, S. 145—288, streut Holmberg auch Bemerkungen über die Thierwelt ein. Von einer *Nephila*-Art wird die Begattung und die Vorkehrungen dazu beschrieben; eine von den Bewohnern Ura genannte und auf einen SpHINGEN (— Ura ist der Name der dortigen Bevölkerung für die Schwärmer —) zurückgeführte Hautkrankheit, die sich in Geschwüren zeigt, wird durch die Made einer Oestride, wahrscheinlich einer *Dermatobia* veranlasst. Die Gattungen der Argentinischen Apiden sind S. 225—227 aufgezählt, und die gesellig lebenden einheimischen

Apiden, Melipona, Trigona und Tetragona, sind auf S. 252—288 ausführlicher behandelt.

M. Cuni y Martorell zählt *Insectos observados en los alrededores de Barcelona* auf; An. Soc. Españ. Hist. Natur. XVII, S. 133—191. (Coleoptera S. 138, Orthoptera S. 161, Neuroptera S. 163, Hymenoptera S. 163, Lepidoptera S. 166, Rhynchota S. 184, Diptera S. 167, Arachnoidea S. 189, 191.)

A. Costa lässt Mem. 2—8 seiner *Notizie ed osservazioni sulla Geo-Fauna Sarda* erscheinen; Atti d. R. Accad. d. sci. fisiche e matematiche, Napoli, (S. 2) Vol. I, No. 2, 9, 13; II, No. 7, 8; dieselben waren bereits früher separat erschienen.

Derselbe. *Miscellanea entomologica*; ebenda I No. 10 mit 1 Taf. — Die Diagnosen der in diesen Misc. beschriebenen (10) Arten sind zuerst in den Rendic. derselben Akademie (S. 2) Vol. I (1887) S. 242—244 erschienen.

F. Mazza: *Note faunistiche sulla Val Staffora (Pavia): II e III Imenotteri e Aracnide*. Genova, 1888. — Ist mir nur aus dem kurzen Referat in Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 235 bekannt geworden.

Sven Lampa macht Bemerkungen über das Auftreten von Insekten aus verschiedenen Ordnungen in Norwegen i. J. 1887. Entomol. Tidskr., 1888, S. 41—49.

Sparre-Schneider schildert das Thierleben, wie er es bei einem Zoologischen Ausflug nach Hillesoe im letzten Drittel des Juni 1887 kennen lernte und stellt ein Verzeichniss der gefundenen (64) Käfer und (11) Schmetterlinge zusammen; Tromsø Museum's Aarsberetning for 1887 S. 17—34.

Brischke erstattet Bericht über eine Excursion nach Hela während des Juli 1887 und stellt ein Verzeichniss der dort beobachteten Insekten zusammen, das manche für Westpreussen neue Arten aufweist und im Ganzen eine Aehnlichkeit mit der schwedischen und Finnischen Fauna erkennen lässt; Schrift. Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F. VII. 1. S. 42—64.

Kraatz' kurzes Referat über Käfer und Schmetterlinge der Mossigkauer Haide in der deutsch. Entom. Zeitschr. 1888. S. 193f. zieht den Werth dieser Verzeichnisse in Zweifel, da weder die Lokalität interessant, noch die Verzeichnisse vollständig und zuverlässig sind; einige wahrscheinlich irrige Benennungen werden berichtigt; vgl. d. vor. Ber. S. 111, 174.

Eine fünftägige zoologische Excursion auf den kahlen Astenberg ergab nach Landois von Gliederthieren keine bemerkenswerthen Formen; Jahresber. zool. Sek. westf. Prov.-Ver. 1887—88, S. 60f.

O. Zacharias berichtet über faunistische Untersuchungen in den Maaren der Eifel; Zool. Anz., 1888, S. 705f.

In G. Beck's „Fauna von Hernstein in Niederösterreich“ sind die Lepidoptera von A. Rogenhofer, die Hymenoptera von A. Rogenhofer und F. Kohl zusammengestellt, S. 77—153, 183—228. Das Gebiet mit seiner weiteren Umgebung hat 2398 Schmetterlinge bekannt werden lassen, unter denen sich 195 alpine befinden. Die Microlepidoptera sind mit Unterstützung von J. Mann bearbeitet. Von *Setina roscida* und *Gnophos serotinaria* sind die Raupen abgebildet. — Von Hymenopteren sind 2016 Arten aus dem Gebiet bekannt geworden, die sich auf 390 Gattungen und 20 Familien vertheilen. Ein solches Resultat ist natürlich, neben einem grossen Reichthum der Fauna, nur aus einer fleissigen Durchforschung des Gebietes zu erklären, der sich Tschek, Mayr, Mann und Rogenhofer in erster Linie unterzogen haben.

A. Becker setzt seine Mittheilungen über bei Sarepta vorkommende Insekten fort, indem er 86 Spinnenarten namhaft macht und Bemerkungen über Schmetterlinge, Käfer und Fliegen beifügt; Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou 1888 S. 373—379.

Hess stellt eine Tabelle zum Bestimmen der dem Rettig .. und dem Radieschen .. schädlichen Insekten ... auf; 34.—37. Jahresh. der Naturhist. Gesellsch. Hannover S. 66—68.

Lindeman behandelt die schädlichsten Insekten des Tabak in Bessarabien ausführlicher; Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1888 No. 1 S. 10—77; vgl. den vor. Ber. S. 3. Die Krankheiten sind dreifach: Schwindsucht, verursacht durch den Frass der Larven von *Opatrum intermedium*, *Pedinus femoralis*, *Platyscelis gages* und *Opatrum pusillum*; Thripskrankheit, veranlasst durch Thrips *Tabaci*, und die in Holland schon längst unter dem Namen Mosaikkkrankheit bekannte Krankheit, die nicht durch Insektenthätigkeit verursacht ist. Nebenher schädigen auch noch andere Insekten den Tabak: Die Raupe von *Agrotis segetum*, die Larve der *Melolontha vulgaris*, von fünf Elateriden, nemlich *Agriotes lineatus*, *pilosus*; *Melanotus rufipes*; *Athous niger* und *scrutator*, endlich *Haltica sinuata* und *Botis sticticalis*. Die Naturgeschichte der wichtigsten dieser Schädlinge ist eingehend behandelt, am ausführlichsten die von *Opatrum intermedium*.

O. Penzig beschäftigt sich in seinen Studi botanici sugli Agrumi e sulle piante affine auf mehr als 100 Seiten und 9 Tafeln mit den Feinden (hauptsächlich Schmetterlinge, Fliegen, Raupen); Ann. di Agricolt., Roma, 1887. (Nach Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 252).

F. B. Greenough handelt über die Statistik und Therapie der durch Läuse verursachten menschlichen Hautkrankheiten in Boston; 5½ % der Krankheiten stellen sich nach der Anschauungsweise der Bostoner Aerzte als *Pediculosis* dar. Boston medical and surgical Journal, CXVII No. 20.

Laboulbène erwähnt, dass ein junges Mädchen, das Blut spuckte, eine halbwüchsige Raupe von *Cossus ligniperda* von sich gegeben habe; Bull. Soc. Entom. France 1887 S. CCVI.

W. M. Schoeyen: Eine Schmeissfliege, *Lucilia nobilis*, parasitirend beim Menschen; Centralbl. f. Bakteriologie und Parasitenkunde, IV. Bd., S. 274 f. Ein Mann hatte am 17. Aug. 1887 bei Kronberg (Dänemark) ein Bad genommen und sich darnach in die Sonne schlafen gelegt. Beim Erwachen spürte er starkes Ohrensausen; bald stellten sich heftige Schmerzen ein und ein Ausfluss von Blut und Eiter aus Ohr und Nase. Er wurde am 21. in das Spital aufgenommen, und ein Ausspülen des linken Ohres brachte wiederholt einige lebende Maden zum Vorschein, bis die letzte und grösste am 23. August entleert wurde. Von jetzt an hörten die Schmerzen und der Ausfluss vollkommen auf; etwas Ohrensausen blieb noch, und das Gehör war sehr geschwächt, als der Patient am 31. August aus dem Spital entlassen wurde. Die Zucht der Maden lieferte die in der Ueberschrift genannte Fliege.

Buddeberg verzeichnet die von ihm bei Nassau beobachteten Blumenbesucher von *Thlaspi alpestre* (27 A.); Korrespbl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinlande, Westf. u. d. Reg.-Bez. Osnabrück, 1888, S. 30.

P. Bargagli: Ricerche sulle relazioni più caratteristiche tra gli insetti e le piante; Atti R. Accad. dei Georgofili, XI, Firenze, 1888. (Ist mir nicht zugänglich gewesen.)

The origin of floral structures trough insects and other agencies; by the Rev. Geo. Henslow; London 1888, 8vo, S. I—XI, 1—349, mit 88 Abbildungen.

Claes Grill hielt auf der Zusammenkunft der Schwedischen Ent. Gesellsch. am 2. März 1888 einen Vortrag über die Svampbildningar hos Insekter; Entom. Tidskr., 1888, S. 4, 8, 19—27.

R. Thaxter behandelt The Entomophthorae of the United States; Memoirs Boston Society Vol. IV, No. VI, S. 133—201, Pl. XIV—XXI.

Im Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CI—CIV, CXXIX bis CXXXI finden sich Bemerkungen von Laboulbène und Gazagnaire über die künstliche Infektion von schädlichen Insekten mit Microben.

A. Targioni-Tozzetti e A. Berlese: intorno ad alcuni insetticidi, alle loro mescolanze ed alla attività relativa di qualli e di questi contro gli insetti; Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 148—158.

R. Dittrich: Ueber das Leuchten der Thiere; Programm des Realgymnasiums am Zwinger zu Breslau, 1888; S. 1—70. — Der Verfasser giebt eine übersichtliche, kritische und geordnete Zusammenstellung der über das Leuchten der Thiere bekannten That-sachen, über die Leuchtorgane, die Eigenschaften des Lichtes, Abhängigkeit des Leuchtens von äusseren Einflüssen oder vom Willen des Thieres, Entstehungsursache und Nutzen des Leuchtens, Verzeichniss der leuchtenden Thiere.

F. Henneguy fand, dass „Glühwürmer“ aus dem Tageslicht in die Dunkelheit gebracht, nicht sofort leuchten, sondern erst nach

$\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ Stunden langem Verweilen in der dunklen Kammer anfangen zu leuchten. Damit ist in Uebereinstimmung, dass in der Natur das Leuchten erst etwa 2 Stunden nach Sonnenuntergang ein vollständiges ist. *Compt. rend. de la Soc. de Biologie*, 1888 (Sér. 8, T. V) S. 707. (Nach dem Referat in der naturwissenschaftl. Rundschau, IV, S. 66 f.)

Latzel hielt im Verein z. Verbr. naturw. Kenntnisse in Wien einen Vortrag über die Brutpflege bei den Arthropoden, der in den Schriften des genannten Vereins, XXVIII. Bd., S. 329—381, abgedruckt und mit 18 Figuren im Text illustriert ist.

Brauer führt Beispiele über Fehlschlüsse und Wahrheiten aus der Biologie an, die zumeist der Literatur der Arthropoden entlehnt sind; *Schrift Ver. z. Verbreit. naturw. Kenntnisse*, XXVIII, S. 695—727.

G. Carlet: De la marche d'un Insecte rendu tétrapode par la suppression d'une paire de pattes; *C. R. Acad. Sci. Paris*, CVII, S. 565f. Insekten, denen etwa das mittlere Beinpaar ausgerissen ist, ruhen beim langsamen Gang auf drei Füßen, wobei zuerst das rechte Vorderbein, dann das linke Hinterbein, rechte Hinterbein und linke Vorderbein vorgesetzt wird. Beim schnellen Gang bewegt sich das Insekt ähnlich wie ein kriechendes Reptil oder Amphibium, indem es gleichzeitig 2 in einer Diagonale stehende Beinpaare vorsetzt und wenn diese den Boden berühren, das andere. Vom Trabe unterscheidet sich diese Gangart dadurch, dass der Körper stets durch 2 Beine unterstützt ist, und nie ein Augenblick der Schwebelage eintritt. Da der starre Chitinpanzer der Insekten eine Krümmung des Leibes fast unmöglich macht, so folgt aus dieser Bewegungsart ein starkes Schaukeln, das bei zu schnellem Gang das Thier sogar in die Rückenlage bringen kann. Der Erfolg ist ein ähnlicher, wenn eines der anderen Beinpaare beseitigt ist.

In einem Wettfliegen zwischen Bienen und Brieftauben, bei dem es sich um die Zurücklegung einer kleinen Strecke (von nicht ganz einer Wegestunde) handelte, siegten die Bienen. Eine Drohne kam 4 Sekunden vor der 1. Taube, die 3 anderen Drohnen gleichzeitig mit der 2. Taube und der Rest (8 Arbeitsbienen) mit den übrigen Tauben an; *Entom. Nachr.*, 1888, S. 285f.

J. Tosquinet hielt auf der Generalversammlung der Soc. Ent. Belg., 26. Dez. 1888, einen Vortrag über schützende Aehnlichkeit unter den Insekten, der seinen Inhalt den Aufsätzen Pavesi's, M. Weales' und namentlich Trimen's entlehnte; *Bullet.*, 1888, S. CIII bis CXI.

Der Einfluss des Lichtes auf die Oxydationsvorgänge in thierischen Organismen lässt sich bei Schmetterlingsspinnen wegen deren Unbeweglichkeit leicht studieren. Durch die Belichtung wird aber bei diesen Geschöpfen, bei denen die Muskelthätigkeit wegfällt, die Oxydationsthätigkeit und die dadurch bedingte Gewichtsabnahme nicht gesteigert; dieselbe ist vielmehr im Dunkeln eher grösser als im Lichte. Die Untersuchungen wurden angestellt mit

Puppen von *Papilio Podal.* und *Machaon*; *Sphinx Ligustri* und *Euphorbiae* von J. Loeb; Archiv f. d. ges. Physiologie, 42. Bd., S. 393 bis 407.

Derselbe untersuchte die Orientierung der Insekten gegen eine Lichtquelle (Heliotropismus), sowie gegen die Schwerkraft der Erde (Geotropismus) vornehmlich bei den Maden der Brummfleie. Dieselben sind negativ-heliotropisch, indem sie die ventrale Seite und den aboralen Pol der Lichtquelle zukehren und sich von derselben zu entfernen suchen; letzteres fällt bei den frisch ausgekrochenen Maden fort. Gegen die Schwerkraft verhalten sie sich ähnlich, indem sie auf einer senkrechten Fläche den aboralen Pol, auf einer horizontalen Fläche die Bauchseite dem Mittelpunkt der Erde zukehren. Die Orientierung der Insekten gegen die Schwerkraft wird durch die Chordotonalorgane erleichtert. Sitzgsber. Phys.-mediz. Gesellsch. Würzburg, 1888.

Im Verfolg früherer Untersuchungen stellte L. Luciani unter Mitwirkung von A. Puitti neue Forschungen sui fenomeni respiratori delle uova del Bombyce del gelso an; Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 67—1112 mit 10 Tabellen und Tav. XIV. Die wesentlichsten Ergebnisse dieser neuen Beobachtungen sind folgende. Während des Winters ist die Athmung der Eier eine geringe, indem ein Kilogramm Eier während 24 Stunden bei einer Temperatur von $8-10^{\circ}$ 18 Centigramm Kohlensäure abgibt. Bei niedrigerer Temperatur ist auch die Athmung niedriger; ein Kilogramm Eier gibt z. B. bei einer Temperatur von 0° nur 5 Centigramm Kohlensäure ab. Trockene Luft entzieht den Eiern Wasser, während dieselben aus feuchter Luft Wasser aufnehmen und zwar proportional der Durchlüftung (vgl. den Ber. für 1885, S. 28—30). Im Zusammenhang mit dieser Wasserabgabe bzw. -aufnahme steht eine Verminderung oder Erhöhung der Athemthätigkeit. Mittels einer bei gewöhnlicher Temperatur langsam ausgeführten Austrocknung lässt sich das Ei in einen Zustand latenten Lebens bringen, bei welchem die Athmung ganz aufgehoben ist, aber unter geeigneten Verhältnissen wieder eintreten kann. Die Menge der ausgeathmeten Kohlensäure ist ferner um so grösser, je reichlicher der Sauerstoff in der umgebenden Atmosphäre ist. Bei einer künstlichen Beschleunigung der Entwicklung (durch Erhöhung der Temperatur) steigt auch die Athmung und unmittelbar vor dem Ausschlüpfen der Larve ist die Menge ausgeathmeter Kohlensäure 259 mal so gross als während der Winterruhe bei 0° . Während der lebhaften Entwicklung beeinflusst die Trockenheit oder Feuchtigkeit der Luft weit mehr als während der Winterruhe die Athemthätigkeit. — Der aus der ausgeathmeten Kohlensäure und dem aufgenommenen Sauerstoff gebildete Quotient (Respirationsquotient) ist keine konstante Grösse, sondern wächst während der Entwicklung von einem echten Bruch über die Einheit hinaus (0,9749 bis 1,3047). Dieser Umstand macht es wahrscheinlich, dass bei der Entwicklung später chemische Molekeln einer immer niedrigeren Oxydationsstufe

und daher von einer stets wachsenden Summe von potentieller Energie gebildet werden.

A. B. Griffiths' researches on the problematical organs of the Invertebrata in Proc. R. Societ. of Edinburgh, 16. May 1887, S. 230—237 theilen einige Versuche über die Speicheldrüsen der *Periplaneta orientalis* mit, aus denen hervorgeht, dass der Speichel dieser Thiere alkalisch reagirt und ein diastatisches Ferment enthält. Die übrigen Mittheilungen über die exkretorische Funktion der Malpighi'schen Gefässe und die pankreatische der sog. „Leber“ bei *Periplaneta* sind älteren Beobachtungen anderer Forscher entnommen.

G. Carlet lässt in den Compt. Rend. CVII, S. 755—757 mit 2 Holzschn. eine Note sur un nouveau mode de fermeture des trachées, „fermeture operculaire“, chez les Insectes veröffentlichen. Der neue Verschlussmodus findet sich bei Hymenopteren, an dem letzten Stigma, das eine dreieckige Schuppe zwischen der von Lacaze Duthiers „écaille anale“ genannten Platte und der Genitalbewaffnung durchbohrt; diese Schuppe wird von Carlet „écaille trouée“ genannt. Der auf das Stigma folgende Theil der Trachee hat in seinem unteren Theile Aehnlichkeit mit einem der Körbe mit schieferm Deckel, den die Fischer an einem Bande tragen. An den Deckel setzt sich ein Muskel, „muscle trachéen“ an, der von einer Ecke der durchbohrten Schuppe entspringt. Ist dieser Muskel erschlafft, so senkt sich der Deckel und die Füllung und Entleerung der Trachee geht in der „gewöhnlichen Weise“ vor sich. Kontrahirt sich aber der Muskel, so schliesst der Deckel die Trachee, indem er gegen die gegenüberliegende Wand gedrückt wird, und der Inhalt der Trachee ist demnach von der äusseren Luft abgesperrt. (Wenn ich Carlet recht verstanden habe, so soll sich ausser dem äusseren Stigma im Inneren, unterhalb des Deckels, ein Spalt befinden, eine Angabe, die wohl sehr auf ihre Richtigkeit zu prüfen wäre. Refer.).

Derselbe desgl. sur une nouvelle pièce, „le coussinet“, organe annexe de l'aiguillon, chez les Hyménoptères; ebenda S. 955f. Dieses Organ hat eine plan-konvexe Gestalt; die obere Oberfläche ist an der Analschuppe befestigt, während die gewölbte Oberfläche sich gegen den Theil der durchbohrten Schuppe legt, der nicht von dem Tracheenapparat eingenommen ist; dadurch wird dieser Theil von einer Berührung mit der Analschuppe und einer Beschädigung durch diese oder einen anderen Theil des Stachelapparates ausgeschlossen, und der Deckel an dem vorher beschriebenen Tracheenverschluss kann sich ungehindert heben und senken, je nach der Thätigkeit des Tracheenmuskels. Das „Polster“ besteht aus kugeligen Zellen mit körnigen Plasern, die durch eine zarte, durchsichtige Chitinsubstanz zusammengehalten werden. (Ich habe dieses „Polster“ stark im Verdacht, das zu sein, was man bisher als die Schmierdrüse des Stachelapparates bezeichnete; Refer.).

A. v. Gehuchten untersuchte die gestreiften Muskeln der Arthropoden; Archiv f. Anat. u. Physiol. (Physiol. Abth.), 1888, S. 560—564.

G. V. Ciaccio: Dell'anatomia minuta di quei muscoli che negli insetti muovono le ali; nuove osservazioni; Mem. d. R. Accad. delle Scienze etc. di Bologna, ser. 4., como VIII. (Ist mir nicht gekommen).

A. M. Fielde macht Notes on an aquatic Insect, or Insect-larva, having jointed dorsal appendages; Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1888, S. 129 f., Pl. VIII. — Die Verfasserin fand in Wassertümpeln bei Seratow (China) eine Insektenlarve, deren sämtliche Körpersegmente mit Ausnahme des Kopfes und letzten Segments auf dem Rücken je 4 borstenförmige, aus 12—17 Gliedern bestehende, über körperlange Anhänge trugen, in die ein Tracheenast hineintritt und welche niedergelegt und aufgerichtet werden können. Das letzte Körpersegment trägt nur 2 ähnliche Anhänge, welche aber nicht aufgerichtet sind, sondern nach hinten horizontal abstehen. — Die Larve gehört nach der Zeichnung wohl einem netzflügeligen Insekt an.

F. Müller schreibt über Larven von Mücken und Haarflüglern mit zweierlei abwechselnd thätigen Athemwerkzeugen. Larven brasilianischer Psychodiden haben am Körperende zwei Stigmen, in die die beiden Luftröhrenstämme ausmünden und athmen durch diese, wenn sie sich, was bisweilen geschieht, ausserhalb des Wassers begeben. Am After finden sich jederseits 3 (2) fingerförmige Schläuche, die ausgestreckt und eingezogen werden können; in dieselben hinein verzweigt sich je ein Luftröhren-Ast, der kurz vor dem Stigma sich vom Hauptstamm abzweigt. Unter Wasser nun sind diese Schläuche ausgestreckt und dienen der Athmung; in der Luft sind sie eingezogen, und die Athmung geht durch die Stigmen vor sich. — Aehnliche Afterschläuche finden sich bei Haarflüglerlarven, die durch Tracheenkiemen athmen. In diese Afterschläuche tritt aber, abgesehen von einem Falle, keine Trachee ein; sie sind dagegen von Blut geschwellt, und dienen, wie aus ihrem Verhalten unter gewissen Umständen hervorgeht, als echte Blutkiemen, die also hier neben Luftröhrenkiemen vorkommen. Entom. Nachr., 1888, S. 273—277 mit 3 Holzschn.

In F. Leydig's Bemerkungen über die Pigmente der Hautdecke und der Iris, Verhandl. d. physikal.-medizin. Gesellsch. zu Würzburg; (N. F.) XXII, S. 241—265, finden sich auch viele Angaben über die Hautdecke von Arthropoden, z. Th. Wiederholungen früherer Mittheilungen. (Die weissen und gelben Zeichnungen mancher Syrphiden, Syrphus, Chrysotoxum, sind wahrscheinlich Urate; gleich wie bei Cetonia, Lixus wird auch bei Larinus, Liophloeus nubilus die Färbung durch nach aussen getretene Sekrete beeinflusst, die wohl auch „Harnkörper“ sind).

A. Bergé handelt des couleurs métalliques chez les Insectes et spécialement chez les Coléoptères; Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI S. 315—325. Er kommt zu dem Schlusse, dass die metallischen Farben wie alle anderen ihren Sitz in der Kutikula

haben und nicht auf Interferenzerscheinungen zurückzuführen sind. Sie stehen in Zusammenhang mit dem Hauptpigment, indem sie verschwinden, wenn letzteres (durch langsame Oxydation an der Luft) zerstört ist, ohne dass die Kutikula sichtbare Aenderungen erlitten hat, und es ist wahrscheinlich, obwohl nicht erwiesen, dass es ein metallisches Pigment in der Haut giebt.

E. B. Poulton untersuchte das von den Raupen von *Cerura* aus der an der Unterseite des Prothorax mündenden Drüse abgechiedene Sekret und fand in demselben 33 % freier Ameisensäure. Eine vorher nicht gereizte ausgewachsene Raupe scheidet ungefähr 0,05 Gr. einer wässerigen Flüssigkeit ab, die 40 % Säure enthält. Fasten verringert die Menge des Sekretes. Dasselbe war gleich, wenn die Raupe mit Pappel- oder Weidenblättern gefüttert wurde. Report British Assoc. f. Advenc. of Science 1887 S. 765 f.; Nature, No. 938, S. 593f.

Ein Beitrag zur Entwicklung des Flügelgeädters der Insekten von Brauer und Redtenbacher zeigt, dass die von den holometabolen Insekten (Lepidopteren und Hymenopteren) her gemachte Verallgemeinerung, dass nur die Konkavadern durch Tracheen vorgebildet sind, die Konvexadern aber als Zellstränge angelegt werden, in die später Tracheen hineinwachsen können, nicht richtig ist. Bei *Aeschna* werden alle Adern (mit Ausnahme der Vorderrandader) als Tracheen angelegt, und es können Aeste von diesen Tracheen über andere hinweggehen, wodurch weiter nach hinten gelegene Aderverzweigungen ihren Ursprung aus vorderen Längsstämmen nehmen und vor sich ein Geäder haben können, welches einem hinteren Längsstamm angehört. Es hat aber die Ansicht viel Wahrscheinlichkeit für sich, dass bei den Holometabolen die Zellstränge, welche der Flügelrippe vorausgehen, die Anlage von Tracheen sind, welche aber darum sich nicht zu Tracheen entwickeln, weil zugleich die Kutikularbildung am äusseren Umfang derselben beginnt und dieselben sich sofort zu Flügelrippen umwandeln. Zool. Anz., 1888, S. 443—447.

Saint-Remy ergänzt seine früheren Mittheilungen über den Bau des Gehirns bei Skorpionen und Myriapoden; Bull. Soc. d. Sciences de Nancy (S. II) T. IX Fasc. XXI, 20 e année, 1887, Proc. — Verb. S. XXXIf. — Bei *Scol. morsitans* sind zweierlei Nervenzellen vorhanden, plasmareiche und solche mit keinem sehr chromatischen Kern. Diese letzteren finden sich nur in einer kleinen Insel am lob. opticus. Eine eigenthümliche Bildung an der oberen Fläche des Gehirns wird wegen ihrer Beziehung zu den Ganglienkernen den pilzhutförmigen Körpern des Insektengehirns verglichen.

Das Gehirn der *Scolopendra* ist reich an Bindegewebe, und in dem des Skorpions liess sich eine Menge von feinen Blutgefässen durch Injektion nachweisen. Bei denselben sind ausserdem in den Kernen der grossen Ganglienzellen ein grosser achromatischer Nucleolus neben 2 kleineren chromatischen; bei der Doppelfärbung mit

Eosin und Hämatoxylin färbt sich ersterer durch das Eosin, während die letzteren das Hämotoxylin zurückhalten.

In seinem Werke: *On the senses, instincts, and intelligence of animals with special reference to Insects*, London, 1888, S. I—XXX, 1—292, stellt J. Lubbock in trefflicher Weise unsere Kenntnisse von den Sinnesorganen und von dem Seelenleben der Insekten dar; Lubbock selbst hat ja in hervorragender Weise sich an der Erweiterung dieser Kenntnisse betheiligt. Zahlreiche Holzschnitte sind dem Text zur Erläuterung beigelegt.

O. vom Rath hat seiner vorjährigen vorläufigen Mittheilung (s. diesen Ber. S. 13) eine ausführliche Abhandlung folgen lassen: Ueber die Hautsinnesorgane der Insekten; *Zeitschr. f. wiss. Zoolog.*, 46, S. 413—454, Taf. XXX, XXXI.

Auch F. Ruland bringt Beiträge zur Kenntniss der antennalen Sinnesorgane der Insekten; ebenda S. 602—628, Taf. XXVII. — An den Fühlern der Insekten glaubt der Verfasser dreierlei Sinnesorgane: Tastborsten, Geruchskegel und Platten, die zur Wahrnehmung von Tönen dienen, nachweisen zu können.

Die Tastborsten sind stets lang, stark chitinisiert und beweglich eingelenkt; ihr Ende ist nicht durchbrochen. — Die Geruchskegel ragen dagegen nur wenig (wenn überhaupt) über die Fläche hervor und sind am Ende von einer Oeffnung durchbohrt. Nach aussen vorragende Geruchskegel fand Ruland bei allen untersuchten Hymenopteren (Apiden, Vespiden, Mutilliden, Ichneumoniden und Cynipiden); unter den Käfern bei Dytisciden, Hydrophiliden, Carabiden, Cerambyciden, Lamellicorniern und Silphiden; Geruchskegel in der von Leydig angegebenen Form finden sich ferner bei allen Schmetterlingen mit Ausnahme der Rhopalocera (hier sind sie vielleicht vertreten durch die von O. vom Rath beschriebenen Gruben der Palpen; vgl. vorhin und vor. Ber. S. 13; Refer.); und da von anderen Autoren ähnliche Kegel bei anderen Insektenordnungen, den Myriapoden und Crustaceen beschrieben sind, so sind sie als die unter den Arthropoden am weitesten verbreiteten Geruchsorgane anzusehen. Hinsichtlich des zu ihnen gehörigen Nervenapparates führten die Untersuchungen Ruland's im Gegensatz zu Hauser zu einer Uebereinstimmung mit der von Sazepin gegebenen Schilderung: Zu jedem Kegel gehört eine Mehrzahl von Nervenfasern, die eine grössere Zahl von Ganglienkugeln aufnehmen, von denen dann ein Bündel von Fasern (bei Dyticus einfacher Achsenstrang) ausgeht, welche sich weiter nach dem Ende hin vereinigen zu einem einzigen hyalinen Faden, der bis in das letzte Drittel des Kegels verfolgt werden kann. An diese Flächenkegel schliessen sich die Grubenkegel an, die sich von ihnen nur dadurch unterscheiden, dass sie nicht über die Fläche hervorragen. Alle als Geruchsorgane zu deutenden Gruben besitzen aber die am Ende durchbohrten Kegel. Diese Grubenkegel sind entweder einfach (mit einem Kegel) oder zusammengesetzt (mit mehreren Kegeln).

Einfache Grubenkegel fand Ruland bei Tagschmetterlingen, Spannern und Kleinschmetterlingen; ferner bei Käfern (Lamellicorniern). (Bei letzteren kommen auch geschlossene Gruben, ohne Kegel, vor, die aus der Reihe der hier zu betrachtenden Organe auszuschliessen sind.) Eine Reihe von Grubenkegeln, die tiefer und tiefer in die Haut, bezw. in das Innere der Fühler einsinken und sich bei *Tabanus*, *Eristalis*, *Vespiden*, *Ammophila* und *Mutilla* vorfinden, führen zuletzt zu den zuerst von den Ameisen bekannt gewordenen flaschenförmigen und champagnerpfropfenähnlichen Organen. Die zusammengesetzten Gruben sind eingesenkte grössere Stücke der Haut mit mehreren Kegeln.

Die sog. Porenplatten der Haut haben mit den bisher betrachteten Organen nichts zu thun, da hier eine vollständig geschlossene Chitinplatte den Hohlraum in der Chitinhaut nach aussen vollständig abschliesst, so dass das Plasma des Nerven nicht in unmittelbare Berührung mit der Luft kommt. Diese Porenplatten werden von Ruland als Gehörorgane in Anspruch genommen. Bei den als die vollkommensten Gehörorgane anzusehenden Porenplatten sind dieselben mittels einer zarten Verbindungshaut an einem in das Lumen des Porenkanals vorspringenden Ring befestigt und somit leicht vibrationsfähig. Solche Platten finden sich bei Apiden, Vespiden, *Ammophila*, *Mutilla* und *Chrysis*; unter den Käfern bei *Necrophorus*, während bei Cynipiden und Formiciden sich schwer auf jene zurückzuführende Platten, die jedenfalls keine elastische Einfügung besaßen, vorfinden. Der zugehörige Nervenapparat wurde bei *Vespa* in seinen Grundzügen erkannt. Ähnlich wie bei den Geruchskegeln findet sich in der Tiefe ein vielzelliges Ganglion, während die Seiten des Porenkanals von langgestreckten Epithelzellen ausgekleidet sind. Aus dem basalen Ganglion zieht sich durch diese epitheliale Masse ein centraler Nervenstrang, der sich aber jedenfalls nicht direkt an die Platte inserirt. — Drüsenartige Organe hat Ruland in den Insektenfühlern nicht gefunden.

W. Patten setzt seine Untersuchungen über die Augen der Arthropoden fort mit der Entwicklungsgeschichte des Auges von *Acilius*; *Journal of morphology*, II, S. 97—190, mit 7 Tafeln. „Er findet, dass das larvale optische Ganglion aus 3 Theilen (? „segments“) besteht, deren jeder einerseits mit einem Theil (? „segment“) des Gehirns, anderseits mit einem solchen der optischen Platte verbunden ist. Jeder Theil der optischen Platte hat ein Paar von Augen. Die Ozellen sind aus 4 oder mehr sensorischen Gruben gebildet, deren jede mit einer besonderen kutikularen Verdickung und einem Nerv versehen ist; in der Mitte jeder Gruppe der vier sensorischen Einsenkungen ist ein einziger, grosser Nukleus, dessen Bedeutung noch nicht aufgeklärt ist. Die Gruben jedes Auges vereinigen sich schliesslich zur Bildung einer Insel verdickten Ektoderms mit einer medianen doppelten Reihe riesiger Zellen und einer gemeinsamen kutikularen Verdickung. Das verdickte Ektoderm wird invaginiert zur Bildung einer Augenblase, deren inneren Wandungen die Retina bilden, während der

umgebende indifferente Ektoderm eine dicke Schicht über jede Blase bildet; auf diese Weise entsteht das typische dreischichtige Auge.

In den embryonalen Augen I.—IV., deren Retinä invaginiert sind ohne Bildung einer Höhle in der optischen Blase (abgesehen von dem Raum zwischen der medianen Reihe der riesigen Zellen), sind alle Stäbchen horizontal; bei den ausgewachsenen Larven richten sich die kleineren, äussersten Stäbchen auf, während die grösseren und tiefer gelegenen ihre horizontale Lage beibehalten. In Auge V. besteht anfangs eine starke Neigung, horizontale Stäbchen zu bilden, aber die seitlich abgeflachte Augenblase dehnt sich aus und bildet eine geräumige Höhle in der Blase; alle Stäbchen mit Ausnahme derer der medianen Reihe der riesigen Zellen werden aufgerichtet. Im Auge VI., das keine mediane Reihe von Riesenzenellen hat, werden keine horizontale Stäbchen gebildet.

In den Augen I.—IV. scheint die äussere Wand zu fehlen, indem ihre Anwesenheit im Embryo nur durch wenige charakteristische Kerne zwischen der Retina und dem Korneagen angedeutet wird. Im Auge V. ist dieselbe durch 2 grosse Massen umgekehrter, stäbchen-tragender Zellen dargestellt, welche wahrscheinlich von 2 entsprechenden sensorischen Gruben sich herleiten. Im Auge VI. ist die äussere Schicht von einer dünnen gekerntn Haut und einem Klumpen von umgekehrten Retinazellen gebildet.

Auge I. setzt sich aus mindestens 9 sensorischen Flecken zusammen, von denen 4 nebst ihrem zentralen Nukleus und der medianen Reihe von Riesenzenellen die horizontale Retina entstehen lassen; vier andere, ganz gleich den ersteren, geben der vertikalen Retina und der 9. dem Anhang den Ursprung. Alle diese einzelnen Flecken verschmelzen, um ein einheitliches Organ zu bilden; aber während der späteren Stadien modifizieren sich die 3 Gruppen der Sinnesflecken stark, so dass im erwachsenen Auge die Theile, die aus ihnen entstanden sind, sehr verschieden sind. Alle Retinä sind aus Retinophoren zusammengesetzt, deren jede aus der Verschmelzung zweier Zellen entsteht; sie enthalten 2 Kerne und 2 Stäbchen und sind mit axialen und peripheren Nervenfasern ausgestattet. Ganglienzellen finden sich spärlich in der Retina von *Acilius*. Die Stäbchen sind paarweise angeordnet und bilden aufgerichtet ein Mosaik von sechseckigen, horizontal gestellt dagegen gerade vertikale Linien. In beiden Fällen sind die Nervenfasern unter einem rechten Winkel gegen die Lichtstrahlen.

Alle Larvenaugen von *Acilius* und *Dyticus* enthalten mehr oder weniger deutlich dimorphe Retinazellen. Die Riesenzenellen bilden immer eine doppelte Reihe längs des Grundes der Furche; ihre freien Enden sind unter einem rechten Winkel gebogen und tragen kurze, breite, horizontale Stäbchen. Die Enden der kleineren Retinazellen und demzufolge auch ihre Stäbchen können horizontal, aufgerichtet oder umgekehrt sein. Zwischen den 2 Reihen von Riesenzenellen sind 2 Streifen starker, vertikaler Nervenfasern und eine

Schicht von einer markähnlichen Substanz. Die Pigmentkörnchen sind an der Oberfläche der Retinophorä und um die äusseren Nervenfasern gelagert.

Alle Augen werden von der Augenplatte, dem verdickten distalen Ende der Kopflappen, entwickelt. An dem proximalen Ende dieser Augenplatte ist eine halbkreisförmige Furche, welche dem gangl. opt. seinen Ursprung gibt. Die Furche ist zu zwei Taschen vertieft, aus denen der erste und 2te Abschnitt des gangl. opt. entsteht. Der dritte Abschnitt wird von einer nach innen gerichteten Wucherung an der proximalen Seite des dritten Abschnittes der Augenplatte gebildet. Die innersten Schichten der Ganglionabschnitte hängen von Anfang an mit der Innenseite der Augenplatte zusammen. Zahlreiche Ganglienzellen entstehen an der Augenverdickung und wandern die Augennerven entlang in das gangl. opt. ein. Gegen Ende dieses Vorganges, ungefähr zu der Zeit, wo die Invagination der sensorischen Flecken beginnt, entstehen in jedem Auge ungeheure tripolare Zellen, wandern längs dem nerv. opt. in das gangl. optic., unterwegs sich lebhaft theilend, und lassen so kleine tripolare Ganglienzellen entstehen. Nur eine von den Zellen behält ihre bedeutende Grösse und lagert sich an die Seite der Marksubstanz, welche zu dem Auge gehört, von dem sie entstand.

Das Augenganglion des konvexen Auges der Arthropoden ist aus 3 Lappen zusammengesetzt; der erste verschwindet immer, der dritte bisweilen; der zweite lässt das eigentliche Augenganglion entstehen. Das retinale Ganglion ist sekundärer Herkunft, und nicht durch Invagination entstanden. Das dreilappige Augenganglion leitet sich von einem dreitheiligen larvalen Ganglion ab, dessen einzelne Abschnitte zu je einem Paar von Larvenzellen gehören. Der 1., 2. und 3. Abschnitt des Augenganglions der *Acilius*-Larven sind homolog dem 2., 1. und 3. Lappen des Augenganglions des zusammengesetzten Imago-Auges, und daraus folgt, dass das eigentliche gangl. opt. des zusammengesetzten Auges von dem ersten Abschnitt des Larvenganglions, oder dem sich ableitet, welcher mit dem grossen hinteren dorsalen Ocellus verbunden ist. Das gangl. opt. enthält 6 Markballen, deren jeder in seinem Bau dem des zugehörigen Ganglions entspricht, und dies beweist, dass die Anordnung der Markfasern nahezu der der Retinafasern gleich ist.

Der Bau der Netzhaut in den Larvenaugen der Insekten ist sehr ähnlich dem der Myriapoden, und das ganze Auge ist nach demselben Plane gebaut wie das von *Peripatus* und den meisten Mollusken. Patten glaubt, dass die primitiven Ganglienzellen tripolar sind und sich von tripolaren Neuro-epithelialzellen ableiten. Die äusseren Enden dieser Zellen reduzieren sich zu interzellularen Nervenenden, deren Basis bei *Acilius* die protoplasmatischen Verlängerungen der Ganglienzellen werden und wahrscheinlich den Achsenzylindern der Wirbelthiere homolog sind. (Uebersetzt aus Journ. R. Microsc. Soc., 1888, S. 938—940).

Appendices à mon mémoire sur les sensations des Insectes (vergl. den vor. Ber. S. 20) von A. Forel in Recueil zoolog. Suisse IV, S. 515—523 behandeln einige Versuche mit *Formica pratensis*, um über die Rolle der Fühler und Augen bei der Orientierung Aufschluss zu erhalten. Der Fühler beraubte Exemplare waren ganz hilflos und machten nicht einmal den Versuch, den Rückweg nach ihrem Stock aufzufinden. Exemplare dagegen, deren Augen und Ozellen mit einer Schicht von dunkeltem Firniß überzogen waren, suchten und fanden den richtigen Weg, auf dem aber nur ein Exemplar ins Nest gelangte; bei diesem waren einige Fazetten unbedeckt geblieben; aber Forel meint, dass dieser Umstand nicht entscheidend gewesen sei. Jedenfalls aber dient bei dieser Art das Auge in höherem Grade zur Orientierung, als es nach den Versuchen mit *Camponotus* bei diesem der Fall zu sein scheint. Es erklärt sich dies vielleicht aus dem Umstande, dass *F. pratensis* (und die Gattung *Formica* überhaupt) einen hoch entwickelten Gesichtssinn, aber einen schwach entwickelten Geruchssinn hat.

F. Plateau hat seinem vorjährigen Programm (s. d. Ber. S. 18f) entsprechend Part. III, IV und V seiner *Recherches expérimentales sur la vision chez les Arthropodes* erscheinen lassen; Bull. de l'Acad. royale de Belgique, (3. Sér.) t. XV No. 1, S. 1—66; Mém. couronnés et autres mémoires publ. par l'Acad. royale de Belgique t. XLIII, S. 1—91. Pl. III, IV; Bull. de l'Acad. royale de Belgique (3. Sér.) t. XVI No. 11, S. 1—65, Pl. V.

Der dritte Theil ist dem Sehen mittels Ozellen gewidmet, und zwar sowohl bei Raupen, wo Ozellen die einzigen Augen sind, als auch bei Imagines, bei denen sie neben den Fazettenaugen vorkommen. Bei den Raupen zeigte es sich, was aus den bisherigen Untersuchungen über den Bau ihrer Ozellen nicht zu erwarten war, dass sie nicht nur Licht und Dunkelheit unterscheiden, sondern auch sehen können, freilich nur auf geringe Entfernungen, die in der Nachbarschaft eines Centimeters liegen; auf grössere Entfernungen nehmen sie nur noch die Gegenwart grösserer Massen wahr, ohne dieselben deutlich zu sehen. Auch Bewegungen werden von den Raupen nur innerhalb der Grenze wahrgenommen. Behaarte Raupen haben auf ihren vorderen Körperringen Tasthaare, die sie zur Auskundschaftung ihrer Umgebung benutzen, und alle erkunden mittels ihrer Fühler die Unterlage, auf der sie kriechen und die Gegenstände, denen sie bei ihrem Vorwärtskriechen begegnen.

Die Versuche mit Imagines, die gleichzeitig mit Ozellen und Fazettenaugen ausgerüstet sind, ergaben das bemerkenswerthe Resultat, dass die ersteren sozusagen nutzlos sind. Das Benehmen von geblendeten flugfähigen Insekten ist bekannt: sie erheben sich senkrecht in die Höhe, dem Blicke entschwindend. Dieses thun auch solche, denen die Ozellen funktionsfähig belassen sind, während eine Unbrauchbarmachung dieser allein keinen bemerkbaren Einfluss ausübt; die so behandelten Insekten benahmen sich ganz wie normale. —

B*

Dieses Gebahren ist auf die dermatoptische Fähigkeit zurückzuführen; die geblendeten Insekten bewegen sich nach der Richtung der grössten Helligkeit. Dass diese Erklärung die richtige ist, beweisen Versuche, die als Nachtrag im 5. Theile mitgetheilt werden. Geblendete nächtliche Insekten (Nachtschmetterlinge) fliegen (bei dunkeltem Himmel) nicht senkrecht in die Höhe. Es lässt sich aber annehmen, dass diese Insekten, wenn der Himmel klar ist, sich ebenso wie Taginsekten benehmen würden. In der That flogen geblendete Schmetterlinge, die im erleuchteten Zimmer entwichen, entweder gegen die Lampe oder gegen die helle Decke, oder liessen sich, wenn sie in einen nicht direkt vom Licht getroffenen Theil des Zimmers gerathen waren, an dem ersten besten Gegenstand, an den sie stiessen, nieder.

Der 4. Theil enthält nach einem *Resumé anato-mo-physiologique* vergleichende Untersuchungen über Insekten und Wirbelthiere. Diese waren veranlasst durch die von verschiedenen Seiten gegen die Beweiskraft der früheren Untersuchungen erhobenen Einwände, die ein mangelndes Urtheil da annahmen, wo Plateau auf unvollkommenes Sehen geschlossen hatte. Diese Einwände erwiesen sich als berechtigt; aber die anatomische Beschaffenheit der Insektenaugen macht es wahrscheinlich, dass die Insekten die Gestalt der sie umgebenden Gegenstände gar nicht oder unvollkommen sehen, und die Versuche stehen mit dieser Annahme nicht im Widerspruch.

Der 5. Theil theilt Versuche mit über die Wahrnehmung von Bewegungen von Seiten der Insekten. Dieselben bestätigten die Behauptungen, die zuerst Exner auf Grund theoretischer Betrachtungen ausgesprochen hatte. Am besten sind in dieser Hinsicht die Hymenopteren, Lepidopteren, Dipteren und Odonaten begabt. Doch übersteigt die Entfernung, auf welche Bewegungen wahrgenommen werden, 2 Meter nicht, und beträgt im Mittel für die Schmetterlinge 1,5, für die Dipteren 0,68 und für die Hymenopteren 0,58 m. — Ein *Resumé général* über alle in den 5 Theilen angestellten Versuche und die daraus zu ziehenden Folgerungen bildet den Schluss dieser interessanten und mühsamen Arbeit, über deren 2. und 3. Theil Tiebe im *Biolog. Centralblatt*, VIII, S. 179—185 und 276—282 referirt hat.

E. Gilson schliesst seine vergleichenden Untersuchungen über die Spermatogenese der Arthropoden mit den Gamasiden und Ixodiden und mit vergleichenden Betrachtungen; *La cellule*, IV. S. 351—446, mit 1 Taf.

Leydig's Beiträge zur Kenntniss des thierischen Eies im unbefruchteten Zustande, *Zool. Jahrb.*, Abth. f. Anatomie u. Ontogenie, III, enthalten auf S. 302—336 Angaben über die Eier der Arachniden, Tausendfüssler und Insekten. — An den Ovarien mancher Spinnenarten lassen sich die Eikeime und die Matrixelemente schon früh unterscheiden, indem die Kerne der letzteren kleiner sind und das sie umgebende Plasma mit dem der benachbarten Elemente zu einer zusammenhängenden Masse zusammenfliessen kann. An den

Ovarien mancher Arten (Tetragnatha; Teraphoside; Opilione) bemerkt man ein Muskulatur, bestehend aus inneren Ring- und äusseren Längsmuskeln; bei Phalangium setzt sich diese Muskulatur auf den Stiel des Eiersäckchens fort. Der Keimstock ist von sehr verschiedenem Aussehen; bei einer Theridium- (? , wahrscheinlich Dictyna-) Art finden sich im Keimfleck Anhäufungen kleiner, in Strängen angeordneter Kügelchen, welche sich aus dem Keimbläschen hinaus in den Dotter hinein erstrecken. — Der Anfangs homogene Dotter lässt später allgemein eine Sonderung in Spongioplasma und Hyaloplasma erkennen, wozu sich Dotterkugeln und Granula gesellen. Bei einer Lycosa ordneten sich die Dotterkugeln in einer Rindenschicht des Dotters an, so dass der Schein erweckt wurde, als habe die Blastodermbildung begonnen. Bisweilen hat der sonst kugelige Dotter des Phalangiumeies einen kegelförmigen Fortsatz, der sich in den Stiel des Eiesäckchens erstreckt. Wie schon oben bei den Eiern von Theridium erwähnt wurde, dass Körperchen aus dem Keimbläschen in den Dotter übertreten, so erhielt Leydig auch Bilder, welche darauf hindeuten, dass der Dotterkern so mancher Arachnideneier aus dem Keimbläschen stamme. — In der Follikelhaut von Tetragnatha beobachtete Leydig einige Kerne, während diese in den meisten Fällen fehlen.

Die äusserlich unpaare Eierstocksröhre von Lithobius und Geophilus hat in ihrem Innern zwei Keimstränge, deren Matrixelemente sich auch hier von den Eikeimen leicht unterscheiden lassen, indem die Kerne der ersteren länglich und kleiner, die der letzteren rund, bläschenförmig mit mittlerem Punkt sind. Der wachsende Eikeim kommt in ein gestieltes Beutelchen zu liegen, dessen Haut und Kerne die Fortsetzung der Matrix des Keimstranges sind. Hinsichtlich des Austretens von Theilen des Keimbläschens in den Dotter nimmt Leydig auf Grund seiner Beobachtungen an, dass Stücke des Keimbläschens sich in feine Granula auflösen, durch die Poren in der Membran des Keimbläschens auswandern und sich dann wieder zu grösseren Ballen vereinigen.

Der Dotter zeigt in manchen Fällen eine radiäre Struktur des Spongioplasmas.

Auch die intravitellinen Körper im Ei der Myriapoden haben, wie schon Balbiani annahm, ihren Ursprung wahrscheinlich im Keimbläschen; dagegen weicht Leydig hinsichtlich der diesen Körpern weiterhin zugeschriebenen Rolle von Balbiani ab, der sie aus dem Ei austreten und zu Follikelzellen werden liess. Nach Leydig sind aber, wie schon oben bemerkt, die Follikelzellen nichts anderes als die Matrixzellen des Keimstranges, und die Zellen, welche man zwischen Follikelhaut und Ei bemerkt, sind Blutzellen, Leukozyten, welche durch den Stiel des Follikels eingedrungen sind, dessen Lichtung mit einem Blutraum zusammenhängt.

Unter den Insekten dienen hauptsächlich Stenobothrus-Arten zur Untersuchung, die die vom Verfasser schon vor mehr als 20 Jahren

gelieferte Beschreibung als richtig bestätigten und ergänzten. Es sind also die Eikeime und Epithelzellen des Keimfaches ursprünglich eins, indem sich beide aus den gleichen Elementen des Endfadens herausdifferenzieren. Während in den Kernen des Endfadens eine feine netzartige Struktur zu erkennen ist, lässt der Keimfleck kleine blasse Klümpchen sichtbar werden, die durch feine Ausläufer kettenartig mit einander verbunden sind. Endlich treten auch bei den Insekten Erscheinungen auf, die ein Auswandern von Körpern des Keimbläschens in den Dotter wahrscheinlich machen.

Henking macht eine vorläufige Mittheilung über die Bildung von Richtungskörpern in den Eiern der Insekten und deren Schicksal; Nachr. d. Königl. Gesellsch. d. Wissenschaften zu Göttingen, 1888, S. 1—6. Aus den Eiern von *Pyrrhocoris apterus* wird 3 bis 4 Stunden nach der Ablage der eine und bald darauf auch der zweite Richtungskörper ausgestossen, und beide liegen in einer Grube, die sich an der Eioberfläche gebildet hat. An 4—5 Stunden alten Eiern ist die Grube tiefer geworden, später senkt sie sich noch tiefer ein, ihre Ränder wölben sich zusammen und verschmelzen, so dass nun die Richtungskörper wieder vom Ei aufgenommen sind. Noch später rücken sie noch mehr ins Innere und liegen bei 20 Stunden alten Eiern an der Oberfläche des centralen Dottermaterials; hier waren sie noch an Eiern aufzufinden, die bereits 78 Stunden alt waren.

Während also hier die ausgestossenen Richtungskörper wieder aufgenommen werden, gelangen sie bei Fliegen, hinsichtlich deren Henking jetzt seinen Widerspruch gegen Blochmann aufgibt, ferner bei Lepidopteren (*Pieris*), *Bombyx Mori*; *Leucoma Salicis*; Hymenopteren (*Formica*, *Apis*) überhaupt nicht nach aussen, sondern bleiben in der Zone randständigen Plasmas liegen.

Bei *Tenebrio molitor* und *Lampyris splendidula* wird ein Richtungskörper völlig ausgestossen; das Schicksal des zweiten ist noch unbekannt. Auch bei *Donacia* und *Agelastica Alni* gelangte der Verfasser zu keiner Gewissheit hinsichtlich der Zahl und der etwaigen Ablösung der Richtungskörper, bezw. der Richtungsspindel.

Henking behandelt die ersten Entwicklungsvorgänge im Fliegenei und freie Kernbildung; Zeitschr. wiss. Zool. XLVI. S. 289—336, Taf. XXIII—XXVI. Die Spermatozoen dringen durch die am spitzen Eipole befindliche Chorion- und Dotterhautmikropyle ein und gehen im Eiplasma zunächst aus der fadenförmigen Gestalt in die eines rundlichen Kerns über. Eine Richtungsspindel wurde in mehreren Fällen beobachtet, allerdings einmal eine von den anderen nicht zu unterscheidende Bildung am stumpfen Eipole und zu einer Zeit, als am spitzen bereits die Entwicklung begonnen hatte. Es gibt ein Stadium, in welchem kein Chromatinrest des Eikerns mehr zu beobachten war; bei der nach Ausstossung der Richtungskörperchen übrig bleibenden geringen Masse ist aber auch ein Uebersehen möglich. In der Nähe der sog. Schalenrinne fanden sich nun aber, ziemlich nahe der Oberfläche, in einem späteren Stadium 3 kernartige Ge-

bilde, von denen der am meisten oberflächlich gelagerte als der weibliche Kern, die beiden anderen, einander stets nahe liegende, als zwei männliche Kerne angesehen wurden; eine Kopulation dieser Kerne wurde nicht beobachtet. Später lösen auch sie sich auf, und dann tritt in der durch ihre Auflösung entstandenen Plasmawolke Chromatin auf, das sich später in eine Spindel auseinanderzieht; nach Henking hat Blochmann diese Spindel für die Richtungsspindel angesehen. vgl. dazu die vorherige Mittheilung. Die Chromatinhälften dieser Spindel rücken weiter auseinander; die zu äusserst liegende lässt sich noch längere Zeit hernach an derselben Stelle beobachten, ohne dass ihr endliches Schicksal ermittelt wurde; die innere Hälfte giebt Theile ins Innere ab, die sich allmählich ganz verlieren. Die beiden anderen Kerne haben sich inzwischen ebenfalls aufgelöst, und in den hierdurch entstandenen Plasmamassen treten durch freie Kernbildung die beiden ersten Kerne der Dotterzellen auf, die sich durch Theilung rasch vermehren, während zugleich wahrscheinlich auch noch später sich die freie Kernbildung wiederholt.

Weismann und Ischikawa stellen weitere Untersuchungen zum Zahlengesetz der Richtungskörper an. Zool. Jahrb., Abth. f. Anatomie u. Ontogenie, III, S. 575—610, Taf. XXV.—XXVIII. Die meisten dieser Untersuchungen beziehen sich auf Crustaceen; von Insekten wurde *Spathogaster tricolor* untersucht, welche bekanntlich die Geschlechtsgeneration zu dem agamen *Neuroterus fumipennis* ist. Die Eier von *Spath tricol.* stossen 2 Richtungskörper ab, die in der Randzone des Eies liegen bleiben und noch unverändert zu sehen sind, wenn bereits eine Kopulation des Sperma- und Eikerns Statt gefunden hat. Insofern also bei diesen der Befruchtung bedürftigen Eiern 2 Richtungskörper gebildet werden, ist der eine Theil des Zahlengesetzes in diesem Falle bestätigt; zur Prüfung des anderen Theiles müssten noch die Eier des agamen *Neuroterus* untersucht werden, wozu vorläufig die Gelegenheit fehlte.

F. Blochmann macht Bemerkungen zu den Publikationen über die Richtungskörper bei parthenogenetisch sich entwickelnden Eiern; Morphol. Jahrb., XIII, S. 654—663. Diese Bemerkungen suchen zu beweisen, dass Blochmann der erste gewesen sei, der auf den Umstand ausdrücklich hingewiesen habe, dass bei parthenogenetischen Eiern nur ein Richtungskörper gebildet werde; vgl. dies. Ber. für 1887, S. 23.

In einer „das Zahlengesetz der Richtungskörper und seine Entdeckung“ betitelten Entgegnung weist Weismann nach, dass der erste, der die Bedeutung von der Einzahl der Richtungskörper bei parthenogenetischen Eiern, nicht als unverständliches Kuriosum, sondern für die Vererbungstheorie erkannt und ausgesprochen habe, nicht Blochmann, sondern Weismann gewesen sei. Ebenda S. 490—506.

G. Platner macht eine vorläufige Mittheilung über die erste Entwicklung befruchteter und parthenogenetischer Eier

von *Liparis dispar*; Biolog. Centralbl., VIII, S. 521—524. Die Eier bilden ausnahmslos zweimal 2 Richtungsspindeln aus; von den aus der doppelten Theilung entstandenen 4 Kernen treten 3 als Richtungskerne an die Peripherie; der vierte rückt als weiblicher Pronukleus an den animalen Pol unter der Mikropyle, um hier mit dem Spermakern zu kopulieren, wenn eine Befruchtung Statt gefunden hat; die Wanderung des weiblichen Pronukleus ist also von der Gegenwart des Spermakerns unabhängig. Das eingedrungene Spermatozoon lässt von der Spitze seines Kopfes bei der Bildung des Spermakerns ein kleines, rundes, dunkles Körperchen sich ablösen. Die drei an die Peripherie gerückten Richtungskerne verschmelzen gewöhnlich mit einander. Die 3 ersten Furchungsspindeln stehen senkrecht auf der Kopulationsrichtung; später lässt sich keine Regel mehr erkennen.

V. Graber stellt über die Polypondie bei Insekten-Embryonen die älteren Literaturangaben zusammen und vermehrt dieselben um die Ergebnisse eigener Untersuchungen, die er namentlich am Maikäfer angestellt hatte; Morpholog. Jahrb., XIII, S. 586—615, Taf. XXV, XXVI. Ihrer Lage und Bildungsweise nach rudimentäre Hinterleibsbeine wurden bei Orthopteren (*Gryllotalpa*, *Mantis*, *Blatta* u. a.), Neuropteren (*Neophalax*!) und Coleopteren (*Hydrophilus* und *Melolontha*) sicher beobachtet und sollen auch bei Rhynchoten, Lepidopteren und Hymenopteren vorkommen. Am häufigsten finden sie sich am ersten, selten auch am zweiten, gar dritten Hinterleibssegment; bei *Melolontha* fand sie Graber an allen mit Ausnahme der 2—3 letzten. Die des ersten Segmentes erscheinen ganz oder fast ganz gleichzeitig mit dem Auftreten der Brustbeine und erhalten sich bis zum Ausschlüpfen der Larve, während die übrigen später erscheinen und bald wieder verschwinden. Sie können als Beweis dienen dafür, dass Insekten und Arachniden von Vorfahren abstammen, die auch am Hinterleib Gliedmassen besaßen, und zwar ist es wahrscheinlich, dass diese Hinterleibsgliedmassen nicht, wie bei Tausendfüßern, denen der Brust glichen, sondern kiemenblattartig waren wie bei den Crustaceen. — S. auch das Referat von Matzdorff in den Monatl. Mitth. a. d. Gesamtgeb. d. Naturw., 6. Jahrg., S. 91 f.

O. Bütschli macht Bemerkungen über die Entwicklungsgeschichte von *Musca*, die sich auf die Anlage der Keimblätter beziehen und im wesentlichen mit Kowalevsky's Angaben (s. d. Ber. für 1886 S. 141 f.) übereinstimmen. Die mediane von vorn nach hinten fortschreitende Einstülpung des Keimstreifens fasst auch Bütschli als Gastrulationsvorgang auf, bei dem der Gastrulum und nicht rund, sondern ein langer Spalt ist, der sich hinten zuletzt schliesst. Das untersuchte Stadium wies nur noch an dem hinteren Ende eine noch nicht geschlossene Oeffnung auf. An diesem Ende entspringen aus dem Stiel der Einstülpung rechts und links eine Ausstülpung, die weiter nach vorn abgelöst erscheinen und durch Zusammenfließen einen unpaaren Sack zwischen dem tiefer gelegenen, ein geschlossenes Rohr darstellenden Theil der Einstülpung

und dem Ektoderm des Keimstreifens, bilden. Jenes tiefer gelegene Rohr stellt wahrscheinlich das Entoderm, oder vielmehr dessen hinteren Theil, dar, während nach Kowalevsky, dessen Darstellung Bütschli in diesem Punkte nicht kontrollieren konnte, der vordere Theil des Entoderms einem ähnlichen Vorgang am vorderen Ende des Gastrulamunds seine Entstehung verdankt. Die abgeschnürten Seitenausstülpungen bilden das Mesoderm, das also als Divertikel an den beiden Enden des Urdarmes entsteht. Von jenem hinteren Ende erhebt sich auch eine nach vorn ziehende und hier allmählich verflachende Ammionfalte. Die Bezeichnung hinten und vorn sind mit Rücksicht auf den Keimstreif zu verstehen; thatsächlich entspringt die Ammionfalte ungefähr in der Mitte des Rückens (so weit reicht auch der Gastrulaspalt) und erreicht am hinteren Eipol ihr Ende. *Morphol. Jahrb.*, XIV, S. 170—174 mit 3 Holzschn; vgl. dazu unten F. Schmidt, bei Dipteren.

V. Graber schreibt über die primäre Segmentierung des Keimstreifs der Insekten; *Morphol. Jahrb.*, XIV, S. 345—368, Taf. XIV, XV, 4 Holzschn. Nachdem schon Metschnikoff (beim Skorpion) und Ayres (bei *Oecanthus*) eine Gliederung des Keimstreifs in 3 Hauptabschnitte angedeutet hatten, zeigt Graber, dass dies bei Insekten (*Stenobothrus*, *Lina*) die Regel ist. Der Keimstreif derselben zerfällt, abgesehen vom Fühlertragenden vordersten Abschnitt, in drei Ursegmente, (Makrosomiten), von denen das erste dem kiefertragenden Theil des Kopfes, das zweite der Brust und das dritte dem Hinterleib entspricht, und diese Gliederung ist nicht nur äusserlich durch Furchen angedeutet, sondern auch in der Zerlegung des inneren Blattes ausgesprochen. Die weitere Segmentierung, (in Mikrosomite), die zu der Bildung der bleibenden Matameren führt, geht nicht von vorn nach hinten fortschreitend vor sich, sondern gelangt zuerst an dem Thorax zur Ausbildung. Gegen die Annahme, dass in jener primären Segmentierung die Zerlegung des Insektenkörpers in die drei Hauptabschnitte, Kopf, Brust und Hinterleib, vorgebildet sei, spricht neben der Verschmelzung der zwei Makrosomiten der Umstand, dass die sekundäre Segmentierung zunächst jene primäre Segmentierung vollkommen verwischt, und das Endstadium durch Verschmelzung gewisser Mikrosomitengruppen sich ausbilden muss.

Desselben Vergleichende Studien über die Keimhüllen und die Rückenbildung der Insekten, *Denkschr. d. kais. Akad. d. Wissenschaft.*, Wien, 1888, sind mir bisher nur aus einer Anzeige bekannt geworden.

Die Freunde des verstorbenen A. T. Bruce haben dessen embryologische Untersuchungen über Arthropoden (*Thyridopteryx*, *Chrysopa*, *Meloe*, *Mantis*, *Heuschrecke*, *Musca*, und eine unbenannte Spinne) herausgegeben; Baltimore, 1887. 4to; 9x 31x 17pp., 7 plates. Ich habe dieses Werk nicht eingesehen; ein kurzes Referat von Kingsley findet sich im *Americ. Naturalist*, 1888, S. 470f.; über eine vorläufige Mittheilung ist referirt in *dies. Ber.* für 1886, S. 48—51.

Verson glaubt hervorheben zu sollen, dass die durch mechanische Reize veranlasste sog. künstliche Parthenogenesis bei den Eiern von *Bombyx Mori* die Entwicklung nur bis zur Bildung der serösen Haut veranlasse und bestreitet, dass beim Seidenspinner eine wirkliche parthenogenetische Entwicklung bis zum Ausschlüpfen der Raupe vorkomme; Zool. Anz., 1888, S. 263f. (Ueber Parthenogenesis bei *Bombyx Mori*). — Tichomiroff dagegen, ebenda, S. 342—344, (Nochmals über Parthenogenesis bei *Bombyx Mori*) weist auf die zahlreichen gegentheiligen Angaben (von Boursier, Barthélémy, v. Siebold, Tichomiroff, Gondatti, hin, die durchaus Vertrauen verdienen.

H. Fockeu beginnt in *Revue biologique du Nord de la France*, I, S. 116—120 eine première liste des galles observées dans le nord de la France, die von Käfergallen nur *Ceuthorrhynchus contractus* Sch., von Hymenopteren eine grössere, der wirklich vorhandenen sich wohl mehr nähernde Zahl angibt.

F. Löw macht Norwegische Phytopto- und Entomocecidien bekannt, die vom 8. Juli bis 3. August 1886 im mittleren und nördlichen Norwegen gesammelt wurden. Es sind 41 Gallen, von denen 21 Phytoptus, 2 Hemipteren, 11 Dipteren, 1 Coleopteren, 6 Hymenopteren zum Erzeuger haben. 8 Gallen wurden auf neuen Substraten gefunden, nämlich von Phytopten Cephaloneonartige Blattgallen auf *Salix hastata*, und Ausstülpungen der Blattspreite an *S. pentandra*; an *Galium boreale* die Galle der *Cecid. gallicola*, an *Salix hastata* die Zweiggallen der *C. Salicis*, an *Rosa carelica* die Gallen der *C. rosarum* und an *Phaca astragalina* hülsenförmige Rollungen der Fiederblättchen; an *Salix hastata* 2 Gallen, eine ähnlich denen des *Nematus Salicis cinereae* und eine andere ähnlich denen des *N. bellus*.

Ph. Bertkau berichtet über die Geschlechtsorgane eines halbierten Zwitter von *Gastropacha Quercus*. Die Geschlechtsorgane waren rein nach dem weiblichen Typus gebaut, aber die Geschlechtsdrüsen ganz verkümmert, dagegen waren die beiden Eileiter, die gemeinsame Scheide, die bursa copulatrix, der diese mit der Scheide verbindende Gang und das recept. seminis wohl ausgebildet; aber die Scheide endete hinten blind. Dieser Befund legte den Gedanken nahe, dass „der Einfluss der Geschlechtsdrüsen auf die sekundären Geschlechtsmerkmale nicht in einer Ausbildung der dem betreffenden Geschlecht zukommenden, sondern in der Unterdrückung der sekundären Geschlechtsmerkmale des anderen Geschlechtes zu sehen ist.“ Sitzgsber. d. Niederrh. Gesellsch. f. Natur- und Heilkunde. Bonn, 1888, S. 67f.

Mit der Frage: Des lois sur l'hermaphrodisme? wendet sich P. Chrétien gegen Lefebvre, der aus den wenigen in der Société entomologique de France zur Sprache gekommenen Fällen von halbierten Zwittern das Zahlenverhältniss der rechtsseitigen männlichen zu den rechtsseitigen weiblichen Zwittern = 4:1 abgeleitet hatte; *Le Naturaliste*, 1888, S. 55f.

Andrena praecox ♀ und *Astacus fluviatilis* ♀ mit theilweise männlichen Kennzeichen; R. Dittrich, Zeitschr. f. Entomologie, Breslau (N. F.) 13, S. 4—6.

Ph. Bertkau erwähnt eine *Diaea dorsata*, deren Cephalothorax nebst Tastern männlich ist, während der Hinterleib den Umfang und die Färbung des Weibchens hat; Sitzgsber. d. Niederrh. Ges. f. Natur- u. Heilkunde, Bonn, 1888, S. 68.

Th. Becker macht eine zwitterähnliche Missbildung von *Syrphus lunulatus* Meig. bekannt, die darin besteht, dass bei 3 Männchen der genannten Art die Augen auf der Stirn nicht zusammenstossen, sondern durch einen verschieden breiten Zwischenraum getrennt sind. Becker hält dafür, dass man von Zwittern nur dann sprechen dürfe, wenn auch die Geschlechtswerkzeuge zwitterig gebildet sind. Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 71—74 m. 13 Holzschn.

Osten-Sacken verweist auf eine Notiz Zetterstedt's in dessen Dipt. Scand., wo ein halbirter Zwitter von *Dilophus femoratus* erwähnt ist; ebenda S. 94; vgl. Mik ebenda S. 141, 182, der noch auf *Scaeva peltata* und *Dilophus vulgaris* verweist.

Zwitter von *Lycaena Icarus*; S. Webb, The Entomologist, XXI, S. 132—135.

Lucas erhielt von Bordeaux 2 Exemplare der *Apis mellifica*, die nach der Grösse der Augen halbierte Zwitter (das eine rechts, das andere links ♂) waren; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LXXXIV.

Zwitter von *Lasiocampa Pini*; Sitzgsber. Berl. Entom. Ver., 1888, S. 21.

Zwitter von *Liparis dispar*; Goossens, Bull. Soc. Entom. France 1887, S. CLXVI; Bellier de la Chavignerie ebenda S. CLXXXIII; Demaison ebenda S. CCIVf.; Gleissner, Sitzgsber. Berl. Entom. Ver., 1888, S. 23.

2 Halbierte Zwitter von *Argynnis Paphia*; eine rechts ♂, die andere links ♂; die äusseren Geschlechtsorgane sind nicht ganz regelmässig seitlich getheilt zwitterhaft. A. Speyer, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 200—202.

Zwitter von *Saturnia Carpini*; P. B. Mason, Proc. Entom. Soc. London, 1888, S. XV; ein anderes Exemplar, zu Tenby erzogen, hatte 5 Flügel.

Krause berichtet über einen *Prionus coriarius* mit 3 Hinterbeinen der rechten Seite, die einer gemeinsamen Hüfte angefügt waren; die letztere trug 2 Oberschenkel, von denen der eine sich in eine einfache Tibia mit 3 Tarsengliedern (das Klauenglied fehlte) fortsetzte; der andere trug 2 Schienen; eine mit einem vollkommen entwickelten Fuss, die andere mit nur einem Tarsenglied; Sitzgsber. Gesellsch. naturf. Freunde Berlin, 1888, S. 145—148 mit Holzschn.

Gadeau de Kerville beschreibt monströse *Phyllopertha horticola*; *Cicindela sylvatica*; *Stenopterus rufus*; *Telephorus nigricans*;

Ranatra linearis; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LXXXII bis LXXXIV.

Callidium violaceum mit 3 Fühlern; V. v. Röder, Entom. Nachr., 1888, S. 219. *Bombyx Rubi* mit 2 Unterflügeln linkerseits; A. Speyer, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 206 f. *B. Quercus* mit 2 Oberflügeln linkerseits; *Lycaena Jcarus* ebenfalls mit 2 Oberflügeln. E. G. Honrath, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 498, Taf. VII, Fig. 10 und 9.

Kraatz berichtet von einem Weibchen von *Dictyoptera sanguinea*, mit dem 5 Männchen gleichzeitig in copula waren; Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 222.

Cazurro beobachtete eine Kopulation zwischen *Stauronotus Maroccanus Thunb.* ♂ und *Acryptera Tornosi Bol.* ♀; die Männchen letzterer Art waren selten, die Weibchen dagegen häufig; Act. Soc. Españ. Hist. Natural XVII S. 4.

Löffler fing *Lasiocampa Pini* ♂ in copula mit *Psilura monacha* ♀; Sitzbr. Berl. Entom. Ver., 1888, S. 24.

C. Massa lernte Parto verginale nella *Sphinx Atropos* kennen; Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 64 f.

v. Bock beobachtete Parthenogenesis bei *Ocneria dispar*; Entom. Nachr., 1888, S. 56 f.; vgl. oben S. 23f.

Nachdem im vorigen Jahre Deichmüller die im Dresdener Museum befindlichen Insekten des lithographischen Schiefers behandelt hat, erhalten wir nun eine Bearbeitung der im Münchener Museum aufbewahrten Reste von P. Oppenheim: Die Insectenwelt des lithographischen Schiefers in Bayern; *Palaeontographica*, 34. Bd., S. 215–247, Taf. XXX, XXXI. Die von Deichmüller für einen Acridier erklärte *Chresmoda obscura Germ.*, die eines der häufigsten Fossilien des lithographischen Schiefers ist, hält Oppenheim für einen Hydrometriden, obwohl er zugibt, dass die Fühlerbildung „durchaus den Orthopteren- (richtiger Acridier-) charakter“ repräsentiert. Hinsichtlich der *Rhipidorrhabdi* schliesst sich Oppenheim nunmehr den Ansichten Deichmüller's in so fern an, als er sie jetzt für Verwandte von *Sirex* hält, aber nach dem Flügelgeäder sie den *Siriciden* nicht unterordnen, sondern in ihnen eine den *Siriciden* gleichwerthige Abtheilung, für die der Name *Rhipidorrhabdi* beizubehalten ist, erkennen will. — Die Reste der Münchener Sammlung gehören an Blattiden (2), Locustiden (3), Ephemeriden (4), Hemerobiaden (2), Sialiden (1), Fulgoriden (1), Cicadiden (1), Geocoriden (1), Hydrometriden (2), Belostomiden (1), Naucoriden (3), Corisiden (2), Carabiden (3), Dyticiden (2), Scarabaeiden (2), Silphiden (2), Buprestiden (3), Elateriden (2), Curculioniden (2), Chrysomeliden (4), *Rhipidorrhabden* (1); letztere sind auch die einzigen mit Sicherheit erkennbaren Hymenopteren des lithographischen Schiefers.

Zur Kenntniss von Insektenbohrgängen in fossilen Hölzern bringt Kolbe in der Zeitschr. deutsch. geol. Gesellsch. XL,

S. 131—137 Taf. XI einen Beitrag. Ein Stück von einem (Pinus?-) Stamme aus der Braunkohle von Zschipkau in der Nieder-Lausitz liess dreierlei Arten von Bohrgängen erkennen, die einem Anthribiden, *Anthribites Rechenbergi*, einem Cerambyciden, *Astynomus tertarius*, und einem Tomiciden oder Anobiaden zugeschrieben werden. In einem verkieselten Holz aus dem Fischeisenerz des Libanon (Senon) waren Frassgänge, die sich mit denen des Magdalinus vergleichen lassen; sie werden auf Curculionites (!) senonicus zurückgeführt. Zum Schluss stellt der Verfasser die aus den Frassstücken bekannten holzbohrenden Insekten zusammen und gibt ihre Vertheilung auf die verschiedenen geologischen Perioden an.

Der Oeninger Stinkschiefer und seine Insektenreste von E. Schöberlin; Societ. Entomol., III, S. 42, 51, 61, 68f.

Arachnoidea.

Das 20. Mém. von E. Simon's Études arachnologiques enthält (XXVIII) Arachnides recueillis dans le sud de l'Afrique . . . ; Ann. Soc. Entom. France 1887 S. 369—384 Pl. 6. — Die Arten wurden auf der Reise des Dr. Schinz im südlichen Afrika (Angra Pequena, Namaqua, Herero, Damara, Kahari bis Ngami) gesammelt und gehören zu den echten Spinnen (10), Solifugen (2) und Skorpionen (7).

Das 21. Mémoire XXIX: Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de l'Amérique centrale et des Antilles, S. 203—216; XXX: Description de quelques Arachnides du Chili et remarques synonymiques sur quelques-unes des espèces décrites par Nicolet S. 217—222; XXXI: Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de Madagascar et de Mayotte S. 223—236; XXXII: Descriptions d'espèces et de genres nouveaux de Nouvelle Calédonie S. 237—247; XXXIII: Descriptions de quelques espèces recueillies au Japon . . . ; S. 248—252; Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Thorell behandelt die Pedipalpie Scorpionum dell'Arcipelago Malese conservati nel Museo Civico di Storia Naturale di Genova. Ann. Mus. Civ. Genov. VI S. 327—428. Aus einer Uebersicht der Literatur ergibt sich, dass bis jetzt 37 Arten der genannten Ordnungen vom Malayischen Archipel beschrieben waren, und zwar 11 Pedipalpi, 26 Skorpione; dazu beschreibt Thorell 8 Pedipalpi und 5 Skorpione. Von diesen 50 Arten kommen 14 Pedipalpi und 25 Skorpione in Indo-Malesia, 6 Pedipalpi und 9 Skorpione in Austro-Malesia vor; nur 4 Arten, nämlich Thelyphonus (?) Philippensis, Isometrus maculatus, armillatus und Hormurus Australasiae sind in beiden Gebieten gefunden.

G. Canestrini: Intorno alcuni Acari ed Opilioni dell'America; Atti della Società veneto-trentina di Sci. natur. etc., Vol. XI. Padova, 1888. (Ist mir nur durch das Referat im Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 225f., bekannt gew.)

In den Act. Soc. Esp. Hist. Natur., XVII, S. 37—41 sind nach der Bestimmung E. Simon's die Arachniden des naturhistorischen Kabinetts der Universität Sevilla namhaft gemacht; dieselben sind bei Sevilla gesammelt.

Loman theilt Altes und Neues über das Nephridium (die Coxaldrüse) der Arachniden mit. Bijdr. tot de Dierkunde, 14. Aflv., S. 91—97, Taf. I, Fig. 1—4. — Bei den Opilionen finden sich die Coxaldrüsen ebenfalls vor; sie wurden hier von Plateau für Harngefäße gehalten, die sich in den Darm öffnen sollten. Nach Loman stellen sie jederseits ein vielfach verschlungenes Rohr dar, das kurz vor seiner Mündung nach aussen (zwischen der Hüfte des 3. und 4. Beinpaares) mit einer umfangreichen, sich nach hinten erstreckenden Tasche in Verbindung tritt. Diese Tasche dient als Sammelblase für das von der Drüse abgeschiedene Sekret. Der Bau der Drüsenzellen ist derselbe, wie er von anderen Arachniden bekannt ist, und obwohl sich die exkretorische Natur des Organs auf chemischem Wege nicht beweisen liess, so ist an derselben doch nicht zu zweifeln. Und bei den Opilionen bleibt dieses Organ auch im späteren Leben in Thätigkeit, ohne, wie bei den meisten anderen Arachniden, durch andere Exkretionsorgane vertreten zu werden. — Ob die Coxaldrüse auch das Homologon der Schalendrüse der Entomostraca ist, bleibt noch zweifelhaft; vielleicht ist die Giftdrüse von Galeodes ein solches Homologon.

G. Saint-Rémy dehnte seine Untersuchungen über das Gehirn bei Myriapoden und Arachniden auch auf Opilionen (*Phal. opilio* und *parietinum*) aus; Compt. Rend. hebdom. Acad. Sci., Paris, CVI, S. 1429—1431; auf *Dipneumones*; ebenda, CVII, S. 926—929 (*Lycosa Narbonensis*; *Pardosa saccata*; *Thomisus*; *Epeira diademata*; *Tegenaria*; *Drassus*; *Segestria*; *Pholcus*; *Eresus*).

Ph. Bertkau berichtet über *Mermis* in *Tarentula inquilina* und die durch den Parasiten bedingte Sterilität des Wirthes. Bertkau hatte mehrere Male aus überwinterten geschlechtsreifen *Tarent. inquilina* einen Eingeweidewurm erhalten, der für *M. albicans* erklärt wird. Während sonst die Männchen von *Tar. inq.* nach Ausübung der Kopulation (im September und Oktober) verschwinden, wurden im Mai auch 2 Männchen gefangen, die den Wurm beherbergten; die Taster derselben erwiesen sich gefüllt mit Sperma. Der Schmarotzer hatte also zunächst die Begattung verhindert, und hieraus ist zu schliessen, dass dieselbe nicht ausschliesslich durch den Zustand der Palpen veranlasst wird; die unterlassene Begattung hatte aber dem Männchen um mehr als ein halbes Jahr das Leben verlängert. Korrespbl. naturh. Ver. d. preuss. Rheinlande, Westf. u. d. Reg. Bez. Osnabrück, 1888, S. 91 f.

Marx zeigte in der Sitzung vom 3 Mai 1888 der Entomol. Soc. Washington die Abbildung eines Skorpions, der nur ein Glied am Metatarsus hatte, und einer *Lycosa*, der die mittlere Augenreihe fehlte; Proceed., I, S. 148.

Linguatulina.

Pentastoma moniliforme, a rare parasite, (aus Python) with remarks on the Pentastomidae; W. S. Gottheil, Journal of comparat. medic. and surgery, X, S. 42—46 mit 4 Holzschn.

J. Csokor: Ueber Pentastomen und *P. denticulatum* aus der Leber des Pferdes; Zeitschr. f. Veterinärkunde, I, 1887, mit 1 Taf.; Ausz. von Th. Kitt, im Centralbl. f. Bakteriologie und Parasitenkunde, 1. Jahrg., 1. Bd., S. 151—154.

Acarina.

G. Canestrini's „Prospetto dell' Acarofauna Italiana“ ist mit der Familie Tyroglyphini fortgesetzt; Atti d. R. Istituto Veneto di Sci., Lettere ed Arti (S. VI.) T. VI, S. 1187—1262, Tav. 19—32. Nach der Zahl der Genitalsaugnäpfe ordnet der Verfasser die Gattungen in die Abtheilungen der Bidisci (*Histiogaster*, *Chortoglyphus*, *Aleurobius*, *Tyroglyphus*, *Rhizoglyphus*), Tetradisci (*Histiostoma*), Adisci (*Homopus*, *Glycyphagus*, *Phycobius*, *Hericia*, *Trichotarsus*); nach dem Besitz oder Mangel einer Thorako-abdominal-furche kann man *Merophori* (*Homopus*, *Histiogaster*, *Histiostoma*, *Aleurobius*, *Tyroglyphus*, *Rhizoglyphus*) und *Ameri* (*Glycyphagus*, *Phycobius*, *Hericia*, *Trichotarsus*, *Chortoglyphus*) unterscheiden.

G. Gilson: The spermatogenesis of the Acarians and the law of spermatogenesis in general; Rep. 57. meet. Brit. ass. adv. sci., S. 758f.

Derselbe: Étude comparée de la spermatogénèse chez les Arthropodes; 3. part., Acariens; aperçu synthétique; conclusions; La Cellule, IV; X und 93 Sf., 1 Taf.

Augenlose Milben (*Phytoptus*) können nach Versuchen, die Westhoff mit ihnen anstellte, zwischen Licht und Dunkelheit unterscheiden und bevorzugen letztere; Jahresber. zool. Sek. d. westf. Prov.-Ver. 1887—88 S. 34f.

Acari Austro-Americani, quos . . . illustravit A. Berlese; Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 171—222, Tav. V—XIII. (50 neue Arten und mehrere neue Gattungen).

Von A. D. Michael's „British Oribatida“ ist Vol. II erschienen; Ray's Soc. for 1887, London, 1888, S. I—XI, 337—657, pls. XXV—LIV; vgl. den Bericht für 1884, S. 37.

G. Rovelli und B. Grassi handeln di un singolare Acaride „*Podapolipus reconditus*, nobis;“ Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 59—63, Tav. XV. Diese Milbe fand sich in ziemlich grosser Anzahl unter den Flügeldecken der *Acis spinosa* und erweist sich als zu den Tarsonemiden gehörig. In der Jugend ist ihr Körper in 4 Segmente getheilt; die Mandibeln sind stiletförmig, die Palpen sehr kurz, zwei-

gliederig; das 3. und 4. Beinpaar endet mit einer gestielten Haftscheibe; das erste ist auf eine kurze Papille reduziert, das zweite endet mit einer verkümmerten Krallen; das Weibchen hat am Körperende zwei neben einander entspringende lange, nach hinten gerichtete Borsten. Die Tracheen münden auf der Bauchseite neben dem Rostrum. Bei dem geschlechtsreifen Weibchen ist der Körper stark aufgebläht, eiförmig, ohne Spur einer Gliederung; die beiden Borsten am Hinterleibsende und sämtliche Beinpaare bis auf das erste (?) sind verloren gegangen; dieses ist jetzt fünfgliedrig; nach aussen von demselben findet sich je ein lappenförmiger Anhang, der vielleicht als Haftorgan dient. Der Leib ist mit Eiern, Embryonen und Jungen angefüllt.

H. E. Quilter: Note on a parasitic mite of *Testacella scutulum*; Journ. of Conchology, V, S. 314.

S. A. Poppe schreibt über parasitische Milben; Abhandl. naturw. Verein Bremen X S. 205—240 Taf. II. Der Verfasser stellt ein systematisches Verzeichniss derjenigen Vögel auf, auf denen Analgesinen gefunden sind und erwähnt dann seine Funde von Listrophoren auf Nagethieren. *Myocoptes musculus* fand er bei Vegesack fast auf jedem Exemplar der Hausmaus; *Listrophorus Leuckarti* auf *Arvicola amphibius*, *L. Pagenstecheri* auf einem aus Oldenburg stammenden Eichhörnchen; den *L. gibbus* dagegen suchte er vergebens. Auf dem Hamster fand er *Criniscansor* n. g.; s. unten. Von Cheyletiden fand er *Myobia musculi* auch auf *Mus silvaticus*; *M. chiropteralis* Mich. auf *Plecotus auritus*; *Syringophilus bipectinatus* ausser auf *Gallus domesticus* und *Anas boschas* auf *Larus argentatus*; *Picus viridis*; *Hirundo riparia*; *Garrulus glandarius*; *Parus caudatus*; *Troglodytes parvulus*; *Turdus pilaris*; *Fringilla coelebs*; *Passer domesticus*, *montanus*. Die Gattung *Picobia* Hall. ist synonym mit *Syringophilus* und wenn auch älter als letztere, so doch aus praktischen Gründen, da sie nicht nur auf *Picus* lebt, nicht beizubehalten. — *Syringophilus uncinatus* Heller ist besser in die Gattung *Cheyletus* zu stellen, da er gut entwickelte Palpen hat; eine nahe verwandte neue Art fand Poppe in den Spulen der Flügel Federn von *Sterna hirundo*.

E. L. Trouessart veröffentlicht in den Compt. Rend. CVII, S. 753—758 eine Note sur les Acariens marins recueillis par M. Giard au laboratoire maritime de Wimereux. Die 9 erbeuteten Arten vertheilen sich auf die Familien der Gamasidae, Bdellidae, Trombidiidae und Halacaridae. Die erste Familie ist vertreten durch einen Kommensalen von *Balanus balanoides*, den *Gamasus Giardi*. Von Bdelliden fand sich *Eupalus sanguineus*, in Gesellschaft mit dem vorigen. Auch der Trombidiade, *Rhyncholophus rubipes* lebt auf dem *Balanus*. Von Halacariden wurde *Halacarus ctenopus* Gosse, *inermis*; *Leptognathus falcatus* Brady; *Rhombognathus longirostris*; *Copidognathus glyptoderma*; *Leptopsalis longipes* erbeutet.

Phytoptidae. Da sich nach den winterlichen Ueberschwemmungen Gallmilben an verschiedenen Weidenarten immer nur an den von der Ueberschwemmung verschont gebliebenen Zweigspitzen zeigen, so ist daraus zu folgern, dass die Ueberwinterung der Gallmilben an den Zweigen erfolgt; Westhoff, Jahresb. zool. Sekt. d. westf. Prov.-Ver. f. 1887—88, S. 32.

T. de Stefani macht eine Nota sopra una galla di *Phytoptus sule* *Vitex agnus castus* bekannt; Il Natural. Siciliano, VIII, S. 66—69.

Sarcoptidae. E. L. Trouessart et G. Neumann: Types nouveaux de *Sarcoptides* epidermiques et psoriques; Bull. Soc. Étud. Scient. Angers, 1887, S. 121—150, 3 Taff. (Habe ich nicht einsehen können; enthält nach Zool. Anz. 2 n. A. und die n. G. *Heteropsorus*).

Giov. Canestrini: J. Tyroglyphidi (Tyroglyphidae). Studio critico. Con 2 tavv. Padova, 1888, Fol. (32 Ss., spieg. d. tav.). Estr. dal Vol. III, degli Studi offerti dalla Univers. padovana alla bolognese nell' VIII. centenario. — Habe ich nicht gesehen; enthält nach Zool. Anz. die n. G. *Aleurobius*, *Hericia*, *Phycobius*, *Trichotarsus*; vgl. unten.

Criniscansor (n. g. Listrophorin.) *Criceti* (Wunstorf und Hildesheim, auf *Cricetus frumentarius*); Poppe a. a. O. S. 234, Taf. II, Fig. 1—3.

Aleurobius n. g. Tyroglyphin.; im Männchen 2 Saugnäpfe neben dem After, und Genitalsaugnäpfe in beiden Geschlechtern; die Beine des ersten Paares beim Männchen verdickt und mit Stacheln bewehrt, die des 4. tragen auf den Tarsen Haftscheibchen (dischetti a ventosa); Tarsen mit einer Haftscheibe und einer wohl entwickelten Krallen endend; Vulva und Penis zwischen den Epimeren des 4. Paares; Furche zwischen Thorax und Hinterleib vorhanden; die wandernden Nymphen sind hypopial; für (Tyr.) *farinae* de Geer, S. 1193;

Hericia n. g. Tyroglyphin.; Saugnäpfe in beiden Geschlechtern fehlend, sowohl neben dem After wie neben der Geschlechtsöffnung; Tarsen mit einer rudimentären Haftscheibe und einer wohl ausgebildeten Krallen; die Epimeren des 2. Paares sind beim Weibchen von einander entfernt und stossen beim Männchen mit ihrem vorderen Ende an die des ersten Paares; Vulva zwischen den Epimeren des 2., Penis zwischen denen des 4. Paares; Geschlechtsdimorphismus in der Entwicklung der Beine; Beine mit Stacheln bewehrt; Haut von Dornen und kurzen kegelförmigen Höckern rau; Furche zwischen Thorax und Hinterleib fehlt; wandernde Nymphen nicht bekannt; für (Glyciph.) *hericus* Rob., S. 1191;

Phycobius n. g. Tyroglyphin.; Aftersaugnäpfe in beiden Geschlechtern fehlend; Genitalsaugnäpfe vorhanden; Tarsen mit wohl entwickelter Haftscheibe und Krallen endend; Epimeren des 2. Paares mit denen des 1. verbunden; Beine in beiden Geschlechtern lang und dünn, ohne Geschlechtsunterschied; Vulva, Penis, Thorako-Abdominalfurche und Nymphen wie bei *Hericia*; für (Glyciph.) *anonymus* Hall., S. 1191;

Trichotarsus n. g. Tyroglyphin.; Aftersaugnäpfe in beiden Geschlechtern fehlend; Geschlechtssaugnäpfe nur beim Weibchen vorhanden; Tarsen mit einer Haftscheibe und schwachen Krallen endend; die Epimeren des 2. Paares in beiden Geschlechtern von einander getrennt; Vulva innerhalb der Epimeren des 1. Paares, kein Geschlechtsdimorphismus in der Entwicklung der Beine; Furche zwischen Thorax und Hinterleib fehlend; die wandernden Nymphen sind trichodaktyloid,

für (Trichod.) *Xylocopae* Donn. und *Osmiae* Duf., S. 1192; G. Canestrini, Prospetto dell' Acarofauna Italiana.

Glycyphagus Canestrinii (Padua); (G. Armanelli, Acari del fieno della provincia di Padova, Cefalù, 1887, S. 7 und) G. Canestrini, Prospetto etc., S. 1225, Tav. 26, Fig. 1, *intermedius* (ibid.); derselbe, ebenda S. 1222, Tav. 23 Fig. 2 (und I Tiroglifidi, Stud. crit. S. 20).

Tyroglyphus agilis (Padua, in modernen Vegetabilien); G. Canestrini, (I Tiroglifidi, Stud. crit., S. 30, Tav. I, Fig. 11—13, und) Prospetto etc., S. 1244, Tav. 30, Fig. 2.

Trombidiadae. *Caeculisoma* (n. g. Rhyncholophin.) *tuberculatum* (Buenos Aires; Asuncion); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 186, Tab. VI, Fig. 1.

Pseudochelys (n. g. Cheyletin. ?; soll nach der angegebenen Etymologie *Pseudochilus* heissen) *biscalatus* (Rio-Apa, Matto-grosso); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 189, Tab. VII, Fig. 3.

Cheyletus Noereri (in den Spulen der Flügel Federn von *Sterna hirundo*); Poppe a. a. O. S. 239, Taf. II, Fig. 4, 5.

Geckobia oblonga (auf *Scolecopus spinosus*; bemerkenswerth durch die ober der Basis des Rostrums entspringenden, am Grunde vereinigten, am Ende in je eine gezähnte Zange auslaufenden Anhangsorgane); Dugès, Bull. Soc. Zool. France, 1888, S. 14—19 mit Abbild. (nach Americ. Naturalist, 1888, S. 360 f.)

Rhyncholophus filipes (Matto-grosso, Bras.) S. 181, Tab. VII, Fig. 2, *impectus* (Bras.; Paraguay; Argentin.) S. 182, Fig. 1, *gloriosus* (Paraguay) Tab. V, Fig. 1, *pedestris* (Buenos Aires) Tab. VIII, Fig. 1, S. 183, *calvescens* (Bras.; Parag.; Argent.) S. 184, Tab. VI, Fig. 3; A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, *rubripes*! (Kanal; nicht beschrieben); E. L. Trouessart, Compt. Rend., CVII, S. 754; vgl. oben S. 32.

Scirus (*taurus* Kram. var. *bison* Tab. VII, Fig. 4), *curtipalpis* (Buenos Aires) Fig. 5; A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 188.

Smaridia depilata (Matto-grosso); A. Berlese, Bull. Soc. Ent. Ital., 1888, S. 185, Tab. VI, Fig. 4.

Trombella nothroides (Matto-grosso) Bras.); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 180, Tab. VI, Fig. 2, VII. Fig. 6, 7.

Trombidium (*gymnopterum* L. var. *brevitarsum*), *perligerum* (Paraguay), S. 177, Tab. V, Fig. 3), *modestum* (Brasilien) S. 178, Fig. 2, *coarctatum* (Buenos Aires; Rio Apa) Fig. 5, *ophthalmicum* (Rio Apa) Fig. 4, S. 179; A. Berlese, Bull. Soc. Ent. Ital., 1888, *americanum*; G. Canestrini, Atti Soc. veneto-trent. di Sci. natur., XI.

Oribatidae. Von A. D. Michael's „British Oribatidae“ ist Vol. II erschienen; London, 1888, Ray Society. — Der Band ist mir noch nicht zugekommen; eine Besprechung desselben s. Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 115.

Podapolipus (n. g. Tarsonemin.) *reconditus* (Italien, unter den Flügeldecken von *Acis spinosa*); G. Rovelli & B. Grassi, Bull. Soc. Entom., Ital., 1888, S. 59—63, Tav. XV; vgl. oben S. 31.

Belba concolor K. var. *vacua* (Matto-grosso); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 218.

Damaeus ornatissimus (Matto-grosso); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 217, Tab. XIII, Fig. 1.

Eremaeus carinulatus (Matto-grosso); A. Berlese, Bull. Soc. Entom., Ital., 1888, S. 217, Tab. XIII, Fig. 2.

Hoplophora variolosa (Matto-grosso); A. Berlese, Bull. Soc. Entom., Ital., 1888, S. 218, Tab. XIII, Fig. 6.

Neoliodes theleproctus Herm. var. *porcellus* (Rio-Apa); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 217.

Nothrus flagellatus (Rio-Apa); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 216, Tab. XIII, Fig. 4.

Oribates peloptoides! (Matto-grosso, Rio-Apa); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 215, Tab. XIII, Fig. 3.

Bdellidae. *Eupalus sanguineus* (Kanal, auf *Balanus balanoïdes*); E. L. Trouessart, Compt. Rend., CVII, S. 753; vgl. oben S. 32.

Gamasidae. W. Winkler: Anatomie der Gamasiden; Arb. Zool. Instit. d. Univers. Wien, VII, S. 317—354, 5 Taff. — Habe ich noch nicht erhalten.

Diplogynium (n. g.; nach A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 199 synonym mit *Celaenopsis* Berl.) *acuminatum* (Amerika); G. Canestrini, Atti Soc. veneto-trentina di Sci. natur., Padova, XI, S. 101.

Euzercon (n. g. inter *Celaenopsis* et *Megistanum*) *Balzani* (Rio-Apa); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 203, Tab. IX, Fig. 2.

Heterosercon (n. g. Antennophorin.) *degeneratus* (Matto-grosso); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 207, Tab. XI, Fig. 1.

Podolaelaps (n. g.) *ambulacralis* (Matto-grosso); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 208, Tab. IX, Fig. 3.

Uropodella (n. g. Uropodin.) *laciniata* (Matto-grosso; Rio-Apa); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 214, Tab. XII, Fig. 6; XIII, Fig. 10.

Antennophorus caputcarabi! (Matto-grosso) S. 205, Tab. XI, Fig. 2, *viduus* (Rio-Apa) S. 206, Fig. 3; A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888.

Celaeno truncata (Matto-grosso); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 212, Tab. XI, Fig. 4.

Celaenopsis ovata (Asuncion) S. 199, Tab. X, Fig. 1, *subincisa* (Buenos-Aires) S. 200, Fig. 2, *lunulata* (Südamerika) Fig. 3, S. 201, *ambigua* (Rio-Apa) S. 202, Taf. XI, Fig. 5; A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888.

Discopoma modesta (Rio-Apa); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 212, Tab. XII, Fig. 5.

Gamasus aberrans (Matto-grosso); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 194, Tab. VIII, Fig. 5, *fortis* (Amerika); G. Canestrini, Atti Soc. veneto-trent. di Sci. natur. etc., XI, *Giardi* (Kanal; Kommensale von *Balanus balanoïdes*; nicht beschrieben); E. L. Trouessart, Compt. Rend., CVII, S. 753; vgl. oben S. 32.

Holostaspis (*marginatus* Herm. var. *americanus*), *cordiger* (Paraguay) S. 195, Tab. VIII, Fig. 4; A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888.

Hypoaspis coleoptratus (Buenos-Aires); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 198, Tab. IX, Fig. 5, *Coffeae* (Amerika); G. Canestrini, Atti Soc. veneto-trentin. di Sci. natur. etc., XI (nach dem Referat im Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 225, ein junger *Laelaps*).

C*

Laelaps glabratus (Rio-Apa); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 198, Tab. IX, Fig. 4.

L[el]iognathus bursa (Buenos-Aires; auf Hühnern); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 208, Tab. IX, Fig. 6.

Megistanus armiger (Rio-Apa); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 204, Tab. IX, Fig. 1.

Pachylaelaps h[a]eros (Matto-grosso) S. 196, Tab. VIII, Fig. 2, *athleticus* (Asuncion) S. 197, Fig. 3; A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888.

Uropoda festiva (Rio-Apa) Tab. XII, Fig. 7, *longiseta* (ibid.) Fig. 4, S. 209, *hypopoides*! (ibid.) Fig. 9, *pusilla* (ibid.) Fig. 3, S. 210, *elimata* (Matto-grosso), *vulpina* (Rio-Apa), Fig. 1, S. 211, *cribraria* (Asuncion) Fig. 8, S. 212; A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, *clavipilis*, *bipilis* (Amerika); G. Canestrini, Atti Soc. veneto-trentin. di Sci. natur., XI.

Ixodidae. *Amblyomma complanatum* (Rio-Apa) S. 191, Tab. XIII, Fig. 7, *auronitens* (Rio-Apa) Fig. 9, *sculptum* (Matto-grosso) Fig. 8, S. 192; A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888.

Haemaphysalis micropla (Amerika); G. Canestrini, Atti Soc. veneto-trentina di Sci. natur., XI.

Ixodes (*Gonixodes* subg. nov.) *rostralis*; A. Dugès, Bull. Soc. Zool. France, XIII, S. 129—132, mit Abbild.

Hydrachnidae. H. Lohmann behandelt die Unterfamilie der Halacaridae *Murr.* und die Meeresmilben der Ostsee; Inaugural-Dissertat. Kiel, S. 1—140, Taf. I—III. Nach einer historischen Einleitung, welche die schwankenden und z. Th. der Begründung entbehrenden Ansichten der Autoren aufdeckt, geht der Verfasser dazu über, die morphologischen und anatomischen Verhältnisse zu schildern. Am Integument ist der Besitz von Panzerplatten hervorzuheben, deren auf dem Rücken konstant 4 vorkommen: in der Mittellinie liegen der vordere und hintere Dorsalschild, an den Seiten, zwischen 2. und 3. Beinpaare je eine Okularplatte, welche die Doppelaugen trägt. Die Bauchseite enthält zunächst die Hüftplatten, welche meist auf die Rückenseite übergreifen; ferner, hinter den Hüftplatten des 4. Paares gelegen, die Genital- und die Analplatte; bei stark gepanzerten Formen verschmelzen beide zur Genito-Analplatte. Grössere Hautporen sind sehr spärlich vorhanden; eine Spalte an der Bauchseite hinter der Hüfte des ersten Beinpaares wird von Lohmann als rudimentäre Bildung aufgefasst und der „Urtrachee“ Henking's, „stigmat“ Megnin's homologisiert; nach der Beschreibung und Abbildung wäre auch ein Vergleich mit den spaltförmigen Hautsinnesorganen der Arachniden gerechtfertigt. — Die Beine sind an den Seiten des Körpers, zwischen Rücken und Bauchfläche eingelenkt, und zwar so, dass 2 Paar nach vorn, 2 nach hinten gerichtet sind; sie eignen sich nicht zu Schwimmbewegungen, desto besser aber zum Klettern. Sie sind sechsgliedrig und tragen am Ende 2 gewöhnlich sichelförmig gekrümmte Krallen, welche den Seiten eines fünfseitigen Mittelstücks eingelenkt sind. Die Beborstung der Beine ist eine verschiedenartige, aber eigentliche Schwimmborsten fehlen.

An dem Capitulum ist ein kugeliges Basalthell deutlich von den Tastern und dem Schnabel zu unterscheiden. Auf der hinteren Hälfte der dorsalen Decke des Capitulum verlaufen die Ausführungsgänge der Speicheldrüsen. Die Mandibeln sind 2-, die Taster 4-gliedrig.

Eine ausführliche Darstellung des inneren Baues ist einem 2. Theil der Arbeit vorbehalten; aus den hier gemachten Angaben hebe ich nur den völligen Mangel der Tracheen hervor.

Nach allen Merkmalen gehören die Halacariden zu den Prostigmata Kramer's und zwar in die Nähe der Hydrachniden, aber als selbständige Unterfamilie. Durch die Panzerung, die laterale Einlenkung der Beine, die Tracheenlosigkeit und ein vorderes, medianes unpaares Auge (neben den seitlichen Augenpaaren) unterscheiden sie sich leicht von den übrigen. Die 26 Arten sind auf 4 Gattungen zu vertheilen, von denen *Aletes* ausser den neuen auch die fälschlich zu *Pachygnathus Dug.* gestellten Arten umfasst. Diese 4 Gattungen sind in folgender Weise auseinanderzuhalten.

A. Maxillartaster seitlich am Capitulum eingelenkt; die Speichelkanäle weit von einander getrennt auf dem breiten Epistom.

I. Maxillartaster kurz, dem Capitulum eng anliegend, zwischen dem 6. Beinglied und dem Krallenmittelstück ein stabförmiges Glied eingeschoben . . . *Aletes* n. g. (*Aletes*-Gruppe).

II. Maxillartaster lang, frei beweglich am Capitulum eingelenkt; das Krallenmittelstück ist unmittelbar dem 6. Glied angefügt (*Halacarus*-Gruppe).

1. 3. Tasterglied mehrmals kürzer als das Endglied, welches an der dicken Basis sich stark und plötzlich verschmälert und auf ihr drei divergirende lange Borsten trägt . . . *Halacarus Hodge*.

2. 3. Tasterglied nur wenig kürzer als das Endglied, welches aus breiter Basis sich ganz allmählich spindelförmig zuspitzt und wenige kurze Borsten trägt . . . *Agave* n. g.

B. Maxillartaster dorsal neben der Medianlinie eingelenkt, mit dem pfriemenförmigen, langen Schnabel eine Scheere bildend, deren beweglicher Arm in vertikaler Richtung bewegt wird; bereits die 2. Glieder der ganzen Länge nach einander berührend. Epistom durch die Maxillarlade verdrängt; Speichelkanäle fehlen . . . *Leptognathus Hodge* (*Leptognathus*-Gruppe).

Zu den bekannten 16 Arten fand nun Lohmann in der Ostsee 10 neue auf, die auf den folgenden Seiten der Abhandlung sehr genau beschrieben sind; es sind dies *Aletes pascens* S. 54 Taf. II. Fig. 64, 69, *setosus* S. 58 Fig. 79, 80; *Halacarus Murrayi* S. 70 Fig. 83, 86, *Floridearum* S. 72 Taf. III Fig. 111, 115 *balticus* S. 73 Fig. 108, 120, *striatus* S. 74 Fig. 117, *spinifer* S. 75 Fig. 101, 102, *Fabricii* S. 79 Taf. II Fig. 81, 82, *loricatus* S. 81; *Leptognathus marinus* S. 88 Taf. III Fig. 121, 122; die Gattung *Agave* ist auf *Hal. parvus Chilton* gegründet.

Die Arten der Ostsee leben vorzugsweise in der Region der Florideen, zwischen denen sie oft in grosser Menge umherkriechen;

auch benutzen sie Idotheen als Transportmittel. Gegen Kälte sind sie sehr wenig empfindlich; Eintrocknen oder kurzer Aufenthalt im süßen Wasser tödtet sie dagegen.

Copidognathus (n. g.) *glyptoderma*; nur angedeutet von E. L. Trouessart a. a. O. S. 754f.;

Leptopsalis (n. g.) *longipes*; ebenso, S. 755;

Rhombognathus (n. g.) *longirostris*; ebenso S. 754; vergl. oben S. 32.

R. Moniez beschreibt in einer Note sur une Hydrachnide marine *Nautarachna asperrium*! n. g., n. sp.; Revue biologique du Nord de la France, I, S. 64—68 mit 3 Holzschn. Die Gattung wird mit Pontarachna verglichen, von der sie sich durch den regelmässig kurz elliptischen Körpermriss, sowie ferner dadurch unterscheidet, dass die Hüftplatten nur das vordere Drittel der Körperunterseite einnehmen und dass die ungefähr in der Bauchmitte gelegene Geschlechtsöffnung von 2 Platten umgeben ist, die mit den bekannten Haftnäpfen besetzt sind. Von der Art wurde nur ein weibliches, noch nicht ganz entwickeltes Exemplar gefangen, in dessen Beschreibung der Verfasser vielfach eine eigene Nomenklatur anwendet. So spricht er von fünfgliedrigen, mit einer Scheere endenden Lippentastern und von einem Mandibeltaster. An der Basis der Mandibeln befinden sich 2 Stigmenplatten; ob Tracheen vorhanden sind, konnte nicht entschieden werden. Auf jeder Seite ist ein Auge vorhanden. Das Exemplar wurde bei Cayeux-sur-Mer (Somme) mit dem feinen Netz gefangen.

In seinen Beiträgen zur Kenntniss der Fauna des Süßen und Salzigen Sees bei Halle a. S. in Zeitschr. f. wissensch. Zool., 46, führt Zacharias auf S. 227—229 8 Hydrachniden auf.

Derselbe zählt die von ihm in einigen Seen in der Umgebung Frankfurt's a. O. gefundenen Arten auf; Huth's monatl. Mitth. a. d. Gesamtgebiete der Naturw., VI, S. 180.

Gadeau de Kerville zählt 12 Arten auf, die er in 2 Teichen des Eure gesammelt hat; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXXVI.

R. v. Schaub, Ueber die Anatomie von *Hydrodroma C. L. Koch*, ein Beitrag zur Kenntniss der Hydrachniden; Sitzber. kais. Akad. Wissensch. Wien, 97. Bd., 1. Abth., S. 98—151, 6 Taff. — Ist mir noch nicht zugekommen.

Eine neue Hydrachnide aus schwach salzhaltigem Wasser ist *Nesaea uncata*, die sich in einem Graben in Oberneuland und in der Mitte des sog. Süß-Sees bei Mannsfeld fand; Koenike, Abhandl. Naturw. Verein Bremen X, S. 273—293, Taf. III. Die Art ist sehr genau beschrieben und einzelne Theile sind zur Erläuterung abgebildet. Die Tracheen haben ihre Stigmen auf der Vorderseite der Oberkiefer und ihr Hauptstamm steckt in einem Chitinsacke, der mit dem der anderen Seite durch einen Gang kommuniziert; nach dem Vorgange Michael's, der dieselbe Bildung bei *Nothrus theleproctus* auffand, nennt Koenike diesen Sack Luftsack; die weitere Verzweigung der Tracheenhauptstämme, die in diesem Sacke anscheinend blind enden, konnte nicht ermittelt werden.

Landois fand 9 Stück der 9 mm. langen Larven von *Hydrachna cruenta* unter den Flügeln eines *Dytiscus marginalis*; Jahresber. zool. Sekt. westf. Prov.-Ver. 1887—88, S. 36.

Arrhenurus affinis (Karasch-See bei Deutsch-Eylan); Könike, Schriften d. Naturforsch. Gesellsch. Danzig, N. F. VII. Bd., 1. Heft, S. 1—4, Taf. I.

Eylais extendens Müll. var. *protendens* (Buenos Aires); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 219.

Hydrachna globosa de Geer. var. *miliaria* (Südamerika); A. Berlese, Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 219.

Tardigrada.

Plate bringt Beiträge zur Naturgeschichte der Tardigraden, die sich auf die Anatomie, Biologie und Systematik dieser Thierchen beziehen; Zool. Jahrb., Abth. f. Anatomie und Ontog., III, S. 487—550, Taf. XX—XXII. Aus den Ausführungen Plate's hebe ich folgende Angaben hervor: Das Nervensystem besteht aus Gehirn, Unterschlundganglion und 4 Bauchganglien. Gehirn und Unterschlundganglion haben ziemlich dieselbe Gestalt; aber ersteres besitzt einen mittleren und je 2 seitliche Anhangslappen, von denen namentlich der äussere stark entwickelt ist. Letzterer steht durch einen Faden mit dem ersten Bauchganglion in Verbindung und enthält das Augenpigment, wenn solches vorhanden ist. Die Endigung der Nerven an den Muskeln geschieht mittels einer zackigen Platte, die dem körnigen „Doyère'schen“ Hügel aufgelagert ist; die körnige Masse gehört zum Muskel, nicht zum Nerv. — Der Verdauungsapparat besteht aus Mundhöhle, Mundröhre, zwei Stosszähnen, Schlundkopf, Oesophagus, Magen- und Enddarm, und alle diese Theile liegen in gerader Linie hinter einander. Der Schlundkopf dient als Saugmagen. Der Enddarm wird durch Aufnahme zweier Malpighi'scher Gefässe und der Geschlechtsorgane zur Kloake. In der Leibeshöhle befinden sich bei den meisten Arten die grossen Blutkörper, die wahrscheinlich zur Aufspeicherung der Assimilationsprodukte dienen. Besondere Cirkulations- und Athemorgane fehlen. — Während die Bärthierchen bisher für Zwitter galten, sind dieselben nach Plate getrennten Geschlechts, die Männchen aber weit seltener als die Weibchen. Die Geschlechtsdrüse hat in beiden Geschlechtern eine übereinstimmende Lage und Gestalt. Die Spermatozoen haben einen langen und einen kurzen Faden. An derselben Stelle mit der Geschlechtsdrüse mündet die dorsal von dem Darm gelegene rundliche Anhangsdrüse in den Enddarm; auch diese ist in beiden Geschlechtern gleich. Ihre Bedeutung ist noch nicht ermittelt; ebenso wenig ist die Begattung beobachtet.

Die systematische Stellung der Bärthierchen ist nach dem Verfasser bisher nicht richtig aufgefasst worden. Was sie vor allen Klassen der Arthropoden auszeichnet, ist der Mangel (einer äusseren Segmentierung und) paariger Sinnes- und Mundwerkzeuge am Kopf. Demnach müssten sie an die Spitze der Tracheaten, noch vor die Onychophoren, gesetzt werden, indem sie den Uebergang von den Gliederwürmern zu den luftathmenden Arthropoden am reinsten zum Ausdruck bringen.

Eine Uebersicht der Gattungen und Arten weist 6 Gattungen, 26 Arten auf, mit folgenden neuen: *Echiniscoides* subg. nov. von *Echiniscus*, Beine mit 7—9 Krallen, für (*Echiniscus*) *Sigismundi*; *Echiniscus filamentosus*, *muscolicola*, *aculeatus*, *similis* S. 530; (*Lydella Dujardini* S. 833); *Macrobiotus intermedius* (Marburg) S. 535, *tuberculatus* (ibid.) S. 536; *Doyeria* (n. g.; zwei kleine Stifte in der Mundröhre; Mundhöhle zu einem langen Rohr ausgezogen; Speicheldrüsen fehlen; sonst *Macrobiotus Hufelandii* ähnlich) *simplex* (Marburg) S. 537; *Diphascion* (n. g., ähnlich *Macrob.* Oberhäuseri, aber der kleine runde Schlundkopf sitzt in der Mitte des Oesophagus) *chilenense* (Ch.) S. 538.

Opiliones.

Henking theilt Biologische Beobachtungen an Phalangiden mit; Zool. Jahrb. III, Abth. f. Systemat., S. 319—335, mit Holzschnitt. — Die Nahrung der Opilionen besteht nach Henking, der hiermit die Beobachtungen Menge's bestätigt, in todtten Thieren oder vegetabilischen Stoffen; lebende Insekten wurden von ihnen stets verschmäht oder gar gemieden. Im Freien wurden sie dabei betroffen, wie sie kleine Flüssigkeitströpfchen auf Blättern aufleckten. Einen Schutz des Fichtenwaldes gegen Chermes, den Keller sich von ihnen verspricht (s. dies. Ber. f. 1885 S. 83f.) beweift Henking ganz und gar. — Begattung und Eiablage sind auch hier beschrieben.

Eine Ueberwinterung erwachsener Thiere beobachtete Henking nicht; es überwintern nur die Eier, aus denen etwa ein halbes Jahr, nachdem sie gelegt sind, die Jungen ausschlüpfen. Mehrere der Jungen wurden bis zur vollen Geschlechtsreife in der Gefangenschaft gezüchtet. Eine Regeneration verletzter Beine beobachtete der Verfasser nicht. War ein Bein am Schenkeltheil verletzt oder abgeschnitten, so wurde der Stumpf im Hüftgelenk freiwillig abgeworfen. War das Bein in der Reihe der Metatarsalglieder verkürzt, so schien die Wunde einfach zu vernarben. — Vgl. auch das Referat von Matzdorff in Monatl. Mitth. a. d. Gesamtgeb. d. Naturw., 6. Jahrg., S. 123f.

Ueber die embryonale Entwicklung der Geschlechtsorgane bei der Afterspinne, (*Phalangium*) macht Faussek im Biolog. Centralbl., VIII, S. 359—363 mit 2 Holzschn. die vorläufige Mittheilung, dass die erste beobachtete Anlage der Geschlechtsorgane sich zu einer Zeit, wo die Segmentierung der Bauchplatte beginnt, als ein Haufen specifischer Zellen am Ende des Hinterleibes zeigt; später ist derselbe vom Mesoderm umschlossen, behält aber den früheren Charakter im übrigen bei. Der Verfasser hält es für wahrscheinlich, dass diese Keimzellen unmittelbar von den Dotterzellen abstammen.

Geraeocormobius (n. g. Gonylept. Opisthoplitae *Sörens.* affine) *sylovarum* (Missiones); Holmberg, Bolet. Acad. Nacion. Ciencias en Cordoba, T. X. S. 211—213 mit Holzschnitt.

Opilio paraguayensis; G. Canestrini, Atti Soc. veneto-trentina di Sc. natur., Padova, XI.

Pachylus gracilipes, *spinosus*; G. Canestrini, Atti Soc. veneto-trentin. di Sci. natur., Padova, XI.

Chernetina.

A. Croneberg hat auf seine vorjährige vorläufige Mittheilung (Ber. S. 34) die ausführlichere Darstellung folgen lassen: Beitrag zur Kenntniss des Baues der Pseudoscorpione, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1888 No. 3, S. 416—461, Taf. X, XI, Xla, und russisch, ebenda S. 494—544. Ich trage daraus folgende Punkte nach. Die Oberlippe und Unterlippe, die zusammen das für die Arachniden charakteristische Rostrum bilden, sieht Croneberg als die Aequivalente je zweier Gliedmassenpaare an, und zwar die Oberlippe als präorales, dem 1. Antennenpaar der Crustaceen, der Oberlippe der Insekten homologes Gliedmassenpaar; die Oberkiefer der Arachniden sind dem 2ten Fühlerpaar der Krebse (!), dem einzigen der Insekten homolog. Die Unterlippe ist den Oberkiefern (!) der Krebse und Insekten, die Unterkiefer dem 1. Maxillenpaar (!) der Krebse und Insekten, das 1. Beinpaar dem 2. Maxillenpaar der Krebse und Insekten (Unterlippe der letzteren) homolog. — Die Genitalöffnung befindet sich zwischen einer vorderen und hinteren Genitalplatte; vor der vorderen liegt noch eine kleine dreieckige Platte. Letztere sieht Croneberg als die Bauchschiene des ersten Segments, und die beiden Genitalplatten als die Bauchschiene des zweiten und dritten Segments an. Die beiden Stigmenpaare liegen auf der Grenze des 3. und 4. und 4. und 5. Segments. Ausser den Packeten einzelliger Drüsen münden auch zwei schlauchförmige Drüsen vereint in die Scheide aus; diese Drüsen und ihr Aequivalent bei den Männchen, die Widderhornähnlich gekrümmten Kanäle, entsprechen nach Croneberg einem vorderen Tracheenpaar. — Der Verfasser erkennt nur eine geringe Verwandtschaft der Pseudoscorpione mit den echten Scorpionen, dagegen eine grössere mit den Opilionen. Von diesen letzteren schliesst er aber Gibbocellum aus, das von den Pseudoscorpionen abzuleiten ist.

E. v. Daday giebt eine Uebersicht der Chernetiden des ungarischen Nationalmuseums in Budapest; Termész. Füzet., XI, S. 111—136 (ungar.) und 165—192 (deutsch) Taf. IX. — Der Verfasser fand auch auf dem inneren, unbeweglichen Glied der Mandibeln aller Chernetiden eine Serrula.

Chernetidae nonnullae sud-americanae delin. et descript; . . . ab A. Balzan; pugillus I, II, III. Asuncion Paraguay, 1887. 26 Ss., 23 Taff. (Habe ich nicht erhalten).

Garypinus (n. g.; Mandibularum digitus mobilis galea instructus; cephalothoracis margo anticus epistomate nullo; omnes pedes trochantinis, articulis tarsorum binis; cephalothorax sulco transversali distincto, anteriora versus paulatim angustatus; oculis 4; zugleich Vertreterin der neuen subf. Garypininae), für *Olpium dimidiatum* L. Koch = *semivittatum* Tömösv.; Daday a. a. O. S. 179.

Chernes cyrneus Tömösv. var. *hungaricus* (Szent-Márton, Com. Baranya),

S. 171, Taf. IV, Fig. 4, 6, *hungaricus* (Paulis, Com. Arad) S. 174, Fig. 1, 2; Daday a. a. O.

Chthonius diopthalmus (Mehadia); Daday a. a. O. S. 191, Taf. IV, Fig. 21, 27.

Obisium Cephalonicum (C.) S. 186, Taf. IV, Fig. 22, *dumicola* C. L. Koch var. *nitidum* (Sinnaikö) S. 187, Fig. 24, *macrodactylum* n. sp. (Mehadia) S. 189, Fig. 26; Daday a. a. O.

Pedipalpi.

Diese Ordnung theilt Thorell in den Ann. Mus. Civ. Genov. (2) VI S. 340 ff. in die Unterordnungen **Amblypygi** mit Familie Phrynoidae und Unterordnung **Uropygi** mit den beiden Tribus *Oxopoei*, Familie Thelyphonidae, und **Tartarides**, Familie *Schizonotoïdae*. Den Namen *Schizonotus* nimmt Thorell statt (des bereits bei den Vögeln vergebenen) *Nyctalops Cambr. an.* Die „Microthelyphonidae“ Grass. hält Thorell für eine eigene Ordnung, die mit den Thelyphoniden nur den gegliederten Schwanzfaden gemeinsam hat, und für die der Name **Palpigradi** in Vorschlag gebracht wird. — In *Charon Papuanus* n. sp. fand der Verfasser Embryonen von 3 mm Länge, wodurch eine Angabe Gerstäcker's, dass die Phryniden lebendig gebärend seien, Bestätigung findet. Die Hüften des 2. Paares bilden bei diesen Embryonen eine grosse quere Scheibe, der ringsum die zerrissenen Theile einer feinen Membran anhaften, mit der der Embryo umhüllt war.

Phrynidae. *Charon Beccarii* (Amboina) S. 340, *Papuanus* (Fly river; Yule) S. 345, *subterraneus* (Amboina) S. 349, *Sarawakensis* (S., Borneo) S. 364; Thorell a. a. O.

Thelyphonidae. Als Merkmale, die in erster Linie zur Artunterscheidung zu verwenden sind, gibt Thorell a. a. O. S. 359 an: Gestalt und Grösse der Tarsenglieder des ersten Fusspaares; Bewaffnung der Palpen, Gestalt und Grösse des Tibial- und Tarsalthelles dieser und des beweglichen Fingers derselben und dessen Skulptur; Färbung des Schwanzfadens; Gestalt des Höckers der Rückenaugen; Gestalt und Grösse der Ommatoiden (so nennt Thorell die hellen augenähnlichen Flecke an der Spitze des letzten Hinterleibesegmentes). Neben Thelyphonus, in welcher Gattung bisher alle lebenden Arten vereinigt wurden, unterscheidet Thorell 2 neue Gattungen nach folgender Tabelle:

A. Cephalothorax carinis cephalicis carens; ommatoidae duae... *Hypoctonus*.

B. Cep. carinis cephalicis praeditus:

a) Ommatoidae duae Thelyphonus.

b) Ommat. quattuor *Tetrabalius*.

Type von *Hypoctonus* ist *H. formosus* (Bull.), von *Tetrabalius* *T. seticauda* (Dollesch.); von letzterer Gattung wird ausserdem eine neue Art, *T. nasutus* (Borneo) beschrieben, S. 401. Die meisten der von anderen Autoren beschriebenen Arten (*rufimanus* Luc., *sepiaris* Bull., *Manilanus* C. L. Koch, *pugnator* Bull., *Philippensis* Bull.) werden vorläufig bei *Thelyphonus* belassen, da die Beschreibungen nicht gestatten, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Als neue Arten werden beschrieben *Thel. Doriae* (Sarawak, Borneo) S. 361, *asperatus* (Java) S. 382, *Papuanus* (Ramoï, Neu-Guinea) S. 385.

Scorpiones.

Scorpione mit kreisförmigen Stigmen sind nur die neotropischen Gattungen *Chactas* und *Teuthraustes*; Ray-Lankester kam nur durch eine falsche Determinirung, die ihn in *Chactas* einen *Brotheas* sehen liess, dazu, der Gattung *Brotheas* kreisförmige Stigmen zuzuschreiben. Karsch, Zool. Anz., 1888, S. 15 f.

Mossamedes (n. g. inter *Opisthophthalmum* et *Heterometrum intermedium*) *opinatus* (Kalahari); Simon, Ann. Soc. Entom. France 1887, S. 381.

R. J. Pocock schlägt als Ausweg aus der Verwirrung, die dadurch entstanden ist, dass Thorell, Karsch und Simon die Gattungen *Scorpio*, *Pandinus*, *Heterometrus* und *Palamnaeus* in verschiedenem Sinne anwenden, vor, die Gattung *Scorpio* (= *Pandinus* Thor.) für *africanus* L. anzunehmen, davon aber *maurus* L. nicht generisch zu trennen, und *Heterometrus* für spinifer zu reservieren; es würde danach *Pandinus* mit *Scorpio* und *Palamnaeus* mit *Heterometrus* zusammenfallen und eingehen müssen. — Als neue Arten aus Afrika beschreibt derselbe *Sc. cavimanus* (Kilimandscharo) S. 247, *exitialis* (Schoa) S. 249, *dictator* (Fernando Po; Westafrika) S. 251: On the african specimens of the genus *Scorpio* (Linn.) contained in the collection of the British Museum; Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 245—255.

Buthus raudus S. 377, *fulvipes* S. 378, *laevifrons* S. 379 (Kalahari); Simon, Ann. Soc. Entom. France 1887.

Die Gattung *Hormurus* Thor. ist nicht synonym mit *Liocheles* Sund., da die Type von *Liocheles*, L. Australasiae Sund., eine andere Art ist als die Type von *Hormurus*, H. Australasiae Fabr.; Thorell a. a. O. S. 419.

H. Australasiae F. var. *suspectus* (Birma) S. 420, *insculptus* (Andai, Neu-Guinea) S. 422; Thorell a. a. O.

Ischnurus Tityrus (Kalahari); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 383.

Isometrus flavimanus (Ajer Mancior, Sumatra) S. 409; Thorell a. a. O.

Lepreus lunulifer (Kalahari); Simon, Ann. Soc. Entom. France 1887, S. 375.

Palamnaeus liophysa (Ajer Mancior, Sumatra); Thorell a. a. O. S. 415.

Petrovicus furcatus (Kalahari); Simon, Ann. Soc. Entom. France 1887, S. 380.

R. J. Pocock behandelt the (4) species of the genus *Urodacus* in the collection of the British Museum, und beschreibt *U. excellens* (Port Essington) S. 170, Fig. 2, *armatus* (Port Lincoln) S. 172, Fig. 3, *abruptus* (Adelaide) S. 174, Fig. 4; Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 169—175, Pl. VIII.

Araneae.

J. H. Emerton setzt seine Bearbeitung der Spinnen Neu-Englands mit New England spiders of the family Ciniflonidae fort; Trans. Connecticut Academy of arts and sciences, VII, S. 443—458 Pl. IX—XI. Der Verfasser nimmt die „Ciniflonidae“ prinzipiell in dem Sinne Blackwall's und sieht sie als eine Familie an, mit den Gattungen *Dictyna*, *Amaurobius*, *Titanoeca*, *Uloborus* und *Hyptiotes*; die beiden letzteren bilden die Unterfamilie *Uloborinae*. Wie man sieht, ist die Gattung *Filistata* nicht darunter. Von *Dictyna* sind 9, *Amaurobius* 3, *Titanoeca* 2 Arten, *Uloborus* und *Hyptiotes* je eine Art beschrieben.

van Hasselt zählt auf (16) *Araneae exoticae* .. coll. . . in Guyana Hollandica (Surinam); Tijdschr. v. Entomol. XXXI S. 165—200, Pl. 5, 6.

Die II. der *Etudes sur les Arachnides de l'Asie méridionale* . . von E. Simon behandelt die *Arachnides rec. aux îles Andaman*; Journ. of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LVII, Part. II, S. 282—287. Es sind neben einer Anzahl junger Spinnen aus verschiedenen Familien, die eine nähere Bestimmung nicht gestatten, 7 Arten.

van Hasselt sprach über die Bedeutung der einzelnen Theile des Tasters der Spinnenmännchen, erkannte der bei der Begattung hervortretenden Blase die Hauptrolle bei der Begattung zu und spricht noch einmal ausdrücklich aus, dass sie von dem sog. Spiralmuskel Menge's, elastischen Polster Lebert's gebildet werde; Tijdschr. v. Entom. XXXI, Versl., S. LXXXVI—LXXXVIII.

Des poils nommés auditifs chez les araignées par W. Wagner; Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1888 No. 1 S. 119—134 mit 6 Holzschnitten. — Der Verfasser beschreibt zuerst die von ihm Tasthaare genannten Kutikularanhänge, die durch eine Ausstülpung der innersten Chitinlage der Kutikula entstehen sollen. Diese Ausstülpung bildet noch innerhalb des Hauptporus einen nach innen gerichteten Kegel, „Papille“, und setzt sich dann in das frei in die Luft ragende Haar fort. Dieses hat eine verhältnissmässig dicke Wandung, ist im Endtheil mit Luft angefüllt und in Folge dessen durchscheinend; in seinen Grund ragt das Ende einer Nervenfasers hinein. — Unter den sog. „Hörhaaren“ sind zweierlei Formen zu unterscheiden, zu denen Wagner noch eine dritte beschreibt. Gemeinsam ist diesen allen der verwickelte Bau des Hautporus, in dem sie stecken. Auch hier soll nur die innerste (unterste) Chitinlage der Kutikula die Auskleidung des Hautporus besorgen. Diese besteht zunächst in zwei Bechern, die denselben Boden haben, deren Oeffnung aber das eine Mal nach aussen, das andere Mal nach innen gerichtet ist. Innerhalb des äusseren Bechers erhebt sich ein dritter kleinerer. Der gemeinsame Boden dieser 3 Becher ist durchbohrt, und in der Durchbohrung steckt das Haar, das im Vergleich zu den gewöhnlichen Tasthaaren viel feiner ist. Neben diesen, wegen des Aussehens ihres Endtheiles „rosenkranzförmige“ genannten ist eine zweite Form, „feine Tasthaare“, namentlich dadurch ausgezeichnet, dass das Haar innerhalb des äusseren Bechers eine Verdickung zeigt. Eine dritte Form, wegen ihrer kurzen keulenförmigen Gestalt „kürbisförmige“ genannt, fand sich nur an dem Tarsus der Beine und Palpen einer „Mygale“ von Neu-Guinea.

Der Verfasser konnte sich nicht durch das Experiment davon überzeugen, dass diese Haare auf irgend welche Töne reagirten; er hält sie sammt und sonders für Organe des Gefühls. Während aber die gewöhnlichen Tasthaare die gröberen Berührungen dem Thiere bemerkbar machen, dienen die drei zuletzt beschriebenen Formen dazu, Bewegungen der Luft, und vielleicht auch die Beschaffenheit des Wetters wahrzunehmen.

G. W. & E. H. Peckham theilen some observations on the mental powers of spiders mit; Journal of morphology, I, S. 383—419. Da ich die Abhandlung nicht im Original erhalten habe, so referire ich nach Americ. Naturalist, 1888, S. 654—656. — Mit riechenden Stoffen wurden im ganzen 220 Versuche angestellt, 3 Arten (*Argyropeira hortorum*, *Dolomedes tenebrosus* und *Herpyllus ecclesiasticus*) verriethen nicht, dass sie durch den Geruch beeinflusst wurden; in allen übrigen Fällen zeigten die Arten durch ihr Gebahren, dass sie den Geruch wahrnahmen. Von tönenden Gegenständen wirkte am meisten eine Stimmgabel; wo der Gehörsinn seinen Sitz hat, liess sich nicht ermitteln; wahrscheinlich ist er über einen grossen Theil der Haut verbreitet.

Interessant sind die Versuche, um zu ermitteln, wie lange das Gedächtniss weiblicher Spinnen, die ihr Eiersäckchen bewachen, reicht. Eine 48 Stunden lang von ihren Eiern getrennt gewesene *Clubiona pallens* Hentz nahm sich ihrer sofort wieder an, ein *Theridium globosum* erinnerte sich derselben sogar noch nach 51 Stunden, während Attiden und Thomisiden im Allgemeinen nach 24 stündiger Trennung sich um ihre Eier nicht mehr kümmerten.

Nach der Beobachtung Peckham's sind die Augen mancher Arten schärfer, als die bisherigen Mittheilungen vermuthen liessen. Die Attide *Astia vittata* sieht auf 10" deutlich, wie aus dem Verhalten eines Pärchens hervorgeht: Das verfolgte Weibchen verbarg sich, wenn das Männchen in dieser Entfernung zu sehen war, bewegte sich dagegen ohne Vorsicht, wenn das Männchen durch andere Gegenstände verdeckt war. Hatte dieses seinerseits das Weibchen aus den Augen verloren, so erstieg es einen erhöhten Punkt, von dem aus es Umschau hielt; hatte es das Weibchen erblickt, was oft auf eine Entfernung von 10" geschah, so begab es sich geraden Wegs auf die Verfolgung. Auch das Vermögen, die Farben zu unterscheiden, scheint den Spinnen nicht zu fehlen; die meisten Arten suchten rothes Licht auf.

V. Wagner untersuchte das Blut der Spinnen. Arch. Slav. Biol., IV, S. 297—336. Dasselbe besteht aus einer farblosen Flüssigkeit, in der bei erwachsenen Spinnen viererlei Zellen schwimmen. Von diesen sind nur 2, die amöboiden und die gefärbten, konstant. Sie haben gewisse Eigenschaften in ihrem Bau gemeinsamen, unterscheiden sich aber in anderen von einander, so auch namentlich in der Art ihrer Vermehrung und in ihrer Herkunft, indem die ersteren mesodermal, die letzteren entodermal sind. Die beiden anderen Zellen sind nur vorbereitende Stadien der konstanten Formen und können als das Resultat der Vermehrung betrachtet werden. Die Grösse der Blutkörperchen wächst mit dem Alter des Thieres. Bei der erwachsenen Spinne ist das Verhältniss der verschiedenen Formen der Körperchen in den verschiedenen Körpertheilen streng bestimmt. Während des Wachstums variiert das Verhältniss konstant (in den verschiedenen Stadien) und periodisch (in Verbindung mit der Häutung).

Das Verhältniss ist periodisch beeinflusst durch das plötzliche Auftreten der kugeligen Formen, deren Zahl nach der Häutung ungeheuer zunimmt. Da diese Kugeln das Vermehrungsstadium in den konstanten Formen darstellen, so zeigen sie die Intensität dieses Vorganges zu dieser Zeit an. Diese Intensität erklärt sich bis zu einem gewissen Grad aus der Langsamkeit der Zirkulation während und unmittelbar nach der Häutung. Da nur 2 Formen konstant sind, so müssen wir diesen die grösste Wichtigkeit zusprechen. Der Unterschied in der Reaktion zwischen den amöboiden und den gefärbten Zellen und die Aehnlichkeit zwischen den amöboiden Zellen und den Leukozyten der höheren Thiere gestatten bis zu einem gewissen Grade von Wahrscheinlichkeit, wenn nicht Gewissheit, die Rolle dieser Bestandtheile zu bestimmen. (Nach Journ. R. Micr. Soc., 1888, S. 946f.).

Mc Cook gibt in den Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1888, S. 172 bis 176 Notes on the relations of structure and function to color changes in spiders. Dieselben weisen einmal auf die Thatsache hin, dass, während junge Spinnen durchweg hell gefärbt sind, mit vorschreitendem Alter erst die charakteristischen Zeichnungen sich mehr und mehr ausbilden; ferner auf einige übereinstimmende Fälle von Färbung bei Arten, die in gleicher Umgebung vorkommen. Arten, die durch die Färbung und Grösse sehr auffällig sind, besitzen Lebensgewohnheiten, die sie schützen.

Geo. F. Atkinson macht New instances of protective resemblance in spiders bekannt; Journ. Elisha Mitchell scient. societ., V, S. 28—30. und Americ. Naturalist, 1888, S. 545f.

Thomisus aleatorius Hentz, die auf Gras sehr gemein ist, hält sich mit den beiden hinteren Fusspaaren an dem Halme fest und streckt die kräftigen, langen vorderen Fusspaare unter einem Winkel vom Grashalme ab, der genau dem von den Aehrchen gebildeten Winkel gleich ist. — Eine neue Cyrtarachne-Art, die *C. multilineata* genannt ist, sieht in der Ruhe dem Gehäuse einer Schnecke täuschend ähnlich, welche sehr häufig auf Blättern lebt. Die Eiersäckchen dieser Art ähneln den Gallen, welche am Stamm gewisser Pflanzen nicht selten sind.

Nach einer Beobachtung v. Dietfurth's „schoss“ eine an einem Faden herabhängende Kreuzspinne eine grosse Anzahl Fäden, die in der Luft umherflatterten. Von Zeit zu Zeit tastete die Spinne mit ihren Hinterbeinen, ob nicht ein Fädchen sich festgehäkelt hätte. Bei einigen war dies der Fall, und nun benutzte die Spinne diesen Weg, um, einen festen Faden nachziehend, den ersten Querfaden anzulegen, worauf die Fertigstellung des ganzen Netzes keine Schwierigkeit mehr machte. Landois, Jahresber. Zool. Sekt. west. Prov.-Ver. f. 1887—88 S. 28.

In einer Note on the tube-inhabiting spider, *Lycosa fatifera* Hentz, spricht G. F. Atkinson aus, dass die landläufige Meinung, alle röhrenbewohnenden Lycosiden bedienten sich ihrer Wohnung als Schlupfwinkels nur bei der ungünstigen Jahreszeit oder

zum Zwecke der Häutung, nicht genügend durch Beobachtungen gerechtfertigt sei. Die Gewohnheit der Arten könne zudem durch die geographische Breite beeinflusst werden, insofern die nördlichen Arten ihre Schlupfwinkel unter Steinen haben, die südlichen dagegen sich Röhren graben. Eine Art, die wie die röhrenbewohnenden Teraphosiden sich ständig in ihrer Röhre aufhält und dieselbe nie oder äusserst selten verlässt, um draussen auf Beute auszugehen, ist die *L. fatifera* Hentz. Journ. Elisha Mitchell scientif. societ., V. S. 30f.

Kobert sprach in der Naturforschenden Gesellschaft zu Dorpat über die giftigen Spinnen Russlands, *Galeodes araneoides*, *Trochosa singoriensis* und *Lathrodectus 13 guttatus*. Während die Giftigkeit der ersteren neuerdings wieder in Frage gestellt ist und die zweite Art nur in demselben geringen Grade wie ihre mit Unrecht verschrieene italienische Verwandte giftig ist, ist die Malmignatte, die in einer bunten und schwarzen Varietät (letztere schwarzer Wolf oder schwarze Witwe genannt; es ist das wohl die var. *lugubris* Duf.), vorkommt, in hohem Grade giftig; an ihrem Bisse sollen in manchen Gegenden 33 % der Kameele zu Grunde gehen. Die Wirkung des Giftes, selbst in millionenfacher Verdünnung, besteht in einer Lähmung des Herzens und vielleicht des Zentralnervensystems; innerlich genommen ist es unwirksam. Es ist eine Eiweisssubstanz, und zwar ein sog. Ferment; durch Kochen wird es zerstört. Es findet sich nicht nur in der Giftdrüse, sondern in dem ganzen Körper, selbst in den Eiern. S. Biolog. Centralbl., VIII, S. 287 f.; Sitzgsber. Naturf. Gesellsch. Dorpat, 1888, S. 362—364, 440f.

C. V. Riley berichtete in der Sitzung der Entom. Soc. Washington, 1. März 1888, über einen durch den Biss von *Latrodectus mactans* herbeigeführten Todesfall, woran sich allgemeinere Betrachtungen und Mittheilungen anderer Fälle anschlossen; s. Entomol. Americana, IV, S. 40; Insect life, I, S. 204—211; Lugger erwähnt einen Fall, wo sein Töchterchen in Folge des Bisses von *Phidippus trisguttatus* L. 3 Tage lang krank war; Proceed. Entom. Soc. Washington, I, S. 139f.; Bemerkungen über den von Riley vorgetragenen Fall, die ihn als zweifelhaft erscheinen lassen, über die Natur des Spinnengiftes und über Gegenmittel s. ebenda S. 140f.

L. O. Howard erwähnt eine Notiz aus Hardwicke's Science Gossip, Juli 1888, die eine *Polysphincta*-Larve als äusseren Parasiten einer Spinne von Ceylon kennen lehrt; Insect life, I, S. 42f.

Derselbe meldet ebenda S. 106 andere ähnliche Fälle und beschreibt eine auf *Dictyna volupis* schmarotzende *Polysphincta*.

Mc Cook sprach am 21. Febr. 1888 vor der Acad. Nat. Sci. Philadelphia über die necessity for revising the nomenclature of american spiders. Diese Nothwendigkeit ergibt sich aus dem Umstand, dass Hentz, dessen Benennungen in Amerika allgemein in Gebrauch sind, keine Rücksicht auf frühere Autoren, namentlich nicht auf Walckenaer, genommen hat, welcher letztere durch Abbot eine grössere Zahl amerikanischer Spinnen kennen lernte.

Von 16 Hentz'schen Arten, meist Epeiriden, ist die richtige Benennung angegeben.

Simon möchte die Mimetinae zum Rang einer Familie erheben, die die Gattungen *Ero*, *Mimetes*, *Gelanor* (= *Eurymachus Keys.*), *Arcys*, *Grolus* und *Oarces* umfassen würde; Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 240 Anm.

Unter der Ueberschrift „On a new and interesting spider“ macht Geo. Marx eine interessante neue Gattung bekannt, die zugleich Vertreterin einer neuen Familie ist, die nach der Ansicht des Verfassers Merkmale der Territelarien, Dysderiden, Filistatiden, Pholciden und Scytodiden vereinigt. Indessen sind die Eigenschaften, welche die Gattung mit den Dysderiden und Scytodiden gemeinsam haben soll, keine anderen, als welche auch bei den Filistatiden vorkommen, und so fallen diese beiden Familien weg. Der auffallendste Charakter besteht in dem Vorhandensein eines zweiten Paares von Fächertracheen mit gemeinsamer Eingangsöffnung, die sich ungefähr in der Mitte des Bauches eben da befinden, wo bei *Hyptiotes* und *Uloborus* der Eingang zu den Röhrentracheen ist. Von den *Tetraneumon*es, zu denen der Verfasser die Gattung stellen will, unterscheidet sie sich, ausser durch den Mangel aller anderen Merkmale, die diesen zukommen, durch die in der Mitte zusammengeflossenen Stigmen des zweiten Paares der Fächertracheen. Die langen Beine und Augenstellung erinnern an *Pholcus*; die männlichen und weiblichen Begattungsorgane an *Filistata*, mit der sie auch durch den Besitz eines (allerdings anders gestalteten) *Cribellum* und *Calamistrum* übereinstimmt. Die Gattung ist *Hypochilus* genannt; vgl. unten. Entomol. Americana, IV, No. 8, S. 160—162 mit einer Tafel.

Simon äussert seine Ansicht über die systematische Stellung dieser Familie dahin, dass sie in die Nähe der *Dinopiden* und *Filistatiden* gehöre und beschreibt eine neue Art von Peking, die durch ihre bedeutende Grösse (dieselbe ist aber nur auf 9—10 mm. angegeben) und die aussergewöhnliche Länge des männlichen Tasters bemerkenswerth ist. Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CCVIII.

Tetrasticta.

Teraphosidae. *Barychelus* (n. g. Dionych. Idiommatæ affine) *badius* (Kone, Neu-Caled.), Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 246.

Encyocrypta (n. g. Dionych. Barychelo affine) *meleagris* (Canala; Numea, Neu-Caled.); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 247.

Entomothele (n. g. Trionych. für *Mygale guyonensis Walck.* und) *striatipes* (Nossi-Bé); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 236.

Entychides (n. g. Trionych. *Cyrtachenio* affine) *aurantiacus* S. 213, *Dugesi* (Mexiko), *Guadelupensis* (G.) S. 214; Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Fufius (n. g. Trionych. *Anamae L. Koch* affine) *atramentarius* (Guatemala) Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 213.

Genysa (n. g. Trionych. *Arbaniti L. Koch* affine) *bicalcarata* (Madagaskar); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 235.

Für *Ixalus* *L. Koch* (praeocc.) führt Simon den Namen *Ixamatus* ein; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CXCV.

Simon ersetzt seinen Namen *Mitura* (praeocc.) durch *Mithothele*; Bull. Soc. Entom. France 1887, S. CXCV.

Für *Phrictus* *L. Koch* (praeocc.) schlägt Simon den Namen *Phlogius* vor; Bull. Soc. Entom. France 1887, S. CXCV.

Simon ersetzt den (bereits anderweitig vergebenen) Namen *Orthotrichus* *Karsch* durch *Phrixotrichus*; die *Myg. rubiginosa* *Nic.* ist ein *Phrixotrichus* und vielleicht synonym mit *Orth. vulpinus* *Karsch*; Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 222.

Sarpedon *Cambr.* kann wegen der gleichnamigen Bonvouloir'schen Käfer-Gattung nicht bleiben; Simon bringt als Ersatz den Namen *Sason* in Vorschlag; die Gattung, von Cambridge mit *Moggridgea* verglichen, scheint näher mit *Leptopelma* verwandt zu sein; Bull. Soc. Entom. France 1887, S. CXCV; vgl. Journ. Asiat. Soc. Bengal, LVII Part II, S. 286 f.

Satzicus (n. g. *Sasoni* affine) *Andamanicus* (Port Blair, Andaman-Ins.); derselbe a. l. O. S. 287.

Trichopelma (n. g. *Dionych. Leptopelmata* affine) *nitida* (San Domingo) S. 215, *illetabilis* (Teffé, Amazon.) S. 216; Simon, Ann. Soc. Entom. France 1888.

H. C. Mc Cook schildert die Nesting habits of the american pursweb spider, *Atypus* (*Sphodros*) *Abbotii* (*Walck.*). Von unserem *Atypus* unterscheidet sich die Wohnung dieser amerikanischen Art dadurch, dass der oberirdische Theil nicht dem Boden aufliegt, sondern an Baumstämmen (Palmen) senkrecht in die Höhe geführt wird. Das Ende des unterirdischen Theiles ist erweitert mit Seitenzweigen. Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1888, S. 203—220 mit 9 Holzschn.

Brachythele (subcalpetana *Nic.*), *Pissii* (Chili); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 221.

Crypsidromus pentaloris (Verapaz, Guatemala); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 216.

Eoatypus Woodwardii (Eocän von Garnet Bay, Isle of Wight); H. C. Mc Cook, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1888, S. 200—202 mit 2 Holzschn.; Ann. a. Mag. N. H. (6) II, S. 366—369.

Hexathele cinereo-pilosa (Valdivia); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 222.

Idiops Bonapartei (Surinam); van Hasselt, Tijdschr. v. Entomol. XXXI, S. 166.

Macrothele silvicola (Neu-Caledonien); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 245.

Dysderidae. Simon ersetzt den Namen *Colophon* *Cambr.* (praeocc.) durch *Caponia*. Die Gattung ist trotz ihrer 8 Augen sehr nahe mit *Nops* verwandt; Bull. Soc. Entom. France 1887 S. CXCV.

Simon ersetzt den Namen *Phaedima* *Thor.* (praeocc.) durch *Paculla*; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CXCV.

Polyaspis (n. g. *Gamasomorphae* affine) *acuminata* (Numea); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 245.

Tristicta.

Attidae. Geo. W. & Eliz. G. Peckham beschreiben North American Spiders of the family Attidae; Trans. Wisc. Acad. Sciences, Arts and Letters, Vol. VII, S. 1—104, Pl. I—VI. — Auf eine systematische Tabelle zum Bestimmen der (32) Gattungen lassen die Verfasser die Beschreibungen von 79 Arten folgen, von denen 45 mit Hentz'schen sich identifiziren liessen; 10 der letzteren waren unbestimmbar; von den von Walckenaer beschriebenen 64 Arten konnten nur 4 identifizirt werden. Die Tafeln enthalten z. Th. die Abbildung des Hinterleibes mit seinen Zeichnungen, z. Th. die Darstellung der Taster der Männchen und Epigynen der Weibchen, in einzelnen Fällen auch anderer zur Erkennung der Art wichtiger Körpertheile.

G. W. & E. G. Peckham und Wm. H. Wheeler beschreiben Spiders of the subfamily Lyssomanae; ebenda S. 222—256, Pl. XI, XII. — Die Unterfamilie wird nach folgendem Schema in drei Gruppen getheilt:

I. *Lyssomanii*. Cephalothorax niedrig oder mässig hoch, verlängert, länger als breit, mit *Lyssomanes* (Utg. *Maroussa* und *Jelskia*) und *Asamonea*.

II. *Athamii*. Cephalothorax hoch, kurz, quadratisch, mit *Athamas* und *Epeus*.

III. *Simonellii*. Cephalothorax knotig; Spinne ameisenähnlich, mit *Simonella*.

Admestina (n. g.) *Wheelerii* (Wisconsin); G. W. & E. G. Peckham a. a. O. S. 78, Pl. I, V, Fig. 58.

Dynamius (n. g., für *Jotus opimus* Peckh. und) *elegantissimus* (San-Domingo); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 205.

Laufeia (n. g. *Hasario* affine) *aenea* (Yokohama); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 249.

Sadala (n. g. *Icio* affine, quadrangulo oculorum prope duplo latiore quam longiore ...) *distincta* (Mexico); G. W. & E. G. Peckham a. a. O. S. 53, Pl. I, Fig. 70, VI, Fig. 76.

Simon ersetzt den Namen *Scaea* L. Koch (praeocc.) durch *Servaea*; Bull. Soc. Entom. France 1887, S. CLXXXVI.

Siler (n. g. *Tritae* affine) *cupreus* (Yokohama); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 250.

Stergusa (n. g.) *improbula* (Numea); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 239.

Asamonea punctata Fig. 20, *ornatissima* Fig. 22 (Madagaskar) S. 244, *flava* (Mittelamerika) Fig. 18, S. 246; Peckham & Wheeler a. a. O. Pl. XII.

Astia (?) *morosa* (Californien); G. W. & E. G. Peckham a. a. O. S. 71, Pl. I, V, Fig. 53.

Attus *Albertisi* Thor. gehört zu *Synnamora* *Keyserl.*; Simon, Bull. Soc. Entom. France 1887, S. CLXXXVI.

„*Attus*“ *Croesus* (Surinam); van Hasselt, Tijdschr. v. Entomol. XXXI, S. 196, Pl. 6, Fig. 3, 4.

A. imperialis (Californien) S. 44, Pl. III, Fig. 31, *cautus* (Mexiko) S. 92; Ge. W. & E. G. Peckham a. a. O.

Ballus Youngii (Pennsylvanien); G. W. & E. G. Peckham a. a. O. S. 87, Pl. I, VI, Fig. 66.

Cytaea (?) *minuta* (Californien); G. W. & E. G. Peckham a. a. O. S. 73,

Pl. I, V, Fig. 55, *albolimbata* (Andaman I.); Simon, Journ. Asiat. Soc. Bengal, LVII, Part II, S. 282.

Cyllobelus miniaceomicans (Port Blair, Andaman-I.); Simon, Journ. Asiat. Soc. Bengal, LVII, Part II, S. 283.

Dendryphantes flavus (New-York) S. 39, Pl. I, Fig. 27, III Fig. 27, *flavipe[de]s* (Canada) S. 42, Pl. III, Fig. 29a; G. W. & E. G. Peckham a. a. O.

Eris (?) *barbipes* (Mexiko) S. 55, Pl. IV, Fig. 38, *nervosus* (New-York) S. 56, Pl. I, III, Fig. 39; G. W. & E. G. Peckham a. a. O.

Ergane dispar (Numea); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 238.

Euophrys longipalpis (Numea); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 237.

Habrocestum Schinzi (Kalahari); Simon, Ann. Soc. Entom. France 1887 S. 369, *locuples* (San Domingo); derselbe ebenda 1888, S. 203, *hirsutum* (Oregon) S. 64, Pl. IV, Fig. 47, *Oregonense* (O.) S. 66, Pl. V, Fig. 49; G. W. & E. G. Peckham a. a. O.

Homalattus phoeniceus (Mexiko); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 208.

Hycia Pikei (New-York; S.-Karolina; Georgia; Florida); G. W. & E. G. Peckham a. a. O. S. 79, Pl. I, IV, V, Fig. 59.

Icius piraticus (Texas); G. W. & E. G. Peckham a. a. O. S. 49, Pl. I, Fig. 35, III Fig. 35.

Lyssomanes (Maroussa) antillanus (S. Domingo) S. 226, Pl. XI, Fig. 1, *bitaeniatus* (Venezuela) Fig. 4, *placidus* (Mexiko) Fig. 5, S. 229, *miniaceus* (Rio de Janeiro) S. 230, Fig. 6, *austerus* (Rio de Janeiro) Fig. 7, Pl. XII, Fig. 17, *modestus* (Madagaskar), Pl. XII, Fig. 10, S. 231, *tristis* (Brasil.) S. 232, Fig. 12, (Jelskia) *tenuis* (Rio de Janeiro) S. 233, Pl. XI, Fig. 8, *jemineus* (Südamerika) Pl. XI, Fig. 9, XII Fig. 14, S. 234, *nigropictus* (Amazon.) S. 235, Pl. XII, Fig. 10, *parallelus* (Südamerika) S. 236, Pl. XII, Fig. 15, *velox* (Brasilien) S. 237, Pl. XI, Fig. 11, *amazonicus* (A.) S. 240, Pl. XI, Fig. 1, XII, Fig. 16, *blandus* (Guatemala) S. 241, Pl. XII, Fig. 13; Peckham & Wheeler a. a. O.

Maevia Californica (C.); G. W. & E. G. Peckham a. a. O. S. 73, Pl. V, Fig. 54, *Neo-Caledonica* (N.-C.) S. 237, *Mellotiei* (Yokohama) S. 248; Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Marptusa Californica (K.); G. W. & E. G. Peckham a. a. O. S. 81, Pl. I, V, VI Fig. 61.

Mogrus cephalotes (Haïti); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 204.

Neon Nellii (Pennsylvania; Kanada); G. W. & E. G. Peckham a. a. O., S. 88, Pl. I, VI, Fig. 65.

Opisthuncus aurantiacus Sim. ist eine *Epocilla Thor.*; Simon, Bull. Soc. Entom. France 1887, S. CLXXVI.

Pellenes tripunctatus (crucigerus) Walck. in England (Folkestone); Enock, Proc. Entom. Soc. London, 1888, S. XXII.

Phidippus obscurus (Texas) S. 16, Pl. I Fig. 5, II Fig. 5, *Rautenbergii* (ibid.) S. 22, Pl. I, Fig. 8, II Fig. 8; G. W. & E. G. Peckham a. a. O.

Philaenus farneus (Texas) S. 26, Pl. II, Fig. 16, *partilis* (Mexiko) S. 27, Fig. 17, *Mexicanus* (M.) S. 28, Pl. I, Fig. 18, II Fig. 18; G. W. & E. G. Peckham a. a. O.

Prostheclina Cambridgii (Florida); G. W. & E. G. Peckham a. a. O. S. 69, Pl. I, V, Fig. 51.

Pseudicius Harfordii (Californien); G. W. & E. G. Peckham a. a. O. S. 51, Pl. I, III, IV, Fig. 36.

Zygoballus Bettini (Wisconsin; Missouri; Georgia; Florida); G. W. & E. G. Peckham a. a. O. S. 89, Pl. I, VI, Fig. 68.

Thomisidae. Simon ersetzt den Namen *Charis Keyserl.* (praeocc.) durch *Deltoclitia*; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXVII.

Philodromus funebris Nicol. gehört in die Gattung *Petrichus Sim.*; Simon, Bull. Soc. Entom. France 1887, S. CLXVII.

Sparassidae. *Lauricius* (n. g. Hemiclaein.) *hemiclaeinus* (Ciudad, Mexiko); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 208.

Staianus (n. g. Sparianthin.) *acuminatus* (Madagaskar); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 224.

Bradystichidae. *Geraesta* (n. g.) *hirta* (Madagaskar); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 225.

Drassidae. *Asemestes* (n. g. Pythonissae affine; proportione et dispositione oculorum eximie distinctum) *subnubilus* (Kalahari); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 373.

Cluilius n. g. Clubionin. für (Cl.) *elegans Nic.* und *chilensis Nic.*; Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 220.

Miturgina (n. g. Miturgae affine) *vittata* (Numea); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 244.

Strotarchus (n. g. Clubionae affine; mamillae superiores longe biarticulatae) *nebulosus* (Presidio, Mexico); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 211.

Simon ersetzt den Namen *Microctenus Keyserl.* (praeocc.) durch *Oligoctenus*; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXVI.

Viridasius (n. g. Ctenin.) *pulchripes* (Nossi-Bé); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 233.

Vulsor (n. g. Ctenin.) *bidens* (Mayotte); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 233.

Creugas cinnamius (Mexiko); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 210, *cetratus* (Numea; Koue); derselbe ebenda S. 243.

van Hasselt hält die Ctenidae als besondere Familie nicht für gerechtfertigt, sondern vereinigt sämtliche Arten mit den Lycosiden; die verschiedenen Gattungen möchte er nur als Untergattungen von *Ctenus* angesehen wissen; als neu beschreibt er (*Leptoctenus*) *ten Katei* (Surinam); Tijdschr. v. Entom. XXXI, S. 192.

Leptoctenus byrrhus (Mexiko); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 210.

Megamyrmeceium velox (Kalahari); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 372.

Trachelas Madagascariensis (M.); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 232.

Xeropigo scutulatus (Guadeloupe); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 209.

Lycosidae. Simon erkennt den wesentlichsten Charakter der Unterfamilie Dolomedinae in dem Besitze von 4 Zähnen am unteren Falzrande der

Klaue; die Lycosinae haben 2 oder 3 und die Pisaurinae (mit Podophthalma) immer 3; Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 206.

Saltuinus (n. g. für *Dolom. marginellus* C. L. Koch und) *scoparius* (Orinoco); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 207.

Sosippus (n. g. für *Dolomedes oblongus* C. L. Koch und) *mexicanus* (M.); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 206.

Tallonia (n. g. Pisaurae valde affine) *picta* (Nossi-Bé); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 223.

Tricca (n. g., a *Lycosa linea oculorum* ant. recurva et pedibus ant. fere muticis diversum) *japonica* (Yokohama); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 250.

Simon möchte *Aulonia micarioides* L. Koch zu *Artoria Thor.* versetzen; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXVI.

Baebe Cambr. ist synonym mit *Evippa Sim.*; Simon, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXVI.

Dolomedes Borbonicus Vins. gehört in die Gattung *Dendrolycosa Dolesch.*; Simon, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXVII.

Ueber die Unterschiede von *Hippasa Sim.* und *Diapontia Keys. s.* Simon, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXVI.

The tube-inhabiting spider, *Lycosa fatifera Hentz*, benutzt ihre Röhre das ganze Jahr hindurch als Wohnung; G. F. Atkinson, American Naturalist, 1888, S. 546f.

Perenethis L. Koch ist synonym mit *Tetragonophthalma Karsch*; Simon, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXVI.

Sphedanus marginatus (Port Blair, Andaman-I.); Simon, Journ. Asiat. Soc. Bengal, LVII, Part II, S. 284.

van Hasselt erhielt *Tarentula laeta* L. Koch? (bisher aus Neuholland und Papua bekannt), aus Surinam und liefert eine Abbildung der Epigyne; Tijdschr. v. Entom. XXXI. S. 188, Pl. 5, Fig. 8.

Agalenidae. *Cyrioceta* n. g. für (*Drassus*) *spinifer Nicol.*; Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 219.

Simon ersetzt den Namen *Centropelma* L. Koch (praeocc.) durch *Nicodamus*; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CXIV.

Ch. V. Riley hat eine *Agalena*-Art im Verdacht des Vegetarianismus; dieselbe „bricht Blätter und kleine Zweige ab und macht grosse Nester;“ Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 174.

Cydrela rutilans S. 370, Pl. 6, Fig. 1, *crassimana* S. 371 (Kalahari); Simon, Ann. Soc. Entom. de France, 1887. (Mit dieser Gattung ist *Tristichops Tac.* wahrscheinlich synonym.)

Myro Chilensis (Valdivia); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 218.

Tegenaria torva Cambr., für welche Karsch die Gattung *Lancaria* gebildet hatte, gehört in die Gattung *Psechrus Thor.*; Simon, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CXIV.

Urocteadae. *Uroctea Schinzi* (Kalahari; der erste Vertreter dieser Gattung auf der südlichen Halbkugel); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 370.

Hersiliidae. *Rhadine Americana* (Paraguay), *vittata* (Orinoco); Simon, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXVI.

Argyronetidae. G. A. Poujade theilt *Nouvelles observations sur les mœurs de l'Argyronète, Argyroneta aquatica Clerck . . .* mit; Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 69—76, Pl. 3.

Zoropsididae. *Zorocrates* (n. g. a *Zoropside* *linea oculorum postica* haud recurva sed procurva et oculis anticis subaequalibus diversum) *fusca* (Mexiko); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 212.

Amaurobiadae. Simon führt für *Mezentia Thor.* (praeocc.) den Namen *Fecenia* ein; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CXIV.

Amaurobius sylvestris (Neu-England) S. 451, Pl. X, Fig. 1, *tibialis* (Mt. Washington, gleich dem vorigen auf Bäumen) S. 452, Fig. 3; Emerton a. a. O.

Titanoeca americana (New-Haven und Meriden, Conn.) Pl. X, Fig. 4, *brunnea* (New-Haven) Fig. 5, S. 453; Emerton a. a. O.

Hypochilidae nov. fam. gegründet auf *Hypochilus* n. g. (2 Paar Athmungsorgane als Fächertracheen ausgebildet, aber die Eingangsöffnung zu dem zweiten Paar ein gemeinsamer medianer Spalt. Cribellum und Calamistrum vorhanden; ersteres ungetheilt, rundlich, letzteres aus zwei längeren Reihen von Haaren gebildet. Cephalothorax im hinteren Theile flach, mit tiefer Rückengrube; Kopftheil etwas erhoben; Augenstellung wie bei *Pholcus*, die in den seitlichen Gruppen stehenden Augen gross. Mandibeln senkrecht, kräftig, beide Klauenfalzränder mit Zähnen. Unterlippe nicht mit dem Sternum verschmolzen, breiter als lang. Beine lang und dünn. Palpus des ♂ mit Uebertragungsorganen wie bei *Filistata*; Samentaschen des ♀, wie ich an einem von Thorell mir gütigst zur Ansicht eingesandten Stück sehen konnte, ebenfalls ähnlich wie bei *Filistata*, *Scytodes*, oder den Territelarien angebracht, ohne Epigyne, jederseits aus zwei Säckchen mit gemeinsamer Mündung bestehend). Die Art, *H. Thorellii*, wurde in der Nähe des Lookout Mountain, Tenn., gefunden, wo sie zwischen Felsen grosse, weisse, tellerähnliche Gewebe anfertigt, in denen sie in umgekehrter Stellung sich aufhält und welche sie bei Störungen in Schwingung versetzt; vgl. oben S. 48; Entom. Americana IV No. 8, S. 160 bis 162 mit einer Tafel; vgl. Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 166f.; 178—180.

H. Davidi (Berge nördlich von Peking); Simon, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CCVIII.

Dinopididae. *Avella neo-caledonica* (Numea); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 242.

Uloboridae. Die Gattung *Sylvia Nicol.* ist synonym mit *Uloborus*, und *S. abdominalis Nic.*, von der *similis*, *atra*, *rubiginosa*, *vittata* nur Farbenvarietäten sind, steht *U. productus Sim.* nahe; Simon, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CXCV.

Dictynidae. *Dictyna muraria* (Neu-England) S. 445, Pl. IX, Fig. 1, *longispina* (Meriden, Conn.) S. 446, Fig. 4, *Bostoniensis* (Boston; Beverly; Brookline) Fig. 3, *minuta* (Hamden, Conn.; Providence, R. J.) Fig. 5, S. 447, *rubra* (Massachus.; New-Haven, Conn.) Fig. 7, *cruciata* (ibid.) Fig. 6, S. 448, *frondea* (Neu-England) S. 449, Fig. 9; Emerton a. a. O.

Micropyphantidae. *Thyreobaeus* (n. g. *Araeonco Sim.* affine) *scutiger* (Madagaskar); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 228.

Zodariadae. Simon verweist seine Gattung *Storenomorpha* unter vorstehende Familie, in der sie eine durch den Besitz einer Skopula charakterisierte

Unterfamilie zu bilden hat; eine neue Art ist *St. angusta* (Madagaskar); Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 231.

Storena rugosa (Numea); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 242.

Theridiadae. *Exechocentrus* (n. g. Mimetin. Gelanori *Thor.* affine) *lancearius* (Madagaskar); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 227.

Mastostigmus (n. g. Euryopidi affine) *decemperlatus* (Madagaskar); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 230.

Simon ersetzt den (bereits bei Rhynchoten vergebenen) Namen *Phycus Cbr.* durch *Phylarchus* und beschreibt *Ph. splendidus* (Numea) S. 241; die (*Euryopis*) *aeneocincta* gehört ebenfalls hierher; Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 241f.

Trigonobothrys (n. g. Euryopidi affine) *excisus* (Madagaskar); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 231.

Arcys perlatus (Numea); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 240.

Fox beobachtete eine Art von *Argyrodes* als Inquilinen des Gewebes von *Hypochilus*; Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 173.

Ariamnes cylindrogaster (Yokohama); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 251.

Asagena phalerata bei Troon, Ayrshire, gefangen; W. R. Baxter, Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow (N. S.) II, S. XIX.

Crustulina ambigua (Madagaskar); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 229.

Euryopis mustelina (Yokohama) S. 251, *nubila* (Pondichéry) S. 252; Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Lathrodictus geographicus (Surinam); van Hasselt, Tijdschr. v. Entom. XXXI, S. 176, Pl. 5, Fig. 1—4.

C. Warburton: On a new species of spider (*Linyphia*), with some observations on the habits of certain *Araneina*; abstr. in: Proc. Cambridge Philosoph. Soc., VI, S. 128f.

Moneta triquetra (Numea); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 211.

Theridula perlata (Madagaskar); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 228; „*Chrysso*“ *nivipictus* und *cordiformis* *Bull.* gehören in die Gattung *Theridula*.

Tetragnathidae. *Glenognatha* (n. g. *Pachygnathae* valde affine, differt ventre in parte secunda plica stigmatica coriacea evidentissima transversim secta ...) *Emertoni* (Arizona); Simon, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CXCIV.

Epeiridae. H. C. McCook gibt descriptive notes of new American species of orbweaving spiders; Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1888, S. 193 bis 199 mit Holzschn.

Simon ersetzt den Namen *Inca Tacx.* (praeocc.) durch *Aspidolasius*; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXVII.

Clitaetra (n. g. *Nephilina*.) *episinoides* (Mayotte); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 226.

Hypophthalma Tacx. (praeocc.) wird von Simon durch *Scoloderus* ersetzt; nur *H. cordata* gehört in diese Gattung; die übrigen von *Taczanowski* beschriebenen Arten sind zu *Eurycorma Thor.* zu stellen; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXVII.

Lucas beschreibt den Cocon von *Argiope lobata*; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LXIf.

F. Karsch macht das Männchen der *Cyclosa Sierrae* Sim. bekannt; Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 483 Anm.

Cyclosa tubicola (Angra-Pequena; hängt in ihr kreisförmiges Fanggewebe ein einem Füllhorn ähnliches Wohngewebe auf); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 373, Pl. 6, Fig. 5, *albisternis* (Port Blair; Havelock, Andaman-L.); derselbe, Journ. Asiat. Soc. Bengal, LVII, Part II, S. 285.

Cyrtarachne multilineata (Chapel Hill, N. C., Mime von Schneckenhäusern); G. F. Atkinson, Journ. Elisha Mitchell scientif. societ., V., S. 29 und Americ. Naturalist, 1888, S. 546.

Cyrtophora bifurca (Florida; ähnlich *C. caudata* Hentz und gleich dieser ihr einem unregelmässigen Oktogon ähnliches Eiersäckchen in ihr Fangnetz aufhängend); Mc Cook, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1887, Part III, S. 342f.

Diphyia pumila (Madagaskar); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 226.

Epeira ectypa Walck. gehört zu *Vixia Cambr.*; Simon, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXVII.

Epeira heptagon Hentz gehört zu *Ebaea* L. Koch, (welche letztere nach Thorell mit *Gea C. L. Koch* synonym ist; vgl. den vor. Ber. S. 54); Simon, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXVII.

E. Messalina S. 151, Pl. 6, Fig. 1, 2, *musiva* S. 184, Pl. 5, Fig. 5—7 (Surinam); van Hasselt, Tijdschr. v. Entomol. XXXI.

E. gemma (San Diego; Victoria, Brit.-Columb.) S. 193, Fig. 1, 2, *bicentennaria* (Ohio; Alleghany-Geb.) S. 194, Fig. 3, 5, *vertebrata* (San Diego, Calif.) S. 196, Fig. 6, 7, 9, 10, und var. *pullus* S. 198, Fig. 8, *balaustina* (Florida; Swan Isl., S. Domingo) S. 198, *parvula* var. *conchlea* (Wisconsin; Calif.) S. 199; H. C. Mc Cook a. a. O.

Lipocrea Thor. ist wahrscheinlich synonym mit *Larinia* Sim.; Simon, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXVII.

Meta Menardi in Schottland; W. R. Baxter, Proc. Nat. Hist. Soc. Glasgow (N. S.) II, S. XIX.

Poltys vesicularis (Madagaskar); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 225.

Simon hält *Pycnacantha Meadi* Blackw. und *Daturina hystrix* Thor. für synonym mit *P. (Aranea) tribulus* F.; die Art würde dann vom Cap bis zum Tanganjika verbreitet sein; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXVII.

Tholia L. Koch ist synonym mit *Dolophones* Walck., bei welcher letzteren aber der Analhöcker als eine Art Schnabel und die Abdominaleindrücke für Augen genommen sind; die Diagnose wurde nach einer Zeichnung im Atlas von Quoy & Gaimard angefertigt; Simon, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXVII.

Eine verkannte deutsche Spinne ist *Zilla Thorellii* Auss., die von Bertkau in seinem Verzeichniss für *Z. Kochii* Thor. gehalten war; die Unterschiede beider Arten sind einander gegenübergestellt; F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 483—486. — *Z. Kochii* ist demnach noch nicht in Deutschland gefunden; *Z. Thorellii* bei Wien, im Mosel- und Lahnthal.

Solifugae.

Datames magna (Laredo, Texas); J. L. Hancock, Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. XXV, No. 127, S. 107—110 mit 1 Taf.

Hexisopus fodiens (Kalahari); Simon, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 374, Pl. 6, Fig. 6, 7.

Myriapoda.

The classification of Myriapoda ist nach J. S. Kingsley nicht natürlich. Die Aehnlichkeit der beiden grössten Ordnungen, Chilopoden und Chilognathen ist eine mehr oberflächliche und äusserliche, als auf eine innere Verwandtschaft hindeutende, und in allen den Punkten, in denen die Chilopoden sich von den Chilognathen unterscheiden, stimmen sie mit den Hexapoden überein. American Naturalist, 1888, S. 1118—1121.

Ch. H. Bollman stellt auf a preliminary list of the Myriapoda of Arkansas with descriptions of new species; Entomol. Americana, IV. S. 1—8.

Ch. H. Bolman macht Notes upon a collection of Myriapoda from East Tennessee, with description of a new genus and six new species; Ann. New-York Akad. Sci. Vol. IV. S. 106—112. — Die Arten stammten von 3 Lokalitäten: Knoxville (11 A.), Beaver creek (21 A.), Mossy creek (7 A.).

In seinen Contributions to our Knowledge of the Myriopoda of Dominica führt R. J. Pocock 9 Arten mit Beschreibung und Abbildung der neuen auf; Ann. a. Mag. N. H. (6) II. S. 472—483, Pl. XVI.

Karsch beschreibt Zwei neue Myriopoden von Ecuador; Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 29—31.

Addenda à la faune des Myriopodes de la Normandie sind *Polyxenus lagurus* und *Julus albolineatus* var. *confundens*; Gadeau de Kerville, Bull. Soc. d. Amis d. Sci. nat. d. Rouen (1887), procès-verbal de la Séance du 3 février, S. 14.

Dalla Torre verzeichnet die Myriopoden Tirols mit Angabe ihrer Verbreitung in Tirol; es sind (ungerechnet 3 zweifelhafte Arten) 100 Arten in 24 Gattungen, und zwar 49 Chilopoden, 1 Symphyle, 50 Diplopoden; 17. Bericht naturw.-mediz. Ver. Innsbruck S. 73—102.

R. Lätzel zählt die ... in Bosnien, der Herzegowina und in Novibazar gesammelten Myriopoden (48 A.) auf; Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, Abh., 1888, S. 91—94.

Karsch stellt ein Verzeichniss der von Herrn E. von Oertzen i. d. J. 1884 und 1885 in Griechenland und auf Kreta gesammelten Myriopoden zusammen; Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 220—224. Es sind 17 Arten, darunter drei neue.

Peripatina.

Peripatus (juliformis?) auf Dominica; H. A. A. Nicholls, Nature, 38, S. 566.

P. Leuckartii (?) in Viktoria (Gippsland und Warburton), J. J. Fletcher, Proceed. Linn. Soc. New-South Wales (2) II, Part I; A. Dendy, Nature, 39, S. 366.

A forgotten species of *Peripatus* ist nach F. J. Bell im Rep. 57. Meet. Brit. Assoc. Advanc. Sci., S. 769f. *P. Quitensis Schmarda*.

Note on a specimen of *Peripatus* found at Cassilis, N. S. W., A. S. Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), II, S. 981.

A. Sedgwick beschreibt die Entwicklung des *P. capensis* vom Stadium G an bis zur Geburt; Quart. Journ. Microsc. Sci., XXVIII, S. 373—396, mit 4 Tafeln.

Derselbe giebt eine Monograph of the genus *Peripatus*; ebenda S. 431—493 mit 7 Taff. (2 n. A.).

W. L. Sclater schildert die ersten Entwicklungsvorgänge einer südamerikanischen Art (von Demerara), die er *P. Imthurmi* zu nennen vorschlägt; ebenda S. 343—362 mit 1 Taf.

L. Sheldon gibt einige Unterschiede in der Anatomie des *P. capensis*, *Novae-Zelandiae* und *Edwardsii* an; ebenda S. 495—499.

Dieselbe macht Bemerkungen über die ersten Entwicklungsvorgänge des *P. Novae-Zelandiae*; ebenda XXIX, S. 283—293, 2 Taff.

Chilognatha.

G. Saint-Remy untersuchte das Gehirn von *Iulus sabulosus* und *maritimus*, und findet dasselbe komplizierter gebaut als bei irgend einem anderen Myriapoden; es nähert sich am meisten dem der Insekten; Compt. Rend. hebdom. Acad. Sci., Paris, CVI, S. 618—620.

F. G. Heathcote setzt seine Untersuchungen über die Entwicklung der Myriapoden mit der nachembryonalen Entwicklung von *Iulus terrestris* fort; Philosoph. Transact., CLXXIX, B., S. 157 bis 179, mit 4 Taff.

Die Somiten entwickeln sich im wesentlichen auf dieselbe Weise wie bei *Peripatus*. Die Cölomräume haben mit der bleibenden Leibeshöhle oder dem Gefäßsystem von *Iulus* nichts zu thun. Die Leibeshöhle ist ein Pseudocöl und besteht aus einer Reihe von Höhlen zwischen Darm und Körperwandung. Hinter dem dritten Körpersegment gehen die Somiten z. Th. in die Gliedmassen, z. Th. in den Körper; die letzteren rücken an den Nervenstrang und nicht an die Rückenseite wie bei *Peripatus*. Der in die Beine getretene Theil, der bei *Peripatus* das Segmentalorgan und dessen Blase bildet, liefert bei *Iulus* die Beinmuskulatur.

Balfour's Ansicht, dass die Segmente mit 2 Beinpaaren einfache Segmente mit einem zweiten Beinpaar seien, ist wohl nicht haltbar, da diese Segmente je 2 mesoblastische Segmente haben.

An dem Gehirn tritt ein später verschwindendes Paar von Gruben auf, das denen von *Peripatus* gleicht; zeitweilig treten solche Gruben auch an den Ganglien auf, verschwinden aber, wenn die beiden Stränge sich vereinigen.

Die Stinkdrüsen entstehen als Einstülpungen der Haut. Auch

die Tracheen bilden sich als Einstülpungen hinter je einem Gliedmassenpaar. Indem die erste grubenförmige Einstülpung tiefer einsinkt, nimmt sie die Gestalt einer im Körper liegenden Blase an, die zwei kurze, dicke Divertikula aussendet; diese werden unter Umwandlung der auseinanderweichenden Zellen zu den Tracheenröhren.

Das Herz von *Iulus* hat in jedem Segment 2 Paare von Ostien; die in das Innere des Herzschauches hineinragenden Lippen dieser Ostien sind aus 4 eigenthümlich gestalteten Muskelzellen gebildet. Jedem Segment kommen ferner 2 Paar von Arterien zu, die direkt in die Zwischenräume des Fettkörpers führen. Die innerste Wand des Herzschauches ist strukturlos; sie ist ein Sekret der mittleren Schicht, die ihrerseits aus Reifen von Muskelzellen gebildet ist, wobei ein breiter und schmaler Reifen abwechseln. Feine Muskelfasern befestigen das Herz an die Hypodermis und an den Fettkörper. Der Raum, in dem das Herz liegt, ist von der übrigen Leibeshöhle durch eine Perikardialmembran abgeschlossen, die aus einem Netzwerk von Zellen besteht, die auch dem Herzen den Ursprung gaben und mit dem Fettkörper in Verbindung stehen.

Die Augen erscheinen zuerst als ein einzelner Ocellus jederseits, dem sich dann nach und nach je 1 weiterer Ocellus anfügt, bis die normale Zahl erreicht ist. Die Bildung des einzelnen Ocellus lässt sich mit Patten's Ansicht von der Entstehung des einfachen Auges aus einer von der Hypodermis abgeschnürten Augenblase vereinigen.

Die wesentlichen Züge, welche die Myriapoden mit *Peripatus* gemeinsam haben, sind solche, welche auch bei manchen anderen Tracheaten vorkommen. Nach Scudder's Beschreibung hat *Euphoberia* aus der Kohlenformation Merkmale, die sich bei *Iulus* im Laufe der Entwicklung vorübergehend finden. Die Archipolypoda haben den Rückentheil eines Doppelsegmentes, der jetzt einfach ist, noch getheilt. Chilopoden und Diplopoden zweigten sich vermuthlich von einem gemeinsamen Vorfahren zu einer Zeit ab, die nicht weit vor das Erscheinen der Archipolypoda zu setzen ist, und beide sind entfernte Abkömmlinge eines *Peripatus*-ähnlichen Stammvaters.

Julidae. Auch Plateau machte die Beobachtung, dass *Blaniulus guttulatus* nicht ausschliesslich pflanzenfressend ist; obwohl er keine Augen hat, so vermag er doch Licht und Finsterniss zu unterscheiden und bevorzugt die letztere, wenn auch in geringerem Grade als die blinden Chilopoden; Bull. Soc. Entom. Belg. XXX. S. LXXXI—LXXXV.

Iulus podabrus var. *bosnensis* (B.); Latzel, Abhandl. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, S. 94, (*Ommatoiulus*, *Pachiulus*) *atticus* (Attika) S. 222, (*Allaiulus*) *impartitus* (Attika) S. 223; Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888.

J. albolineatus Luc. var. *confundens* (Rouen); Latzel, Bull. Soc. Amis Sci. natur. Rouen, 1887, proc. verb. du 3. février S. 14.

Spirobolus (*Rhinocricus*) *spinipodex* (Ecuador); Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 29, *Dominicae* (Dominica); R. J. Pocock, Ann. a. Mag. N. H. (6) II, S. 481, Pl. XVI, Fig. f.

F. E. Schulze erhielt 20—24 cm. lange lebende Exemplare von *Spirostreptus* aus Sansibar, die aus ihren Hautdrüsen ein gelbliches Sekret mit

stechendem, an unterchlorige Säure erinnerndem Geruch entleerten. Die Untersuchung ergab jedoch die Abwesenheit dieser und anderer Mineralsäuren; Sitzgsber. Gesellsch. naturf. Freunde Berlin, 1888, S. 110 f.

Sp. (Nodopyge) *dominicanus* (Dominica); R. J. Pocock, Ann. a. Mag. N. H. (6) II, S. 478, Pl. XVI, Fig. e.

Chordeumidae. *Striaria* (n. g., scutis dorsalibus, ultimo excepto, carinis in utroque latere senis instructis) *granulosa* (Beaver creek); Bollman, Ann. New-York Acad. Sci. Vol. IV, S. 108.

Atractosoma augustum (Ligurien, Grotta del Poggio, gr. della Gisetta, gr. superiore delle Grae); Latzel, Ann. Mus. Civico Genova (2) V, S. 507 mit Holzschn. und var. *hebesens* (gr. della Gisetta), var. *caecum* (gr. Lubea) S. 508

Craspedosoma carinatum (Beaver Creek); Bollman, Ann. New-York Acad. Sci. Vol. IV, S. 109, *flavidum* (Okolona, Arkansas); derselbe, Entomol. Americana, IV, S. 2.

Polydesmidae. *Polydesmus minor* (Little Rock, Arkansas) S. 2, *pinetorum* (ibid.; Arkadelphia; Okolona, etc.) S. 3; Ch. H. Bolman, Entomol. Americana, IV.

Sphaeriodesmus pudicus (Little Rock; Okolona, Arkansas); Ch. H. Bollman, Entomol. Americana, IV, S. 3.

Strongylosoma semirugosum (Dominica); R. J. Pocock, Ann. a. Mag. N. H. (6) II, S. 477, Fig. d.

Chilopoda.

B. Schaufler: Beiträge zur Kenntniss der Chilopoden; Anzeig. Kais. Akad. Wissensch. Wien, 1888, No. V, S. 44—46. (Habe ich nicht gesehen.)

Prenaut macht eine vorläufige Mittheilung über seine Observations cytologiques sur les éléments séminaux de la Scolopendre nach Untersuchungen an Scol. morsitans und Lithobius; Bull. Soc. d. Sciences de Nancy (Sér. II), T. IX, Fasc. XXI, 20e année (1887), Proc.-Verb. S. XXXf. In den Spermatogonien und Spermatocten können mehrere Fadenenden sich vereinigen und einen Körper von bestimmter Gestalt erzeugen, „der den Werth eines Nebenkerns“ hat. Für die Entstehung der Spindel aus Theilen des Kerns spricht der Umstand, dass noch bei vollständig intakter Kernmembran schon eine bipolare Anordnung der Zwischenräume des Kernnetzes erkennbar ist; die Spindelfasern sind auf dem Niveau der Aequatorialplatte durch ein achromatisches Netzwerk verbunden. Bei Beginn der Mitose kann das Chromatin längs der Spindelfäden angeordnet sein und zerfällt später in ovoide Körner, nicht in Stäbchen. Die Rückbildung der Spindel zu Ende der Theilung geht in sehr verschiedener Weise vor sich: sie streckt sich und vereinigt wie ein Schlauch die beiden Tochterzellen, oder die getrennt bleibenden Fasern bilden jede für sich eben so viele Brücken zwischen denselben, oder sie bildet sich zu einem Stiel um, der, anfangs geringelt, späterhin glatt, die beiden Tochterzellen verbindet, oder endlich sie theilt sich in 2 Hälften, deren jede einer der Tochterzellen verbleibt; die direkte Umwandlung in einen „Nebenkern“ wurde auch im letzteren Falle nicht beobachtet. S. auch in „La Cellule“, T. 3, Fasc. 3, S. 413 bis 442, mit 2 Taff.

J. Gazagnaire fand, dass die ganze Unterseite von *Orya barbara* leuchtet; Druck allein genügt, um das Leuchten hervorzurufen, und dieses ist entweder total oder auf einen oder mehrere Ringe beschränkt. Das Licht zeigt sich auf den Sternalplatten und den vorderen und hinteren Episternen; mit Hülfe einer guten Lupe entdeckt man zahlreiche Hautporen auf diesen Platten, die an den Sternen in elliptische, an den Epimeren in kreisrunde Gruppen vereinigt sind. Auf Berührung tritt aus denselben ein in Alkohol unlösliches Sekret von eigenthümlichem Geruch, das an der Luft rasch trocknet; es hat eine saure Reaktion. Dieses Sekret leuchtet mit einem bläulich-grünen Licht, und dieses Licht dauert auch eine Zeit lang fort, wenn das Sekret an andere Gegenstände abgestreift ist; Bull. Soc. Zool. France, XIII, S. 182—186. R. Blanchard bestätigt einige der vorstehenden Angaben; ebenda S. 186 und Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XCIII—XCV; CXVIII.

Könike macht den Fund eines *Geophilus sodalis* Bergs. & Mein. in einem Hühnerei bekannt; Abhandl. Naturw. Verein Bremen X, S. 294.

Geophilidae. *Geophilus tenuitarsis* (Dominica); R. J. Pocock, Ann. a. Mag. N. H. (6) II, S. 475, Pl. XVI, Fig. c. *Okolonae* (Arkansas); Ch. H. Bollman, Entomol. Americana, IV, S. 5.

Linotaenia Branneri (Little Rock, Arkansas); Ch. H. Bollman, Entomol. Americana, IV, S. 4.

Scolioptanes gracilis (Beaver Creek); Bollman, Ann. New-York Acad. Sci. Vol. IV, S. 110.

Scolopendridae. Karsch beschreibt Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 29, *Otostigma Kervillei* (Ecuador), erkennt in der früher für innerne gehaltenen Art von S. Thomé eine neue, *productum*, S. 30, und stellt eine Tabelle der Arten mit dornlosen Schenkeln der Analbeine auf, S. 30f., mit *O. muticum* (Peru) S. 31; vielleicht lassen sich aber die unterschiedenen 6 Formen innerne, *Kervillei*, *limbatum*, *Brasilense*, *sulcatum* und *muticum* nicht als selbständige Arten aufrecht halten.

O. cormocephalinum (Dominica); R. J. Pocock, Ann. a. Mag. N. H. (6) II, S. 473, Pl. XVI, Fig. a.

A. Dugès schildert die Lebensweise einer mexikanischen Scolopendra, wahrscheinlich *S. Azteca Sauss.*; Bull. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. CI—CIII.

R. J. Pocock beschreibt *Sc. valida* Luc. ausführlich und macht Bemerkungen über die verwandten Arten *Sc. prasina* C. L. Koch, *viridicornis* Newport, *gigas* Leach; Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 335—340.

Scolopocryptops Meinerti (Dominica); R. J. Pocock, Ann. a. Mag. N. H. (6) II, S. 474, Pl. XVI, Fig. b.

Die halb verschollene Gattung *Theatops* Newport ist synonym mit *Opisthomega* Wood, und die typische Art, *Th. (Cryptops) postica* Say = *O. crassipes* Meinert; R. J. Pocock, Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 283—290, Pl. XVI, Fig. 6 bis 10.

Lithobiadae. *Lithobius scotophilus* (Ligurien, Grotta del Poggio); Latzel, Ann. Mus. Civico Genova (2) V, S. 507, (*Archilithobius*) *Branneri* (Knoxville, Tennessee) S. 107, *caecus* (Beaver creek) S. 111, *similis* (Mossy creek); Boll-

man, Ann. New-York Acad. Sci. Vol. IV. grossipes *C. Koch* var. *bosnensis* (Bosnien), *spiniger* n. sp. (Bosnien); Latzel, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 1888, S. 93, (*Archilithobius*) *macrops* (Athen; Nauplia); Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 221, *pinguis* (Little Rock, Arkansas), *celer* (Arkansas) S. 7, *oedipes* (Little Rock) S. 8; Ch. H. Bollman, Entomol. Americana, IV.

Insecta.

Thysanura.

C. Parona's Note I e II sulle Collembole e sui Tisanuri in den Ann. Mus. Civico Genova (2) IV, S. 475—482 beziehen sich auf einige Arten der Gattung *Achorutes* *Templet.*, s. diese, und auf die im Trentino von Doria gesammelten (14) Arten (*Orchesilla* 2, *Tomocerus* 2, *Beckia* 1, *Lepidocyrtus* 3, *Anura* 1, *Campodea* 1, *Lepisma* 1, *Machilis* 3).

Desselben weiteren Note III e IV, ebenda VI, S. 78—86 enthalten die Beschreibung und Abbildung einer neuen Japyx-Art aus Guatemala und eines *Smynthurus* aus Sardinien.

Derselbe zählt auf (50) Collembole e (17) Tisanuri finora riscontrate in Liguria, ebenda S. 133—154, Tav. I, II (*Smynthurus* 6, *Papirius* 5, *Orchesella* 2, *Templetonia* 1, *Macrotoma* 1, *Tomocerus* 5, *Lepidocyrtus* 4, *Beckia* 1, *Seira* 3, *Entomobrya* 3 nebst 5 Varr., *Isotoma* 7, *Achorutes* 3, *Lipura* 3, *Anura* 1, *Campodea* 1, *Nicoletia* 2, *Japyx* 1, *Lepisma* 5, *Lepismina* 3, *Machilis* 5).

Dalla Torre verzeichnet die (52) Thysanuren Tirols mit Angabe ihrer Fundpunkte; Zeitschr. d. Ferdinandeums (3 F.) 32. Heft, S. 145—160.

J. Th. Oudemans' Bijdr. tot des kennis etc. (s. den vor. Ber. S. 63) sind nun auch (in deutscher Sprache) unter dem Titel Beiträge zur Kenntniss der Thysanura und Collembola in den Bijdr. tot de Dierkunde, uitgeg. d. h. K. Zoolog. Genootsch. Natura artis magistra, 16. Aflev., S. 147—226 mit 3 Taff. erschienen. Ich hebe aus der umfang- und inhaltreichen Abhandlung folgende der Erwähnung besonders werthe Punkte hervor. — Am Endgliede der Lippentaster von *Lepisma* finden sich 5 Erhöhungen von streifigem Ansehen, die an ihrem Ende von zahlreichen Oeffnungen durchbohrt zu sein scheinen; da zu dieser Stelle Nerven hinziehen, so liegt hier wahrscheinlich ein Sinnesorgan vor. — Die Bläschen am Bauche von *Machilis* werden durch den Druck der Blutflüssigkeit ausgestülpt und durch die Thätigkeit eines Muskels wieder eingezogen. Beim lebenden Thiere findet das Ausstülpen nur im Zustande der Ruhe Statt; beunruhigt zieht es die Bläschen sofort ein. Wahrscheinlich dienen sie in untergeordneter Weise (durch ihre dünne Wandung besonders dazu befähigt) der Athmung. Der Ventraltubus der Collembola ist als das Homologon des ersten Bläschenpaares der Thysanuren anzusehen. — Die beinartigen Anhänge an den Bauchringen haben viel Aehnlichkeit mit dem Hüftanhang der Beine, unterscheiden sich aber dadurch, dass sie durch einen Streckmuskel bewegt werden

können, dem Hüftanhang der Streckmuskel dagegen fehlt. — Das Nervensystem der Thysanuren zeigt (mit Ausnahme von Campodea) 8 Hinterleibsganglien, von denen das letzte aus 3 verschmolzen ist; bei den Collembola ist die Zahl der Hinterleibsganglien eine geringere in Folge von Verschmelzung, die bei den gedrungenen Formen (Sminthuren) am weitesten vorgeschritten ist. — Die Einzelaugen der zusammengesetzten Augen von Machilis haben je 4 Hypodermiszellen, 4 Krystallkegelzellen, 2 Hauptpigmentzellen und 6 Retinulazellen mit einem sechstheiligen Rhabdom; die Retinulazellen sind noch von Nebenzellen umgeben. Vor den zusammengesetzten Augen finden sich 3 Nebenaugen, deren Bau mit dem der Ocellen der übrigen Insekten übereinstimmt.

Machilis hat ein Paar röhrenförmiger Speicheldrüsen, die zwischen Unterlippe und Ligula ausmünden. Am Mitteldarm, der vorn 6 Blindsäcke nach dem Kopfe zu entsendet, findet sich wahrscheinlich eine chitinige Intima und daneben vielleicht noch ein Härichensaum der Epithelzellen. Vertiefte Stellen in dem Darmepithel deutet Oudemans als Regenerationsmittelpunkte für das Epithel. Die Zahl der Malpighi'schen Gefäße beträgt 20. — Das Herz hat 9 Ostienpaare und schwach entwickelte Flügelmuskeln.

Machilis hat 9 Stigmenpaare an Meso- und Metathorax und 2. bis 8. Hinterleibsring; die Tracheen gehen keine Anastomose ein.

Bei *M. maritima* sind 3 Paare von quergestellten Hoden vorhanden, deren jeder sein vas efferens hat. Die v. eff. entspringen an dem der Mittellinie des Körpers zugewendeten Ende des Hodens, und wenden sich nach aussen und später nach hinten. Dabei mündet das v. eff. des zweiten Hodens in das vom ersten her herabkommenden und das des dritten in das vereinigte v. eff. der beiden vorhergehenden. Das aus der Vereinigung hervorgehende vas deferens läuft nach hinten, spaltet sich in zwei Schenkel, die sich dann wieder vereinigen, so dass ein Ring entsteht; solcher Ringe folgen 5 aufeinander. Im 9. Hinterleibsring findet die Vereinigung der beiderseitigen v. def. zu dem unpaaren duct. ejac. Statt, an welchem ein kleiner Blindsack sitzt. — Die Zahl der Eierstöcke ist konstant 7 (nicht 6, wie es auf S. 221 heisst) auf jeder Seite; die Eileiter der beiden Seiten münden dicht neben einander an derselben Stelle aus, jedoch ohne dass es zu der Bildung eines gemeinsamen Endabschnittes käme; ein recept. seminis fehlt.

Die Nahrung von *M. maritima* besteht in pflanzlichen Stoffen, die sich in Zersetzung befinden. Obwohl die Art auch zur Nachtzeit munter sein mag, so ist sie doch kein Nachthier, sondern liebt im Gegentheil die Sonnenwärme.

Die eigenen Untersuchungen des Verfassers erstreckten sich vorzugsweise auf diese Art (und *Lepisma saccharina*); der Vergleich mit anderen Thysanuren und Collembola gründet sich auf die Untersuchungen Sommer's, Grassi's, Rovelli's u. a.

S. Jourdain macht eine vorläufige Mittheilung über *Machilis maritima*, die sich auf die Anhängen und die ausstülpbaren Bläschen

bezieht. Er vergleicht den Anhang an den Hüften mit dem Exopodit der Crustaceen, so dass das Bein aus einem basalen Stück mit Endopodit und ungegliedertem Exopodit bestehen würde. Der Hinterleib besteht nach ihm aus 11 Ringen, von denen der erste keine Anhänge besitzt; der letzte Ring hat nur einen langen fadenförmigen Anhang, der vermuthlich aus zweien verschmolzen ist. *Compt. Rend. hebdom. Acad. Sci., Paris*, CVI, S. 623—625.

de Bormans regte in der Soc. Entom. de Belg. die Frage an, ob Japyx zu den Orthopteren oder Thysanuren gehöre; Lameere weist auf die übereinstimmende Ansicht der neueren Autoren hin, die diese Gattung den Thysanuren zuweisen; *Bull. XXXI*, S. XCVf.

Japyx *Goliath* (Guatemala; 34 mm. lang); Parona, *Ann. Mus. Civico Genova* (2) VI, S. 78—83, mit 5 Holzschn.

Ph. Bertkau fand bei Bonn einen Japyx, der um die Hälfte kleiner ist, als der bei Bingen gefundene *J. solifugus*; welcher Art die Bonner Exemplare angehören, lässt Bertkau unentschieden. *Korrspbl. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl., Westf. u. d. R.-B. Osnabrück*, 1888, S. 92f.

Parona zieht *Achorutes similis Nicol.*, affinis *Nicol.*, similatus *Nicol.* und dubius *Templ.* zu *viaticus (L.) Templ.*, welche Art eine weite, fast kosmopolitische, Verbreitung hat, indem sie aus Grönland, Nova Sembla, Spitzbergen, Bäreninsel, Sibirien, Schweden, Irland, England, Helgoland, Frankreich, Schweiz, Oesterreich, Italien, Algier, Chili und Patagonien nachgewiesen ist. *Ann. Mus. Civico Genova* (2) IV, S. 475—480.

Seira Ferrarii (Genua); Parona, *Ann. Mus. Civico Genova* (2) VI, S. 141, Tav. I, Fig. 7.

Smynturus Doderii (Sardinien); Parona, *Ann. Mus. Civico Genova* (2) VI, S. 84 mit 5 Holzschn.

Tomocerus Doderii (Ligurien; Grotta di Suja); Parona, *Ann. Mus. Civico Genova* (2) VI, S. 139, Tav. I, Fig. 5.

Rhynchota.

A proposed classification of the Hemiptera von W. H. Ashmead in *Entomol. Americana*, IV, S. 65—69 eignet sich nicht zu einem Auszuge.

Pissot beobachtete das Auskriechen einer grossen Larve aus *Pentatoma dissimilis*, die eine Dipterenlarve zu sein schien. Da dieselbe aber zu Boden fiel und entkam, so lässt sich nichts bestimmtes darüber sagen. Die Larve verliess ihren Wirth durch den After. (*Ocyptera* und *Gymnosoma* sind als Schmarotzer von *Pentatomidea* bekannt; Refer.). — Ein in copula befindliches Paar von *P. grisen* wurde von zwei anderen Artgenossen längere Zeit belästigt; endlich kroch das eine Exemplar unter das Paar und hielt dasselbe längere Zeit auf seinem Rücken. *Bull. Soc. Entom. France*, 1888, S. CXCVf.

Vol. III von L. Provancher's *Petite faune entomologique du Canada* enthält die Hemiptera. Der Verfasser erläutert in der Einleitung den äusseren Bau und die von demselben hergenommenen Kunstausschnitte und stellt dann in analytischer Weise die Systematik

der Unterordnungen und Familien dar. Während die Parasitica ausgeschlossen sind, sind die Thysanoptera zu den Rhynchoten gezogen. Abbildungen auf den beigefügten Tafeln und im Text dienen theils zur Erläuterung der Terminologie, theils sollen sie das Erkennen der Arten unterstützen. Bis jetzt (vom 31. Aug. 1885 bis 31. Juli 1888) sind S. 1—204 nebst 4 Taf. erschienen und die Heteroptera, abgesehen von noch herauszugebenden Ergänzungen, beendet. — Dass ich erst jetzt auch über die in früheren Jahren erschienenen Lieferungen berichte, hat darin seinen Grund, dass mir erst kürzlich durch die Freundlichkeit Bergroth's eine Einsicht in dieses Werk möglich wurde.

P. R. Uhler macht Observations upon the Heteroptera collect. in southern Florida ...; Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 142f.; vgl. oben S. 6.

Enumeration of the van Volxem collection of Rhynchota contained in the Brussels' museum; by W. L. Distant; Bull. Soc. Entom. Belg., 1887, S. LVI—LXVI; 1888, S. VII—XII, LXXVIII bis LXXXIII. — Südamerikanische Arten.

J. Edwards bringt Part II seiner Synopsis of British Homoptera-Cicadina; Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 13 bis 108, Pl. III.

Derselbe macht als additional species zu den British Hemiptera Chlamydatus flaveolus Reut.; 2 bisher mit pellucida vermengte neue Liburnia-Arten, L. Reyi Fieb. und L. punctulum Kbm. bekannt, die von pallidula Boh. verschieden ist. Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 196—198.

Notes additionnelles sur les Hémiptères-Hétéroptères des environs de Gorice par O. M. Reuter; Revue d'entomolog., 1888, S. 57—61.

G. Horvath liefert Matériaux pour servir à l'étude des Hémiptères de la faune paléarctique; ebenda, S. 168—189, Pl. I. Auf S. 186—189 gibt derselbe folgende Notes synonymiques: Sternodontus obtusus Muls.-R. = (Trigonosoma) affinis Westw.; Brachynema (Pentatoma) anabasis Beck. = (Cimex) virens Klug.; Pentatoma decoratum H.-Sch. ist keine selbständige Art, sondern = Eurydema festivum var. decoratum; Centrosceliocoris (Centroscelis) spinosus Jak. = (Reduvius) desertus Beck; Deraeocoris trifasciatus var. ultramontanus Gredl. = (Capsus) var. annulatus Germ.; Poeciloscytus (Systratiotes) diversipes Horv. = Psallus ambiguus Fall. var. diversipes Horv.; Heleocoris tabidulus Stål = (Naucoris) minusculus Walk.; Notonecta nanuta Walk. = Anisops varia Fieb.

Hemiptera Amurensia enumerant E. Autran et O. M. Reuter; Revue d'entomol., 1888, S. 199—202.

Description de quatre Homoptères nouveaux d'Irkoutsk; par L. Lethierry; ebenda, S. 252—254.

Cl. Rey gibt Notes sur quelques Hémiptères-Hétéroptères et descriptions d'espèces nouvelles ou peu connues; ebenda, S. 189—198.

Heteroptera nova in Graecia ... lecta descripsit O.M. Reuter; ebenda, S. 223—228.

Zur Entwicklungsgeschichte der viviparen Aphiden hat Will an 3 Stellen seine Beobachtungen veröffentlicht, nämlich in den Sitzgsber. naturf. Gesellsch. Rostock, 24. Mai 1887, S. XII—XVIII (im Arch. d. Ver. d. Freunde der Naturgesch. in Mecklenburg, 41. Jahr), Biolog. Centralbl., VIII, S. 148—155 und ausführlicher in Zool. Jahrb., Abth. f. Anat. u. Ontog., III, S. 201—286, Taf. VI—X. — Die Vermehrung der Zellen zur Bildung des Blastoderms geschieht durchaus mittels indirekter Kerntheilung. Das Blastoderm lässt den unteren Eipol frei; am Rande dieser Stelle tritt eine lebhafte Zellwucherung ein, die Zellen lösen sich ab und wandern in den Dotter ein, somit das Entoderm einer echten Gastrula mit Blastoporus bildend. Der bis dahin reguläre Bau der Gastrula wird durch die an einer Seite des Scheitelpols auftretende Verdickung, die zur Bildung der Scheitelplatte führt, symmetrisch; aus der Scheitelplatte geht das Gehirn hervor, und sie ist demnach nach Entstehung und fernerem Schicksal der Scheitelplatte der Würmer völlig homolog. Das übrige, in die Bildung der Scheitelplatte nicht eingehende Blastoderm wird dünner und dünner und entwickelt sich zu der einen embryonalen Hülle, der Serosa.

Indem die Zellen der Blastoporuslippen sich lebhaft durch Theilung vermehren, wird zugleich der Verschluss des Blastoporus in einer Längsnath angebahnt, über welche sich der Keimstreif erheben würde. Dieser Vorgang, zu dem es in einigen abnormen Fällen kommt, wird zunächst noch vereitelt durch das Einwandern des „sekundären“ Dotters, der von dem Follikelepithel stammt und die Maschen in dem Plasmanetz der Entodermzellen ausfüllt; letztere werden aber keineswegs von ihm verdrängt. „Der Ringwulst (um den Blastoporus) wächst zu einem Zylinder aus, der an seiner Spitze die Oeffnung für den einströmenden Dotter zeigt, an seinem Grunde aber ebenso wie bei anderen Hemipteren allseitig in das Blastoderm übergeht. Die obere Oeffnung ist nichts anderes als der durch den wachsenden Keimzylinder emporgehobene, für den einwandernden Dotter offen gehaltene Rest des Blastoporus.“

Unmittelbar nach dem Auftreten des Keimstreifens, stets aber noch vor der Anlage des mittleren Keimblattes, nehmen von den noch indifferenten Zellen der der Scheitelplatte anliegenden verdickten Seite des eingestülpten Keimzylinders einige ganz bedeutend an Grösse zu, vermehren sich lebhaft durch Theilung und stellen alsdann einen rundlichen Zellenhaufen, die erste Anlage der Geschlechtsorgane dar, die ihrer Entstehung nach keinem bestimmten Keimblatte zugerechnet werden kann. Hieran schliesst sich die Bildung des Mesoderms an, welches durch einen Invaginationsprozess innerhalb einer Furche ent-

steht, die sich längs der Medianlinie der verdickten (der Scheitelplatte zugewendeten) Seite des Keimzylinders hinzieht; das ist die Stelle, an welcher der Blastoporus zum Verschluss gekommen ist. Die Bildung von Entoderm und Mesoderm dokumentiert sich demnach bei *Aphis* als zwei aufeinander folgende Stadien der Gastrulation. Bei den übrigen Insekten sind diese Vorgänge so weit auseinander gezogen, dass es scheinbar zu einer zweimaligen Gastrulation kommt.

Während nur der der Scheitelplatte zugewendete Theil der Einstülpung sich zum definitiven Keimstreif entwickelt, verdünnt sich die gegenüberliegende Wandung der Einstülpung in ähnlicher Weise zur Bildung einer inneren Embryonalhülle, des Amnion, wie es vorher mit einem grossen Theil des Blastoderm zur Bildung der Serosa geschehen war. Die Scheitelplatten sind anfänglich noch frei von einer Umhüllung; aber durch je eine sich an beiden Enden erhebende Falte, die einander entgegenwachsen und verschmelzen, kommt es auch hier zur Bildung einer Hülle. Die Falten erheben sich da, wo die Scheitelplatte mit der Serosa zusammenhängt, und wo diese und das Amnion sich begegnen. Die Invagination des Keimstreifens bei Insekten mit einem Keimstreif hat nicht den Zweck, die Embryonalhüllen zu bilden, sondern ist bedingt durch das Längenwachsthum eines Anfangs kurzen Keimstreifens.

Die Segmentierung beginnt mit dem Auftreten von Furchen in der Mesodermplatte an den Stellen, wo die Segmentgrenzen liegen. Dann theilt sich die unpaare Mesodermplatte in zwei laterale Stränge, welche die Mittellinie vollständig frei machen und nur in der Gegend des zukünftigen Mundes zusammenfliessen; hier bleibt das Mesoderm stets unpaar. Der präorale Theil des Kopfes ist ursprünglich frei von Mesoderm; er erhält solches, indem von der vorderen unpaaren Masse zwei Mesodermfortsätze in ihn hineinwachsen.

Mit dem Auftreten der Extremitätenanlagen rücken die Mesodermstränge des Rumpfes in diese hinein; die Kopffortsätze des Mesoderm rücken in die Antennen. Sämmtliche Segmenthöhlen entstehen als Faltungen einer einschichtigen Mesoderm-lamelle, nicht als ein Spalt in einem mehrschichtigen Mesoderm. Die Segmenthöhlen sind demnach gegen die Medianebene des Körpers zu offen, und der vollständige Abschluss der Leibeshöhle wird dadurch hergestellt, dass das Mesoderm aus den Extremitäten herauswächst, indem die ventrale Lamelle die Bauchseite, die dorsale die Rückenseite überzieht. Ursprünglich sind die Mund- und Enddarmeinstülpung frei von Mesoderm; der Darm wird erst später von Mund und After her von Mesoderm überzogen. Indem Entodermzellen sich zusammenschliessen und an die Mund- und Enddarmeinstülpung anlegen, wird der Mitteldarm gebildet. Alle hierzu nicht aufgebrauchten Entodermzellen werden, soweit sie nicht im sekundären Dotter zurückbleiben, zur Bildung des Fettkörpers und der Blutzellen verwandt. Das Mesoderm liefert die Peritonealhülle des Darmes, das Herz und die Muskulatur. Das Ektoderm bildet die Tracheen, das Epithel von

E*

Mund- und Enddarm, die Haut mit ihren Sinnesorganen und das Nervensystem.

O. M. Reuter nimmt eine Synonymische Revision der von den älteren Autoren (Linné 1758 — Latreille 1806) beschriebenen Paläarktischen Heteropteren vor; Acta Soc. Scient. Fennicae T. XVI, S. 243—313, 445—812. Der Zweck dieser mühevollen Arbeit ist, eine feste Nomenklatur der Wanzen einzuführen, und so ist der erste Theil ausschliesslich der Darlegung der Regeln gewidmet, welche in der wissenschaftlichen Nomenklatur nach den Ansichten des Verfassers zur Anwendung kommen sollten. Die Regeln sind so ziemlich dieselben, wie die von Staudinger in seinem Schmetterlings-Kataloge ausgesprochenen und fliessen aus einer vernunftgemässen, konsequenten Anwendung des Prioritäts-Prinzips. Nur in einem Falle ist Reuter geneigt, das Prioritäts-Prinzip zu opfern, wenn nämlich der (unberechtigte) jüngere Name in andere wissenschaftliche oder gar gewerbliche Kreise Eingang gefunden hat. Die eigentliche Revision enthält (einschliesslich mehrerer nicht zu deutender älterer Arten) die Synonymie von 396 Arten. Bei folgenden Arten ist in Ausführung der aufgestellten Regeln eine Aenderung in der Benennung eingeführt: *Eurygaster nigro-cucullatus* (Goeze) S. 452 (= *hottentotus* Fieb. etc.), *hottentotus* (F.) S. 453 (= *maroccanus* Germ., Fieb. etc.); *Trigonosoma rusticum* (F.) S. 457 (= *nigellae* Burm.); *Ancyrosoma leucogrammes* (Gmel.) S. 459 (= *albolineata* F., aut.); *Dyroderes umbraculatus* (F.) S. 476 (= *marginatus* Pz., aut.); *Stagonomus italicus* (Gmel.) S. 481 (= *bipunctatus* F., aut.); *Eusarcoris venustissimus* (Schränk) S. 482 (= *melanocephalus* F.); *Rhaphigaster sagittifer* (Goeze) S. 499 (= *griseus* Pet., aut.); *Mesocerus* (n. g.) *marginatus* S. 528 (= *Syrom. marg.*; der Name *Syrom. astes* wird für *quadratus*, *rhombeus*, *sulcicornis* an Stelle von *Verlusia* angenommen); *Gonocerus acutangulatus* (Goeze) S. 532 (= *venator* F.); *Megalotomus junceus* (Scop.) S. 534 (= *limbatus* H.-Sch.); *Rhopalus subrufus* (Gmel.) S. 543 (= *capitatus* F.); *Eulygaeus* (n. g.) S. 550 (= *Lygaeus equestris*, *pandurus*, *saxatilis* etc.; die Gattung *Lygaeus* wird für *leucopterus* zurückbehalten, für welchen erst vor kurzem die Gattung *Melanospilus* errichtet war); *Stygnocoris fuliginus* (Geoffr. in Fourcr.) S. 565 (= *arenarius* Hahn); *Pachymerus confusus* S. 575 (= *pineti* Fieb. nec H.-Sch.); *Beosus quadripunctatus* (Müll.) S. 576 (= *erythropterus* Brull., *pulcher* H.-Sch.); *Gastrosdes grossipes* (De Geer) S. 583 (= *ferrugineus* L.); *Heterogaster catarinae* (Geoffr. in Fourcr.) S. 588 (= *Nepetae* Fieb.); *Dictyonota tricornis* (Schränk) S. 591 (= *crassicornis* Fall.); *Catoplatus carthusianus* (Goeze) S. 596 (= *Eryngii* Latr.); *Monanthia Echii* Schrank S. 597 (= *Humuli* Fall., *Wolffii* Fieb.), *M. rotundata* H.-Sch. S. 599 (= *Echii* Burm., aut.); *Megaloceraea recticornis* (Geoffr. in Fourcr.) S. 611 (= *longicornis* H.-Sch., aut.); *Calocoris ochromelas* (Gmel.) S. 622 (= *strictellus* F.), *C. biclavatus* H.-Sch. S. 624 (= *bifasciatus* Hahn), *C. hispanicus* (Gmel.) S. 626 (= *sempunctatus* F.), *C. salviae* Hahn S. 627 (= *affinis* H.-Sch.), *C. norvegicus* (Gmel.) S. 629 (= *bipunctatus* F.), *C. lineolatus* (Goeze) S. 632 (= *Chenopodii* Fall.); *Homodemus* *M. flavum* (Goeze) S. 633

=)marginellus F.); *Lygus* (Orthops) *campestris* (L.) S. 641 (= *Pastinacae* Fall., aut.); *Deraeocoris* *seguinus* (Muell.) S. 649 (= *capillaris* F.); *Acanthia* (= *Salda*) *Muelleri* (Gmel.) S. 690 (= *flavipes* F.); *Leptopus* *marmoratus* (Goeze) S. 695 (= *boopis* Geoffr.), *L. spinosus* (Rossi) S. 696 (= *echinops* Duf.); *Ploiariola* (= *Ploearia* olim, für *vagabunda*, *culiciformis*; der Name *Ploiaria* wird für *Emesodema domesticum* beibehalten) S. 711.

Parasitica.

Piaget beschreibt Quelques nouvelles Pédiculines (d. h. Mallophagen); Tijdschr. v. Entom. XXXI, S. 147—164, Pl. 3, 4.

Colpocephalum eurygaster (auf *Leptoptilus argala*) S. 162, Pl. 4, Fig. 5, *tibiale* (auf *Tantalus senegalensis*) S. 163, Fig. 6; Piaget a. a. O.

Docophorus acuminatus (auf *Turacus purpureus*) S. 147, Pl. 3, Fig. 1, *sulcatus* (auf *Ardea minuta*) S. 148, Fig. 2, *truncatus* (auf *Aulacorrhynchus rubrogularis*) S. 149, Fig. 3; Piaget a. a. O.

Echinophthirius microchir (Auckland, auf *Phocarcotus Hookeri*); Trouessart & G. Neumann, Le Naturaliste, 1888, S. 80 mit Holzschn. — Dieselben erwähnen auch einen 1886 von Becker beschriebenen *E. groenlandicus* von *Phoca groenlandica* bei Jan Mayen.

Gonicotes crassipes (auf *Talegalla Cuvieri*); Piaget a. a. S. 154, Pl. 3, Fig. 7,

Lipeurus (monilis) *Nitzsch* S. 155, Pl. 3, Fig. 8), *quadripustulatus* (auf *Hydrornis maxima*) S. 156, Fig. 9, *bicolor* (auf *Tantalus senegalensis*, vielleicht Varietät von *L. versicolor* vom Storch) S. 157, Pl. 4, Fig. 1, *rotundatus* (auf *Podoa senegalensis*) S. 159, Fig. 2, *breviceps* (auf *Camptolaemus cinereus*) S. 160, Fig. 3; Piaget a. a. O.

Ueber Menopon perale *Leidy* (vielleicht = *titan* oder *consanguineum* Piag.) s. *Leidy*, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1888, S. 167 f.

M. pachypus (auf *Sterna hirundo*); Piaget a. a. O. S. 161, Pl. 4, Fig. 4.

Nirmus grandiceps (auf *Penelopides Manillae*) S. 150, Pl. 3, Fig. 4, *laticeps* (auf *Aulacorrhynchus rubrogularis*) S. 152, Fig. 5; Piaget a. a. O.

Oncophorus major (auf *Ocydromus La Fresnayanus*); Piaget a. a. O. S. 158, Pl. 3, Fig. 6.

Phytophthires.

Coccidae. A. C. F. Morgan theilt Observations on Coccidae mit; Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 42—48, Pl. I, 118—120, Pl. II.

J. W. Douglas macht Notes on some British and Exotic Coccidae (No. 9—12) ebenda, S. 57—60, 86—89, 124—125, 150—153. (*Lecanium Lauri* verschieden von *hesperidum*; *L. bituberculatum* Targ.-Tozz.; *Vinonia stellifera* Westw. = *pulchella* Sign.; die übrigen sind Beschreibungen neuer Arten.

Kraatz ersetzt den Namen *Westwoodia* Sign., da er bereits 1878 für eine Cetonidengattung eingeführt sei (thatsächlich ist er ausserdem noch vier Mal angewendet) durch *Signoretia* und übersieht dabei, dass auch dieser Name bereits 1860 von Stål für eine Rhynchoten-Gattung angewendet ist; Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 176. Hierauf durch Bergroth aufmerksam gemacht, schlägt er für *Westwoodia* Sign. *Bergrothia* vor; ebenda S. 360.

Aleurodes xylostei Westh. (s. d. vor. Ber. S. 66) ist wohl sicher = *A. Loniceræ* Walk.; F. Karsch, Entom. Nachr., 1888, S. 31.

A. Ribium (England, auf *R. rubrum* und *nigrum*); J. W. Douglas, Entom. Monthl. Mag. XXIV, S. 265 mit Holzschn.

Aspidiotus zonatus Frauenf., by A. C. F. Morgan; Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 205—208.

Coccus Agavium (auf einer nordamerikanischen Agave; Weibchen mit 7, Männchen mit 10 Fühlergliedern); Douglas a. a. O. S. 150 mit 4 Holzschn.

Dactylopius destructor Comst. = *Lecanium phyllococcus* Ashm. = (*Coccus*) *Citri* Boisd.; Insect life, I, S. 118.

Icerya Purchasi in ihren Entwicklungszuständen beschrieben und abgebildet, mit Aufzählung der natürlichen Feinde, von Riley, Insect life I, S. 126 bis 131 mit 6 Holzschn.

F. Westhoff: Die Männchen der Schildlaus (*Lecanium hesperidum*); Referat nach Moniez; s. d. vor. Ber. S. 65.

L. chypeatum (auf *Adiantum capillus Veneris*); Douglas a. a. O. S. 58.

Ortonia Natalensis (N.); Douglas a. a. O. S. 86 mit Holzschn.

Pseudococcus Ulicis (Blackheath, auf *U. europæus*); Douglas a. a. O., S. 88, mit 2 Holzschn., *Ulm* (Brockley, auf *U. camp.*) S. 124 mit 2 Holzschn.; derselbe ebenda.

Orthezia insignis (Kew, auf der chinesischen *Strobilanthes*); Douglas, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 169 mit 4 Holzschn.

„Westwoodia“ *Hordei* n. sp. Lindeman; s. Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 176; vgl. oben S. 69.

Aphididae. O. W. Oestlund stellt eine Synopsis of the Aphididae of Minnesota zusammen; Bulletin geol. and nat. hist. survey of Minnesota, No. 4, S. 1—100. Auf eine morphologische Einleitung folgt eine Uebersicht der amerikanischen Literatur über die Blattläuse und dann die eigentliche Synopsis der Aphiden, die in die Unterfamilien Rhizobiinae, Chermesinae, Pemphiginae, Schizoneurinae, Lachninae, Aphidinae (letztere mit den Tribus Callipterini, Aphidini, Nectarophorini) getheilt werden. Der Beschreibung der Arten aus Minnesota ist am Schluss jeder Unterfamilie ein Verzeichniss der übrigen nordamerikanischen Aphiden angeschlossen. Eine Aufzählung nordamerikanischer Pflanzen mit Angabe der von ihnen heimgesuchten Blattlausarten bildet den Schluss dieser Synopsis, die aus Minnesota 99 Arten namhaft macht.

Von mehreren Siphonophora-Arten beobachtete Oestlund ungeflügelte Männchen.

D. M. P. Graells. — Teorias, suposiciones, discordancias, misterios, comprobaciones é ignorancias sobre cuestiones biológico-ontogénicas y fisiológicas de los Afidios; Mem. de la R. Acad. de Ciencias exactas, físicas etc., XIII, Madrid, 1887. — Die Arbeit enthält die Beschreibung einer auf *Daucus carota* lebenden Aphide, wahrscheinlich der *Forda Dauci Goureaux*, die später zur Gattung *Aphis* gerechnet wurde. Die ungeflügelten parthenogenetisierenden Exemplare leben an der Wurzel, die geflügelten, aus Nymphen der Wurzelform sich entwickelnden, ebenfalls parthenogenetisch sich fortpflanzenden auf den oberirdischen Pflanzentheilen; eine geschlechtliche Form fehlt in dem Entwicklungskreis dieser Art.

Der Verfasser beschäftigt sich dann weiter mit der Frage der Wanderung gewisser Aphiden und bekämpft die Annahme der Verjüngung durch die Geschlechtsformen und der praktischen Bedeutung des Wintereies von *Phylloxera vastatrix*. Eine schöne kolorierte Tafel illustriert die Beschreibung. (Nach dem Referat im Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 243 f.)

Mieren en bladluizen, door Dr. H. Bos; Tijdschr. v. Entomologie, 81, S. 235—242. Bos kam auf den Gedanken, dass die von Ameisen „gemolkenen“ Blattläuse sich durch Aufnahme neuen Pflanzensaftes schadlos halten und also der Pflanze mehr Schaden zufügen würden. Er prüfte diese Ansicht, indem er von einer Anzahl mit *Aphis Papaveris* besetzten Pflanzen von *Vicia Faba* die Ameisen fern hielt, zu einer anderen Anzahl ein Nest von *Lasius niger* setzte. Die ersteren brachten reichlicher und schwereren Samen zur Reife, und die Anwesenheit von Ameisen auf Pflanzen, die mit Aphiden besetzt sind, ist daher den Pflanzen nachtheilig.

Mastopoda (n. g. Aphidin.; antennae 6-artic.; tarsi atrophii) *Pteridis* (Minnesota, auf *Pt. aquilina*); Oestlund, 14th. annual report geol. a. nat. hist. survey of Minnesota S. 58 und a. a. O. S. 49.

Macrosiphum! (n. g. Nectarophorin.; tubuli melliferi incrassati; prothorax tuberculo laterali; alae apice infuscae) *rubicola* (Minnesota; auf *Rubus strigosus*); Oestlund, 14th. annual rep. geol. a. nat. hist. survey of Minnesota S. 27 und a. a. O. S. 78.

Monellia n. g. Callipterin. für (*Aphis*) *caryella* Fitch; Oestlund a. a. O. S. 44.

Aphis albipes (auf *Symphoricarpos vulgaris*) S. 52, *Trifolii* (an den Wurzeln von *Tr. repens*) S. 55, *Mimuli* (auf *M. Jamesii*) S. 57, *Monardae* (auf *M. fistulosa*), *Thaspii* (auf *Th. aureum*) S. 58, *Neilliae* (auf *N. opulifolia*) S. 59, *rubicola* (auf *Rubus strigosus*) S. 60, *maculatae* (auf *Cornus paniculata*) S. 61, *Oxybaphi* (auf *O. angustifolius*), *Oenotherae* (auf *Oenothera*) S. 62, *Spiraeae* (auf *Sp. salicifolia*) S. 68; Oestlund a. a. O., *Marutae* (auf *M. cotula*) S. 40, *Eupatorii* (auf *E. perfoliatum*) S. 39, *ripariae* (auf *Vitis riparia*) S. 41, *frigidae* (auf *Artemisia frigida*) S. 46, *Adianthi* (auf *A. pedatum*) S. 26, *annuae* (auf *Poa annua*) S. 43, *frondosae* (auf *Bidens frondosa*) S. 38, *Polanisiae* (auf *P. graveolens*) S. 42, *ageratoidis* (auf *Eupatorium ageratoides*); derselbe, 14th. annual report geol. and nat. hist. survey of Minnesota.

Chaetophorus spinosus (auf Eiche), *nigrae* (auf *Salix nigra*); Oestlund, 14th. ann. rep. geol. a. nat. hist. survey of Minnesota S. 49 und a. a. O. S. 38, 40.

Cholodkovsky schreibt über einige Chermes-Arten, deren Bezeichnung der Einfachheit halber nach ihren Nährpflanzen *Ch. cembrae* und *pectinatae* sind; Zool. Anz., 1888, S. 45—48. Unter Wollflocken überwintern an *Pinus cembra* ungeflügelte Weibchen der ersteren Art, die in der zweiten Hälfte des April gestielte Eier ablegen. Mitte Mai sind schon geflügelte Individuen da, die ihre Eier an die Nadeln absetzen. Aus denselben entwickeln sich gelbbraune ungeflügelte Individuen, die Cholodkovsky für die Geschlechts-generation ansieht. — An *Abies pectinata* fand der Verfasser im Winter auf der Unterseite der Nadeln Wollhäufchen, in denen sich neben Häuten der Läuse einige Eier befinden. Aus diesen kommen im Frühjahr ungeflügelte Läuse zum Vorschein, die an der Stelle bleiben und Ende Mai geflügelten Individuen Platz machen. In den überwinternden Eiern der letzteren Art vermuthet der Verfasser die befruchteten Eier.

Hormaphis papyraceae (Minnesota, auf *Betula papyracea*); Oestlund a. a. O. S. 19.

Melanoxanthus bicolor (Minnesota, auf Weiden und Pappeln), Oestlund a. a. O. S. 86.

Nectarophora fulvae (auf *Impatiens fulva*), *Geranii* (auf *G. maculatum*) S. 80, *Cynosbati* (auf *Ribes cynosbati*), *purpurascens* (auf *Thalictrum purpurascens*) S. 81, *Potentillae* (auf *P. anserina*) S. 83, *pallida* (auf der wilden Rose) S. 84; Oestlund a. a. O., *ludoviciana* (auf *Artemisia ludovic.*) S. 23, *Corydalis* (auf *C. aurea*) S. 25, *frigidae* (auf *Artemisia frigida*) S. 20, *Chrysanthemi* (auf *Bidens chrysanthemoides*) S. 22; derselbe, 14th. annual rep. geol. a. nat. hist. survey of Minnesota.

Bei Münster kommen an Pappeln die Gallen von 4 Pemphigus-Arten (*P. spirothecae*, *bursarius*, *marsupialis* und *affinis*) vor; Jahresb. zool. Sekt. westf. Prov.-Ver. 1887—88, S. 38.

Further notes on the hop plant-louse (*Phorodon Humuli*) s. in Insect life, II, S. 70—74; 133—136 mit 5 Holzschn.

O. Geise: Die Reblausgefahr; Samml. gemeinverst. wissensch. Vorträge, herausg. von Virchow und v. Holtzendorff, N. F., 3. Ser., Heft 57.

E. Haase: Über den Einfluss des Hungerns auf die Entwicklung der Thiere, mit Berücksichtigung der Reblausfrage; Sitzgsber. in Abhandl. d. naturw. Ges. „Isis“ in Dresden; 1888, Sitzgsber. S. 3—5.

G. Wilhelm: Die Reblaus (Vortrag); Mitth. naturw. Ver. f. Steiermark, Jahrg. 1887, S. 127—149.

Wegener hielt gleichfalls einen Vortrag über die Reblaus; Schrift. d. naturwiss. Vereins des Harzes in Wernigerode, III, S. 61f.

H. F. Kessler: Weitere Beobachtungen und Untersuchungen über die Reblaus . . .; Cassel, 1888; S. 1—58.

In Fortsetzung seiner Untersuchungen beschreibt V. Lemoine das Gehirn etc. der geflügelten Form von *Ph. punctata*; Compt. Rend. hebdom. Acad. Sci., Paris, CVI, S. 678—680.

Phylloxera prolifera (Minnesota, in Gallen von *Pemphigus populicaulis* Fitch auf *Populus monilifera*); Oestlund a. a. O. S. 16.

Chr. Aurivillius fand auf Tannen im Roslagen die seltene und fast verschollene *Physochermes hemicyphus* Dalm. wieder; Entom. Tidskr., 1888, S. 124.

Rhopalosiphum serotinae (Minnesota, auf *Solidago serotina*); Oestlund a. a. O. S. 76, *Nabalis* (auf *N. albus*); derselbe, 14th. ann. rep. geol. a. nat. hist. survey of Minnesota S. 84 und a. a. O. S. 77.

Rh. maidis wird von 8 Ameisenarten gepflegt: *Lasius flavus*; Formica Schaufussii und fusca; Americ. Naturalist, 1888, S. 753.

Schizoneura Crataegi (Minnesota, auf *Cr. punctata*); Oestlund a. a. O. S. 27.

C. M. Weed beobachtete ungeflügelte Männchen bei *Sch. cornicola*, ferner bei der Wurzelform von *Aphis Maidis* und bei einer auf *Amaranthus albus* lebenden *Aphis*-Art; Americ. Naturalist, 1888, S. 70.

Sch. compressa Koch (verschieden von *Tetraneura alba* Ratzeb.) bei Halle auf *Ulmus effusa*; v. Schlechtendal, Zeitschr. f. Naturwissensch., Halle, LXI. (4. F. VII), S. 436f.

Siphocoryne Archangelicae (Minnesota, auf *A. atropurpurea*), *Xanthii* (auf

X. canadense); Oestlund, 14th. ann. rep. geol. a. nat. hist. survey of Minnesota S. 86 und a. a. O. S. 70, 71.

Tychea radicola (an den Wurzeln von *Ambrosia trifida*); Oestlund, 14th. ann. rep. geol. a. nat. hist. survey of Minnesota S. 86 und a. a. O. S. 14.

Psyllidae. F. Loew gibt eine Übersicht der Psylliden von Österreich-Ungarn mit Einschluss von Bosnien und der Herzegowina, nebst Beschreibung neuer Arten; Abh. Zool. Bot. Gesellsch. Wien 1888, S. 5—40. Diese Aufzählung enthält (einschliesslich 6 nicht genau benannter) 123 Arten, also mehr als 70 %, der aus der paläarktischen Region bisher überhaupt bekannten (167) Arten. Bei den einzelnen Arten ist Erscheinungszeit, Nährpflanze, Verbreitung, ob sie überwintern u. s. w. angegeben.

P. M. Ferrari. Psillide raccolte in Liguria: Res ligusticae V. Ann. Mus. Civ. Genova (2) VI, 7 Marzo 1888.

Aphalara conopsea (Langenfeld, Südungarn); F. Löw a. a. O. S. 81.

Psylla colorata (Görz) S. 32, *intermedia* (ibid.) S. 33; F. Löw a. a. O.

Trioxa (*alpestris* Lw. = *acutipennis* Zett.), *versicolor* (Südungarn), S. 34, *agrophila* (Niederösterreich, in Blattrandrollungen von *Cirsium arvense*) S. 35, *Saxifragae* (Steiermark, auf *S. aizoon*) S. 36, *Thomasii* (Tirol, auf *Homogyne alpina*) S. 37 (*acutipennis* Zett. Larve) S. 39; F. Loew a. a. O.

Über *Tr. Centranthi* s. Dalla Torre, 17. Ber. naturw.-mediz. Ver. Innsbruck, Vereinsnachr., S. 4.

Homoptera.

Jassidae. *Aconura sibirica* (Irkutsk); L. Lethierry, Revue d'entomol., 1888, S. 252.

Aphrophora similis (Irkutsk); L. Lethierry, Revue d'entomol., 1888, S. 252.

Athysanus Jakowleffi (Irkutsk); L. Lethierry, Revue d'entomol., 1888, S. 253.

Deltocephalus acarifer (Irkutsk); L. Lethierry, Revue d'entomol., 1888, S. 253.

Typhlocyba Hippocastani (Lewisham), *avellanae* (ibid.) S. 157, *opaca* (ibid., auf *Aesc. Hippocast.*), *Pruni* (Norwich, auf *P. domestica*); J. Edwards, Entom. Monthl. Mag., XXV.

Fulgoridae. *Prolystra lithographica* (lithogr. Schiefer); Oppenheim, Palaeontogr. 34, S. 228, Taf. XXXI, Fig. 1.

J. Edwards gibt eine Übersicht der Englischen Cixius-Arten, wobei er das frühere Scott'sche Verzeichniss zu Grunde legt; die von Scott irriger Weise für *simplex* H.-Sch. und *similis* Kschbm. gehaltenen Arten sind *Scotti* und *remotus* genannt, S. 100; Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 100f.

Die Additional notes on the lantern-fly of Brazil von J. C. Branner bestehen in der Übersetzung eines in dem Liberal Mineiro, Ouro Preto, Prov. Minas Geraës, 19. Dec. 1885 erschienenen Artikels, der ebenfalls ausführt, dass die Bevölkerung Brasiliens vor dem Laternenträger eine abergläubische Furcht hat; vergl. dies. Bericht für 1885, S. 115; Trans. New-York Acad. Sci., VII, S. 66—68.

Liburnia difficilis, discreta (England, bisher unter *pellucida* vereinigt, aber an der Gestalt des Penis leicht zu unterscheiden); J. Edwards, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 197 mit Holzschn.

Orgerius conspersus (Batna) S. 107, *albofasciatus* (Algier) S. 108; A. Puton, Revue d'entomol., 1888.

Tettigometra sulphurea Muls.-R. var. *mendax* (Ungarn; Serbien); G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 186.

Cicadidae. W. L. Distant liefert Descriptions of new species of Oriental Homoptera belonging to the family Cicadidae; Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 291—298, 370—376; II, S. 323—325.

P. R. Uhler gibt eine preliminary survey of the Cicadae, of the United States; Entomol. Americana, IV, S. 21—23, 81—85.

W. H. Ashmead stellt a generic synopsis of the Cicadidae auf; ebenda S. 140f.

Eocicada microcephala (lithogr. Schiefer); Oppenheim, Palaeontogr. 34, S. 229, Taf. XXXI, Fig. 30.

Platypedia! n. g. (vox hybrida!) für (*Cicada*) *areolata* Uhl. und *Putnami* Uhl.; P. R. Uhler, a. a. O., S. 23, und *Pl. minor* (S. Kalif.) S. 81.

Notes on the oviposition of the Buffalo tree-hopper von C. L. Marlatt schildern das Eierlegen von *Ceresa bubalus*, die ihre Eier in Packeten von 6—12 Stück unter die Rinde von Apfelbäumen bringt. Je zwei Packete werden so neben einander gelegt, dass zwischen ihnen ein Raum von etwa der Dicke eines Eies bleibt. Transact. Kansas Academy of Science, X, S. 84f. mit Abbild. auf S. 83.

The periodical Cicada in 1888; in Wisconsin, Iowa, Illinois, Indiana, Michigan, Pennsylvania ist die 17jährige Brut (1854, 1871, 1888), in Texas die 13jährige (1849, 1862, 1875, 1888) aufgetreten; Insect life, I, S. 31.

C. elopurina (Borneo) S. 297, *pontianaka* (ibid.) S. 298; W. L. Distant, a. a. O. I.

Cicadetta continuata (Quetta), *literata* (Kaschmirthal); W. L. Distant a. a. O., I, S. 375.

Cosmopsaltria nigra (Philippinen) S. 292, *umbrata* (Sikkim), *lauta* (Pontianak) S. 293, *Minahasae* (Celebes; Ceram; Menado) S. 294, *sihetana* (S.), *jacoona* (Johore) S. 295, *Pigafettiae* (Ternate) S. 371; W. L. Distant, a. a. O. I, *albostrata* (Philippinen); derselbe, ebenda, II, S. 324.

Cryptotympana Limborgi (Tenasserim); W. L. Distant, a. a. O. I, S. 296, *epithesia* (Borneo); derselbe, ebenda, II, S. 325.

Dundubia aerata (Elopura), *tavoyana* (Tavoy), *similis* (Sikkim); W. L. Distant, a. a. O., I, S. 292.

Goeana delinenda (Cochin); W. L. Distant, a. a. O., I, S. 291.

Fumouze erwähnt, dass *Huechys sanguinea* in ihrer Heimath (China) als Mittel gegen Tollwuth angewendet werde. Während aber der Erfolg in dieser Hinsicht zweifelhaft ist, besitzt die Art einen auf den Urogenitalapparat wirkenden Stoff. Die Versuche, diesen rein darzustellen, misslangen bis jetzt; dagegen lässt sich der rothe Farbstoff (*Huechys*-Roth), der dem Hinterleib dieser Thiere die prächtige Farbe verleiht, ausziehen. Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XXII f.

H. suffusa (Java); W. L. Distant, a. a. O. I, S. 291.

Leptopsaltria picturata (Nilgirri H.), *andamanensis* (A.-I.); W. L. Distant, a. a. O., I, S. 370.

Pomponia solitaria (Andaman-I.) S. 295, *obnubila* (Simla) S. 296, *collina* (Nilgirri H.) S. 371, *Ranssonneti* (Colombo) S. 372; W. L. Distant, a. a. O., I.

Prasia princeps (Nordöstl. Celebes); W. L. Distant, a. a. O., II, S. 825.

Proarna valvata (Texas; Arizona); P. R. Uhler, Entomol. Americana, IV, S. 84.

Prunasis venosa (Texas); P. R. Uhler, Entomol. Americana, IV, S. 82.

Tibicen amussitatus (Darjiling), *Acheri* (Kaschmirthal) S. 373, *reticulatus* (Gilgit), *casyapae* (Kaschmirthal) S. 374; W. L. Distant, a. a. O. I., *tigrinus* (Kulluur); derselbe, ebenda, II, S. 325.

Tosena depicta (Borneo); W. L. Distant, a. a. O., II, S. 323.

Heteroptera.

Nepidae. E. v. Ferrari bearbeitete die Hemipteren-Gattung *Nepa* Latr. in monographischer Weise; Ann. K. K. Naturhist. Hofmuseums III. S. 161 bis 194, Taf. VIII, IX. Der Verfasser nimmt die Gattung in dem Umfange an, den Latreille ihr gab, also mit Einschluss der von Stål aufgestellten Gattungen *Telmatotrepes*, *Curicta*, *Borborophilus*, *Laccotrepes*, *Borborophyes* und der Gattung *Helotenthos* Berg. Diese „Gattungen“ kann nämlich der Verfasser nicht mit *Nepa* und *Ranatra* als gleichwerthig erachten, und die zu ihrer Unterscheidung angegebenen Merkmale reichen manchmal noch nicht zur Feststellung von Artengruppen aus; bei *Borborophyes* Mayri und *Telmatotrepes* bezweifelt er sogar, ob diese Formen Imaginet sind.

Von dem Körperbau der Gattung wird nun eine genaue Beschreibung gegeben, wobei diejenigen Theile, welche für die Artunterscheidung besonders wichtig sind, ausführlicher behandelt werden.

Ein *Conspectus specierum* weist 85 Arten auf, darunter folgende neue: *N. spinigera* (Malacca), S. 175, *Rogenhoferi* (Comoren), *rapax* (Chartum, Madagaskar) S. 178, *eusoma* (Kalkutta) S. 179, *Steindachneri* (Wadai) S. 180, *dubia* (Indien; China) S. 181, *ingens* (Brasilien?), *Archipelagi* (Batavia; Sumatra; Borneo; Indien) S. 183, *anonyma* (Java; Sumatra) S. 184, *Pfeiseriae* (Indien) S. 187, *Stalii* (Südafrika) S. 188, *Gredleri* (Port Natal) S. 189. Die dem Verfasser unbekannt gebliebenen Arten anderer Autoren sind mit den Worten des ersten Beschreibers aufgeführt; Ferrari selbst hält die eine oder andere der von ihm als neu beschriebenen Arten vielleicht für synonym mit einer der letzteren.

Hydrometridae. *Halometra* n. g. für (*Pygolampis*, *Chresmoda*) obscura Germar; Oppenheim, Palaeontogr. 34, S. 230 und ? *minor* S. 233, Taf. XXXI, Fig. 4.

Aëpophilus Bonnairii lebt wahrscheinlich von unterseeischen thierischen Stoffen; die Art wurde auch bei Plymouth gefangen; Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 174.

Naucoridae. *Naucoris carinata* (lithogr. Schiefer); Oppenheim, Palaeontogr. 34, S. 235, Taf. XXX, Fig. 14.

Sphaerodema jurassicum (lithogr. Schiefer); Oppenheim, Palaeontogr. 34, S. 235, Taf. XXXI, Fig. 10.

Saldidae. *Acanthia* (d. h. Salda) *hirsuta* (Illyrien); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 60, *variabilis* H.-Sch. var. *connectens* (Zilah, Ung.); G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 179, *melanoscela* Fisch. var. *pallidipennis* (Elis); O. M. Reuter, ebenda S. 226.

Reduviadae. *Coranus rugosicollis* (Biskra); A. Puton, Revue d'entomol., 1888, S. 105.

Darbanus palliatus (Ottawa); L. Provancher, a. a. O., S. 182.

Euagoras marginata (Ottawa); L. Provancher, a. a. O., S. 182.

F. Pascoe beobachtete bei Pará eine Ghilianella-Art, die ihre Jungen auf dem Rücken trug; der lange, dünne Hinterleib der letzteren war dabei um den Thorax gewickelt (coiled round the thorax); Proc. Entom. Soc. London, 1888, S. I.

Harpactor sanguineus var. *albiventer*, *iracundus* var. *rubricus* Germ.; Cl. Rey, Revue d'entomol., 1888, S. 194.

Oncocephalus similimus (Chabarofka); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 201.

Pygolampis bidentata var. *obscuripes* (Bresse); Cl. Rey, Revue d'entom., 1888, S. 194.

Stenolemus Novaki (Lesina; der erste Vertreter dieser Gattung in Europa); G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 178, Pl. I, Fig. 7.

Ceratocombidae. *Henschiella* (n. g.) *pellucida* (Herzegowina); G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 170, Pl. I, Fig. 1.

Cryptostemma medium (Fréjus); Cl. Rey, Revue d'entomol., 1888, S. 195.

Anthocoridae. *Montandoniella* (n. g. prope *Ectemnum*) *dacica* (Bukarest); A. Puton, Revue d'entomolog., 1888, S. 256.

Brachysteles dubius Reut. ist eine kurzflügelige Form von *parvicornis* Costa; Cl. Rey, Revue d'entomol., 1888, S. 197.

Cardiastethus nazarenus Reut. in Frankreich (Fréjus; St. Raphaël); Cl. Rey, Revue d'entomol., 1888, S. 197.

Temnostethus tibialis (Kisamos, Kreta); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 226.

Tetraphlebs Canadensis (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 90.

Triphlebs brevicollis (Lyon; Bugey; Huyères); Cl. Rey, Revue d'entom., 1888, S. 196.

Microphysidae. *Myrmedobia distinguenda* var. *pupalis* (Lyon), coleopterata var. *subtruncata* (Mont-Dore), *antica* n. sp. (Crest; Fréjus); Cl. Rey, Revue d'entomol., 1888, S. 197.

Tingitidae. *Acalypta hellenica* (Attika; Taygetus; Korfu); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 224.

Acanthochila exquisita (Cape Florida, der erste Vertreter dieser süd-amerikanischen Gattung in Nordamerika); P. R. Uhler, Proc. Entomol. Soc. Washington, 1, S. 143.

Derephysia brevicornis (Mittelgriechenland); O. M. Reuter, Revue d'entom., 1888, S. 224.

Cl. Rey unterscheidet in analytischer Tabelle *Eurycera clavicornis* L., *Teucii* Fieb., *brevicornis* Jak. und *intermedia* (Korsika; Sardinien), *magnicornis* (Rouen), welche beiden letzteren bisher unter *clavicornis* vereinigt waren, und bildet die letzten Fühlerglieder ab; Revue d'entomol., 1888, S. 190 f.

Galeat[h]us multiseriatus (Attika); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 225.

Monanthia angustata H.-Sch. in England; E. Saunders, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 34; Proc. Entom. Soc. London, 1888, S. XIX.

M. cucullifera (Sarepta); A. Puton, Revue d'entomol., 1888, S. 105, *pormata* (Botafogo), *loricata* (Entre Rios); W. L. Distant, Bull. Soc. Ent. Belg., 1888, S. XXXIII.

Monost[e]jira lobulifera (Attika); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 225.

Piesma quadrata var. *rotundicollis*, *variabilis* var. *brevicornis* (Lyon); Cl. Rey, Revue d'entomol., 1888, S. 189.

Zosmenus Silenus (Kecskemet, Ung.); G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 176.

Aradidae. *Aradus Serbicus* (Negotin); G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 177, *notatus* (Sorèze); Cl. Rey, ebenda S. 192.

Capsidae. In A. P. Fedtschenko's resa i Turkestan sind die Hemiptera, Capsidae, 1887 von O. M. Reuter bearbeitet; 39 Seiten (nach E. Bergroth, Entom. Tidskrift, 1888, S. 28).

Euderon (n. g. Oncotyl.) *Martini* (Biskra); A. Puton, Revue d'entomol., 1888, S. 107.

Alloeonotus fulvipes Scop. var. *separandus* (Bosnien; Krim; Kleinasien); G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 179.

Amblytylus delicatus Perr. in England; E. Saunders, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 78; Proc. Entom. Soc. London, 1888, S. XXVII.

A. sexguttatus (Sherbrooke); L. Provancher, a. a. O., S. 150.

Byrsoptera (*cylindricollis* Costa ♂), *pontica* (Friedenthal, Krim); G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 182.

Calocoris Costae (Armenien); O. M. Reuter, Wien. Entom. Zeitg; 1888, S. 99 mit Uebersicht der ähnlich gezeichneten Arten, *Putoni* (Caiffa, Syrien); G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 180, *tegularis*; A. Puton ebenda S. 864.

Campylomma Oertzenii (Attika); O. M. Reuter, Revue d'entom., 1888, S. 228.

Chlamydatus luctuosus (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 187.

Deraeocoris schach F. var. *cunealis* (Sporaden); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 227.

Dicyphus Montandoni (Rumänien); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 62.

Eccritotarsus incusus (Entre-Rios) S. LXXXI, *magnificus* (Tres Khos) S. LXXXII; W. L. Distant, Bull. Soc. Entom. Belg., 1888.

Excentricus singularis (Friedenthal, Krim) Pl. I. Fig. 8, *oophorus* (Brussa, Kleinas.) Fig. 10, (*punctipes* Fieb. Fig. 9); G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 184 mit analytischer Tabelle der 3 Arten auf S. 185.

Fundanins bicolor (Petropolis, Brasil.); W. L. Distant, Bull. Soc. Ent. Belg., 1888, S. LXXXII.

Globiceps fulvicollis Jak. ♂; G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 181.

Halticus Henschii (Görz); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 58.

Helopeltis Romundei (Java, auf Theepflanzen); C. O. Waterhouse, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 207.

Liocoris glabratus M. S. (Entre Rios); W. L. Distant, Bull. Soc. Ent. Belg., 1888, S. LXXXII.

Lopus Graeseri (Chabarofka); O. M. Reuter, Revue d'entomolog., 1888, S. 201.

Lygus rutilans (Innsbruck); G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 181.

Malacocoris Provancheri Burque i. l. (Cap rouge, Ste. Hyacinthe); L. Provancher, a. a. O., S. 144.

Orthothylus palustris (Görz); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 59.

Paredrocoris pectoralis Reut. ♀; G. Horvath, Revue d'entom., 1888, S. 186.

Pilophorus angustulus (Kumani, Morea); O. M. Reuter, Revue d'entomolog., 1888, S. 227.

Plagiognathus tomentosus (Sizilien); O. M. Reuter, Il Naturalista Siciliano, VII, S. 236, *rubricans* (Ste. Gertrude), L. Provancher, a. a. O., S. 154.

Psallus Henschii (Görz); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 59, *carduellus* (Lesina; Herzegowina); G. Horvath, ebenda, S. 183.

Pycnopterna amoena (Ottawa); L. Provancher, a. a. O., S. 114.

Resthenia designata (Petropolis; Therezopolis, Brasil.), *majuscula* (Rio Janeiro); W. L. Distant, Bull. Soc. Entom. Belg., 1888, S. LXXXI.

Sthenarus carbonarius (Rumänien); G. Horvath, Revue d'entom., 1888, S. 185, *nigripilis* (Attika); O. M. Reuter, ebenda, S. 228.

Systellonotus venustissimus (Abruzzen); Costa, Atti d. R. Acc. sci. fis. e mat. di Napoli (2) I, No. 10, S. 10, Tav. I, Fig. 10.

Lygaeidae. *Ischyopteron* (n. g. „Geocorid.“) *suprajurensis* (lithogr. Schiefer; vielleicht zu den Lygaeiden gehörig); Oppenheim, Palaeontogr. 34, S. 280, Taf. XXX, Fig. 7.

Liabaris (n. g. Plinthisomo simile) *Reuteri*; G. Horvath, Revue d'entom., 1888, S. 75.

Aphanus Pini var. *intermedius* (Batna; Mahadid); A. Puton, Revue d'entom., 1888, S. 104.

In U. S. Depart. of agriculture, divis. of entomology, erschien in Bullet. No. 17 eine ausführliche Abhandlung von L. O. Howard über the chinch bug; a general summary of its history, habits, enemies, and of the remedies and preventives to be used against it; Washington, 1888, S. 1—48 mit zahlreichen Holzschn.

The chinch-bug in California; Insect life, I, S. 26; — in 1888; ebenda S. 31.

Blissus Doriae Ferr. var. *obscurus* (Attika); O. M. Reuter, Revue d'entom., 1888, S. 223.

Während bisher die Gattung *Cymus* nur 3 Arten in Europa hatte, *clavculus* Fall., *melanocephalus* Fieb. und *glandicolor* Hahn, überzeugte sich Horvath neuerdings, dass die Gattung mindestens mit 5 Arten in Europa vertreten ist, indem die *glandicolor* var. *simplex* eine selbständige Art ist, und unter *glandicolor* 2 Arten vereinigt waren, von denen die eine den Namen *C. obliquus* erhält (kürzer; der braune Längsstrich des Corium schief von aussen nach hinten und innen gestellt...); die Unterschiede dieser 5 Arten sind in einer analytischen Tabelle sichtlich gemacht; Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 309f.

Emblethis denticollis Horv. var. *anodon*; G. Horvath, Revue d'entom., 1888, S. 176.

Geocoris chloroticus (Portugal); A. Puton, Revue d'entomol., 1888, S. 108.

Langflügelige Form des *Ischnocoris hemipterus*; E. Saunders, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 35; die Art ist aber nicht *hemipterus* *Schill.*, die in England noch nicht gefunden ist, sondern *angustulus* *Boh.*; derselbe ebenda S. 149.

Macropterna convexa var. *conica* (Huyères); Cl. Rey, Revue d'entomol., 1888, S. 99.

Notochilus obscurior (Wien; Dalmatien); Cl. Rey, Revue d'entomol., 1888, S. 102.

Nysius Volkemi (St. Theresa, Brasil.); W. L. Distant, Bull. Soc. Ent. Belg., 1888, S. LXXIX.

Peritrechus ambiguus (Kalocsa); G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 175.

Plinthinus bicolor (?); Cl. Rey, Revue d'entomol., 1888, S. 101.

Pterotmetus Canadensis (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 84 mit Holzschn.

Pyrrhocoris niger (Kreta, auf dem Berg Basithi); C. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 223.

Rhyparochromus chiragra F. var. *emarginatus*, *sabulicola* Th. var. *incertus*; Cl. Rey, Revue d'entomol., 1888, S. 101.

In England kommen die 3 *Scolopostethus*-Arten, *Sc. pictus* *Schill.*, *affinis* *Schill.* (oder *adjunctus* D. & Sc.), *decoratus* *Hahn* var. *ericetorum* *Leth.* vor; E. Saunders, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 148f.

Stygnocoris faustus (Ungarn; Fiume; Lesina); G. Horvath, Revue d'entom., 1888, S. 174.

Tropistethus holosericeus *Schltz.* var. *albidipennis* (Dalmatien; Korsika; Griechenland); G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 173 Pl. I Fig. 5, *gracilis* n. sp. (Dalmatien; Herzegowina); derselbe, S. 174, Fig. 6.

Coreadae. *Curupira* (n. g. *Leptocoris.*) *illustrata* (Rio Janeiro); W. L. Distant, Bull. Soc. Entom. Belg., 1888, S. XI.

Peruda (n. g. *Leptocoris.*) *typica* (Rio Janeiro); W. L. Distant, Bull. Soc. Entom. Belg., 1888, S. X.

Borthrostethus (*elevatus* Fieb. var. ?) *subinermis* (Smyrna); A. Puton, Revue d'entomol., 1888, S. 257.

Colobathristes saccharicida (Java; durch Anstechen der Blätter des Zuckerrohr schädigend); Karsch, Entom. Nachr., 1888, S. (205 —) 207.

Megalotomus castaneus (Peking); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 66.

Mictis Falloui (Peking); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 65.

Rhopalus (*Aeschynteles*) *angularis* (Peking); O. M. Reuter, Revue d'entom., 1888, S. 67.

Stenocephalus femoralis S. 66, *Horvathi* S. 67 (Peking); O. M. Reuter, Revue d'entomologie, 1888.

Pentatomidae. *Anhanga* (n. g. *Discocephalin.*) *modesta* (Rio Grande); Distant, Bull. Soc. Entom. Belg. XXXI S. LX.

Peribyssus (n. g. *Byrsino* et *Cydno* affine) *scutellaris* (Laghounat, südl. Alger); A. Puton, Revue d'entomol., 1883, S. 364.

Risibia (n. g. *Cnephosae* *Jak.* affine) *xanthochila* (Sibirien); G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 169.

Aelia notata (Saint-Raphaël; St.-Paul); Cl. Rey, Revue d'entom., 1888, S. 92.

Apodiphus integriceps Oshanin i. l. (Turkestan); G. Horvath, Revue d'entomol., 1888, S. 172.

Edessa ansata (Brasilien) S. LXIII, *macraspis* (Rio Janeiro), *complicata* (Brasilien), S. LXIV; Distant, Bull. Soc. Entom. Belg. XXXI.

Eurydema decoratum H.-Sch. var. *simplicissima* Put. i. l., *simplex*, *completa* Put. i. l.; cognatum var. *aeneiventer* (Arcachon); Cl. Rey, Revue d'entomol., 1888, S. 96.

Eurygaster maura var. *griseescens* (Freiburg); Cl. Rey, Revue d'entomol., 1888, S. 91.

Euschistus bovillus (Botafogo) S. LXI, *quadrimaculatus* (Sao Joao del Re) S. LXII; Distant, Bull. Soc. Entom. Belg. XXXI, *jugalis*; L. Provancher, a. a. O. S. 204.

Menida Scotti Jak. var. *sinensis* (Peking); O. M. Reuter, Revue d'entom., 1888, S. 64.

G. Horvath gibt eine Paralleldiagnose zur Unterscheidung der einander sehr ähnlichen *Nezara Heegeri* Fieb. und *Millieri Muls.-R.*; Revue d'entom., 1888, S. 173, Pl. I, Fig. 34.

N. amurensis (Chabarofka); O. M. Reuter, ebenda, S. 200.

Peribalus sphacelatus var. *suboblongus* (Huyères); Cl. Rey, Revue d'entom., 1888, S. 95.

Phimodera bufonia (Südfrankreich; = *galgulina Muls.-R.*, *Put.*, nec *H.-Sch.*); A. Puton, Revue d'entomol., 1888, S. 362.

Podisus Volkemi (Therezopolis, Brasil.); Distant, Bull. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. LVIII.

Prionosoma villosus (Vancouver); L. Provancher, a. a. O., S. 204.

Sehirus bicolor L. var. *Delagrangi* (Smyrna); A. Puton, Revue d'entom., 1888, S. 256.

Urochela Falloui (Peking); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 65.

Urolabidina sinensis (Peking); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 64.

Urostylis virescens (Chabarofka); O. M. Reuter, Revue d'entomol., 1888, S. 199 mit Holzschn.

Orthoptera.

Ueber die Bildung des Entoderms bei *Blatta germanica* macht Cholodkovsky eine vorläufige Mittheilung; Zool. Anz., 1888, S. 163—166 mit 2 Holzschn.

Hiernach bildet sich durch Invagination der Primitivrinne neben dem Ektoderm ein inneres Keimblatt, das aus mehreren Schichten besteht. Indem in demselben eine Höhle entsteht, zerfällt es in zwei Blätter, ein äusseres, das mesodermale Hautmuskelblatt, und ein inneres, das bald in zwei Schichten zerfällt. Die äussere besteht aus grösseren Zellen und bildet das Darmfaserblatt, die andere aus kleineren, dünneren Zellen und bildet das echte Entoderm, welches später den Dotter vollständig umwächst. Die Dotterzellen nehmen gar keinen Antheil an der Bildung des Entoderms und dienen wahrscheinlich bloss zur Assimilierung des Dotters. Die beschriebene Differenzierung des Entoderms findet erst Statt, nachdem die Primitivrinne sich geschlossen, der Embryo seine 18 Gliedmassenpaare

(4 Kopf-, 3 Brust- und 11 Abdominalgliedmassen incl. cerci) angelegt, und die zwei Nervenstämme sich vom Ektoderm abzutrennen begonnen haben. Die Bildung des Entoderms geht ziemlich gleichzeitig in der ganzen Länge des Keimstreifens vor sich.

Nachdem durch Gerstäcker schon vor nahezu 30 Jahren bei *Corydia* ausstülpbare Hautanhänge beschrieben sind, macht E. A. Minchin solche auch von *Periplaneta orientalis* bekannt. Sie liegen hier nicht wie dort zwischen der 1. und 2., sondern zwischen der 5. und 6. Rückenschiene, der Mittellinie genähert. Die Wand dieser Säckchen ist aussen mit steifen, stark verästelten Haaren bekleidet; darunter findet sich ein Beleg von drüsigen Epithelzellen. Besondere Muskeln fehlen. Die Bedeutung dieser Säckchen ist wahrscheinlich die eines Stinkorganes. Die Hypodermis besteht nach Minchin nicht aus einer, sondern aus 2 Zellenlagen, von denen die untere nur an den Artikulationsstellen der Segmente fehlt. An manchen Stellen werden die Zellen dieser unteren Schicht sehr gross und sind „unzweifelhaft“ Ganglienzellen; besonders zahlreich sind sie am vorderen Theile der Rückenschienen. Wo die letzteren frei (d. h. von der Gelenkhaut zwischen den einzelnen Schienen unbedeckt) sind, da ist wahrscheinlich jede Nervenendzelle mit einem Haare in Verbindung, an den bedeckten Theilen mit einer kleinen Papille. Quart. Journ. Micr. Sci., XXIX, S. 229—233, Pl. (Note on a new organ, and on the structure of Hypodermis, in *Periplaneta orientalis*).

A. Gerstäcker gibt die Charakteristik einer Reihe (50) bemerkenswerther Orthopteren; Mitth. a. d. naturw. Verein f. Neu-Vorpommern und Rügen, 20, S. 1—58.

Orthopterologische Beiträge No. III von F. Karsch in Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 415—463, Taf. IV enthalten: 1. Das Weibchen des *Corycus Jurinei* Sauss.; 2. eine neue Prochilide oder Mecopodidae; 3. Beiträge zur Kenntniss der Phaneropteriden-Fauna Afrikas, der Seychellen und Madagaskars; 4. *Eugaster spinulosus* (L.) und *Guyonii* Serv.

The Orthoptera of New England; Fernald, in 25th annual report of the Mass. Agri. College; s. Americ. Naturalist, 1888, S. 469.

H. J. Kolbe gibt die geographische Verbreitung der Neuroptera und Pseudoneuroptera der Antillen, nebst einer Uebersicht über die von Herrn Consul Krug auf Portoriko gesammelten Arten; dieses Archiv, 1888, I, S. 153—178, Taf. XIII. Die Neuropteren- und Pseudoneuropterenfauna der Antillen hat theils nordamerikanische, theils südamerikanische und zentralamerikanische Bestandtheile; die beiden letzteren überwiegen, indem von den 73 Odonaten der Antillen, von denen 36 endemisch sind, nur 15 auch in Nordamerika, 22 in Südamerika und 21 in Zentralamerika vorkommen; ausser auf den Antillen kommen von diesen Arten nur in Nordamerika bloss 6, in Südamerika 10, in Zentralamerika 4 Arten vor. Die Corduliinen und Calopteryginen fehlen auf den Antillen gänzlich. — Die übrigen Pseudoneuropteren und Neuropteren der Antillen zeigen

hinsichtlich ihrer Verbreitung über das übrige Amerika ähnliche Verhältnisse, wie die Odonaten; von den Trichopteren ist nur wenig bekannt. 7 Karten auf der Tafel XIII zeigen die Verbreitung theils der Familien, theils einzelner Gattungen und Arten der Odonaten über Amerika.

In den Act. Soc. Esp. Hist. Natur., XVII, S. 42—46 sind eine Exkursion nach den Bergen von Toledo und Cercedilla und Siete Picos beschrieben und die erbeuteten Orthopteren aufgezählt.

Die Enumeración de los Ortopteros de España y Portugal von M. Cazorro y Ruiz enthält 243 Arten, von denen 80 der Spanischen Fauna eigenthümlich sind; An. Soc. Esp. Hist. Natur., XVII, S. 435—511.

Bolívar macht 19 im September bei Bordeaux gesammelte Arten namhaft; Act. Soc. Esp. Hist. Natur., XVII, S. 35.

P. Mabilelle führt (40) Orthopteren aus der Umgegend von Senlis auf; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LXXIII f.

Die weiteren Appunti e note di Ortoterologia Siciliana von G. Riggio behandeln *Cyrtaspis scutata* *Charp.* (*variopicta* *Costa*); *Trigonidium cicindeloides* *Serv.*; *Gryllus burdigalensis* *Latr.* var. *arvensis* *Ramb.*, *algericus* *Sauss.*; *Grylloides Brunneri* n. sp.; *Ephippigera latipennis* *Fisch.*; *Leptophyes punctatissima* *Bosc.*; II Naturalista Siciliano, VII, S. 95—101, 110—113, Tav. I Fig. 1, 2; VIII, S. 69—71, 308—311.

F. Pajno zählt Ortoteri raccolti nel territorio di Sclafani auf; ebenda, VIII, S. 18 f. (22 A.).

Primo cenno sulla fauna dell'isola Lesina in Dalmazia. Dermoptera et Orthoptera; di G. B. Novak; Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 119—132 (68 A.).

O. Retowski bringt Beiträge zur Orthopteren-Kunde der Krim; Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, 1888, No. 3, S. 402—415. (4 Forficulid., 8 Blattid., 5 Mantid., 18 Acridiad., 11 Locustid., 7 Gryllid.).

Der II. der Beiträge zur Orthopteren-Kunde von H. Krauss behandelt Blattiden aus der Krim und aus West-Kaukasien; *Ochrilidia* (*Opomala*) *tryxalicera* *Fisch. Fr.*; *Stenobothrus Saulcyi* n. sp.; das Zirporgan von *Cyrtaspis scutata* *Charp.*; Verh. Zool. Bot. Gesellsch. Wien, 1888, S. 567—576 Taf. XV.

H. de Saussure gibt eine Synopsis de la tribu des Sagiens; Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 127—155, Pl. 5.

Beiträge zu Ign. Bolívar's Monografía de los Pirgomorfinos von F. Karsch in Entom. Nachr., 1888, S. 326—335, 340—346, 355—361 führen die Pyrgomorphiden des Berliner Museums mit Beschreibung der neuen Arten auf. Als allgemein bemerkenswerth ist hervorzuheben die Verbreitung dieser Gruppe mit einer Pyrgomorpha-Art auf Neu-Guinea und das Vorkommen flugunfähiger Poeciloceræ (n. G. *Cawendia*) auf dem Festlande (Tanganjika-See), welches auf innige Beziehungen des afrikanischen Ostens mit

Madagaskar (durch *Rubellia*) und Australien (durch *Monistria*) deutet. Ferner ist die durch Pigmente hervorgerufene verschiedene Färbung bei Jungen und Alten beachtenswerth, namentlich bei *Zonocerus*, *Phymateus* und *Petasia*. Als Felderverwüstende Wanderheuschrecke Ostafrikas ist eine *Phymateus*-Art durch Hildebrandt bezeichnet.

J. Bolívar lässt in den *Ann. Soc. Entom. Belg.* XXXI S. 175—313 Pl. IV, V einen *Essai sur les Acridiens de la tribu des Tettigidae* erscheinen. Diese durch das stark entwickelte Pronotum und die kleinen, schuppenförmigen Oberflügel charakterisierte Gruppe theilt Bolívar in die 7 Sektionen der *Cleostratae* (vorderes Ocellum zwischen, nicht vor den Punktaugen), *Cladonotae* (Stirnkiel verbreitert, Fühler kurz und fadenförmig), *Scelimenae* (Pronotum lang pfriemenförmig, vorn beiderseitig bedornt, Hinterschienen gegen die Spitze hin erweitert), *Metrodora* (erstes Tarsenglied der Hinterfüsse so lang (oder kürzer) als das dritte), *Tettigiae* (erstes Tarsenglied länger als das dritte), *Batrachideae* (Vorderschenkel oben gefurcht; Fühler mit zahlreichen Gliedern), *Tripetalocerae* (Fühler von ungewöhnlicher, bizarrer Gestalt). Von manchen Arten ist eine aquatische, bezw. amphibische Lebensweise bekannt; andere sind hinsichtlich ihrer Lebensweise noch ganz unbekannt. An das Verzeichniss, das 222 Arten enthält, schliesst sich ein *Conspectus* der Sektionen und Gattungen, und an diesen die spezielle Beschreibung; die grösste Zahl der Gattungen ist neu aufgestellt. — Ich werde diese Arbeit zitiren: Bolívar, *Essai*.

Seinem 1884 erschienenen *Prodromus* (Bericht S. 94) lässt Saussure nun *Additamenta* folgen; *Mém. Soc. de Physique et d'Histoire naturelle de Genève*, XXX, No. 1, S. 1—180 Pl. 2. Diese *Additamenta* enthalten zum grössten Theile die Beschreibungen neuer Gattungen und Arten und Ergänzungen zu früher beschriebenen. Um die neuen Gattungen in ihren Beziehungen zu den übrigen leichter kenntlich zu machen, hat der Verfasser eine *Synopsis* sämtlicher Gattungen vorangestellt, womit er sich gewiss den Dank aller diese Gruppe Studirenden erworben hat. Der speziellen Behandlung der ganzen Gruppe und der drei in ihr unterschiedenen Abtheilungen (*Oedipoda*, *Thrincus*, *Eremobia*) sind allgemeine Bemerkungen vorangeschickt, aus denen hier ein Auszug wiedergegeben wird.

Die *Oedipodier* sind auf der nördlichen Halbkugel zahlreicher als auf der südlichen und erreichen ihre Hauptentfaltung in dem wärmeren Theile der gemässigten Zone (40—25°). Während eine europäische Art (*Sphingonotus coerulans*) sich (wahrscheinlich eingeschleppt) auf Cuba findet, sind sonst fast alle amerikanischen Gattungen von den paläarktischen verschieden, aber mit diesen nahe verwandt, und manche können als die amerikanischen Vertreter der letzteren gelten, so *Tropidolophus* und *Pyrgodera*; *Heliastus*, *Oedocara* und *Sphingonotus*; *Dissosteira* und *Conistica*; *Tomonotus*, *Lactista* und *Oedipoda*; *Psinidia* und *Trilophidia*.

Einen sehr grossen Verbreitungsbezirk haben die Gattungen *Sphingonotus* und *Acrotylus*. Erstere verbreitet sich von Schweden

bis zur Sahara, von Sibirien bis nach Indien, von den Küsten des Atlantischen Oceans bis nach Japan, und hat sich sogar in Amerika wiedergefunden. *Acrotylus* ist über das mediterrane Gebiet und die diesem entsprechenden Länderstrecken Asiens, ausserdem aber über ganz Afrika verbreitet. In der neuen Welt hat *Trimerotropis* eine Verbreitung von Neu-England bis nach Patagonien. Die wenigen *Oedipodier* Australiens sind asiatischen Charakters.

Auch diese Gruppe bestätigt die nahen Beziehungen zwischen der indischen und südafrikanischen Fauna; weiterhin sind aber auch einige südafrikanische Gattungen die nahen Verwandten von mittelmeerländischen. Merkwürdiger Weise finden sich zwei Arten an den Küsten des Rothen Meeres und am Cap verde und auf den Kanaren; es sind dies *Sphingonotus Savignyi* und *Quiroguesia Brullei*.

Einzelne Arten leben gesellig, vermehren sich gelegentlich sehr stark und wandern dann in grossen Zügen nach Nahrung umher, eine wahre Plage für den Ackerbau. Namentlich Nordamerika ist reich an solchen Arten, die den Gattungen *Pachytylus* und *Oedalea* angehören. Unser *Pachytylus cinerascens* hat sich über die ganze östliche Halbkugel verbreitet: Europa, Asien, Afrika, Indischer Archipel, Neu-Seeland, Inseln Polynesiens werden von dieser Art heimgesucht, die weit eher als der mehr auf Osteuropa und Turkestan beschränkte *P. migratorius* den Namen der Wanderheuschrecke verdiente.

Ein besonderer Abschnitt ist den Eremobien mit Rücksicht auf ihre geographische Verbreitung, Anpassung an die Wüste und Tonapparate gewidmet. Die Eremobien bewohnen auf der östlichen Halbkugel zwei getrennte Bezirke: die Mittelmeerländer und die Südspitze Afrikas; die beiden amerikanischen Gattungen, *Haldmanella* und *Brachystola*, leben ungefähr unter den Breiten der Mittelmeerregion, vgl. den vor. Bericht S. 74f.

Durch ihre Farbe, die bald grob, bald feiner gekörnelte Hautbedeckung ähneln diese Thiere sehr der Erde, dem Sande, auf dem sie leben. Ihr Flug- und Sprungvermögen ist z. Th. gering, z. Th. ganz unterdrückt, und sie verlassen sich mehr darauf, durch ihr Aussehen nicht in Gefahr zu kommen, als sich dieser durch die Flucht zu entziehen.

Die Eremobien haben zweierlei Tonapparate. Der eine befindet sich am Hinterleibe, und besteht in einer gerieften Platte zu beiden Seiten des 2. Ringes, über welche die Oberschenkel des letzten Beinpaars reiben. Dieser Apparat ist bei *Batrachotettix* und *Methone* am stärksten entwickelt, fehlt den Gattungen *Eneremius* und *Brachystola* vollständig, und ist bei anderen Gattungen unvollkommen, während er sich ausserhalb der Eremobien bei *Thrincus* und einigen Pamphaginen (auch sogar bei einigen Locustiden) wiederfindet. Er kommt beiden Geschlechtern zu, wenn er auch im männlichen stärker entwickelt ist. — Der andere Thonapparat ist erst vor zwei Jahren von J. Pantel entdeckt worden, kommt allen geflügelten und selbst den kurzflügeligen Arten zu, ist beim Weibchen aber in höherem

Grade verkümmert als der abdominale. Er besteht in der stark auf der Unterseite hervortretenden und von ihrem gewöhnlichen Verlaufe abgelenkten hinteren Axillarader, auf der sich eine Leiste erhebt. Die Schienen der Mittelbeine besitzen auf ihrer Oberseite eine Reihe von Zähnchen, durch welche jene Ader in Schwingung versetzt wird. Dies geschieht (bei den fliegenden Arten) während des Fluges, je nach der Willkür des Thieres, namentlich wenn es sich zur Erde niederlassen will. — Die Zähnchen der Tibia fehlen den kurzgeflügelten und ungeflügelten Arten vollständig, von denen doch die ersteren den einen Theil des Tonapparates (an den Flügeln) haben.

In seiner Monographie der Stenopelmatiden und Gryllacriden, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 1888, S. 247—394, Taf. V—IX, weist Brunner von Wattenwyl den Stenopelmatiden ihren Platz unter den Locustiden an, wofür die viergliedrigen Tarsen, die Bildung der Legescheide und der Flügel sprechen, während die Aehnlichkeit mit den Grylliden Anpassungserscheinungen sind. Wie in dem Besitz zusammengedrückter Tarsenglieder ohne alle seitliche Ansätze das Hauptmerkmal der Zunft liegt, so gibt der Besitz oder der Mangel von Sohlenballen an den Tarsen, namentlich dem Metatarsus, ein Unterscheidungsmerkmal der beiden Sektionen der Zunft ab. Weiterhin ist für die Systematik wichtig die Anwesenheit oder der Mangel der Gehörorgane und die Bedornung der Füße, während die Bildung der Mundwerkzeuge nicht geeignet ist, in der Systematik Verwendung zu finden. Tuberkeln, crenelirte Kanten und Querleisten am ersten und zweiten Hinterleibssegment, die sich bei beiden Geschlechtern und auch bei Formen ohne Gehörorgan finden, sieht der Verfasser als Zirporgane an. Die versteckte, nächtliche Lebensweise dieser Thiere macht es wahrscheinlich, dass erst ein kleiner Theil derselben bekannt ist, obwohl die Zahl der bekannten Arten sich auf 93 beläuft, die vom Verfasser in 36 Gattungen, darunter 21 neue, gebracht werden.

Die Gryllacriden sind durch die Bildung der Flügel, die gegliedert eingesetzten Dornen der Vorder- und Mittelschienen und durch die starke Verbreiterung der Tarsenglieder ausgezeichnet. Der Bau des 8. und 9. Hinterleibssegmentes im männlichen Geschlecht ist ebenfalls eigenthümlich und nimmt 8 verschiedene Formen an, die aber zur Gattungsbildung nicht geeignet erscheinen. Brunner unterscheidet 12 Gattungen, darunter 10 neue; die Zahl der hier aufgeführten Arten beträgt 131, von denen 95 der Gattung *Gryllacris* angehören.

A. Pictet beschreibt *Locustides nouveaux ou peu connus* du musée de Genève; Mém. d. l. Soc. de physique et d'histoire naturelle de Genève, T. XXX No. 6, S. 1—84, Pl. 1—3.

Als *Contributo allo studio delle forme larvali degli Odonati* gibt A. Roster im Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 159—170, Tav. I—IV, die Beschreibung und Abbildung der Nymphen folgender Agrioniden: *Calopteryx haemorrhoidalis*, *splendens*; *Lestes viridis*, *virens*, *barbara*; *Sympycna fusca*; *Platynemis pennipes*; *Agrion viridulum*, *puella*, *Lindeni*, *scitulum*.

(16) Odonates rec. aux îles Loo-Choo; par de Sélys-Longchamps; Bull. Soc. Ent. Belg., 1888, S. XLVIII—LIII.

Als I der Beiträge zur Insektenfauna der Umgebung von Tübingen zählt H. Kissling die (31) bei Tübingen vorkommenden Wasserjungfern (Odonaten) auf; Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturk. i. Württemberg, 44, S. 209—231.

Ueber eine Sammlung südafrikanischer Libellen s. Kirby in den Proc. Entom. Soc. London, 1888, S. XIII f.

de Sélys-Longchamps: Odonates de l'Asie Mineure et revision de ceux des autres parties de la faune dite Européenne; Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 1—85. — Diese Arbeit zerfällt in 3 Theile: I. Odonates de l'Asie Mineure. II. Revision des Odonates de l'Asie septentrionale, du Japon et de l'Afrique septentrionale. III. Liste des Odonates de l'Europe géographique. Ein geschichtlicher Rückblick lässt am besten die Fortschritte erkennen, die unsere Kenntniss der Odonatenfauna der genannten Gebiete gemacht hat: während aus Kleinasien 1845 erst 27 Arten bekannt waren, werden deren hier 83 namhaft gemacht, die zu drei Vierteln (54) identisch sind mit denen aus dem eigentlichen Europa bekannten; vom Rest sind 22 Kleinasien und den angrenzenden Gebieten eigenthümlich, unter diesen aber 5 Lokalarassen europäischer Arten; 7 Arten gehören der Afrikanischen Fauna an und kommen mit Ausnahme von *Pseudagrion praetextatum* sämmtlich im Norden Afrikas vor. — Aus dem nördlichen Asien und Japan sind hier 30 Arten behandelt, wozu noch 5 Arten von den Loo-Choo-Inseln (zwischen Formosa und Japan) kommen. — Den aus Algier, Tunis und Marocco bekannten Arten werden 4 hinzugefügt; Madeira und die Canaren haben nur Arten (13), die auch in Algier vorkommen. — Aus dem nur unvollkommen durchforschten unteren Aegypten sind 25 Arten bekannt, von denen eine bisher auf dieses Gebiet beschränkt erscheint: *Onychogomphus pumilio*. — Das Verzeichniss der Europäischen Arten enthält 103 Namen.

Genuina.

Blattidae. Neue und wenig bekannte Blattiden beschrieben von H. Dohrn; Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 129—132.

Ueber (Stink-)Drüsen in der Rückenhaut der Blattiden s. oben S. 81.

Krauss beschreibt die verschollene, von L. H. Fischer irrthümlich zu *marginata*, und von Brunner zu *infumata* gezogene *Aphlebia adusta* Fischer. v. W., S. 568, Taf. XV, Fig. 1, sowie *A. polita* (Novorossisk) S. 569, Fig. 2, *Retowskii* (Krim) S. 570, Fig. 3; Verh. Zool. Bot. Gesellsch. Wien, 1888.

Gyna centurio (Kamerun); H. Dohrn, a. a. O., S. 129.

Heterogamia Saussurei (Taschkent) S. 131, (*Homoeogamia*) *Sinensis* Sauss. ♀ S. 132; H. Dohrn, a. a. O.

Nyctibora humeralis (Fonteboa); H. Dohrn, a. a. O., S. 129.

Panchlora Najas (Fonteboa); H. Dohrn, a. a. O., S. 130.

Forficulidae. *Chelidura albipennis* Meg. och *Ch. acanthopygia* Géné tvänne for Sveriges fauna nya Forficulina; B. Haij, Entomol. Tidskr., 1888, S. 119—122, mit 5 Holzschn.

Forficula *Lesnei* (St. Arnoult; Benerville, Calvados); Finot, Bull. Soc. Entom. France 1887 S. CLXXXIX. — Lesne fand sie auch im J. 1888 wieder, und zwar auch noch in den Stümpfen von Villers-sur-Mer und gibt weitere Merkmale, namentlich zur Unterscheidung von *F. pubescens* an. — *Chelidura acanthopygia* fand derselbe an drei weiteren Lokalitäten (Calvados; Fourqueux; Forêt de Normal); ebenda, 1888, S. CCVII.

Mantidae. *Acanthops contorta* (Iquitos, Amaz.) S. 56, *adusta* (ibid.) S. 57; A. Gerstäcker, a. a. O.

Acontista amoenula (Pebas, Amaz.); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 51.

Ameles Heldreichi f. minor (Krim); Retowski, Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, 1888 No. 3, S. 405.

Liturgusa lichenalis (Jurimaguas, Peru) S. 52, *superba* (ibid.) S. 53, *nubeculosa* (Ega; Fonteboa, Amaz.) S. 54; A. Gerstäcker, a. a. O.

G. W. Alexander beobachtete eine Mantis einen Kolibri verzehrend; Proceed. Elliot Societ. und daraus angeblich in Nature, 26. Juli 1888; s. Zool. Garten, 1888, S. 287.

Sibylla (?) polyacantha (Stanley-Pool, Congo); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 49.

Acridiidae. *Acidacris* (n. g. *Acridio* affine, für *amethystinum* Gerst. und) *violacea* (Olivença; Fonteboa, Amaz.), *miniacea* (Jurimaguas, Peru); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 31.

Anabylis (n. g. *Ommatolampin.*) *pantherina* (Fonteboa, Amaz.); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 15.

Brunnerella (n. g. *Oedipodin.*) *mirabilis* (Ordubad); Saussure, a. a. O., S. 31, Fig. 1.

Callirhipis! (n. g.; bei Käfern vergeben). *Davidiana* (Mongolei); Saussure, a. a. O., S. 67.

Cavendia (n. g. *Pyrgomorphin.* inter *Rubelliam* et *Monistriam*) *granulata* (Tanganjika) S. 344, *glabrata* (ibid.) S. 345; Karsch, Entom. Nachr., 1888.

Charora (n. g. oder *Egnatii* subgen.) *crassivenosa* (Elbrus); Saussure, a. a. O., S. 71 und 175.

Chthonius! n. g. (*Scelimen.*; Name bei Arachniden vergeben) für (*Tettix*) *palpatus* Stål; Bolivar, Essai S. 221.

Coptotettix (n. g. *Tettig.*) *fossulatus* (Ceylon) S. 288, *flavus* (Nordaustr.), *capitatus* (Java), *fuscus* (Sibul) S. 289, *rufipes* (Somali), *Maesot* (Nueva Caceres), *asperatus* (Cochinchina) Pl. V, Fig. 25, S. 290, *tuberculatus* (Borneo), *testaceus* (Ceylon), *interruptus* (Java) S. 291, *nodulosus* (Dolores, Philipp.), *fuliginosus* (Indien), *ferrugineus* (Philippinen), S. 292, *Mazarredoi* (Dolores) S. 293; Bolivar, Essai.

Cota (n. g. *Cladonot.*; für *Tettix bispina* Sauss.? und) *strumosa* (Hochamazonas) S. 206, *saxosa* (Peru) S. 207, Pl. IV, Fig. 8; Bolivar, Essai.

Cotys (n. g. *Metrodor.*) *antennatus* (Peru); Bolivar, Essai S. 247.

Crimisius (n. g. *Metrodor.*) *patruus* (Hochamazonas), *contractus* (Peru), Bolivar, Essai S. 246.

Criotettix (n. g. *Scelimen.*) *tricarinatus* (Ceylon), *nezuosus* (Borneo) S. 224, *Borrei* (Cochinchina), *nigellus* (Gabon), *saginatus* (Java) S. 225, *miliarius* (Ceylon)

S. 226, *Baeri* (Philippinen), *subulatus* (Indien), *Vidali* (Philippinen), *perminutus* (Sibul) S. 227, *rugosus* (Borneo), *insidiosus* (Malacca), *pulcher* (Queensland) S. 228, *pullus* (Irocin), *clavitaris* (Borneo) S. 230; Bolivar, Essai.

Crypsiarus (n. g. Thrincin.) *cubicus* (Namaqua); Saussure, a. a. S., S. 100.

Cyphacris (n. g. Rhomaleae affine) *decorata* (Olivença, Amazon.); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 4.

Eleleus (n. g. Cladonot.) *curtus* (Brasilien); Bolivar, Essai S. 206, Pl. IV, Fig. 7.

Eneremius (n. g. Eremobiin.) *mutus* (Angra Pequena); Saussure, a. a. O., S. 161.

Epiprora (n. g. Copiocerae proximum) *hilaris* (Itaituba, Amaz.); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 33.

Eremotettix n. g. Eremobiin. für *Trachypetra* *bufo* Walk. nec *White*; Saussure, a. a. O., S. 136.

Haldmanella n. g. Eremobiin. für *Ephippigera* *Tschivavensis* Haldm.; Saussure, a. a. O., S. 153.

Haplotropis (n. g. Eremobiin.) *Brunneriana* (Amurland); Saussure, a. a. O., S. 126, Fig. 10.

Hedotettix (n. g. Tettig. für *gracilis* de Haan, *exsultans* Stål und) *affinis* (Philippinen; Sidney), *Guibelondoi* (Sibul), *coactus* (Sumatra) S. 285, *sobrinus* (Nueva Caceres), *rusticus* (Philippinen), *festivus* (Ceylon) Pl. V, Fig. 24, S. 286, *angustifrons* (Congo; Madagaskar) S. 287; Bolivar, Essai.

Hirrius n. g. Tripetalocer., für (*Arulenus*) *validispinus* Stål; Bolivar, Essai S. 308.

Hypsaeus (n. g. Cladonot.) *Westwoodi* (Luzon); Bolivar, Essai S. 200, Pl. IV, Fig. 3.

Hypsipages (n. g. Ommatolampin.) *dives* (Olivença, Amaz.); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 17.

Lathicerus (n. g. Thrincin.) *cimex* (Angra Pequena); Saussure, a. a. O., S. 103.

Leptoscirtus (n. g. Oedipodin.) *aviculus* (Aegypten), *unguiculatus* (Senegal); Saussure, a. a. O., S. 73.

Mazarredia (n. g. Metrodor.) *sculpta* (Indien), *remissa* (Kambodscha), *Semperi* (Philippinen) S. 238, *abbreviata* (Viti-L.), *insularis* (Ceylon) S. 239, *atypa* (Philippinen), *lauta* („Monts d'Angat“) S. 240, *gemella* (Irocin) Pl. V, Fig. 17, *Celebica* (Minahassa), S. 241, *centrosa* (Borneo) S. 242; Bolivar, Essai.

Meristopteryx n. g. Oedipodin. für (*Oedipoda*) *rotundata* Walk.; Saussure, a. a. O., S. 52.

Metrodora (n. g. Metrodor.) *rana* (Oberamazonas), *lutosa* (Brasil.) S. 248, *Amazonica* (Oberamazonas), *concinna* (Paramaribo) S. 249; Bolivar, Essai.

Mioscirtus n. g. Oedipodin. für (*Scintharista*) *Wagneri* Ev. und *venusta* Fieb.; Saussure, a. a. O., S. 36 und 175.

Mitraria! (n. g. Metrodor.; Name bei Mollusken vergeben) *producta* (Oberamazonas); Bolivar, Essai S. 253.

Nephela! (n. g. Metrodor.; Name bei Lepidopt. vergeben) *turgida* (Oberamazonas); Bolivar, Essai S. 252.

Ostracina (n. g. Oedipodin.) *terrea* (Cap); Saussure, a. a. O., S. 27.

Pantelia (n. g. Cladonot.) *cristulata* (Sierra Leona); Bolivar, Essai S. 214, Pl. IV, Fig. 12.

Paratettix (n. g. Tettig., für *toltecus* Sauss., *rugosus* Scudd., *cnemidotus* Burm. etc. und) *Peruvianus* (Pumamarca) S. 272, *Cayennensis* (C.) S. 273, *Schochii* (Guatemala; Mexiko) S. 274, *Frey-Gessnerii* (Cuba), *variabilis* (Madure; Borneo; Philippinen) S. 276, *femoralis* (Sidney), *obesus* (?), *cinereus* (Nossibé) S. 277, *personatus* (Ceylon), *mimus* (Philippinen) S. 278, *variegatus* (Ceylon), *fluctuans* (Nordaustralien), *sagittatus* (Philippinen) S. 280, *Indicus* (J.), *contractus* (Borneo; Philippinen), *pullus* (Viti) S. 281, *tricarinatus* (Philippinen), *similis* (Nordaustr.), *fallax* (Guatemala) S. 282; Bolivar, Essai.

Paxilla n. g. Batrachid., für (Tettigidea) *obesa* Scudd.; Bolivar, Essai S. 294.

Phaestus n. g. Tripetalocer., für (Tettix) *Mallerborgi* Stål; Bolivar, Essai S. 309.

Phanerocherus (n. g. Thrincin.) *testudo* (Südaustralien); Saussure, a. a. O., S. 97, Fig. 9.

Phloeonotus (n. g. Batrachid., für *Hymenotes humilis* Gerst. und) *Natalensis* (N.); Bolivar, Essai S. 304, Pl. V, Fig. 27.

Piezotettix n. g. Cladonot. für (*Hymenotes*) *cultratus*, *sulcatus*, *arcuatus*; Bolivar, Essai S. 200.

Potua (n. g. Cladonot.) *coronata* (Borneo; Malacca); Bolivar, Essai S. 208, Pl. IV, Fig. 9.

Procrachthes (n. g. Leguae Walk. affine) *insignis* (Olivença, Amaz.; Jurimaguas, Peru); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 40.

Prototettix (n. g. Tettig., für *T. impressus* Stål, *lobulatus* Stål und) *fossulatus* (Apiaty, Brasil.); Bolivar, Essai S. 256.

Pterotettix (n. g. Metrodor.) *Andrei* (Nossibé); Bolivar, Essai S. 245.

Puiggaria (n. g. Batrachid.) *antennata* (Apiaty, Brasil.); Bolivar, Essai S. 302, Pl. V, Fig. 26.

Rhcnoderma (n. g., zu den ganz flügellosen der Ophthalmolampis-Gruppe gehörend) *olivacea* (Chiriqui); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 29.

Saussurella n. g. Batrachid., für (Acrid.) *cornutum* de Haan; Bolivar, Essai S. 303.

Scaria (n. g. Batrachid., für (Acridium) *hamata* de Geer und) *lineata* (Oberamazonas); Bolivar, Essai S. 302.

Stegastris (n. g. Ommatolampin.) *volucris* (Ega, Amaz.), *corallipes* (Fonteboa, Amazon.); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 20.

Systolederus (n. g. Metrodor.) *ophthalmicus* (Minahassa), *Haani* (Philippinen) Pl. V, Fig. 16, S. 235, *languidus* (Philippinen) S. 236; Bolivar, Essai.

Tetramerotropis (n. g. Oedipodin.) *cruciata* (Torres-Strasse); Saussure, a. a. O., S. 26, Fig. 2.

Threciscus (n. g. Metrodor., für (Spartolus) *pugionatus* Stål; Bolivar, Essai S. 232.

Thyrus (n. g. Metrodor.) *tiaratus* (Viti Levu); Bolivar, Essai S. 254, Pl. V, Fig. 21.

Xistra (n. g. Metrodor.) *Gogorzae* (Camarines) S. 243, Pl. V, Fig. 18, *sagittaria* (Philippinen), *impressa* (ibid.), *lurida* (ibid.) S. 244, *similis*, *ochracea* (ibid.) S. 245; Bolivar, Essai.

- Acrotylus furcifer* (Cap); Saussure, a. a. O., S. 69.
- Amorphopus cunctatus* (Neu-Caledonien), S. 250, *antennatus* (Oberamazonas) Pl. V, Fig. 19, *phyllocerus* (Gabon), *griseus* (Oberamazonas) S. 251; Bolivar, Essai.
- Arphia ovaticeps* (Colorado); Saussure, a. a. O., S. 165.
- Atractomorpha rhodoptera* Hagenb. i. l. (Java) S. 332, *angusta* (Bintang), *aberrans* (S. Salvador) S. 333; Karsch, Entom. Nachr. 1888.
- Batrachidea flavonotata* (Neu-Granada); Bolivar, Essai S. 300.
- Batrachornis Peringueyi* (Namaqua) S. 140, *namaquensis* (ibid.) S. 141; Saussure, a. a. O.
- Batrachotettix cantans* (Namaqua) S. 145, *Peringueyi* (Griqua) S. 146, *Whitei* (Südafrika; = *Trachypetra bufo Whitei*) S. 148, *acutus* (Namaqua) S. 151; Saussure, a. a. O.
- Chloeobora Grandidieri* (Madagaskar); Saussure, a. a. O., S. 34.
- Chorophyllum Saussurei* (Cuba); Bolivar, Essai S. 203, Pl. IV, Fig. 5.
- Circotettix lobatus* (Colorado) Fig. 5, (undulatus *Thom.* Fig. 6); Saussure a. a. O., S. 65.
- Colpolopha praemorsa* (Jurimaguas, Peru); A. Gerstäcker, a. a. O. S. 9.
- Copiocera lepida* (Ega; Fonteboa, Amaz.) S. 34, *specularis* (Chiriqui), *laeta* (Fonteboa) S. 35, *erythrogastra Perty*, *austera* (Iquitos, Amaz.) S. 36; A. Gerstäcker, a. a. O.
- Conozoa rebellis* (Kalifornien) S. 61, *Rogenhoferi* (Bagdad? Amerika?) S. 62, Fig. 4; Saussure, a. a. O.
- Cosmorrhysa costata* (Cap); Saussure, a. a. O., S. 37.
- Diotarus Brunneri* (Sidney), *galeatus* (Philippinen), *pupus* (ibid.), Bolivar, Essai S. 212.
- Discotettix Selysi* (Sumatra); Bolivar, Essai S. 307.
- Dittopternis cruciata* (Gawlerstown, Austr.); Saussure, a. a. O., S. 44.
- Elaeochlora hilaris* (Peru); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 10.
- Eremobia persa* (P.); Saussure a. a. O., S. 128.
- Eremocharis (Eremopesa) granulosa* (Beludschistan); Saussure a. a. O., S. 134.
- Gavialidium tuberculatum* (Minahassa), *Philippinum* (Philippinen) S. 219, *Aurivillii* (ibid.), *Celebicum* (Minahassa) S. 220, *Kraussi* (Philippinen) S. 221; Bolivar, Essai.
- Heteropternis hyalina* (Senegal; Natal; Transvaal; Sansibar); Saussure, a. a. O., S. 47.
- Heliasius Guatemalae* (G.); Saussure, a. a. O., S. 91.
- Leptopternis canescens* (Aegypten); Saussure, a. a. O., S. 89.
- Leptysma cyanoptera* (Iquitos, Amaz.); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 37.
- Mastax tipularia* (Saracayon; Jurimaguas, Peru) S. 41, *militaris* (Olivença; Fonteboa, Amaz.) S. 42, *imitatrix* (ibid.) S. 43, *laeta* (Fonteboa) S. 44, *collaris* (Saracayon) S. 45, *tenuis Perty* (Fonteboa; Saracayon) S. 46, *plebeja* (Fonteboa) S. 47; A. Gerstäcker, a. a. O.
- Mestra celebesia* (C.) S. 334, *concolor* (Salanga) S. 335; Karsch, Entom. Nachr., 1888.
- Methone fallax* (Namaqua; in der Tabelle S. 156 *rana* genannt); Saussure, a. a. O., S. 158.
- Monachidium opulentum* (Amazonas); A. Gerstäcker, a. a. S., S. 5.

Krauss erhielt die halb verschollene *Ochridia tryxalicera* Fisch. W. von Taormina, erkennt in ihr seinen *Brachycrotaphus*, der demnach einzuziehen ist, und ihre Zusammengehörigkeit zu den Tryxaliden und nicht Opomaliden, und gibt endlich die Verbreitung dieser Art (Sizilien; Türkei; Nubien; Senegal) an; Verh. Zool. Bot. Gesellsch. Wien, 1888, S. 571 f.

Ochrophlebia pygmaea (Delagoabai); Karsch, Entom. Nachr., 1888, S. 342.

Oedaleus (*Gastrimargus*) *vitripennis* (Cap); Saussure, a. a. O., S. 38, *Dohrnianus* (Transvaal), S. 166; derselbe ebenda, (*Humbella*) *procerus* (Aburi, Goldküste); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 48.

Oedipoda Ledereri (Syrien); Saussure, a. a. O., S. 51.

Ophthalmolampis pulchripes (Jquitos, Amaz.) S. 23, *modesta* (Itaituba, Amaz.) S. 24, *punicea* (Cambase, Peru) S. 25, *speciosissima* (Fonteboa, Amaz.) S. 26, *dichroa* (Ega) S. 27; A. Gerstäcker, a. a. O.

Zur Gattung *Pachytylus* bemerkt Retowski in Berichtigung der Brunner'schen Charakteristik, dass der Kiel des Pronotum fast immer durch die typische Querrfurche und ausserdem bisweilen in der vorderen Hälfte durch eine oder zwei kleine Furchen leicht eingekerbt ist. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1888, No. 3, S. 407.

Eine Nota sulla Cavalletta nomade o *Pachytylus migratorius* (L.) von A. P. Ninni spricht aus, dass diese Art in Italien entweder ganz fehlt oder nur ausnahmsweise vorkommt; Venezia, Antonelli, 1887.

Parapleurus alliaceus Germ. in verheerender Menge aufgetreten (Verdalle, Arrondissement Castres); A. Giard, Le Naturaliste, 1888, S. 203 f.

Petasia impotens (Usegna); Karsch, Entom. Nachr., 1888, S. 360, *monacha* (Delagoa-B.); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 2.

Phrynotettix (rana Sauss. Fig. 7.) *peruviana* (Peru); Saussure, a. a. O., S. 30, Fig. 8.

Phymateus madagassus (nordwestl. M.); Karsch, Entom. Nachr., 1888, S. 357.

Poecilocerus calotropidis Barnum i. l. (Dahela, Sennâr); Karsch, Entom. Nachr., 1888, S. 346.

Procolpia (*Prorrhachis*) *gonagra* (Fonteboa, Amaz.) S. 6, *nuptialis* (Olivença; Ega; Fonteboa) S. 7; A. Gerstäcker, a. a. O.

Pycnodictya citripennis (Sierra-Leone); Saussure, a. a. O., S. 167.

Pyrgomorpha picturata (S. Salvador) S. 340, *explicata* (Neu-Guinea) S. 341; Karsch, Entom. Nachr., 1888.

Quiroguesia Brullei var. *Blanchardiana* (Bombay; Aden); Saussure, a. a. O., S. 35.

Rhomalea opulenta (Olivença; Iquitos, Amazon.); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 82.

Scelimena sanguinolenta Krauss (Java, = *Tett. productus* Stål nec De Haan); Bolivar, Essai S. 216.

Spartolus tricostratus (Philippinen); Bolivar, Essai S. 233.

Sphingonotus bengalensis (B.), *niloticus* (Aegypten) S. 80, *brasiliensis* (Br.) S. 81, *mongolicus* (M.) S. 82, *japonicus* (J.) S. 84, *intutus* (Schahrud, Persien) S. 87; Saussure, a. a. O.

Tallavignes und Lucas fanden in Eierhäufchen des *Stauronotus maroccanus* in Algier zweierlei Larven, die Lucas einem Hautflügler und

einem Käfer zuschreibt; letztere erinnert etwas an die von Trichodes; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXCVf.

Stenobothrus parallelus und *Stetheophyma grossum* sind im Sommer 1887 in Belgien verheerend auf Ackerfeldern aufgetreten; de Borre, Bull. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. LXXVIII f.

Stenobothrus Saulcyi (Vernet-les-Bains, Pyrenäen); Krauss, Verh. Zool. Bot. Gesellsch. Wien, 1888, S. 573, Taf. XV, Fig. 4, *lesinensis* (L.); derselbe, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 117, *grammicus* (Navacerrada; Peñalara; Escorial); M. Cazorro y Ruiz, An. Soc. Esp. Hist. Natur., XVII, S. 457.

Taphronota gabonica (Gabun); Karsch, Entom. Nachr., 1888, S. 358.

Tetratania brachyptera (Fonteboa, Amaz.) S. 19 (?) *virgata* (ibid.) S. 20; A. Gerstäcker, a. a. O.

Tettigidea Guatemalteca (Guatemala) S. 298, *Scudderi* (Oberamazonas), *multicostata* (Brasilien) S. 299; Bolivar, Essai.

Tettix asperulus (Apiahy, Brasil.) S. 260, *priscus* (Nordaustral.), *dubiosus* (Kaffrarien) S. 261, *irruptus* (Sidney), *tartarus* (Turkestan) S. 262, *Japonicus* (J.) S. 263, *Sibiricus* (Ostsibirien) S. 265, *Brunnerii* (Hudsons-Bai) S. 266, Pl. V, Fig. 22, *signatus* (Dolores, Philippinen) S. 268; Bolivar, Essai, *Kraussi* (Frankreich, Deutschland, Österreich); F. de Saulcy, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXXXV.

Thericles zebra (Victoria, Abo; Kamerun); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 47.

Tmetonota (charact. emend.) *tuberculosa* (Südafrika), *verrucosa* (Cap) S. 56, *scabra* (Cap), *terrosa* (Cap) S. 57; Saussure, a. a. O.

Vilerna tibialis (Fonteboa; Olivença; Amaz.), *flavipennis* (Fonteboa); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 13.

Xerophyllum fuscum (Sierra Leona) S. 204, *simile* (Angola) S. 205, Pl. IV, Fig. 6; Bolivar, Essai.

H. de Saussure theilt (nach Peringuey) mit, dass (in der Gefangenschaft) eine *Xiphocera carinata* L. ♂ sich mit einer *X. canescens* ♀ gepaart habe und beschreibt *X. (Bradyana) Sauss.* S. 156, Fig. 3), *Peringueyi* (Namaqua) S. 157, Fig. 4, (*Bolivariana Sauss.* S. 158, Fig. 5); Ann. Soc. Entom. de France, 1888, Pl. 5.

Xiphophora (soll *Xiphocera* heissen) *cyanoptera* (Olivença, Amaz.; Jurimaguas, Peru); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 11.

Locustidae. H. Dohrn schreibt über einige merkwürdige Pseudophylliden; Stett. Ent. Zeit., 1888, S. 353—362.

Aistus (n. g. Stenopelmat.) *gracilis* (Neu-Caledonien); Brunner, a. a. O., S. 278, Fig. 10.

Ametrus (n. g. Gryllacrid.) *tibialis* (Melbourne); Brunner, a. a. O., S. 385, Fig. 50.

Amytta (n. g. Meconem., ♂ mit Stimmorgan) *pellucida* (Bondei; Usambara); Karsch, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 161, der ebenda S. 159f. die Gruppe der Meconemiden schildert; vgl. unten, Krauss, bei *Cyrtaspis*.

Anisotochra (n. g. Acrometop.) *gracilipes* (Kuako-Kimpoko, Westafri.); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 431.

Apopetamenus (n. g. Stenopelmat.) *Amazonae* (Ober-Amaz.) Fig. 16, *clipeatus!* (Brasilien); Brunner, a. a. O., S. 283.

Apotrechus (n. g. Gryllacrid., für *Gryll. ambulans* Erichs. und) *unicolor* (Port Denison); Brunner, a. a. O., S. 384, Fig. 49.

Aprosphyllus (n. g. Decticin.) *hybridus* (Angra); A. Pictet, a. a. O., S. 67, Fig. 22.

Borborothis (n. g. Stenopelmat.) *opaca* (Cap); Brunner, a. a. O., S. 280, Fig. 12.

Brachyporus (n. g. Stenopelmat.) *personatus* (Madagaskar); Brunner, a. a. O., S. 272, Fig. 7.

Bugajus n. g. (soll *Bugaeus* heissen) für (*Anostostoma*) *Couloni* Sauss.; Brunner, a. a. O., S. 264.

Butleria n. g. Stenopelmat. für (*Anostost.*) *alata* Buttl.; Brunner, a. a. O., S. 289.

Büttneria (n. g. Phaneropterin., Gruppe *Phlaurocentr.*) *maculipes* (Kuako-Kimpoko, Westafrika); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 445.

Carcinopsis (n. g. Stenopelmat.) *unicolor* (Neu-Caledonien), *signata* (ibid.) S. 276, *ornata* (Nossibé), *femorialis* (Natal) S. 77, *fusca* (Natal) S. 278; Brunner, a. a. O.

Chlorophylla (n. g. Pterochrozin.) *latifolia* (Cayenne); A. Pictet, a. a. O., S. 43, Fig. 14.

Choeroparnops (n. g. Pseudophyllid.) *Hahneli*, *Garleppi*, *platythorax*, *fulvus* (Amazonenstrom); H. Dohrn, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 360, Taf. II, Fig. 3.

Comicus (n. g. Gryllacid.) *Capensis* (Cap); Brunner, a. a. O., S. 387, Fig. 52.

Cosmozoma! (n. g. Stirodont.) *Doenitzi* (Süd-Zentral-Madagaskar); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 461, Taf. IV, Fig. 12.

Cyrtophyllites (n. g. Maxillartaster auffallend stark entwickelt) *Rogeri* (lithogr. Schiefer); Oppenheim, Palaeontogr. 34, S. 223, Taf. XXX, Fig. 5.

Dapanera (n. g. Psyr.) *genuteres* (Accra); F. Karsch, Berlin. Ent. Zeitschr. 1888, S. 441.

Dibelona (n. g. Gryllacid. für *Gryll. rubrinervosa* Serv. und) *Brasilensis* (Santo Paulo), S. 366, *Cubensis* (C.) S. 367; Brunner, a. a. O.

Dicranostomus (n. g. Mecroncidio affine; mandibulae basi dente longo, cylindrico, antrosum porrecto, apice incurvato, acuto armatae; fastigium frontis in processum conicum, acutum prolongatum) *monoceros* (Cumbasi, Peru); H. Dohrn, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 362, Taf. II, Fig. 2.

Diestrammena (n. g. Stenopelmat. für *Rhaphidoph. marmorata* de Haan und) *unicolor* (Wladiwostok; Peking; Tenasserim), *apicalis* (Japan); Brunner, a. a. O., S. 299.

Dyscapna (n. g. Stenopelmat.) *atra* (Angola); Brunner, a. a. O., S. 279, Fig. 11.

Echinacris (n. g. Pseudophyllin.) *hispida* (Ober-Amazon.); A. Pictet, a. a. O., S. 20, Fig. 5.

Emptera (n. g. Sagin.; uterque sexus alatus, elytris alisque longioribus) für (Saga) *Indica* Herbst; H. de Saussure, Ann. Soc. Entom. de France, 1889, S. 148.

Epacra (n. g. Gryllacid.) *acnea* (Rockhampton) Fig. 48, *modesta* (Cap York); Brunner, a. a. O., S. 382.

Eremus (n. g. Gryllacid. für *Gr. sphinx* Gerst., *glomerinus* Gerst. und) *nigrifrons* (Indien?) S. 375, *rugosifrons* (China) Fig. 46, *geniculatus* (Indien) S. 376, *atroctectus* (Himalaja), *spinulosus* (Viti-I.) S. 377, *Muelleri* (Queensl.), *fusco-terminatus* (China) S. 378, *brevisfalcatus* (Kamerun), *marginatus* (Sambesi) S. 379, *exiguus* (Madagaskar) S. 380; Brunner, a. a. O.

Eucatopta (n. g. Phaneropterin., Vertreterin der neuen Gruppe Eucatopt.) *Heringi* (Süd-Zentral-Madagaskar); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 448, Taf. IV, Fig. 8.

Eumenymus (n. g. Decticin.) *Vaucherianus* (Marocco; Tanger); A. Pictet, a. a. O., S. 59, Fig. 36.

Gammarotettix (n. g. Stenopelmat.) *Californicus* (C.); Brunner, a. a. O., S. 305, Fig. 32.

Glaphyrosoma (n. g. Stenopelmat. für *Daihinia Mexicana* Sauss. und *gracile* (Mexiko; Guatemala); Brunner, a. a. O., S. 284, Fig. 17.

Gonatoxia (n. g. Psyr.) *immaculata* (Usambara), *maculata* (Somali); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 442.

Gryllacropsis (n. g. Stenopelmat.) *perturbans* (Madras); Brunner, a. a. O., S. 279, Fig. 10, 2.

Hemihetroides (n. g. Hetroidin.) *Peringueyi* (Südafrika); A. Pictet, a. a. S. 74, Fig. 30.

Hemisaga (n. g. Sagin.; *Pronoti sulcus typicus oblitteratus*; tibiae intermediae superne spinulis nonnullis armatae; meso = et metasterni spinæ invicem remotae, in longitudinem compressae, erectae) *hastata* (Afrika); H. de Saussure, Ann. Soc. Entom. de France, 1888, S. 149.

Heteromallus (n. g. Stenopelmat.) *notabilis* (Chili), Fig. 35, *spina* (ibid.); Brunner, a. a. O., S. 311.

Hyperbaenus (n. g. Gryllacid.) *virgo* (Pern), *juvenis* (Brasilien; Pernambuco) S. 368, *ensifer* (Pernambuco), Fig. 43, S. 369; Brunner, a. a. O.

Hypocophus (n. g. Stenopelmat.) *fortior* (Madagaskar); Brunner, a. a. O., S. 281, Fig. 14.

Idiostatus (n. g. Decticin.) *californicus* (K.); A. Pictet, a. a. O., S. 64, Fig. 35.

Macroscirtus (n. g. Mecopodin.) *kangaroo* (Gabon); A. Pictet, a. a. O., S. 14, Fig. 38.

Macrocephalus (n. g. Conocephalin.) *vaginatus* (Java) S. 53, Fig. 27, *nasicornis* (ibid.) S. 54, Fig. 26; A. Pictet, a. a. O.

Magrettia (n. g. Stenopelmat.) *abominata* (Suakim; Dongola), *mutica* (Aschabad) Fig. 18; Brunner, a. a. O., S. 285.

Megotoessa (n. g. Stirodont.) *insulana* (Süd - Zentral - Madagaskar); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 461, Taf. IV, Fig. 11.

Mimetica (n. g. Pterochrozin.) *mortuifolia* (Mittelamerika); A. Pictet, a. a. O., S. 30, Fig. 13.

Monteiroa (n. g. Amblycoryph.) *latifrons* (Delagoabai); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 458.

Neanias (n. g. Gryllacid.) *lobatus* (Neu-Guinea) Fig. 45, S. 373, *squamosus* (Ceylon) S. 374; Brunner, a. a. O.

Neonetus (n. g. Stenopelmat.) *variegatus* (Neu-Seeland); Brunner, a. a. O., S. 300, Fig. 27.

Neortus (n. g. Gryllacid. für Gr. *Carolinensis* Gerst. und *Jamaicensis* (J.); Brunner, a. a. O., S. 381, Fig. 47.

Ommatoptera (n. g. Pterochrozin.) *laurifolia* (Brasilien?); A. Pictet, a. a. O., S. 34, Fig. 15.

Oryctopus (n. g. Stenopelmat.) *Bolivari* (Madura); Brunner, a. a. O., S. 267, Fig. 4.

Otiaphysa (n. g. Phaneropterin., Gruppe *Otiaphys.*, ausgezeichnet durch kurze Legescheide, muschelförmige foram. tymp., Vorderhüftendorn) *hebetata* (Usambara); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 454, Taf. IV, Fig. 10.

Pachyr(r)hamma (n. g. Stenopelmat. für *Hadenocerus Edwardsii* Sauss. und *Novae-Seelandiae* (N. S.); Brunner, a. a. O., S. 302, Fig. 29.

Pantolepta (n. g. Acrometop.) *heteromorpha* (Mombassa); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 430, Taf. IV, Fig. 5.

Paragryllacris (n. g. Gryllacr. für *combusta* Gerst. und) *infusca* (Adelaide), *callosa* (Sidney), Fig. 44 B, S. 371, *latelineolata* (Melbourne) Fig. 44 C, *exserta* (Queensl.), *lobata* (Rockhampton) S. 372, *modesta* (Port Adelaide) S. 373; Brunner, a. a. O.

Paura (n. g. Phaneropterin., Vertreter der neuen Gruppe *Paurae*) *biramosa* (Usambara) S. 439, Fig. 6, *reticulosa* (Mombassa) S. 440, Fig. 7; F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, Taf. IV.

Peringueyella (n. g. Sagin.; *Corpus gracillimum*, bacillare; caput apice longe anguste productum; prosternum muticum, meso = et metasternum spinulis 2 armata; pedes gracillimi; femora 1, 2 subtus spinis utrinque 9, tibiae 8, 7 armat.; für *Saga macrocephala* Schaum und) *jocosa* (Südafrika); H. de Saussure, Ann. Soc. Entom. de France, 1888, S. 152, Pl. 5, Fig. 1, 2.

Peronura (n. g. Acrometop.) *clavigera* (Mombassa) Fig. 2, *Hildebrandtiana* (ibid.) Fig. 3; F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, Taf. IV.

Pherterus (n. g. Stenopelm. für *Rhaphidoph. Cubaensis* de Haan und) *Brasiliensis* (Theresopolis); Brunner, a. a. O., S. 282.

Phlaurocentrum (n. g. Phaneropterin., Gruppe *Phlaurocentr.*) *latevittatum* (Kuako-Kimpoko, Westafr.); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 445.

Phyrama (n. g.; eine Vereinigung der Merkmale der Prochiliden und Mecopiden zeigend) *interjectum* (Süd-Zentral-Madagaskar); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 417, Taf. IV, Fig. 1.

Plangiopsis (n. g. Stirodont.) *semiconchata* (Kamerun); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 460.

Platenia (n. g. Pseudophyllid. Sathrophylliae affine, alar. post. campo axillario rudimentario distinctum) *semialata* (Palawan); H. Dohrn, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 354., Taf. II, Fig. 4.

Platysiagon (n. g. Stenopelmat.) *signatus* (Tabora); Brunner, a. a. O., S. 292, Fig. 23.

Plegmatoptera (n. g. Acrometop.) *reticulata* (Tanganjika-See); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 429, Taf. IV, Fig. 4.

Rhodopteryx (n. g. Pterochrozin., Name bei Schmetterlingen vergeben) *pulchripennis* (Neu-Granada); A. Pictet, a. a. O., S. 32, Fig. 7.

Stilpnothorax (n. g. Phaneropter.) *loricatus* (Südafrika); A. Pictet, a. a. O., S. 6, Fig. 1.

Thoracistus (n. g. Decticin.) *Peringueyi* (Transvaal); A. Pictet, a. a. O., S. 62, Fig. 16, 21.

Trihoplophora (n. g. Stenopelmat.) *abnormis* (Nordaust.); Brunner, a. a. O., S. 281, Fig. 13.

Weissenbornia (n. g. Phaneropterin. *Ancylechae* Serv., *Phygelae* Stål,

Arnobiae Stål affine, palpis valde compressis, dilatatis, art. apic. latere interiore concavo distinctum) *praestantissima* (Kamerun); Karsch, Ent. Nachr., 1888, S. 66.

Zeuneria (n. g. Psyr.) *melanopeza* (Kamerun); F. Karsch, Berl. Entom. Zeitschr., 1888, S. 443.

A. Pictet stellt a. a. O., S. 69, eine Synopsis der Arten der Gattung *Acanthoproctus* auf und beschreibt *A. capreolus* (Cap) Fig. 33, *ibex* (Süd-Afrika) S. 72, Fig. 31.

Agraecia pupus Sauss. i. l. (Neu-Irland) S. 49, Fig. 28, *Godeffroyi* (ibid.) S. 50, Fig. 29; A. Pictet, a. a. O.

Anostostoma opacum (Queensland); Brunner, a. a. O., S. 271.

Antaxius Capellei (Monserat); Cazurro y Ruiz, An. Soc. Esp. Hist. Natur., XVII, S. 459.

Apocerycta Bariana (Cayenne); A. Pictet, a. a. O., S. 10, Fig. 3.

F. Karsch stellt eine Übersicht der afrikanischen Arten der Gattung *Arantia* auf mit *A. regina* (Gabun) S. 434, *marmorata* (Kongo), *excelsior* (Sierra Leone) S. 435, *accrana* (Accra), *hydatinoptera* (Binue) S. 436, *retinervis* (Chinchoxo; Kamerun; Sierra Leone) S. 437, *simplicinervis* (Chinchoxo) S. 438; Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 432—438.

Barbitistes Berengueri (Var; in Wäldern und Weinbergen verheerend); V. Mayet, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXI.

Caedicia afra (Binue); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 446.

Ceuthophilus unispinosus (Kalif.), *nodulosus* (Dallas, Texas) Fig. 33 A, S. 308; Brunner, a. a. O.

Clonia tessellata (Südafrika); H. de Saussure, Ann. Soc. Entom. de France, 1888, S. 143.

Cocconotus personata (?); A. Pictet, a. a. O., S. 17, Fig. 6.

Pictet stellt a. a. O., S. 44, eine synoptische Tabelle der *Copiophora*-Arten auf und beschreibt die neuen *C. licornis* (Ober-Amazon.) S. 45, Fig. 24, *carinata* (ibid.) S. 46, *cultricornis* (Mittelamerika), S. 47, Fig. 23, *rhinoceros* (ibid.) S. 48, Fig. 25.

F. Karsch beschreibt das Weibchen des *Corgeus Jurinei* Sauss.; die bis dahin unbekannte Heimath dieser Gattung ist Kamerun; Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 415f. mit Holzschn.

Ctenodecticus costulatus (Sardinien); Costa a. a. O. I, No. 2, S. 87.

Krauss erinnert an seine schon früher mitgetheilte Beobachtung von dem Zirpen der *Cyrtaspis scutata* Charp. und beschreibt das Zirporgan, das sich auf der Unterseite beider Flügel in Gestalt einer mit 10—11 starken Zähnchen versehenen Schrillease befindet; es kann somit sowohl der rechte wie der linke Flügel als Fiedelbogen und als Saite fungiren (?; Voraussetzung ist dabei, dass beide Flügel ihre Lage zu einander, der rechte unter oder über dem linken, vertauschen können; vgl. meine früheren Bemerkungen zu *Ephippigera*). Da nun *Cyrt. scutata* einen Zirpapparat besitzt, so wird dadurch die Berechtigung der von Karsch aufgestellten Gattung *Amytta* (s. oben) zweifelhaft. Verhandl. Zool. Bot. Gesellsch. Wien, 1888, S. 574—576, Taf. XV, Fig. 5.

Dinacrida ligata (Neu-Seeland); Brunner, a. a. O., S. 268, Fig. 5.

Dioncomena superba (Bondei; Usambara); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 449.

Elbenia manillensis (M.); A. Pictet, a. a. O., S. 7.

F. Karsch widerruft nach Ansicht eines *Eugaster Guyonii Serv.* seine Meinung von der Identität dieser Art mit *E. spinulosus* (L.) und stellt eine neue Tabelle der 3 Arten auf; Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 462f.

Eurycorypha brevipennis (Süd-Zentral-Madagaskar), *spinulosa* (Knako-Kimpoko, Westafri.); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 455.

Gampsocleis glabra neu für Belgien (Lanklaer); C. Bamps, Bull. Soc. Entom. Belg., 1888, S. XVIII—XXII.

Gryllacris cyanea (Nordaustr.) S. 326, *magnifica* (Melbourne) S. 327, *nigrata* (Sumatra) S. 328, *nigro-geniculata* (Manilla), *nigro-scutata* (Batavia) S. 330, *dimidiata* (Neu-Britannien) S. 331, *distincta* (?) S. 332, *alternans* (Puebla) und var. *minor* (Indien), *annulata* (Ceylon) Fig. 41 A, S. 333, *vittata* (Indien) S. 334, *abbreviata* (Indien), *atrata* (Hinterindien), *Chinensis* (Hongkong; Cochinchina) Fig. 41 B, S. 335, *laeta* (Bagamoio; Sansibar) S. 337, *hieroglyphica* (Ceylon), *deminuta* (China) S. 338, *deflorata*, *latifrons* (Indien) S. 339, *falcifer* (Java?), *castanea* (Himalaja), *reticulata* (Ceylon) S. 340, *falcata* (China), *parvula* (Java) S. 341, *inconspicua* (Celebes), *secpunctata* (Ceram), *navicula* (?) S. 342, *spuria* (Ceylon), *laevigata* (Ober-Amaz.) Fig. 41 C, S. 344, *cruenta* (ibid.) S. 345, *moesta* (Philippinen) S. 346, *moestissima* (Halmahera) S. 347, *superba* (Borneo) Fig. 39, *soror* (ibid.) S. 348, *picea* (Comoren), *luctuosa* (Palembang), *voluptaria* (Celebes) Fig. 41 G, S. 349, *aethiops* (Sumatra), *excelsa* (Duke of York Isl.) Fig. 41 D, S. 351, *appendiculata* (Neu-Britannien) Fig. 41 H, S. 352, *obscura* (Sunda-I.), *variabilis* (Batavia), Fig. 40, *lugubris* (Java) S. 353, *junior* (Silhet) Fig. 41 F, S. 354, *athleta* (Buerö) S. 355, *aurantiaca* (Amboina) S. 356, *punctata* (Quango), *conspersa* (Madagaskar), *quadripunctata* (Guinea) S. 357, *atriceps*, *stigmata* (Madagaskar), *infumata* (Amboina) S. 358, *straminea* (Adelaide), *ligata* (Neu-Britannien) S. 359, *debilis* (Nordaustr.) S. 360, *ferruginea* (Viti-I.), *exigua* (Neu-Caledonien), *hyalina* (Australien), *gemina* (Nordaustr.) S. 361, *major* (Sidney), *adventa* (Queensl.), *Africana* (Goldküste) S. 362, *sanguinolenta* (Madagaskar), *abluta* (San Salvador), *picta* (Costa Rica) S. 363, *maculata* (Chiriqui), *Hattensis* (H.), *nana* (Port Natal) S. 364, *fasciata* (Fernando Po), *nivea* (Madras) S. 365, *submutica* (Mombassa) S. 365; Brunner, a. a. O.

Isophia (*taurica* ♂ S. 409), *Brunneri* (Krim) S. 410; Retowski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1888, No. 8.

Locusta viridissima 1886 sehr häufig einen *Gordius* beherbergend; Dalla Torre, 17. Ber. naturw.-mediz. Ver. Innsbruck, Vereinsnachr., S. 8.

Karsch stellt eine neue, bereicherte Tabelle der Mecopoda-Arten auf und beschreibt *M. cyrtoscelis* H. Dohrn i. l. (Sega-Bay) S. 146, (*Euthypoda*) *unguiculata* (Usambara) S. 147; Entom. Nachr., 1888, S. 145—148.

Mimnermus costulatus (Malanga, Angola); Brunner, a. a. O., S. 290.

Odontura Calaritana (Sardinien); Costa, a. a. O., I No. 2, S. 88.

Onosandrus crassipes (Grahamstown), *Saussurei* (Cap) S. 287, *opacus* (Cape-town), *humilis* (Madagaskar) S. 288; Brunner, a. a. O.

H. Dohrn gibt von der Gattung *Panoploscelis* Scudd. eine erneute Diagnose und erwähnt dabei als ein die Gattung „vor allen anderen Heuschrecken“ auszeichnendes Merkmal das Vorkommen eines grossen Zirporgans beim Weibchen; bekanntlich besitzen aber die weiblichen *Ephippigera* und *Platyphyllum*-Arten ebenfalls ein Zirporgan. Derselbe beschreibt dann weiterhin

P. armata Scudd. Die von Walker noch beschriebenen Arten, *P. tuberculata* und *tuberosa* gehören nach Dohrn der neuen Gattung *Choeroparnops* an; Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 355–359.

Paradrymadusa Galitzini (Theodosia und Nowij-Swet, Krim); Retowski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1888, No. 3, S. 411, *syriaca* (S); A. Pictet, a. a. O., S. 55, Fig. 37.

Plangia guttatipennis (Madagaskar), *camerata* (Kamerun); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 457.

J. Pungur schildert die Lebensweise des *Poecilimon Schmidtii*; Mathematische und naturwissensch. Berichte aus Ungarn, IV. Bd., S. 78–85, Taf. II.

Poecilimon tauricus (Krim); Retowski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1888, No. 3, S. 408.

Posidippus Barellus (Cayenne); A. Pictet, a. a. O., S. 11, Fig. 4.

Prosagoga coriacea (Guinea); A. Pictet, a. a. O., S. 9, Fig. 2.

Raphidophora mutica (Java), *crassicornis* (Australien) S. 295, *nigerrima* (Amboina; Borneo), *foeda* (Neu-Guinea) Fig. 25, S. 296, *fulva* (Java), *gracilis* (Philippinen) S. 297, *deusta* (Indien) S. 298; Brunner, a. a. O.

Saga serrata bei Znaim in Mähren; Wachtl, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 65; in Sizilien (Fontanamurata, Prov. Palermo) wieder aufgefunden; F. Pajno, Il Natur. Sicil., VII, S. 166 f.

Saga Brunneri (Ephesus) S. 183, *Ledereri* (Syrien) S. 184, *Lucasii* (Syrien) S. 135; H. de Saussure, Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Schoenobates apterus (Guatemala) S. 274, Fig. 8A, *frater* (Indien?) S. 275; Brunner, a. a. O.

Stenopelmatus longispina (Vancouver) S. 260, Fig. 1D, *Californicus* (ibid.) Fig. 1A, B, C, *irregularis* (Mazatlan), *hydrocephalus* (Calif.) S. 261, *vicinus, Guatemalae* (G.) S. 262; Brunner, a. a. O.

Symmetropleura dirempta (Nossi bé); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 451.

Tanusia grandiocellata (Guinea?) S. 37, Fig. 20, *variabilis* (Guinea) S. 38, Fig. 19; A. Pictet, a. a. O.

Thamnotrizon ponticus (Dwuch - Jakornij, Kisiltasch und Novorossiisk, Krim); Retowski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1888, No. 3, S. 412.

Turpilia madagassa (M.); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 448.

Tylopsis inhamata (Delagoabay); F. Karsch, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 453.

Typophyllum excisum (Cayenne) S. 26, Fig. 9, *lunatum* (Peru) S. 27, Fig. 12, *peruvianum* (P.) S. 29, Fig. 10; A. Pictet, a. a. O.

Gryllidae. *Gryllodes Brunneri* (Palermo; Castelvetro); Riggio, Il Natural. Siciliano, VII, S. 110 mit Synopsis der Arten auf S. 113, Tav. I, Fig. 1, 2, *Panteli* (Uclés); Cazorro y Ruiz, An. Soc. Esp. Hist. Nat., XVII, S. 461.

Die bisher unbekannten Weibchen von *Gryllomorphus Fragosoi* Boliv. sind etwas grösser und breiter als die Männchen, entbehren der Flugorgane vollständig und besitzen eine Legescheide, deren Länge meist hinter $\frac{1}{4}$ der Körperlänge zurückbleibt; Retowski, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1888, No. 3, S. 414.

Mogoplistes Novaki (Lesina); Krauss, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 118.

Physopoda.

K. Jordan stellt in Zeitschr. f. wiss. Zool., 47, S. 541—620, Taf. XXXVI bis XXXVIII, die Anatomie und Biologie der Physopoda dar, wobei der Verfasser fast über alle Organe wichtige Aufschlüsse giebt. Die Mundtheile stehen gewissermassen auf der Grenze zwischen denen von Locusta und Homopteren. Oberlippe, Unterkiefer und Unterlippe bilden den nach unten und hinten gerückten Mundkegel, in dem die stechenden Mandibeln Aufnahme finden; ausser diesen dient auch noch eine unpaare, unsymmetrisch zwischen Oberlippe und Hypopharynx links gelagerte Stechborste sowie der Hypopharynx zum Zerstören des Pflanzengewebes. — Die Athemorgane sind reich verzweigte Tracheen, die mit 3 (oder 4) Stigmenpaaren, am Meso- (und Meta-) thorax, am 1. und 8. Hinterleibsring sich öffnen; bei den Larven ist das Tracheensystem holopneustisch angelegt. — Der Darm hat 2 Paar von Malpighi'schen Gefässen, die unverästelt sind; das eine Paar liegt im vorderen Theil, das zweite Paar im hinteren Theil des Hinterleibs; beide münden an derselben Stelle in den Darm. Auch zwei Paare von Speicheldrüsen sind vorhanden, von denen bei den Tubuliferen das eine Paar blasenförmig, das andere schlauchförmig ist. Bei den Terebrantien ist das blasenartige Paar hell und durchsichtig, das schlauchförmige stark verlängert und an seinem Ende an den Mitteldarm befestigt. — Das Nervensystem zeichnet sich durch geringe Zahl seiner Ganglienknotten aus. Das Gehirn ist gross; in der Brust liegen 3 Ganglien, je 1 in jedem Segment; im Hinterleib hat nur das erste Segment ein Ganglion, von welchem ein dünner Strang durch den ganzen Hinterleib zieht. — Das Herz liegt im 8. Hinterleibsringe, hat die Länge von diesem, 2 Paar Ostien und setzt sich vorne in die sehr lange, dünne Aorta fort.

Die Geschlechtsdrüsen der Tubuliferen und der ♂ der Terebrantien münden zwischen dem 9. und 10. Hinterleibsringe; die ♀ der Terebrantien besitzen einen gesägten Legebohrer, der aus der ventralen Platte des 8. und 9. Ringes hervorgegangen ist und in der Ruhe von einer ventralen Rille der 3 letzten Segmente aufgenommen wird. Die Terebrantien haben neben den 2 Hoden ein Paar blasenförmige Drüsen; bei den Tubuliferen sind 2 Paar schlauchförmige Anhangsdrüsen vorhanden. Bei beiden sind 8 Ovarialröhren vorhanden, die ausser dem Endfache nur Eifächer enthalten; je 2 sind an ihrem Ende in einen gemeinsamen Faden verlängert; je 4 haben einen gemeinsamen Ovidukt, und die beiden Ovidukte vereinigen sich bald zu der unpaaren Scheide, der ein lang gestieltes rec. seminis angefügt ist. Manche Arten, z. B. die in unseren Gewächshäusern nicht seltenen Heliothrips, sind im Stande, sich parthenogenetisch fortzupflanzen, obwohl auch bei ihnen zeitweilig ♂ vorkommen. Die Terebrantien legen ihre Eier in das Parenchym der Pflanzen; die Entwicklung erfolgt, wie bereits bekannt ist, mit Anlage eines innerlichen Keimstreifens.

Wenn die Physopoden auch manche Beziehungen zu den Orthopteren s. l. haben, so sind sie doch als eine selbständige Ordnung anzusehen, die sich von diesen abgezweigt hat, und so zwischen die Mallophagen und Rhynchoten zu stehen kommt. Als Charaktere dieser Ordnung giebt Jordan folgende an.

Körper sehr schmal, 1—10 mm lang, niedergedrückt. Kopf hypognath; Mundtheile unsymmetrisch, saugend; Mandibeln zu Stechborsten umgewandelt; Oberlippe mit Unterkiefer und Unterlippe zu einer kurzen, dicken Röhre ver-

G*

wachsen; Kiefer- und Unterlippentaster kurz, 1- bis 2 gliederig. Fühler borsten-, faden- oder schnurförmig, 7- bis 9 gliederig. Facettenaugen gross, 3 Ocellen meist vorhanden. Thoraxringe ziemlich gleichlang, Prothorax frei, Metanotum länger als Mesonotum; Mesophragma schwach, Metaphragma fehlend. Abdomen 10 gliederig, 1. Segment ohne Bauchplatte, seine Dorsalplatte in die Metathoraxbedeckung eingegangen; Aftersegment oft röhrig (Tubulifera); Beine kurz, Tarsus 1—2 gliederig; Klaue sammt Haftlappen zu einem ausstülpbaren Blasenapparat verwachsen. Zwei Paar sehr schmaler Flügel, Adersystem reducirt; Rand lang gefranst; oft fehlend oder rudimentär. 3 oder 4 Paar Stigmata, je 1 am Meso- bezw. auch am Metathorax, am 1. und 8. Hinterleibsegment. Darm deutlich in Vorder-, Mittel- und Enddarm gegliedert, ohne Saugmagen, Mitteldarm gross, ohne äussere Drüsenanhänge, 4 Malpighi'sche Gefässe, 2 Paar Speicheldrüsen. Nervensystem konzentriert, besteht aus Gehirn, Unterschlundganglion, Meso-, Metathorax- und 1 Abdomenknoten, von welch letzterem ein unpaarer Strang, das Abdomen durchziehend, abgeht. Herz klein, im 8. Abdomensegment, Aorta lang. Weiblicher Geschlechtsapparat mit vierklappiger Legeröhre an der Oeffnung zwischen achtem und neuntem Abdomenring (Terebrantia), oder ohne Legeröhre und Oeffnung zwischen 9. und 10. Segment (Tubulifera). Zweimal 4 Ovarialröhren, ein recept. seminis, keine accessorischen Drüsen. Männliche Oeffnung zwischen 9. und 10. Segment, mit dreitheiliger äusserer Genitalarmatur (Terebrantia), oder mit hervorstülpbarem ductus ejaculatorius (Tubulifera); paariger Hoden je ein kolbiger, einfacher Schlauch; 2 oder 4 accessorische Drüsen.

Fortpflanzung geschlechtlich oder parthenogenetisch. Keimstreif ein vollständig innerer. Larve ähneln der Imago; Nymphe ohne Nahrungsaufnahme; Larve und Imago phytophag.

Osborn stellt die Angaben verschiedener Beobachter über the food habits of the Thripidae zusammen und theilt seine eigenen Beobachtungen über zahlreiche Arten mit, die an bestimmte Pflanzen geknüpft sind; Insect life, I, S. 137—142.

The grass-eating Thrips (*Limothrips poaphagus* Mss.) ist eine neue „Gras-Pest“; Lintner, Report of the State-Entomologist of New-York for 1886; s. Americ. Naturalist. 1888, S. 260.

D. v. Schlechtendal behandelt die Physopoden aus dem Braunkohlengebirge von Rott am Siebengebirge; Zeitschr. f. Naturwiss. Halle, LX. S. 551—592, Taf. III—V. — Reste von Physopoden sind, wie überhaupt in tertiären Ablagerungen, in den Rotter Braunkohlenplatten keine Seltenheit. Während aber bisher nur Angehörige der Terebrantia bekannt waren, fanden sich unter den Rotter Resten auch ein Phloeothrips. Im Ganzen waren es dreissig und einige Platten, die erkennbare Reste von Physopoden enthielten, die vom Verfasser 12 Arten zugetheilt werden: ausser dem zu den Tubuliferen gehörigen Phloeothrips *Pohlgi* 7 Thrips- und 4 Heliothrips-Arten; wobei Schlechtendal einerseits die Möglichkeit zulässt, dass einige der zu Thrips gerechneten anderen Gattungen zuzuzählen sein möchten, und anderseits, dass die Gründe, welche die Einordnung der anderen Arten unter Heliothrips veranlassten, nicht im Objekte selbst, sondern in der Art des Versteinerungsvorganges liegen. Die Arten sind Phloeothrips *Pohlgi* S. 560, Fig. 1; Thrips *excellens* S. 564, Fig. 2—8, *longula* S. 568, Fig. 9, *pennifera* S. 570, Fig. 10—12, *breviventris* S. 572, Fig. 13 bis 15, *minima* S. 574, Fig. 16, 17, *pygmaea* S. 577, Fig. 18, 19, *capito* S. 579,

Fig. 20; *Heliothrips cucullata* S. 582, Fig. 21, 22, *longipes* S. 586, Fig. 23, *clypeata* S. 589, Fig. 24, *Frechi* S. 591, Fig. 25.

Phloeothrips angustifrons (Blumenau; Typus einer neuen Gattung, ebenso wie *Thrips Schotti Heeg.*); Bergroth, Bull. Soc. Entom. Belg., 1888., S. XXXf.

Thrips Asperulae (bei Göttingen an der Blattunterseite von *A. odorata*; nur benannt); Jordan, a. a. O., S. 599.

Pseudoneuroptera.

Odonata. On the genus *Sympetrum Newm.*, ebenso *Orthetrum*, *Platetrum*, *Leptetrum* äussert H. A. Hagen die weitläufig begründete Ansicht, dass dieser Name nicht anzunehmen sei; Entomol. Americana, IV, S. 31—34.

Calopteryx splendens race *orientalis* (Krasnowodsk; Astrabad); de Selys-Longchamps; Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 40.

Diplax portoricana (P.); H. J. Kolbe, a. a. O., S. 168.

Enallagma Krugii (Portoriko); H. J. Kolbe, a. a. O., S. 171.

Epithecica bimaculata race *sibirica* (Pokrofka, Amur; Irkutsk); de Selys-Longchamps, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 59.

Erythromma humerale (Irkutsk; Pokrofka am Amur); de Selys-Longchamps, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 61.

Gomphus Davidi (Syrien) S. 30, *nigripes* (Pokrofka, Amur) S. 59; de Selys-Longchamps, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, *excelsus* (Sardinien); Costa, a. a. O., I. No. 2, S. 89.

Zur Unterscheidung der *Gynacantha nervosa*, *robusta* und *gracilis* s. H. J. Kolbe, a. a. O., S. 169f.

Leucorrhinia (rubicunda race?) orientalis (Amur; Japan); de Selys-Longchamps, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 54.

Libellula fulva Müll. race *pontica* (Syrien; Kleinasien; Mesopot.) S. 12, *gracilis* n. sp. (Sibalkut; Malatia) S. 15; (Albarda mssc.), de Selys-Longchamps, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI.

Onychogomphus macrodon (Beyrut; Antiochia); de Selys-Longchamps; Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 24.

Pseudagrion praetextatum race *syriacum* (Beyrut); de Selys-Longchamps, Ann. Soc. Entom. Belg. XXX, S. 48.

Rhythemis imperatrix (Inseln Loo-Choo; vielleicht Rasse von *Rh. splendida*); de Selys-Longchamps, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 53.

Somatochlora Graeseri (Pokrofka, Amur); de Selys-Longchamps, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 58.

de Selys-Longchamps verweist seine *Diplax imitans* (s. dies. Bericht für 1886, S. 138) in die Gattung *Sympetrum*, beschreibt das dazugehörige Männchen (von Pokrofka) und schlägt für die aberrirenden Exemplare von Peking den Namen *infumatum* vor; Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 56, 57.

Ueber die Ueberwinterung von *S. scoticum* und *Sympycna fusca* s. de Selys-Longchamps, Bull. Soc. Entom. Belg., 1888, S. XXVIIIf.

Trithemis arteriosa Burm. race *Syriaca* (Syrien), S. 22, *fuscopalliatata* n. sp. Mesopotamien) S. 23; de Selys-Longchamps, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI.

Ephemeridae. Eaton bringt auf S. 281—352, Taf. 64, 65 der Trans. Linn. Soc. London (2. S.), Zool. Vol. III, den Schluss seiner revisional monograph of recent Ephemeridae, in welchem neben Nachträgen zu einzelnen Gattungen eine

Uebersicht über die befolgte Klassifikation und die geographische Verbreitung der Gattungen gegeben wird.

Derselbe giebt a concise generical synopsis, with an annotated list, of the species of British Ephemeridae; Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 9—12, 29—33.

H. Hagen stellt unsere gegenwärtige Kenntniss der Ephemeriden in Hinsicht auf Systematik und Verbreitung der Arten dar; Stett. Entom. Zeitg., 1888, S. 221—232.

A. Fritze macht über den Darmkanal der Ephemeriden in den verschiedenen Entwicklungsstadien bemerkenswerthe Mittheilungen; Berichte der Naturforsch. Gesellsch. zu Freiburg i. B., IV, S. 58—82, Taf. II, III. Der Darmkanal durchzieht als ein gerades Rohr den Körper und zerfällt in die drei bei allen Insekten zu unterscheidenden Theile. Während bei Larve, Subimago und Imago an dem Vorderdarm kein anderer Unterschied zu bemerken ist, als dass der Darm der Imago ein weit engeres Lumen besitzt, als die Larve, ist der Mitteldarm in beiden Stadien sehr verschieden. Die Längs- und sehr kräftige Ringmuskulatur des Larvendarmes ist bei der Imago ganz geschwunden; am längsten erhält sie sich noch am Anfang und Ende des Mitteldarmes. Das hohe Cylinderepithel der Larve ist durch ein flaches Plattenepithel ersetzt; das Lumen des Darmes erheblich erweitert. In der Subimago und Imago enthält der Mitteldarm nur ausnahmsweise Nahrungsstoffe, und diese wahrscheinlich nicht neu aufgenommen, sondern als Ueberbleibsel von der im Larvenstadium aufgenommenen Nahrung. Bei der Subimago füllt sich der Mitteldarm mit Wasser, und der Druck desselben bewirkt wahrscheinlich die Ausbreitung desselben und die Verflachung seines Epithels. In der Imago ist das Wasser durch ein Gas, wahrscheinlich atmosphärische Luft, ersetzt. Der Zweck derselben mag einmal, wie schon Palmén meinte, der sein, durch einen Druck auf die umgebenden Organe das Ausstossen der Geschlechtsstoffe zu erleichtern; wahrscheinlich wirkt sie aber auch als aërostatischer Apparat. Eine verwickelte Verschlusseinrichtung am Beginn des Enddarms verhindert ein Entweichen der Luft durch den After. Die Malpighischen Gefässe zeigen bei Larve und Imago keine Verschiedenheit; in dem Dickdarm genannten mittleren Stück des Enddarmes findet sich ein hohes Epithel, das wahrscheinlich eine sezernirende Thätigkeit hat. Nur an einer Stelle des Umkreises ist das hohe Epithel durch ein ganz flaches ersetzt, und von hier geht wahrscheinlich der Ersatz der bei dem Sekretionsakt zu Grunde gehenden hohen Epithelzellen vor sich. — Auch bei der Imago ist noch eine Mundöffnung vorhanden, durch welche die Luft in den Darm ein- und ausströmen kann.

Ameletus inopinatus (Schwarzwald; Vogesen); Eaton, a. a. O., S. 307, Pl. 65, Fig. 13.

Ecdyurus Helveticus (Alpen), S. 282, Pl. 24, Fig. 46a, *forcipula* Koll. ms. (Mitteleuropa bis Central-Italien), S. 286, Pl. 24, Fig. 46c, *affinis* (Niederlande), S. 293, Fig. 46e; Eaton, a. a. O.

Ephemerella speciosa Taf. XXX, Fig. 13, (?) *multinervosa* (aus dem lithographischen Schiefer); Oppenheim, Palaeontograph. 34, S. 225.

Ephemerella notata (Nordengland; Südschottland) S. 305, Pl. 65, Fig. 9, *Hispanica* (Sp.), S. 306., Eaton, a. a. O.

Embiadae. *Embia nobilis* (Itaituba, Amaz.); A. Gerstäcker, a. a. O., S. 1.

Termitidae. H. Drummond schreibt den Termiten für die Tropen dieselbe Bedeutung für die Lockerung des Bodens zu, die Darwin in den gemässigten Klimaten dem Regenwurm zugesprochen hatte; Proc. R. Soc. Edinburgh, Session, 1884—85, S. 137—146.

Landois beschreibt ein Termiten-Nest von der Congo-Mündung; Jahresber. d. zool. Sekt. d. westf. Prov.-Ver. für 1887—88, S. 25.

Ueber die Sitten der Termiten machte ebenda S. 39—42 Rade (nach Berthaud's Angaben) Mittheilungen; vgl. d. vor. Ber. S. 80.

Ueber das Ersatzpaar bei den Termiten hatte Fritz Müller (gegenüber Ihering) die richtige Vorstellung; die „nymphes de la deuxième forme“ bekommen nie völlig entwickelte Flügel und sterben meist vor Ende September. In verwaisten oder künstlich ihres Königsaares beraubten Nestern von *Calotermes* findet man nach einiger Zeit Ersatzmännchen und -Weibchen nebst ihren Eiern; Grassi, Zool. Anz. 1888, S. 63f., 615—618 und Atti R. Accad. dei Lincei; Entom. Nachr., 1888, S. 77f., Bull. Soc. Ent. Ital., 1888, S. 139—147.

Psocidae. Ueber die Spinngewebe der Psociden macht Westhoff einige Mittheilungen; Jahresb. zool. Sekt. westf. Prov.-Ver. 1887—88, S. 55—57. Während er meint, dass Lage und Beschaffenheit der Spinnndrüsen noch unbekannt seien, zieht er auch die „Eierschleierchen“ zu den Gespinnnten, die aus den am Kopfe mündenden Drüsen verfertigt werden. Ausser den Eigespinnnten erwähnt er das bekannte Spinnen der Larven von verschiedenen Arten, und das sternförmige Gespinnnt über der seichten Mulde auf der Unterseite eines Eichenblattes, unter dessen Schutz die Nymphen von *Stenopsocus immaculatus* und einer anderen Art ihre letzte Häutung abwarten.

Troctes silvarum (Grünwald bei Berlin, an Lattenzäunen); Kolbe, Entom. Nachr., 1888, S. 234. (Kommt auch bei Bonn und im Ahrthal vor, wo sie vom Referenten vielfach gefunden, aber nicht als besondere Art unterschieden wurde.)

Neuroptera.

Neuroptera germanica. Die Netzflügler Deutschlands mit Berücksichtigung auch einiger ausserdeutschen Arten nach der analytischen Methode unter Mitwirkung von H. Kolbe bearbeitet von M. Rostock; Zwickau, 1888, 8°; S. 1—200, Taf. I—X.

Dieses Werk ist dem berechtigten Wunsch entsprungen, durch eine Zusammenstellung und Beschreibung der in Deutschland beobachteten Neuropteren s. l. das bisher sehr vernachlässigte Studium dieser Insekten zu erleichtern, ihm neue Jünger zuzuführen und dadurch unsere Kenntnisse zu vervollständigen und zu vertiefen. Zu diesem Zwecke ist von dem Bau nur so viel gesagt, als zum Verständniss der Kunstaussdrücke nöthig ist; erleichtert wird dieses Verständniss durch die sehr deutlichen Zeichnungen; die Lebensweise ist nur so weit berücksichtigt, als durch ihre Kenntniss das Fangen der Thiere erleichtert wird. In wie weit auch in den übrigen Gruppen (Trichoptera, Planipennia, Odonata, Ephemeridae und Perlidae) Kolbe als Mitarbeiter anzusehen ist, ist nicht gesagt; in einem Anhang wird eine ausführliche Bearbeitung der Psocidae unter der Aufschrift Kolbe's geboten. — Der Zweck des Buches würde noch vollkommener erreicht werden, wenn alle deutschen Arten in analytischen Tabellen auf-

genommen wären, während vielfach die seltenen oder Süddeutschland angehörigen Arten einfach genannt sind; selbst die Zuziehung von Arten, die in den Grenzländern vorkommen, würde die Brauchbarkeit des Buches nur erhöht haben.

In seinem Fortegnelse over de i Norge hidtil observerede Neuroptera Planipennia og Pseudo-Neuroptera zählt W. M. Schoeyen 35 Planipennia und 75 Pseudoneuroptera auf; Forhandl. Vidensk.-Selsk. Christiania, 1887, No. 13, S. 3—30.

In seinen Notes on a small collection of Neuroptera from the island of Coll zählt I. I. F. X. King 3 Odonaten, eine Planipennie und 8 Trichoptera auf; Trans. Nat. Hist. Soc. Glasgow (N. S.) II S. 133 f.

Leptocerus senilis *Burm.*, *commutatus* *M'Lach.*; *Oecetis furva* *Ramb.*; *Glyptotaelius pellucidus* *Retz.*; *Limnophilus hirsutus* *Pict.*; *Silo nigricornis* *Pict.* im westlichen Irland; derselbe ebenda, *Proceed.*, S. XIX.

In Proc. Boston Soc. Nat. Hist., XXIII, S. 276—292 lässt H. A. Hagen Part II seines Monograph of the Hemerobidae erscheinen; derselbe ist der Gattung *Micromus* *Ramb.* gewidmet.

Gerstäcker bringt weitere Beiträge zur Artenkenntniss der Neuroptera Megaloptera, in denen 38 Arten beschrieben, bezw. genauer beschrieben werden; Mitth. a. d. naturw. Ver. f. Neu-Vorpommern und Rügen, 19. Jahrg., S. 89—130.

Kolbe berichtet über den kranzförmigen Laich einer *Phryganea*, der mit einem Theile seiner Peripherie an der Unterseite der Blätter von *Nuphar* angeheftet senkrecht ins Wasser hinabhangt. Die jungen Embryonen hatten noch keine Tracheenkiemen, gehörten aber ihrer Gestalt nach zur Unterfamilie der *Phryganen*, vielleicht zu *Phr. striata*; Sitzgsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 1888, S. 22—26 mit Holzschn. — Der Laich wurde später als zu *Phr. grandis* gehörig erkannt; derselbe, *Entom. Nachr.*, 1888, S. 297.

Die widersprechenden Angaben über die Eier der Haarflügler sucht F. Müller durch die Annahme zu vereinigen, dass die verschiedenen Gattungen sich verschieden verhalten. Die einen legen sie im Wasser ab, die anderen (*Chimarra*, *Macronema*, *Setodes*, eine *Rhyacophilide*) an feuchte Felswände; Gesträuch; andere tragen sie am Hinterleibe mit sich herum. Eine Gallerthülle kommt nicht allen zu; alle *Hydropsychiden* kleben ihre Eier mit einem nicht aufquellbaren Kitt an Steine. *Entom. Nachr.* 1888, S. 259—261.

On the oral apparatus of the larva of *Wormaldia*, a genus of Trichoptera; by K. I. Morton; Trans. Natur. Hist. Soc. Glasgow, (N. S.) II S. 115—117 Pl. II. — Die Larven der genannten Gattung finden sich im Frühling in lockerem Gewebe an Steinen in kleineren Wasserläufen. Die Fühler sind ausserordentlich kurz, fast halbkugelig mit 2 längeren, sich kreuzenden Aesten. Die Oberlippe ist breit zweilappig, mit einem regelmässigen dichten Fransenbesatz am Vorderrande und einer Reihe von Wimpern an der Unterseite.

Die Mandibeln sind sichelförmig mit einem starken Endzahn, ein oder zwei anderen Zähnen und einer schwächeren Zählzähnelung darunter. Die Maxillartaster sind viergliedrig, Labialtaster fehlen. Am Körperende befinden sich vorstreckbare Fäden, die wahrscheinlich der Athmung dienen.

Planipennia.

Hemerobiadae. *Apochrysa mirifica* (Chiriqui); Gerstäcker, a. a. O., S. 122.

Chrysopa Krugii (Portoriko); H. J. Kolbe, a. a. O., S. 173, Fig. IX, 2.

Drepanopteryx phalaenoides bei Ballenstedt am Harz erbeutet; v. Roeder, Entom. Nachr., 1888, S. 21; bei Perleberg, Lenzen, Zerbst, Sondershausen, Wernigerode, Schlesien; Rudow, ebenda S. 148.

Hemerobius impudicus (Blumenau, Bras.) S. 127, *cicciiformis* (Itaituba, Amazonas) S. 128; Gerstäcker, a. a. O.

Lencochrysa platyptera (Blumenau, Bras.) S. 124, *inquinata* (Cumbase, Peru) S. 125, *radiosa* (ibid.) S. 126; Gerstäcker, a. a. O.

Micromus tessellatus (Blumenau, Bras.); Gerstäcker, a. a. O., S. 129, *montanus* (Natick, Mass.) S. 279, *variolosus* (Denver, Color.) S. 284, *Cubanus* (C.) S. 286, *angustus* (Haulover, Florida) S. 287, *insularis* (Madagaskar) S. 292; H. A. Hagen a. a. O.

Nothochrysa capitata F. auf der Gänsekuppe bei Friedrichroda in Thüringen gefangen; v. Roeder, Entom. Nachr., 1888, S. 20; andere Fundpunkte dieser Art und von *N. fulviceps* (Eckartsberga) führt Rudow, ebenda S. 148, auf.

Nothochrysa panchlora (Theresopolis, Bras.); Gerstäcker, a. a. O., S. 123.

Mantispidae. Gerstäcker hält den Namen Anisoptera *Schneid.* (gegenüber *Trichosellia Westw.* und *Symphrasis Hagen*) aufrecht und beschreibt *A. jocosa* (Itaituba, Amazonas) S. 117, *amoenula* (ibid.) S. 119, *remipes* (Bogotá) S. 120.

Mantispa debilis (Itaituba, Amaz.) S. 114, *stenoptera* (Neu-Guinea) S. 115; Gerstäcker, a. a. O.

Ascalaphidae. I. O. Westwood nimmt aus einer Beobachtung J. S. Green's Veranlassung, alles das zusammenzustellen, was ihm über die Familie der Ascalaphiden, namentlich über die Entwicklung dieser Thiere, bekannt geworden ist. Die von Green mitgetheilte Beobachtung besteht darin, dass er auf Ceylon Mitte April an dem Stengel einer in einem Topf stehenden Lilie gegen 40 junge Larven eines Ascalaphus fand. Dieselben sassen in einer Reihe untereinander, so, dass die vorhergehende bis auf den grossen Kopf mit den ausgebreiteten Mandibeln von der folgenden bedeckt war. Der Kopf dieser jungen Exemplare war nur am Vorderrande ausgeschweift und betrug über ein Drittel des gesammten, in seinem Umriss kurz eiförmigen und an den Seiten mit stark borstigen Zapfen versehenen Körpers. Die Larven wurden in ein Gefäss gebracht und gefüttert, anfangs mit kleinen Mücken, später mit grösseren Fliegen. Sie blieben meist an derselben Stelle sitzen und fingen ein in ihr Bereich kommendes Insekt durch ein plötzliches Zuschlagen ihrer langen Mandibeln. Da das gebissene Insekt sehr rasch stirbt, so vermuthet Green, dass beim Biss Gift in die Wunde fliesst. Die Larven häuteten sich zum ersten Mal am 4., zum zweiten Mal am 17. Mai; am 1. Juni begann die am weitesten vorgeschrittene

einen kugeligen Cocon zu spinnen, dem sie aussen Erd- und Sandstückchen anheftete; am 3. war der Cocon fertig, und am 23. schlüpfte die erste Imago aus, die wahrscheinlich *Helicomitus insimulans* Walk ist. Die ausgewachsene Larve hat einen auch hinten tiefausgeschweiften Kopf, schmalen Thorax und gestreckten, eiförmigen Hinterleib, an dem die Fleischzapfen verhältnissmässig kleiner sind, als bei der jungen Larve. Die Augen stehen zu beiden Seiten des Kopfes gehäuft auf einer starken Erhöhung. Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 1—12 Pl. I, II.

Mc Lachlan glaubt in *Ascalaphus expansus* Gerst. eine Modifikation von *A. lacteus*, und in *A. radians* Gerst. eine Varietät von *A. sibiricus* erkennen zu müssen; Compt. Rend. Soc. Entom. Belg. 1887, S. XXXV; Gerstäcker zeigt aber, dass beides selbständige Arten sind, a. a. O., S. 92, 93. — Mc Lachlan meldet ferner den Fund des verschollenen *A. ustulatus* Eversm. im Gouvernement Tiflis; a. a. O., S. XXXIV.

A. coccajus bei Feldkirch in Vorarlberg; Dalla Torre, 17. Ber. d. naturw.-mediz. Ver. Innsbruck, Vereinsnachr., S. 3.

Colobopteris trivialis (Chiriqui); Gerstäcker, a. a. O., S. 90.

Cordulecerus inquinatus (Chiriqui); Gerstäcker, a. a. O., S. 89.

Puer (?) *pardalis* (Freetown, Sierra Leone); Gerstäcker, a. a. O., S. 91.

Myrmeleontidae. *Periclystus* (n. g.! *Periclistus* schon von Förster vergeben) *laceratus* (Australien) S. 105, *calipeplus* (ibid.) S. 107; Gerstäcker, a. a. O.

Acanthaclisis (?) *debilis* (Lagos); Gerstäcker, a. a. O., S. 100.

Formicaleo nubilis (Freetown, Sierra Leone); Gerstäcker, a. a. O., S. 109.

Glenurus pantherinus F. verbreitet sich von Südeuropa bis nach China (Peking); Gerstäcker, a. a. O., S. 103.

Glenurus mollis (Columbien); Gerstäcker, a. a. O., S. 101.

Myrmeleon scopifer (Ceram) S. 110, *timidus* (Chiriqui) S. 112; Gerstäcker, a. a. O., *fulcipennis* (Sardinien); Costa, a. a. O., I, No. 2, S. 89.

Autor des Namens *Palpares* (*Myrmeleon*) *gigas* ist nicht Drury, sondern Dalman; die Aufstellung der Gattung *Symmathe* ist für diese und verwandte Arten mit sichelförmigen Flügeln ist überflüssig, da sich „ein Anlauf zur Sichelform auch bei anderen Arten bemerkbar macht“; Gerstäcker, a. a. O., S. 94f.

P. obsoletus (Stanley Pool) S. 95, *aegrotus* (Angola) S. 98; derselbe ebenda.

Trichoptera.

Chimarra albomaculata (Portoriko); H. J. Kolbe, a. a. O., S. 175.

K. J. Morton beschreibt the larva and case of *Ithytrichia lamellaris* Eaton....; Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 171—173 mit Holzschn. Das Gehäuse ist von dem gewöhnlichen durchsichtigen Material, oval, mit einem tiefen Ausschnitt an dem Kopfende; bei der Nymphe ist an dieser Stelle ein langer Zapfen, der die frühere Oeffnung verschliesst. Die Larve ist ungewohnter Weise schlank, ganz durchsichtig, am 3.—6. Hinterleibssegment mit dorso-ventralen (!) Fortsätzen, die die Tracheenkiemen tragen. — Auch die Larven- und Nymphengehäuse von *Oxyethira costalis*, *Orthotrichia angustella* und *Agraylea multipunctata* sind abgebildet.

Das von F. Müller einer deutschen Lagenopsyche zugeschriebene Gehäuse (s. den vor. Ber. S. 81) ist wahrscheinlich das einer *Oxyethira*-Art, und zwar

O. costalis; K. J. Morton, Entom. Nachr., 1888, S. 16; Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 173.

The larva, &c., of *Philopotamus (montanus)*; K. J. Morton, Entom., Monthl. Mag., XXV, S. 89–91.

Ein Beitrag zur Naturgeschichte der *Phryganea grandis* und anderer Trichoptera von H. J. Kolbe stellt fest, dass die genannte Art nur eine Generation im Jahre hat; die Mitte Juni geborenen Larven haben bis zum Spätherbst wohl ihre völlige Körpergrösse erreicht; ihre Nahrung besteht wahrscheinlich in *Spongilla*. Ueber den Laich vgl. oben S. 104. Entom. Nachr., 1888, S. 295–299.

Rhyacophila munda in Frankreich; Mc Lachlan, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 262; Revue d'entomolog., 1888, S. 56.

Diptera.

Mik schreibt Dipterologische Miscellen VIII—XIV; Wien Entom. Zeitg., 1888, S. 27–31, 94, 140–142, 181–182, 221–222, 299–303, 327.

Derselbe bringt Verbesserungen zu seinem „Verzeichniss der Artnamen . . . in Schiner's Fauna Austriaca“ . . .; ebenda S. 57–64.

P. Stein macht Dipterologische Bemerkungen; Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 201–203.

Ueber einige von G. A. Olivier beschriebene Dipteren schreibt Mik und versucht deren Deutung; Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 91–93.

Dipterologische Beiträge von V. v. Röder; ebenda S. 95 f. (*Tachina lepidia* M. gehört zur Gattung *Rhinophora*; *Tachina Pavoniae* Zett. = *grandis* Zett. = *Scotia Saturniae* R. D., gehört zu *Exorista*; *Gnoriste trilineata* Zett. ist das Männchen zu *Gn. bilineata* Zett.; *Ocydromia nigripes* Zett. ist ein *Hybos* und wurde von Girschner auf dem Stedtlinger Moor in Thüringen gefangen, ebenso *Dolichopus Stenhammeri* Zett.; *Frauenfeldia rubricosa* M. in Hoym, Anhalt).

Dem 1. und 2. Hefte der Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, sind Bogen 1–5 der Fauna insectorum Helvetiae, Diptera, von G. Huguenin, beigelegt, die Familie der Tipuliden enthaltend. Die in dem Text eingedruckten Abbildungen des Flügelgeäders fast sämtlicher Gattungen bilden eine angenehme und die Benutzung erleichternde Beigabe. Von einigen Gattungen, namentlich der Limnobiinen, sind nov. spec. angeführt, aber nicht benannt.

Williston stellte eine Table of the families of Diptera für Anfänger auf; Transact. Kansas Acad. Sci., X, S. 122–128.

Bigot beschreibt weiter Diptères nouveaux ou peu connus; 33e partie, XLI: Tachinidae; 34e partie, XLII: Diagnoses de nouvelles espèces; Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 77–101, 253–270.

Bigot behandelt die Diptères in der Mission scientifique du cap Horn. -- Diese Arbeit habe ich nicht gesehen; Mik referirt

über dieselbe in der Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 164 und schliesst daran folgende Bemerkungen: *Boletina antarctica* ist eine Glaphyroptera; *Palloptera guttipennis* ist eine Ephydrine, wahrscheinlich *Scatella*.

F. M. van der Wulp beschreibt (16) nieuwe Argentijnsche Diptera . . . ; Tijdschr. v. Entomologie, 31. Deel, S. 359—376, Pl. 9, 10.

S. W. Williston zählt auf Diptera Brasiliana ab H. H. Smith collecta; Part I: Stratiomyidae, Syrphidae, mit Beschreibung der zahlreichen neuen Arten; Trans. Americ. Entomol. Soc., XV, S. 243—291.

S. W. Williston: Synopsis of the families and genera of North American Diptera with bibliography and new species; New Haven; 8°, S. 1—84. (Habe ich nicht gesehen.)

L. Pandellé gibt in seiner Étude sur les Muscides de France, Revue d'entomol., 1888, S. 258—362 eine allgemeine Schilderung des äusseren Baues und der Theile des Hautskelets der Fliegen, deren Benennung vielfach der Wirbelthieranatomie entlehnt ist; einen Vergleich dieser Theile mit den Hymenopteren und Koleopteren; die sekundären Geschlechtsunterschiede u. s. w.

Als einen Beitrag zur Diptern-Fauna der Schweiz zählt F. Rühl die Anthrax-Arten im Albulathal und die Dioc trien des Läger nberges im Aargau auf; Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 61—63.

G. H. Verral stellt eine List of British Diptera zusammen; London 1888, kl. 4°, 31 Ss.

A. Siebeck zählt seltene Dipteren, gefangen . . am Manhartsberg in Niederösterreich, auf; Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 217 f.

E. Girschner setzt seine Dipterologischen Studien, Beitrag zur Dipterenfauna Thüringens, fort; XI—XIII; Entom. Nachr., 1888, S. 97—100 mit Taf., XIV, S. 225—234.

P. Stein zählt die (109) Tachininen und (120) Anthomyinen der Umgegend Genthins als Beitrag zur Dipterenfauna der Prov. Sachsen, auf; ebenda S. 211—219; 370—379.

Sintenis behandelt die livländischen Trypetinen (47 Art.), Sitzgsber. Naturf. - Gesellsch. Dorpat, 1887, S. 198—211; die Tetanocerinen (22 A.), Ortalininen (8 A.), Platystomininen (fehlen) und Ulidinen (1 A.) S. 219—226; Sapromyzinen (28 A.) S. 266—270.

Énumération des Diptères rec. en Tunisie . . . 1884; par I. M. F. Bigot; Exploration scientifique de la Tunisie, Zool., Diptères, S. 6—11.

Larven der Wohlfart'schen Fliege (*Sarcophila Wohlfartii* Portsch.) im Zahnfleisch des Menschen; E. Brandt, Zool. Ang., 1888, S. 560 f.

Ein bisschen Protest wird von Meinert gegen Raschke's Arbeit über die Larven von *Culex nemorosus* gerichtet, wobei dem

Verfasser namentlich die Vernachlässigung der älteren Literatur vorgeworfen wird; Zool. Anz., 1888, S. 111—113; in einer Entgegnung auf Herrn Fr. Meinert's Protest rechtfertigt sich Raschke; ebenda S. 562—564; vgl. d. vor Ber. S 86.

J. Cuccati hat auf seine vorläufige Mittheilung (s. d. vor. Ber. S. 85) eine ausführlichere Abhandlung über die Organisation des Gehirns der *Somomya erythrocephala* folgen lassen; Zeitschr. f. wiss. Zool., 46, S. 240—269 Taf. XX, XXI.

Voeltzkow macht eine vorläufige Mittheilung über die Entwicklung im Ei von *Musca vomitoria*; Zool. Anz., 1888, S. 235 f.

Ein Beitrag zur Metamorphose einiger zweiflügeliger Insecten aus den Familien Tabanidae, Empidae und Syrphidae von Th. Beling beschreibt Larve und Puppe von *Chrysops caecutiens*; *Platypalpus major*; *Hilara quadrivittata*; *Chrysogaster viduata*; *Chilosia fasciata*; *Helophilus nigrotarsatus*; Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 1888, S. 1—4.

F. Schmidt macht eine vorläufige Mittheilung über die Bildung des Blastoderms und des Keimstreifens der Musciden; Sitzgsber. Naturf.-Gesellsch. Dorpat, 8. Bd., S. 366—371. In dem eben abgelegten Ei ist ein Kern nicht zu finden. In dem Dotter sammelt sich das Protoplasma in kleinen Massen an, in denen keine Dotterelemente sichtbar sind, und in denen im weiteren Verlauf kernartige Bildungen auftreten. Diese Zellenanlagen vermehren sich und sammeln sich in einer Ringschicht an, die allmählich an die Oberfläche rückt; einzelne der Zellanlagen bleiben auch im zentralen Dotter zurück. Von der Oberfläche her werden dann die einzelnen Zellanlagen gegen einander durch Furchen getrennt, und auf diese Weise kommt das Blastoderm zur Ausbildung. An der Bauchseite tritt nun, am vorderen und hinteren Pol getrennt, im Blastoderm je eine Abflachung auf, die zu einer seichten Einsenkung in den Dotter wird. Diese Einsenkungen werden tiefer und tiefer, breiten sich mehr und mehr aus und verschmelzen zu einer einzigen Furche, deren Ränder sich schliessen und so zur Bildung eines aus zwei Zelllagen bestehenden Rohres unter dem Blastoderm führt; dieses Rohr ist der Keimstreif. In den beiden ursprünglich getrennten Einstülpungen sieht Schmidt ein Homologon der durch Knospung in der Trochosphäre hervorgehenden Annelidenkeime, des Kopf- und Rumpfkeimes, und einen Hinweis darauf, dass bei den Musciden wie bei Anneliden und Nemertinen der Leib durch eine Knospung entstehe. — Zur Untersuchung diente *Musca vomitoria*.

J. van Rees bringt Beiträge zur Kenntniss der inneren Matamorphose von *Musca vomitoria*; Zool. Jahrb., Abth. für Anatomie und Ontogenie, III, S. 1—134 Taf. I, II und 10 Holzschn. im Text. Die gegenwärtigen Beiträge beschäftigen sich mit der Ausbildung der Larve zur Puppe, während die Ausbildung der Puppe

zur Imago später zur Darstellung kommen soll. Aus gegenwärtiger Arbeit erfahre ich zugleich, dass der Verfasser i. d. J. 1884 und 1885 über diesen Gegenstand vorläufige Mittheilungen gemacht hat, die ich, da sie mir damals unbekannt geblieben sind, der Vollständigkeit halber anführen will: Over intracellulaire spijsverteering en over de beteekenis der witte bloedlichaampjes; *Maandblad voor Natuurwetenschappen*, 1884, Aug., Oct., Novemb., und Over de postembryonale ontwikkeling van *Musca vomitoria*, ebenda, 1885, Juli, S. 67—77. — Die wesentlichsten Punkte der gegenwärtigen ausführlicheren Abhandlung sind nun die folgenden.

Die Degeneration und Zerstörung der Muskeln durch die Angriffe der Leukozyten beschreibt van Rees in Uebereinstimmung mit Kowalevsky; auf diese Weise werden die Larvenmuskeln zerstört bis auf drei Paar von Muskeln des Mesothorax, die sich unter dem zeitweiligen Verlust der Querstreifung regeneriren, zum Mittelpunkt einer umfangreichen Mesenchymwucherung werden und zu den drei Paar der mächtigen Flügelmuskeln der Imago auswachsen. — An sämtlichen 6 Paaren von Imaginalscheiben des Thorax gelang es dem Verfasser, einen Stiel aufzufinden, der sie an der Haut desjenigen Segmentes befestigt, welches die betreffende Imaginalscheibe bei der Imago zu bilden hat, und zwar an der Ventralseite, die ventralen mehr nach der Mittellinie des Bauches zu, die dorsalen mehr nach der Seite. Es befestigt sich also die Imaginalscheibe des 1. Beinpaares und des Prothorakalstigmas am 2., die des 2. Beinpaares und der Vorderflügel am 3., die des 3. Beinpaares und der Schwinger am 4. Segmente. Die Scheiben selbst haben an ihrer der Achse zugewendeten Wand in das Innere des Lumens vorspringend die Anlage des imaginalen Organs; die der peripheren Seite zugekehrte Wand, die aber natürlich mit jener zusammenhängt, ist sehr zart, und wird von van Rees die peripodale Membran genannt; es ist die „Hüllmembran“ Weismann's, „provisorische Membran“ Ganin's und Viallanes'; den Hohlraum der Scheibe nennt van Rees peripodalen Raum. Der Stiel, der die Imaginalscheiben an die Hypodermis befestigt, hat bei den dorsalen neben einer Trachee und bei den ventralen neben einem Nerv einen Strang, der die unmittelbare Fortsetzung der peripodalen Membran ist und in den sich der peripodale Raum als feines Lumen mehr oder weniger weit fortsetzt. Beim Uebergang zur Puppe verkürzt sich der Stiel unter gleichzeitiger Erweiterung mehr und mehr, und die Imaginalscheiben gelangen dadurch an den Ort ihrer definitiven Bestimmung, bis die peripodale Membran mit der Hypodermis der betreffenden Segmente zusammengetroffen ist. Hierauf beginnen sich beide in der Richtung von vorn nach hinten zurückzuziehen und nun liegt das Bein- oder Flügelpaar der Imago offen zu Tage. Der genaue Vorgang und das Verhalten der peripodalen Membran und Larvenhypodermis ist mir selbst unter Zuhülfenahme der Abbildungen nicht ganz klar geworden. Aber die an die Oberfläche gelangten Theile der Imaginalscheiben haben auch bereits imaginales Epithel (Hypo-

dermis), welches sich von ihnen aus verbreitet, indem es sich über die larvale Hypodermis fortschiebt; letztere geht dann zu Grunde, so dass immer nur am Rande, wo beide zusammentreffen, ein schmaler Streif vorhanden ist, wo die imaginale über der larvalen Hypodermis liegt; aber es ist auch nirgends die Hypodermis unterbrochen. Die Imaginalscheiben des ersten Beinpaars lassen die peripodale Membran wie bekannt z. Th. mit einander verschmelzen; ebenso verschmelzen die als Fortsetzung des peripodalen Raumes anzusehenden Stränge zu einem einzigen median gelegenen, während sich der nervöse und tracheale Theil des Anheftungstieles gesondert erhalten hat, so dass nun von diesem verschmolzenen Scheibenpaar 3 Bänder nach vorn gehen, von denen die äusseren das nervöse und tracheale Gewebe enthalten, der mittlere die Fortsetzung des peripodalen Raumes. Aus diesen Verhältnissen zieht van Rees für die (ventralen) Imaginalscheiben folgenden Schluss: „Die Scheiben sammt ihren Verbindungsstielen mit der Hypodermis sind ektodermale Bildungen, deren Anlage sich an der Stelle entwickelt hat, wo der embryonale Hautnerv die Hypodermis berührt, (wie bei *Corethra*), die aber dann in der Richtung des Nervenverlaufes — als ob der sich verkürzende Nerv einen Zug ausübte — in die Tiefe rücken, dabei einen kurzen Strang bildend, dessen tiefster Abschnitt, also an der Ansatzstelle des Nerven, sich alsbald zur künftigen Imaginalscheibe differenziert, während sich zu gleicher Zeit in dem Strang ein feines Lumen bildet. In diesem Stadium würde also der Strang eine feine Röhre darstellen, welche nichts anderes wäre als der stark verlängerte Halstheil einer in das Innere des Körpers eingestülpten Hauttasche. Damit würden sich dann in der That diese Imaginalscheiben nur durch die Länge dieses Taschenhalses und durch ihre eigene tiefe Lage von den oberflächlichen Imaginalscheiben von *Corethra* unterscheiden. Für das vordere Paar käme noch die Komplikation hinzu, dass, indem die beiden Hautnerven sich an naheliegende Hautstellen inserirten, es zwar zur Bildung zweier getrennter Imaginalanlagen gekommen war, welche jedoch bei dem Tiefer-Rücken nur einen einzigen Stiel bekamen. Inwiefern die beiden seitlichen Stränge des vorderen Paares mit einer solchen Bildung in genetischem Verband stehen, oder ob sie, wie die später anwesenden feinen Tracheen, eine sekundäre Bildung sind, darüber kann ich auf Grund meiner Präparate kein Urtheil abgeben.“ Für die Flügel- und Schwingerscheibe ist die Entstehung aus dem trachealen Epithel wahrscheinlich.

Die Imaginalscheiben des Kopfes sind bekanntlich die Scheitel- und die Augenscheiben, die als eine Einstülpung des Schlundes anzusehen sind, mit dessen Lumen ihr Lumen später kommuniziert. Indem sich nun die Kopfblase (mit diesem Namen bezeichnet van Rees die vereinigten Scheitel- und Augenscheiben) ausstülpt, tritt der Kopf, der bis dahin in den Thorax eingestülpt war, vor denselben, wobei die frühere Ausmündung des Schlundes zum Hals geworden ist, der Kopf und Thorax verbindet. Die Kraft, welche das Ausstülpen der

Kopfblase bewirkt, ist in dem Zusammenziehen des Hinterleibes zu suchen, der in der Puppe weit kürzer als in der Larve ist.

Durch diese Verkürzung hat einerseits der Kopf jetzt vor dem Thorax Raum, andererseits wird durch dieselbe Blutflüssigkeit u. s. w. nach vorn getrieben, was die Ausstülpung zur Folge hat. Diese Ausstülpung geht (abgesehen von den Speicheldrüsen) ohne jede Zerreissung vor sich; die ausführliche Darlegung aller hier in Betracht kommenden Verhältnisse ist aber ohne (und selbst mit) Abbildungen eine schwierige Aufgabe, von der ich hier absehe.

Wenn der Thorax der Imago schon angelegt und der Kopf bereits ausgestülpt ist, hat der Hinterleib noch zum grössten Theil Larvenepithel. Aber in jedem Segment befinden sich 6 Inseln kleinzelligen Epithels, von denen 4 bereits Ganin bekannt waren, 2 oben und 2 unten; hinter den ersteren fand van Rees noch ein zweites kleineres Paar. Von diesen Inseln geht die Entwicklung der imaginalen Hypodermis aus, indem dieselbe, allseitig vorwachsend, die larvale, die bereits gelockert ist, verdrängt. Der Vorgang ist hier derselbe, wie der beim Thorax geschilderte; auch hier schwindet die larvale Hypodermis erst dann, wenn der Ersatz schon da ist, so dass die Hypodermis an keiner Stelle unterbrochen ist. Bald nach Vollendung der imaginalen Hypodermis treten in ihr Differenzirungen auf, indem sich kleine Gruppen grösserer Zellen ausbilden; dieselben haben die grösseren Haare des Hinterleibes zu bilden.

Schon Ganin hatte das Mesenchym (Mesoderm) durch Abspaltung von den imaginalen Scheiben und deren Aequivalent im Hinterleib, den oben erwähnten Inseln, hergeleitet. Für den Hinterleib bestätigt van Rees diese Entstehungsweise, bei der die durch Abspaltung entstandenen Mesenchymzellen die membrana propria der Hypodermis durchbrechen und sich entlang derselben ausbreiten.

Die an dem Vorder- und Enddarm vorgehenden Veränderungen beschreibt van Rees ähnlich wie Kowalevsky. Nur soll der Saugmagen, nachdem sein Muskelbeleg durch die Thätigkeit der Leukozyten zerstört ist, sich zusammenziehen, ohne dass eine einzige Zelle seines Epithels verloren geht, und sich so in den Verlauf des Oesophagus einschieben. Ferner gehe die Wand des Oesophagus zum Theil aus dem Larvenepithel hervor, das sich theilt, so dass für den Vorderdarm die Bedeutung des „Vorderdarmringes“ (Kow.) geringer ist, als Kowalevsky wollte. Ähnlich ist es bei dem Hinterdarm, wo nur der vordere Theil von dem Hinterdarmring aus neugebildet wird; am Rectum erliegen bloss die Muskeln den Angriffen der Leukozyten, während das Epithel für die Neubildung erhalten bleibt. Am Mitteldarm bleiben, nachdem das larvale Epithel in das Darmlumen abgestossen ist, 2—300 Inseln kleinzelligen Epithels auf der Muskelschicht des Darmes zurück und regenerieren das Epithel; bis dies geschehen ist, bleibt die Muskelschicht unangetastet und erst wenn der Epithelbeleg zu einem allseitig geschlossenen Rohr sich ausgebildet hat, werden die Darmmuskeln von den Leukozyten zerstört.

Den Zerfall der Speicheldrüsen beobachtete van Rees als ein Zerreißen beim Ausstülpfen der Kopfblasen, gleichzeitig mit, nicht nach, dem Angriff durch die Leukozyten. In die Fettzellen wandern die Blutkörperchen ebenfalls massenhaft ein und bringen dieselben dadurch zum Zerfall; doch bleibt ein Theil der Fettzellen noch lange erhalten. Das Tracheensystem verhält sich in seinen verschiedenen Theilen verschieden. Die in allen mit Ausnahme des letzten Abdominalsegments zu der Hypodermis ziehenden Seitenzweige regeneriren sich (theilweise), und zwar vom peripheren Theile aus, indem 4 von ihnen zu den Stämmchen werden, die die Stigmen mit den Längsstämmen in Verbindung setzen. Der sechste wird zum Endabschnitt des Hauptstammes, indem der ganze dahinter liegende Theil bis zum (einzigsten) larvalen Stigma zerfällt. — Das endliche Schicksal der Leukozyten ist nicht mit Sicherheit bekannt; doch ist es wahrscheinlich, dass ein Theil derselben zu Grunde geht, da eine weit grössere Zahl von Leukozyten als Blutkörperchen in der Imago vorhanden ist. In der sich entwickelnden imaginalen Hypodermis fand van Rees auch Körnchen, die wohl auf zerfallene Leukozyten zu beziehen sind. Es lässt sich hier also annehmen, dass die Leukozyten auch in diesem Falle einen Angriff gemacht haben, dabei aber gegenüber dem lebenskräftigen Gewebe unterlegen sind.

Orthorrhapha.

Cecidomyiadae. J. J. Kieffer's Aufsatz über Gallmücken und Mückengallen in den Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, S. 95—114 enthält die Beschreibungen neuer Gallmückenarten, Ergänzungen zur Beschreibung einiger schon bekannten Arten, und Bemerkungen über neue oder wenig bekannte Mückengallen, deren Erzeuger noch unbekannt sind. Die neuen Gallen der letzteren Rubrik fanden sich an *Glechoma hederacea*, *Hieracium umbellatum*, *Silene inflata* und *Sorbus aucuparia* in Lothringen.

Auch F. Löw macht Mittheilungen über neue und bekannte Cecidomyiden; ebenda S. 231—246. Die Bemerkungen zu schon bekannten Arten beziehen sich auf *Cec. affinis*, *Beckiana*, *circinans*, *Euphorbiae*, *Galii*, *galiicola*, *Salicis*, *Sonchi*, *Violae*; *Diplosis Steini*; *Asphondylia Hornigi*, *Verbasci*; neue Gallen von unbekannten Erzeugern werden beschrieben an *Fagus silvatica* (Blattparenchymgallen), *Galium mollugo* und *silvestre* (Triebspitzen), *Heracleum sphondylium* (geschlossene Blüten), *Inula germanica* und *hybrida* (Knospen), *Scorzonera humilis* (Blattparenchymgallen), *Verbascum austriacum* (Triebspitzen). Bei Weissenbach wurde eine Cecidomyidenlarve gefunden, die sich von den Sporen eines der Zweige einer Tanne bedeckenden Pilzes (*Apiosporium pinophilum*) nährte; die Imago ist in diesem, wie in den meisten ähnlichen Fällen, noch unbekannt.

J. J. Kieffer bringt weitere Beiträge zur Kenntniss der Gallmücken; Entom. Nachr., 1888, S. 200—205, 243—249, 262—268, 310—314.

Ein Beitrag zur Biologie einiger Cecidomyiden von Mik beschreibt und bildet ab: 1. Die Blütenknospen-Gallen auf *Silene nutans*, welche von ihren Insassen erst im September verlassen wurden; die Larven umgaben sich in der Erde mit einem dichten, reinweissen Cocon; 2. Blütenknospen-Gallen auf *Phyteuma Michellii*, die bisher noch nicht beschrieben waren. In einer Galle kommen bis zu 6 Larven vor, die sich von dem letzten Drittel des August an in die Erde begeben; 3. eine noch nicht beschriebene Triebgalle auf *Lotus corniculatus*, durch welche die Endknospe taschenförmig wird; sie ist bleich grün und gewöhnlich hakig nach abwärts gekrümmt; die sie umschliessenden Nebenblättchen des letzten Blattes des Triebes sind schmaler als die normalen und ebenfalls blasser grün. 4. Larven in den Beeren von *Polygonatum multiflorum*, die dadurch kleine trockenhäutige Stellen bekommen. Von den 4 Larven ist die Brustgräte abgebildet; die übrigen Abbildungen beziehen sich auf die missbildeten Pflanzentheile.

Asphondylia Prunorum (aus den knospenförmigen Gallen der *Pr. spinosa*); Wachtl, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 205, *bitensis* (Bitsch; Larven in den Hülsen der *Genista sagittalis*); Kieffer, Entom. Nachr., 1888, S. 264.

Asynapta pectoralis Winn. (descript. nec figur.) ist von (*Cecid.*) *hirticornis* Zett. verschieden und daher beizubehalten; Kieffer, Entom. Nachr., 1888, S. 204 f.; neu ist *A. citrina* (Bitsch; Larve unter Baumrinde); derselbe ebenda S. 243.

Ch. Whitehead & Gray: Report of the commissioners appoint. by the gouvernement to inquire into the present visitation of the Hessian fly on corn crops in Great Britain; London, 1887.

S. Enock erhielt aus englischen Exemplaren der *Cecidomyia destructor* die amerikanischen Parasiten *Merisus destructor* und *Platygaster Herrickii*; Nature, Vol. 38, S. 221; Proc. Entom. Soc. London, 1888, S. XXII f.; vergl. oben S. 6.

Lindeman fand 1887 und 1888 die Larven der *C. destructor* auch an *Timotheograss*, an *Phleum pratense* und *Triticum repens*; letztere Art wurde auf grössere Strecken durch die Mücke verdorben; (Whitehead hatte sie in England auch an *Holcus lanatus* gefunden; s. obigen Report S. 7); Entom. Nachr. 1888, S. 242 f.

C. destructor in Neu-Seeland; Insect life, I, S. 32; über dasselbe Insekt s. ebenda S. 131—133.

F. Paulsen & F. Guerrieri: Sopra alcune galle rinvenute sui tralce e sulle foglie delle viti; R. Staz. agraria chimico-sperim. di Palermo, 1888, mit Tafel. Bezieht sich auf die Gallen von *C. oenophila*, in der *Tetrastichus Cecidomyiae de Stef.* schmarotzt; vgl. den vor. Bericht. S. 157.

C. aceris crispans (verbreitet, die Blätter einrollend) S. 266, *compositarum* (in Blütenköpfen) S. 310, *genistamtorquens* (Bitsch.) S. 311; Kieffer, Entom. Nachr., 1888, *Thomasiana* (Halle und Lothringen, auf *Tilia*) S. 95, *salicariae* (Lothringen, an *Lythrum*.) S. 96, *Scabiosae* (Thüringen, Alpen; Lothringen, an *Sc. columbaria*) S. 97, *Taraxaci* (Lothringen, auf *T. officinale*) S. 98, *Thymi* (Oesterreich; Tirol; Rhön; Halle; Bitsch; auf *Th. serpyllum* und *chamaedrys*) S. 100, *thymicola* (Lothringen, ebenfalls auf beiden *Th.*-Arten) S. 101, *Viciae* (Lothringen, an *V. sepium*) S. 106, *Lotharingiae* (L., auf *Cerastium glomeratum*, triviale und *arvense*) S. 107; derselbe, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, *floriperda* (Niederösterreich,

in Blüten von *Silene inflata*) S. 231, *similis* (Lothringen, in Triebspitzen oder Blütenknospen von *Veronica scutellata*) S. 232; Löw ebenda, *Hierochloae* (Heirochl. ist wohl Druckfehler; Russland, Gouv. Poltawa, auf *H. repens*); Lindeman, Entom. Nachr. 1888, S. 50, *lamiicola* (Gallen auf *Lam. maculatum*, ähnlich denen der *C. galeabdomontis*); Mik, Wien. Ent. Zeitg., 1888, S. 31—38, Taf. I.

A. Aloi: Di un nuovo insetto del genere *Cecidomyia* dannoso alla viti, scoperto nelle vigne della piana di Catania; Atti Acc. Gioenia, (S. 3) XIX.

Diplosis Frirenii (Metz, aus Gallen der *D. ramicola* auf *Tilia grandif.*); Kieffer, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, S. 109, *auripes* (Stuttgart, an *Galium mollugo*) S. 233, *quinenotata* (Wien, in Blüten von *Hemerocallis fulva*) S. 235; Löw ebenda, *Pulsatillae* (Bitsch, Larve in den Früchtchen von *P. vulgaris*) S. 262, *Nasturtii* (Larve in Blüten von *N. palustre*) S. 263; Kieffer, Entom. Nachr., 1888 (mit Bemerkungen über *D. praecox Winn.*, *lonicerarum Fr. Lw.* und *mosellana Geh.* auf S. 244 f.), *fraxinella* (Inquiline der Eschengallen); R. H. Meade, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 77.

Epidosis erythromma (Bitsch; Larve unter der Rinde einer absterbenden *Rhamnus frangula*) S. 200, *latescens* (ibid. unter Buchenrinde) S. 202; Kieffer, Entom. Nachr., 1888.

Simuliadae. Ueber die Larven einer bei Ithaca, N.-Y., häufigen *Simulium*-Art, die nicht zu „beissen“ scheint, s. L. O. Howard, in *Insect life*, I, S. 99 f.

Riley sprach auf der 36. Versammlung (zu New-York) der Amer. Assoc. for the advancem. of Sci. über die dem Viehstand in den Südstaaten so schädlichen *Simulium*-Arten, namentlich *S. pecuarum* und *meridionale*; Proceed. S. 262.

Bibionidae. Larven von *Bibio hortulanus*, die mit Waldstren in ein Melonenbeet gebracht waren, verzehrten die gelegten Melonenkerne. Die ausgeschlüpften Imagines wurden eifrig von *Telephorus fuscus* verspeist. Fallou, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXCVI.

Culicidae. G. Macloskie schildert the poison-apparatus of the mosquito; American Naturalist, 1888, S. 884—888 mit 3 Holzschn.

Culex rufinus (Tunis); Bigot, Dipt. rec. en Tunisie 1884, S. 7.

Chironomidae. Gercke's Vermuthung, dass die nacktfügeligen *Ceratopogon*-Arten sich aus im Wasser lebenden Larven, die behaartfügeligen aus Larven entwickeln, die unter Baumrinde, verwesenden Pflanzenstoffen u. s. w. leben, findet sich in einem neuen Falle (*C. Hippocastani* S. 185) bestätigt, bei dem aber die Gestalt und Bewegungsweise der Larve und Nympe eine nacktfügelige Art erwarten liess. Die Larve lebt in ulcerösen Stammtheilen von *Aesculus Hippocastanum* im Schönbrunner Park und ist nebst Nympe und Imago sehr genau beschrieben und abgebildet von Mik, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 183—192, Taf. II. (Zur Biologie von *Ceratopogon Meig.*, nebst Beschreibung einer neuen Art dieser Gattung.)

Om myggor's förekomst i sala grufva (*Chironomus fuscipes*); S. Auri-villius, Entomol. Tidskr., 1888, S. 97—101.

Orphnephilidae. *Orphnephila larvata* (Tirol, im oberen Innthal); Mik, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 243.

H*

Psychodidae. Ueber die Athemorgane einiger brasilianischer Psychodiden-Larven s. oben S. 13.

Tipulidae. E. Bergroth zählt (64) österreichische Tipuliden auf, die von Palmén 1870 gesammelt wurden; Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, S. 645—656.

Derselbe schreibt über einige nordamerikanische Tipuliden; Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 193—201, 239f. (Die erstere Arbeit wird zitiert werden: a. a. O.)

Derselbe handelt on some South African Tipulidae; Entom. Tidskr., 1888, S. 127—141 mit mehreren Holzschn.

G. H. Verrall bringt seine List of British Tipulidae, &... with notes zu Ende; Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 20—27, 97—99.

Sintenis erstattet seinen 4. Bericht über Livländische Tipuliden und Dixia; Sitzgsber. Naturf.-Gesellsch. Dorpat, VIII. Bd., S. 393—396.

Derselbe sprach über Unregelmässigkeiten im Aderlauf der Tipulidenflügel; ebenda S. 383—393. Aus einer grösseren Zahl von Einzelbeobachtungen unregelmässigen Geäders bei verschiedenen Arten ergibt sich, dass die meisten Unregelmässigkeiten im Bereich der Diskoidalzelle vorkommen.

Podoneura (n. g. *Psiloconopae* affine, sed vena axillaris furcata, ramo furcae anteriore posteriore multo longiore; inter cellulas axillarem et spuriam igitur adest cell. axill. secundaria) *anthracogramma* (Kapstadt); E. Bergroth, Entom. Tidskr., 1888, S. 133, Fig. 2.

Amalopsis pyrenaica (P.); G. H. Verrall, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 97, *claripennis* (Wales; auch Oesterreich); derselbe ebenda S. 99.

Dicranomyia Osten-Sackeni *Westh.* = affinis *Schumm.* (*stigmatica* Meig.); E. Bergroth, a. a. O., S. 646.

D. venusta (Sitka) S. 193, *vulgata* (ibid.) S. 194; E. Bergroth, Wien. Entom. Zeitg., 1888, *consimilis* (Kaffrarien); derselbe, Entom. Tidskr., 1888, S. 127.

Elephantomyia Wahlbergi (Kaffrarien); E. Bergroth, Entom. Tidskr., 1888, S. 129, Fig. 1.

Erioptera Peringueyi (Kapstadt) S. 129, *subaurea* (Kaffrarien) S. 130; E. Bergroth, Entom. Tidskr., 1888.

Goniomyia pilipennis Strobl = *Cladura fuscula* Lw.; J. Mik, Wien. Ent. Zeitg., 1888, S. 30.

G. galactoptera (Sitka); E. Bergroth ebenda S. 196, *spuria* (Kaffrarien); derselbe, Entom. Tidskr., 1888, S. 134.

Limnophila tetrasticta (Laibach) S. 647, *posthabita* (ibid.) S. 648; E. Bergroth, a. a. O., *frugi* (Kaffrarien); derselbe, Entom. Tidskr., 1888, S. 137.

Ueber *Limnophila pilicornis* Zett. s. Sintenis, Sitzgsber. Naturforschergesellsch. Dorpat, VIII. Bd., S. 396—398.

Molophilus colonus S. 195, *falcatus, paulus* S. 196 (Sitka); E. Bergroth, Wien. Entom. Zeitg., 1888.

Nephrotoma varineura; Bigot, Mission Cap Horn; die Art ist nach E. Bergroth, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 240, eine Tipula; der Artname wird, weil eine vox hybrida, in *variinervis* geändert.

Pachyrrhina Wulpiana (Siskiyon Cy.); E. Bergroth, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 200, *excelsior* (Brit. Kolumbien); derselbe ebenda S. 239.

Rhipidia afra (Kaffrarien); E. Bergroth, Entom. Tidskr., 1888, S. 128.

Tipula Alpium (Grossglockner) S. 652, *Mikiana* (Hohe Tauern) S. 653, *bidens* (Julische Alpen) S. 654; E. Bergroth, a. a. O., *bonae spei* (Kapstadt) S. 138, *pomposa* (Kaffrarien) S. 130, Fig. 4; derselbe, Entom. Tidskr., 1888.

Trentepohlia exornata (Kaffrarien, Delagoa B.); E. Bergroth, Entom. Tidskr., 1888, S. 135, Fig. 3 mit analytischer Tabelle der Arten auf S. 136 f.

Tricyphona contraria (Salzburg; Hohe Tauern); E. Bergroth, a. a. O., S. 650, *septentrionalis* (Sitka); derselbe, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 199.

Stratiomyiadae. Cazorro verzeichnet 26 Spanische Arten dieser Familie; Act. Soc. Esp. Hist. Nat., 1888, S. 102 f.

Bigot giebt zu, dass seine *Odontomyia nigriceps* und *Stratiomys nigriceps* dieselbe Art bedeuten, die er aber im Gegensatz zu Mik zu *Stratiomyia* stellt und für verschieden von *Odontomyia microleon* hält; Bull. Soc. Entom. France 1887, S. CCV; vergl. den vor. Ber. S. 92.

Beris bellula (Rio de Janeiro), *pulchella* (Chapada, bei Cuyabá, Bras.); S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 245.

Chordonota nigra (Chapada, bei Cuyabá, Bras.); S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 255.

Chrysonotus analis (Chapada, bei Cuyabá, Bras.); S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 251.

Clitellaria ephippium bei Seesen, Zerbst und aus Nassau erhalten; Rudow, Entom. Nachr., 1888, S. 148. (Referent fand sie bei Bonn und Münster a. St. im Nahethal).

Dicranophora astuta (Brasilien) S. 250, *affinis* (Rio de Janeiro) S. 251; S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV.

Euryneura nasica (Chapada, bei Cuyabá, Brasil.); S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 252.

Hermetia ceriogaster (Brasilien); S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 246.

Merosargus gracilis (Chapada, bei Cuyabá, Brasil.) S. 249, *festivus* (Rio de Janeiro) S. 250; S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV.

Myxosargus Braueri (Chapada, bei Cuyabá, Bras.); S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 254.

Odontomyia allifrons (Cordova, Argent.) S. 363, Pl. 9, Fig. 3, 4, *maculifrons* (ibid.) S. 364, Fig. 5, *nitidiceps* (ibid.) S. 365; F. M. van der Wulp, Tijdschr. v. Entomol., 31. Deel.

Promerisana cylindricornis (Chapada, bei Cuyabá, Brasil.); S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 253.

Tabanidae. Williston gibt Notes and descriptions of North American Tabanidae; Transact. Kansas Acad. Sci., X, S. 129—142. Keine der nordamerikanischen Arten ist mit einer europäischen identisch. Die Gattungen *Theriopterus* und *Atylotus* werden nur zu Gruppenbezeichnungen benutzt.

Chrysops pertinax S. 182, *Frazeri*, *sequax* S. 133, *pachycera* S. 134 (Nordamerika); Williston, a. a. O.

Pangonia fera, *dives* (Nordamerika); Williston, a. a. O., S. 130, *lasio-phthalma* (Cordova, Argent.); F. M. van der Wulp, Tijdschr. v. Entomol., 31. Deel, S. 365, Pl. 9, Fig. 6.

v. d. Wulp erkennt in den früher für *Tabanus tropicus*, *luridus* und *solstitialis* gehaltenen Exemplaren seiner und anderer Sammlungen *T. tropicus*, so

dass es wahrscheinlich ist, dass die beiden anderen Arten in den Niederlanden nicht vorkommen; eine für die Niederlande neue Art ist *T. plebejus*; Tijdschr. v. Entom. XXXI, Versl., S. XXI—XXIII; XCIV f.; *T. maculicornis* in den Niederlanden; derselbe ebenda S. XXVII.

T. sequax, *comastes* S. 137, *sodalis*, *fur* S. 139. *fratellus* S. 140, *pygmaeus*, *parvulus*, *fenestra* S. 141 (Nordamerika); Williston, a. a. O.

Asilidae. Mik macht darauf aufmerksam, dass die Augen der Asiliden in dem vorderen Theile gröber fazettiert sind als in dem hinteren, und glaubt hierin einen Familiencharakter sehen zu können, der die Asiliden von den Midasiden, Apioceriden, Thereuiden und Leptiden unterscheidet. Wien. Ent. Zeitg., 1888, S. 181 f.

Cerdistus (?) *elegans* (Tunis); Bigot, Dipt. rec. en Tunisie 1884, S. 8.

Saropogon varians (Gabhès); Bigot, Dipt. rec. en Tunisie 1884, S. 7.

Stichopogon Dziedziickii Schnabl. = (*nigrifrons* Lw.) *albofasciatus* M.; Mik, Wien. Ent. Zeitg., 1888, S. 31; Schnabl, Entom. Nachr., 1888, S. 100, bestreitet dies, Mik findet aber die Schnabl'sche Beschreibung vollkommen auf die Meigen'sche Type passend. Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 182.

Nemestrinidae. *Nemestrina fascifrons*! (Iles Kerkenna); Bigot, Dipt. rec. en Tunisie 1884, S. 8.

Bombyliidae. *Eucharimyia* (n. g. Bombylior.) *dives* (Ceylon); Bigot, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXL.

D. W. Coquillett giebt eine Monograph of the species belonging to the genus *Anthrax* from American north of Mexico; Trans. Amer. Ent. Soc., XIV, S. 159—182. Die (54) Arten sind in analytischer Tabelle unterschieden und dann genauer beschrieben; die Gattung *Dipalta* wird vom Verfasser verworfen, weil auch bei echten *Anthrax*-Arten abnormer Weise 3 Submarginalzellen vorkommen. Folgende Arten sind neu: *A. (Dipalta) junctura* S. 163, *Keenii* S. 164, (*A. aenea*, *nebulo*, *concessor* S. 165, *Mercedis* S. 166, *turbata* S. 168, *Anna*, *supina*, *inops*, *Eudora* S. 169, *caprea*, *inaurata* S. 170, *lauta*, *agrestis*, *campestris*, *atrata*, *miscella* S. 171, *scitula* S. 172, *vana*, *syrtis* S. 173, *cautor* S. 175, *adumbrata*, *perplena*, *vigilans* S. 176, *fumida*, *impiger*, *dispar* S. 177, *plagosa*, *nugator* S. 178, *mira* S. 179, *Willistonii* S. 181, *effrena*, *arizonensis*, *otiosa* S. 182; die meisten derselben stammen von Kalifornien.

Bombylius discolor Mikan bei Stettin und Ballenstedt; v. Röder, Entom. Nachr., 1888, S. 21; bei Malchin; Rudow, ebenda, S. 148.

Comastes bicolor (Cordova, Argentin.); F. M. van der Wulp, Tijdschr. v. Entomol., 31. Deel, S. 366, Pl. 9, Fig. 7; 8.

Cylenia laevis (Iles Kerkenna); Bigot, Dipt. rec. en Tunisie 1884, S. 9.

Anthrax fasciata Duf. und *Exoprosopa turcomana* Portsch. = *E. grandis* Meig.; *Anthr. rhymnica* Eversm. = *Ex. Dyonisii* Big. = *Ex. Pallasii* Wied.; *Anthr. Migii* Duf. = *hilaris* Eversm. = *interrupta* Muls. = *Ex. rutila* Wied.; *Anthr. nox* Walk. = *Ex. Nemesis* Fabr.; die *Ex. longipennis* Lw. (sine descriptione) ist unter dem Namen *macroptera* von Loew beschrieben worden; v. Roeder, Wien Ent. Zeitg., 1888, S. 97 f.

Exoprosopa extensa (Cordova, Argentin.); F. M. van der Wulp, Tijdschr. v. Entomol., 31. Deel, S. 367, Pl. 10, Fig. 1.

Exoprosopa Mayeti (Sfax); Bigot, Dipt. rec. en Tunisie 1884, S. 9.

Toxophora maculata Meig. aus *Eumenes pomiformis*-Nest (als Kommen-

sale von der als Nahrung eingetragenen Spannerraupe) erzogen; A. Palumbo, *Il Naturalista Siciliano*, VII, S. 187; vgl. unten.

Therenidae. *Psilocephala costata* (Cordova, Argentin.) S. 368, *rubida* (ibid.) S. 369; F. M. van der Wulp, *Tijdschr. v. Entomol.*, 31. Deel.

Acroceridae. Nach W. M. Maskell legen die Weibchen von *Henops brunneus* Hutton ihre kleinen, schwarzen Eier gesellschaftlich an die Zweige von Apfel- und Birnbäumen, die davon ganz bedeckt erscheinen. Die Larve soll der von Cecidomyiden ähnlicher sehen als irgend einer anderen Fliege. *Transact. of the New Zealand Institute*, XX, und *Ann. a. Mag. N. H.* (6), II, S. 194—196.

Oncodes limbatus (Tunis); Bigot, *Dipt. rec. en Tunisie* 1884, S. 7.

Empidae. Die auf *Tachydromia melanocephala* F. gegründete Gattung *Lepidomyia* Big. ist synonym mit *Chelipoda* Macq., während für die Arten mit Diskoidalzelle *Thamnodromia* Mik (statt des vergebenen *Phyllodromia* Zett.) bleiben kann; Mik, *Wien. Entom. Zeitg.*, 1888, S. 299f., 327. Auf diese Weise verschwindet die *vox hybrida* *Lepidomyia*. Freilich ist *Chelipoda mantispa* Macq. nicht die Panzer'sche Art, sondern (*Thamnodromia*) *vocatoria* Fall.; die rechte *T. mantispa* Pz. ist von Macquart *Chel. minor sibi* genannt worden.

Hemerodromia ochracea (Kap Horn); Bigot, *Miss. du cap Horn*, div. 22; (wird später in die Gattung *Hilara* verwiesen; *Bull. Soc. Entom. France*, 1888, S. XXX).

Ueber den „Schleier“, den vor 10 Jahren Osten-Sacken bei einer unbeschriebenen *Hilara*-Art angegeben hat, (s. dies. Bericht für 1877—78 S. 190 (534) und 1886 S. 150) macht Th. Becker in der *Berl. Entom. Zeitschr.* 1888, S. 7—10 nähere Mittheilungen. Nur die Männchen haben dieses im best erhaltenen Zustande muldenförmige, etwa 2 mm lange und 1 mm breite Häutchen auf dem Hinterleibe, und halten es mit den Beinen fest. Wahrscheinlich ist es durch Zusammenfließen von Sekretfäden entstanden, die zu beiden Seiten des Hinterleibes aus Drüsen stammen; diese Drüsen sind aber noch nicht nachgewiesen. Der Zweck des silberglänzenden Häutchens scheint der zu sein, die Männchen den Weibchen angenehmer zu machen. Der Schleier ist in 2 Ansichten im Holzschnitt abgebildet — Die Art, welche diesen Schleier trägt, ist bei Gastein und wohl überhaupt in den Alpen nicht selten, in Loew's Sammlung unter dem Namen i. l. *alpina*, und wird von Becker als *H. sartor* eingehend beschrieben S. 11.

Mik bestreitet einige dieser Angaben: das Gewebe habe keine Art Nath in der Längsachse, keine S-förmig gebogenen Fäden und werde auf der Bauchseite festgehalten; *Sitzgsber. Zool. Bot. Gesellsch. Wien*, 1888, S. 97f.

Dolichopodidae. Bigot unterdrückt die in seinem 1859 erschienenen Werke angewandten Namen *Condylostylus*, *Megistotylus*, *Oedipsilopus*, *Mesoblepharius*, *Dasyphilopus*, *Eurostomerus*, *Oariostylus* und *Hemospathus* und schlägt folgende neue Namen vorläufig vor: *Spathiopsilopus* (*Psilopus globifer* Wiedm.), *Eudasyppus* (*Ps. senegalensis* Macq.), *Oariophorus* (*Ps. tuberculicornis* Macq.), *Gymnoceromyia* (für *andicola*), *Spathitarsus* (*Hypophyllus discipes* Abr.), *Spathichira* (*Dolichopus funditor* Lw.), *Paragymnopternus* (*Gymnopt.* mit vollständig glatter Chäta), *Calyxochaetus*! (*Sympycnus notatus* Lw.), *Amblypsilopus* (*Ps. peittacinus* F.), *Tylochaetus* (*Ps. bituberculatus* Macq.), *Psilopodinus* (*Ps. platypterus* F.); *Bull. Soc. Entom. France*, 1888, S. XXIIV.

Medeterus insignis (Thüringen); E. Girschner, *Entom. Nachr.*, 1888, S. 97 mit Taf., Fig. 1—4.

Poecilobothrus mexicanus (M.); Bigot, a. a. O., S. XXX.

Psilopodius hirtulus (Haiti); Bigot, a. a. O., S. XXIX.

Psilopodinus pallens (Nord-Carolina), *pamposculus* (Haiti), *carolinensis* (C.), *occidentalis* (Kalifornien), S. XXIX, *astegivinus* (Mexiko), S. XXX; Bigot, a. a. O.

Psilopus ciliatarsis (Cordova, Argent.); F. M. van der Wulp, Tijdschr. v. Entomol., 31. Deel, S. 369.

Saucropus cinereicollis (Cordova, Argent.); derselbe ebenda S. 370.

Spatichira (früher *Spathich.* geschrieben; s. oben) *pulchrimana* (Rocky-Mts.); Bigot, a. a. O., S. XXX.

Cyclorrhapha.

Syrphidae. Additions to the catalogue of South-American Syrphidae; S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 291f.

Apophysophora (n. g. Volucellae affine, für *V. hirtipes* Macq. und *scutellata* (Chapada bei Cuyabá, Bras.); S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 277.

Die Gattung *Catabomba* O.-S. ist wohl beizubehalten, da Rondani als Type zu seinem *Lasiotictus* „zufällig“ den *S. pyrastris* aufgestellt hat; will man aber *Lasiotictus* vor *Catabomba* gelten lassen, so ist *Ischyrosyrphus* Big. für die nicht in die Verwandtschaft von *pyrastris* gehörigen Arten mit behaarten Augen beizubehalten; Mik, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 222; vergl. Bigot, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXXVII. — Zu *Catabomba* gehören noch *Gemellarii* Rond. und wahrscheinlich *S. lunulatus* Wied. und *albomaculatus* Macq.

Ceriogaster (n. g. *Xylotae* propinquum, facie carinata, abdomine basi valde contracto, für *X. coarctata* Wied.? und) *foscithorax*! (Corumbá; Rio de Janeiro); S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 286.

Trichopsomyia (n. g. *Pipizellae* affine, vertice in ♀ et triangulo frontali in ♂ diversum; oculi irregulariter pilosi) *polita* (Chapada bei Cuyabá, Bras.), *puella*, *tuberculata* (Chapada) S. 260, *longicornis* (ibid.) S. 261; S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV.

S. W. Williston gibt eine Tabelle brasilianischer *Baccha*-Arten und beschreibt *B. stenogaster* (Chapada, bei Cuyabá) S. 266, *exigua* (ibid.) S. 267, *placiva* (ibid.) S. 269; Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 265–270.

B. trincta (Tucuman, Argent.); F. M. van der Wulp, Tijdschr. v. Entomol., 31. Deel, S. 376, Pl. 10, Fig. 8.

Ceria Lynchii (Chapada, Bras.), *Sackenii* (ibid.) S. 287, *Mikii* (ibid.) S. 288, *Brauerii* (ibid.; Santarem), *Roederii* (Chapada) S. 289, *Wulpii* (ibid.; Rio) S. 290, *Bigotii* (Chapada) S. 291; S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV.

S. W. Williston stellt eine analytische Tabelle brasilianischer *Eristalis*-Arten auf und beschreibt *E. ochraceus* (Chapada) S. 279, *pr(a)ecipuus* (ibid.), *volaticus* (ibid.; Corumbá; Rio) S. 280, *schistaceus* (Chapada), *parvulus* (ibid.) S. 282; Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 277–283.

E. congruus (Tucuman, Argent.); F. M. van der Wulp, Tijdschr. v. Entomol., 31. Deel, S. 371.

Eugeniamyia Will. ist synonym mit (*Exochila Rnd.* 1857, non 1867 nec 1877, wo Rondani den Namen *Euchila* nochmals für eine Sciomyzinen-Phycodrominen-Gattung verwandte) *Hammerschmidtia Schumm.*; Mik, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 27 f., s. auch unten.

Habromyia coeruleithorax (Chapada, Bras.); S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 284.

Ein dipterologischer Beitrag über die Gattung *Hammerschmidtia Schummel* von V. v. Röder zeigt, dass *H. vittata Schum.* = (*Rhingia*) *feruginea Fall.* ist; auf diese Art (als *Eug. rufa Will.*) hat Williston die Gattung *Eugeniamyia* gegründet, die demnach mit *Hammerschmidtia* synonym ist; Zeitschr. f. Entomologie, Breslau (N. F.) 13, S. 1—3; vgl. oben.

Lepidomyia ortalina (Cordova, Argentin.); F. M. van der Wulp, Tijdschr. v. Entomol., 31. Deel, S. 374, Pl. 10, Fig. 2, 3, 4, 5.

Der Name *Lepidostola Mik* hat die Priorität vor *Lepromyia Will.*; Mik, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 27.

L. pulchra (Chapada, bei Cuyabá, Bras.) S. 261, *similis* (ibid.), *abdominalis* (ibid.) S. 262; S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV.

Leucozona lucorum var. *nigripila* (Kaukasus); Mik, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 131.

Melanostoma longicornis (Chapada, Cuyabá, Bras.) S. 263, *scitulum* (ibid.) S. 264; S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, *punctulata* (Cordova, Argentin.); F. M. van der Wulp, Tijdschr. v. Entomol., 31. Deel, S. 375.

Die Larve von *Mesograpta polita Say* ist als Pflanzenfresser (sie frisst Pollenkörner und Blätter des Korns) in dieser Familie eine vereinzelte Erscheinung. Insect life, I, S. 5—8 mit Holzschnitt der Larve, Puppe und Imago.

Microdon mirabilis (Chapada bei Cuyabá, Bras.) S. 257, *inermis* (Entre Rios) S. 258; S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV.

Pterallastes nubeculosus (Tucuman, Argentin.); F. M. van der Wulp, Tijdschr. v. Entomol., 31. Deel, S. 372.

Pteroptila aemula (Chapada, Brasil.); S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 283.

Sphaerophora nasuta, trilimbata S. 253, (*Mesograpta*) *quinque-cincta, quinque-maculata* S. 254 (Mexiko); Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Spilomyia gratiosa (Tucuman, Argentin.); F. M. van der Wulp, Tijdschr. v. Entomologie, 31. Deel, S. 372, Pl. 10, Fig. 6, 7.

Ueber eine zwitterähnliche Missbildung bei *Syrphus lunulatus*, s. oben S. 27.

S. erraticus (Chapada bei Cuyabá, Bras.); S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 264.

Mik illustrierte die Veränderlichkeit der Färbung des Haarkleides von *Volucella bombylans* durch Nebeneinanderstellung der Varietäten *bombylans*, *plumata* und *xantholeuca* mit *Bombus lapidarius*, *hortorum* und *terrestris*; Sitzgsber. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, S. 63 f.

S. W. Williston gibt eine analytische Tabelle brasilianischer Arten, mit *V. meretricias* (Chapada; Rio de Janeiro), *aemula* (Piedra) S. 272, *prescutellaris*! (Chapada), *persimilis* (ibid.); Destares; Rio de Janeiro) S. 273, *musta* (Chapada) *mus* (ibid.) S. 274, *viridis* (ibid.) S. 275; Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 271 bis 276.

Xylota genuina (Rio de Janeiro); S. W. Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 284.

Conopidae. *Tropidomyia* (n. g.) *bimaculata* (Brasilien); Williston, The Canadian Entomologist, 1888, S. 11. — Die Gattung *Physocephala*, die Williston früher nicht gelten lassen wollte, erkennt er nun als berechtigt an (Nach Mik, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 77).

Oestridae. R. Matas zog einem aus Honduras gekommenen Reisenden mehrere Larven aus einer Geschwulst, die grosse Aehnlichkeit mit denen einer *Dermatobia*-Art haben; Insect life, I, S. 76—80 mit Holzschn. und separat: Report of the case of a patient from whose subcutaneous tissue three larvae of a species of *Dermatobia* were removed; with remarks.

Tachinidae. Die 33e partie der Diptères nouveaux ou peu connus von Bigot ist der Beschreibung neuer Arten aus dieser Familie gewidmet; Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 77—101. (Wird zitiert werden: a. a. O.) Von den durch die Verkümmern der Palpen ausgezeichneten Gattungen wird auf S. 87 f. eine analytische Tabelle aufgestellt.

Melanophrys (n. g.) *flavipennis* (Nordamerika); Williston, Trans. Amer. Entom. Soc., 1886, S. 306 (nach Mik, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 47).

Tach. lepida Meig. ist wahrscheinlich = *Leucostoma aenescens* Zett., indem Meigen bei der Beschreibung einen Irrthum begangen hat; die Art würde besser unter *Leucostoma* bleiben, als zu *Rhinophora* zu stellen sein; vergl. oben v. Röder S. 107; Stein, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 201 f. — Röder hält gleichfalls *L. lepida* M. und *aenescens* Zett. für synonym; ebenda S. 253.

Allophora fenestrata (Nevada), *luctuosa* (Rocky Mts.); Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 255.

Mit *Besseria melanura* M. sind folgende Namen synonym, die sich zum Theil auf Männchen mit obliterierter Spitzenquerader, z. Th. auf Varietäten beziehen: *Wahlbergia dimidiata* Zett., *Apostrophus anthophilus*, *suspectus* Lw., *Melia forcipata* Big.; Mik, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 302 f.

Blepharipeza aurocaudata (Montevideo), *andina* (Chili) S. 90, *monticola* (Rocky Mts.), *inermis* (Nordamerika) S. 91, *fulvipes* (Washington Terr.), *albifacies* (Brasilien) S. 92; Bigot, a. a. O.

Brachycoma macropogon (Kalifornien); Bigot, a. a. O., S. 259.

Ceromasia quadrivittata, *zonata*, *pictigaster*!, *castanifrons*, *chrysocephala* S. 261, *spinipes*, *abbreviata* S. 262 (Mexiko); Bigot, a. a. O.

Cestonia nigra (Mexiko); Bigot, a. a. O., S. 259.

Chetolyga erythropyga, *nigriventris*, *dubia* (Mexiko), *rufonotata* (Rocky Mts.) S. 257, *nigrifacies* (ibid.), *nigripalpis*, *flavolimbata*, *albopicta*, *occidentalis*, *nigriventris* S. 258, *aenea* (alle von Mexiko), *rufopicta* (Rocky Mts.) S. 259; Bigot, a. a. O.

Cryptopalpus flaviceps (Rocky Mts.) S. 98, *palliceps* (Columbien) S. 94; Bigot, a. a. O.

Degeeria cora, *anthracina* (Mexiko); Bigot, a. a. O., S. 259.

Dejeania crocea (Kap); Bigot, a. a. O., S. 77.

Echinomyia flavopilosa (Java), *rubrifrons* (Mexiko) S. 80, *cora* (Mexiko), *macrocera* S. 81, *notata* (ibid.) S. 82; Bigot, a. a. O., *cinerascens* (Mexiko); derselbe ebenda S. 256.

Eine interessante, für die Mark neue *Echinomyia* ist die bisher nur aus Russland bekannte *E. Popelii* Portsch.; P. Stein, Entom. Nachr., 1888, S. 17—20.

Epalpus lineolatus S. 94, *erythrostoma*, *ochricornis* S. 95 (Chili); Bigot, a. a. O.

Evibrissa americana (Washington Terr.); Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 256.

Exorista nemea aus *Thyatira batis* erzogen; V. v. Röder, Entom. Nachr., 1888, S. 221.

Exorista ornata (Indien), *melas* (Van-Diemen), *rufipalpis* (Mexiko) S. 256, *rufata* (ibid. und Para) S. 257; Bigot, a. a. O.

Fabricia infumata (Mexiko) S. 85, *andicola* (Chili) S. 86; Bigot, a. a. O.

Frontina rufostylata S. 83, *chrysopygata* (Mexiko), *aurulenta* (Brasil.) S. 84; Bigot, a. a. O.

Gonia (cilipeda) Rond. var.? *incerta* (Sfax); Bigot, Dipt. rec. en Tunisie 1884, S. 10.

In seinen Notizen zu den europäischen Arten der Dipteren-Gattung *Gonia* spricht Kowarz zunächst aus, dass die relative Länge des 2. und 3. Gliedes der Fühlerborste keinen systematischen Werth besitzt, und die Gattung *Spallanzania* R. D. nicht haltbar sei; die Beborstung des Hinterleibs hat dagegen grösseren generischen Werth. Auf eine Tabelle zur Bestimmung „einiger“ Gonien folgt dann die Diagnose und Beschreibung dieser 12 Arten und hierauf Bemerkungen zu den übrigen Arten nebst einem Register; Wien Entom. Zeitg., 1888, S. 1—18.

Heteropterina *spinulosa* (Nordamerika); Bigot, a. a. O., S. 262.

Hystericia fulvida (Nordamerika), *erythrina*! (*etythrina* ist wohl Druckfehler; Bahia); Bigot, a. a. O., S. 79; (*H. fulvida* wird später, Bull. S. CVI, eingezogen, da sie identisch mit *H. testacea* Macq. ist; der Name der zweiten Art ist *erythrina*).

Jurinea (?) *barbata* (Mexiko), *gonoides* (ibid.); Bigot, a. a. O., S. 78; (letztere Art wird später, Bull. S. CVI, als identisch mit *J. lateralis* Macq. erkannt)

Macquartia atrifrons (Mexiko); Bigot, a. a. O., S. 259.

Masicera fulvipalpis (Rocky Mts.), *flavifacies*, (Mexiko), *eucrata* (Kalif.); Bigot, a. a. O., S. 263.

Micropalpus nigrifrons (Mexiko); Bigot, a. a. O., S. 263.

Eine Note sur le parasitisme du *Myobia pumila* von H. Lucas theilt mit, dass die Larve der genannten Fliege in den Larven des *Crioceris Asparagi* schmarotze; Ann. Soc. Entom. France. 1888, S. 102—104.

Ueber die Artgrenze der *Phasia crassipennis* F. s. Girschner, Entom. Nachr., 1888, S. 225—234 mit Holzschn.

Phorocera barbata, *melanocephala*! (Mexiko), *parva* (Rocky Mts.); Bigot, a. a. O., S. 260.

Prosopea americana (Mexiko); Bigot, a. a. O., S. 260.

Rhinophora umbratica Fall. (= *lugubris* Zett. = *Stevenia nigripennis* R. D. = *Rhin. simplicissima* Lw. = *Ptilocera atramentaria* Rnd. nec Meig.) ist (wahrscheinlich) ein Schmarotzer von *Callidium violaceum*; V. v. Röder, Entom. Nachr., 1888, S. 219f.

Scopolia satanica (Mexiko); Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 254,

Stevenia pictipes (Washington Terr.) S. 254, *pallidiventris*, *flavo-calyptata* S. 255 (Mexiko); Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Tachina rufostomata! (Rocky Mts.); Bigot, a. a. O., S. 260.

Trichophora (?) *albocalyptata* (Quito); Bigot, a. a. O., S. 82.

Tricoliga caloptera (Mexiko), *fulvidapex* (ibid.?, Celebes?); Bigot, a. a. O., S. 263.

Nach Bigot ist die Gattung *Udschimyia* Rond. synonym mit *Leskia*, die Bigot zu seinem *Dexidi* stellt; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XXXIX f.

Viviana (?) *rufopygata*, *citrina* (Mexiko); Bigot, a. a. O., S. 262.

Dexiadae. *Anthracomyia pallidicornis* (Mexiko); Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 270.

Cordulogaster fuscifacies (Java?); Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 101.

Dexiosoma fumipennis, *partita* (Mexiko); Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 270.

Doleschalla nigra, *consobrina* (Molukken) S. 98, (?) *picta* (Batchian) S. 99, *venosa*, *maculifera* (Neu-Guinea) S. 100; Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Homodexia longicornis, *vittigera* S. 267, *flavipes*, *spinosa*, *triangulifera* S. 268 (Mexiko); Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Megerlea rufo-caudata (Rocky Mts.); Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 269.

Microphthalma calogaster (Mexiko); Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 266.

Morinia Washingtoniana (Washingt. Terr.); Bigot, a. a. O., S. 269.

Morphomyia rufonotata (Kaliforn.); Bigot, a. a. O., S. 269.

Myocera ruficornis (Baltimore), *simplex* (Mexiko); Bigot, a. a. O., S. 266.

Myostoma nigriceps (Washington Terr.); Bigot, a. a. O., S. 267.

Oplisa albifacies, *nigrifacies* (Mexiko); Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 268.

Phorostoma appendiculata (Mexiko), *melanogaster* (New-York); Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 269.

Prosenia maculifera, *obscura*, *curvirostris* (Mexiko); Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 264.

Pyrrhosia ochracea (Mexiko), Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 268.

Rhamphinia formidabilis S. 264, *major* (ibid. und Washingt. Terr.), *picta*, *rubricauda* (Cuba), *anthracina* (Mexiko), *argentina* (Buenos Aires) S. 265; Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Rhychiodexia tincticornis (Mexiko), *spinosa* (Haïti); Bigot, a. a. O., S. 266.

Tromodesia haemorrhoidalis (Mexiko); Bigot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 267.

Sarcophagidae. Biologische und synonymische Notizen über *Sarcophaga affinis* Fall. von F. A. Wachtl melden das Schmarotzen dieser Fliege in Raupen von *Lasiocampa Pini*, als Synonyme gehören dazu *S. quinquevittata* Hart. und *Agria punctata* R. D.; auch die übrigen Wirthe dieser Art sind aufgezählt; Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 277 f.

S. fulvicauda (Oxfordshire); R. H. Meade, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 28.

E. Brandt berichtet über ein von Larven der *Sarcophila magnifica* Schin. (Wohlfartii Ports.) veranlassetes Zahngeschwür; Zool. Anz., 1888, S. 560 f.

Theria muscaria Meig. in England; R. H. Meade, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 27.

Muscidae. *Calliphora zanthorrhina* (Mexiko); Bigot, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXX.

Curtoneura fulvipes, *vittigera*, *pallidicornis*, *callidimera* (Mexiko), *anthomydaea*, *nigriceps* (Felsengebirge); Bigot, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXII.

Eine Schmeissfliege, *Lucilia nobilis*, parasitierend beim Menschen; W. M. Schoeyen, Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde, 1888, IV. Bd., S. 274f.; vgl. oben S. 9.

Musca atrifrons (Mexiko, Kuba), *flavipennis* (Felsengebirge); Bigot, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXI.

Pollenia obscura (Nordamerika); Bigot, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXI.

Pyrellia obscuripes (Mexiko); Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXI.

Somomyia rufigena, *rectinervis* (Felsengebirge), *iridicolor* (Kuba); Bigot, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXI.

Anthomyiadae. J. Schnabl sagt quelques mots sur l'utilité de l'extirpation de l'organe copulateur dans la famille des Anthomyides pour la diagnostique; Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 181—186.

Allocostylus (n. g.) *sudeticus* (Graefenberg, Oesterr.-Schlesien); Schnabl, Entom. Nachr., 1888, S. 49f., 82. Vgl. über diese Gattung und über die sog. Kreuzborsten bei Anthomyidenweibchen: Mik, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 135—139.

In dieselbe Gattung werden (*Aricia*) *simplex* Wiedm. und (*Mydaea*) *flaveola*, *varians* Fall. verwiesen; Schnabl, a. a. O., S. 82f.

Hera (n. g. praecedenti valde affine, für *longipes* Zett., *variabilis* Fall., *hirsutula* Zett., *baicalensis* Schn., *nigritella* Zett., *semicinerea* Wied. und) *Mikii* (Nesselkoppe); derselbe ebenda S. 114, der S. 118—120 die Berechtigung der Mik'schen Forderung, die aufgestellten Gattungen *Spilogaster*, *Mydaea*, *Limnophora*, *Trichopticus* u. s. w. nicht mit *Aricia* wieder zu vereinigen, sondern besser auszuarbeiten, als berechtigt anerkennt.

Anthomyia litoralis (Hela; nur angedeutet); Brischke, Schrift. Naturf.-Gesellsch. Danzig, N. F., VII. 1. S. 45, (*Acanthiptera*) *signata* (Seeresen, Larve in umgerollten Wedelspitzen des *Aspidium filix femina*); derselbe ebenda S. 107.

Schnabl's Contributions à la faune diptérologique, Hor. Soc. Ent. Ross. XXII, S. 378—486 enthalten Additions aux descriptions précédentes des *Aricia* et descriptions des espèces nouvelles, nämlich *Ar. nigripennis* (Warschau) S. 378, *obscurataeformis* (Dolmar) S. 383, *van-der-Wulpi* (Holland) S. 387, *charcoviensis* (Charkow) S. 391, *hybrida* (Nesselkoppe, Oesterreich.-Schles.) S. 396, *Girschmeri* (Schmalkalden) S. 401, *Jaroschewskii* (Charkow) S. 408, *Zugmayeriae* (Niederösterreich) S. 411, *Portschinskyi* (Gouv. Mohilew) S. 414, *rossica* (Charkow) S. 418, *Tiefi* (Gräfenberg) S. 421, *Steinii* (Genthin) S. 423; II. espèces connues, non décrites dans mes contributions, S. 427—446; Additions aux espèces décrites dans les contributions, S. 447—483; Addenda ad tabulam synopticam specierum generis *Ariciae* in s. str., S. 483—486.

Mik schickt eine Antwort auf Dr. J. Schnabl's „Entgegnung“... ein; Entom. Nachr., 1888, S. 41—45; vgl. d. vor. Ber. S. 99 u. oben unter *Hera*.

Chortophila nigrisquama (Sachsen); P. Stein, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 290.

Hydrotaea ezimia (Sachsen) S. 289, *palaestrica* M. ♀ S. 292; P. Stein, Wien. Entom. Zeitg., 1888.

Syllegoptera curvinervis Big. ist wahrscheinlich das Weibchen zu *S. ocypterata* Meig.; Mik, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 29.

Ortalididae. *Cephalia caloptera* Big. ist eine Trypetine und zwar = *Euphranta connexa* F.; Mik, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 30.

Mik erinnert daran, dass Scholtz die Larve von *Seoptera* im Pferdemist beobachtet habe; vgl. den vor. Ber. über *Myodina vibrans* S. 100; Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 94.

Trypetidae. F. Vitale: *Monografia su la Mosca olearia* (*Dacus Oleae*); Messina, D'Amico, 1887; 8°, 64 Ss.

Die Larve von *Spilographa Abrotani* scheint ausser in *Eupatorium* auch in *Adenostylis alpina* zu leben; Mik, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 140.

Die Entwicklungsgeschichte der in Mexiko als Verderberin der Orangen aufgetretenen *Trypeta ludens* Löw, the morelos orange fruitworm, ist dargestellt von C. V. Riley in *Insect life*, I, S. 45—47 mit Holzschn.

Sapromyzidae. *Sapromyza quadrilineata* Strobl = *quadrivittata* Lw.; Mik, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 221.

Heteroneuridae. Zur Unterscheidung der *Heteroneura alpina* Lw. und *albimana* Mg. s. Girschner, Entom. Nachr., 1888, S. 98f. mit Taf., Fig. 5—8.

Ueber *Trigonometopus frontalis* und verwandte Arten s. v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XXXI, Versl., S. XXIII f.

Stein ergänzt auf Grund reichlichen Materials die Beschreibung von *Tr. frontalis* und zieht, entgegen Schiner, *Oxyrrhina frontalis* Zett. als Synonym zu dieser Art; Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 202f.

Ephydriidae. *Discomyza cimiciformis* Hal. bei Artern am Soolgraben; E. Girschner, Entom. Nachr., 1888, S. 99f. mit Abbildung des Flügelgeäders in Fig. 9 der beigefügten Tafel.

Drosophilidae. *Gitona* (?) *pruinosa* (Gabès); Bigot, Dipt. rec. en Tunisie 1884, S. 10.

Oscinidae. *Lestophonus* (n. g. Oscinin.) *Iceryae* (Adelaide; aber auch in Kalifornien eingeführt; aus *Icerya Purchasi* und *Monophlebus Crawfordi* erhalten); S. W. Williston, *Insect life*, I, S. 21f. mit Holzschn.; vgl. S. 199f.

Chlorops glabra Meig. eine Krankheit der Kletterpflanzen verursachend?; J. Kühn, Mitth. ü. Landwirtschaft, Gartenbau und Hauswirtschaft, Separat-Beibl. des Berlin. Tagebl., 9. Jahrg., S. 265.

Ueber die Beziehungen der „*Musca pumilionis*“ Bjerk. zu *Chlorops*-Arten und ihre Synonymie s. S. Lampa. Entom. Tidskrift, 1888, S. 5, 34, 39.

Lampa bemerkt, dass *Oscin. pumilionis* Fall. und Zett. eine andere Art als *M. pum.* Bjerk. u. F. ist, dass sie dagegen wahrscheinlich identisch mit *Chl. lineata* F. und *taeniopus* Meig. sei.

Derselbe legte der Ent. Fören. bei ihrer Zusammenkunft in Stockholm die Eier von *Chl. taeniopus* und einer zweiten nahe verwandten Art vor. Die beiden Eier zeigen eine sehr grosse Verschiedenheit. Ein ♀ von *Chl. taeniopus* legte nach wiederholten Begattungen nicht weniger als 80 Eier; ebenda S. 123, 125f.

Ueber einen in unseren diesjährigen Hafersaaten verheerend aufgetretenen Schädling (*Oscinis pusilla* Meig.) s. H. Wilhelm, Mitth. d. Mährisch-Schles. Gesellsch. f. Ackerbau etc., 1888, S. 289–293.

Agromyzidae. *Milichia* (?) *Tamaricis* (Gabès); Bigot, Dipt. rec. en Tunisie 1884, S. 10.

Aphaniptera.

B. Grassi: La Pulce del cane (*Pulex serraticeps* Gervais) é l'ordinario ospite intermedio della *Taenia cucumerina*; Bull. Soc. Ent. Ital., 1888, S. 66. (Bisher galt *Trichodectes canis* als Wirth der Finne dieses Bandwurms; Refer.)

Dasselbe Insekt beherbergt eine Entwicklungsform der Spiroptera (*Filaria sanguinolenta*; derselbe, Ciclo evolutiva della Spiroptera (*Filaria sanguinolenta*; Catania, 14. April 1888.

Lepidoptera.

Ein dritter Aufsatz von E. Haase über Duftapparate indomalischer Schmetterlinge im Corbl. Entom. Vereins „Iris“, No. 5, S. 281–336 erhält Nachträge zu den früheren Mittheilungen und eine Uebersicht über diese Organe. Man hat bei den Schmetterlingen dreierlei Arten von Gerüchen zu unterscheiden: einige, wie *Danaïs* und *Euploea*, haben in beiden Geschlechtern einen stechenden, starken Geruch, der in der Blutflüssigkeit seinen Sitz hat und diese Thiere den Vögeln und anderen Feinden ungeniessbar macht — Widrigkeitsduft. Der Flug dieser Schmetterlinge ist ein langsamer, schwankender. — Dem unbefruchteten Weibchen entströmt ein Lockduft, der das Männchen anzieht. Dies ist namentlich bei den Bombyciden der Fall, bei denen nur die Männchen fluggewandt und mit hochausgebildeten Geruchsorganen ausgerüstet sind; besondere Einrichtungen der Weibchen, die mit diesem Lockduft in Verbindung stehen, haben sich bis jetzt nicht nachweisen lassen; vgl. indessen unten (Ovipositor?). — Dem Männchen allein sind Einrichtungen eigenthümlich, die auf das Ausströmen eines Reizduftes hinzielen, der dem werbenden Männchen das Weibchen willig machen soll. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass sich solche Duftapparate nur bei solchen Gattungen finden, bei denen beide Geschlechter gleich gut und zu derselben Tageszeit fliegen; sie fehlen denjenigen Spinnern, deren Weibchen plump und träge sind, und sind unter den Spinnern bis jetzt überhaupt nur bei einigen Hepialiden und Lithosiaden bekannt geworden. In ihrer speziellen Einrichtung und dem Ort ihres Vorkommens herrscht, bei aller Uebereinstimmung, in gewissen Grundzügen, eine grosse Verschiedenheit, und es lassen sich ähnliche Dufteinrichtungen nicht als ein Zeichen enger Verwandtschaft, sondern nur als gleich gerichtete Anpassungserscheinungen ansehen, was ganz besonders bei den Danaiden nachgewiesen wird und die von Moore und Butler wesentlich auf Dufteinrichtungen begründeten zahlreichen Gattungen als unnatürliche erscheinen lässt.

Die Zusammenstellung der Dufteinrichtungen geht von dem ein-

fachsten Falle, wo die Duftschuppen zerstreut zwischen anderen Schuppen stehen (Pieriden, einige Nymphaliden und Lycaeniden) aus, um dann zu höher und höher ausgebildeten Apparaten vorzuschreiten. Wenn ich diese auch nur annähernd im Einzelnen darlegen wollte, so würde ich einen grösseren Raum in Anspruch nehmen müssen, als mir naturgemäss zur Verfügung steht; ich verweise daher auf das Original selbst, das eine ungeheure Summe von Arbeit und eine reiche Fülle von Beobachtungen enthält.

Derselbe fasst die allgemeinen Resultate obiger Untersuchungen zusammen: Dufteinrichtungen indischer Schmetterlinge; Zool. Anzeig. 1888, S. 475—481.

E. Reuter macht eine vorläufige Mittheilung über den „Basalfleck“ auf den Palpen der Schmetterlinge; Zool. Anzeig., 1888, S. 500—503. Indem Reuter zunächst nur den Landois von 1867 kennt und nicht auch den von 1874, stellte er sich die Aufgabe, den „von Landois (1867) entdeckten“ und von O. M. Reuter bei anderen Schmetterlingen aufgefundenen „Stridulationsapparat“ der Palpen an allen ihm zugänglichen Arten zu studieren. Es findet sich nun an der Basis der Palpen, an der dem Rüssel zugewandten Seite, bei allen untersuchten Arten ein „nackter“ Fleck, „Basalfleck“, der gewöhnlich mit den von Landois entdeckten Rillen besetzt ist; bei zwei Familien fehlen diese Rillen indess gänzlich. Ausser den Rillen finden sich nun an dem Basalfleck kegelförmige, mit einer Nervenfaser in Verbindung stehende Chitingebilde vor, die mit den Geruchskegeln an den Fühlern die grösste Aehnlichkeit haben, sowie Poren oder Gruben, die ebenfalls den von anderen Forschern von den Fühlern beschriebenen Gebilden völlig gleich sind. Es können Kegel und Gruben nebeneinander vorkommen; bei den Kleinschmetterlingen scheinen aber die ersteren von den letzteren vollständig vertreten zu werden.

T. F. Smith beschreibt den feineren Bau der Schuppen verschiedener Schmetterlinge (*Amathusia*; *Morpho Menelaus*; *Papilio Memnon*; *Zygaena trigonilla*); Journ. Quekett Microsc. Club, III, S. 178—181.

Ueber die Bedeutung des Flügelgeäders für die Systematik der Schmetterlinge s. Snellen, Tijdschr. v. Entom., XXXI, Versl., S. XCIII f.

Ein Aufsatz von Poppius in Berl. Entom. Zeitschr., 1888, S. 17—28, Taf. I, „über das Flügelgeäder der finnischen Dendrometriden theilt die Dendrometriden in die drei Gruppen der Odontoperiden, Boarmiden und Acidaliden. Die Odontoperiden lassen Rippe 10 und 11 von der vorderen Mittelrippe (Radius) getrennt in den Vorderrand laufen, wie dies bei Odontopera, *Crocallis*, *Selenia* und *Pericallia* der Fall ist. Bei *Eugonia*, *Ploseria*, *Plagodis*, *Numeria*, *Venilia*, *Perconia*, *Aspilates* kommen Anastomosen, bald von Rippe 11 mit 12, bald von 10 mit dem Stamme 8—9 u. s. w. vor. Die Zurückführung des Geäders dieser Gattungen und der übrigen Odontoperiden (*Angerona*, *Epione*, *Hypoplectis*, *Diastictis*,

Hetrione, Cabera, Ellophia, Opisthograptis, Macaria, Abraxas) auf das ursprünglichere der zuerst genannten Gattungen wird von Poppius vorgenommen, kann aber hier nicht wiederholt werden. Bei den wenigen typischen Gattungen „wird die Farbe heller, die typischen Querstreifen der Geometriden erscheinen undeutlicher und mehr variabel und die Aehnlichkeit der Raupen mit Aestchen wird weniger offenbar.“

Die Boarmiden zählen die Gattungen Amphidasys, Biston und Hibernia, bei denen 10 und 11 aus kurzem gemeinschaftlichem Stamme entspringen, Gnophos, Boarmia, bei denen sie bald getrennt, bald vereint entspringen, Fidonia und Psodos mit nur einer Rippe, und Scoria.

Die Acidaliden sind dadurch ausgezeichnet, dass bei ihnen an den Hinterflügeln Rippe 5 vorhanden ist, die bei den vorhergehenden Gattungen nur ausnahmsweise vorkommt. Hierhin gehören Geometra, Parascotia (Boletobia), Odezia, Pellonia, Timandra, Zonosoma, Acidalia. Die Gattung Odezia vermittelt den Uebergang zu den Phytometriden, indem bei *O. atrata* Rippe 7 und 8 des Hinterflügels getrennt entspringen, bei *O. tibialis* dagegen eine Strecke lang verschmolzen sind.

Die Männchen von Argiva (Celebensis) besitzen auf den Hinterflügeln nur 5 Adern, zwischen denen die Flügel in starke, nach unten vortretende Falten zusammengelegt sind. Vor und hinter diesen Falten sind die Flügel bei solchen Thieren, die bereits geflogen haben, abgerieben. Die Vermuthung, dass man es hier mit einem einfachen Tonapparat zu thun hat, indem geringe, oben vortretende Concavitäten der Vorderflügel im Fluge über die grösseren Einsenkungen der Hinterflügel streichen, wurde durch eine Beobachtung Kühn's bestätigt. Derselbe nahm bei den Männchen der genannten Arten während des Fluges ein knatterndes Geräusch wahr, das verstummte, wenn eine Fledermaus an ihnen vorbei huschte, oder wenn er mit dem Fangnetz nach ihnen schlug. Aehnliche Einrichtungen finden sich auch bei *Anisoneura sphingoides* und, in geringerem Grade, bei *Potamophora Manlia*. Haase, Corrb. Entom. Ver. „Iris“, No. 5, S. 337f.

J. H. Emerton gibt Zeichnungen zu den Changes of the internal organs in the pupa of the milkweed butterfly nebst erläuterndem Text; Proceed. Boston Soc. Natural History, XXIII, Pl. III, S. 457—460.

Urech hat seine Bestimmungen der successiven Gewichtsabnahme der Winterpuppen von *Pieris Brassicae* fortgesetzt und stellt mechanisch-physiologische Betrachtungen darüber an; Zool. Anz. 1888, S. 205—212; vgl. d. vor. Ber. S. 102. Als Hauptresultate erhielt derselbe eine stetige Abnahme des Gewichtes, die gegen Ende des Puppenstandes eine beschleunigte ist. Mässig erhöhte Temperaturen und trockene Luft wirken verkürzend auf die Dauer des Puppenstadiums. (Frühere Beobachter hatten bei Beginn der

Puppenruhe eine stärkere Gewichtsabnahme gefunden, wovon bei Urech nichts zu lesen ist; Ref.)

Goossens glaubt bemerkt zu haben, dass das „méconium“, das die frisch der Puppe entschlüpften Schmetterlinge fahren lassen, für die Raupen tödtlich sei; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LXF.

Die Kennzeichen der männlichen und weiblichen Lepidopteren-Puppen von F. Rühl; Societ. Entomol., II, S. 185f.; III, S. 5.

Die Weibchen gewisser Schmetterlinge (*Harpyia vinula*; *Valeria oleagina*; *Polyommatus rutilus*) legen an dieselbe Stelle nur 2 Eier, aus denen sich je ein Männchen und ein Weibchen entwickelt; F. Rühl und H. Locke, Societ. Entom., II, S. 178; III, S. 12f., 21.

Aus Amerika werden wieder Fälle von Raupenzügen gemeldet, die einen Eisenbahnzug zum Stehen brachten; Insect life, I, S. 30.

Zur Beobachtung der weissen Nachtkerze (*Oenothera speciosa*) als Schmetterlingsfalle s. L. Glaser, Entom. Nachr., 1888, S. 53—55.

Un capítulo de Lepidopterología von C. Berg ist ein populärer Vortrag über Seidenraupenzucht und Gewinnung der Seide; An. Soc. Científ. Argent., XXVI, S. 91—103.

G. Carlet theilt seine Beobachtungen sur le mode de locomotion des chenilles mit; Compt. Rendus, CVII, S. 131—134.

W. Beutenmüller fährt in der Aufzählung von Food-plants of Lepidoptera fort; Entomol. Americana, IV, S. 75—77. (*Apatela americana* Harr.; *Emperetia stimulea* Clem.; *Halesidota tessellata* A. & S.; *Pyrophila pyramidoïdes* Guen.)

Aquatic lepidopterous larvae (Argama; *Paraponyx stratiotalis*; *Cataclysta pyropalis*; *Paraponyx oryzalis*); Americ. Naturalist, 1888, S. 468f.

Angeregt durch Peragallo's Mittheilung über die Ernährungsweise der *Erastria scitula* stellt Douglas aus der Litteratur die larvae of Lepidoptera feeding on Coccidae zusammen. Es sind dies noch *Thalpochara communimacula* Mill., *coccophaga* Meyr.; *Dacruma coccidivora* Comst., *pallida* Comst.; *Blastobasis coccivorella* Chamb.; *Euclemensia Bassettella* Clem.; Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 225 bis 228.

P. Chrétien schildert in unterhaltender Weise die Sackträger-raupen, die „autour d'un piquet“ zu finden sind; Le Naturaliste, 1888, S. 118—120 und beschreibt die in Ritzen lebende Raupe von *Oecophora lunaris*.

A. M. Fielde beschreibt das Larvengehäuse einer in China heimischen, nicht näher bezeichneten Motte. Dasselbe ist aus trockenen Pflanzenstengeln verfertigt, die in Spiralen von wachsender Weite zusammengefügt sind; Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1888, S. 176f.; vgl. unten bei Psychidae.

On Melanism in Lepidoptera äussert T. A. Chapman

die Vermuthung, dass der Melanismus eine Eigenthümlichkeit mehr des Westens als Nordens, mehr eines feuchten als kalten Klimas sei; Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 40.

C. R. Jordan macht die von ihm aufgefundenen Fälle von Melanism in Birmingham and South Devon bekannt; ebenda S. 102 f.

C. G. Barret bespricht Fälle von Climatic and local variation in our butterflies, ebenda S. 79—83.

F. Merrifield erstattet Report of progress in pedigree moth-breeding to Dec. 7th., 1887, . . . (Selenia illunaria und illustraria); Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 123—126, Pl. V.

Als Beitrag zur Biologie der Insekten betitelt sich ein Aufsatz von C. Fromholz in der Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 225—232 mit Taf. II über Missbildungen bei Schmetterlingen, besonders der Schmetterlingsflügel, indem er Verbildungen aufzählt, die sich bei der Verpuppung und bei dem Ausschlüpfen der Imago zeigten. Solche sind angeführt von Calymnia trapezina, Deilephila Euphorbiae (Puppe und Schmetterling), Sphinx Ligustri (2 Puppen), Lasiocampa Pini (Puppe und Schmetterling), Porthesia auriflua, Vanessa polychloros, Lycaena semiargus und Spilosoma fuliginosa.

Lepidopterologisches von M. Standfuss; Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 233—246, Taf. III.

Th. Goossens schildert Les pattes des chenilles durch das ganze System, die der Microlepidoptera freilich sehr kurz; Ann. Soc. Entom. France 1887, S. 385—404, Pl. 7.

Ueber Varietäten-Zucht berichtet C. Ed. Venus; Corrb. Entom. Ver. „Iris“, No. 5, S. 209 f. Er setzte Raupen von Vanessa Urticae anhaltend dem hellen Sonnenschein und in Folge dessen grösserer Wärme aus; ein Theil der Raupen ging zu Grunde; die anderen lieferten die goldglänzenden Puppen, die sonst seltener sind. Aus ihnen schlüpften Falter, die fast alle unter der gewöhnlichen Grösse waren, jedoch von der lebhaften rothen Färbung der var. Ichnusa. Die Abbildungen, Fig. 14 und 15 auf Taf. XII, zeigen überdies in dem einen Exemplar auffallend schmale Flügel.

G. C. Griffiths stellte an experiments upon the colour-relation between the pupae of Pieris rapae and their immediata surroundings, welche von W. White beschrieben und zu allgemeinen Betrachtungen verwendet werden; Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 247—267. Der Inhalt dieser Mittheilung besteht aus 1. Einleitung; 2. Versuchsmethoden; 3. Natur der angewendeten Farben; 4. Poulton's Farbenskala in den Puppen von P. rapae; 5. Versuche mit verschiedenen Farben (schwarz, weiss, rosa, gelb, grün, blau); 6. verschiedene andere Versuche; 7. Schlussfolgerungen. White gelangt zu folgenden Resultaten: Eine dunkle Umgebung verlangsamt die Entwicklung vor der Verpuppung. In dem Umstand, dass Farben im 3. Stadium keinen Einfluss mehr

ausüben, liegt eine starke Stütze für Poulton's Behauptung, dass die frische Puppe nicht in photographischer Weise gegen die Farbe der Umgebung empfindlich und dass das 2. Stadium das empfänglichste ist. Auch die durch die Farben selbst erhaltenen Resultate bestätigen Poulton's Versuche: schwarze Umgebung erzeugt dunkle Puppen, gelbe grüne; blasser Farben (rosa und hellblau) wirken ähnlich wie ein schmutziges Weiss, indem sie Puppen von keiner ausgesprochenen, aber im allgemeinen hellen Farbe liefern. Die Wirkung der gelben Umgebung in Rücksicht auf die Unterdrückung dunkler Pigmente in der Haut der Puppe und Hervorbringung grüner Puppen war besonders deutlich zu sehen und macht es wahrscheinlich, dass bei der Entstehung grüner Puppen in der Natur diese Strahlen des Spektrums in dem von den Blättern reflektierten Licht vorherrschen.

Ein Aufsatz von E. B. Poulton über bemerkenswerthe Schmetterlingsraupen, in den Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 515—606 mit 3 Tafeln, ist mir noch nicht zugänglich gewesen. Derselbe behandelt die ersten Entwicklungsstände von *Sphinx Convolvuli* und *Agria tau*, und findet bei letzterer Art manche Züge, die an die Sphingiden erinnern, so dass die Ansicht ausgesprochen wird, die Sphingiden stammten von den Saturniaden ab. Ferner wird die Schreckstellung der Raupe von *Stauropus Fagi* behandelt; die schwarzen Eier des *Paniscus cephalotes* auf den Raupen der *Cerura vinula* sollen ein Zeichen sein, dass die Raupe schon mit Parasiten besetzt ist. Es kommen noch die Cochliopoden, Larven der *Geometra papilionaria*, *Croesus varus*, *Euclidia mi*, Puppe von *Apatura Iris* und die Bürsten („tussock“) gewisser Raupen zur Sprache.

Rogenhofer machte Mittheilung über die bisher bekannt gewordenen Fälle von Bastardirungen bei Schmetterlingen. Im Freien wurden Bastarde zwischen *Deilephila vespertilio* und *Euphorbiae*; *Saturnia hybrida minor*; *Parnassius Delius* und *Apollo* beobachtet; eine Begattung zwischen verschiedenen Arten, meist derselben Gattung, wurde öfter beobachtet; namentlich häufig bei *Zygaena*; dieselben verliefen aber meistens resultatlos. Sitzgsb. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, S. 73f.

P. Preiss beginnt die Herausgabe von Abbildungen ansehnlicher Vertreter der Exotischen Nachtschmetterlinge mit erläuterndem Text; Koblenz, Königsbach, Selbstverlag des Herausgebers.

E. G. Honrath beschreibt Neue Rhopolocera; Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 247—252, Taf. V und macht Bemerkungen über wenig bekannte Tagfalter; ebenda S. 253f.

Constant liefert Descriptions de (9) Lépidoptères nouveaux ou peu connus; Ann. Soc. Entom. de France, 1888, S. 161 bis 172, Pl. 4.

L. de Joannis und E. L. Ragonot gleichfalls Descriptions de genres nouveaux et espèces nouvelles de Lépidoptères; ebenda S. 271—284, Pl. 6.

Die Notes lépidoptérologiques, 1re partie, von C. Jourdeuille beziehen sich auf *Cochylis aeneana* Hübn.; *Penthina pyrolana* Wocke; *Psecadia chrysopyga* Z.; *Cladodes gerronella* Z.; *Coleophora Inulae* Wocke; *Lioptilus pectodactylus* Stgr.; Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 63—68.

H. Herms theilt Lepidopterologische Beobachtungen aus seinem Tagebuche mit, die sich auf die Raupen und Futterpflanzen von *Atemilia torquatella*; *Gelechia rhombelliformis*; *Douglasia ocnrostomella*; *Cosmopteryx Scribaella* und *Lienigella*; *Elachista pullella* (?) beziehen; die Raupen letzterer Art fand er in *Koeleria cristata*; Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 81—83.

Ueber die geographische Verbreitung der Schmetterlinge (nach Marshall's Atlas) s. Rogenhofer, Sitzgsber. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, S. 63.

W. Petersen. Die Lepidopterenfauna d. arktischen Gebietes von Europa u. d. Eiszeit; Petersburg 1887, gr. 8, 41 Ss. — Habe ich nicht gesehen.

Rogenhofer stellt im Anschluss an Petersen's „Die Lepidopterenfauna des arktischen Gebietes von Europa und die Eiszeit“ Vergleiche zwischen der arktischen und alpinen Schmetterlingsfauna an. Den 13 Diurna, 2 Sphingiden, 11 Bombyciden, 16 Noctuen, 10 Geometren des Nordens stehen 29 Diurna, 2 Sphingiden, 12 Bombyciden, 32 Noctuen, 37 Geometren der Alpen gegenüber; Sitzgsber. Zool. Bot. Gesellsch. Wien, 1888, S. 83f.

Descriptions of new species of Lepidoptera, chiefly from Central-America; by H. Druce, Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 234 bis 242.

J. B. Smith setzt an introduction to a classification of North American Lepidoptera fort; Entomolog. Americana, IV, S. 9—13, 27f.

F. Platt: A List of the Butterflies of Meriden, Conn.; Trans. Meriden Scientific Association, Vol. III, S. 42—45.

H. Edwards beschreibt die early stages of some North American moths (*Sphinx Elsa* Strecker; *Saturnia gallina* Clemens; *Coloradia Pandora* Blake; *Clisiocampa fragilis* Stretch; *Sphingicampa 4-lineata* G. & R.; *Citheronia mexicana* G. & R.; *Hyperchiria Pamina* Neum.); Entom. Americana, IV, S. 61f.

List of the (69) Butterflies coll. at Chapel Hill, N. C.; A. Braswell; Journ. Elisha Mitchell scient. societ. V, S. 19—21.

H. Edwards stellt einen Catalogue of species of the higher families of the North American Heterocera, described since Grote's „new check list“ (1872) with those omitted from that publication zusammen; Entomol. Americana, III, S. 221—232.

Derselbe beschreibt new genera and species of North American Moths; ebenda, III, S. 181—185.

The Butterflies of the eastern United states and Canada, with special reference to New England; by S. H. Scudder; Cambridge, publ. by the author. — Dieses Werk ist mir nur aus der überaus empfehlenden Besprechung durch Elwes, The Nature, 39 No. 1000, S. 193f. bekannt geworden. Es soll in 12 monatlichen Lieferungen gr. 4^o erscheinen und im Ganzen 96 colorierte Tafeln und über 1700 Seiten Text enthalten. Von den Tafeln sind 17 den Imagines, 6 den Eiern, 11 den Raupen, 2 deren Nestern, 3 den Puppen, 2 den Parasiten, 33 dem inneren und äusseren Bau, 19 der geographischen Verbreitung bestimmt; 3 enthalten die Porträts älterer amerikanischer Naturforscher. — Der Subscriptionspreis für das ganze Werk beträgt 50 Doll., der spätere Preis ist 75 Doll.

A. Spannert erklärt die wissenschaftlichen Benennungen sämtlicher europäischer Grossschmetterlinge etymologisch; Berlin, C. Duncker; 8^o, S. 1—240.

S. Webb führt Varieties of *Rhopalocera* near Dover auf; Entomologist, XXI, S. 132—135. — Eine Stelle bei Dover zeichnet sich durch den grossen Reichthum an Varietäten aus, namentlich 1887. Solche Varietäten werden erwähnt von *Euchloë Cardamines* (Orange der Vorderfl. des Männchens in Hellgelb verwandelt); *Argynnis Aglaia*; *Vanessa Urticae*; *Melanargia Galathea* (Flügelschnitt wie bei *Gonept. Rhamni*; Hinterfl. ganz schwarz); *Epinephele Janira*; *Coenonympha Pamphilus*; *Polyommatus Phlaeas* und andere *Lycaenen*. Von *L. Icarus* wurde ein Zwitter beobachtet.

R. Martin: Les Lépidoptères du département de l'Indre; Revue d'entomol., 1888, S. 36—56.

Eupithecia isogrammaria; *Nephoptyx obductella*; *Acrolepia granitella* neu für die Niederländische Fauna; Snellen, Tijdschr. v. Entom. XXXI, Versl., S. XXVI.

J. T. Oudemans verzeichnet De Nederlandsche Macrolepidoptera in der Sammlung der Zool. Genotschap Natura Artis magistra; Bijdr. tot de Dierkunde, Fest-Nummer, VI, S. 1—13. — Als für die Fauna neu ist *Orthosia nitida* erwähnt.

Ein 4. Nachtrag z. Verz. der bei Hannover ... vorkommenden Schmetterlinge fügt 52 Arten hinzu; C. T. Glitz, 34. bis 37. Jahresber. d. Naturhist. Gesellsch. Hannover, S. 69—74.

A. Hoffmann schildert die Lepidopteren-Fauna der Moorgebiete des Oberharzes; Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 133—199.

A. Speyer macht Lepidopterologische Mittheilungen; ebenda, S. 200—213.

O. Leege zählt die Macrolepidopteren der Insel Juist auf und macht dazu allgemeine Bemerkungen; auf Juist sind 111 Arten gefunden, darunter 44 für die ostfriesischen Inseln neue; im Ganzen sind von letzteren jetzt 144 Arten bekannt. Abhandl. naturw. Verein Bremen, X, S. 556—565.

Fuchs hatte auf der 60. Vers. Deutscher Naturf. etc. 1887 in

Wiesbaden eine Charakteristik der Lepidopterenfauna des unteren Rheingaus gegeben, die in den Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 65—84 abgedruckt ist.

G. Höfner bereichert die Schmetterlinge des Lavanthales und der beiden Alpen „Kor- und Saualpe“ in einem 6. Nachtrage um 61 Arten; Jahrb. d. naturhist. Landes-Museums in Kärnthen, 19. Heft, S. 113—120.

H. Calberla fährt in seiner Schilderung der Macrolepidopterenfauna der römischen Campagna und der angrenzenden Provinzen Mittel-Italiens fort; Corrb. Entom. Ver. „Iris“, No. 5, S. 220—272 Taf. XII.

Minà-Palumbo & Failla-Tedaldi liefern weitere Materiali per la fauna lepidotterologica della Sicilia, Il Natur. Siciliano, VII, S. 81—97, 133—139, 153—156, 201—205, 225—233, 269—272; VIII, S. 1—10, 29—36, 57—62.

Zur Ergänzung dieser Berichte schickt O. Struve einen Brief ein mit Angabe einiger interessanten Funde, ebenda VII, S. 183, wozu Kalchberg die Berichtigung macht, dass *Acidalia mutilata* Stgr. nicht in Andalusien, sondern von ihm in Sizilien entdeckt sei; derselbe gibt ein Verzeichniss der von ihm in Sizilien gefundenen *Acidalia*-Arten; ebenda, S. 267 f.; vgl. Failla-Tedaldi ebenda, S. 206.

A. Riesen setzt seine Lepidopterologischen Mittheilungen aus Ostpreussen fort; Stett. Entom. Zeitg., 1888, S. 233—239.

C. A. Teich zählt in seinem Beitrag zur baltischen Lepidopteren-Fauna als neu auf: *Leucania albipuncta*; *Eucosmia certata*; *Teras Shepherdana*; *Retinia sylvestrana*; *Penthina dissolutana*, *Carpentierana*, *achatana*; *Grapholitha aemulana*; *Steganoptycha simplana*; *Depressaria Artemisiae*; *Bryotropha obscurella*, *basaltinella*; *Lita tussilaginella*, *tricolorella*; *Teleia vulgella*, *Coleophora idaeella*, *auricella*, *partitella*; *Chauliodus strictellus*; *Asychna aeratella*; *Elachista stagnalis*, *montanella*, *cinctella*; *Lithocolletis faginella*, *quinquegatella*; Korresp. Naturf. Ver. Riga, XXXI, S. 23—25.

11 Lepidoptera von Hillesoe; Sparre-Schneider, Tromsø Museums Aarsberetning for 1887, S. 31—34.

In einem Bidrag til kannedomen om svenska fjärilars geografiska utbredning führt J. Meves bemerkenswerthe Arten an, die er auf der Insel Svartsjölandet (Mälar) und zu Roserberg (Upland) beobachtet hat. Entom. Tidskr., 1888, S. 17 f.

Ebenda, S. 96, gibt J. H. Wermelin Några svenska fjärilars fyndorter an.

Yderligere tillæg til Norges Lepidopterfauna af W. M. Schoeyen; Forhandl., Vidensk.-Selsk. Christiania, 1887, No. 3 (S. 3 bis 32). — Während Siebke's Enum. Insect. Norveg. 1876 934 Schmetterlinge (529 Macro-, 405 Microlepid.) namhaft machte, ist ihre Zahl inzwischen

auf 1260 (630 Macro- und ebensoviele Microlep.) gestiegen. Ueber 129 Arten macht der Verfasser kurze Bemerkungen.

N. Erschoff beschreibt *Lepidoptera nova aut minus cognita*; Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 199—201, Taf. XI, Fig. 1, 2, 3.

Novae species et varietates Rhopalocerorum e Pamir auctore Gr. Grumm-Grshimailo; ebenda S. 303—307.

H. Christoph gibt Diagnosen zu einigen neuen Lepidopteren des paläarktischen Faunengebietes; ebenda S. 308 bis 314.

O. Staudinger beschreibt neue Noctuiden des Amurgebiets; ebenda S. 245—283.

L. Graeser bringt Beiträge zur Kenntniss der Lepidopteren-Fauna des Amurlandes, in denen er die während eines nahezu fünfjährigen Aufenthaltes an verschiedenen Orten des Amurlandes erbeuteten Arten aufzählt. Dem Verzeichniss ist eine Reisebeschreibung mit Schilderung der Flora und sonstigen Beschaffenheit der Fangplätze vorausgeschickt. Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 33 bis 153, 309—414.

O. Staudinger fährt fort Centralasiatische Lepidopteren zu beschreiben; Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 1—65 (Noctuina).

S. Alpheraki beschreibt ebenda S. 66—69 (12) neue Lepidopteren (ebenfalls aus Centralasien).

F. Moore hat Part III seiner *Description of new Indian lepidopterous insects from the collection of the late Mr. W. S. Atkinson (Heterocera)* erscheinen lassen; Calcutta, publ. by the Asiatic Society of Bengal, 1888; s. Nature, Vol. 38, S. 267.

H. J. Elwes stellt zusammen a catalogue of the *Lepidoptera (Rhopalocera)* of Sikkim, with additions, corrections, and notes on seasonal and local distribution; Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 269 ff., Pl. VIII—XI. Ein Vergleich der aus Malakka und dem nordwestl. Himalaya-Gebiet bekannt gewordenen Arten (490, 333) mit denen von Sikkim zeigt, dass letzteres Gebiet, obwohl beträchtlich kleiner, doch sehr reich ist (530 A.), und dennoch ist die Zahl der bekannten Arten von der der wirklich vorkommenden gewiss noch weit entfernt. — Mehrere Arten sind in prächtigen farbigen Abbildungen wiedergegeben.

W. Warren: On *Lepidoptera coll. . . in Western India*; Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 292—339. (206 A.).

F. Moore bringt *Descriptions of new genera and species of Lepidoptera Heterocera coll. . . in the Kangra district, N. W. Himalaya*; ebenda, S. 390—412.

A. G. Butler gibt an account of three series of *Lepidoptera collected in Northwest India . . .*; Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 132—151, 196—209.

J. O. Westwood stellt eine List of diurnal *Lepidoptera*

coll. in Northern Celebes . . . auf; Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 467—475, Pl. XII.

Pagenstecher stellt als V. seiner Beiträge zur Lepidopteren-fauna des malayischen Archipels ein Verzeichniss der Schmetterlinge von Amboina zusammen; Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 85—217. (712 Ar.).

O. Staudinger beginnt eine Schilderung der Lepidopteren von der Insel Palawan. Diese lang gestreckte Insel, zwischen Borneo und den Philippinen, hat ihrer Lage entsprechend eine Schmetterlings-fauna, die ein Gemisch von Sunda-Arten und Philippinischen ist neben einigen endemischen. Die Sunda-Arten, namentlich Borneaner, scheinen aber zu überwiegen. Corrb. Entom. Ver. „Iris,“ No. 5, S. 273—280.

H. Druce stellt zusammen eine list of Lepidoptera Heterocera collected . . . at Suva, Viti Levu, Fiji Isl., with the descriptions of some new species; Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 219—231, Pl. XIII.

New Species of Butterflies . . . in the Solomon Islands; by F. D. Godman & O. Salvin; Ann. a. Mag. N. H. (6) I. S. 90—101, 209—214.

A. S. Olliff gibt Short life-histories of nine Australian Lepidoptera, nämlich *Papilio Sarpedon* L. var. *Choredon* Feld. Fig. 1, *Macleanus* Leach Fig. 2, *Erechtheus* Don.; *Acraea Andromache* F.; *Apaustus agraulia* Hew. Fig. 3; *Hypsa nesophora* Meyr. Fig. 4; *Philobota bimaculana* Don. Fig. 6; *Gonionota pyrobola* Meyr. Fig. 7; *Enaemia caminaea* Meyr. Fig. 5. Die Arten finden sich alle in Double Bay, Port Jackson; Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 357—361, Pl. XX.

G. F. Mathew schildert life-histories of Rhopalocera from the Australian region; Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 137 bis 188, Pl. VI. (*Melanitis Leda* L.; *Epinephele abeona* Don. Fig. 8; *Acraea Andromacha* F. Fig. 14; *Pyrameis Itea* F. Fig. 10; *Junonia vellida* F. Fig. 11; *Doleschallia Herrichii* Butl. Fig. 13; *Hypolimnas bolina* L.; *Lycaena Heathi* Cox; *Jalmenus Euagoras* Don.; *Elodina angulipennis* Luc.; *Pieris latilimbata* Butl. Fig. 4, *teutonia* F. Fig. 6; *Callidryas Gorgophone* F. Fig. 7; *Eurycus Cressida* F. Fig. 12; *Ornithoptera pronomus* Gray, *Urvilliana Guér.* Fig. 1; *Papilio Erithonius Cram.*, *indicatus* Butl. Fig. 3, *Erechtheus* Don., *Anactus Macl.* Fig. 2, *Lycaon Westw.*; *Pamphila Phineus* Cram., *angustula* H.-S.; *Netrocoryne repanda* Feld. Fig. 5; *Trapezites symmorus* Hübn.; *Hesperilla picta* Leach Fig. 9, *ornata* Leach).

Von R. Trimen's „South-African Butterflies“: a monograph of the extratropical species (Trübner & Co.); sind Vol. I und II erschienen. I enthält nach einer Einleitung die Nymphaliden, 7 Tafeln und eine Karte von Südafrika; II behandelt die Eryciniden und Lycaeniden, 3 Tafeln. Der III. Bd. soll die Papilioniden und Hesperiden enthalten, deren Zahl Trimen auf 142 schätzt. Im

Ganzen werden etwa 380 Arten bekannt sein. (Nach dem Referat in Ann. a. Mag. N. H. (6) I, S. 228)

A. G. Butler schreibt on the Lepidoptera received from Dr. Emin Pascha (Inner-Ostafrika); Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 56—85 (156 A.).

Derselbe liefert Descriptions of some new Lepidoptera from Kilima-njaro; ebenda, S. 91—98.

G. T. Baker schickt Descriptions of some new species of Micro-Lepidoptera from Algeria ein; Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 254—257.

E. G. Honrath beschreibt einige Varietäten, Abnormitäten, Monstrositäten und Hermaphroditen von Lepidopteren; Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 495—500, Taf. VII, Fig. 2—10 (*Argynnis Aglaja*; *Vanessa Cardui* ab. var. *Elymi*; *Parnassius Apollo*; *Arctia Hebe* var. *sartha* *Stgr.*; *A. Hebe* 2 weitere Farbenabnormitäten; *A. villica* Farbenabnormität; *Lycaena Icarus* mit 5 Flügeln; *B. Quercus* mit 5 Flügeln; *Charaxes affinis* Zwitter; *Papilio Lycophron* Zwitter).

H. G. Dyar schildert das Ei und 4 Stadien der auf *Viburnum aenifolium* und *lentago* lebenden Raupe von *Dryopteryx rosea* *Wlk.*; Entomol. Americana, IV, S. 179.

Oligochroa pellucidella (Porto Rico); Ragonot, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXL.

Microlepidoptera.

Pterophorina. Die Raupe von *Agdistis adactyla* auf *Artemisia campestris*; E. Hering, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 39f.

Notes on the life-history of the second brood of *Platyptilia gonodactyla* und on the variation in the early stages of *Platyptilia gonodactyla* (*trigonodactylus*) von J. W. Tutt s. Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 104f., 105—107.

Pl. rhynchophora (= *repletalis* *Bull.* nec *Walk.*) S. 239, *brachymorpha* S. 240 (Hawaii); E. Meyrick, Trans. Entom. Soc. London, 1888.

Micropterygina. *Micropteryx Berytella de Joannis* abgebildet Ann. Soc. Entom. France, 1888, Pl. 6 Fig. 5.

M. salopiella *Stn.* ist von *unimaculella* ♀ verschieden, lokal in England, aber verbreitet; Barrett, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 213.

Tineina. Steps towards a revision of Chambers's index, with notes and descriptions of new species, by Lord Walsingham; Insect life, I, S. 81—84, 113—117, 145—150.

W. Beutenmüller: On North American Tineidae; Entomol. Americana, IV, S. 29f.

Arotrura (n. g. *Butalidi* simile, venatione et organis genitalibus diversum) *eburnea* (Arizona); Walsingham, Insect life, I, S. 117 mit Holzschn. des Flügelgäders und Uncus des Männchens.

Acrolophus mexicanellus (Mexiko); W. Beutenmüller, Entomol. Americana, IV, S. 29.

Die Räumchen einiger *Adela* (und *Nemophora*) sind zu keiner Zeit ihres Lebens Minierer; die Weibchen legen die Eier in die Stengel der Pflanzen

(N. Panzerella und Adela viridella in die von Urtica); die ausschlüpfenden Räumchen bohren sich aus den Zweigen heraus und verfertigen sich draussen einen Sack; Chrétien, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LXXXIV f.

A. *Hedemanni* (O. Amur), *basiradiella* (mittl. Amur); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 312, *latifasciella* (Thundani, Indien); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 338.

Bucculatrix Turatii (Modena); Standfuss, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 244.

La *Bucculatrix Turatii* Standf. parassita della Marruca (*Paliurus aculeatus*); G. Camus, Rendic. Soc. Natur. Modena (S. III) Vol. III, S. 112—114.

Larvae of *Butalis siccella* and *variella*; E. R. Bankes, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 246—248.

B. *laminella* H.-Sch. in Sussex, new to Britain; Fletcher, ebenda, XXV, S. 15, mit Beschreibung der Raupe durch Bankes, S. 16.

Hofmann findet die Gestalt der After- und Genitalklappen der Männchen für recht geeignet zur Artunterscheidung, und bildet diese Theile von 8 der kleinen einfarbigen Arten ab; Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 335—347 Taf. I.

Butalis suffusa (Mt. Shasta), *perspicillella* (Kalif.) S. 114, *ochristriata* (Sheep rock; Mendocino Cty., Calif.) S. 115, *albilineata* (Arizona) S. 116; Walsingham, Insect life, I.

Walsingham fand, dass von den Wallengren'schen von *Cerostoma* abgezweigten Gattungen *Credemnon*, *Periclymenobius* und *Trachoma* letztere durch die aufgerichteten Schuppen der Vorderflügel und *Periclymenobius* durch die sichelförmige Spitze der Vorderflügel berechtigt erscheinen; dass Nebenaugen bei allen genannten Gattungen (auch bei *Theristis*) vorkommen, und dass der Verlauf der Apikal- und Subapikalader kein konstanter ist, so dass die Gattung *Credemnon* vorläufig eingehen muss. Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 153—156.

Cleodora modesta (Los Angeles), *canicostella* (Mt. Shasta) S. 82, *tophella* (Mendocino Cty.), *sabulella* (Colusa Cty., Calif.) S. 83; Walsingham, Insect life, I, *Constantina* (Lambessa); Baker, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 256.

Coleophora melilotella Scott = *Frischella* L. (*Trifolii* Curt.); E. R. Bankes, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 1—5.

P. Chrétien bildet den Sack von *C. vibicilla* und *craccella* (= *Lugdunella*) ab; Le Naturaliste, 1888, S. 262 f.

Coleophora Potentillae Boyd i. l. (Raupe auf Rosifloren); Stainton, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 231, *Pechi*, *dubiella* (Raupe auf *Artemisia* sp.); Baker, ebenda, S. 256.

Cryptolechia concolorella (Nevada); W. Beutenmüller, Entomol. Americana, IV, S. 30.

Dactylota Snellenella (Arizona); Walsingham, Insect life, I, S. 84.

Riley schildert die Lebensgeschichte der *Depressaria heracliana* De G.; Insect life, I, S. 94—98 mit Holzschn.

Zur Bekämpfung der *D. nervosa* s. Kühn, Mitth. üb. Landwirthsch., Gartenbau und Hauswirthsch., Separat-Beibl. des Berl. Tagebl., 10. Jahrg., No. 37, S. 217.

D. aspersella (Meeralpen; Raupe auf *Cytisus triflorus*); Constant, Ann. Soc. Entom. de France, 1888, S. 170, Pl. 4 Fig. 9, *imbutella* (Borshom); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 313.

Ergatis mirabilis (Sarepta); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 314.

Euplocamus violaceus (Schahrud); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 312.

Gelechia rhombelliformis in Schlesien und bei Stettin (an Schwarzpappel); Wocke, Zeitschr. f. Entomologie, Breslau, (N. F.) 18, Sitzgsber. S. XIX.

Warren gibt eine Berichtigung in Betreff der Raupe von *G. peliella*; Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 161.

G. algeriella (Lambessa); Baker, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 255.

Gracilaria eximiella (Lenkoran); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 314, *sanguinella* (Sa. Clara Co., Kalif.), *nigristrigella* (Alameda Co., Kalif.), *ruptistrigella* (Kalif.), *shastella* (ibid.); W. Beutenmüller, Entomol. Americana, IV, S. 30.

Holoscopia forficella Hb. ist eine Mordraupe, die ihre eigenen Artgenossen auffrisst; B. Funke, Societ. Entomol., II, S. 179.

Hyponomeuta millepunctatellus (Kala Pani); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 338.

Idophasia concinnella (Borshom); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XII, S. 313.

Incurvaria punctiferella (Oregon) S. 145, *poliella* (ibid.), *humilis* (Kalif.) S. 146, *aenescens* (Oregon) S. 147; Walsingham, Insect life, I.

Lita pseudolella (Sarepta); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 313.

Die Fühlerscheiden der Puppen von *Nemotois fasciellus* sind vom Körper abgelöst; Stainton, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 231.

N. Constantinella (Lambessa); Baker, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 255.

Nepticula serella (aus *Potentilla tormentilla*); Stainton, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 260, *fulgens* (aus Buche); derselbe, ebenda XXV, S. 12.

Oecophora lunaris-Raupe (in Spalten von Zaunpfählen) beschrieben; P. Chrétien, Le Naturaliste 1888, S. 119.

Oecophora thoracella (Kolorado) S. 147, *disimidiella* (Sonoma Cty., Kalif.), *coloradella* (K.) S. 148; Walsingham, Insect life, I, *trigutta* (Borshom), *coeruleopicta* (Suchum-Kalé); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 314.

Oenophila V-flavum ist keine Lithocolletide, sondern echte Tineide; Heylaerts, Bull. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. VIII f.; über ihr Vorkommen in Flaschenkorken s. ebenda S. XI, XIV, XXXVI; Mc Lachlan fand sie auch an Eichenrinde; ebenda S. L.

Die Rüpchen von *Opostega salaciella* Tr. leben wahrscheinlich in den Blütenständen von *Rumex acetosella*; W. Warren, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 145 f., der ebenso aus der Litteratur die Futterpflanzen der anderen Arten angibt.

Ornix prunivorella Chamb. = (*Lithocolletis*) *geminatella* Pack.; C. M. Weed, Americ. Naturalist, 1888, S. 364 f.

Parasia obsoleta (Schahkuh); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 313.

Pleurota Staintoniella (Sebdu) S. 119, *Mauretanica* (ibid.), *Oranella* (ibid.) S. 120; G. T. Baker, Trans. Entom. Soc. London, 1888.

Prays rustica ist die in den Phytoptus-Gallen der Esche lebende dunkle Varietät des in der Stammform auf der Rinde, Knospe und Blatt lebenden *Prays Curtisellus*. Beide haben 2 Generationen; die der Stammform erscheinen Ende Mai und im Juli und August; die Frühjahrsgeneration von *rustica* hat auf ein helles 5 dunkle Exemplare, die Sommergeneration ist ganz schwarz und

kleiner als die Stammform. T. A. Chapman, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 73—76.

C. V. Riley theilt weitere Notes on *Pronuba* and *Yucca*-pollination mit; Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 150—154.

Psecadia marmorea (Arizona). S. 149, *fuscipedeella* (Nord-Karolina) S. 150; Walsingham, Insect life, I, *obsurella* (Havilah, Kalif.); W. Beutenmüller, Entomol. Americana, IV, S. 29.

Setiostoma Fernandella (Los Angeles, Calif., auf *Quercus agrifolia*); C. V. Riley, Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 155.

Simaethis atrosignata (Nikolskaja); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 311.

Tinea fulgens (Borshom), *severella* Zell. i. l. (Sarepta: Derbend); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 812.

Tortricina. C. G. Barrett setzt seine Notes on British Tortrices fort; Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 219—221.

Derselbe macht Bemerkungen über Tortrices in Norfolk in 1887; ebenda S. 243—246.

Skandinaviens Vecklarefjärilar beskrifna af H. D. Wallengren; Entom. Tidskr., 1888, S. 159—192.

Walsinghamia (n.g. Choregiae proximum; dem Geäder nach scheinen beide Gattungen besser zu den Tortriciden zu passen als zu den Tineinen, wozu Felder Choregia gestellt hatte) *diva* (Florida; Raupe minirend in den Blättern einer Ficus, wahrscheinlich *F. pedunculata*); C. V. Riley, Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 158.

Amphysa Joannisia (Marseille; Raupe auf Rosmarin); Ragonot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 283, Pl. 6, Fig. 13.

Argyrolepis maritima Willk. unterscheidet sich von *zephyrana* durch die Futterpflanze (*Eryng. marit.* gegen *Daucus carota*), Erscheinungszeit (Ende Juni oder Juli gegen Ende Mai, Juni) und Färbung, und ist daher selbständige Art; Barrett, Notes, S. 219f.; Fletcher, ebenda XXV, S. 15.

J. Ramírez schreibt über die *Semillas brincadoras*, *saltonas*, *frijoles del diablo*, *olipasos* etc. genannten Euphorbiaceen-Früchte, denen durch die in ihnen lebenden Larven von *Carpocapsa saltitans* springende Bewegungen mitgetheilt werden, und bildet Larve, Puppe und Imago des Insektes (nach Riley) ab; La Naturaleza (2. S.) T. I, S. 54—59, L. VII.

Raupe von *Catoptria candidulana* Nollk. (auf *Artemisia maritima*) beschrieben von Barrett, Notes, S. 221.

Chrétien beschreibt die Raupe von *Cochylis Mussehliana*, die er in den Fruchtknoten von *Melampyrum pratense* fand, wozu Ragonot bemerkt, dass sie in Deutschland auf *Butomus umbellatus* gefunden sei; Bull. Soc. Entom. France 1887, S. CLXXXV.

C. clavana (Meeralpen in *Artemisia gallica*) S. 164, Fig. 4, *leucanthana* (ibid. in den Blütenköpfen von *Cephalaria leucantha*) S. 166, Fig. 5; Constant, ebenda, Annales, 1888, Pl. 4, *Lambessana* (Lambessa); Baker, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 254.

Die Raupe der *Eccopsis latifasciana* lebt in einem anscheinend aus Moos bestehenden Sack zwischen Moos; Wocke, Zeitschr. f. Entomol., Breslau (N. F.) 13, Vereinsnachr. S. XVI.

Grapholitha incinerana (Meeralpen) S. 167, Fig. 6, *fulvostrigana* (Korsika) S. 168, Fig. 7; Constant, Ann. Soc. Entom. de France, 1888, Pl. 4, *sulphurana* (Sarepta); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 311.

Die Raupe von *Olindia ulmana* Hb. auf *Aquilegia vulgaris* und *Ranunculus ficaria* lebend (nach Frey und Breyer); Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 230.

Penthina norvegicana; s. Schoeyen, Forh. Vidensk.-Selsk. Christiania, 1887, No. 8, S. 14.

C. M. Weed lernte als Schmarotzer von *Phoxopteryx comptana* Fröl. eine neue *Cremastus*- und *Glypta*-Art kennen; Entomol. Americana, IV, S. 149—152.

Phtheochroa syrtana (Gabès); Ragonot, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LXXXVIII.

Phthoroblastis purpureana (Meeralpen; Raupe in dem Markkanal der jungen Zweigenden von *Arbutus unedo*); Constant, Ann. Soc. Entom. de France, 1888, S. 169, Pl. 4, Fig. 8.

Retinia posticana, Zett., a new British Tortrix; W. Warren Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 146 f.

Larve von *Stigmonota Leplastriana* Curt. in Schoten der wilden, *Brassica oleracea*; Barrett, Notes, S. 220 f.

Tortrix *luticostana* (Wladiwostok); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 311.

Xanthosetia innotatana (Kala Pani); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 337.

Pyrilidina. Diagnoses of N. A. Phycitidae and Galleridae, by E. L. Ragonot; Paris, 1887. (Ist mir nicht zugekommen; eine Besprechung von G. D. Hulst s. Entomol. Americana, IV, S. 38 f.)

Nouveaux genres (61) et espèces (230) de Phycitidae et Galleriidae, par E. L. Ragonot, Paris, April 1888; s. ebenda S. 99 f.

G. D. Hulst macht new genera and species of *Epipaschiae* and *Phycitidae* bekannt; Entomol. Americana, IV, S. 113—118.

E. Meyrick handelt on the *Pyrilidina* of the Hawaiian Islands (56 A.); Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 209—246.

Altoona (n. g. Phycitin., für *opacella* Hulst und) *ardiferella* (Texas); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 116, 118.

Araxates n. g. Ancylolom., für (*Crambus*) *pulcherrimus* Stgr.; Ragonot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 281.

Cayuga n. g. Phycitin., für *gemmatella* Hulst; G. D. Hulst, Entom. Americana, IV, S. 116.

Elethysia! n. g. Ancylolom., für (*Prionopteryx*) *subscissa* Chr.; Ragonot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 281.

Epichilo (n. g. transitum a *Chilone* ad *Crambus* formans) *parvulus* (Indien); Ragonot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 278.

Genophantis (n. g. Phycit.) *iodora* (Hawaii); E. Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 1888, S. 246.

Katona (n. g. *Epipaschi*.) *euphemella* (Texas); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 113.

Loma (n. g. *Epipaschi*.) *nephelotella* (Pennsilv.); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 114.

Mesolia (n. g. Ancyloleom. Prionopterygi affine) *pandavella* (Indien); Ragonot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 282.

Mona (n. g. Phycitin.) *olbiella* (Kolorado); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 116.

Oreana n. g. Phycitin., für unicolorella *Hulst*; G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 115.

Petaluma n. g. Phycitin., für illibella *Hulst*; G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 116.

Phidotricha (n. g. Tetralophae et Pococerae affine) *erigens* (Porto-Rico; Columbien; Peru); Ragonot, Bull. Soc. Entom. France, 1883, S. CXXXIX.

Pima (n. g. Phycitin.) *Fosterella* (Kolorado); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 114.

Protocolletis n. g. Scopulae affine für (Sc.) constricta *Butl.*; E. Meyrick, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 223.

Saluda n. g. Epipaschi. für asperatella *Clem.*; G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 113.

Sciota (n. g. Phycitin.) *croceella* (Texas); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 115.

Tacoma (n. g. Phycitin.) *feriella* (Texas); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 115.

Tallula n. g. Phycitin. für atrifascialis *Hulst*; G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 115.

Tehama n. g. Phycitin. für bonifatella *Hulst*; G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 115.

Tioga (n. g. Epipaschi.) *aplastella*; G. D. Hulst, Ent. Americ., IV, S. 113.

Uinta (n. g. Phycitin.) *oreadella* (Kolorado); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 116.

Wanda (n. g. Epipaschi., für baptisiella *Fern.* und) *tittella* (Texas); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 114.

Welaka n. g. Phycitin. für multilineella *Hulst*; G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 116.

Winona n. g. Epipaschi. für incrustalis *Hulst*; G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 113.

v. Kennel fing bei Dorpat eine von Acentropus Newae *Kol.* verschiedene Art; Sitzgsber. Naturf.-Gesellsch. Dorpat, 1887, S. 297f.

A. niveus in Norfolk; C. G. Barrett, Ent. Monthl. Mag., XXIV, S. 198f. *Acrobasis nigrescens* (Kala Pani); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 336, *albocapitella* (Kanada); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 116.

Aglossa Brabantii (Basses-Alpes); Ragonot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 277, Pl. 6, Fig. 6.

Ancyloleomia hipponella (Bone); Ragonot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 279, Pl. 6, Fig. 11, 12.

Die Gattung bildet mit *Scenoploca* *Meyr.*, *Hednota* *Meyr.*, *Gadira* *Wlk.* (= *Cryptomima* *Meyr.*), *Surratha* *Wlk.*, *Prionopteryx* *Steph.*, *Talis* *Gn.* und 3 neuen die „Familie“ Ancyloleomidae; Ragonot, a. a. O., S. 281 und Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXI

Anoristia olivella (The Needles, Kalifornien); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 117.

Digby vermuthet als Futter der Raupen von *Aphomia sociella*, die er unter Baumrinde, wo auch Hymenopteren nisteten, fand, Holzfaser, entweder von der Rinde oder von den Hymenopterennestern; Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 186.

Bandera cupidinella (Kolorado); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 118.

Botis serotinalis (Beyrut) S. 272, Fig. 2, *cineracealis* (ibid.) S. 273, Fig. 3; L. de Joannis, Ann. Soc. Entom. France, 1888, Pl. 6, *Retowskyi* (Krim); H. B. Möschler, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 128, *plumbosignalis* (Kolorado); C. H. Fernald, Entom. Americana, IV, S. 37.

Canthelia lucida (Campbellpore); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 886.

On the habits of *Cateremna terebrella* Zk. s. C. G. Barrett, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 109—111.

Chilo plejadellus Zinck. = *Diphryx prolatella* Grote, *Chilo oryzaeellus* Riley; C. H. Fernald, Entomol. Americana, IV, S. 45.

Chloauges nigroviridalis (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 193.

Cledeobia oculatalis Rag. abgebildet Ann. Soc. Entom. France, 1888, Pl. 6, Fig. 7, 8, *Berytalis* Rag. Fig. 1.

Constant beschreibt und bildet ab *Constantia* (Hypotia Z.) *pectinalis* H.-Sch. und schildert deren Lebensweise; Ann. Soc. Entom. de France, 1888, S. 162 ff. Pl. 4, Fig. 3.

Crambus decorellus (Zinck.) = *polyactinellus* Koll., *goodellianus* Grote, *bonusculalis* Hulst; C. H. Fernald, Entomol. Americana, IV, S. 44.

Notes on some Norwegian Crambi by G. T. Baker; Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 267 f.

Crambus italellus (Abruzzan); Costa, Atti d. R. Acc. sci. fis. e mat. di Napoli (2) I, No. 10, S. 9, Tav. I, Fig. 9, *divisellus* (Beyrut); L. de Joannis, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 273, Pl. 6, Fig. 4, *argentistrigellus* (Algier); Ragonot, ebenda S. 279, Fig. 9, *Ulae* (Kolorado); T. D. A. Cockerill, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 272 (= *hemiochrellus* Zell., *duplicatus* Grote, *zeelus* Fern., *luteolellus* Clem.; derselbe, ebenda XXV, S. 92), *saxonellus* Zell. var. *carentellus* (Hadschyabad); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 311.

Dasypyga carbonella (Texas); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 117.

C. H. Fernald charakterisiert die Gattung *Diatraea* Guild. und unterscheidet in analytischer Tabelle die nordamerikanischen Arten derselben, unter denen *D. Alleni* (Orona, Me.) und *differentialis* (Florida) neu sind; Entomol. Americana, IV, S. 119 f.

Wood liefert nach frischen Exemplaren eine neue Beschreibung der *Ephestia semirufa*; Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 250—252.

Epischia Bankesella (Portland); N. M. Richardson, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 68.

Hednota oxyptera (Hawaii); E. Meyrick, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 243.

Homoeosoma candidella (Arizona); G. D. Hulst, Ent. Americ., IV, S. 118.

Honora glaucatella (Texas) S. 117, *obsipella* (ibid.), *fuscatella* (ibid.) S. 118; G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV.

Hercyna nanalis (Schahkuh); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 310.

Heterographis singhalella (Ceylon); Ragonot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 288.

Hydrocampa proprialis (Florida; Texas); C. H. Fernald, Entomol. Americana, IV, S. 37.

Lipocosma fuliginosalis (Maine; Ontario; Illinois); C. H. Fernald, Entomol. Americana, IV, S. 37. ●

Lipographis decimerella (Texas), *niviella* (Kolorado); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 117.

Marasmia aurea (Viti Levu); H. Druce, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 230.

The privet web-worm (*Margarodes quadristigmalis* Gn.), Lebensgeschichte; Insect life, I, S. 22—26 mit Holzschn.

Margarodes tricoloralis (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 190, *exaula* (Hawaii; = *glaucaalis* Bull. nec Gn.); E. Meyrick, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 213.

Myelois (?) *carnea* (Campbellpore); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 336.

Life-history of *Nephopteryx abietella* S. V., with a description of its larva; E. A. Atmore, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 221—224.

Ragonot möchte den Ratzeburg'schen Namen *sylvestrella*, unter dem er obige Art mit einer anderen vereinigt hat, unterdrücken und dafür *N. (Dioryctria) splendidella* H.-Sch. annehmen, ebenda, S. 224. — Notizen über die Larve und Lebensweise letzterer Art s. ebenda, S. 269—272.

N. filiolella (Texas); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 117.

Omiodes monogona S. 216, *hodyta* S. 217 (Hawaii); E. Meyrick, Trans. Entom. Soc. London, 1888.

Orthomecyna aphanopsis (Hawaii); E. Meyrick, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 227.

Piesmopoda rufulella (Porto Rico); Ragonot, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXXXIX.

Rhodophaea Heringii (Ceylon); Ragonot, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 282.

Samea (?) *bipunctalis* (Thundiani); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 333.

On the genus *Schoenobius* s. C. H. Fernald, Entomol. Americana, IV, S. 135—139.

J. H. Wood beschreibt die Pyraliden-ähnliche, auf der fleischigen Pfahlwurzel von *Picris hieracioides* lebende Larve von *Scoparia cembrae*; Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 126 f.

Sc. macrophanes (Hawaii); E. Meyrick, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 231.

Scopula eucrena S. 218, *argocelis* S. 222 (Hawaii); E. Meyrick, Trans. Entom. Soc. London, 1888.

Siculodes nitida, *media* S. 182, *fenestrata* S. 183 (Amboina), Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41.

Spermatophthora (?) *pulverulenta* (Campbellpore); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 336.

Tetralopha scabridella, *insularella* (Porto Rico); Ragonot, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXXXVIII, *callipeplella* (Texas); G. D. Hulst, Entomol. Americana, IV, S. 114.

Xeroscopa melanopsis, S. 233, *ombrodes*, *demodes* S. 234, *ischnias* S. 235, *pachysema* S. 236, *mesoleuca* S. 237 (Hawaii); E. Meyrick, Trans. Entom. Soc. London, 1888.

Zophodia longipennella (Texas); G. D. Hulst, Entom. Americana, IV, S. 118.

Macrolepidoptera.

Geometridae. R. Püngeler beschreibt einige neue europäische Spanner; Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 348—351.

G. D. Hulst macht new species of Geometridae bekannt; Entomolog. Americana, III, S. 213—217.

Derselbe setzt seine Notes on Geometrinae fort; ebenda, IV, S. 49—51.

A. Poppius beschreibt Finlands Dendrometridae, med (12) planscher öfver deras ribbförgrening; Acta Soc. pro Fauna et Flora Fennica, III, No. 3, S. 1—151; vgl. oben S. 128.

Photoscotia n. g. (*Scotosia* affine) für (*Cidaria*) *amplicata* Walk. und (*Scotosia*) *miniosata* Walk.; W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 328.

Pseudosterrha (n. g.: *Fidoniin*, *Sterrhae* propinquum) *ochrea* (Campbellpore); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 324.

Abraxas intermedia (Thundiani; Kala Pani; Indien) S. 324, *diversicolor* (Thundiani) S. 325; W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888.

Acidalia spissilimbaria (Algier); Mabille, Bull. Soc. Entom. de France, 1888, S. LIX, (*calunetaria* Stgr. var.?) *Valesiaria* (Wallis), R. Püngeler, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 350, *cernea* (Viti Levu); H. Druce, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 227, Pl. XIII, Fig. 8, *Algeriensis* (Sebdu); G. T. Baker, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 118.

Alcis nudipennis (Thundiani); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 320.

Angerona stramineata (Thundiani); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 319.

Apoch[e]jima juglansaria! (Chabarofka; die einer *Abr. grossulariata* ähnliche Raupe an Jugl. mandschurica); L. Graeser, a. a. O., S. 396.

Argyris metalloptictata (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 174.

Asthena ochracea (Thundiani); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 321.

Aspilates desperaria var. *unicoloraria* (Kolorado); G. D. Hulst, a. a. O., S. 217.

Bapta aetheriata (Chabarofka); L. Graeser, a. a. O., S. 391.

Boarmia fractaria in Frankreich (Hérault); Heulz, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXCVI.

Melanismus bei *B. repandata*; Porritt, Ent. Monthl. Mag., XXV, S. 161.

Boarmia viridaria S. 168, *nigrofasciata* S. 169 (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, *furfuraria* (Kolorado), *atrolinearia* (Kentucky) S. 214, *fuliginaria* (?), *Fernaldaria* (Maine), *Floridaria* (Florida), *Wrightiaria* (S. Bernardino, Kalif.) S. 215, (?) *plumogeraria* (Kalif.) S. 216; G. D. Hulst, a. a. O., *saturniaria* (Wladiwostok; Sidemi) S. 398, *lutamentaria* (Chabarofka) S. 401; L. Graeser, a. a. O.

Chesias linogrisearia (Korsika; Raupe auf *Genista corsica*); Constant, Ann. Soc. Entom. de France, 1888, S. 161, Pl. 4, Fig. 2.

G. D. Hulst beschreibt die Raupe von *Chlorosea bistriaria* Pack.; dieselbe lebt von den Blütenköpfen der *Solidago* und nimmt nach dem Verzehren der Hüllblätter die Blüten auf die Dornen, welche den Körper auf beiden Seiten des Rückens überragen, und ist so von diesen fast vollständig bedeckt; Entomol. Americana, III, S. 193 f.

Zur Biologie der *Cidaria tophaceata* Hbr. s. H. Gross, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 351 f.

Cidaria ectypata (Gabès); Mabilie, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LVIII, munitata Hb. var. *pauperrimata* (Kurusch); H. Christoph, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 310, *subrubescens* (Berham Gully), *Thomasata* (Thundiani) S. 329, *rostrifera* (Berham G.; Thund.), *brevifasciata* (Thundiani) S. 330; W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, *hortulanaria* (Wladiwostok) S. 408, *Rogenhoferi* (Raddefka) S. 409, *corydalaria* (Nikolajefsk) S. 411; L. Graeser, a. a. O.

J. Meves fing am 22. Juni 1887 zu Roserberg (Upland) eine *Cidaria* (Larentia), die mit der von Thunberg erwähnten *C. pupillata* am nächsten übereinkommt, und gibt nach diesem und einem zweiten Exemplare, das ohne nähere Fundortsangabe im Museum zu Stockholm aufbewahrt wird, eine Beschreibung derselben; Entomol. Tidskr., 1888, S. 29—32.

Cleora punctomacularia (Vancouver Isl.), *atrifasciata* (Kalifornien); G. D. Hulst, Entomol. Americana, III, S. 214.

Decetia (?) *pallidaria* (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 166.

Eois parvularia (Texas), (?) *scintillularia* (Florida); G. D. Hulst, Entom. Americana, III, S. 213.

Eubolia nasifera (Thundiani); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 331.

Eupithecia Roederaria (Digne); Standfuss, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888 S. 243, Taf. III, Fig. 7, 8, *poecilata* (Korsika; Sardinien); R. Püngeler, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 349, *quadripunctata* (Thundiani); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 331.

Geometra Dieckmanni (Chabarofka); L. Graeser, a. a. O., S. 384.

Gnophos nimbata, *crassipunctata* (Turkestan); S. Alpheraki, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 68, *isometra* (Akhor); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 321, *Burmesteri*! (Wladiwostok); L. Graeser, a. a. O., S. 402.

Gonodela fuscomarginata (Campbellpore); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 323.

Halia costimaculata (Pokrofka); L. Graeser, a. a. O., S. 403.

Hemerophila Grummi (Turkestan); S. Alpheraki, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 69, *Packardaria* (Kalifornien); G. D. Hulst, a. a. O., S. 217.

Heterolocha (?) *Snoviaria*! (N.-Mexiko); G. D. Hulst, a. a. O., S. 213.

Hypsipetes undulata (Thundiani); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 326.

Idea pallida (Thundiani); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 322.

Larentia bosora (Viti Levu); H. Druce, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 228, Pl. XIII, Fig. 10.

Lithostegia fissurata (Gabès); Mabilie, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LVIII.

K*

Lobophora internata (Mazedonien; Kleinasien); R. Püngeler, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 348.

Macaria violavittata (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 176, *Zimmermanni* (Blagoweschtschenak); L. Graeser, a. a. O., S. 395.

Melanippe flavistrigata (Kala Pani); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 329.

Micronia hermaea (Viti Levu); H. Druce, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 227, Pl. XIII, Fig. 9.

Milionia Pryeri (Loo Choo Isl.); H. Druce, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 62.

Numeria pulveraria var. *violacearia* (Wladiwostok); L. Graeser, a. a. O., S. 392.

Nyssia zonaria two years in the pupa (Sommer 1886 bis Frühjahr 1888); J. Arkle, The Entomologist, XXI, S. 140.

Ortholitha pinnaria (Kurusch); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 310.

Pellonia vibicaria var. *roseata* (Irkutsk); N. Erschoff, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, Taf. XI Fig. 8.

Phibalapteryx nigrovittata (Thundiani) S. 327, *nigripunctata* (ibid.) S. 328; W. Warren, Proc. Zool. London. 1888.

White glaubt, einige irrige Vorstellungen über die Raupe von *Phorodesma smaragdaria* und die an ihr anhaftenden Pflanzentheile berichtigen zu müssen; Proc. Entom. Soc. London, 1888, S. XX f.

Phorodesma concinnata (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 171, *tenuisaria* (Wladiwostok; Raupe auf *Quercus mongolica*); L. Graeser, a. a. O., S. 385.

Plutodes cupreata (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 178.

Psamatodes acutaria (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 177.

Pyra debilis (Thundiani); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 319.

Sarcinodes (?) *Holsi* (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 167.

Scotosia nigralbata (Thundiani; Sikkim); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 327.

Semiothisa caesiaria (Oestl. Ver. Staaten); G. D. Hulst, a. a. O., S. 217.

Tephrosia Texanaria (Texas), *fautaria* (Kalif.), *celataria* (Havilah, Kalif.), *carnearia* (Kalif.) S. 216, *Nevadaria* (Sierra Nevada, Kalif.) S. 217; G. D. Hulst, a. a. O.

Thalassodes timoclea (Viti Levu); H. Druce, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 227, Pl. XIII, Fig. 6, 7.

Thalera lacertaria (Wladiwostok); L. Graeser, a. a. O., S. 387.

Thera consimilis (Thundiani; Nandar); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 326.

Trichopleura undulosa (Houton); S. Alpheraki, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 69.

Urapteryx pluristrigata (Thundiani); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 318.

Xandrames *Salahuti* (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 170.

Noctuidae. J. B. Smith beschreibt (2) New genera and (49) species of North American Noctuidae; Proc. U. S. Nation. Museum, Washington, 1887, S. 450—479.

Gyrophysoma (n. g. prope *Metoponiam*) *sterrha* (Margelan; Kuldscha); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 47.

Hypsophila n. g. für (Anarta) *jugorum* Ersch. var. *Haberhaueri*, Pamira Stgr.; O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 40.

[E] *Icomorpha* (n. g. *Isochlorae* affine) *antiqua* (Namangan; Samarkand); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 24.

L[e]liometopon! (n. g. prope *Simyram*; in der Form *Liometopum* ist der Name von Mayr bereits vergeben) *simyrides* (Kuldscha); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg. 1888, S. 37.

Margelana (n. g. *Heliophobo* affine) *versicolor* (Margelan); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 20.

Metoponrhis! n. g. für (*Photedes?*) *albirena* Christ.; O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 54; vgl. d. vor. Ber. S. 131.

Namangana (n. g. prope *Segetiam*) *cretacea* (Namangan); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 29, *mirabilis* (Namangan); derselbe ebenda S. 52.

Phoebophilus (n. g. *Margelanae* affine) *amoenus* (Issyk-kul); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 21.

Scotocampa (n. g. prope *Scotochrostam*, für *distincta* Chr.?, *fissilis* Chr.? und) *indigesta* (Kuldscha); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 36.

Scotogramma (n. g.) *perpieza*, *inconcinna* S. 469, *umbrosa* S. 470 (Nordamerika); J. B. Smith a. a. O.

Ulolonche (n. g.) *fasciata* (Nordamerika); J. B. Smith a. a. O., S. 471.

Biography of *Acontia delecta* Walk.; A. C. Weeks, Entomol. Americana, IV, S. 46f.

Acosmetia (?) (*Amphipyra?*) *Alpherakii* (Kuldscha) S. 30 und var. *Sergei* S. 31; O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, (*Acosmetia*) *lugubris* (Chabarofka; Pokrofska); L. Graeser, a. a. O., S. 351.

Acronycta nigrostriata (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 128, *asiatica* (Mou-Pin); Poujade, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XX, *Rumicis* L. var. *Turanica* (Centralasien); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 65, (?) *Cornelia* n. sp. (Askold; Suifu); derselbe, ebenda, S. 246, *Fixseni* (Chabarofka) S. 311, *catocaloida!* (ibid.) S. 313; L. Graeser, a. a. O.

Alte und neue Agrotiden der europäischen Fauna werden von Standfuss beschrieben und abgebildet, nämlich *Agrot. culminicola* Stgr., *Wiskotti* (Alpen, 5,500—7000') S. 212, Taf. X, Fig. 3, 4, *Turatii* (Digne, Südfrankr.) S. 216, Fig. 5, *nictymera* B., *eremicola* (Kirgisensteppe) S. 217, Fig. 8, 9, *vallesiaca* B., *squalorum* Ev.; von *A. culminicola*, *Wiskotti*, *lucerna* und *nictymera* ist die männliche Genitalbewaffnung auf Taf. XI dargestellt; Corrbl. Ent. Ver. Iris, 5.

Ebenda beschreibt *Calberla* A. *cinerea* var. *alpigena* Tur. S. 226, Taf. XII, Fig. 7, 8, *trux* Hb. Fig. 10, *xanthographa* ab. *cohaesa* H. - S. Fig. 12.

A. baja F. ab. *punctata*; J. Meves, Entom. Tidskrift, 1888, S. 40.

A. *sabura*, *rugifrons* (Gabès); Mabille, Bull. Soc. Entom. France, 1888,

S. XLII, *binomialis*, *crenulata* S. 451, *confusa*, *Tepperi* S. 452, *soror*, *proclivis* S. 453, *albicosta*, *oblongistigma* S. 454, *flavidens*, *brevipennis* S. 455, *flavicollis*, *obesula* S. 456, *sponsa*, *finis*, *luteola* S. 457, *serriicornis*, *tetrica* S. 458, *medialis*, *extranea* S. 459, *trifasciata*, *bifasciata*, *orbicularis* S. 460, *rufula*, *pallipennis* S. 461, *solitaria* S. 462 (Nordamerika); J. B. Smith, a. a. O., *senescens* *Stgr.* var. *senilis* (Kuldscha; Alexandergeb.) S. 1, *Ledereri* n. sp. (Margelan; Osch; Samarkand) S. 2, *Violetta* (Transalai) S. 3, *clara* (Issyk-kul) S. 4, *alaina* (Alai; Osch) S. 5, *nyctimerina*! (Issyk-kul). *Electra* (Margelan) S. 6, *subdecora* (ibid.), *ignobilis* (Issyk-kul) S. 7, *improba* (Samarkand) S. 8, *exacta* (Issyk-kul) S. 9, *turbans* (Samarkand) S. 10, *incognita* (ibid.; Alai) S. 11, *farinosa* (Kuldscha) S. 12, *subconspicua* (Transalai; Osch) S. 13, *lasciva* (Samarkand) S. 14; O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, *poecila* (Bain-Tsagan); S. Alpheraki, ebenda, S. 67, *pachnobides* (Wladiwostok; Askold; Suifun) S. 246, *velata* (Suifun; Sidimi), *militaris* (Sidimi) S. 247, *nigricostata* (Sidimi), *praecurrens* (Wladiwostok; Nikolsk) S. 248; O. Staudinger, ebenda, *Dewitzi* (Chabarofka) S. 316, *bipartita* (Wladiwostok) S. 318, *exhausta* Butl. ab. *nigromaculata* (Chabarofka; Wladiwostok) S. 320, *plecta* var. *glaucomaculata* (Chabarofka; Pokrofska) S. 321, *praecox* var. *flavomaculata* (Chabarofka) S. 323; L. Graeser, a. a. O.

Aletia fraterna, *exanthemata* S. 410, *rudis* S. 411 (Kangra); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888.

Amphipyra cinnamomea überwintert als Imago; die Begattung findet im November und Dezember Statt und die Eiablage im Februar und März; W. Caspary II, Societ. Entomol., III, S. 2.

A. *Tragopogonis* var. *Turcomana* (Samarkand; Margelan; Tekke); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 32, *flavicaudata* n. sp. (Thundiani; Indien); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 312, *pyramidea* var. *obliquilimbata* (Chabarofka); L. Graeser, a. a. O., S. 352.

W. Warren ist geneigt, *Amyna stellata* Butl., undulifera Butl. und *stigmatula* Snell. als lokale Formen der durch die Tropen verbreiteten *Amyna* (*Poaphila*) *stricta* Walk. anzusehen; Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 303 f.

Anarta fumida (Nikolajefsk); L. Graeser, a. a. O., S. 365.

Apatela sancta (White Mts.); H. Edwards, Entomol. Americana, III, S. 185.

Aporophyla luteolenta ab. *pallida* (Röm. Campagna); Calberla, a. a. O., S. 237.

Ueber den Tonapparat der Männchen von *Argiva* s. oben. S. 129.

Argyrospila formosa (Nikolajefsk); L. Graeser, a. a. O., S. 345.

Athyma tripunctata (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 149.

Axyia triseriata (Kangra); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 409.

Nach Möschler hat Guenée bei Beschreibung der *Bolina fascicularis* B. *fasciolaris* Hb. und *Melipotis ochreipennis* Harvey vermischt; die letztere Art wird vielfach als Synonym von *B. fascicularis* angesehen, doch hat der letztere Name aus dem angegebenen Grunde keine Berechtigung; *B. cunearis* Guenée ist wahrscheinlich das Weibchen von *fasciolaris* Hb.; H. B. Möschler, Entomol. Americana, III, S. 197 f. — A. G. Butler schliesst sich der letzteren Ansicht an und vermuthet ebenso in *B. ochreipennis* das Männchen von *nigrescens*; ebenda, IV, S. 13.

Bomolocha bicoloralis (Chabarofka); L. Graeser, a. a. O., S. 381.

Bryophila raptricula var. *Eretina* (Röm. Campagna); Calberla, a. a. O., S. 221, Fig. 3.

Br. marginelota (Beyrut); L. de Joannis, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 271, Pl. 6., Fig. 10, *nigrivittata* (Campbellpore); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 301.

Calocampa exoleta var. *impudica* (Margelan, Samarkand); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 35.

Calymnia moderata (Suifun), *picta* (Wladiwostok; Askold; Ussuri); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 257, *grandifica* (Chabarofka); L. Graeser, a. a. O., S. 356.

Canna splendens (Dharmasala); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 412.

Caradriua Alsines Brahm var. *levis*! (Margelan); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 29, *lenta* Tr. var. *lentina* (Amur), *maurella* n. sp. (Ussuri; Suifun; Sidimi; Blagoweschtschensk) S. 255, (*Hydrilla*) *funesta* (Wladiwostok; Askold), *illustrata* (Amurgebiet, Ussuri) S. 256; derselbe ebenda, *farinaceu* (Kangra); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 411.

Eine für die deutsch-österreichische Fauna neue *Catocala* ist *C. lupina* H.S., deren der *C. electa* ähnliche Raupe Streckfuss im österreichischen Küstenlande auf Weide fand; Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 16.

Poujade nennt seine *C. Davidi* wegen der gleichnamigen Oberthür'schen Art jetzt *C. Armandi*; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CCVIII.

C. repudiata (Kuldscha) S. 55, *neglecta* (Usgent) S. 56, *optima* (Kuldscha) S. 57, *desiderata* (ibid. und Margelan) S. 59; O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, *serenides* (Raddefskaja; Ussuri; Suifun) S. 268, *Greys* (Ussuri) S. 270, *Doerriesi* (Raddefskaja; Ussuri) S. 271, *Streckeri* (Askold; Bykin) S. 272; derselbe, ebenda, *persimilis* (Thundiani, Indien), (*patula* Feld.); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 314, *agitatrix* (Chabarofka, Raupe auf Pyrus) S. 372, *nutrix* (Raddefka) S. 374, *Honrathi* (ibid.; Chabarofka) S. 376; L. Graeser, a. a. O.

Chariella suavis (Margelan; Kuldscha); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 44.

Cleophana serratula (Kuldscha; Alexandergeb.); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 38.

Ei, Raupe (auf *Portulaca oleracea*), Puppe und Imago von *Copidryas Gloveri Grote & Robins.* s. in *Insect life*, I, S. 104—106 mit Holzschn.

Copimamestra curialis (Nordamerika); J. B. Smith, a. a. O. S. 470.

Delahaye beschreibt die Raupe von *Corycia bimaculata* F.; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXXXVII.

Cosmia (?) *foveata* (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 130, *subtilis* (Margelan; Namangan); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 33.

Cucullia syrtana (Gabès); Mabile, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LI, *Maracandica* (Samarkand); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 39, *maculosa* (Ussuri); derselbe, ebenda S. 259.

Diphthera fasciata (Kangra); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 408, *Honrathi* (Ussuri; Raddefka); L. Graeser, a. a. O., S. 315.

Dyschorista plebeja (Samarkand); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 34.

Dysgonia latifascia (Campbellpore); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 816.

Epimecia quadrivirgula, subtilis (Gabès); Mabilie, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LI.

Episema glaucina var. *meridionalis* (Röm. Campagna); Calberla, a. a. O., S. 235, (?) *vulpina* n. sp. (Margelan); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 18.

Epizeuxis betularis S. 162, *brunnealis, viridalis* S. 163 (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41.

Erastria albofusca (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 183, *bicyclica* (Kuldsha); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 46, *distinguenda* (Raddeffskaja; Bykin; Sidimi), *numisma* (Wladiwostok; Askold; Suifun) S. 265, *Wiskotti* (Askold; Ussuri) S. 266; derselbe ebenda, *mollicula* (Chabarofka); L. Graeser, a. a. O., S. 368.

H. T. Fernald beschreibt das Ei und die junge, 12flüssige Raupe von *Erebus odora*; Entomol. Americana, IV, S. 36.

Eriocera Chysenaeri (Sumatra); F. J. M. Heylaerts, Bull. Soc. Ent. Belg., 1888, S. LXI.

Eriopus Venus (Raddeffskaja; Ussuri); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 258, *albolineola* (Pokrofska); L. Graeser, a. a. O., S. 337.

T. Porritt beschreibt die Raupe von *Euclidia* m; Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 13—15.

E. regia (Alai); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 48.

Euplexia pectinata (Thundiani, Indien; gleich *Oxira ochracea* Walk. im männlichen Geschlecht mit gekämmten Fühlern; Warren möchte aber dieses Merkmal nicht als ein zur Aufstellung einer neuen Gattung berechtigendes, sondern als eine „spezifische Abweichung von einem Gattungstypus“ ansehen); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 308 und 298, *illustrata* (Chabarofka; Wladiwostok); L. Graeser, a. a. O., S. 339.

Gonitis albitarsata (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 189.

Gortyna basalipunctata (Chabarofka; Ussuri); L. Graeser a. a. O., S. 241.

Grammesia bifasciata (Suifun); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 254.

Grammodes alcyona (Viti Levu); H. Druce, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 225, Pl. XIII, Fig. 5.

Die im Rasen von *Aira flexuosa* lebende Raupe von *Hadena gemmea* ist beschrieben von Werner, Entom. Nachr., 1888, S. 257—259.

Hadena Calberlai Stgr. von Hartmann bei Bozen gefangen; Standfuss, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 243.

H. zeta var. *Curoi* (Gran Sasso) S. 241, Taf. XII, Fig. 1, 2, *Calberlai* Stgr. Fig. 9; Calberla, a. a. O., *inquinata* (Gabès); Mabilie, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XLIII, *timida* (Ugent); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 26, *Christophi* (Taganrog); S. Alpheraki, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 68, *arctides* (= *arcta* Oberth. nec Led.; die *H. parietum* Oberth. = *arcta* Led.) S. 252, *Christophi* (Raddeffskaja; Ussuri; Suifun), *fraudulenta* (Blagoweschtschensk) S. 252; O. Staudinger, ebenda, *viridimacula* (Wladiwostok) S. 331, *Hedeni* (Raddeffskaja; Pokrofska) S. 338, *cinefacta* (Wladiwostok) S. 334; L. Graeser, a. a. O.

- Helia quadra* (Chabarofka; Raddefka; Suifun); L. Graeser, a. a. O., S. 378.
Heliophobus Scillae (Bone; Raupe auf *Sc. maritima*); P. Chrétien, *Le Naturaliste*, 1888, S. 92.
Heliothis albistriata (Amboina); Pagenstecher, *Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk.* Wiesbaden, 41, S. 132, *foveolatus!* (Suifun; Sidimi); O. Staudinger, *Stett. Ent. Zeitg.*, 1888, S. 263, *olivaria* (Chabarofka); L. Graeser, a. a. O., S. 365.
Hulodes cinereomarginata (Amboina); Pagenstecher, *Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk.* Wiesbaden, 41, S. 146.
Hyboma divisa (Kangra); F. Moore, *Proc. Zool. Soc. London*, 1888, S. 409.
Hyparpax aurostriata (Texas); E. L. Graff, *Entomol. American.*, IV, S. 58.
Hypena conspersalis (Wladiwostok; Ussuri; Suifun; Bykin); O. Staudinger, *Stett. Ent. Zeitg.*, 1888, S. 282, *angustalis* (Dumtanar); W. Warren, *Proc. Zool. Soc. London*, 1888, S. 317, *passerinalis* (Chabarofka); L. Graeser, a. a. O., S. 383.
Janthinea (Stemmaphora) *viola* (Samarkand); O. Staudinger, *Stett. Ent. Zeitg.*, 1898, S. 43.
Isochlora viridis *Styr.* var. *maxima* (Usgent; Osch); O. Staudinger, *Stett. Ent. Zeitg.*, 1888, S. 24.
Leocyma cilia (Wladiwostok) S. 263, *borussica* (Raddefskaja) S. 264; O. Staudinger, *Stett. Ent. Zeitg.*, 1888.
Larva of *Leucania turca* beschrieben von Porritt, *Entom. Monthl. Mag.*, XXIV, S. 248f.
W. Warren zieht *L. bistrigata* und *penicillata* Moore zu *l.-album*; *Proc. Zool. Soc. London*, 1888, S. 301.
Leucania turca var. *lutescens*, *obscura*, *lithargyrea* var. *extralineae*, *unipuncta* var. *asticta* (England); J. W. Tutt, *The Entomologist*, XXI, S. 136—139.
L. irrorata S. 409, *percosa*, *bifasciata* S. 410 (Kangra); F. Moore, *Proc. Zool. Soc. London*, 1888, *semicircula* (Blagoweschtschensk; Wladiwostok); L. Graeser, a. a. O., S. 349.
Leucanitis aberrans (Kuldscha) S. 49, *sesquilina* (Samarkand; Osch) S. 51, *Hedemanni* (Blagoweschtschensk) S. 267; O. Staudinger, *Stett. Ent. Zeitg.*, 1888.
Lithocampa ramulosa (Wladiwostok; Ussuri); O. Staudinger, *Stett. Ent. Zeitg.*, 1888, S. 258.
Madopa rectilinealis (Chabarofka); L. Graeser, a. a. O., S. 380.
Eine neue Eulenform aus Sachsen ist *Mamestra Brassicae* ab. *scotochroma*, 1887 bei Dresden gefangen; Röber, *Corrbl. Entom. Ver. „Iris“*, No. 5, S. 340, Taf. XII, Fig. 18.
M. (*rubrica* var. *subapicalis* S. 462), *lepidula* S. 463, *prodeniformis*, *canadensis* S. 464, *rectilinea* S. 465, *vau-media*, *incurva* S. 466, *variolata*, *minorata* S. 467, (assimilis var. *pulverulenta*), *obscura* S. 468 (Nordamerika); J. B. Smith a. a. O., (Leineri var. ?) *bovina* (Transalai) S. 14, *armata* (Samarkand) S. 15, *peculiaris* (ibid) S. 16, *vidua* (Margelan) S. 17; O. Staudinger, *Stett. Ent. Zeitg.*, 1888, *advena* F. var. *adjuncta* (Wladiwostok; Askold), *mortua* n. sp. (Askold) S. 249, *declinans* (Suifun), (?) *incommoda* (Wladiwostok; Askold) S. 250; derselbe ebenda, *nigerrima* (Thundiani); W. Warren, *Proc. Zool. Soc. London*, 1888, S. 302, *tetrica* (Chabarofka); L. Graeser, a. a. O., S. 325.
Masalia tosta (Dharmasala); F. Moore, *Proc. Zool. Soc. London*, 1888, S. 411.
Megacephalon pilosum (Amboina); Pagenstecher, *Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk.* Wiesbaden, 41, S. 156.

Metachrostis contingens (Dharmasala); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 412.

Miselia Tancrei (Wladiwostok); L. Graeser, a. a. O., S. 329.

Mithymna (?) *imbellis* (Samarkand); O. Staudinger, Stett. Entom. Zeitg. 1888, S. 28.

Moma Orion var. *myrrhina* (Chabarofka); L. Graeser, a. a. O., S. 314.

Nodaria (?) *Amurensis* (Wladiwostok; Askold; Suifun; Ussuri); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 274.

Nonagria concolor Gn. nicht = *extrema* Hb., sondern eine blasse Form von *fulva* Hb., S. 53—55; *dissoluta* Treitsch. und *arundineta* Schm. sind Variet. von *neurica* Hb.; S. 56f.; J. W. Tutt, Entom. Monthl. Mag., XXV; letzteres auch Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 239f.

N. (?) *amoena* (Sidimi); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 254, *graminea* (Chabarofka); L. Graeser, a. a. O., S. 343.

Ochropleura denticulata (Thundiani); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 307.

Oncocnemis fasciatus (Kalif.), *tenuifascia* (Kolorado) S. 18, *iricolor* (ibid.) *terminalis* (ibid.) S. 19, *simplex* (Utah) S. 20; J. B. Smith, Insect life, I.

Orrhodia ligula Esp. var. *politina*, *subspadiceana* (Centralasien); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 35, *canicostata* (Chabarofka); L. Graeser, a. a. O., S. 358.

Orthodes irrorata (Nordamerika); J. B. Smith, a. a. O., S. 478.

Orthosia pistacina ab. *caerulea* (Röm. Campagna); Calberla a. a. O., S. 254.

Palimpsestis renalis (Kangra), *orbicularis* (ibid.) S. 407, *albidisca* (Kangra) S. 408; F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888.

Pandesma benenotata (Rawal Pindi, Indien); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 313.

Pangrapta marmorata (Raddefskaja; Wladiwostok; Askold; Bykin) S. 277, *incisa* (Raddefskaja; Askold; Ussuri) S. 278, *flavomacula* (Wladiwostok; Askold; Sidimi) S. 279, *suaveola* (Wladiwostok; Baranowsky; Bykin) S. 281, *costaemacula* (Wladiwostok; Bykin) S. 282; O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888.

Perigrapha inferior (Nordamerika); J. B. Smith, a. a. O., S. 477.

Phyllodes imperialis (Solomon Is.); H. Druce, Ann. a. Mag. N. H., (6), II, S. 241.

Plusia Italica Stgr. abgebildet von Calberla a. a. O., Taf. XII Fig. 4, 5.

Pl. litterata (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 137, *aurata* (Ussuri) S. 260, *adscripta* (Sidimi) S. 261, *intracata* (Wladiwostok; Askold) S. 262; O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888.

L. Graeser beschreibt die in Gestalt und Haltung einer *Plusia*-Raupe ähnliche Raupe von *Plusiodonta compressipalpis* Gn. = *Platidia casta* Butl.; a. a. O., S. 361f.

Polia Centralasiae Stgr. var. *?extrita* (Sarmakand; Alai); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 22, Chi var. *subcaerulea* (Nikolajefsk); L. Graeser, a. a. O., S. 329.

Pradatta bimaculata (Dharmasala); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 411.

R. F. Pearsall gibt eine kurze Beschreibung der Raupe von *Scopelosoma moffatiana* Grote; Entomol. Americana, IV, S. 59.

Senta nigrosignata (Wladiwostok); L. Graeser, a. a. O., S. 344.

Sesamia Cretica Stgr. var. (aberr.?) *striata* (Margelan); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 27.

Simyra splendida (Wladiwostok); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 245.

Spintherops exsiccata Ld. in Italien; Calberla, a. a. O., S. 268, Taf. XII, Fig. 6.

O. Staudinger setzt die Unterschiede zwischen *Sp. cataphanes* Hb. und *dilucida* Hb. auseinander und beschreibt von ersterer die Varr. *subligaminosa* (Centralasien), *praeligaminosa* (Amur) S. 61, *maculifera* (Margelan) S. 62, *maura* (Lambèse, Algier) S. 63; ferner *dilucida* Hb. var. *asiatica* (Kleinasien und Centralasien) und *rosea* (Biskra) S. 63, *simplex* n. sp. (Kuldsha); Stett. Ent. Zeitg., 1888.

H. Druce bildet 2 von Viti Levu stammende Exemplare der sehr veränderlichen *Steiria variabilis* Moore ab; Proc. Zool. Soc. London, 1888, Pl. XIII, Fig. 3, 4.

Sypna rectifasciata (Raddefka; Ussuri; Askold); L. Graeser, a. a. O., S. 370.

Taeniocampa uniformis, *columbia* S. 472, *utahensis* S. 473, *suffusa*, *obtusa* S. 474, *pectinata*, *terminata* S. 475, *subterminata* S. 476 (Nordamerika); J. B. Smith, a. a. O., incerta *Hufn.* var. *pallida*, *gracilis* F. var. *pallidior* (Centralasien); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 32.

H. Linder beobachtete bei *Taeniocampa* wiederholt (1874, 1878, 1882 und 1886) ein häufiges Auftreten in einem Cyklus von 4 Jahren; in den Zwischenjahren war die Art selten; Soc. Entomol., II, S. 155.

Tapinostola lagunica (Pokrofska); L. Graeser, a. a. O., S. 344.

Telesilla (?) *placens* (Suifun; Ussuri); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 259.

Die Angabe, dass nach Snellen *Thalpochares communimacula* das Flügelgeäder einer Cochliopode habe und zu dieser Familie gehöre, beruht auf einem Irrthum von Seiten der Redaktion der Mém. s. l. Lépid.

Th. triangularis (Campbellpore); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 309, *respersa* var. *Bythinica* (Brussa); G. T. Baker, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 121.

Thalpochares viridis (Samarkand); O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg. 1888, S. 45, *bella* (Wladiwostok); derselbe, ebenda, S. 264.

Triaena denticulata (Kangra); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 408.

Trichoclea Edwardsii (Nordamerika); J. B. Smith, a. a. O., S. 478.

Tympanistes rubidorsalis (Kangra); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 409.

Xanthia coriacea (Wladiwostok); L. Graeser, a. a. O., S. 357.

A. Hiendlmayr veröffentlicht die Beschreibung der Raupe und Puppe von *Xylina ingraca* (auf *Alnus glutinosa*); Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 229f.

X. ingraca var. *grisea* (Blagoweschtsch.; Nikolajefsk; Wladiw.); L. Graeser, a. a. O., S. 360.

Zanclognatha ciliata (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 160, *assimilis* (Wladiwostok; Suifun), (?) *robiginosa*! (Raddefskaja; Askold; Suifun) S. 275, (?) *bistrigata* S. 276; O. Staudinger, Stett. Ent. Zeitg., 1888.

Zethes laudatus S. 152, *bilineatus* S. 153, *variabilis* S. 154 (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41.

Cymatophoridae. *Asphalia nigrofascicula* (Chabarofka); Graeser, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 152, *cinerea* (Thundiani, Indien); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 300.

Cymatophora ypsilon graecum Göze ab. *unimaculata*; J. Meves, Entom. Tidskr., 1888, S. 40.

Cymatophora or var. *terrosa* (Nikolajefsk; Chabarofka, etc.) S. 150, *Tancredi* n. sp. (Raddefka) S. 151; Graeser, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888.

H. Edwards verweist seine *Gluphisia* Teärlei jetzt in die Gattung *Bombycia* Hübn.; Entomol. Americana, IV, S. 63.

Gonophora Diekmanni (Nikolajefsk, Raupe zwischen zusammen gesponnenen Himbeerblättern); Graeser, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 148.

Habrosyne fraterna (Kangra); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 406.

Karaua similis (Kangra); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 407.

Polyplocia albidisca Moore i. l. (Berham Gully, Indien) S. 299, *dubia* (Handar) S. 300; W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888.

Thyatira cognata (Kangra); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 406.

Notodontidae. *Rhegmatochloa* n. g. (Submediana saumwärts gegabelt), auf *Clostera alpina* Bellier de la Chavignerie (s. dies. Ber. f. 1880, S. 164) gegründet; die Art ist in beiden Geschlechtern abgebildet; Standfuss, Berlin. Entomol. Zeitschr. 1888, S. 289, Taf. III, Fig. 5, 6.

Varmina n. g. für (*Gluphisia*) *indica* Walk., deren auf Pflaumenbäumen lebende Raupe ebenfalls beschrieben ist; F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 405.

Cerura Himalayana (Dharmasala); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 400.

Poujade beschreibt das Ei und die Raupe von *Clostera alpina*; die Raupe lebt auf *Populus nigra*; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XCIX; CXXVI.

Cnethocampa pityocampa bei Brixen, Schabs, und Wolkenstein-Rodenegg; Dalla Torre, 17. Ber. naturw.-mediz. Ver. Innsbruck, Vereinsnachr., S. 4.

F. Rühl machte in 2 Jahren die Beobachtung, dass die Weibchen von *Harpyia vinula* auf einen kleinen Busch nur je 2 Eier ablegen, und erzog aus den so gesammelten Raupen eine gleiche Anzahl von Männchen und Weibchen; Societ. Entomol., II, S. 178.

Ueber die Natur der Ausscheidung aus der Prothorakaldrüse dieser Art s. oben S. 14.

Heterocampa basistriga (Dharmasala); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 400.

Lophopteryx Hoegei (Wladiwostok); Graeser, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 143.

Die Raupe von *Notodonta concinna* hat die Fähigkeit, grosse Mengen eines salzsäurehaltigen Sekrets zu entleeren; Denham, Insect life, I, S. 143.

Phalera bucephala var. *insulgens* (Nikolajefsk; Chabarofka; Wladiwostok); Graeser, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 146.

Pheosa fuscata (Dharmasala; Raupe auf Kirsche); F. Moore Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 401.

Spatalia Doerriesi (Chabarofka); Graeser, Berlin. Ent. Zeitschr. 1888, S. 141.

Poujade über die Zucht von *Stauropus Fagi*; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXIV—CLXVI.

St. *Berberisae*! (Dharmasala; Raupe auf der „wilden Berberitze“ und wilden Birne); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 400.

Drepanulidae. *Drepana hyalina* (Dharmasala), *ilacina* (ibid.) S. 401, *similima* (ibid.) S. 402; F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888.

Oreta rubra (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 122.

Saturniidae. Standfuss zog seine Var. *lugens* von *Agria tau* (s. dies. Ber. für 1886, S. 158) drei Jahre hindurch, ohne indessen durch Inzucht eine schwärzere Form zu erzielen; die letzte Generation litt sehr an Kränklichkeit. Die Nachkommen spalteten sich stets in typische Stücke der Grundart und der var. *lugens*, ohne Zwischenformen. Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 238f., Taf. III, Fig. 3, 4.

The ontogeny of *Agria tau*; Poulton, Proc. Entom. Soc. London, 1888, S. XXXIIf.

Antheraea Emini (Gadda); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 84, *fraterna* (N. W. Himalaya); F. Moore, ebenda, S. 402.

G. D. Hulst beschreibt die Raupe von *Hemileuca Nevadensis*; Entomol. Americana, III, S. 191—193.

Saturnia Hockingii (Kullu); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 402.

Bombycoidea. *Bhimana* g. (Taragamae = Megasomae affine) für (*Poecilocampa*) undulosa Walk.; F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 408.

Silkworms („Young collector series“). By E. A. Butler, London, Swan Sonnenschein, Lowrey & Co., 1888. S. die Besprechung von W. F. Kirby, Nature, Vol. 38, S. 386f.

A. Speyer beobachtete bei *B. lanestris* eine fünfjährige Puppenruhe; eine zweite, 1882 erhaltene Puppe war gar 1888 noch nicht ausgeschlüpft, lebte aber noch; Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 205f.

B. Datini (Gabès); Mabilie, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XLII, *Hersi* (Schahrud, Raupe an *Lycium barbarum*); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 810.

Crateronyx Balkioni (Novorossiisk); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 810.

Eupterote fraterna (Dharmasala); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 406.

Die Raupen der *Gastropacha Rubi* lassen sich am besten mit *Polygonum aviculare* füttern; Poujade, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXXXVI.

B. Populi L. fra den arktiske region (70° 20'); W. M. Schöyen, Entom. Tidskr., 1888, S. 142.

Lasiocampa Dieckmanni (Nikolajefsk; Wladiwostok; nebst Ei und der auf Birken und Vogelbeersträuchern lebenden Raupe); Graeser, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 128.

Pyrosis idiota (Blagoweschtschensk; Chabarofka); Graeser, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 131.

Taragama castanoptera (Kangra valley); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 404.

Cossidae. *Inguromorpha* (n. g. *Cosso* affine) *Slossoni* (Jacksonville, Flor.); H. Edwards, Entomol. Americana, III, S. 188.

Cossus albionubilis (Wladiwostok); Graeser, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 119, *Hyrcanus* (Schahrud); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 309.

Zeuzera pyrina F. (wahrscheinlich eingeschleppt) in Nordamerika (New-Jersey); E. L. Graff, Entomol. Americana, IV, S. 162f.

Zeuzera mixta (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 126.

Hepialidae. D. S. Kellicott erhielt aus der in den Wurzeln und Stämmen von *Alnus incana* lebenden und vorläufig einem *Cossus Alni* zugeschriebenen Raupe den *Hepialus argenteomaculatus*; Entomol. Americana, IV, S. 153.

Hepialus tegulatus, rosatus (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 127, *Schamyl* (Kaukasus); H. Christoph, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 309.

W. Schaus beschreibt die in Wurzeln des „Guzanillo“ oder „Maggot tree“ bohrende Raupe von *Phassus triangularis*; Entomol. Americana, IV, S. 64.

Heterogynidae. *Thia* (n. g.) *extranea* (Los Angeles); H. Edwards, Entomol. Americana, III, S. 181.

Psychidae. *Akesina* (n. g.) *basalis* (Dharmasala); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 396.

Barandra (n. g.) *fumata* (ibid.); F. Moore, ebenda S. 396.

Dasaratha (n. g.) *Himalayana* (ibid.); F. Moore, ebenda S. 397.

F. Rühl beendet seine Beiträge zur Kenntniss der Familie Psyche; Societ. Entomol., II, S. 147, 154f., 172f., 180, III, S. 11f.; C. Schmidt bringt einen Beitrag zur Kenntniss der Lebensweise schlesischer Psychiden; ebenda III, S. 26f., 35f., 41f., 58f., 73.

Acanthopsyche Grummi (Polusak, Turkestan); Heylaerts, Bull. Soc. Ent. Belg. XXXI, S. LXXXV.

Animula Sumatrensis (Fort de Kock, Raupe vorzüglich auf *Callaeocarpus rhamnifolia* und *Syzygium Jambolanum*); Heylaerts, Bull. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. XXXVI.

F. J. M. Heylaerts ergänzt nach besser erhaltenen Stücken die Beschreibung seiner *Chalia Javana* (s. dies. Ber. für 1885, S. 193); der Sack der Raupe ist 25—30 mm. lang und in der Mitte 8 mm. breit, und besteht aus mehreren Etagen, die abwechselnd der Längsachse des ganzen Sackes parallel sind und damit einen stumpfen Winkel bilden. Jede Etage ist aus unter sich gleich langen Stückchen von Grashalmen gebildet. Bull. Soc. Entom. Belg., 1888, S. LXf.

Eumeta Moddermanni (Liberia; Sklavenküste); F. J. M. Heylaerts; Bull. Soc. Ent. Belg., 1888, S. LIX.

A. Speyer beschreibt *Fumea roboricolella Bruand* in beiden Geschlechtern; Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 203f.

Mahasena Hockingii (Dharmasala; Raupe auf *Credela toona*; beim Ausschlüpfen stiess der Schmetterling das Schwanzende der Puppe ab und liess sich in der Chrysalis an einem seidenen Faden herab; an letzterem hielt er sich mit den beiden Vorderbeinen fest, während die anderen Beine sich an der Puppenhülse anklammerten, bis die Flügel sich entfaltet hatten und getrocknet waren); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 397.

Oeceticus Riemsdyki (Fort de Kock, Sumatra; Raupe auf *Persea gratissima* und *Psidium*; auch Rosen); Heylaerts, Bull. Soc. Entom. Belg. XXXI S. LXXXVI.

Die Psyche *Cassiae Weijenb.* ist ein *Platoeceticus*; die Weijenbergh'sche mangelhafte Beschreibung ist durch eine bessere ersetzt; Heylaerts, Bull. Soc. Entom. Belg., XXXI S. VIII.

Ps. Ioannisi (Madagaskar); Mabilie, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LXVII, *longicauda* (Campbellpore); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 299.

Liporidae. *Lachana* (n. g.) *Ladakensis* (Ladak); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 398.

Artaxa sulphurea (Dharmasala); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 399.

Charnidas aurantiaca (Attock); W. Warren, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 296.

Dasychira grossa Snellen i. l. (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 121, *Dalbergiae* (Dharmasala; Masuri, Raupe auf *D. sissoo*); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 399.

Euproctis abdominalis (Dharmasala); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 398.

Lymantria carnecolor (Dharmasala), *nigra* (Kangra valley); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 399.

Ueber die Eier von *Orgyia antiqua* s. Blackburn, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc. XXVI, S. 53f.

O. Zimmermanni (Blagoweschtschensk); Graeser, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 122.

Pentophora (morio var.?) *Caucasica* (K.); Heylaerts, Bull. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. LXXXVIII.

Procodeca umbrina (Kullu); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 398.

Limacodidae. *Aphendala fasciata* (Dharmasala); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 403.

Heterogenea Christophi (Wladiwostok); Graeser, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 119.

Miresa suffusa (Dharmasala), *quadrinotata* (Kangra; Kullu); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 403.

Parasa Hockingii (Kangra valley; Raupe *Limax*-ähnlich. auf *Cedrela toona*); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, 403.

Arotidae *Arctia mongolica* (Dschungor), *Haberhaueri* (Sarafschan); S. Alpheraky, Stett. Entom. Zeitg., 1888, S. 67, *Brucei* (Denver, Color., Ei und Larve beschrieben, S. 219f.) S. 183, *Franconia* (White Mts.), *remissa* (Hudson Bay terr.) S. 184; H. Edwards, Entomol. Americana, III.

A. R. Grote berichtet einige Irrthümer von J. B. Smith in dessen Diagnose der *Cerathosia tricolor* (s. den vor. Ber. S. 135) und bestreitet deren Zugehörigkeit zu den Arctiaden; sie sei vielmehr eine Eule; Entomol. Americana, IV, S. 121; J. B. Smith erkennt eine Berichtigung Grote's (die Anwesenheit der Ader 5 in den Hinterflügeln) an, die übrigen dagegen nicht, und lässt ebenso die systematische Stellung bei den Arctiaden unbeanstandet; ebenda, S. 122f.

Challa quadrimaculata (Palampore); F. Moore, Proc. Zool. London, 1888, S. 395.

Ecpantheria scribonia Stoll var. *demudata*; A. T. Slosson, Entomol. Americana, III, S. 212.

Halisidota significans (Las Vegas, N. Mexiko); H. Edwards, Entomol. Americana, III, S. 182.

Icambosida dorsalis (Dharmasala; Raupe auf Kirsche); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 394.

Laora variabilis (Chili, die Weinberge verheerend); F. Philippi; s. Sitzgsber. d. Berl. Entom. Vereins, 1888, S. 10.

Die Raupen von *Nemeophila Plantaginis* und *Arct. Quensellii* sind (unter Umständen) Mordraupen; C. Hebsacker, Societ. Entom., III, S. 83, 110.

Nemeophila Plantaginis var. *floccosa* (Nikolajefsk; Pokrofska); Graeser, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 115.

Ocnogyna corsica var. *albifascia* (Korsika); Constant, Ann. Soc. Entom. de France, 1888, S. 161, Pl. 4, Fig. 1.

Pleretes pactolicus (Wadelai); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 82.

Pompostola smaragdina (Kilimandscharo); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 97.

Spilartia Dalbergiae (Dharmasala; Raupe auf D. sissoo), *sagittifera* (ibid.); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 394.

Die Raupen von *Spilosoma zatima* sind Mordraupen, die die von *Phibalapteryx aquata* begierig fressen; Poujade, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXXI; eine Raupe von *Euchelia Jacobaeae* hatte ihre bereits in eine Puppe verwandelte Schwester ebenfalls angefressen; Lucas, ebenda S. CXXXIII.

Lithosiadae. Seinen Bijdrage tot de kennis van de Aganaisiden *Herrich-Schäffer* in Tijdschr. v. Entomol. XXXI, S. 109—146, Pl. 1, 2 beginnt Snellen mit einem geschichtlichen Rückblick und gibt dann folgende Charakteristik: „Fühler borstenförmig; Augen nackt, unbewimpert; Nebenaugen vorhanden; Rüssel aufgerollt; Palpen anliegend beschuppt, keine Nebenzpalpen; Stirn flach; Kopf, Thorax und Hinterleib von gewöhnlicher Bildung, ebenso die mittelmässig langen, glatt beschuppten, wie gewöhnlich bedorneten Beine. Vorderflügel mit 12 Adern: 1 bogig; 2 aus oder vor dreiviertel des Innenrandes der Mittelzelle; 3—5 nahe bei einander an der Innenrandecke der Zelle; Hinterflügel mit 2 Innenrandsadern und noch 7 anderen, 2—5 ungefähr wie in den Vorderflügeln; 6—7 ungestielt. — Die Gattungen *Pachyphilona* *Bull.* und *Petalia* *Walk.* sind dem Verfasser unbekannt geblieben; *Anagria* *Walk.* und *Aganopsis* *H. S.*, die nur auf Merkmale des männlichen Geschlechtes gegründet waren, vereinigt er mit *Aganais* unter dem Namen *Hypsa*. Ausser dieser Gattung kommen demnach noch *Agape* *Feld.*, *Euplocia* *Hüb.*, *Panglima* *Moore*, *Philona* *Bull.*, *Neochera* *Hüb.* zur Sprache, im Ganzen 53 Arten, von denen 39 zur Gattung *Hypsa* gehören.

Aemene sagittifera (Dharmasala; N.V.-Indien) S. 392, *inconstans* (Dharmasala) S. 393; F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888.

Hypsa Agarista (Neu-Hebriden) S. 129, Pl. 1, Fig. 4, *leuconota* (Java; Sumatra) S. 135, Pl. 2, Fig. 2; Snellen, Tijdschr. v. Entom. XXXI, *Woodfordi* (Viti Levu); H. Druce, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 221.

Lepista limbata (Kilimandscharo); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 98.

Meningocera tricolor (Amboina); Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 118.

Roeselia scripta (Dharmasala), *fraterna* (Kullu), *angulata* (Dharmasala; N.V.-Indien); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 393.

Setina calamaria (Palampore); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 392.

Chalcosiidae. *Dianeura* (n. g. Chalcosiin.) *Goochii* (Natal) S. 49, Fig. 4, *Jacksoni* (Manda Isl., Kilimandscharo) S. 50, Fig. 2, 3; A. G. Butler, Ann. a. Mag. N. H. (6) I.

A. G. Butler war durch reichlicheres Material in den Stand gesetzt, die Angaben über den Aderverlauf in den Hinterflügeln von *Doratopteryx* zu ergänzen. Von den beiden Adern desselben ist die Medianader doppelt und entsendet vor der schwanzartigen Verschmälerung einen kurzen Zweig in den Hinterrand, während sie selbst in den Schwanz eintritt und kurz vor dessen Spitze am Hinterrande ausläuft. Die Subkostalader tritt ebenfalls in den Schwanz ein, den sie bis zu dessen Spitze durchläuft; in dem etwas verbreiterten Endtheil giebt sie aber einen Ast in den Vorderrand ab. Eine neue Art ist *D. plumigera* vom River Ozy, Kilimandscharo; Ann. a. Mag. N. H. (6) I S. 47 f. mit Holzschn. Fig. 1.

Histia dolens (Celebes); H. Druce, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 62.

Heteropan dolens (Viti Levu); H. Druce, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 220, Pl. XIII, Fig. 1.

Nyctoolidae. *Hylophila Kraeffti* (Chabarofka); Graeser, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 110.

Callidulidae. *Pterodecta anchora* (Dharmasala); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 392.

Uraniidae. *Alcides Latona* (Solomon Isl.); H. Druce, Ann. a. Mag. N. H., (6), II, S. 241.

Himantopteridae. *Pedoptila Staudingeri* (Sierra Leone); Rogenhofer, Sitzgsber. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, S. 61.

Zygaenidae. *Antichloris ruatava* (Honduras); H. Druce, Ann. a. Mag. N. H., (6), II, S. 241.

Argyroides minuta (Honduras); H. Druce, Ann. a. Mag. N. H. (6) II, S. 240.

Belemnia Whiteleyi (Brit. Guyana); H. Druce, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 62.

A. G. Butler macht Notes on the species of the lepidopterous genus *Euchromia* (*Glaucop. Pagenstecheri* Rüb. = *coelipennis* Wlkr., dubia Rüb. = *Creusa* L., *Butleri* Rüb. = *Celebensis* Butt.) und beschreibt *E. lurlina* (Thursday Isl.) S. 110, *Mathewi* (Solomon Isl.) S. 111, Fig. 3, *fulvida* (Kongo; Angola; etc.) S. 112, Fig. 5, *splendens* (Alt-Kalabar, bis Kamerun) S. 113, Fig. 4, *formosana* (Formosa) S. 114, Fig. 7; Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 109 bis 115, Pl. IV.

Röber weist die von Butler angezeifelte Berechtigung der von ihm im vorigen Jahre beschriebenen *Glaucopis*-Arten *Pagenstecheri*, *dubia* und *Paula* nach; *Pagenstecheri* gehört mit *Gl. (Hira) coelipennis* vielleicht als Lokalform zu einer Art; *Polymena* L. var. *Butleri* erkennt auch Röber für identisch mit *Celebensis* Butt., sieht aber in dieser, wie auch in *fraterna*, *orientalis*, *Laura*,

Siamensis und Formosana *Butl.* nur Abänderungen, z. Th kaum besondere Lokalformen von *Gl. Polymena*. — *Corrbl. Entom.-Ver. „Iris“* No. 5, S. 338—340.

Eupyra splendens (Ecuador); P. Dognin, *Le Naturaliste*, 1888, S. 152 mit Holzschn.

Inope impellucida (Wladiwostok); Graeser, *Berlin. Entom. Zeitschr.*, 1888, S. 108.

Ino orana (Sebdu, Algier); G. T. Baker, *Trans. Entom. Soc. London*, 1888, S. 117.

Macroceme Hesione (Panama); H. Druce, *Ann. a. Mag. N. H.*, (6), II, S. 239.

Mastigocera splendens (Bahama-I); H. Druce, *Ann. a. Mag. N. H.* (6), II, S. 240.

Northiaulmivora (Chabarofka); Graeser, *Berlin. Entom. Zeitschr.*, 1888, S. 107.

Syntomis minor (zw. Kala Pani und Abbotabad, westl. Indien); W. Warren, *Proc. Zool. Soc. London*, 1888, S. 294.

J. B. Smith spricht auch in *Societ. Entomol.*, III, S. 1, aus, dass *Zygaena* nur zwei Innenrandadern an den Hinterflügeln hat; die angebliche dritte ist eine einfache Falte; *Societ. Entomol.*, III, S. 1; Möschler erkennt dies als richtig an; ebenda, S. 17.

F. Rühl spricht die Vermuthung aus, dass die Gattung *Zygaena* erst in diesem Jahrhundert zu variieren und sich in eine grössere Anzahl von Formen zu spalten begonnen habe; *Societ. Entom.*, III, S. 50, 65f.

Standfuss hält nach wie vor *Zygaena rubicunda* *Hb.* für eine gute Art und bildet zum Beweise für ihre Artberechtigung die männlichen Begattungswerkzeuge neben denen von *Z. pilosellae* und *punctum* ab; *Berlin. Entom. Zeitschr.* 1888, S. 236—238.

Z. Oberthüri (Sebdu); G. T. Baker, *Trans. Entom. Soc. London*, 1888, S. 118.

Thyrididae. *Thyridophora* (n.g.) *fenestrata* (Campbellpore); W. Warren, *Proc. Zool. Soc. London*, 1888, S. 311.

A. R. Grote findet die von J. B. Smith vorgebrachten Gründe für eine Ausschlössung der Gattung *Platythyris* von den *Thyrididen* nicht für ausreichend; *Entomol. Americana*, IV, S. 78f.

Agaristidae. *Pseudalypia Walkeri* (Akapulko, Mex.); H. Druce, *Ann. a. Mag. N. H.*, (6), II, S. 239.

Sesiidae. J. J. Rivers beschreibt das Weibchen von *Aegeria impropria* *H. E.*; *Entomol. Americana*, IV, S. 99.

Melittia Kulluana (N.-W. Himalaya); F. Moore, *Proc. Zool. Soc. London*, 1888, S. 392.

Drei im unteren Rheingau neuerdings aufgefundenene Sesien sind *S. ichneumoniformis*, *affinis* und *chrysidiformis*; Fuchs, *Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk.* Wiesbaden, 41, S. 50—64; vgl. d. vor. Ber. S. 139.

Sphingidae. J. B. Smith stellt eine List of the *Sphingidae* of temperate North America auf, die 85 Arten enthält; *Entomol. Americana*, IV, S. 89—94.

Derselbe veröffentlicht in den *Trans. Amer. Entom. Soc.*, XV, S. 49—242. Pl. IV—XIII, a *Monograph of the Sphingidae of North America, north of Mexiko*, mit voller Berücksichtigung der Literatur. Die Tafeln enthalten zumeist die Abbildungen der männlichen Begattungsorgane, die aber für die Unterscheidung der Unterfamilien noch nicht zu verwenden sind. Für die Gattung *Phlegethontius* *Hüb.* ist *Protoparce* *Burm.* angenommen, und

Daremma ist als Synonym von *Ceratoma* fallen gelassen. Eine ausführliche Besprechung von C. H. Fernald s. in den Entomol. Americana, IV, S. 177f.

Dahira (n. g. prope Pergesam) *rubiginosa* (Mundi, N.W. Himalaya); F. Moore, Proc. Zool. London, 1888, S. 391.

Aleuron tachasara (Panama); H. Druce, Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 236.

Ambulyx placida (N.W. Himalaya); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 390.

Ampelophaga fasciosa (Dharmasala); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 391.

Amphonyx Staudingeri (Nikaragua; Panama); H. Druce, Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 237.

Choerocampa Jocasta (Guatemala); H. Druce, Ann. a. Mag. N. H. II, S. 237.

Deilephila Galii häufig bei Deal 1888; Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 111f. (Von Bonn kann in diesem Jahre dasselbe gemeldet werden; Refer.)

Euproserpinus Euterpe (San Diego, Kalif.); H. Edwards, Entom. Americ., IV, S. 25.

Hemaris simillima (Kangra Valley, N.W. Himalaya); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 391.

C. M. Weed beobachtete als Schmarotzer der Raupen von *H. diffinis* *Rhogas fumipennis* Cress. und *Apanteles Limenitidis* Rsl. var.; in letzterer schmarotzt als sekundärer Parasit eine wahrscheinlich unbeschriebene *Hemiteles*-Art; Entomol. Americana, IV, S. 147—149.

Hyloecus haterius (Mexiko; Yukatan); H. Druce, Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 239.

Isognathus yucatanus (Y.; Mexiko); H. Druce, Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 239.

Pachygonia ericea (Panama); H. Druce, Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 235.

Perigonia tacita (Panama); H. Druce, Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 236.

Polyptychus trilineatus (Dharmasala); F. Moore, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 390.

E. B. Poulton nährte eine Raupe von *Smerinthus ocellatus* bis zum letzten Stadium mit Nussblättern; 30 Eier waren auf diese Pflanze gesetzt, aber nur 2 Räupchen nahmen das ungewohnte Futter an; Proc. Entom. Soc. London, 1888, S. XXVII f.

Lucas fand die Raupe von *Sphinx Pinastri* auf *Paulownia imperialis* fressend; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LXXXIX.

The Ontogeny of *Sphinx Convolvuli*; Poulton, Proc. Entom. Soc. London, 1888, S. XXXII.

Hesperiadae. Diagnoses de Lépidoptères (Hespérides) nouveaux, par P. Mabille. Le Naturaliste, 1888, S. 77, 98, 108, 146, 169, 180, 221, 242, 254, 265, 275 mit Holzschn.

Lignystola (n. g.) *Pemphigargyra* (Chiriqui); P. Mabille, Le Naturaliste, 1888, S. 221.

Nerula (n. g. *Pythonidi* affine) *nautes* (Brasil.; Porto Cabello) Fig. X, *abbreviata* (Chiriqui) Fig. 5, *Pelia* (Unt. Amazon.) Fig. 6; P. Mabille, Le Naturaliste, 1888, S. 255.

Pachyneuria (n. g.) *obscura* (Chanchamayo); P. Mabille, Le Naturaliste, 1888, S. 275, Fig. 1.

L*

Plestia (n. g. *Eudamo* affine) *Staudingeri* (Guatemala); P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888, S. 146 mit Holzschn.

Achlyodes violacea (Zamora und Loja, Ecuador); Dognin, Le Naturaliste, 1888, S. 67.

Anastrus eugramma (Chiriqui); P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888, S. 221, Fig. 2.

Anisochoria albida (Südamerika); P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888, S. 242 mit Holzschn.

Apastus bilineatus (Ecuador); Dognin, Le Naturaliste, 1888, S. 68 mit Holzschn.

Augiades otinas (?); P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888, S. 146 mit Holzschn.

Carterocephalus Dieckmanni (Wladiwostok); Graeser, Berlin. Entomol. Zeitschr. 1888, S. 102.

Casyapa lunula. (Waigion) Fig. 4, *naevifera* (Batjan) Fig. 5; P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888, S. 77.

Chaetioneme? Lidderdali (Sikkim); H. J. Elwes, Trans. Entomol. Soc. London, 1888, S. 459.

Cyclopides Puelmae (Chili); Wm. Bartlett-Calvert, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 34.

Cyclosemia albata (Chanchamayo) Fig. 1, *Parus* (Porto Cabello) Fig. 2; P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888, S. 265.

Ephyriades palica (Pebas) Fig. 4, *xantholeuce* (Chiriqui) Fig. 5; P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888, S. 242.

Erycides Mazares (Südamerika) Fig. 1, *maximus* (Bras.) Fig. 2, *Perillus* (Antioquia) Fig. 3; P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888, S. 77.

Eudamus leucites (Columbien) S. 98, Fig. 2, *calenus* (Guatemala) Fig. 3, *Megacles* (?) Fig. 4, *Callias* (?) Fig. 5, S. 99, *Clewas* (Brasil.) Fig. 1, *metallescens* (ibid.) Fig. 2, S. 108, *leucogramma* (Porto-Cabello) Fig. 3, *glyphyrus* (Blumenau) Fig. 4, *Talhybius* (Brasil.) Fig. 5, S. 109; P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888.

Chrétien fing *Hesperia Nostradamus* (neu für Frankreich) am Golf von Juan, Meer Alpen; die Art hat vielleicht 2 Generationen; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXXV.

Leucochitonina chalybs (Chanchamayo) Fig. 1, *orbiger* (Brasilien) Fig. 2; P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888, S. 242.

Metrocoryne atilia (Minahassa); P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888, S. 98 mit Holzschn.

Nisoniades Petale (San Paulo); P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888, S. 221, Fig. 1.

Pamphila Ormuzd (Kabadian); Grumm-Grshimailo, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 307.

Zur Unterscheidung von *Parnara colaca* Moore und P. Beavani Moore s. H. J. Elwes, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 446, 446 mit 2 Holzschn., der ebenda auf S. 448 P. Austeni Moore abbildet.

Plesioneura Lamus (Obidos); P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888, S. 275, Fig. 2, *bistriata* (Kilimandscharo); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 97.

Pyrus zebra (Campbellpore); A. G. Butler, Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 207.

Pythonides Polla (Costa-Rica) Fig. 1, S. 254, *subornatus* (Panama) Fig. 2, S. 255; P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888.

Telegonus erythras (Unter. Amazon.) Fig. 3, *Gildo* (Coary) Fig. 4, *Galeus*

(Chanchamayo) Fig. 5, *glarus* (Unter. Amazon.) Fig. 6; P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888, S. 147, *heras* (Porto Cabello) Fig. 1, *Dexo* (Chiriqui) Fig. 2, S. 169, *Euathlus* (ibid.) Fig. 3, *Mithras* (Porto Cabello) Fig. 4, *Gallius* (Chiriqui) Fig. 5, S. 170; derselbe ebenda.

Telemiades *Misitheus* (Chanchamayo) Fig. 3, *megallus* (Rio San Juan) Fig. 4; P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888, S. 221.

Thymele *Gryllus* (Chiriqui); P. Mabilie, Le Naturaliste, 1888, S. 147 mit Holzschn., *virgatus* (Pebas, Brasil.) Fig. 6, *Eudemus* (Chiriqui) Fig. 7, *viridans* (Ob. Amazon.) Fig. 8, S. 170, *fulviluna* (Blumenau) Fig. 9, S. 171, *Neobulus* (Brasil.) Fig. 1, *Eudicus* (Sta. Catharina) Fig. 2, S. 180, *Euphronius* (Yuruty) Fig. 3, S. 181; derselbe ebenda.

Lycaenidae. S. H. Scudder sprach in dem meet. der Entom. Sect. der Boston Soc. Nat. Hist. am 23. März 1887 über die ausstülpbaren Organe und Drüsen auf der Rückenseite der Larven einiger Lycaeniden. An dem 7. Hinterleibsringe findet sich ein Querspalt, aus welchem eine kleine Blase hervorgestülpt werden kann; diese lockt Ameisen an; neben den Stigmen des folgenden Segments ist ein Paar ausstülpbarer Organe, deren Spitze mit einer Krone von Borsten endigt; der Zweck dieser Organe ist noch nicht aufgeklärt. — Das erstere Organ findet sich wahrscheinlich in den Raupen aller Lycaeninen und auch bei einigen Theclinen (*Lyc. pseudargiolus*, *Comyntas*, *argiolus*, *Icarus*, *minima*, *Iolas*, *Aegon*, *Admetus*, *Corydon*; *Thestor ballus*; *Thecla Ilicis*, *roboris*); fehlt in *Th. strigosa*, *Quercus*, *Rubi*, *spini*, *Betulae*; *Heodes Phlaeas*, *hypophlaeas*; *Femisea Tarquinius*. — Die seitlichen Organe sind weniger verbreitet; sie sind nachgewiesen bei *L. Comyntas*, *pseudargiolus*, *argiolus*, *Aegon*, *Admetus*, *Corydon* und *Thestor ballus*, fehlen dagegen bei den übrigen oben genannten Arten. — Proceed., XXIII, S. 357f.

Pseudaletis (n. g.) *Agrippina* (Kamerun); H. H. Druce, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 259.

Notes on *Eumaeus atala* by E. A. Schwarz s. Insect life I, S. 37—40 mit Holzschn.

Hypolycaena (*Tatura*) *pachalica* (Wadelai); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 69.

Larinopoda albula (Addah); H. H. Druce, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 108.

Liptena rubrica (Kamerun); H. H. Druce, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 108.

Verbreitung der auf *Cotyledon laxa* lebenden *Lycaena Sonorensis* Feld. s. bei W. G. Wright, Entomol. Americana, IV, S. 71f.

Lycaena Tancrei (Nikolajefsk); Graeser, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 77, *Eleusis* (Nubien); Demaison, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LXVI, *Bellona* (Afghanistan), *kogistana* (Darwaz), *Dagmara* (ibid.), *chrysopsis* (Hindukusch); Grumm-Grshimaïlo, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 306.

Polyommatus dispar. var. *Dahurica* (Pokrofska); Graeser, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 75, *Solskyi Ersch.* var. *fulminans*, Thersamon *Esp.* var. *alaica*, *Alpherakii* n. sp. (Hindukusch); Grumm-Grshimaïlo, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 305.

Pseuderesia Helena (Addah); H. H. Druce, Ent. Monthl. Mag., XXV, S. 108.

Teriomima Melissa (Addah); H. H. Druce, Ent. Monthl. Mag., XXV, S. 109.

(*Thecla*) *Roboris* ist wegen ihrer unbehaarten Augen eine *Lycaena*; A. Speyer, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 211f.

Die Raupe von *Thecla Rubi* frisst auch *Vaccinium vitis-idaea*; Fletcher, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 15.

Tingra tripunctata (Addah); H. H. Druce, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 109, *mylothrina* (Monbuttu); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 67.

Satyridae. *Coenonympha pavonina* (Hai-ho), *Sinica* (Djin-ta-sy); S. Alpheraky, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 66.

Über *Epinephele Eudora* var. *Lupinus Costa* und sein von *Eudora* verschiedenes Benehmen, das ihn als berechnigte Art erscheinen lässt, s. L. De-preto, Societ. Entomol., II, S. 172.

Erebia Tyndarus Esp. var. *Dromus H.-Sch.* in der Schweiz (les Vents ob Gryon, in Kanton Waadt); Christ, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 47.

E. mongolica (Tschatir-Kuhl); N. Erschoff, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 199, Taf. XI, Fig. 8.

C. v. Gumpenberg hat Beiträge zur Kenntniss der Gattung *Erebia Dalm.* gesammelt; Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 365—393. Nach der Gattungsdiagnose sind mehrere Arten auszuschneiden: *Maracandica*, *Jordana* etc. als *Epinephele*, *Clytus* als *Pararge* u. s. w. Abzüglich 5 dem Verfasser nicht in Natur bekannten Arten unterscheidet er derselben 49, die er auf drei Herkunftsmittelpunkte zurückführt, einen nordpolaren, asiatischen und uralpinen; von dem asiatischen sind die meisten (31) Nachkommen ausgegangen. Die Arten sind nach der Zeichnung der Unterseite der Hinterflügel in Gruppen gebracht und dann weiter unterschieden, katalogisirt und mit Noten versehen.

Melanargia Halimede Mén. var. *lugens* (Kiukiang); Honrath, Entom. Nachr., 1888, S. 161.

Nach Möller ist *Mycalasis Langi de Nicév.* von *M. nicotia Hew.* verschieden; sie kommt im ersten Frühjahr in einer Form mit kleinen Augen (auf den Flügeln) vor, während im Mai und August eine Form mit grossen Augen fliegt; ein Weibchen der letzteren ist auf Pl. IX, Fig. 5 abgebildet. Die Frühjahrsform kommt mit der seltenen *nicotia* zusammen vor, in einer Höhe von 2000—5000'; *nicotia* fliegt nur im Frühling; H. J. Elwes, Trans. Ent. Soc. London, 1888, S. 806 f.

Oeneis Hora (an Bore var. ?; Transalai); Grumm-Grshimaïlo, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 807.

Satyrus Staudingeri B.-Haas var. *gultschensis* (Gultscha), *boloricus* n. sp. (Hindukusch); Grumm-Grshimaïlo, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 807, *Dryas* var. *paupera*! (Honton); S. Alpheraky, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 67.

Ypthima pupillaris (River Dangu; Ganyese Tambu), *albida* (Fóda); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 59, *Kalelonda* (Kalelonda, Celebes); J. O. Westwood, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 475, Pl. XII, Fig. 4.

Morphidae. *Discophora spilopectera* de Nicéville & Möller (Sikkim); H. J. Elwes, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 331.

Lemoniadae. *Libythea orientalis* (Guadalcanar Isl.); Godman & Salvin, Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 211.

Acraeadae. *Acraea pollonia* (Guadalcanar Isl.); Godman & Salvin, Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 210.

Planema montana (Kilimandscharo); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 91.

Nymphalidae. Die an der Unterseite eines Blattes angeheftete Puppe einer *Adolias*-Art gleicht zum Verwechseln einer durch üblen Geruch ausgezeichneten grünen Pentatomide; *A. Corezia* pflegt sich, abweichend von der Gewohnheit ihrer Verwandten und der Tagsschmetterlinge überhaupt, auf die Unterseite der Blätter niederzusetzen; Weyers, Bull. Soc. Entom. Belg., 1888, S. XXVI.

Swarming of Hackberry butterfly (*Apatura Celtis*). Von diesem Schmetterling, dessen aus überwinternden Raupen sich entwickelnde 1. Generation gewöhnlich erst im Juni, und dessen 2. Generation im August fliegt, zeigte sich am 24. Mai d. J. im Mississippi-Thal bei Memphis ein Schwarm von Millionen von Individuen. Insect life, I, S. 28f.

Argynnis paphia ab.; B. Friedländer, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 491, Taf. VII, Fig. 1.

Argynnis Oscarus var. *australis* (Wladiwostok), *Iphigenia* n. sp. (Nikolajefsk); Graeser, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 90.

Arg. aglaja L. ab. *Wimani*, S. 103, Fig. 1, ab. S. 104, Fig. 2; *Adippe* ab. *Vareni* S. 104, Fig. 3; E. Holmgren, Entomol. Tidskr., 1888, S. 103—106 mit Holzschn.

Ueber die Verbreitung und den etwaigen Ursprung der var. *valesina* von *Arg. paphia* s. Proceed. Entom. Soc. London, 1888, S. IV—VI; Xlf.

Atella ephyra (Solomon Isl.); Godman & Salvin, Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 97.

Athyma orientalis (Sikkim); H. J. Elwes, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 354, Pl. IX, Fig. 4.

Charaxes Pyrrhus var. *Kronos* (Neu-Pommern); Honrath, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 250, *epigenes* n. sp. (Guadalcanar Isl.); Godman & Salvin, Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 210.

Larve und Puppe von *Cynthia Ereta*; N. Manders, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 37f.

Cynthia sapor, S. 95, *catenes*, *Clodia* S. 96 (Solomon Isl.); Godman & Salvin, Ann. a. Mag. N. H. (6), I.

Diadema scopas (Solomon Isl.); Godman & Salvin, Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 98.

Doleschallia sciron (Solomon Isl.); Godman & Salvin, Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 98.

Euryphene violacea (Kilimandscharo); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 91.

Junonia infracta (Tobbo; Védada; Kilimandscharo); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 63.

Melitaea Athalia Rott. var. *helvetica* (Graubündten); F. Rühl, Societ. Entom., III, S. 137.

Messaras Woodfordi, *pallescens* (Solomon Isl.); Godman & Salvin, Ann. a. Mag. N. H. (6) I, S. 97, *ophthalmicus* (Talissee Isl., Celebes); J. O. Westwood, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 473, Pl. XII, Fig. 3.

Mynes Woodfordi (Solomon Isl.); Godman & Salvin, Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 99, *hercyna* (Guadalcanar Isl., ibid.); dieselben, ebenda S. 211.

Neptis pisias (Solomon Isl.); Godman & Salvin, Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 98.

Parthenos *Aspila* (Kaiser-Wilhelmsland); Honrath, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 248, Taf. V, Fig. 2.

Perisama *Davidi* (Loja, Ecuador); Dognin, Le Naturaliste, 1888, S. 67 mit Holzschn. (wird als *P. Hazarma Hew.* erkannt, S. 95).

Phyciodes *Rosina* (Numbala, Ecuador); Dognin, Le Naturaliste, 1888, S. 48 mit Holzschn., *Miriam* (Loja), S. 66 mit Holzschn.

Prothoë *Schönbergi* (Kaiser-Wilhelmsland); Honrath, Berlin. Ent. Zeitschr., 1888, S. 249, Taf. V, Fig. 3.

Vanessa levana und xanthomelas bei Steegen und Heubude; Brischke, Schrift. Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F., VII, 2. Heft, S. 197.

J. Morison fand in seinem Hause am 9. Januar eine Vanessa Urticae, von der er als sicher annimmt, dass sie kurz vorher aus der Puppe geschlüpft war; Nature, Vol. 37, S. 321.

V. l-album verbindet die Gattung Vanessa s. str. mit Grapta *Kby.* (Polygonia *H. Verz.*) und spricht gegen eine Trennung beider; sollte eine solche aber doch beliebt werden, so wäre die Art eher zu Polygonia als zu Vanessa zu stellen; A. Speyer, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 213.

V. c-album var. *tibetana* (Sikkim); H. J. Elwes, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 363, Pl. X, Fig. 1.

Danaidae. Haase kommt durch das genauere Studium der Duftapparate dieser Abtheilung zu dem Schlusse, dass eine grosse Zahl von Gattungen nicht einmal mehr als Untergattungen beizubehalten sind. So sind bei Danais Radena, Ravadeba, Bahora, Phirdana, Asthipa, Mangatisa, Parantica, Caduga, Chittira zu der Untergattung Radena zu vereinigen; Melinda mit der Unterg. Tirumala; Nasuma, Tasitia, Limnas und Salatura mit Anosia. Bei Euploea sind nur die 3 Untergattungen Crastia (ohne Spiegel), Salpinx (mit Spiegel) und Trepsichrois (mit Spiegel und Zottenpelz) beizubehalten. Corrb. Entom. Vereins „Iris“, No. 5, S. 288—301.

Amauris *Hanningtoni* (Kilima-njaro); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 91.

Danais *cometho* (Solomon Isl.); Godman & Salvin, Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 90, *garamantis* (Guadalcanar Isl., *ibid.*); dieselben ebenda S. 210.

Euploea *Hansemani* (Kaiser-Wilhelmsland); Honrath, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 248, Taf. V, Fig. 1, *Woodfordi* S. 90, *pyrgion*, *pronax* S. 91, *Prusias*, *Polymela*, *Asyllus* S. 92, *Gerion!*, *Heurippa* S. 93, *pyres* S. 94 (Solomon Isl.); Godman & Salvin, Ann. a. Mag. N. H. (6) 1.

Hamadryas *evages*, *Hiero* (Solomon Isl.); Godman & Salvin, Ann. a. Mag. N. H. (6) I, S. 95.

Pieridae. The egg and young larva of Anthocharis Cardamines; by T. A. Chapman, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 257—259.

Archonias *incerta* (Zamora; Loja, Ecuador); Dognin, Le Naturaliste, 1888, S. 48 mit Holzschn.

Belenois *instabilis* (Fóda) S. 76, *dentigera* (Gadda), *infida* (Waddelai) S. 78; A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888.

Colias Wiskotti *Stgr.* var. *separata* (Alai), var. *chrysoptera* (Afghanistan; Transalai) S. 305, *Marco-Polo* n. sp. (Hindukusch) S. 304; Grumm-Grshimaïlo, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, *chlorocoma* (Kasikoparan); H. Christoph, ebenda S. 308.

Eronia dilatata (Taveta, Kilimandscharo); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 96.

Glutophrissa contracta (Wadelai); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 75.

Herpaenia iterata (Kilimandsch.); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. Lond., 1888, S. 96.

Hesperocharis aureomaculata (Loja, Ecuador); Dognin, Le Naturaliste, 1888, S. 68 mit Holzschn.

Mylothris Clarissa (Wadelai); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 70, *Narcissus* (Kilimandscharo, Wälder von Tiveta); derselbe, ebenda S. 95.

Pieris erutae Boisd. ined. (Mou-Pin) und var. *extensa*; Poujade, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XIX, *Ngasiya* (Grande Comore) S. XLI, *Humboldtii* (ibid.); S. XLII; Charles Oberthür, ebenda, *tadjika* (Darwaz), Krueperi Stgr. var. *mahometana* (ibid.); Grumm-Grshimaïlo, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 304, *Potanini* (Berge der Mongolei); S. Alpheraki, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 66.

Tachyris Phestus (Talissee Isl., Celebes); J. O. Westwood, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 469, Pl. XII, Fig. 2.

Teracolus Palliseri (Khandesh); A. G. Butler, Ann. a. Mag. N.H., (6), I, S. 418, *punicus* (Wadelai) S. 72, *Bacchus* (ibid.; Lado) S. 73; derselbe, Proc. Zool. Soc. London, 1888, *venustus* (Kilimandscharo), *helvolus* (Somali), *comptus* (Kilimandscharo); derselbe, ebenda S. 94.

T. leo ist von Halimede Klug. verschieden; (Callosone) *vulnerata* Staud. = *T. ineretus* Butl.; Butler, Proc. Zool. Soc. London 1888, S. 92f.

Ein Zuchtresultat lieferte den Beweis, dass *Terias Bethesba* und *laeta* eine Art bilden, für die Pryer deshalb den Namen *biformis* in Vorschlag bringt, wozu die Herausgeber bemerken, dass der erste der beiden Namen bleiben müsse; Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 185.

T. orientis (Ober-Aegypten; Habesch; Victoria Nyanza); A. G. Butler, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 71, *Talissa* (Talissee Isl., Celebes), J. O. Westwood, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 469, Pl. XII, Fig. 1.

Papilionidae. M. C. Piepers schreibt über die Entwicklungsgeschichte einiger javanischen Papilioniden-Raupen; Tijdschr. v. Entomologie, 31. Deel, S. 339—358, Taf. 7, 8. Es werden die Raupen von Pap. Agamemnon, Sarpedon, Jason *Exp.* (= *Eurypylus* L. var.?), Antiphates, Memnon, Polytes in ihren verschiedenen Stadien beschrieben und z. Th. abgebildet. Als allgemeine Resultate sind folgende Thatfachen beachtenswerth. Die jungen Raupen besitzen eine starke Bedornung; die Dornen sind am Ende gegabelt und können wohl als Schutzmittel angesehen werden. Sie verschwinden aber mit wachsendem Alter; wahrscheinlich genügt die vorstreckbare, stark riechende Nackengabel als Schreckmittel und machte die Dornen überflüssig. Ferner sind bei mehreren jungen Raupen zwei Farben scharf getrennt vorhanden; diese fließen zusammen, erscheinen aber im nächsten Stadium, unmittelbar nach der Häutung, wieder scharf getrennt, fließen dann nochmals zusammen, und dieser Vorgang kann sich noch einmal wiederholen, bis zuletzt die Mischfarbe bleibt.

Doritis Mnemosyne L. im Harz (bei Lauterberg) neuerdings gefangen; v. Röder, Entom. Nachr., 1888, S. 316.

Ornithoptera *Plateni* (Palawan) Staudinger, Korrespbl. Entom. Ver. „Iris“, No. 5, S. 274, *Staudingeri* (Ins. Luang), *Iris* (Ins. Letti), J. Röber, Entom. Nachr., 1888, S. 369.

Das im vorigen Jahre (s. d. Ber. S. 147) von O. Salvin als Männchen von *O. Victoriae* beschriebene Exemplar gehört einer neuen Art, *O. reginae*, an; die Unterschiede beider Arten sind einander gegenübergestellt, und *O. Victoriae* ♂ nebst Raupe ist auf Pl. IV abgebildet: *O. Victoriae* ist auf Aola, Guadalcana Isl., Florida Isl., *O. reginae* auf Maleita Isl. der Solomon-Gruppe gefunden; O. Salvin, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 116—119.

Papilio Zaddachii Dew. ist eine dimorphe Form des ♀ von *P. Cacicus*; Honrath, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 253; vgl. über diese Frage Dewitz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 332.

Ch. & R. Oberthür führen Beispiele für mimetische Formen unter Arten der Gattung *Papilio* an; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. X.

P. Sarpedon L. var. *semifasciatus* (Kiukiang); Honrath, Ent. Nachr., 1888, S. 161.

Description of a larva of *P. Gundlachianus* two days prev. to its transform.; by A. Bonzon, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 293f.

Als Ergebniss ausgedehnter Versuche über den Saisondimorphismus des *Papilio Podalirius* giebt Standfuss an: Je heisser die Zeit, in welcher die Entwicklung zum Falter vor sich geht, desto kürzer wird die Behaarung der Stirn und des Thorax, desto lichter und durchscheinender wird das Weiss der Flügel, desto länger und feiner werden die Schwänze, und desto ausgedehnter die helle Färbung an der Spitze derselben, desto weisser endlich Thorax und Leib; Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 234.

P. bicolor Kirby = Lesches *Godm. & Salv.*; O. Salvin, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 275.

P. Aegisthus var. *Aegist(h)iades* (Neu-Pommern), *Schönbergianus* n. sp. (Borneo) Fig. 4. S. 250, *Lysimachus* (Peru) S. 251, Fig. 5; Honrath, Berl. Ent. Zeitschr., 1888, *Megaera* S. 275, (*Antiphus* F. var.?) *Atropos* S. 276, *Helenus* L. var. *Palawanicus*, *Daedalus* Feld. var. *angustatus* S. 278, *Antiphates* Cram. var. *decolor* S. 279 (Palawan-I.); Staudinger, Corbl. Ent. Ver. „Iris“, No. 5, *Humbloti* (Grande-Comore); Ch. Oberthür, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XL, *Polychus* S. 99, *Woodfordi*, *Pisidice* S. 100, *Orsippus* S. 101, (Solomon Isls.); Godman & Salvin, Ann. a. Mag. Mag. N. H. (6), I, *Isander* S. 211, *Mendana* S. 212, *Solon*, *Hecataeus* S. 213, *Laarchus* S. 214 (ibid.); dieselben ebenda, *Langeni* (Ké Isl.) S. 234, *argynnus* (ibid.) S. 235; H. Druce, ebenda II.

Parnassius Mnemosyne var. *Hartmanni* (bairisch. Hochgeb.); Standfuss, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 234, Taf. III, Fig. 1, 2, *Stoliczkanus* Feld. var. *Hunza* (Hindukusch) S. 303, *Delphius Eversm.* var. *illustris* (Transalai) S. 304, *princeps* n. sp. (Karamuk), *Romanovi* (Transalai) S. 303; Grumm-Grshimailo, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII.

E. G. Honrath vermuthet, dass sich die Folgen der bei verschiedenen *Parnassius*-Arten nicht seltenen Kreuzungen an den Fühlern verathen und weist auf mehrere Stücke hin, die als Hybriden gelten könnten; Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 501—503.

Hymenoptera.

In seinem Aufsatz on the pollination of *Phlomis tuberosa*, L., and the perforation of flowers stellt L. H. Pammel die um seine eigenen bereicherten Beobachtungen, über das Durchbohren von Blumenkronen von Seiten der Insekten (und Vögel) zum Zweck

des Raubes von Nektar zusammen; die Insekten sind meistens Arten von *Bombus* und *Xylocopa*; Trans. Acad. Sci. St. Louis, V, S. 256—277, Pl 7.

P. Cameron bringt descriptions of one new genus and some new species of parasitic Hymenoptera; Proc. Manchester literary and philosophical society, XXVI, S. 117—136.

Derselbe desgl. Descriptions of 23 new species of Hymenoptera und leitet diese Beschreibungen mit einer Kritik des Verfahrens ein, die Artengruppen umfangreicher Gattungen zu benennen und zum Range von Gattungen zu erheben; die letzteren würden nur für beschränkte Gegenden Anwendung finden können. Memoirs and Proceedings of the Manchester lit. a. phil. Society (4. S.) I, S. 159—183.

Hymenoptera aculeata nova descripsit F. Morawitz; Hor. Soc. Entom. Ross. XXII, S. 224—302.

Radoszkowski's Etudes hyménoptérologiques ebenda S. 315 bis 387, Tab. XII—XXV, bestehen I. in einer révision des armures copulatrices des mâles. 1. *Bombus* 2. *Philanthus* 3. *Anthophilus* 4. *Salix* 5. *Sphex* 6. *Mutilla*. II. in Description de nouvelles espèces russes.

Derselbe setzt die Faune hyménoptérologique transcaspienne fort; ebenda, S. 338—349.

F. F. Kohl beschreibt (33) Neue Hymenopteren (Aculeata) in den Sammlungen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums; Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, S. 133 —156.

Die 5. der Notes hyménoptérologiques von Thomson enthält weitere Observations sur le genre *Ichneumon*; Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 105—126.

In dem den Campopleginen gewidmeten XI fasc. seiner Opuscula entomolog. theilt Thomson die Ophioniden in die Helwigiina, Ophionina, Trachynotina, Anomalina, Cremastina und Campoplegina. Von letzterer Tribus wird eine synoptische Tabelle der (26) Gattungen aufgestellt; 327 Arten sind beschrieben, darunter 144 neue.

F. Rudow theilt weitere Beobachtungen an Bienennestern mit; Societ. Entomol., II, S. 145, 155f., 171f., 179f.; (*Xiphidria camelus*; *Sphecodes ephippium* und verwandte Arten).

E. Saunders macht einige Notes on Dr. H. Müller's „Fertilisation of Flowers,“ indem er einige Irrthümer Müller's hinsichtlich der Hymenopteren aufdeckt; Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 252—254.

Kronfeld theilt eigene Beobachtungen zur Blumenstetigkeit der Bienen und Hummeln mit; Verh. Zool. Bot. Gesellsch. Wien, 1888, S. 785f.

Buddeberg gibt die Namen einer Reihe von Schlupfwespen (i. w. S.) an, die er bei der Zucht von Käferlarven erhielt; Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 41f.

The hosts of a few larger Ichneumonids (Schmetterlingsraupen) s. in Insect life, I, S. 161.

Friese stellt die Schmarotzerbienen und ihre Wirthe zusammen; Zool. Jahrb., Abth. f. Systematik u. s. w., III, S. 847—870, und versucht eine Darstellung des Stammbaumes der Kukuksbienen. Während von *Bombus* sich *Psithyrus* und von *Anthidium* *Stelis* abgezweigt und zu Schmarotzern ausgebildet haben, ist *Megachile* (und *Eucera*) der Ausgangspunkt für die übrigen geworden, indem sich zunächst *Coelioxys* und von diesem aus 2 Reihen entwickelt haben, die eine aus *Melecta*, *Crocisa*, *Epeolus* mit *Epeoloides* und *Nomada*, die andere aus *Dioxys*, *Ammobates*, *Phiarus*, *Pasites*, *Phileremus* und *Biastes* bestehend.

Bridgman beobachtete auch bei seiner *Limneria Kriechbaumeri* (= *Spudastica petiolaris* Thoms.) das Springen der Cocons. Die Larve drückt die Mitte des Körpers gegen eine Seite und biegt Kopf und Schwanz, bis sie die entgegengesetzte Seite des Cocons etwas von den Enden entfernt berühren. Dann scheint sie sich aufzublähen, als wollte sie bersten, bis Kopf und Schwanz dem Druck nicht mehr widerstehen können und zurückschlagen. — Der Cocon ist eiförmig, chokoladefarben mit einem blassen Gürtel in der Mitte. Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 163.

von Schlechtendal sprach im naturwissensch. Verein für Sachsen und Thüringen über das Vorkommen von phytophagen Schlupfwespen (richtiger Chalcidier); Zeitschr. f. Naturwissensch., Halle, LXI. (4. F. VII) S. 415—419. Unter den Toryminen sind es *Megastigmus collaris* und *pictus*, die in den Samen der Rose, *M. Pistaciae*, der in den Kernen der *Pist. lentiscus* lebt. *Syntomaspis druparum* lebt in den Früchten des Weissdorns und erscheint nach der (gewöhnlich 2 bis 3 maligen) Ueberwinterung im Juni, um die Früchte anzustechen, wobei der Legestachel suchend auf der harten Samenschale gleitet, bis er zur Mikropyle gelangt, durch welche das Ei in den Samen gebracht wird. Unter den Eurytominen scheinen alle *Isosoma*-Arten von Pflanzen zu leben, und zwar vorzugsweise von Gräsern, Frucht-, Halm- und Blattscheidengallen erzeugend. Anschwellungen an den Halmen von *Triticum repens* wurden als Erzeugniß einer der *I. Hordei* ähnlichen Art erkannt; auch an den Früchten von *Stipa capillata* beobachtete v. Schlechtendal *Isosoma*-Gallen. Nur zwei Arten sind von anderen Gewächsen als Gräsern bekannt: *I. Vitis* aus den Kernen der Weinbeere, und *I. Taprobanica* in einer brasilianischen Orchidee.

A. J. Cook hielt im Aug. 1887 vor der Amer. Assoc. f. advanc. of Science einen Vortrag über die morphology of the legs of hymenopterous insects, der im Americ. Naturalist, 1888, S. 193 bis 201 abgedruckt ist mit 10 Holzschn.; er beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Fächer und Kamm an den Vorderbeinen und dem Sammelapparat an den Hinterbeinen.

Bos findet Spuren eines zweiten Schenkelringes bei weit mehr Familien als gewöhnlich angenommen wird. Die Ameisen z. B. gehören zu den *Ditrocha*; Tijdschr. v. Entom. XXXI, Versl., S. LXXXIX.

Derselbe fand, dass Samen verschiedener Pflanzen durch eine 50 %ige Ameisensäurelösung ihre Keimkraft verlieren.

G. Carlet macht vergleichende Angaben über das Gift der Hym. aculeata; Compt. Rend., CVI. S. 1737—1740. Bei *Philanthus*, *Pompilus* u. a. ist die bei den Melliferen nachgewiesene alkalische Drüse rudimentär. Dadurch gewinnt das Gift dieser Arten die Eigenschaft, die Opfer nur zu lähmen nicht zu tödten. Nach Carlet's Meinung ist das durch die Mischung der Sekrete aus den beiderlei Drüsen entstehende Gift tödtlich; das eine Sekret der Fossores allein kann nur lähmen, unabhängig von dem Körpertheile, dem es beigebracht wird. — Ein Reservoir für das Gift kommt nach Carlet nur den Mellifera zu. (!?)

A. v. Planta unternahm eine Analyse des Futterbreies der Bienenlarven; in dem für die königlichen Larven bestimmten ist 69,38 %, für die Drohnen 72,75 % und für die Arbeiterinnen 71,63 % Wasser.

Die Zusammensetzung der festen Bestandtheile zeigt folgende Tabelle:

	Königin.	Drohnen in den 4 ersten Tagen.	Drohnen nach dem 4. Tage.	Ar- beiterinnen.
Stickstoffhaltige. .	45,14	55,91	31,67	51,21
Fette	13,55	11,90	4,74	6,84
Glykose	20,39	9,57	38,49	27,65
Aschenbestandtheile	4,06	..	2,02	..

Da der Futterbrei seiner Zusammensetzung nach variiert, so neigt der Verfasser sich der Meinung zu, dass wir es hier nicht mit einer Sekretion ähnlich der Milch zu thun haben, sondern Schönfeld folgen müssen, der annahm, dass der Futterbrei aus dem Magen stamme, und dass seine Zusammensetzung und der Grad seiner Verdauung von den Bienen nach dem Alter und Geschlecht der zu fütternden Larven verändert werde; Zeitschr. f. Phys. Chemie, XII, S. 327 ff.; vgl. auch E. Bourguelot in Archiv Zool. expériment. et génér., VI (1888) S. XIII—XVI; Journ. R. Microscop. Soc., 1888, S. 942 f.

A. Handlirsch sprach in der Zool. Bot. Gesellsch. Wien, 6. Juni 1888, über Mimikry zwischen Hymenopteren verschiedener Familien. Es handelt sich um 4 Grabwespenarten, die je eine Vespide, und um eine Art, die eine *Scolia* nachahmt. Es sind *Gorytes politus* und *Polybia chrysothorax* aus Brasilien; *G. velutinus* und *Gayella eumenoides* aus Chili; *G. robustus* und *Odynerus Parredesii* aus Mexiko; *G. fuscus* und *Nectarina Lechegana* aus Brasilien; *Stizus tridentatus* und *Scolia hirta* aus Südeuropa. Der Vortheil, den die nachahmende Grabwespe genießt, besteht vielleicht darin, dass sie im Gewande der *Scolia* oder Wespe leichter ihrer Beute, wahrscheinlich Cicadinen, die von einer Wespe nichts zu fürchten haben, beikommen kann. — Die Aehnlichkeit zwischen *Psithyrus*- und *Bombus*-Arten beruht auf wirklicher Verwandtschaft, nicht auf Mimikry; Sitzgsber. S. 67—69.

Die Gattung *Eucera* ist aus *Tetralonia* dadurch entstanden, dass das Venenrohr der zweiten Kubitalquerader untergegangen ist; ebenso *Biareolina* aus *Andrena*. Es dürfen daher *Tetralonia* und *Biareolina* nur als Untergattungen gelten, und obwohl *Tetralonia* die Muttergattung ist, so hat doch *Eucera* als der ältere Name der

ganzen Gattung zu verbleiben. Ähnlich sind bei den Grabwespen *Parapison* und *Aulacophilus* die zweizellige Gattungsform von *Pison*, *Coloptera* von *Ammophila*, *Aporus* von *Pompilus*; Kohl, Fauna von Hernstein, S. 226. Ann.

Lemoine legte der Soci  t   entom. de France Zeichnungen   ber Ei und die Entwicklungsst  nde einer bei *Aspidiotus Nerii* schmarotzenden Teleas vor. Die erste Larvenform hat grosse Mandibeln und Dornen am zugespitzten Hinterende; die zweite Larvenform hat keine Mandibeln und keine Dornen mehr; Bull., 1888, S. XVII f.

Ueber Spinola's *Faunae Liguriaee fragmenta* 1805 und 8 in denselben beschriebene Arten s. v. Dalla Torre, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 249.

A. Handlirsch bringt eine Monographie der mit *Nysson* und *Bembex* verwandten Grabwespen; Sitzgsber. Kais. Akad. Wissensch. Wien. XCV. Bd. 1. Abth. S. 246—420, Taf. I—V; XCVI. Bd. 1. Abth. S. 219—311 Taf. I, II. Behandelt werden 15 Gattungen, von denen einige engere Verwandtschaftsgruppen bilden, ohne aber als Unterfamilien oder gar Familien abgegrenzt werden zu k  nnen. N  her verwandt mit einander sind: *Bothynostethus* und *Scapheutes*; *Alyson* und *Didineis*; *Stizus* und *Sphecius*; *Bembex*, *Monedula*, *Bembidula* und *Steniolia*, w  hrend *Nysson*, *Mellinus*, *Entomosericus*, *Gorytes* und *Exirus*, jede f  r sich, isoliert stehen. *Stizus* und *Gorytes* sind reich an Arten, unter welchen sich mehrere zu Gruppen vereinigen lassen, die aber durch Zwischenformen mit einander verbunden sind. Nach der Ansicht des Verfassers sind diese Gattungen im Begriffe, mit dem Aussterben der Zwischenformen in eine gr  ssere Anzahl von Gattungen zu zerfallen, welche dann einen Gattungskomplex   hnlich dem von *Bembex* und Verwandten bilden.

Die Terminologie der Theile der Brust gr  ndet sich bei Handlirsch auf eine vergleichende Betrachtung eines umfangreichen Materials und schliesst sich den grundlegenden Ausf  hrungen Gerst  cker's und Brauer's an. Bei allen Hymenopteren ist das erste Hinterleibssegment mit dem Thorax verschmolzen (Mittelsegment), aber bis auf die R  ckenplatte, welche jederseits ein Stigma tr  gt, verk  mmert. Ausser diesem Mittelsegment tragen noch Meta- und Mesothorax nahe an ihrem Vorderrande ein Stigmenpaar. Der Mesothorax l  sst an seiner R  ckenplatte gew  hnlich drei hintereinanderliegende Platten sehen, das Praescutum und Scutum, die vereint mit dem hergebrachten Namen Dorsulum bezeichnet werden, und das Scutellum. Die R  ckenplatte des Metathorax, das Metanotum, ist der von den meisten Autoren Postscutellum genannte Theil. — In dem Werke von Andr   sind diese Verh  ltnisse nicht richtig aufgefasst, und auch nicht einmal die vorgeschlagene Terminologie einheitlich beibehalten und durchgef  hrt.

In dem speziellen Theil werden die oben angef  hrten Gattungen in einem Conspectus unterschieden und dann die einzelnen Gattungen in sehr eingehender Weise abgehandelt, indem ihre Morphologie, Biologie, geographische Verbreitung und Literatur ausf  hrlich zur

Darstellung gelangen. Von der Gattung Nysson, deren Lebensweise noch ganz unbekannt ist, sind 64, von Bothynostethus 2, Scapheutes 1, Alyson 7, Didineis 6, Mellinus 9, Entomosericus 2, Exirus 1 Arten beschrieben. Das reiche, z. Th. typische Material, das dem Verfasser zu Gebote stand, setzte ihn in den Stand, die Synonymie mehrfach aufzuklären.

Von Ed. André's Species des Hyménoptères d'Europe et d'Algérie sind Fasc. 27—32 erschienen, von denen 27, 30 und 33 die Fortsetzung der Sphegidae, (T. III.) 28, 29, 31 und 32 den Anfang der Braconidae enthalten (T. IV). Die letztere Familie ist von T. A. Marshall bearbeitet. Die Einleitung schildert den äusseren Bau, die Entwicklung und Lebensweise dieser Thiere, wobei die Literatur in kritischer Weise benutzt ist. (Die Angabe, dass Braconiden, genauer Microgastriden, aus Spinneneiern erzogen worden seien, zieht der Verfasser mit Recht in Zweifel, wenn auch der Grund, den er dafür anführt, nicht stichhaltig ist; er meint nämlich, dass ein Schmarotzer sich zum Verzehren von Eiern nicht eigne, dazu gehörten, „larves butineuses.“ Für die angeblichen in Spinnennestern schmarotzenden Microgaster hat aber Brischke schon nachgewiesen, dass hier eine Verwechslung vorliege, indem das gemeinsame kugelige Gespinnst, in das die aus ihrem Wirth, einer Raupe, ausgekrochenen Microgasterlarven sich einhüllen, irriger Weise für den Eiercocon einer Spinne angesehen wurde, worauf auch Marshall hinweist. Zu weit geht aber Marshall, wenn er auch die Ichneumoniden als Verzehrer von Spinneneiern nicht gelten lassen will; eine ganze Reihe von Beobachtern und auch ich selbst haben Ichneumoniden aus Spinneneiern erzogen, am häufigsten Pezomachus und Hemiteles aus Agroeca-Eiern, dann auch Brachycentrus, Cryptus und Pimpla; die Arten letzterer Gattung erhielt ich wiederholt aus Epeira-Cocons; P. angens einmal in 9 Exemplaren aus einem Eierhäufchen von E. quadrata. Refer.).

L. Provancher setzt seine Additions et corrections à la faune hyménoptérologique de la province de Quebec fort; S. 273—440; Quebec, 1888. (Sphegiden, Vespiden, Apiden, und Supplem. zu den früheren Additions).

G. Riggio und T. de Stefani-Perez schicken eine Nota sopra alcuni Imenotteri dell' Isola di Ustica ein; Il Natural. Siciliano, VII, S. 145—150, Tav. I, Fig. 3—5, indem sie 62 Arten verzeichnen und 3 neue beschreiben.

G. Riggio führt ebenda, VIII, S. 20—22, 57 Arten auf, die z. Th. in dem vorhergehenden Verzeichniss noch nicht enthalten waren.

T. de Stefani behandelt in der Fortsetzung seiner Imenotteri Siculi die Gattungen Scolia, Elis, Sapyga, Tiphia, Myzine, Methoca; ebenda VIII, S. 12—18, 40—44.

Noticie sulla fauna imenotterologia Dalmata, von R. Gasperini, Annuario Dalmatico, Zara, 1887, 208f. (Sonderabdruck). Dieser II. Theil behandelt die Formiciden (6), Mutilliden (8), Scolia-

den (2), Sapygiden (1), Pompiliden (16), Sphegiden (19), Chrysididen (18); vgl. dies. Ber. für 1886, S. 216.

Einige für Deutschland neue Bienen und Wespen sind *Anthophora personata* Illig. bei Strassburg, die bei ihr schmarotzende *Melecta notata* Illig.; *Andrena sericata* Imh. und *nychthemera* Imh. bei Strassburg; *Eumenes unguiculus* Vill. bei Achenheim; *Meliturga* bei Artern; Friese, Entom. Nachr., 1888, S. 103f.

In einem Nachtrag zur Hymenopterenfauna Tirols gibt F. F. Kohl theils neue Fundorte bereits aus Tirol bekannter, theils die Namen von (39) bisher in Tirol nicht gefundenen Arten von Grabwespen an. Von den 232 Arten des früheren Verzeichnisses (1880) sind 11 zu streichen, während hier 39 neue hinzugefügt werden, so dass jetzt aus Tirol 260 Arten bekannt sind. Von diesen sind 172 in Nord- und Südtirol, 83 ausschliesslich in Südtirol und 5 ausschliesslich in Nordtirol beobachtet. Von den 83 Südtirolern gehören 44 den Mittelmeerländern an. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, S. 719—734.

Brauns beschreibt (5) neue Ichneumoniden der Schweiz; Mitth. Sweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 1—9.

E. Hoffer's „Beiträge zur Hymenopterenkunde Steiermarks und der angrenzenden Länder“ geben ein Verzeichniss der Apiden, Vespiden und Mutilliden mit biologischen und geographischen Bemerkungen; Mitth. d. naturw. Ver. f. Steiermark, 1887, S. 65—100.

Brischke bearbeitete neu die Hymenoptera aculeata der Provinzen West- und Ostpreussen; Schrift. Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F., VII. 1. S. 85—107.

In einem Supplement til H. Siebke's *Enumeratio Insectorum Norvegicorum*, Fasc. V Pars I (Hymenoptera phytophaga et aculeata) macht W. M. Schoeyen 13 Phytophaga und 39 Aculeata aus Norwegen zum ersten Mal bekannt; Forhandl. Vidensk.-Selsk. Christiania; 1887, No. 5 S. 3—11.

Blackburn und Cameron schreiben on the Hymenoptera of the Hawaiian Islands; Proc. Manchester literary a. philosoph. soc. XXV, S. 134—183 und Memoirs (3. S.) X, S. 194—244. Da in allen Ländern, wo Coleoptera und Hymenoptera genauer gesammelt sind, die letzteren an Zahl überwiegen, von den Sandwichs-Inseln aber 428 Käfer und 83 Hymenoptera bekannt sind, so ist anzunehmen, dass ein längeres Sammeln noch eine Menge von Hautflüglern zu Tage fördern werde. 14 sind wahrscheinlich durch den Menschen eingeschleppt: *Camponotus sexguttatus*; *Ponera contracta*; *Monomorium specularis*; *Tetramorium guineense*; *Prenolepis longicornis*; *Phidole megacephala*; *Solenopsis geminata*; *Pelopoeus caementarius*; *Polistes aurifer*, *hebraeus*; *Xylocopa aeneipennis*; *Evania laevigata*; *Metacoelus femoralis* und *Spalangia hirta*; die beiden letzteren als Schmarotzer der Stubenfliege. Welche von den übrigen auf natürlichem Wege eingewandert und welche autochthon sind, lässt Cameron unentschieden; er glaubt aber, dass die meisten Arten von *Crabro*, *Odynerus* und *Prosopis* sich aus den Nachkommen von einer oder zwei, vor langer Zeit eingewanderten Arten entwickelt haben.

Tenthredinidae. Ein zweiter Nachtrag zu den Beobachtungen über die Blatt- und Holzwespen von Brischke in den Schriften Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F., VII, 1, S. 6—12 enthält ausser der Beschreibung neuer Arten die Widerlegung der Cameron'schen Vermuthung, dass *Nematus palliatus* eine Varietät von *miliaris* sei; die Unterschiede beider Arten im Larven- und Imago-Zustande sind hervorgehoben. — Die Eier eines unbefruchteten *Cimbex variabilis* entwickelten sich, so dass die schwarzen Augen des Embryo schon erkennbar waren, trockneten dann aber ein, weil die Weidenblätter, in denen sie abgelegt, vertrocknet waren.

Konow verzeichnet 10 von v. Oertzen in Griechenland, den Inseln und Kleinasien gesammelte Blattwespen, unter denen sich 2 neue Arten befinden. Sitzgsber. K. preuss. Akad. Wissensch. 1888, S. 187—198.

A. Jakowlew beschreibt Quelques nouvelles espèces des moches à scie de l'empire Russe; Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 358—376.

Über das durch eine Tenthredinide (*Hoplocampa Xylostei*) erzeugte *Myeloecidium* von *Lonicera* und dessen Verbreitung s. Thomas, Verh. d. botan. Ver. der Prov. Brandenburg, XXIX, S. XXIV—XXVII.

Sphacophilus (n. g. Acordulecer. affine, sed antennis triarticul. distinctum) *Crawii* (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 428.

Konow behandelt die Blattwespengattung *Allantus* Jw.; Deutsche Entom. Zeitschr., 1888, S. 209—220. Dieselbe ist von *Tenthredo* ausser durch die Gestalt der Flügel und Bildung der Fühler durch den Bau des Kopfes zu unterscheiden, der bei *Tenthredo* zwischen den Augen tief muldenförmig ausgehöhlt ist mit einer Stirn, die sich über den Fühlern in zwei Fortsätze spaltet, die an der Spitze zur Aufnahme der Fühler ausgerandet sind. Bei *Allantus* ist der Kopf zwischen den Augen nicht ausgehöhlt; die Stirn über den Fühlern nicht in zwei Fortsätze gespalten, sondern jederseits abgestutzt. Nach der Form des Kopfes zerfallen die europäischen *Allantus*-Arten in die drei Gruppen des *pallicornis*, *viduus* und *Scrophulariae*, von denen die beiden ersten hier in analytischer Tabelle unterschieden sind, mit *A. Persa* (P.) S. 213, *Steckii* (Schweiz), *Parnassius*! (*Parnass*) S. 215, *Graecus* (Gr.) S. 216, *Kussariensis* (*Kaukasus*) S. 219, *clypealis* (Schweiz) S. 220; die beiden letzten Arten gehören zur *Scrophulariae*-Gruppe.

A. Morawitzi (*Piatigorsk*) S. 372, *subcostatus* (*ibid.*), *cephalotes* (*Altai*) S. 374; A. Jakowlew, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII.

Athalia spinarum var. *ruficornis* (*Irkutsk*); A. Jakowlew, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 373.

Kriechbaumer nennt seine *Blennocampa intermedia* wegen des gleichlautenden Namens für eine mittelamerikanische Art *Bl. Tergestina*; Entom. Nachr., 1888, S. 211.

Blennocampa apicalis (Preussen, Larve in Blasen der Blätter von *Tilia microphylla*); Brischke, Schrift. Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F., VII, 1, S. 10.

Camponiscus Tscheki (Niederösterreich, auf Lärchen); Kohl & Rogenhöfer, Fauna von Hernalstein, S. 185, mit Holzschn.

Dolerus melanopterus (Griechenland); Konow, Sitzgsber. K. preuss. Akad. Wissensch. 1888, S. 190, mit analytischer Tabelle der verwandten Arten *D. palustris*, *aericeps*, *pratensis*.

Emphytus nigristigma (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 348, *aztecus* (Orizaba, Mexiko); P. Cameron, Mem. a. Proc. lit. a. phil. soc. Manchester, (4. S.), 163.

Eriocampa superba (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 351.

Euura nigra (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 346.

Fenella Agrimoniae (Preussen) Brischke, Schriften Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F., VII, 1, S. 8, mit 2 *Perilissus* und 1 *Hemiteles* als Schmarotzern. *Harpiphorus Calderoni* (Sevilla); Médina, Le Naturaliste, 1888, S. 268, mit Holzschn. und Act. Soc. Esp. Hist. Natur., 1888, S. 117.

Konow giebt eine analytische Tabelle der *Hoplocampa*-Arten, Sitzgsber. K. preuss. Akad. Wissensch. 1888, S. 187—190, mit H. *Oertzeni* (Sporaden) S. 190.

Lophyrus (*Monoctenus*) *Juniperi* (Kansas, auf *J. virginiana*); Marlatt, Transact. Kansas Academy Sci., X, S. 80—82, mit Tafel, die Larven, das Weibchen, dessen Legescheide, Cocon u. a. w. darstellend.

Macrophya 4 *maculata* F. var. *nigra* (Irkutsk); A. Jakowlew, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 870, *castanea* n. sp. (Turkestan); derselbe, ebenda S. 373, *crassicornis* (Chicoutimi); L. Provancher, a. a. O., S. 352.

Over het oecidium van *Nematus Capreae* van *Salix amygdalina* door M. W. Beijerinck; Versl. en Mededeel. der Koninglijke Akademie van Wetenschappen, Afd. Natuurk. (3. R.) 3. D., S. 11—21; vgl. den vor. Bericht.

Nematus ventralis natural history; by L. O. Howard; Insect life, I, S. 38—37, mit Holzschn.

Der verschollene *N. crassicornis* Htg. ist in England wiederholt aufgefunden und von L. Cameron beschrieben; Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 219.

N. sibiricus (Irkutsk); A. Jakowlew, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 368, *discoidalis*, *frenalis*, *striipes*, *nitens* (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII, *decoratus* (Florida); L. Provancher, a. a. O., S. 349.

Pelmatopus minutus (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entomol. XII.

Phyllotoma fumipennis (Norwich); P. Cameron, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 218.

Schizocerus ebenus Norton, the sweet-potato saw-fly; Insect life, I, S. 43—45, mit Holzschn. Parasit derselben ist *Eubadizon Schisoceri*.

Selandria (?) *Rothneyi* (Barrakporé, Bengalen); P. Cameron, Mem. a. Proc. lit. a. phil. soc. Manchester, (4. S.), I, S. 162.

Strongylogaster cingulatus ist als Larve und Imago variabel, und *geniculatus* Thoms. Varietät von *cingulatus*; Brischke, Schriften Naturf. Gesellschaft Danzig, N. F., VII, 2. Heft, S. 196.

Tarpa ruthena (Krasnojarsk); A. Jakowlew, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 375.

Taxonus floridanus (Jacksonville); L. Provancher, a. a. O., S. 352, *latus* (Irkutsk); A. Jakowlew, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 368.

Un nuovo nemico delle piante fruttifere ist nach A. Ramello *Tenthredo adumbrata* Klug; Ann. d. R. Accad. di Agricolt. di Torino, XXIX.

Tenthredo Bernardi (Schweiz); Konow, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1886, S. 220, *pamyrensis* (P.); A. Jakowlew, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 369, *atra* L. var. *obscurata* (Irkutsk) S. 370, *Lachlaniana* Cam. var. *rubripes* (Jaroslaw), var. *immaculata* (Jaroslaw), *oryssoides* n. sp. (Piatigorsk) S. 371, *Morawitsi* (ibid.) S. 372; derselbe, ebenda.

Uroceridae. *Cephus Parreyssi* Spin. var. *rufiventris* (Piatigorsk); A. Jakowlew, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 373, *politissimus* n. sp. (Armenien); A. Costa, Rendic. d. Accad. d. Sci. fis. e matemat. Napoli, (2) II, S. 108, *interruptus* (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 355.

Riley schildert den Entwicklungsgang des *Phylloecus integer* Norton, dessen Larve in Weidenschösslingen lebt; Insect life, I, S. 8—11, mit Holzschn. Über die Parasiten von *Tremex columba* s. unten bei *Thalessa*.

Ichneumonidae. Schmiedeknecht charakterisirt die europäischen Gattungen der Schlupfwespenfamilie *Pimplariae* in analytischer Tabelle; Zool. Jahrb., Abth. f. Systemat. etc., III, S. 419—444.

Thomson führt in seinen Observations sur le genre *Ichneumon* et descriptions de nouvelles espèces fort. Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 103 bis 125.

Kriechbaumer's Ichneumoniden-Studien 12 und 13 beziehen sich auf die ♂ des *I. extensorius*, *suspiciosus*, *cerebrosus*, *fulvicornis*, *subannulatus*; Entom. Nachr., 1888, S. 9—16, 278—283.

Desselben Pimpliden-Studien behandeln 17. *Poemenia notata* Hgr., 18. *Acoenites saltans* und *fulvicornis* Gr.; 19. *Acoenit. rufipes* Gr.; 20. *Pimpla Schmiedeknechti* Kriechb.; ebenda, S. 337—340.

F. Rudow beschreibt einige neue Ichneumoniden, zumeist aus Süd-europa; ebenda, S. 88—92, 120—124, 129—136.

Allomacrus (n. g. Plectiscin.) *pimplarius* (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Anilasta n. g. Campoplegin.; C. G. Thomson, a. a. O., XI.

Da *Banchopsis* Rud. und *Banchopsis* Kriechb. ganz verschiedene Gattungen sind, so beeilt sich v. Dalla Torre, für den Kriechbaumer'schen Namen jüngeren Datums *Banchoides* zu proponiren; Wien. Entom. Zeitg. 1888, S. 218—220; vgl. dies. Ber. für 1886, S. 218f.

Blapticus (n. g. Plectiscin., für *robustus*, *suspiciosus*, *leucostomus*, *flavipes* und) *dentifer*, *crassulus* (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Callidora n. g. Campoplegin.; C. G. Thomson, a. a. O., XI.

Ephora n. g. Campoplegin.; C. G. Thomson, a. a. O., XI.

Euceribanchus (n. g. Bancho simile) *maculipennis* (Sizilien); Costa, Atti d. R. Accad. sci. fis. e mat. di Napoli (2) I, No. 10, S. 6, Tav. I, Fig. 5.

Gonotypa n. g. Campoplegin.; C. G. Thomson, a. a. O., XI.

Holocremna n. g. Campoplegin.; C. G. Thomson, a. a. O., XI.

Lathroplex n. g. Campoplegin.; C. G. Thomson, a. a. O., XI.

Lathrostisa n. g. Campoplegin.; C. G. Thomson, a. a. O., XI.

Macrochasmus (n. g. Plectiscin.) *alysiina* (Lappland); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Nepiera n. g. Campoplegin.; C. G. Thomson, a. a. O., XI.

Nepiesta n. g. Campoplegin.; C. G. Thomson, a. a. O., XI.

Omorga n. g. Campoplegin.; C. G. Thomson, a. a. O., XI.

Parabatus (n. g., von Paniscus durch den Mangel eines das Hinterhaupt begrenzenden Kiels unterschieden; für *virgatus* Grav. und) *nigricarpus*, *latungula*, *cristatus* (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entomol., XII.

Phobocampa n. g. Campoplegin.; C. G. Thomson, a. a. O., XI.

Synetaeris n. g. Campoplegin.; C. G. Thomson, a. a. O., XI.

M*

Taschenbergia n. g. Pimplin. für (*Mesoleptus*) *modestus* Grav., dessen ♀ von Gravenhorst als *Phytodietus microtarnius* beschrieben wurde; Schmiedeknecht, Zool. Jahrb., Abth. f. Systemat. etc., III, S. 437.

Thranosema n. g. Campoplegin.; C. G. Thomson, a. a. O., XI.

Adelognathus nigriceps, *dimidiatus*, *nigricornis* (Frankreich), *limbatus*, *pilosus* (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Amblyteles strigatorius bei Steegen; Brischke, Schrift. d. Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F., VII, 2. Heft, S. 201.

Amblyteles longigena (Südschweden) S. 112, *anurus* (Schweden) S. 114, *truncicola* (Schweden) S. 115, *limnophilus* (Schweden), *stagnicola* (Südschweden) S. 119, *simplicidens* (Südschweden) S. 120; Thomson, a. a. O., *violaceus* (Italien, Griechenland, aus *Papilio*) S. 84, *fumipennis*! (Südeuropa, aus *Papilio*), *dimidiativentris* (Normandie) S. 85, *varipes* (aus *Oenieris* dispar), *fumipennis*! (?) S. 86, *rufipes* (Portugal; Südfrankr.; Sizilien; Dalmatien), *dromedarius* (Marseille) S. 87, *erythromerus* (Süd- und Mittelfrankreich), *palliventris* (Normandie, aus *Bombyx*) S. 88, *contristans* (Thüringen, aus *Dasych. pudibunda*?), *quadrimaculatus* (Lombardei) S. 89, *Bellemis* (Nordfrankr.), *muticus* (Alpen) S. 90, *sulfureopictus* (Alpen), *erythropygus* (aus *Leucoma Salicis*) S. 91, *ruficornis* (Alpen) S. 92, *siculus* (Palermo) S. 120, *bipunctatus* (Marseille), *flavopictus* (ibid.) S. 121, *croceiventris* (Portugal; Pyrenäen) S. 122, *sexzonatus* (Sizilien), *laticinctus*! (Spanien) S. 123, *collaris* (Normandie) S. 124, *tristis* (Portugal; Südfrankr.) S. 129, *lotharingicus* (L.; Normandie), *zonatus* (Normandie) S. 130, *mauritanicus* (Algier), *severus* (Südeuropa) S. 131, *massiliensis* (M.) S. 131, *bicolor* (Südeuropa), *italicus* (Turin) S. 132, *laticeps* (Italien), *gynandromorphus* (Südeuropa, aus *Lasioch. otus*) S. 134, *triguttatus* (Normandie), *bisonatus* (ibid.) S. 135; Rudow, Entom. Nachr., 1888. (Bridgman erinnert daran, dass mehrere dieser Rudow'schen Namen vergeben sind; Ent. Monthl. Mag., XXV, S. 36).

Anisobas platystylus, *parviceps*; Thomson, a. a. O., S. 122.

Anomalon fulco-hirtum (Amazonen); Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc. XXVI, S. 132.

Arenetra tomentosa Grav. zu St. Gilles gefangen; Bull. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. XXXIX.

Banchus polychromus (Vancouver); L. Provancher, a. a. O., S. 366.

Bassus festatorius (Caltonisetta, Siz.); A. Costa, Rendic. d. Accad. d. Sci. fis. e matemat., Napoli, (2) II, S. 106, *aciculatus* (Ste. Gertrude) S. 368, *auriculatus* (Cap rouge), *mellipes* (Ste. Gertrude) S. 429; L. Provancher, a. a. O.

Cacotropa sericea (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Campoplex gracilis (Hela); Brischke, Schrift. Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F., VII, 1, S. 55.

Catonicrus trichops (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Charops fuscipennis (Los Angeles; aus Raupen der *Melitaea* Chalcedon); L. Provancher, a. a. O., S. 365.

Coleocentrus croceicornis Gr. ♀; Brauns, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 8.

Colpognathus (?) *Magellansis*! (Magellan Ctr.); Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc., XXVI, S. 129.

Cremastus Cookii und var. *rufus* (Illinois; Michigan; aus *Phoxopteris comptana* Fröl.); O. M. Weed, Entomol. Americana, IV, S. 151.

Crypturus Siculus (Castelvetro); Costa, Atti d. R. Acc. sci. fis. e mat. di Napoli (2) I, No. 10, S. 7, Tav. I, Fig. 6.

Cryptus divisorius bei Gossensass; Dalla Torre, 17. Ber. naturw.-mediz. Vereins Innsbruck, Vereinsnachr., S. 4.

C. Myrmecoleonis (aus M. erhalten); F. Rudow, Societ. Entom., III, S. 137 f., *nigricoxis* (Cap rouge), *spissicornis* (Ste Gertrude), *Fletcheri* (Vancouver); L. Provancher, a. a. O., S. 361, (*Gambrus*) *maculatus* (Westpreussen); Brischke, a. a. O., VII, 1, S. 106.

Echthromorpha flavo-orbitalis (Hawaii); Cameron, Proc. Manchester literary a. philos. soc. XXV, S. 178.

Ephialtes parallelus, heteropus (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Euceros grandicornis Holmgr. ist wahrscheinlich die gewöhnliche Form des ♂ von *E. egregius* Holmgr., während die als ♂ der letzteren beschriebene Form eine Varietät darstellt; eine neue, bei München gefangene Art, ist *E. superbus* S. 199, ♂ S. 353; Kriechbaumer, Entom. Nachr., 1888, S. 197—200.

Euryproctus coxalis (Mte. Sile, Calabr.); A. Costa, Rendic. d. Accad. d. Sci. fis. e matemat., Napoli, (2) II, S. 106.

Euxorides Vancouveriensis (V.); L. Provancher, a. a. O., S. 369.

Exenterus laricinus (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Exetastes scutellaris (Berner Oberland); Brauns, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 7, *alpinus* (höhere Alpen); Kriechbaumer, Entom. Nachr., 1888, S. 354.

Exochus lucidus (Ustica); Riggio & de Stefani, Il Natural. Siciliano, VII, S. 148, Tav. I, Fig. 5.

Glypta Phoxopteridis (Michigan; aus *Ph. comptana* Fröl.); C. M. Weed, Entomol. Americana, IV, S. 151.

Jacobs ergänzt die Beschreibung des *Gnathoxys marginellus*, der im männlichen Geschlechte zahlreiche Färbungsvarietäten darbietet; Bull. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. XLVI.

Grypocentrus lucidus (Preussen, aus *Fenusa intermedia*); Brischke, Schrift. Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F., VII, 1, S. 11.

Hemiteles pygmaeus (Preussen, aus *Fenella Agrimoniae*); Brischke, Schrift. Naturf. Gesellsch. Danzig (N. F.) VII, 1, S. 10, *albipalpis* (Hela); derselbe, ebenda S. 59, *hirtus* (Berner Oberland); Brauns, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 5 f., *bellicornis*, *notaticrus*, *clausus*, *ischnocerus*, *cyclogaster* (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Heteropelma Datanae (aus *D. ministra* und *integerrima*); Riley, Insect life, I, S. 177, *longipes* (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 363.

Nach Jacobs hat Wesmael mit Unrecht *Ichneumon ammonius* ♀ Grav. vom Männchen getrennt und für identisch mit *I. caloscelis* Wesm. erklärt; die Art ist jetzt auch in Belgien (Willeriken) gefangen; Bull. Soc. Ent. Belg. XXXI, S. XLIII f.

Die Unterschiede der Männchen von *I. suspiciosus* und *extensorius* s. bei Kriechbaumer, Entom. Nachr., 1888, S. 9—16.

I. laetepictus Costa ist eine *leucogrammus* am nächsten stehende *Platyjabus*-Art; *I. Calabarius* Costa ist neben *rufinus* und *microstictus* zu stellen; derselbe, ebenda, S. 210.

Ichneumon Helensis (Hela); Brischke, Schrift. Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F., VII, 1, S. 58, (*Patroclus*) *Venezuelensis* (V.); Cameron, Proc. Manchester

literary and philosoph. soc. XXVI, S. 128, *mesostilpnus* (Deutschland), *nudicoxa* (Schweden) S. 107; Thomson, a. a. O., *liocnemis* (= *rufinus* Holmgr.), *hypoleus*, *trispilus*, *leucopeltis*, *aequicalcar* (Schweden); derselbe, Opusc. entom. XII, *Saguenayensis* (Chicoutimi) S. 356, *bimaculatus* (Ottawa) S. 357; L. Provancher, a. a. O.

Leptocryptus clavipes (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Limneria Hawaiensis (Oahu); Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc. XXV, S. 180.

Lissonota irrigua (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII, *tristis* (Hela); Brischke, Schrift. Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F., VII, 1, S. 57, *maculiceps* (Amazons); Camerons, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc. XXVI, S. 131, *Steckii* (Sieders) S. 1, *lunigera* (Sierre) S. 2; Brauns, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII.

Megastylus multicolor (Vallombrosa); Costa, Atti d. R. Acc. sci. fis. e. mat. di Napoli (2) I, No. 10, S. 8, Tav. I, Fig. 7, (*Helictes*) *pilicornis*, (Meg. i. sp.) *pleuralis* (Norddeutschland); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Meniscus Ashmeadii (Jacksonville, Florid.); L. Provancher, a. a. O., S. 430.

Mesochorus truncatus Vancouver); L. Provancher, a. a. O., S. 365.

Mesolius grandis, *pulcherrimus*, *subroseus*, *liopleuris*, *longiventris*, *dorsatus*, *nigriscuta* (Schweden); C. H. Thomson, Opusc. entomol. XII, *bisignatus* (Zafferrana, Aetna); A. Costa, Rendic. d. Accad. d. Sci. fis. e. matemat., Napoli, (2) II, S. 107, *Chicoutimiensis* (Ch.); L. Provancher, a. a. O., S. 368.

Mesostenus crassifemur (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII, *albifacies* (Ottawa); L. Provancher, a. a. O., S. 362.

Microcryptus pectoralis (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Miomoris glabriventris (Schweden), *rectangulus* (Frankreich); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Misetus oculatus bei Steegen; Brischke, Schriften Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F., VII, 2, Heft, S. 201.

Monoblastus angulatus (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Ophion longigena, *distans*, *scutellaris* (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Orthocentrus nigricoxus (Ottawa); L. Provancher, a. a. O., S. 369.

Paniscus melamerus (= *testaceus* Holmgr.), *opaculus*, *ocellaris*, *dilatatus*, *brachycerus*, *gracilipes* (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Perilissus Fenellae, *cingulatus* (Preussen, in *Fenella Agrimoniae* schmarotzend); Brischke, Schriften Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F., VII, 1, S. 9.

Pezomachus pilosus (Stiere); E. Capron, Entom. Monthl. Mag. XXIV, S. 217, *niger* (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 362.

Phaeogenes sectus (Vancouver); L. Provancher, a. a. O., S. 358.

Phygadeuon flavipes, *stilpninus*, *armatulus*, *ochrogaster*, *ripicola* (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. Entom. XII, *fusiformis* (= *annulatus* Prov. praecoc.) S. 359, *curticus* n. sp. (Chicoutimi) S. 360; L. Provancher, a. a. O.

Phytodietus superbus (Trinidad) S. 430, *elegans*, *ornatus* (ibid.) S. 431; L. Provancher, a. a. O.

Phyzelus fasciatus (Danzig); Brischke, Schrift. Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F., VII, 1, S. 105.

Pimpla scanica hyperparasitic (in *Limneria vulgaris*); G. C. Bignell, The Entomologist, XXI, S. 140 f., mit literarischen Nachweisen von E. A. Fitch, über den Hypermetamorphismus der Pimpliden.

Pimpla Hawaiensis (Oahu); Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc. XXV, S. 178, *Schmiedeknechti* (Korfu); Kriechbaumer, Entom. Nachr., 1888, S. 389, *varicauda* (Stiere); E. Capron, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 217, *Jason* (Colombia); P. Cameron, Mem. a. proc. Manchester lit. a. philos. soc. (4 S.), I, S. 176.

Im Anschluss an seine Tabellen der europäischen Pimplarien-Gattungen liefert Schmiedeknecht in den Zool. Jahrb., Abth. f. Systematik etc., III, S. 445—542 eine monographische Bearbeitung der Gattung *Pimpla*. Nach derselben enthält die Gattung, ausser 16 nicht mit Sicherheit zu deutenden Hartig'schen und Ratzeburg'schen und 2 zweifelhaften De Stefani'schen, 60 Arten, die unter dem Namen *Pimpla* vereinigt bleiben, indem die Förster'schen Gattungen (mit Ausnahme von *Stilbops*) nicht angenommen sind. Neu sind *P. Moraguesi* (Palma auf Mallorca) S. 479 (*Holmgreni* = *graminellae Holmgr.*, S. 502), (*Stilbops*) *himmeriaeformis* (Thüringen) S. 531.

P. nematorum Rudow = *abdominalis* Grav.; Schmiedeknecht, a. a. O., S. 447.

Platylabus concinnus (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Plectiscus (*Aperileptus*) *obliquus*, (Pl. i. sp.) *bistriatus*, *eury stigma* (Schweden), *subteres*, *curticauda* (Norddeutschland), (*Dialispis*) *crassipes* (Nord- und Mitteleuropa), (*Proclitus*) *longitarsis* (Norddeutschland), *heterocerus* (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Podogaster striatus (Amazons); Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc. XXVI, S. 131.

Polyblastus macrocentrus, *pallicoxa* (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Polysphincta Dictymae (Larve äusserlich am Hinterleib von *D. volupis Keys.*, Nordamerika, schmarotzend); L. O. Howard, Insect life, I, S. 106 f. mit Holzschn., *caudata*, *pictocollis* (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entomol. XII.

Porizon albipes (Cap rouge), *Californicum*! (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 364.

Spudastica petiolaris; Thomson, Opusc. entom. XI. Bridgman erklärt diese Art, die er aus *Taeniocampa gracilis* und *instabilis* erhalten hatte, für synonym mit seiner *Limneria Kriechbaumeri*; Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 163.

Stilpnus deficiens (Ottawa); L. Provancher, a. a. O., S. 859.

Symplexis facialis (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom. XII.

Riley schildert the habits of *Thalessa* and *Tremex*, Insect life, I, S. 168—179 mit Taf. I und mehreren Holzschnitten. *Thalessa lunata* und *atrata* sind äussere Parasiten von *Tremex columba*. Die Weibchen bohren vorzugsweise in Bäumen, die von Larven von *Tr. columba* bewohnt sind; bisweilen führt ihr Instinkt sie aber auch irre. Der lange Legebohrer sucht den Gang einer *Tremex*-Larve zu erreichen und ein Ei hinein zu bringen, der ausschlüpfenden Larve es überlassend, sich ihr Opfer aufzusuchen, an welches sie sich festheftet. Die Angabe Lintner's, dass *Th. lunator* auch an Larven eines Schmetterlings, *Datona*, ihre Eier ablege, beruht wahrscheinlich auf einer Verwechselung von *Heteropelma* mit *Thalessa*. Die Lageänderung, welche der Bohrer und die Stützkappen beim Bohrakte machen, sind sehr genau beschrieben.

H. Samzelius erhielt *Th. superba* (als Parasiten einer *Sirex*-Art) in Skärgård (Südmanien); Entom. Tidskr., 1888, S. 52, 54.

Trogus violaceus (aus Pap. hospiton); Rudow, Entom. Nachr., 1888, S. 84.

Tryphon flavitarsis Costa = *Crypturus argiolus* Gr.; *Tr. nigricarpus* Costa gehört zur Gattung *Oteniscus* Curt.; Kriechbaumer, Entom. Nachr., 1888, S. 211.

Tryphon Schmiedeknechtii (Meklenburg; Wallis); Brauns, Mitth. Schweiz. Entom. Gesellsch., VIII, S. 4, *ceratophorus* (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entomol. XII, *rufopectus* (Ste. Gertrude); L. Provancher, a. a. O., S. 367.

Braconidae. C. M. Weed liefert Descriptions of some new or little known Microgasterinae; Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 294—297.

Euchasmus (n. z. Hecabolin.) *exiguus* (England); T. A. Marshall, a. a. O., IV, S. 211.

Telebolus (n. g. Hecabolin.) *Corsicus* (Ajaccio); T. A. Marshall, a. a. O., IV, S. 203.

Acrisis clavipes Reinh. (Dresden, aus Tannenzapfen); T. A. Marshall, a. a. O., IV, S. 212.

Agathis imperialis (Sizilien); Costa, Atti d. R. Acc. sci. fis. e mat. di Napoli (2) I, No. 10, S. 9, Tav. I, Fig. 8.

Alysia fossulata (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 391.

Aphidaria basilaris (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 396.

Aphidius nigrovarius (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 396.

Aspilota astigma (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 393.

Blacus cuneatus (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 383.

Billups erhielt *Bracon brevicornis* aus *Ephestia Kühniella*; Proc. Entom. Soc. London, 1888, S. XXVIII f.

Bracon Siculus (Palermo) S. 86, *trucidator* (Norditalien) S. 93, *Illyricus* (Albanien) S. 154; T. A. Marshall, a. a. O., IV, *uromelas* (Sardinien), *flicauda* (Lago di Lentini, Sizil.) und var. (Assemini, Sardin.); A. Costa, Rendic. d. Accad. d. Sci. fis. e matemat., Napoli, (2) II, S. 107, *auripes* (Ottawa), *sanguineus* (Los Angeles), *Angelesius* (ibid.) S. 372, *politus* (ibid.) S. 373, *pilosipes* (Trinidad) S. 431, *striatus* (Vancouver) S. 432; L. Provancher, a. a. O., *dolichojura* (Berge bei Bogota); P. Cameron, Mem. a. proc. Manchestr. lit. a. phil. soc. (4 S) I, S. 176.

Centetes americana, schmarotzt in *Megilla maculata* in ähnlicher Weise wie in *Coccin. 5-punct.* und *7-punct.* der *Microctonus terminatus* Nees, der nach Riley ein *Perilitus* ist; Riley, Insect life, I, S. 108 mit Holzschn.

Cameron ersetzt den Namen *Chelonus carinatus* Cam. (nec Cresson) durch *Ch. Blackburni*; Proc. Manchester literary a. philosoph. soc. XXV, S. 181; vgl. dies. Bericht über 1881, S. 221.

Chelonus flicornis (Neu-Mexiko); Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc. XXVI, S. 185.

Dendrosoter Sicanus (Sizilien) S. 243, *ferrugineus* (Arles) S. 247; T. A. Marshall, a. a. O., IV.

Doryctes pallipes (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 375.

Doryctes brachyurus (Ungarn); T. A. Marshall, a. a. O., IV, S. 238.

Eubadizon Schizoceri (aus Sch. ebenus Norton); s. Insect life, I, S. 44 mit Holzschn., *californicus* (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 368.

Iphiaulax americanus (Ste. Gertrude); L. Provancher, a. a. O., S. 371.

Macrocentrus aciculatus (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 360.

Microgaster rubricoxus (Cap rouge) S. 386, *crenulatus* (ibid.) S. 387;

L. Provancher, a. a. O., *facetosus* (Illinois); C. M. Weed, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 296.

Microplitis matorus (New-York; Connecticut) S. 294, *terminatus* (Illinois) S. 295; C. M. Weed, Trans. Amer. Entom. Soc., XV.

Oenone sericea (Ottawa); L. Provancher, a. a. O., S. 394.

Opus niger (Cap rouge) S. 381, *nanus* (Los Angeles), *variabilis* (Cap rouge) S. 382; L. Provancher, a. a. O.

Perilitus nigritus (Ste. Gertrude); L. Provancher, a. a. O., S. 379.

Phaenocarpa rubriceps (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 392.

Prosopha hyalina (Ottawa) L. Provancher, a. a. O., S. 392.

Rhogas rugosulus (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 374.

Sigalphus Caledonicus (Schottland); T. A. Marshall, a. a. O., IV, S. 317.

Vipio phoenix (Sarepta); T. A. Marshall, a. a. O., IV, S. 74.

Zelee basalis (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 380.

Proctotrupidae. L. O. Howard stellt a generic Synopsis of the hymenopterous family Proctotrupidae (Tabelle der Unterfamilien und Gattungen) auf; Trans. Amer. Entom. Soc., XIII, S. 169—178.

Sclerogibba (n. g. Scleroderm. et Perisemo affine) *crassifemorata* (Ustica), Riggio & de Stefani, II Natural. Sicilian., VII, S. 146, Tav. I, Fig. 3.

Camptotera clavata (Ste. Gertrude); L. Provancher, a. a. O., S. 404.

Epyris orientalis (Barrakpore, Bengalen), *Hispanicus* (Gibraltar), S. 169, *apterus* (ibid.) S. 171, *tricolor* (New-Forest) S. 172, *rufipes* (Orizaba, Mexiko) S. 173, *punctatus* (ibid.) S. 174; P. Cameron, Mem. a. Proc. lit. a. phil. soc. Manchester (4 S.), I.

Proctotrupes maculipennis (Greymouth, Neu-Seeland); derselbe, ebenda S. 175.

Sierola monticola (Hawaii) S. 176, *leuconeura* (Lanai) S. 177; Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc. XXV.

Telemonus rufoniger (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 403.

Trichacis auripes (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 403.

Evaniadae. *Aulacus flavipennis* (Dekaya, Ceylon); Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc. XXVI, S. 134.

Gasteryption japonicum (Kobe); P. Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc. XXVI, S. 133, *orientale* (Barrakpore, Bengalen); derselbe, ebenda Mem. a. proc. (4 S.), I, S. 177.

Chalcididae. W. H. Ashmead liefert Descriptions of new Florida Chalcids, belonging to the subfamily Encyrtinae; Entomol. Americana IV, S. 15—17.

Derselbe gibt a revised generic table of the Eurytominae, with descriptions of new species; ebenda S. 41—43; die neuen Arten sind bisher nicht beschrieben.

Derselbe desgl. a revised generic table of the Chalcidinae; ebenda S. 87f.

Arrhenophagus (n. g. Encyrtin.) *Chionaspidis* (Schweden; in den männlichen Exemplaren von *Chionaspis Salicis*); Chr. Aurivillius, Entom. Tidskr., 1888, S. 144—148, Taf. I. — Der Verfasser bemerkt dabei, dass überhaupt die in Cocciden schmarotzenden Pteromalinen stets nur die Männchen heimsuchen.

Bruchophagus n. g. Eurytomin.; W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 42.

Decatomidea n. g. Eurytomin.; W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 42.

Diplodontia n. g. Chalcidin.; W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 87.

Eudecatoma n. g. Eurytomin.; W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 42.

Evoxsoma n. g. Eurytomin.; W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 42.

Eurytomocharis n. g. Eurytomin.; W. H. Ashmead, Entom. Americana, IV, S. 42.

Isosomocharis n. g. Eurytomin.; W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 42.

Isosomodes n. g. Eurytomin.; W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 42.

Isoso(mo)morpha n. g. Eurytomin.; W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 42.

Metadontia n. g. Chalcidin.; W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 87.

Panthalis (! n. g.; Name bei Würmern vergeben) *Blackburni* (Port Lincoln, S. Australien); Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. society, XXVI, S. 122.

Phylloxeroxenus n. g. Eurytomin.; W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 42.

Systolodes n. g. Eurytomin.; W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 42.

Xanthosoma n. g. Eurytomin.; W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 42.

Aphycus niger, *Chrysopae* (aus dem Cocon einer Chr.), *unicolor* (alle von Florida); W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 15.

Belonea erythropoda (Port Lincoln, S. Australien); Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc., XXVI, S. 123.

Chalcis Mikado (Hugita, Japan); Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. society, XXVI, S. 117.

Cleonymus superbus (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 407.

Choreia flavicincta (Florida); W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 17.

Comys cyanea (Florida); W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 17.

Copidosoma variegatum (Amerika, aus *Anarsia lineatella*); Howard, Insect life, I, S. 197.

Dinocarsis pulcher (Florida); W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 17.

Eucyrtus (?) *insularis* (Hawaii); Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc., XXV, S. 182, *Pyralidis* (Florida, aus einer „peach pyralid“); W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 15 (Ashmead schreibt *Eucyrtus*).

Epitranus erythrogaster (Nagasaki); Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc., XXVI, S. 119.

Halticella tinctipennis (Nagasaki); Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc., XXVI, S. 118.

Leptomastix tineavora (Florida, aus einer Tineine); W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 16.

Lophyrocera floridana (Fl.); W. H. Ashmead, Entomol. Americana, III, S. 187.

Mira longipennis (Florida); W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 17.

Monodontomerus usticensis (Ustica); Riggio & de Stefani, Il Natural. Sicilian., VII, S. 148, Tav. I, Fig. 4.

Oraesema violacea, S. 187, *minuta*, S. 188 (Florida); W. H. Ashmead, Entomol. Americana, III.

Perilampna stygius (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 406.

Phaenodiscus armatus (Florida); W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 17.

Prionomastix americana (Florida); W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 16.

Psilophrys armatus, (?) *pulchripennis* (Florida); W. H. Ashmead, Entomol. Americana, IV, S. 16.

Rhopalicus pallipes (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 407.

Cynipidae. P. Cameron handelt On some new or little known British parasitic Cynipidae; 1. The paras. Cyn. descr. by Prof. Westwood in the Mag. of Nat. Hist., 1833. — Eine Vergleichung der Typen ergab folgendes: *Eucolla crassinerva* = *maculata* Htg.; *Clidotoma psiloides* = *bicolor* Gir. = *ruficornis* Thoms.; *Anacharis rufipes* = *Aegilips Dalmani* Reinh.; *Anach. fumipennis* ist eine nicht wieder aufgefundene Art und wird neu beschrieben nebst einer Synopsis der Britischen Aegilips-Arten. Ent. Monthl. Mag., XXIV, S. 209—211.

Acothyreus mellipes (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 438.

Ceroptres dorsalis (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 398.

Cleditoma nigripes (Dulwich) S. 165, *crassiclava* (Sutherlandshire), *Caledonica* (Claddich) S. 166, *striaticollis* (New Galloway), *melanopoda* (London District) S. 167; P. Cameron, Mem. a. proc. lit. a. phil. soc. Manchester (4. S.), I.

v. Schlechtendal überzeugte sich durch Zuchtversuche von der Zusammengehörigkeit der *Chilaspis nitida* und Lwii *Giraud-Wachtl*; Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 245 f.

Dimicrostrophis nigricornis (Ottawa); L. Provancher, a. a. O., S. 436.

Eucoela gracilicornis (Banks of Clyde); P. Cameron, Mem. a. proc. lit. a. phil. soc. Manchester (4. S.), I, S. 168, *minor* (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 398.

Onychia striolata (Barrakpore, Bengalen); P. Cameron, Mem. a. proc. lit. a. phil. soc. Manchester (4. S.), I, S. 164.

Periclistus obliquus (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 397.

Phaenoglyphis forticornis (England); P. Cameron, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 210.

In Weismann's und Ischikawa's „Weiteren Untersuchungen zum Zahlengesetz der Richtungskörper“, Zool. Jahrb., Abth. f. Anat. u. Ontog., III, S. 575—610, Taf. XXV—XXVIII, sind auf S. 587 f., Taf. XXVIII, Fig. 28—30 die Vorgänge bei der Bildung der Richtungskörper und Kopulation der Geschlechtskerne in den Eiern von *Spathogaster tricolor* geschildert. Es werden bei diesen der Befruchtung bedürftenden Eiern zwei Richtungskörper ausgestossen; die Kopulation der Geschlechtskerne geht in der Tiefe des Eikörpers vor sich.

Chrysididae. Von A. de Bormans sind Notes sur les Chrysidides des environs de Bruxelles in dem Bull. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. XX—XXIII abgedruckt.

T. de Stefani fährt in seiner Note sulle Crisididi di Sicilia fort; II Natural. Siciliano, VII, S. 88—95, 114—125, 139—145, 156—161, 177—182, 215—224, 237—244, 273—291.

Tableau dichotomique der bei Brüssel beobachteten Arten von P. Meunier, ebenda, VIII, S. 48—54.

R. du Buysson fährt in seinen Descriptions de Chrysidides nouvelles fort; Revue d'entomologie, 1888, S. 1—18.

Brischke erhielt eine Chrysis aerata aus einer anscheinend unverletzten Made von Osmia adunca; Schrift. Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F., VII, S. 103.

Chr. japonicus (Hitoyoshi) S. 125, pulchellus (Ceylon) S. 126; Cameron, Proc. Manchester literary a. philos. soc., XXVI, Ragusae (Sizilien); Th. De-Stefani, II Natural. Siciliano, VII, S. 218, fulminatrix (Teniet) S. 4, chloropraxis (Ilmenau) S. 5, Anceyi (Oran) S. 6; R. du Buysson a. a. O.

Hedychrum japonicum (Fukui) S. 123, Lewisii (Hitoyoshi) S. 124; Cameron, Proc. Manchester literary a. philos. soc., XXVI, sculptiventre (Oran), Phoenix (Syrien); R. du Buysson, a. a. O., S. 2.

Hedychridium monochroum (Marseille?); R. du Buysson, a. a. O., S. 3.

Philoctetes omaloides (Oran); R. du Buysson, a. a. O., S. 1.

Crabronidae. F. W. Putnam theilt seine Beobachtungen an 2 Wespen mit, die gelähmte Raupen in ihre Brutkammern schleppten; Proceed. Boston Soc. Natur. History, XXIII, S. 465.

Aphanilopterus (n. g.) vagabundus (Sa. Theresa, Bras.); F. Meunier, II Natural. Siciliano, VII, S. 302.

Scapheutes (n. g. Bothynostethi affine; antennae ♂ 12-art., segm. ventrale 7. conspicuum, 8. bifurcatum; XCV, S. 278 und XCVI, S. 229) Mocsáryi (San Paulo, Bras.); Handlirsch, a. a. O., XCVI, S. 232.

Ammophila psilocera (Bucharra) S. 153, nigrohirta (Kaukasus) S. 154; Kohl, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, (Psammophila) alpina (Tirol, von Franzenshöhe bis zur Stifiserjochhöhe, auch Schweiz, Petit-Salève, Berisal); derselbe, ebenda, S. 729.

Ampulex ruficollis (Gibraltar); P. Cameron, Mem. a. proc. Manchester lit. a. philos. soc. (4 S.), I, S. 178.

Anthophilus 14-punctatus (Semipalatinsk) S. 289, elegans (ibid.) S. 290; F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII.

Astutus pictus (Mexiko) S. 146, strigosus (Orizaba, Mex.) S. 147; Kohl, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888.

Blepharipus caspicus (Tschikischljar); F. Morawitz, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 293, nigricornis (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 294.

Bothynostethus nitens (Blumenau, Brasil.); Handlirsch, a. a. O., XCVI, S. 227 und XCV, Tab. II, Fig. 18.

Kohl ergänzt nach Ansicht der Type die Dahlbom'sche Beschreibung von Ceratocolus Loewii Dahlb. und bildet einzelne Theile desselben ab; Fauna von Hernstein, S. 218.

Cerceris opalipennis (Helenendorf, Kaukas.) S. 186, curyanthe (Kauk.), rhinoceros (Syrien) S. 187, Schlettereri Rad. i. l. (Taschkend) S. 188, (Mocsáryi =

orientalis Mocs., aber nicht = *eugenia* Schlett.; der Name *orientalis* wurde aber bereits früher von Smith vergeben, S. 139); Kohl, Abh. Zool. Bot. Gesellsch. Wien 1888, *Stefanii* (Sizilien); Ed. André, a. a. O., III, S. 255.

Cerceris Schlettereri (Hodzent; Taschkent); Radoszkowski, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 335, *aequalis* (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 417. *Corynopus simplicipes* (Turkestan); F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 291.

Crabro *Mauiensis* (Maui) S. 165, *abnormis* (Oahu) S. 169, *adspectans* (Haleakala, Maui) S. 170, *rubrocaudatus* (Mauna Loa, Hawaii) S. 172; Blackburn, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc. XXV, (Lindenus) *aegyptius* (Ä.) (Solenius) *persicus* (Schiras) S. 134, *Schlettereri* (Bozen) S. 135; Kohl, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, (Kriechbaumeri) Kohl ♂ S. 722; derselbe, ebenda, *niger* (Ottawa); L. Provancher, a. a. O., S. 419, *cora* (Greymouth, Neu-Seeland); P. Cameron Mem. a. proc. Manchester lit. phil. soc. (4 S.) I, S. 181.

Kohl beschreibt *Cr. curvitaris* H.-S. (= *Brachymerus* Megerlei Dahlb.) und bildet Afterklappe und Kopf ab; Fauna von Hernstein, S. 217 f.

Nach Pissot verproviantiert *Cr. Wesmaeli* seine in alten Bohrlöchern angelegten Brutzellen mit *Typhlocyba Rosae* und einem grünen Chironomus; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXX.

Didineis Wästneii (Dalmatien) S. 263, *Pannonica* (Südost-Ungarn) S. 264, *crassicornis* (Mittelungarn) S. 266, Tab. I, Fig. 15; Handlirsch, a. a. O., XCVI.

Diodontus Handlirschi (Trafai); Kohl, Verh. Zool. Bot. Gesellsch. Wien., 1888, S. 725.

Diphlebus austriacus (Niederösterreich, aus Gallen von *Cynips* Kollari und *argentea*); Kohl, Verh. Zool. Bot. Gesellsch. Wien, 1888, S. 723 Anm.

Entomosericus concinnus (südöstl. Europa); Handlirsch, a. a. O., XCVI, S. 300, Tab. II, Fig. 19—22, II, Fig. 12—15 und XCV, Tab. III, Fig. 6, 7.

Eucerceris insignis (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 418.

Gorytes ruficornis (Kalifornien) S. 248, *eximius* (ibid.), *laticinctus* (Vancouver) S. 274; L. Provancher, a. a. O., *trichiosoma* (Greymouth, Neu-Seeland); P. Cameron, Mem. a. proc. Manchester lit. a. phil. soc. (4 S.), I, S. 180.

Harpactes transiens (Sizilien); Costa, Atti d. R. Acc. sci. fis. e mat. di Napoli (2), I, No. 10, S. 3, Tav. I, Fig. 2.

Mellinus compactus (?) S. 284, Tab. II, Fig. 7, 8, *obscurus* (Korea) S. 288 Fig. 11, *pygmaeus* (Orizaba, Mexiko) S. 289, Fig. 1; Handlirsch, a. a. O., XCVI.

Monedula nigrifrons (Los Angeles) S. 415, *parata* (ibid.) S. 416; L. Provancher, a. a. O.

Nysson dives (Orizaba, Mexiko) S. 309, Tab. IV, Fig. 8, 24, *Braueri* (Setif, Algier) S. 323, *Capensis* (C.) S. 325, *Saussurei* (Süd-Austr.) S. 332, Fig. 14, *Kolaryi* (reg. palaeart.) S. 342, Tab. V, Fig. 2, *Freyi-Gessneri* (Georgia) S. 355, Fig. 5, *tuberculatus* (Wisconsin; Südcarolina) S. 363, *tomentosus* (Blumenau, Brasil.) S. 369, *Gerstäckeri* (Rhodus) S. 384, Tab. IV, Fig. 18, V, Fig. 19, *Friesei* (Weissenfels a. d. Saale) S. 393; Handlirsch, a. a. O., XCV.

Oxybelus transcaspicus (Askhabad); Radoszkowski, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 345.

Passaloecus abnormis (Wippach in Krain); Kohl, Verh. Zool. Bot. Gesellsch. Wien, 1888, S. 726.

Pelopoeus brachystylus (Chinchoxo) S. 154, (Chalybion) *punctatus* (Sansibar),

laevigatus (ibid.) S. 155; Kohl, Abh. Zool. Bot. Gesellsch. Wien, 1888, *atripes* (Semipalatinsk); F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 271, *caucasicus* (K.); E. André, a. a. O., III, S. 110.

P. spirifex, *pensilis* und *transcaspicus* bei Sevilla; Medina, Act. Soc. Esp. Hist. Natur., XVII, S. 51.

Philanthus andalusiacus (A.); Kohl, Abh. Zool. Bot. Gesellsch. Wien, 1888, S. 140, *Sibiricus* (= Anthoph. Hellmanni *Eversm.* var. B.); Radoszkowski, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 325, *Harringtonii* (Ottawa); L. Provancher, a. a. O., S. 278.

Pison sericeum (Attika); Kohl, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, S. 140.

Sphex Radoszkowskyi (Khiwa), *puncticollis* (Krasnowodsk) S. 151, *anatolicus* (Ephesus) S. 152; Kohl, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888.

Steniolia duplicata (Los Angeles); L. Provancher, a. a. O., S. 414.

Stizus villosus (Sizilien); Costa, Atti d. R. Acc. sci. fis. e mat. di Napoli (2) I, No. 10, S. 2, Tav. I, Fig. 1, *dispar* (Kiltitschinar, Transkasp.) S. 284, *Koenigi* (ibid.) S. 285, *histrio* (ibid.) S. 287; F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Rossic., XXII, *Komarovi* (?) S. 332, *Pluschtschewskii* (Astrachan) S. 334, Taf. XV, Fig. 30; Radoszkowski, ebenda.

Tachysphex (*micans Rad.* S. 143), *Nattereri* (Sudan) S. 144, *melanarius* Helenendorf, Kaukas.) S. 145, *syriacus* (S.) S. 146; Kohl, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888. *Helmsi* (Greymouth, Neu-Seeland); P. Cameron, Mem. a. proc. Manchester lit. a. phil. soc. (4. S.) I, S. 182.

T. caucasicus Rad., ♀ = *dubius*; *dubius Rad.* ♀ wahrscheinlich = *caucasicus*; Kohl, a. a. O., S. 142 f.

Tachytes pygmaea (Aegypten), *japonica* (J.); Kohl, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien 1888, S. 141.

Kohl behandelt die (paläarktischen) Crabronen der Section *Thyreopus Lep.* (Schildwespen, Siebienen) in monographischer Weise; Zool. Jahrb., Abth. f. Systematik etc., III, S. 543—590, Taf. XIV. Ausser den allgemeiner bekannten Arten *cribrarius L.*, *scutellatus Schv.* und *peltarius Schreb.* lagen dem Verfasser in natura vor die vielfach mit jenen verwechselten, fast unbekannten *alpinus Imh.*, *pugillator Costa*, *rhaeticus Kriechb.* & Aichinger und *Korbii Kohl*, sowie die östlichen Arten *filiformis Radoszk.*, *Uljanini Radoszk.*, *sibiricus Moraw.* und *(Thyreus) camelus Eversm.* — Ausser diesen paläarktischen Arten zählt der Verfasser noch 16 aus Nordamerika beschriebene Arten auf und beschreibt *Cr. (Thyreopus) thyreophorus* (Nevada) S. 585, *peltista* (Orizaba, Mexiko) S. 587. — Die nearktische Region ist die einzige, in der bis jetzt ausser der paläarktischen *Thyreopus*-Arten gefunden sind, und dieser Umstand liefert einen Beweis mehr für die Ansicht, dass die nearktische mit der paläarktischen Region zu vereinigen ist.

Th. ingricus (Ingrien, bei Petersburg); F. Morawitz, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 294, *elongatus* (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 298.

Trypoxylon striatum (Ottawa); L. Provancher, a. a. O., S. 288.

Pompilidae. In einer Révision des armures copulatrices des mâles de la famille Pompilidae in den Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, 1888, No. 3, S. 462—498, Pl. XII—XV stellt Radoszkowski die Genitalbewaffnung von 42 Arten der Gattungen *Pompilus*, *Agania*, *Pogonius*, *Aporus*, *Cyphononyx*, *Wesmaelinus*, *Ferreola*, *Pseudoferreola*, *Salius*, *Priocnemioides*, *Priocnemis*, *Ceropalcoides*, *Hemipepsis* und *Pepsis* dar. Die Genitalbewaffnung

von *Ceropales* hat mit der der Pompiliden nur den Besitz der „Genitalpalpen“ gemein; die Gattung bildet wahrscheinlich eine besondere Familie.

Ceropaleoides n. g. für (*Ceropales*) *Komarowii* Rad.; Radoszkowski, a. a. O., S. 486, mit Abbildung der männlichen Genitalbewaffnung auf Pl. XV, Fig. 85.

Priocnemioïdes (n. g. für *Priocnemis fulvicornis* Cress., *flammipennis* Smith, und) *andalusiensis* (A.); Radoszkowski, a. a. O., S. 483, Pl. XIV, Fig. 27.

Pseudoferreola (n. g.) *striata* (Andalusien) S. 478, Pl. XIV, Fig. 20, *incisa* (ibid.) (Algier) S. 479; Radoszkowski, a. a. O.

Agencia (Pogonius) *erythropus* (Attika; Spalato); Kohl, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, S. 150.

Ceropales sibirica (Kultuk; Minusinsk) S. 490, *Mlokosewitzi* (Lagodekhi, Kauk.) S. 491; Radoszkowski, a. a. O.

Ceropales altaica (Semipalatinsk); F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 272.

Cyphononyx tuberculatus (Nepaul); Radoszkowski a. a. O., S. 470, Pl. XIII, Fig. 15.

Ferreola syraensis (Syra), *caucasica* (K.), *rossica* (Saratow; Orenburg) S. 475, *sirdariensis* (Syr-Darja) Pl. XIII, Fig. 18, *Komarowii* (Transkaspien) S. 476; Radoszkowski, a. a. O.

Homonotus rectangulus (Charkow) S. 277, *nasutus* (Astrachan) S. 279, *signativentris* (Tschikischlar, Transkasp.) S. 281, *cyanopterus* (Kiltitschinar) S. 282; F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII.

Brisckke erhielt *Pompilus niger* F., als deren Varietäten er *concinus* und *melanarius* Dahlb. ansieht, aus Gängen in Erlenstämmen, die wahrscheinlich von den Raupen der *Sesia spheciformis* gefressen waren. Schrift. Naturf. Gesellsch. Danzig, N. F., VII, 1, S. 95.

P. galactopterus (Helenendorf, Kaukasus) S. 147, *sericeomaculatus* (Kleinasien) S. 148, *alpivagus* (Bozen) S. 731; Kohl, Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, (Planiceps) *Castor* (Tirol; Genf; Niederösterreich), *Pollux* (Tirol; Marseille; Brindisi; Attika); derselbe, ebenda, S. 150, *peranceps* (Andalusien) Fig. 7, S. 466, *binotatus* (Taschkend), *sexnotatus* Eversm. ined. (Orenburg) S. 467; Radoszkowski, a. a. O., *asiaticus* (Semipalatinsk) S. 274, *truchmenus* (Ass-chabad) S. 276; F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, *Sidemii* (Wladiwostok) S. 331, *Schlettereri* (Askhabad) S. 331, *tristis*, S. 342, *deceptor*, S. 343, *Kohlii*, S. 344, (Askhabad); Radoszkowski, ebenda.

Priocnemis trifurcus (Vichy); Radoszkowski, a. a. O., S. 485, Pl. XV, Fig. 34.

A. Costa: Osservazioni intorno al genere *Salius* di Fabricio e specie italiane dello stesso. — Atti d. Real. Istitut d'incoraggiamento alle Sci. nat., econom. e tecnolog.; Novembr. 1886.

Salius Costae (Syra; Saratow; Orenburg etc.); Radoszkowski a. a. O., S. 479, Pl. XIV, Fig. 22.

Wesmaelinus caucasicus (K.) S. 672, *aegyptiacus* (A.) S. 673; Radoszkowski a. a. O.

Sooliadae. *Dielis angulata* (Ass-chabad); F. Morawitz, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 296.

Elis dives (Los Angeles) S. 410, *4-cincta* (ibid.) S. 411; L. Provancher, a. a. O.

Meria albipes (Tschikischljär, Transkasp.) S. 298, *sculpturata* (Merw) S. 299, *nocturna* (ibid., Nachts an der Lampe gefangen) S. 301; F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII.

Om *Scolia unifasciata* Cyril. som skandinavisk insekt (Risör; Sälö); W. M. Schöyen, Entomol. Tidskr., 1888, S. 109—114.

Mutillidae. Ch. A. Blake schrieb eine Monograph of the Mutillidae of North America; Trans. Americ. Entom. Societ., XIII, S. 179—280, mit 37 Fig. im Text. (Nach Wachtl, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 48).

Chyphotes (n. g.) *elevatus* (Arizona; Süd-Carolina); Blake a. a. O. S. 276, Fig. 19, 20.

Apterogyna Morawitzi (Askhabad); Radoszkowski, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 349.

Dasylabris Koenigi (Kiltitschinar); Radoszkowski, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 348.

Mutilla bison (Sizilien); A. Costa, Atti d. R. Acc. sci. fis. e mat. di Napoli (2) I, S. 4, Tav. I, Fig. 3, *intermedia* (ibid.); derselbe, ebenda, II, S. 104, *eximia* (Arizona) S. 200, *thoracica* (New-York) S. 204, *parvula* (Alabama) S. 206; Blake, a. a. O., *Portschinskii* (Kaukasus) S. 330, Taf. XV, Fig. 28, *Kuschakewitzi* (Wiernoje) S. 331, Fig. 29; Radoszkowski, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, *laticeps* (Astrabad) S. 345, *transcaspica* (Askhabad) S. 346, *binio* (ibid.), (subcomata Wesm. ♂) S. 347; derselbe, ebenda.

Unter dem Namen *M. erythrocephala* wurden 4 Arten beschrieben, *M. erythrocephala* Latr., mit der *dorsata* Oliv. und *Spinolae* Lep. synonym sind; *M. erythr. F.* ist von Radoszkowsky *aureotrifasciata* genannt; die als *M. erythroc.* (Latr.) von Coqueb. abgebildete ist nicht die Latreille'sche Art, und von Smith *ruficeps* genannt; der Text Coquebert's bezieht sich auf noch eine andere Art, die *M. cornuta* Oliv.; v. Dalla Torre, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 254.

Photopsis mellipes (Arizona) S. 262, *melaniceps*! (ibid.) S. 264, *sobrinus* (Kolorado) S. 268, *lepidus* (ibid.) S. 269, *venustus* (Arizona) S. 270, *inconspicuus* (Kalifornien) S. 272, *nebulosus* (Süd-Kalif.), *abdominalis* (Kolorado) S. 275; Blake, a. a. O., *Canadensis* (Ottawa); L. Provancher, a. a. O., S. 410.

Sphaerophthalma parmosa, *venifica* (Kalifornien) S. 210, *thetis* (Arizona) S. 214, *mollissima* (Kolorado) S. 215, *hispida* (ibid.) S. 226, *macer* (ibid.; Kentucky; Montana) S. 227, *luteola* (Utah; Kansas) S. 235, *praeclara* (Arizona) S. 252, *virguncula* (Neu-Mexiko) S. 253; Blake, a. a. O.

Formicidae. Ludwig referiert im Biolog. Centralbl., VIII, S. 321—330 über Schimper's „Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und Ameisen im tropischen Amerika.“

Derselbe desgl. über einige Arbeiten, welche weitere Untersuchungen über Ameisenpflanzen zum Gegenstand haben: E. Huth, Myrmekophile und myrmekophobe Pflanzen; Berlin 1887; L. Kny, Die Ameisen im Dienste des Gartenbaues; Gartenflora XXXVI; K. Schumann, einige neue Ameisenpflanzen; Pringsheims Jahrb., 1888, S. 357—420; v. Wettstein, Ueber die Kompositen ... mit zuckerabscheidenden Hüllschuppen; Sitzgaber. K. Akad. Wissensch. Wien, math.-naturw. Klasse, XCVII, I, S. 570—589; ebenda, S. 577—580.

Mc Cook: Note on the sense of direction in a European ant,

Formica rufa; Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 1887, Part III, S. 385—388. Mc. Cook hatte Gelegenheit, in Schottland mehrere Haufen dieser Art und die von ihnen ausgehenden Wege zu beobachten. Letztere weichen von geraden Linien nur unbedeutend ab, obwohl sie eine bedeutende Länge hatten (65,70 und 100 Fuss). — Eine Kolonie von *Atta fervens* hatte von ihrem Bau einen unterirdischen Gang 448 Fuss weit bis zur Oberfläche geführt, und von diesem Punkte aus noch 185 Fuss weiter zu einem Baum, dessen Blätter sie holten. Die Abweichung dieses 669 Fuss langen Weges von einer geraden Linie betrug nicht mehr als in dem obigen Falle von *F. rufa*. — S. auch Ann. a. Mag. N. H., (6), II, S. 189—192.

Mieren en bladluizen s. oben S. 71.

G. Stricker macht Mittheilungen aus dem Leben der Ameisen, wesentlich nach den Forschungen Forel's; Mitth. d. Thurgauischen Naturf. Gesellschaft, 8. Heft, S. 128—153.

Ueber livländische Formiciden (24 Aa.) s. v. zur Mühlen, Sitzgeber. naturf. Gesellsch. Dorpat, 1887, S. 327—333.

Wasmann sprach auf der 42. Sommervers. der Ned. Ent. Vereen. über Ameisengäste u. s. w.; Verslag, 81. D., S. XVI f.; die Gäste von *Formica rufa* in den Haagschen Dünen zählt Everts auf; ebenda, S. XIX.

Derselbe: Die Getreidesammelnden Ameisen in alter und neuer Zeit; Stimmen aus Maria Laach, 1887; s. Tijdschr. v. Entom. XXXI, S. 105—108.

H. Bos berichtet einige seiner früheren Angaben über die Niederländische Ameisenfauna; ebenda, Tijdschr., 81. Deel, S. 242—244.

R. Cobelli: Gli Imenotteri del Trentino; fasc. I. Formicidae. — XII Publ. del Museo civico di Rovereto; Rovereto, 1887.

A. Forel zählt auf Ameisen aus den Sporaden, Cykladen und Griechenland...; Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 255—265 (51 A.).

Emery stellt in einer ausführlichen, mit zahlreichen Abbildungen versehenen Abhandlung über den sogenannten Kaumagen einiger Ameisen dieses Organ, das zuerst von Forel eingehender vergleichend studiert worden ist, von zahlreichen Gattungen dar; Zeitschr. f. wiss. Zool., 46, S. 378—412, Taf. XXVII—XXIX und 2 Holzschn. Als ursprüngliche Form dieses vielgestaltigen Organs sieht Emery eine elastische mit vier Längsfalten versehene Chitinröhre an, die von einer Längs- und Ringmuskulatur umgeben ist. Dieselbe differenzierte sich bei den meisten Arten in den vorderen, Kelch (*calice Forel*) genannten, und in den hinteren, Kugel (*boule Forel*) genannten Abschnitt, der sich mittels eines langen cylindrischen Rohrs mit dem Chylusdarm in Verbindung setzt. Die Funktion dieses Organs ist aber nicht die, die ihm durch den bisherigen Namen zugeschrieben wird; nach Emery wirkt vielmehr der Kugel genannte Theil wesentlich als Pumpe, und zwar als Druckpumpe bei Kontraktion seiner Quermuskeln, um den Inhalt in den Chylusdarm zu pressen, während bei Erschlaffung der Muskulatur seine Wände auseinanderweichen und aus dem Kropfe kleine Mengen angesaugt werden. Emery selbst fasst seine Ansichten in folgenden Worten zusammen: Der Pumpmagen der Camponotiden und der mit einer Kelchglocke versehenen Dolichoderiden besteht aus Theilen, welche zwei verschiedenen Funktionen dienen. Unter der Wirkung der Kropfmuskulatur wird der Eingang zum Pumpmagen verschlossen, um beim Akt des Erbrechens den Zufluss des Kropfinhalts nach der Kugel zu verhindern. Unter dem Druck

der Quermuskulatur des Pumptagens wird der Inhalt der Kugel in den Obylusdarm entleert, während zugleich das Zurückströmen in den Kropf unmöglich gemacht wird. Bei den Dolichoderiden und Plagiopelidinen wird der Verschluss in beiden Fällen von den Klappen bewirkt. Bei den echten Camponotiden sind zwei getrennte Verschlussvorrichtungen vorhanden: Der Kelch gehorcht der Kropfmuskulatur, während die Klappen hauptsächlich dem Pumpapparat zugehören.

K. Schumann macht einige neue Ameisenpflanzen bekannt. Jahrb. wiss. Botanik, XIX, S. 357—420. Bei *Duroia hirsuta* findet sich unterhalb der terminalen Blattbüschel an den etwa 2 mm dicken Zweigliedern Anschwellungen von einem Durchmesser bis zu 1 Cm. Dieselben enthalten einen Hohlraum, in den 2 Spalten führen. Bei *D. petiolaris* sind an den Anschwellungen reihenweise angeordnete Löcher, von denen einige durch die Pflanze wieder verschlossen waren. *D. saccifera* hat am Grunde der Blattspreite der kurz gestielten Blätter 2 Blasen bis zu 1,7 cm Länge, in welche ein an der Unterseite befindlicher, aber eigentlich der Oberseite der eingefalteten Blattspreite angehöriger Eingang führt. Die Blasen sind denen der Ameisen beherbergendem Melastomaceen sehr ähnlich. Nach den Bestimmungen Emery's beherbergt *D. hirsuta* *Myrmelachista Schumanni* und *Azteca depilis*; *D. petiolaris* *Azteca brevicornis* Mayr und *D. saccifera* *Allomerus septemarticulatus* Mayr; vergl. auch oben S. 192, Ludwig.

O. M. Reuter machte Nya rön om myrornas omtvistade medlidande och hjälpsamhet; Entomol. Tidskr., 1888, S. 55—95. Die mit *F. rufa* angestellten Versuche gaben ein wesentlich anderes Resultat, als Lubbock und Astiz mit derselben Art und *Lasius niger* erhalten hatten; im Allgemeinen fand Reuter die Ameisen hilfsbereiter gegen hilflose Kameraden. Indessen zeigten sich hier grosse Verschiedenheiten bei den einzelnen Individuen, ohne dass die Körpergrösse diesen Unterschied bedingte. An der Hülfeleistung beteiligten sich auch die zum Nahrungserwerb aus dem Stock ausziehenden und die beladen dahin zurückkehrenden Exemplare. Erwiesen sich die Bemühungen zur Befreiung gefangener Kameraden als fruchtlos, so warteten sie weiteren Beistand ab, ohne diesen zu holen; in dem einzigen Falle, der als ein Aufruf an die Hülfe anderer entfernterer Ameisen gedeutet werden konnte, blieb dieser Appell ohne Antwort. Zu den Hülfeleistungen brauchten die Gefangenen ihre Kameraden nicht aufzufordern; die blosse Beobachtung eines hilflosen Genossen genügte, um den Beobachter zur Hülfeleistung zu veranlassen. Die Versuche, zu helfen, dehnten sich auch auf die stark verwundeten Genossen aus, so dass man ein wirkliches Mitleid, und nicht die praktische Erwägung, dem Stocke ein nützliches Glied zu erhalten, bei den Hülfeleistenden annehmen muss. Wenn eine arbeitende Ameise in ihrer Verwirrung eine andere angriff, so mischten sich die Genossen der letzteren ein und ergriffen für diese Partei. Die verletzten oder ins Wasser gefallen Kameraden wurden von den grossen und mittleren, nicht aber von den kleinen Exemplaren in den Stock getragen. Der Transport dieser Kranken geschieht nicht in derselben Weise, wie bei Wunden die gesunden getragen werden, sondern war jedesmal den besonderen Umständen entsprechend in zweckmässiger Weise abgeändert. Die Vorliebe für Süßigkeiten scheint bei *F. rufa* geringer als bei *F. furca* und *L. niger* zu sein; wenigstens liessen sie sich durch dieselbe nicht verlocken, sondern blieben ihrer Samariterthätigkeit treu. Anders war es dagegen, wenn es sich um eine Beute

handelte, die für den Ameisenstock von grosser Wichtigkeit ist (Raupe). Die Versuche, zu entscheiden, ob beim Streit der Gefühle, Hass gegen Fremde und Mitleid mit den Genossen, das eine oder andere den Sieg davon trägt, ergaben kein sicheres Resultat; doch scheint bei *F. rufa* der Hass das stärkere Gefühl zu sein, am stärksten scheint dieser durch *F. fusca* und *sanguinea* erregt zu werden, und zwar in gleicher Weise bei den grossen, mittleren und kleinen.

Forelius n. g. *Dolichoderin.*, für (*Iridomyrmex*) *Mc. Cooki* *For.*, ausgezeichnet durch den Bau des Pumpmagens; Emery, Zeitschr. f. wiss. Zool., 46, S. 389.

Lewis fand bei Gibraltar unter anderen, wie die bekannten Arbeiter aussehenden Exemplaren von *Anochetus Ghilianii* *Spin.* auch solche von bedeutender Grösse und mit Ozellen, gewöhnlich eines, nur einmal 3 in einem Nest. E. Saunders möchte diese für Weibchen halten, Emery hingegen verweist brieflich auf die Weibchen des neotropischen *A. Mayri*, die rudimentäre Flügel haben; E. Saunders, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 61; es liegen hier demnach vielleicht Formen vor, die die Mitte zwischen Arbeitern und echten Weibchen halten und die letzteren fehlen vielleicht vollständig; Proc. Entom. Soc. London, 1888, S. XXV.

Aphaenogaster splendida *Rog. r. rugoso-ferruginea* (Kreta); A. Forel, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 260.

Camponotus rubripes *Drury r. Samius* (Samos) S. 262, *r. Oertzeni* (ibid.) S. 263, var. *Jaliensis* (Jali, Sporaden), var. *Kappariensis* (Kappari) S. 264, var. *Andrius* (Andros) S. 265; A. Forel, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888.

Dolichoderus borealis (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 408.

Junge Sperber im Horst von *Formica rufa* getödtet; A. von Krüdener, Zoolog. Garten, 1888, S. 283.

Strumigenys Lewisi (Nagasaki); P. Cameron, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc., XXV, S. 229, mit Aufzählung der beschriebenen Arten der Gattung auf S. 232.

Vespidæ. *Catilostenus* (n. g. Eumenid.) *nigro-violacea!* (Banana, Afr.); F. Meunier, II Natural. Siciliano, VII, S. 151.

Eumenestiferus (n. g. Eumenid.) *Brasiliensis* (Rio de Janeiro); F. Meunier, II Natural. Siciliano, VII, S. 300.

Celonites crenulatus (Kiltitschinar, Transkasp.) S. 267, *osseus* (Tschikischlar) S. 268; F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross. XXII.

Alcune note biologiche sull' *Eumenes pomiformis* *F.*, per A. Palumbo, II Naturalista Siciliano, VII, S. 162—166, 184—189, 207—210.

Aus 2 Brutzellen, welche mit Spannerraupe proviantiert waren, erhielt Palumbo je 1 Männchen von *Eumenes* und je eine *Toxophora maculata*. Er erklärt das männliche Geschlecht des *Eumenes* durch mangelhafte Nahrung, indem die mit dem *Toxophora*-Ei behaftete Raupe von der Fliegenmade verzehrt wurde und daher der *Eumenes*-Larve entging.

Eu. (Ischnogasteroides?) tenuis (Transkaspien); F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 261, *crucifera* (Los Angeles), *impunctus* (Trinidad) S. 421, *cinctus* (ibid.), *flavopectus* (ibid.) S. 422; L. Provancher, a. a. O.

Hoplomerus signaticollis (Kiltitschinar, Transkaspien) S. 262, *aestimandus* (ibid.) S. 264; F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII.

N*

Jugurtha (an nov. gen.?) *chlorotica* (Tschikischljär, Transkasp.); F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 270.

Odynerus dromedarius (Mauna Loa, Hawaii) S. 151, *Vulcanus* (ibid.) S. 152, *Hawaiensis* (H.) S. 153, *Haleakalae* (H., Maui) S. 154, *cardinalis* (Oahu) S. 155, *pacificus* (Maui; Hawaii), *rubropustulatus* (Hawaii) S. 159, *obscuro-punctatus* (ibid.) S. 160, *diversus* (Oahu) S. 161, *insulicola* (Maui) S. 163; Blackburn, Proc. Manchester literary a. philosoph. soc. XXV, *sinuato-fasciatus* (Mittelitalien; Sardinien; Sizilien); A. Costa, Rendic. d. Accad. d. Sci. fis. e matemat., Napoli (2), II, S. 104, *Antillarum* (Anaheim); L. Provancher, a. a. O., S. 421.

Polistes orbitalis (Lagos, Bras.); W. F. Kirby, Ann. a. Mag. N. H., (6), II, S. 143, *Anaheimensis* (Kalif.); L. Provancher, a. a. O., S. 423.

E. Härter macht ein blaues Wespennest (von *Pol. diadema*) bekannt; die Wespe hatte zu demselben das blaue Holzpapier verwendet, mit dem die schwedischen Zündholzschachteln überzogen sind. 26. Bericht d. Oberhess. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, S. 94.

Pterochilus meridionalis (Prov. Lecce; mont. di Cava de Terreni); Costa, Atti d. R. Acc. sci. fis. e mat. di Napoli (2), I, S. 6, Tav. I, Fig. 4.

J. Mc Farland stellt a table of the species of *Vespa* found in the United States ... auf, und beschreibt *V. bistriata*, *scelista* (Penns.; Virg., Kolorado etc.) S. 298; Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 297—299.

Apidae. *Apum Mohileviensium* species parum cognitae vel imperfecte descriptae auct. N. Arnold, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 202—206.

E. L. Holmberg fährt in seinen Bemerkungen fort sobre ápidos nómadas de la república argentina; An. Soc. Científ. Argentina, XXVI, S. 118—132; vgl. den Bericht über 1886, S. 229.

Chelynia (n. g. post *Panurgum* locandum; labro magno, quadrato) *labiata* (Ottawa); L. Provancher, a. a. O., S. 322.

Stellenigris (n. g. Megachilid.) *Vandeveldii* (Innerafrika); F. Meunier, II Natural. Siciliano, VII, S. 152.

Dittrich macht zu den 36 früher aufgeführten Schlesischen *Andrena*-Arten 18 weitere bekannt; Zeitschr. f. Entomologie, Breslau (N. F.), 13, Sitzgsber., S. XVII f.

R. C. L. Perkins entwirrt die Synonymie der 3 Britischen Arten der *Afzeliella*-Gruppe: *similis* Smith, *xanthura* Kirby, *Afzeliella* Kirby und unterscheidet dieselben in analytischer Tabelle; Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 128 bis 131.

A. *Ehnbergi* (Minussinsk, Sib.) S. 238, *sibirica* (Osnatschennaja) S. 239, *Sahlbergi* (ibid.) S. 240; F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, *uromela(e)na* (Oerignola, Apul.), *hyalinella* (ibid.); A. Costa, Rendic. d. Accad. d. Sci. fis. e matemat., Napoli, (2) II, S. 105, *laticeps* (Ottawa), *distans* (Cap rouge), S. 307, *hirticincta* (Ottawa) S. 308, *lineata* (Cap rouge) S. 309, *vestita* (ibid.) S. 310, *conceca* (ibid.) S. 311, *simulata* (Ottawa), *macilentia* (ibid.; Cap rouge) S. 313, L. Provancher, a. a. O.

Anthidium anguliventre (Kiltitschinar) S. 248, *puncticolle* (Tschikischljär) S. 250; F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII.

Anthophora testaceipes (Semipalatinsk) S. 225, *Suworzevi* (ibid.) S. 227, *turcomannica* (Kiltitschinar) S. 228, *trochanterica* (Ass-schabad) S. 230, *vestita*

(Kiltitschinar) S. 232; F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, *subglobulosa* (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 297.

Apathus dorsalis (Ottawa); L. Provancher, a. a. O., S. 343.

Ueber die Honigbiene. Vortrag von Dr. O. Hofmann; Berichte naturw. Ver. Regensburg, I, S. 30—50 Taf. I.

A probable case of instinct at fault in bees theilt C. A. White im Americ. Naturalist, 1888, S. 1029f. mit. Er beobachtete einen mit Honig gefüllten Stock, der, ohne von Feinden zu leiden, allmählich dem Untergang entgegen ging, und vermuthet, dass der reichlich eingetragene Honig, der alle Zellen anfüllte, die Königin am Eierlegen gehindert habe, so dass der Schwarm aussterben musste.

Ueber das Futter der Bienenlarven s. oben S. 173.

Angochlora striata (Kanada), S. 317, *obliqua* (Vancouver) S. 318; L. Provancher, a. a. O.

Ueber oberhessische Hummeln s. Reallehrer Härter im 26. Ber. d. Oberhess. Gesellsch. für Natur- u. Heilkunde, S. 107—112.

Ueber die Variabilität und geographische Verbreitung der Hummeln s. Handlirsch, Sitzgsber. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, S. 34—36.

Derselbe beschreibt die Hummelsammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums; Annalen d. k. k. naturh. Hofmus., III, S. 209—250, Taf. X. (81 *Bombus*, 9 *Psithyrus*). Während die Arten der paläarktischen Region durch die Arbeiten der Vorgänger bereits ziemlich gesichtet sind, befinden sich unter den aus anderen Regionen stammenden Vorräthen noch mehrere neue, bezw. nicht mit Sicherheit auf bereits beschriebene zu beziehende Arten. Von *B. mastrucatus* wird eine Beobachtung Brauer's mitgetheilt, der diese Art in Gemeinschaft mit der an Gestalt und Färbung ähnlichen *Cephenomyia stimulator* schwärmen sah.

B. mastrucatus var. *funebria* (Hinterleib ganz schwarz); Hoffer, Mitth. naturw. Ver. f. Steiermark, Jahrg. 1887, S. 69.

B. soroënsis, Form *Proteus Gerst.* var. *tricolor* S. 554, Form *sepulcralis Schmiedekn.* var. *Luttmanni*, S. 555, beide bei Bremen; D. Alfken, Abh. herausg. vom naturw. Ver. z. Bremen, X. Bd.

F. Meunier stellt ein tableau dichotomique des espèces, variétés Belges du gre. *Bombus Latr.* mit sonderbaren Namen der Gruppen auf; II Natural. Siciliano, VII, S. 173—175 und erweitert dieses zu einem Prodrome à la monographie; ... ebenda, S. 195—200, 245—253.

A. Handlirsch verurtheilt diesen und die übrigen Meunier'schen Aufsätze; ebenda, VIII, S. 63—66.

Bombus flavipes (Indien), S. 225, *dentatus* (Indien?) S. 227, *melaleucus* (ibid.?) S. 228, *Haueri* (Mexiko) S. 234, *consanguineus* (Br. Columbien; Vancouver), *Steindachneri* (Brasilien; Mexiko) S. 239 (*carbonarius* = ? *velutinus Ill.*, *violaceus Lepel., Holmbg.* S. 241), *nearcticus* (Br. Columbien) S. 243, (*dolichocephalus* = ? *diligens Smith*, *brachycephalus* = ? *diligens Smith* S. 244); Handlirsch, Ann. k. k. naturh. Hofmus., III, *serrisquama* (Semipalatinsk), F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 224, *simulatrix* (Erzerum) S. 317, *tricornis* (Wladiwostok) S. 319, Taf. XII, Fig. 5, *Jankowskii* (ibid.) S. 320, Fig. 6, *Wolkonskii* (Daghestan) S. 322, Fig. 13; Radoszkowski, ebenda, *nigrocinctus* (Kalifornien); L. Provancher, a. a. O., S. 342.

Calliopsis 4-lineata (Toronto) S. 319, *interrupta* (ibid.) S. 320; L. Provancher, a. a. O.

Cilissa sibirica (Minussinsk); F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 237.

Coelioxys tenax (Buenos Aires) S. 118, *laudabilis* (ibid.) S. 120, *alacris* (Asuncion) S. 122, *litoralis* (Parana-Delta) S. 124, *missionum* (Misiones) S. 126, *angustivalva* (Las Conchas) S. 130, *remissa* (Buenos Aires; Chaco) S. 131; E. L. Holmberg, a. a. O.

Colletes dorsalis (Zerfashan); F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 242, *hyalina* (Ottawa; Hull; Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 303.

Crocisa biseriata (Osnatschennaja, Sib.); F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 252.

Dioxys albofasciata (Askhabad); Radoszkowski, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 340.

Epeolus minutus (Kirghisensteppe, Orenburg); Radoszkowski, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 336, *pilosulus* (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 426.

Halictus cinctipes (Ottawa); L. Provancher, a. a. O., S. 316.

Heriades maculatum! (Vancouver) S. 323, *alboscopatum*! (Cap rouge), *plenum*! (Ottawa) S. 425; L. Provancher, a. a. O.

Macrocera Morawitzi (Askhabad); Radoszkowski, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 338.

Macropis longilingua (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 424.

Megachile villosa benutzte bei Wien die hohlen Blätter von Stockzwiebeln, um in denselben ihre Brutzellen anzulegen, nachdem sie eine ovale Eingangsöffnung ausgefressen hatte. G. Henschel, Entom. Nachr., 1888, S. 321—323.

M. tecta (Askhabad); Radoszkowski, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 339, *Vancouveriensis* (V.); L. Provancher, a. a. O., S. 424.

Melipona Trinidadensis (Port d'Espagne; Arima) S. 344, *paupera*! (Trinidad) S. 427; L. Provancher, a. a. O.

Melissodes festonata (Cap rouge) S. 300, *lata* (Vancouver), *nigricornis* (ibid.) S. 302; L. Provancher, a. a. O.

Nomada pulchra (Mohilev); N. Arnold, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 201, Taf. XI, Fig. 4—7, *Palméni* (Osnatschennaja, Sib.) S. 253, *Hammarstroemi* (ibid.) S. 254, *ecarinata* (ibid.) S. 257, *fasciculata* (Semipalatinsk) S. 259; F. Morawitz, ebenda, *flavipes* (Los Angeles) S. 426, *rubra* (ibid.) S. 427; L. Provancher, a. a. O.

Nomia compacta (Cap rouge); L. Provancher, a. a. O., S. 337.

A. Handlirsch behandelt die Bienengattung *Nomioides* Schenck in monographischer Weise; Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, S. 395—406, Taf. X. Die Synonymie der bekannten Arten ist *N. pulchellus* Schenck (= *minutissima*? Rossi, III., *minutissima* Mocs., *parvula*? Jur., *parvula* Mor.), *Turanica* Mor., *parviceps* Mor., *variegata* Oliv. (= *flavo-picta* Dours, *jucunda* Mor., *Rad.*, *pulchellus* Mocs.); neu sind *fallax* (Marseille; Sizilien; Sarepta; = *minutissima*? Rossi, III., *parvula*? F., Jur.) S. 401, Fig. 2, 7, *pulverosa* (Bergwüste an der Grenze von Turkmenien und Afghanistan) S. 404, Fig. 1, *rotundiceps* (Aegypten) S. 405, Fig. 3.

N. pallida (Askhabad); Radoszkowski, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 341.

Hoffer beschreibt das Verfahren der *Osmia bicolor* beim Herrichten eines Schutzdaches über das mit Eiern belegte Haus einer Schnecke (*Helix nemoralis* etc.), in welchem diese Art mit Vorliebe nistet; Mitth. naturw. Ver. f. Steiermark, Jahrg. 1887, S. 94.

O. melanota (Transkaspien) S. 248, *transcaspica* (Tschikischljar) S. 245, (minor *Mor.* ♀ S. 247); F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, *spoliata* (*Cap rouge*) S. 327, *tarsata* (ibid.) S. 328; L. Provancher, a. a. O.

Prosopis satellus! (Haleakala, Maui) S. 141, *Kona* (Mauna Loa, Hawaii) S. 144, *coniceps* (Mauna Kea, Hawaii) S. 145, *rugiventris* (Maui, Lanai) S. 146; Blackburn, Proc. Manchester literary a. philosoph. societ. XXV.

Pseudoosmia tridentata (Askhabad); Radoszkowski, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 343.

Hoffer wirft einige Fragen auf, die die Beziehungen von *Psithyrus* zu *Bombus* betreffen und durch folgende Beobachtungen angeregt werden. Auch wenn das *Psithyrus*-Weibchen schon Eier abgelegt hat, und es wird dann weggefangen, so entwickeln sich keine Schmarotzerhummeln. Obwohl die *Psithyrus* den Honig und Blütenstaub ihrer Wirthe verzehren, so tragen sie doch auch selbst beides in das Nest ihrer Wirthe ein. Mitth. naturw. Ver. f. Steiermark, Jahrg. 1887, S. 87.

F. Meunier stellt ein tableau dichotomique des espèces, variétés du genre *Psithyrus* *Lep.* auf mit *Ps. campestris* var. *Stefanii*, S. 176; II Naturalista Siciliano, VII, S. 175 f.

Derselbe liefert Matériaux p. s. à l'étude des espèces, variétés Belges du gre. *Psithyrus* *Lep.*; ebenda, VIII, S. 76–80.

Tetralonia metallescens (Tschikischljar) S. 233, *Pomeranzevi* (Atrek) S. 235; F. Morawitz, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII.

Coleoptera.

G. Gilson untersuchte die einzelligen Stinkdrüsen der *Blaps mortisaga* und einiger anderer Arten. Diese einzelligen Hautdrüsen sind zu lapfenförmigen Gruppen vereinigt, welche mehrzelligen Drüsen gleichen. Die Drüsenzelle besteht aus 4 Theilen: einer radialen Blase, einer inneren Ampulle, einem feinen Ausführungsgang, und einer diesen umgebenden Hülle, die in ihrem Bau mit der radialen Blase übereinstimmt. Die festen Bestandtheile dieser Theile stehen mit dem Netzwerke des Protoplasma in Zusammenhang. Die inneren Strahlen der Blase und der Hülle des Ausführungsganges sind regelmässige radiale Balken von Protoplasma. Die Wand der Blase, Hülle, Ausführungsgang und Ampulle sind in ihrem Bau ähnlich den Zell- und Kernhäuten; sie sind Erzeugnisse des Zellplasma. Das Netzwerk strahlt nicht nothwendiger Weise von dem Zellkern aus; manche der Bälkchen strahlen von anderen protoplasmatischen Bildungen aus, wie von der radialen Blase, der Hülle mit dem Ausführungsgang selbst. La cellule, V, S. 1–21 mit 1 Taf. (Nach Journ. R. Microsc. Soc. 1888, S. 943).

Jacquet führt einige Fälle an, wo die Nährpflanze die Farbe und Pubeszenz beeinflusst; die Beispiele sind Rüsselkäfern entnommen; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CVI.

Dewitz untersuchte zur Beantwortung der Frage: entnehmen die Larven der Donacien vermittelst Stigmen oder Athemröhren den Lufträumen der Pflanzen die sauerstoffhaltige Luft? die Larven von *Haemonia Equiseti* und fand an der Basis der Hinterleibshaken derselben ein Stigma, dessen enger Spalt in die kopfartige Erweiterung des einen der beiden Haupttracheenstämme führt. Die Tracheenstämme gehen in die Anhänge nicht hinein, und an der Spitze derselben findet sich keine Oeffnung. Die Athmung geht also in der Weise vor sich, wie v. Siebold angegeben hatte. Vgl. den vor. Ber. S. 184; Berl. Entom. Zeitschr. 1888, S. 5f. mit 2-Holzschn.

L. Hacker trägt Atome zur Biologie der Käfer zusammen; Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 49—56. (*Leistotrophus* unter Kuddinger, *Aphodius* nachstellend; Larven von *Cetonia floricola* in Nestern der *Formica rufa*; *Telephorus fuscus* sehr mordgierig; Larven von *Dasytes coeruleus* in alten *Crataegus*-Stämmen; Ei von *Hylecoetes dermestoides*; Larve von *Polydrosus atomarius*; Larvensack von *Clythra humeralis*, *sexpunctata* und *aurita*; Ei von *Cryptocephalus flavipes*; *Chrysomela varians* gebiert nicht immer lebendige Junge, sondern legt auch Eier; Ei von *Chr. violacea*).

Buddeberg theilt Beobachtungen über Lebensweise und Entwicklungsgeschichte einheimischer Käferarten mit (*Gymnetron bipustulatum*; *Anthonomus Rubi*; *Rhynchites aequatus*; *Rhinoncus castor*; *Chrysomela didymata*, *Hyperici*, *staphylea*; *Hermoeophaga Mercurialis*; *Aphthona cyparissiae*, *nonstriata*; *Longitarsus niger*, *tabidus*); Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 20—43. — Angeschlossen sind einige Beobachtungen über die Lebensdauer von Käfern: Befruchtete Weibchen von *Timarcha tenebricosa* leben $1\frac{1}{4}$ Jahr, ausnahmsweise $1\frac{2}{3}$ Jahr; die von *T. violaceonigra* gar über 2 Jahre und legen zwei Jahre hindurch (natürlich während der guten Jahreszeit) Eier. Die von *T. tenebricosa* im Sommer und Herbst gelegten Eier überwintern und liefern die Larven erst im nächsten Frühjahr, obwohl schon Ende Juli in den zuerst gelegten Eiern die fertigen Larven sich fanden.

Die *Métamorphoses de quelques Coléoptères du Mexique* von E. Dugès enthalten Beschreibung und Abbildung der Larven und Puppen folgender Arten: *Dynastes Hyllus*; *Euryomia canescens*; *Xyleborus Guanajuatensis* E. Dug.; *Coptocycla dubitabilis*, *opulenta*; *Calligrapha piceicollis*; Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI S. 137—148 Pl. I, II.

E. A. Schwarz stellt die (9 oder) 8 *Termitophilous Coleoptera* found in North America zusammen; Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 160f.

T. Townsend fand in den Mägen von Kröten 12 Arten von Käfern; Proc. Entomol. Soc. Washington, I, S. 167f

Käferfänge unter Menschenkoth mit einem Verzeichniss der

beobachteten Art s. bei Gerhardt, Zeitschr. f. Entomologie, Breslau, (N. F.) 13, S. 10—13 und 13f.

Durch den Gestank des blühenden *Arum dracunculus* werden nicht nur Aasfliegen, sondern auch Aaskäfer verlockt; *Creophilus maxillosus*; *Oxytelus*; *Dermestes vulpinus*, 3 Arten von *Saprinus*, darunter *S. semipunctatus* F.; J. J. Walker, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 33. (Referent fand die sonst bei Bonn nicht häufige *Silpha thoracica* wiederholt auf *Phallus impudicus*).

G. H. Horn veröffentlicht *Miscellaneous coleopterous studies*, die sich auf die nordamerikanischen Arten verschiedener Familien beziehen; Trans. Amer. Ent. Soc., XV, S. 26—48.

E. A. Schwarz bespricht the *Insectfauna of semitropical Florida with special regard to the Coleoptera*. Er findet, dass Florida eine starke Kolonie Westindischer Insekten besitzt, und schlägt vor, aus den Katalogen Nordamerikanischer Insekten diejenigen der südlichen Grenzländer wegzulassen, die einen fremdartigen Bestandtheil in der nordamerikanischen Fauna ausmachen würden; Entomol. Americana, IV, S. 165—175; vgl. oben S. 6.

Brodie stellt eine List of (85) *Coleoptera coll ... in Kicking Horse pass, Rocky Mts.*, zusammen; Proceed. Canad. Instit. Toronto (3. S.) V, S. 213—215.

Rauterberg fährt in der Aufzählung der *Coleoptera of Wisconsin*, No. 378—799, fort; Proceed. Nat. Hist. Soc. Wisconsin, 19. December 1887, S. 145—153.

A. Bau. Handbuch für Insekten-Sammler. Bd. II. Die Käfer; Magdeburg; Creutz'sche Verlagsbuchhandlung. (Eine Besprechung von Seidlitz s. Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 303f.; von Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 252; Dohrn, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 217).

Das XVI. Heft der Bestimmungs-Tabellen der europäischen *Coleopteren* enthält die Familien *Erotylidae* und *Cryptophagidae*, bearbeitet von E. Reitter; Verhandl. d. naturf. Ver. in Brünn, XXVI, S. 3—56; das XVI. die *Phalacridae*, von K. Flach; s. unten

Reitter beschreibt zum fünften Mal neue *Coleopteren* aus Europa, den angrenzenden Ländern und Sibirien und macht Bemerkungen über bekannte Arten; Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 417—432.

A. Fauvel fährt in seinen *rectifications au catalogue Coleopterorum Europae et Caucasi* fort (Addenda und Delenda); Revue d'entomol., 1888, S. 229—251

Demselben Jahrgang ist mit besonderer Paginierung der Anfang (Seite 1—16) eines Catalogue des *Coléoptères Gallo-Rhénans* beigelegt.

v. Heyden schickte *Coleopterologisch-synonymische Notizen* ein; Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 215f.

Reitter setzt seine *Coleopterologischen Notizen* fort;

XXVIII—XXX; Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 41—42, 104—105, 133—134.

The Coleopterous fauna of the Liverpool district by J. W. Ellis; Liverpool Biol. Soc. II S. 192—220 (Cicind.-Staphylinidae theilweise).

J. Sparre-Schneider beginnt eine Oversigt over de i Norges arktiske region hidtil fundne Coleoptera; Tromsø Museums Aarshefter, XI, S. 81—184. — Nach einer Zusammenstellung auf S. 90 sind von den in ganz Norwegen beobachteten 1996 Arten 694 in dem arktischen Theile vertreten, von denen im vorliegenden Bande 399 mit Angabe des nördlichsten Fundpunktes namhaft gemacht sind.

Derselbe zählt 64 auf einer mehrtägigen Exkursion Ende Juni in der Umgegend von Hillesø am Malangenfjord (69° 40') erbeutete Arten auf; Tromsø Museums Arsberetning for 1887 S. 24—31.

Pantel stellt einen Catalogue des Coléoptères carnassiers terrestres des environs d'Ulcés . . . zusammen; An. Soc. Esp. Hist. Natur., XVII, S. 193—245, und schickt demselben eine kurze Physiographie des Sammelgebietes voraus. Ausser Angaben über die Erscheinungszeit, Häufigkeit und Art des Vorkommens sind auch manche kritische Bemerkungen hinzugefügt.

L. Bedel's Faune des Coléoptères du bassin de la Seine etc. ist mit Ss. 385—444 des 2. Fasc. des VI Bd. fortgesetzt (Scolytidae; Supplément; tables des noms de plantes . . .).

Bonnaire führt einige seltene oder neue Arten der Fauna des Beckens der Seine an; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XCVI.

In den Mém. Soc. r. d. sciences de Liège (2. Sér.) T. XV, 51 Ss. ist von den Matériaux pour la faune entomologique de la province de Liège, Coléoptères, die 4 Centurie von A. Preudhomme de Borre erschienen; (Carabid. Suppl., Halipid. Suppl. Dyticid., Gyrinid., Lucanid., Scarabaeid. part.).

A. Preudhomme de Borre bringt die 3. Centurie seiner Matériaux pour la faune entomologique de la province de Namur, Coléoptères; Bruxelles, 1888, S. 1—41.

Derselbe desgl. III. Centurie der Coléoptères de la province du Luxembourg belge; Publ. de l'Institut. roy. grand-ducal de Luxembourg, sect. des Sci. nat., 1888, S. 1—37 (Separatabdr.).

Für die Niederländische Fauna neue Arten S. Everts, Tijdschr. v. Entom., 31. D., Versl. S. XVII f, XXVI, LXXXVI.

J. Schilsky stellt ein neues Systematisches Verzeichniss der Käfer Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung auf; Berlin, 1888, Nicolaische Verlags-Buchhandlung, R. Stricker; 8°, S. I—VIII, 1—159. Die Käfer der Mark Brandenburg sind durch besonderes Zeichen kenntlich gemacht; die Verbreitung in Deutschland ist auf sinnreiche Weise durch ein

einfaches Zeichen verdeutlicht. — Reitter macht einige Berichtigungen zu dem Text, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 227.

In seinem Beitrag zur Kenntniss der deutschen Käferfauna gibt Schilsky die Beschreibung von 119 von ihm im obigen Verzeichniss aufgestellten Varietäten; Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 177—190

Derselbe gibt Berichtigungen und Ergänzungen zu Schilsky's Verzeichniss der deutschen Käfer; Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 321—328.

Derselbe bringt den III. seiner Beiträge zur Käferfauna Deutschlands; Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 125—128. (*Coryphium angusticollis* in der Mark; *Bathyscia celata* in Krain; *Aphodius maculatus* in Steiermark?; *Rhizotrogus tauricus* bei Wien, Burmeisteri ebenfalls Wien; *Athous difficilis* in Krain; *Dolichosoma melanostoma* var. *smaragdinus* auf Sylt; *Phaleria cadaverina* häufig auf Dars; *Otiorrhynchus tenebricosus* wohl nicht im mittleren Deutschland, meist wird *O. fuscipes* var. *Fagi* damit verwechselt, *O. multipunctatus* nicht in Schlesien; *Dichotrachelus* Stierlini bei Laucha a. Unstr.; *Gymnetron* *Veronicae* nicht Varietät von *Beccabungae*; *Labidostomis taxicornis* bei Bozen; *Gynandrophthalma concolor* in Osterreich; *Phyllotreta caucasica* bei Fünfkirchen; *Berosus affinis* am salzigen See bei Eisleben; *Lamprorrhiza* *Mulsanti* in Trient).

K. Jordan's Nachtrag zum Käferverzeichniss Hildesheims ist fortgesetzt; Societ. Entomol., II, S. 178f., 185f.; III, S. 1f., 11, 21, 58, 65.

Der Beitrag zur Käferfauna des Regierungsbezirks Osnabrück von E. Lienenklaus beschäftigt sich mit der Aufzählung der beim Sammeln von Wasserconchylien in die Hände gefallenen Dyticiden; 7. Jahresh. d. naturw. Ver. zu Osnabrück, S. 67—76.

K. Letzner bringt (mit besonderer Paginierung S. 181—236) die Fortsetzung seines Verzeichnisses der Käfer Schlesiens; Zeitschr. f. Entomologie; Breslau, (N. F.) 13.

Als Zugänge zur Schlesischen Coleopterenfauna 1887 führt derselbe auf *Elaphrus smaragdinus* Reitt.; *Cryptopleurum crenatum* Pz. (*Vaucheri Tourn.*); *Oxypoda misella* Kraatz; *Mycetoporus forticornis* Fauv.; *Stenus lustrator* Er.; *Cephennium* *Reitteri* Bris.; *Neuraphes Antoniae* Reitt.; *Eumicrus Perrisii* Reitt.; *Hydnobius spinipes* Gyllh. (*spinula* Zett.); *Liodes subglobosa* Reitt.; *Cyrtusa subferruginea* Reitt.; *Liosoma Discontignyi* Bris.; *Magdalinus exaratus* Bris.; *Hylesinus oleiperda* F. (*scaber Marsh.*, *suturalis* Reitt., Esau Gredl.); 65. Jahresh. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur, S. 344f.

Gerhardt schickt einen Sammelbericht pro 1887 ein; Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 356—360.

Einiges aus der schlesischen Käferwelt; Vortrag von Dr. Marx; 24. Bericht der Philomathie in Neisse, S. 296—309

G. Seidlitz: Fauna Transsylvanica. Die Käfer Siebenbürgens.

I. u. II. Lieferg. (Einleitung. S. I—XL mit lith. Taf.; Gatt. S. 1—48, Arten. S. 1—340) Königsberg. 1888. Diese Bearbeitung der Siebenbürgenschen Käfer ist in der Einleitung in voller Uebereinstimmung mit der Faun. Baltica desselben Verfassers; im speziellen Theile ist der Umfang je nach den Umfang beider Faunen ein verschiedener. Bis jetzt sind die Carabiden abgeschlossen.

Von der Fauna baltica sind Lief. II und III, Familien S. XL bis LXVIII (Malacod.), Gattungen S. 17—80 (Pselaph.), Arten S. 97 bis 336 (Staph.) erschienen.

Die *Supplementa faunae Coleopterorum in Transsilvania*, welche Al. Ormay 1888 verfasst hat, Nagy-Szeben (8^o, S. 1—54) erhöhen die Zahl des Bielz'schen Katalogs um 15 Gattungen und 220 Arten, so dass jetzt aus Siebenbürgen 4235 Arten bekannt sind; 4 derselben sind n. sp.

(4) *Coleoptera nova e Transsilvania* in Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 165—168, a pr. Ormay S. descripta.

(4) *Coleoptera nova ex Hungaria* a J. Frivaldszky descripta s. in den Termész. Füzetek, XI, S. 159—164.

C. v. Hormuzaki bringt Beiträge zur Käferfauna der Bukowina und Nordrumäniens; Entom. Nachr., 1888, S. 1—9, 21—31, 34—41, 67—77, 93—96, 105—110, 148—156, 161—169.

Bemerkungen dazu von Kraatz s. Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 198; die *Homalota Algae* ist nicht richtig benannt.

Rätzer bringt Nachträge zur Fauna coleopt. Helvetiae, besonders aus dem Gebiete des berner Seelandes, des Jura und der Walliser Alpen; Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 20—42.

Ueber das Schicksal der von ... O. Heer beschriebenen neuen Käferarten s. Stierlin ebenda S. 70—76.

S. Bertolini setzt seine *Contribuzione alla fauna Trentina dei Coleotteri* mit *Hydrophilidae*, *Sphaeridiadae*, *Limnichidae*, *Dryopidae*, *Georyssidae*, *Heteroceridae*, *Staphylinidae* fort; Bull. Soc. Entom. Ital., 1888, S. 1—58.

V. Ghiliani: *Elenco delle specie di Coleotteri trovate in Piemonte*; Ann. d. R. Accad. d'Agricolt. di Torino, XXIX.

B. Halbherr fährt in seinem *Elenco systematico dei Coleotteri finora raccolti nella Valle-Lagarino* fort; III: *Staphylinidae* (372 A.) nebst Nachtrag zu den Carabiden und Dyticiden; XIIIa *Publicatione fatta per cura del Civico Museo di Rovereto*.

O. Schneider fügt seiner Schilderung von Vallombrosa (Toskana) in dem Globus, LIV, No. 14, ein Verzeichniss der bisher dort beobachteten Käfer hinzu, S. 8—12 des Separatabdr. (über 700 Arten).

Ragusa setzt seinen *Catalogo ragionato dei Coleotteri di Sicilia* mit den *Gyriniden* und *Hydrophiliden* fort; Il Natural. Siciliano, VII, S. 257—267.

Derselbe beschreibt weitere Coleotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia; ebenda, S. 272f.; VIII, S. 11f., 36f.

In einem 2. Beitrag zu den Materiali per una fauna entomologica dell'isola d'Ustica beginnt G. Riggio eine Aufzählung der Käfer; (86 A.); ebenda, VII, S. 292—298.

Stierlin, Ganglbauer und Eppelsheim erstatten Berichte über die von E. v. Oertzen i. J. 1887 in Griechenland und Kleinasien gesammelten Coleopteren, wobei Stierlin Otiorhynchus, Ganglbauer die Carabiden, Eppelsheim die Staphyliniden behandelt und ausserdem 2 Apion-Arten beschreibt. Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 369—410.

N. Tscherkunoff stellt ein spisok schukof, wodjaschichsja w Kieff i ego okrestnostjach (Verzeichniss der Käfer von Kieff und dessen Umgebung) auf; Sapiski Kieffskago obschestwa estestwoispijtatellei, T. X, S. 147—204 (3029 A.)

Reitter zählt auf Coleopteren aus Cirkassien....; Wien. Ent. Zeitg. 1888, S. 19—26, 81—90, 143—156, 169—180, 207—214, 231—238, 259—274, 279—288, 317—321.

Beiträge zur Kleinasiatischen Coleopteren-Fauna von v. Heyden und Faust zählen bemerkenswerthe Arten von Amasia und Tokat auf; Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888. S. 45—47.

v. Heyden theilt weitere Käfer vom Cilicischen Taurus mit; ebenda S. 68—71.

Derselbe desgl. neue und interessante Coleopteren aus Malatia in Mesopotamien (unter Mitwirkung von Ganglbauer und Kraatz); ebenda S. 72—78.

J. Faust bringt Beiträge zur Kenntniss der Käfer des Europäischen und Asiatischen Russlands mit Einschluss des Kaspischen Meeres; Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 147—180 (Curcul.)

L. Ganglbauer verzeichnet von E. König in Turcmenien gesammelte Buprestiden und Cerambyciden; ebenda, S. 192—198.

Ueber die von L. Conradt aus dem Alai-Gebirge mitgebrachten Coleopteren — XII. Beitrag; von L. v. Heyden mit Beiträgen von J. Faust; Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 39—44.

Description of some new Coleoptera from Japan; by D. Sharp: Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 242—245.

In seinen Bemerkungen on a collection of Coleoptera from Korea (Tribes Geodephaga, Lamellicornia and Longicornia) macht H. W. Bates zu den 286 aus Korea bekannten Arten 60 weitere nahhaft, die die Gesamtzahl auf 346 bringen. Die Mehrzahl derselben weisen eine grössere Verwandtschaft mit den kontinentalen paläarktischen Gattungen und Arten nach als mit den Formen Japans, und auch die tropischen Formen, welche Korea wie Japan besitzen, sind den Gattungen und Arten nach in Korea andere als in Japan; sie sind in Korea überdies spärlicher vertreten als in Japan. Dieser Umstand deutet wohl darauf hin, dass die Quelle und auch die Epoche

der Einwanderung für beide Länder eine verschiedene war; doch sind unsere Kenntnisse noch zu lückenhaft, um mit Sicherheit derartige Folgerungen zu gestatten. Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 367—380.

Kraatz macht Bemerkungen zu Kolbe's und v. Heyden's Beiträgen zur Coleopteren-Fauna Koreas; Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 199—204; vgl. dies. Ber. f. 1886, S. 249 und 1887, S. 175.

H. von Schönfeldt erweitert in einem ersten Nachtrag zum Catalog der Coleopteren von Japan die Zahl der aus Japan bekannt gewordenen Arten von 2702 auf 2754; Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 44—49.

On some Coleoptera from Kiu-Kiang; by H. W. Bates, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 380—383 (Cicindelidae und Carabidae).

Fairmaire setzt seine Notes sur les Coléoptères des environs de Pékin fort; Revue d'entomol., 1888, S. 111—160.

Fairmaire macht zum dritten Male Coléoptères de l'intérieur de la Chine bekannt. Dieselben stammen aus Yunnan, Tchekiang und Fokien und sind deshalb interessant, weil neben europäischen Gattungen sich tropische finden, die gleichzeitig auf Japan und Indien hinweisen; mit dem Amurland und Daurien sind die Beziehungen weit geringer. Ann. Soc. Entomol. Belg. XXXI S. 87—136.

Mit Part VII bringt Geo. Masters seinen Catalogue of the described Coleoptera of Australia zu Ende (Fam. Chrysomelidae, Erotylidae, Endomychidae, Coccinellidae, Corylophidae, No. 6229—7201); Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II S. 13—94.

A. S. Olliff bringt No. IV seiner Contributions towards a knowledge of the Coleoptera of Australia; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II S. 153—155. (Description of a new genus and species of Oedemeridae).

J. G. O. Tepper: Common Native Insects of South. Australia ... Part I. Coleoptera or Beetles. Adelaide, 1887, 4^o 46 Ss.

No. III von W. Macleay's Miscellanea Entomologica behandelt the Scaritidae of New Holland; Proc. Linn. Soc. New S. Wales (2. S.) II S. 115—134.

Derselbe behandelt the Insects of the Cairns district, Northern Queensland; ebenda S. 213—238, 307—328. (95 n. A.).

L. Fairmaire beschreibt Coléoptères nouveaux de l'Afrique ...; Notes Leyden Museum, X, S. 255—271.

Die Beiträge zur Kenntniss der Coleopteren-Fauna von Central-Afrika nach den Ergebnissen der Lieutenant Wissmannschen Kassai-Expedition 1883 bis 1886 von G. Quedenfeldt zählen 229 Arten auf mit der Beschreibung einer grossen Anzahl neuer; Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 155—219.

Fairmaire bringt den Schluss seines Verzeichnisses der Coléoptères ... chez les Somâlis et dans l'intérieur du Zanguebar; Ann. Soc. Ent. France 1887 S. 321—368 Pl. 3.

H. W. Bates fährt in der Beschreibung der Tropical African Coleoptera; chiefly from the Zanzibar Mainland, fort; Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 200—203, 237—242.

Fairmaire liefert eine Enumération des Coléoptères rec. dans le sud de l'Afrique; Ann. Soc. Entom. de France, 1888, S. 173—202.

L. Bedel stellt weitere Recherches sur les Coléoptères du nord de l'Afrique an; Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 285—290. Dieselben bestehen aus recherches synonymiques u. additions à la faune du nord de l'Afrique. In den ersteren werden folgende Synonymieen angegeben: *Licinus brevicollis Dej.* = *punctatulus F.*; (*Pedius ineptus Coq.* = *siculus Levrat*); *Dromius fedjezensis V. Mayet* = *Metabletus vittatus Mots.*; *Hydroporus dorso-plagiatus Fairm.* = *bimaculatus Duf.* = *jucundus Perr.*; *Ochthebius trisulcatus Rey* = *velutinus Fairm.*; *Tarphius liliputanus Lucas* nicht = *Fairmairei Mars.*, sondern *oblongulus Fairm.*; *Pleurophorus ovipennis Desbr.* = *vulneratus Muls.*; *Asida silphoïdes L.* = *maura L.*; *Lagria brevipilis Desbr.* = *rubida Graells*; *Sitona hipponensis Desbr.* = *lividipes Fährs.*, *argentellus Desbr.* = *virgatus Fährs.*; *Leucomigus albo-tesselatus Fairm.* = *Lucasi Chev.* = *candidatus Pall.*; *Tychius discithorax* und *undulatus Desbr.* sind eine Art und gehören zu *Pachytychius Jek.*; *T. Raffrayi Tourn.* = *longitubus Desbr.*; *Ectatotychius Tourn.* = *Apeltarius Desbr.*; *Orchestes biplagiatus Desbr.* = *Rhynchaenus erythropus Germ.*; *O. flavipes Desbr.* = *R. erythr. var. tricolor Kiesw.*; *Chrysomela edoughensis Fairm.* = *seriatipora Fairm.* — Die Additions geben neue Fundorte in Nordafrika an.

K. Eckstein beschreibt einen abnormen *Procrustes coriaceus* (mit ganz verkürzten, nur 3 mm. langen Flügeldecken); Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 32 mit Holzschn.

Reitter sagt Einiges über den Werth mehrerer Coleopteren-Gattungen und über deren Prioritäts-Berechtigung; Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 97—109; s. auch v. Seidlitz, „Zur Abwehr“, ebenda S. 168—172.

Zur Kenntniss von Insectenbohrgängen in fossilen Hölzern s. oben S. 28 f.

L. W. Schaufuss beschreibt einige Käfer aus dem baltischen Bernsteine; Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 266—270.

Hypsosoma rotundicolle (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol. 1888, S. 125.

Coccinellidae. Weise macht Bemerkungen über Coccinellen aus Africa, hauptsächlich von Herrn Maj. v. Mechow gesammelt; Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 81—96.

Adalia (*rufescens* var.?) *bifasciata* (Addah) S. 94, *miniata* (Stanley-pool) S. 95, *Pipitzi* (Madagaskar) S. 96; Weise, a. a. O.

Caria decempustulata (Ashanti); Weise, a. a. O., S. 87.

Chilocorus quadriguttatus (Natal); Weise, a. a. O., S. 93.

Chilomenes tetrasticta (Kibanga); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France 1887, S. 366.

Coccinella quinquepunctata var. *Elberti* (Aschaffenburg); Flach, Wien. Ent. Zeitg., 1888, S. 298.

Epilachna Murrayi var. *praematura* (Quango), *villica* n. sp. (Ashanti) S. 82, *Dohrni* (Madagaskar) S. 85, *tibialis* S. 86; Weise, a. a. O..

Megilla maculata in Amerika von *Centistes americana* in ähnlicher Weise verfolgt, wie die europäischen *Cocc. 5-punct.* und *7-punct.* von *Microctonus terminatus*; Riley, Insect life, I. S. 101—104 mit Holzschn.

Ortalia punctata (Südafrika) S. 89, *oculata* (Quango) S. 90, *egena* (ibid.) S. 91; Weise, a. a. O.

Platynaspis bimaculata (Quango) S. 92, *rufipennis* (Sansibar) S. 93; Weise, a. a. O.

Scymnus zig-zag (Sardinien, Aegypten); Costa, a. a. O., I, No. 2, S. 87.

Endomychidae. *Alexia Reitteri* (Siebenbürgen; bisher mit *A. pilosissima* Friv. verwechselt); Ormay, Supplem. S. 27 und Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 166, *circassica*, *Lederi* S. 169, *clamboides* S. 170 (Cirkassien); Reitter a. l. O. Eine Übersicht der (28) Arten aus Europa und den angrenzenden Ländern, in welche obige 3 Arten bereits aufgenommen sind, gibt Reitter ebenda S. 322—327.

Endomychus coccineus var. *Biehli* (Siebenbürgen); Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 424.

Panomoea sumatrensis (Deli) H. S. Gorham, Notes Leyden Museum, X, S. 152.

Stenotarsus maculosus (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 158.

Erotylidae. On Erotylidae of the Leyden Museum; by H. S. Gorham, Notes Leyden Museum, X, S. 129—151, Pl. 7.

E. Reitter behandelt in dem XVI. Heft seiner Bestimmungs-Tabellen diese Familie; die Gattungen *Loberogasmus* Reitt. und *Pharoxonotha* Reitt., die ursprünglich zu den Cryptophagiden gestellt waren, werden jetzt zu den Erotyliden gebracht, mit denen sie ebenso vollkommen übereinstimmen, wie mit den Cryptophagiden, von welchen letzteren sie ihre unbehaarte Oberfläche entfernt.

Amblyscelis (n. g. Triplacin., für die Afrikanischen *Amblyopus* und *Kelleni* (Humpata) S. 145, *pallidus* (Congo-Fluss) S. 146; H. S. Gorham a. a. O.

Eusostria (n. g. Dacnin. Coptengidi affine) *aruensis* (Aru I.); H. S. Gorham, a. a. O., S. 140, Fig. 6.

Phoxogenys (n. g. Triplacin.) *Mülleri* (Java); H. S. Gorham, a. a. O., S. 149, Fig. 10.

Pseudotritoma (n. g. Triplacin., für *Tritomidea?* *nigrocruciata* Crotch und) *pulchra* (Moeara-Laboe, Sumatra); H. S. Gorham, a. a. O., S. 148, Fig. 9.

Aulacochilus crucis-meditae (Sumatra; Andaman-I.; Kambodscha); H. S. Gorham, a. a. O., S. 150, Fig. 11.

Encaustes Hageni (Sardang, Sumatra) S. 133, Fig. 1, *sulcata* (ibid.) S. 134, Fig. 2, *ceramensis* (Wahai) S. 135, Fig. 3; H. S. Gorham, a. a. O.

Episcapha Froggatti (Cairns); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 327.

Episcaphula gigas (Cairns) S. 326, *bifasciata* (Russell River) S. 327; Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, *andamanensis* (Andam.-I.) S. 141, (?) *corallipes* (Amboina) S. 142, Fig. 7, *aruensis* (Aru.-I.) S. 143; H. S. Gorham, a. a. O.

The larva of the clover stem borer, *Languria Mozardi Latr.*, as a gall maker (in Stengeln von *Lactuca canadensis*); Insect life, I, S. 119, mit Holzschn.

Languria australis (Cairns); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 326, *Yunnana* (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 136, *calcaroides* (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 217, *Vandepolli* (Normantown, Queensland); W. W. Fowler, Notes Leyden Museum, X, S. 159.

Micrencaustes metallica (Soekadana, Sumatra) S. 136, *sexguttata* (Serdang, Sumatr.) S. 137, Fig. 4, *eximia* (Borneo; Banka) S. 138, Fig. 5; H. S. Gorham, a. a. O.

Palaeolybas dorsalis (Junk river, Liberia; Niam-Niam); H. S. Gorham, a. a. O., S. 144, Fig. 8.

Thallis bizonata (Barron River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 328.

Triplax marginata (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschrift, 1888, S. 218, *Bedeli* (Marokko), *rudis* (Tanger); E. Reitter, a. a. O., S. 6. *Tritoma liberiana* (Junk river); H. S. Gorham, a. a. O., S. 146.

Chrysomelidae. E. Lefèvre zählt die Eumolpides auf, die É. Gounelle auf seiner Reise in Brasilien gesammelt hat; Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 291—304.

E. Allard gibt ebenda, S. 305—332, eine Synopsis des Galerucines à corselet silloné transversalement, indem er die Arten z. T. nur in analytischen Tabellen unterscheidet; ob der Autornamen „*All.*“ hinter einer Art überall eine neue Art bezeichnen soll, weiss ich nicht.

M. Jacoby liefert Descriptions of new species of phytophagous Coleoptera from Kin-kiang; Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 339—351.

Derselbe beschreibt some new species of phytophagous Coleoptera from... Blumenau; Notes Leyden Museum, X, S. 153—157.

Derselbe gibt Descriptions of new or little known species of phytophagous Coleoptera from Africa and Madagascar; Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 189—206, Pl. VII.

Aldrisma (n. g. *Mimastrin.*) *externecostata* (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 156.

Anomomera (n. g. *Goniocetene* simile) *tenuelimbata* (Somali-Iza), Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 360.

Cellomius (n. g. *Myochroin.*) *myochroites* (Caraça); Lefèvre, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 300.

Didalsus (n. g. *Pseudocolaspidi* affine) *latesulcatus* (Tabora); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 356.

Hallirrhotius (n. g. *Malacosomati* proximum) *africanus* (Sansibar; Innerafrika); M. Jacoby, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 203.

Malaxioides (n. g. *Galerucin.* *Apophyllae* affine) *grandicornis* (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 155.

Fairmaire ändert den Namen *Mombasa* (s. dies. Ber. für 1884, S. 186), wegen seiner zu grossen Aehnlichkeit mit *Mombasius* in *Mombasica* um;

Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 363; *M. subinermis* ist Pl. 3, Fig. 12, abgebildet.

Otacilus (n. g. Galerucin. Meristae et Malaconidae affine) *fulvus* (Madagaskar); M. Jacoby, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 201.

Schematizella (n. g. Galerucin.) *viridis* (Kamerun); M. Jacoby, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 203, Pl. VII, Fig. 11.

Sigrisma (n. g. prope Criocer.) *tuberifrons* (Ovambo); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 201.

Spilocephalus (n. g. Galerucin. Stenoplatyi et Metrioideae propinquum) *viridipennis* (S.-Afrika); M. Jacoby, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 202, Pl. VII, Fig. 12.

Abirus angustatus (Ramnad); Lefèvre, Bull. Soc. Entom. France 1887, S. CLXXV.

Acrothinium cupricolle (Kiu-Kiang); M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 342.

Adimonia multicostata Jac. = (*Galerucella*) *punctatostriata* Motsch.; M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 351.

Adimonia pallidicollis (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 217.

Aethonea variabilis (Alt Kalabar); M. Jacoby, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 199, Pl. VII, Fig. 14, 15; *Ootheca serricornis* Thoms. gehört gleichfalls in diese Gattung.

Agrianes subcostatus (Rio Grande do Sul); Lefèvre, Bull. Soc. Entomol. France, 1888, S. LXXXI.

Anthraxantha Davidis Fairm. = *Mimastra cyanura* Hope; Fairmaire, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 351.

Antipha viridipennis (Nordindien); Duvivier, Bull. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. XLIX.

Buddeberg schildert den Entwicklungsgang der auf *Euphorbia cyparissias* lebenden *Aphthona cyparissiae* und der auf *Iris pseudacorus* lebenden *A. nonstriata*; Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 36–38.

Apophyllia semiobscura (Zanguebar); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France 1887, S. 365, *smaragdipennis* (Cape town); M. Jacoby, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 204, Pl. VII, Fig. 13.

Argoa cupreata S. 299, *rugulosa* S. 300 (Minas-Geraës); Lefèvre, Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Arorium Revoili (Tabora); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 362.

Asbecesta Senegalense! Dej. (Aegypten), *Capense*! (Cap); Allard, Bull. Soc. Entom. France 1887, S. CC und Synopsis S. 325 f., *perplexa* Dej. (Senegal); derselbe, Synopsis, S. 326.

Anlacophora sternalis (Ovambo); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 202, *pubescens* (Anam) S. 306, *plicaticollis* (Halmahera), *rubicunda* (Indien), *castanea* (Alt-Calabar) S. 307, *natalensis* (N.) S. 308, *bicornuta* (Sumatra), *marginicollis* (Singapore) S. 309, *rubrocastanea* (Alt-Calabar), S. 310, *arcuata* (Natal), *transversa* (Benin), *biguttata* (Ceylon) S. 313, *granulata* (Kaffrarien), *aperta* (Südafrika), *quadripunctata* (Ceylon) S. 314, *quadrifasciata* (Madagaskar) S. 315, *seminigra* (Zanguebar) S. 316; Allard, Synopsis.

Blepharida nigromaculata (Delagoa Bay) S. 194, Pl. VII, Fig. 5, *laterimaculata* (S. Afrika) S. 195, Fig. 9, *ornaticollis* (Afrika) S. 196, Fig. 8, *intermedia* (Mombas, Sansibar) S. 197, Fig. 4; M. Jacoby, Trans. Entom. Soc. London, 1888.

Camptolenes opacula (Ovambo); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 201.

Campylochira Gounellei (Caraga); Lefèvre, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 297.

Costa erhielt zwei lebende *Cassida* (*Aspidomorpha*) *Stae. crucis* von Sumatra und meint, dass ihre Acclimatisation in Neapel nicht schwierig sein würde; Rendic. d. R. Acc. sci. fis. e mat. di Napoli (2) Vol. I (1887) S. 43.

C. gibbosula (Malatia); Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 77, *nigrostrigata* (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 157.

Centroscelis coccinella (Tabora) S. 359, *tripunctata* (Mpuapua) S. 360; Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887.

Chrysochus globicollis (Amur); Lefèvre, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LXXXI.

Buddeberg beschreibt die Entwicklungsstände der auf *Hypericum perforatum* lebenden *Chrysomela didymata* und *Hyperici*; ferner von *Chr. staphylea*, deren Larven sich von *Veronica beccabunga*, seltener von *Mentha aquatica* und *Lycopus europaeus* nährten; Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk., 41, S. 29–34.

Chrysomela amethystina Kolbe und *cupraria* Kolbe = *aurichalcea* Mannh. var.; Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 202.

Chrysomela crebrepunctata (Sansibar); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 359.

Chrysomelites jurassicus Fig. 25, *minima* Fig. 23 (lithogr. Schiefer); Oppenheim, Palaeontograph. 34, S. 242, Taf. XXXI.

Cladocera robusta (Sansibar), *limbata*, *nigrifrons*, *flaviceps* (Zanguebar); Allard, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CC, *nigripennis* (Nguru, Innerafrika) S. 197, Pl. VII, Fig. 2, *zanzibarica* (S.) S. 198; M. Jacoby, Trans. Entom. Soc. London, 1888. (Die erste Jacoby'sche Art ist nach Fairmaire, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXXXII, = *flaviceps* All.; *zanzibarica* Jacoby = *limbata* All.).

Clythra (*Diapromorpha*) *trisonata* (Guelidi); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 348, *lacerofasciata* (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 213.

Oneorane femoralis (Foochan); M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 350.

Colaspis intricata (Caraga) S. 295, *cribellata* (ibid.), *brunnipes* (ibid.) S. 296; Lefèvre, Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Colaspoides trigonomera (Caraga); Lefèvre, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 305, *pusilla* (Rio Grande do Sul); derselbe ebenda Bull. S. LXXXII, *chinensis*, *opaca*, *spinipes*, (Kiu Kiang); M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 343.

Colasposoma varicolor (Somali) S. 349, *densatum* (ibid.) S. 350, *cyaneo-cupreum* (Uzagara) S. 352; Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France 1887, *versicolor* (Ramnad); Lefèvre, ebenda Bull. S. CLXXIV, *foveipenne* (Madagaskar) S. 192, *humeralis* (ibid.) S. 193; M. Jacoby, Trans. Entom. Soc. London, 1888.

Coptocephala bifasciata (Kiu-Kiang); M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 341.

Corynodes laeviusculus (Indien); Lefèvre, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LXXXI.

Corysthea nigratarsis (Caraça); Lefèvre, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 298.

Der in Amerika eingeschleppte *Crioceris Asparagi* breitet sich dort weiter südwärts aus; Insect life, I, S. 29; natürliche Feinde desselben sind *Calocoris Chenopodii* und *Myobia pumila*; ebenda S. 61; vgl. Lucas; Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 102—104.

Crioceris crassicornis (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI S. 136, *Chinensis*, *tripagiata* (Kiu-Kiang); M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 340.

Cryptocephalus venustus mit Vorliebe auf Kartoffel, dann auf Tomaten, Kürbiss und Gurke; Insect life, I, S. 32.

Cryptocephalus tardus (Mte. Rosa); Weise, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 368, *dichrous*, *discoideus* S. 151, *muscifer*, *nigroscriptus* S. 152 (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, *chinensis* (Kiu-Kiang); M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 341.

Diabrotica elongata (Cauca); Duvivier, Bull. Soc. Entom. Belg., XXXI S. XLVII, *brasilensis* (Blumenau); M. Jacoby, Notes Leyden Museum, X, S. 156.

Dianthia trifasciata (Zanguebar), *violacea* (Senegal) S. 317, *rufa* (Fernando vas), *Passeti* (Südafri.), *fasciata* (Cambodscha), *Raffrayi* (Abyssin.) S. 318; Allard, Synopsis.

Diaphidia compacta (Makdischu); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 361.

Donacia transversicollis (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 135, *Lenzi* (Hiogo); H. v. Schönfeldt, Entom. Nachr., 1888, S. 33.

Über die Athmung der Donacien-Larven s. oben S. 200.

Das Vorkommen des Kartoffelkäfers (*Doryphora decemlineata* Say) in Lohe (Kreis Meppen); E. Böhr, 7. Jahresber. d. naturwiss. Ver. zu Osnabrück, S. 118—120.

Elithia bipunctata (Chili); Allard, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CC. *Entomochirus costulatus* (Caraça); Lefèvre, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 298.

Entomoscelis metallica (Sikkim); J. S. Baly, Ent. Monthl. Mag., XXV, S. 85. *Eustetha thoracica* (Kiu-Kiang); M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 348.

Galerucites carinata (lithogr. Schiefer); Oppenheim, Palaeontogr. 34, S. 242, Taf. XXXI, Fig. 26.

Galerucella vageplicata (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 154.

Goniocetena dichroa (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 153. *Gonophora Masoni* (Andaman I.); J. S. Baly, Ent. Monthl. Mag., XXV, S. 85. Life-history of *Graptodera foliacea* Lec.; Insect life, I, S. 74—76; 199. *Gr. modesta* (Blumenau); M. Jacoby, Notes Leyden Museum, X, S. 154. *Gynandrophthalma semiaurantiaca* (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entom., 1888, S. 150.

Haemonia Curtisii Lac. im Salzigen See bei Halle a. S. auf Pota-

mogeton pectinatus; Zacharias (nach Müller), Zeitschr. f. wiss. Zoologie, 46, S. 229.

Über die Bekämpfung der Erdflöhe s. Mitth. Mähr.-Schles. Ges. f. Ackerbau, Natur- und Landeskunde, 1888, S. 87f.

Die Gattung *Hamletia Crotch* (= *Pachyonychis Clark*) gehört nicht zu den Monoplati, sondern zu den Oedionychi, neben *Physodactyla Chap.* und *Eutornus Clark*; M. Jacoby, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 802.

Haplosoma corniculata (Cochin-China), *rostriperennis* (Celebes) S. 328, *piceifemora* (Philippinen), *africana* (Kamerun) S. 329, *longicornis* (Indien), *annamita* (Anam) S. 330; Allard, Synopsis.

Buddeberg beschreibt die Jugendzustände der auf *Mercurialis perennis* lebenden *Hermacophaga Mercurialis*; Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 35f.

Heteraspis nitidissima (Kiu-Kiang); M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 345.

Ein auf dem Zirbitz-Kogel in Steiermark gefangenes Exemplar (das zweite bekannte) von *Hippuriphila simplicipes Kutsch.* gibt Weise Gelegenheit, eine vollständige Diagnose dieser Art zu geben und ihre systematische Stellung zu berichtigen; Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 110.

Hovalia Fairm. = *Alphidia Clark*; M. Jacoby, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 205.

Lactica Haroldi (Blumenau); M. Jacoby, Notes Leyden Museum, X, S. 155.

Lema longula (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 212, *bimaculata* (Andaman-I.); J. S. Baly, Entom. Monthl. Mag. XXV, S. 85, *dilutipes* (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1883, S. 149, *nigribabris* (Blumenau); M. Jacoby, Notes Leyden Museum, X, S. 153, *crispraria* (Kamerun, Delagoa Bay) S. 190, *apicicornis* (Alt-Kalabar), *laticollis* (Delagoa-Bay) S. 191, Pl. VII, Fig. 1; derselbe, Trans. Entom. Soc. London, 1888.

Lepronota singularis (Caraça), *verrucosa* (ibid.) S. 292, *cyanella* (ibid.) S. 293; Lefèvre, Ann. Soc. Entom. France, 1888.

E. Dugès schildert die metamorphosis de la *Chrysomela* (*Leptinotarsa*) *modesta Jacoby*; La Nature (2. S.) I, S. 63—65, L. VII.

Lina ignitincta Fairm. = *Galeruca fulminans Mén.*; Fairmaire, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 351.

Der frühzeitig erscheinende *Longitarsus niger* legt seine Eier im Juni an die Wurzel von *Echinum vulgare* oder in die Nähe derselben; die Larve nährt sich von der Wurzel, ist in anderthalb Monaten ausgewachsen und verwandelt sich in einer Erdböhle ohne Gespinnst in eine Puppe, aus der nach 3-wöchentlicher Ruhe der Käfer schlüpft. *L. tabidus* legt seine Eier Ende Juli und Anfangs August dicht über der Erde an *Verbascum*-Arten; die Larve frisst unter der Rinde der Wurzel Gänge in dieselbe, ist Ende Mai des nächsten Jahres ausgewachsen, kriecht zur Verpuppung in die Erde und liefert nach etwa einmonatlicher Puppenruhe den Käfer Anfangs Juli. Buddeberg, Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk. Wiesbaden, 41, S. 39—41.

Luperodes brasiliensis (Blumenau); M. Jacoby, Notes Leyden Museum, X, S. 156.

Malacosoma deformicornis, S. 213, *procerum*, S. 214, *nigriventre*, S. 215 (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888.

Malaxia Alluandi (Assinie), *aurolimbata* (Natal), *nigricollis* (Alt-Calabar), *purpurea* (China); Allard, Synopsis, S. 332.

Megalognatha Haroldi (Tabora; = *Malacosoma elegans* Har. nec Baly); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France 1887, S. 365.

Melasoma octodecimpunctata (Kiu-Kiang); M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 346.

Mesodonta submetallica (N'Gami; Zambesi); M. Jacoby, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 200, Pl. VII. Fig. 10.

Metaxyonycha minarum (Caraga); Lefèvre, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 294.

Monolepta flaviventris Motsch. ist eine *Malacosoma*; M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 351.

Monolepta tricolor (Ovambo); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 202, *Baeri* (Philippinen) Fig. 1, *puncticollis* (ibid.) Fig. 2; Allard, Le Naturaliste, 1888, S. 260, *Mohuquensis* (Halmahera) Fig. 1, *albiventris* (Madagaskar) Fig. 2, *vulgaris* (Zanguebar) Fig. 3, S. 270, Thomsoni *Murray* (Alt-Kalabar), *elegans* Dej. (Senegal) Fig. 1, *dichroa* Klug Fig. 2, *minima* (Indien) Fig. 3. S. 286; derselbe ebenda.

Nodostoma Fabrei (Ramnad); Lefèvre, Bull. Soc. Entom. France 1887, S. CLXXV, *Leechi* (Kiu-Kiang); M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 344.

Oedionychis madagascariensis (Matanga); M. Jacoby, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 194, Pl. VII. Fig. 8.

Ootheca cyaneovittata Fairm. kann nicht in diese Gattung gehören, da sie vom Typus derselben, *O. mutabilis*, in Gestalt, Bau des Thorax, Mangel der elytralen Epipleuren und dem stark verlängerten ersten Tarsenglied der Hinterfüsse abweicht; M. Jacoby, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 205.

Weise macht zu den 3 bekannten Arten der Gattung *Pachytoma* die neuen *Quedenfeldti* (Quango), *truncata* (Ashanti) und *Mechowi* (Quango), bekannt; die *P. flava* Clark lag dem Verfasser nicht vor und ist vielleicht mit *Quedenfeldti* identisch; Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 111f.

Pagria strigicollis (Ramnad); Lefèvre, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXV.

Paralina impressiuscula Fairm. = *fallaciosa* Stål.; Fairmaire, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 351.

Paria Gounellei (Tijuca), *stigmula*, *maculigera* (ibid.); Lefèvre, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 303.

Paropsides nigrofasciatus (Kiu-Kiang); M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 348.

M. Jacoby und G. H. Horn geben nach Ansicht der Type Aufklärung über *Phaedromus Waterhousei* Clark; Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 303f.

Phyllobrotica (?) *ornata* (Foochan); M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 349.

Phytodecta flavipennis, *tredecimmaculata* (Kiu-Kiang); M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 347.

Poecilomorpha apicata (Somali?); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 348.

Polysticta nigro-maculata (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom.

Zeitschr., 1888, S. 216, *madagascariensis* (M.); M. Jacoby, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 193, Pl. VII, Fig. 6.

Prionodera pusilla (Minas Geraës); Lefèvre, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 294.

Prodoxenus ruficollis (Caraça); Lefèvre, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 297.

Pseudocolaspis anthina (Tabora), *auripes* (ibid.) S. 353, *pachnephora*, *minutula* (Zanguebar) S. 354; Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France 1887.

Pseudocophora nitens (Annam; Sumatra), *flava* (Annam) S. CC, *plicata* (Malacca), *praeusta* Chev. (Java) S. CCI; Allard, Bull. Soc. Entom. France, 1887 und Synopsis, S. 324f.

Rhembastus punctatosulcatus (Uzagara); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 357.

Sagra luctuosa (Guelidi); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 347, *Muelleriana* (Pogge-Fall im Kassai); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 211, *Leechi* (Kiu-Kiang); M. Jacoby, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 339, *opaca* (Mamboia); derselbe, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 189, Pl. VII, Fig. 7.

Scelodonta inaequalis (Mpuapua); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 357.

Sphenoraia indica (Nordindien); Duvivier, Bull. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. XLVIII.

Spintherophyta lampros (Caraça); Lefèvre, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 291.

Systema bifasciata (Blumenau); M. Jacoby, Notes Leyden Museum, X, S. 155.

F. P. de Bono stellte Untersuchungen sull'umore segregato dalla *Timarcha pimelioides* Schöff. zunächst mit Fröschen und Kröten an; die Schlussfolgerungen aus diesen Versuchen sind noch nicht gezogen; Il Natural. Siciliano, VIII, S. 24—28, 44—48, 72—75.

Timarcha Riffensis (R.); Fairmaire, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CXCI, *strophium* (Cuenca und Camarena); Weise, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 124.

Tropidophora tripartita Thoms. scheint = *Physonia Dohrni* Chap. zu sein, gehört aber wohl nicht zu den Galerucinen, wo sie im Cat. Gemm. & Har. steht; M. Jacoby, Trans. Entom. Soc. London, 1888, S. 205.

Lefèvre kommt durch reichliches Material zu der Überzeugung, dass *Typophorus basalis* Baly, *ruficollis* Baly und *sanguinicollis* Lefèvre Varietäten der einen Art *T. Kirbyi* Baly sind und diagnostiziert diese Art mit ihren Varietäten sowie *T. centromaculatus* (Bahia), *erythropus* (Tijuca), *tarsalis* (ibid.); Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 302.

Bruchidae. Abeille de Perrin stellt ein Tableau synoptique des *Bruchides* et *Urodonides* français d'après Fl. Baudi de Selve auf; Revue d'entomol., 1888, S. 77—90.

Cerambycidae. (14) *Cerambycidarum Africae species novae* sind beschrieben von G. Quedenfeldt, Jornal de Sciencias Mathem., Physic. e Naturaes, Lisboa, No. XL, S. 1—8 (Sonderabdruck).

Descriptions of a new genus and of some new species of . . . Lamiidae . . . in the Solomon Islands; by Ch. J. Gahan; *Ann. a. Mag. N. H.* (6), I, S. 190—193.

Derselbe: On Longicorn Coleoptera of the family Lamiidae; ebenda S. 270—281, Pl. XVI, Fig. 1—5.

Derselbe: On new Longicorn Coleoptera from China; ebenda II, S. 59—67.

Derselbe: Descriptions of some Indian species of Longicorn Coleoptera; ebenda S. 260—263.

Derselbe: On new Lamiide Coleoptera belonging to the Monohammus group; ebenda S. 389—401.

Derselbe gibt Notes on some types of North American Cerambycidae in the British Museum; *Trans. Amer. Ent. Soc.*, XV, S. 299f.

F. P. Pascoe stellt a list of the described Longicornia of Australia and Tasmania (553 A.) zusammen; London, 1888, S. 1—48.

Acroptycha (n. g. Niphonin.) *spinifera* (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 210.

Aethaliodes (n. g. Trachystolae affine) *verrucosus* (N.-China); Ch. J. Gahan, a. a. O. I, S. 270, Fig. 1.

Amarysius (n. g. Purpuriceno et imprimis Brototychoe affine, corpore elongatodiversum) *dilatatus* (Peking); L. Fairmaire, *Revue d'entomol.*, 1888, S. 141.

Anybostetha (n. g. Prosopocerin.) *saperdoides* (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 202.

Nach C. J. Gahan ist *Liopus biguttatus* Lec. nicht synonym mit *Graphisurus pusillus* Kirby, sondern letzterer ist *Acanthocinus obsoletus* Oliv. Die Gattung *Graphisurus* ist für die beiden Arten *triangulifer* Hald. und *fasciatus* De Geer beizubehalten, und für *Graphisurus* Horn, mit *biguttatus* Lec. als Type wird die n. g. *Ceratographis* vorgeschlagen; *Trans. Amer. Entom. Soc.*, XV, S. 299f.

Eutaeniopsis n. g. Lamiin. prope *Coelosternam*, für (*Eutaenia*) *trifasciella* White; Ch. J. Gahan, a. a. O., I, S. 277.

Glenida (n. g. Saperdin., *Neoxanthae* affine) *suffusa* (Kiu-Kiang), *cyaneipennis* (China); Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 66.

Haplothrix (n. g. prope *Mecynippum* et Goëm) *simplex* (Siam); Ch. J. Gahan, a. a. O., I, S. 279, Fig. 5.

Leuronotus (n. g. Monohammmin.) *spatulatus* (Solomon Isl.); Ch. J. Gahan, a. a. O., I, S. 190.

Micrometopus (n. g. Toxotin.) *punctipennis* (Angola); G. Quedenfeldt, *Jorn. Sci. math., phys. e nat.*, Lisboa, No. XL, S. 2.

Pizodarus n. g. *Hoplideri* proximum; für (H.) *Nyassae* Bates; Fairmaire, *Ann. Soc. Entom. France*, 1887, S. 325.

Plagiomus (n. g. *Tragocephalin.*) *multinotatus* (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 206.

Thermonotus (n. g. prope *Cereopsium*) *nigripes* (Nordindien; Pinang); Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 399.

Trachylophus (n. g. inter *Mallambycem* et *Xoanoderam*) *sinensis* (China), *approximator* (Java); Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 60.

Aphrodisium Albardae (Tjilatjap, Java); C. Ritsema Cz., *Notes Leyden Museum*, X, S. 193.

Apomecyna latefasciata, S. 6, *quadrisignata*, *brevis*, S. 7 (Angola); G. Quedenfeldt, Journ. Sci. math., phys. e natur., Lisboa, No. XL.

Archidice quadrinotata Thoms. = *Lamiomimus* (Monnh.) *officinator* White; Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 400.

Aristobia angustifrons (Siam); Ch. J. Gahan, a. a. O., I, 276.

Arrhythmus pallimembris (Madagaskar); Fairmaire, Le Naturaliste, 1888, S. 22 mit Holzschn.

Astynomus tertiaris (Braunkohle von Zschipkan); Kolbe, Zeitschr. deutsch. geol. Gesellsch., XL, S. 135.

C. Ritsema Cz. erinnert nochmals daran, dass Pascoe seine beiden Gattungen *Bacchisa* und *Momisis* auf die beiden Geschlechter zweier Arten gegründet hat, die derselben *Astatheinen*-Gattung angehören, zählt die (4) bekannten Arten dieser Gattung auf und beschreibt *Bacchisa singularis* (Serdang, Ost-Sumatra); Notes Leyden Museum, X, S. 253 f.

Baraenus tuberculatus (Angola); G. Quedenfeldt, Journ. Sci. math., phys. e nat., Lisboa, No. XL, S. 4.

Cacoscapus Thoms. = *Stratioceros* Lac., und *C. Mouhotii* Thoms. = *Str. princeps* Lac.; Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 262.

Callichroma carinicolle, S. 198, *rugicolle*, S. 199, *parallelepippe* S. 200 (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, *chrysogaster* (Ceylon); C. Ritsema Cz., Notes Leyden Museum, X, S. 195.

Ueber die Generation des Fichtenbockes, *Callidium luridum*, macht A. Pauly in der Allgem. Forst- und Jagdzeitung, 1888, September-Heft, S. 1—4 (Sep.), nach Zuchtversuchen eine Mittheilung. Der Verfasser beschreibt zunächst das von ihm angewandte Verfahren (Ueuerziehen der Schnittendflächen von frischen Stammstücken mit einer Paraffinschicht), um kleineren Stammstücken die zur Entwicklung der Holzinsekten nöthige Feuchtigkeit zu sichern. In einem so behandelten Stammstück entwickelten sich als Nachkommen eines am 10. Juni ausgesetzten Weibchens noch in demselben Jahre 4 (kleinere) Imagines, während am 2. Juni des folgenden Jahres noch 2 weitere sich entwickelt hatten, von denen eines entwischte, das andere ein grosses Weibchen war. Demnach würde ein, vielleicht der grössere, Theil der Nachkommenschaft dieser Art sich nach drei- bis viermonatlichem Larvenleben noch im Flugjahr der Eltern zu Käfern entwickeln, der andere dagegen erst nach einjährigem Leben unter der Rinde zur Imago werden. Eine ähnliche Entwicklung ist für sämtliche mittel-grossen Arten wahrscheinlich.

C. (Semanotus?) cupreo-virens (Angola); G. Quedenfeldt, Journ. Sci. math., phys. e nat., Lisboa, XL, S. 3, (*Lioderes*) *Henschi* (Herzegowina); A. Puton, Revue d'entom., 1888, S. 23.

Ceroplesis semitrabeata (Uzagara); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France 1887, S. 340.

Charinotes Richteri (Sa. Katharina, Brasil.); Fischer, Berlin. Ent. Zeitschr., 1888, S. 490.

Closteromerus reticollis (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 200, *violaceipennis*, *annulatus* (Angola); derselbe, Journ. Sci. math., phys. e nat., Lisboa, No. XL S. 3.

Clytus tenuicornis S. 14?, *polyzonus*, *Artemisiae* S. 143, *tsitoensis* (auch

Kiangsi) S. 144, *fuliginosus* S. 145 (alle von Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol. 1888.

Cortodera alpina var. *Starcki* (Abago); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 280.

Criocephalus epibata *Schiedle* wiederholt bei Joigny gefangen; Berthelin, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XXVIII.

Crossotus fascicularis (Tabora); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France 1887, S. 337, *flocifer* (Cabinda, Afr.); G. Quedenfeldt, Journ. Sci. mat. phys. e nat., Lisboa, No. XL, S. 6.

Cymatura mucorea (Makdischu); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 343.

Cyriocrates Waterhousei (Nias J.); Ch. J. Gahan, a. a. O., I, S. 276, Fig. 4, *elegans* (Upper Burmah); derselbe, ebenda, II, S. 450.

Deliathis Batesi (Mexiko); Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 398.

Dichostates compactus (Mpuapua); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France 1887, S. 337, *Muelleri* (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 207.

Dihammus spinipennis (Neu-Caledonien); Ch. J. Gahan, a. a. O., I, S. 275.

Diochaes flavoguttatus (Tchekiang); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 133. (Ist nach Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 400, = *Psacotha hilaris Pascoe*; von *Psacotha* sind die Gattungsmerkmale angeführt).

In die Gattung *Domitia* *Thoms.* gehört auch (*Monohammus*) *viridipennis Chev.*, die vielleicht mit der typischen Art, *D. lupanaria* *Thoms.*, identisch ist. Unzweifelhaft gehört auch (*Lamia*) *aenea* *Parry* in diese Gattung; Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 401.

Drymochares Starcki (Kaukasus); Ganglbauer, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 395.

Epepeotes uncinatus (Nordindien) S. 271, Fig. 2, *albomaculatus* (ibid.) S. 272; Ch. J. Gahan, a. a. O., I.

E. (Leptodera) spinosa *Thoms.* = *meridianus* *Pasc.*, *lateralis* *Guér.*; Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 400.

Ephies cardinalis (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 131.

Euoplia argenteo-maculata *Aurivill.* = (*Lamia*) *pulchellator* *Westw.*; die Art passt am besten in die Gattung *Psaromala* *Pascoe*; C. Ritsema Cz., Notes Leyden Museum, X, S. 198.

Gnatholea picicornis (Ovambo); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, S. 200.

Haplohammus speciosus (China) S. 274, *socius* (ibid.) S. 275; Ch. J. Gahan, a. a. O., I, *contemptus* (China); derselbe, ebenda II, S. 62.

Hecyrida rufolineata (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 208.

Hesperophanes hylotropoides (Mpuapua); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 327.

Heteroclytomorpha punctata (Solomon Isld.); Ch. J. Gahan, a. a. O., I, S. 192.

Hippopsicon cribricollis (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 210.

Hyllisa subvirgata (Tabora); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 344.

Melvill zeigte der Manchester literary a. philos. soc., meet. 15. März 1886, ein Exemplar von *Hypocephalus armatus* vor und erörterte dessen verwandtschaftlichen Beziehungen zu den übrigen Käferfamilien; Proceed. XXV, S. 223–229; vgl. dies. Bericht über 1884, S. 197.

Hypocrites pretiosus (Tabora) S. 328, *janthinicornis* (ibid.), *laevipes* (Somali) S. 329; Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887.

Inesida guttata (Muata-Kumbana); G. Quedenfeldt, Berlin. Ent. Zeitschr., 1888, S. 206.

Leptodera arista Thoms. = *verrucosa* Pascoe; Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 262.

L. lecta (Siam) S. 389, *insidiosa* Chevrolat i. m. (Nordindien; Pinang) S. 391; Ch. J. Gahan, a. a. O. II.

Zu *Leptura nana* Newm. und *exigua* Newm. s. G. H. Horn, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 301.

Litopus semiopacus (Kibanga); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 331.

Logisticus sesquivittatus (Madagaskar); Fairmaire, Le Naturaliste, 1888, S. 23 mit Holzschn.

Macrotoma octocostata (Afrika); G. Quedenfeldt, Journ. Sci. math., phys. e nat., Lisboa, No. XL, S. 1.

Mallosia Ganglbaueri Kraatz = (*Saperda*) *mirabilis* Faldern.; Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 77.

M. tristis (Talysh); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 134.

Marmaroglypha sumatrana (Serlang); C. Ristema Cz., Notes Leyden Museum, X, S. 204.

Mecas inornata Say = *cinerea* Newm., *senescens* Bates; *cana* Newm. nicht = *pergrata* Say, sondern *saturnina* Lec.; C. J. Gahan, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 300; vgl. dazu G. H. Horn, ebenda, S. 301.

Melanauster leechi (Kiu Kiang); Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 63.

Monohammus rivulosus Pascoe i. l. (Assam; Laos), *ciliatus* (China); Ch. J. Gahan, a. a. O., I, S. 373, *albisparsus* (Kiu Kiang), S. 62, *auratus* (Silhet), *bimaculatus* S. 260 *amicator* White i. l. (Silhet), *griseatus* (Indien) S. 261 *ocellatus* (Indien; Pinang) S. 262, *modicus* (Madras) S. 391, *distinctus* (Assam) S. 392, *perplexus* (Indien), *vagus* (Gabun?) S. 393, *murinus* Dej. cat. (Senegal), *plumbeus* (Congo) S. 394, *fulvisparsus* (Congo), *nyassensis* (Nyassa) S. 395; derselbe ebenda II.

M. Fredericus White = *desperatus* Thoms. und ist in die Gattung *Agnoderus* Thoms. zu stellen; *rotator* F. = *Goes tigrinus* De Geer; es empfiehlt sich, den De Geer'schen Namen beizubehalten; Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 262f., *melanostictus* White = *beryllinus* Hope und ist mit *Bowringii* White in die Gattung *Melanauster* verwiesen; *M. marcipor* Newm. ist ein *Anammus*; derselbe ebenda S. 401.

Morimus rufispectus (Afrika); G. Quedenfeldt, Journ. Sci. math., phys. e nat., Lisboa, No. XL, S. 4.

Nupserha basipennis (Kibanga) S. 345, *nigriventris* (Tabora.) S. 346; Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France 1887.

Oberea semivittata (Yunnan), *seminigra* (Tchekiang); L. Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 134, *scutellaris* (Peking); derselbe, Revue d'entomol., 1888, S. 147.

Obriacum elegans (Makdischu); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 334, Pl. 3, Fig. 9.

Olenecamptus obsoletus (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 145.

Omocyrius Jansoni (Elopura, N. Borneo); C. Ritsema Cz., Notes Leyden Museum, X, S. 201.

Orsidis ampliatus (Solomon Isl.); Ch. J. Gahan, a. a. O., I, S. 191.

Pachydissus aspericollis (Makdischu); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 335.

Pachyteria Borrei (Java) S. 178, (bicolor *Parry*, S. 180), *Pryeri* (Elopura, Borneo) S. 183, *Hageni* (Serdang, Sumatra) S. 185, *Evertsi* (Deli, Sumatra) S. 187, *Oberthüri* (Siboga, Sumatra) S. 190, (affinis *Rits.*, S. 191); C. Ritsema Cz.; Notes Leyden Museum, X.

P. zonopteroides Fleutiaux = *Callichroma Griffithii Hope*; C. Ritsema Cz., a. a. O., S. 198.

Pelargoderus flavicornis (Nias I.); Ch. J. Gahan, a. a. O., I, S. 272, Fig. 3.

P. rugosus Waterh. = *Paragnoma acuminipennis Ilanch.*; die Gattung *Paragnoma* ist auf das Weibchen einer *Pelargoderus*-Art begründet und kann nicht bestehen bleiben; Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 400 f.

Peribasis albisparsa (Elopura, N. Borneo), C. Ritsema Cz., Notes Leyden Museum, X, S. 203.

Pharsalia alboplagiata (Borneo) S. 279, *pulchra* (Siam) S. 280; Ch. J. Gahan, a. a. O. I.

Phoryctus Paulinoi (Angola); G. Quedenfeldt, Journ. Sci. math., phys. e nat., Lisboa, No. XL, S. 7.

Phryneta nigroperlata (Guelidi); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 338, *ornata* (Angola); G. Quedenfeldt, Journ. Sci. math. phys. e nat., Lisboa, No. XL, S. 5.

Phytoecia (Coptosia) *Heydeni* (Malatia); Ganglbauer, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 76, *sareptana* (S.); derselbe, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 376.

Ph. affinis var. *nigropubescens*, *Starcki*, *circassica* (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 282, (*Pilemia*) *hirsutula Fröl.* var. *homoiesthes!* (Turkmenien); L. Ganglbauer, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 197.

Pidonia lurida F. var. *Ganglbaueri* (Siebenbürgen, Görz; Belgrad); Ormay, Supplementa, S. 45 und Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 168.

Polyzonus hexastictus (Mpuapua); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 327, *Laurae*, *cuprarius* (Yunnan); derselbe, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 132.

Prionus Delavayi (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 130, *Heydeni* (Namangan) S. 265, *curticornis* (Turkestan) S. 266; Ganglbauer, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, mit Bemerkungen über *Pr. Persicus Redtb.* = *Besicanus Jakowl.* nec *Fairm.* und *Besicanus Fairm.*

Pr. (Psilopus) brevis (Taschkent), *turkestanicus* (Samarkand); A. v. Semenow, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 157.

Prosopocera angolensis (A.); G. Quedenfeldt, Journ. Sci. math., phys. e nat., Lisboa, No. XL, S. 5.

Pseudocalamobius filiformis (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entom., 1888, S. 146.

Purpuricenens globiger (Peking; Kiangsi), *sideriger* (Kiangsi) S. 139, *petasifer* (Peking) S. 140; L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, Pratti (China); Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 61.

Pyresthes hypomelas (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXI, S. 131.

A. Lameere behandelt le genre *Rosalia*; Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 159—174, Pl. III. — Die für die Gattung *Eurybatus* angegebenen Unterschiede sind nicht stichhaltig oder (wie die Färbung) nicht wichtig, so dass *Eurybatus* nur eine Untergattung von *Rosalia* bilden kann. Die (10) Arten dieser Gattung werden zuerst in analytischer Tabelle unterschieden und dann genauer beschrieben und abgebildet; neu sind *R. gravida* (Himalaya) S. 166, Fig. 4 und *laeta* (Java) S. 168, Fig. 7.

Rosenbergia exigua (Neu-Guinea); Ch. J. Gahan, a. a. O., I, S. 280.

Saperda simulans (China) S. 64, *brunnipes* (Kiu Kiang) S. 65; Ch. J. Gahan, a. a. O., II.

Sternotomis Wissmanni (Quimalanca) S. 203, *niveipectus* (Muata-Kumbana) S. 204; G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888.

Die Männchen von *Sthenias* (Lamia) *grisator* F. haben an der Aussenseite der Mandibeln in der Basalhälfte einen nahezu senkrecht aufstehenden Zahn; die von Pascoe für identisch gehaltene Sumatra-Art ist eine andere, *Sthenias Pascoei* genannt; C. Ritsema Cz., Notes Leyden Museum, X, S. 272.

Strangalia nigrocaudata (Nordchina); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 135.

Sympiezocera sinensis (China); Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 61.

Taeniotes simplex (Südamerika?) S. 396, *singularis* (Ekuador) S. 397; Ch. J. Gahan, a. a. O., II.

Thyestes funebris (Kiu Kiang); Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 67.

Tragocephala modesta (Makdischu); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 341.

Trigonoptera Woodfordi (Solomon Isla.); Ch. J. Gahan, a. a. O., I, S. 198.

Uraecha punctata (China); Ch. J. Gahan, a. a. O., II, S. 63.

Volumnia militaris (Tabora); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 345.

Xylotrechus oculicollis (Uzagara); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 334.

Xystrocera globosa Oliv. hat sich in Kairo (und Usegua) in grosser Menge gezeigt und die seit 1822 eingeführten Lebbachbäume (*Albizzia Lebbek*) zum grossen Theile zerstört; L. Anderlind, Allg. Forst- und Jagdztg., Juli-Heft 1888, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 15; Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 335, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 275; Entom. Nachr., 1888, S. 241.

Xystrocera nitidiventris (Uzagara); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 326, *trivittata* S. 196, *metallica* S. 197 (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888.

Zygocera (?) *albovirgulata* (Madagaskar); Fairmaire, Le Naturaliste, 1888, S. 23 mit Holzschn.

Anthribidae. *Anthribites Rechenbergi* (Braunkohle von Zschipkau); Kolbe, Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gesellsch. XL, S. 134.

Tophoderes nubeculosus (Madagaskar); Fairmaire, Le Naturaliste, 1888, S. 32 mit Holzschn.

Brenthidae. *Isognathus*! (n. g.; Name von Felder schon bei Schnettleringen vergeben) für (*Anisognathus*) *Mechowi* und *anaticeps* Kolbe; Kolbe, Entom. Nachr., 1888, S. 305; I. *Mechowi* ist abgebildet Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, Taf. VI, Fig. 11.

Orychodes sinensis (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 138.

Spatherinus eupsaloides (Quango), *picturatus* (ibid.) S. 306, *ophthalmicus* (Gabun), *juvenilis* (Joubu) S. 307, *longiceps* (Gabun) S. 308; Kolbe, Entom. Nachr., 1888, mit Tabelle der Arten des Berliner Museums, S. 309.

Scolytidae. Bedel macht folgende Bemerkungen über Scolytiden *Hylesinus Perrisi* Chap. gehört zu *Carphoborus Eichh.*; *Phloeotribus oleae* F. ist früher von Bernard als *Scolytus scarabaeoides* beschrieben; *Scolytus carinatus* Chap., in den „Europ. Borkenk.“ von Eichhoff als Europäer aufgeführt, stammt nicht von Cartagena in Spanien, sondern von dem Columbischen Cartagena; *Ernoporus Schreineri Eichh.* = *caucasicus* Lind.; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CXCI.

E. A. Schwarz theilt Notes on the food habits of some North American Scolytidae and their coleopterous enemies mit; Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 163–165.

Pauly hielt auf der 17. Versammlung deutscher Forstmänner in München einen Vortrag über die Generation der Bostrychiden. Nach Eichhoff ist die Zahl der Generationen in einem Jahre eine drei- oder gar vierfache, und es sind (abgesehen von dem Frühjahrsschwarm) 2 oder gar 3 Schwärme in demselben Sommer zu unterscheiden. Zu dieser Anschauung kam Eichhoff durch die Beobachtung der zur Entwicklung vom Ei bis zur Imago nöthigen Zeit, die er in die gute Jahreszeit dividirte. Pauly zeigt indessen, dass das Schwärmen der Borkenkäfer nicht auf einmal und unmittelbar nach dem Ausschlüpfen der Imago erfolgt, sondern erst bei einer für die einzelnen Arten verschiedenen höheren Temperatur. Diese Temperaturen treten bei uns gewöhnlich erst im Mai ein; dann erfolgt die Anlage der Brutgänge, und wenn sich auch die ersten Nachkommen dieses Jahres bereits Ende Juni zeigen, so sind das nur vereinzelte Vorläufer des erst im Juli bis Mitte August sich zeigenden zweiten und letzten Schwarmes dieses Jahres; die Nachkommen desselben schwärmen erst im nächsten Frühjahr. — Allgem. Forst- und Jagdzeitung, herausgeg. von Lorey und Lehr, November-Heft 1888.

Scolytidae (*Tomicus pini* und *Dendroctonus simplex*) attacking tamarac trees; Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 175.

Anaeretus (!, soll *Anaeretes* heißen und ist in dieser Form schon vergeben) n. g. (?) für (*Xyleborus*) *guanajuatensis* E. Dug.; E. Dugès, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 141.

Pityogenes n. g., für *chalcographus* L. (Type), *bidentatus* Hbst., *quadridens* Htg.; Bedel, Faune du bassin de la Seine etc. S. 397.

Eine Ansicht der Typen der Harris'schen Sammlung bestätigte die Vermuthung E. A. Schwarz', dass Harris unter seinem *Tomicus* (*Phloeotribus*) *liminaris* diese Art und *Hylesinus opaculus* vereinigt hatte; Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 149.

Tomicus pinicola nov. nom. (= *ater* Payk. nec *F.*, *piniperda* *F.* nec *L.*); Bedel, Faune du bass. de la Seine, S. 390.

T. austriacus (Ö.); Wachtl, Mitth. d. Niederöstrerr. Forstvereins, 1887, 3, XXXI, S. 320.

Xyleborus (vielleicht n. G. *Anaeretus*, s. oben) *guanajuatensis* (Mexiko); E. Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, S. 141, Pl. I, Fig. 11—22, mit der ganzen Metamorphose.

E. A. Schwarz berichtet einige Irrthümer Peck's hinsichtlich der Brutkammern von *X. pyri*, der mit dem europäischen *X. dispar* nahe verwandt oder gar identisch ist, und beschreibt die Brutkammern einer als neu angedeuteten, zur *pyri*-Gruppe gehörigen Art, *X. Chrysobalani*, in Zweigen der *Chr. icaco*; Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 188 f.

Curculionidae. On some new North American Rhynchophora Part I. By Thos. L. Casey; Annals New-York Acad. Sci., IV, S. 229—296.

J. Faust beschreibt neue Rüsselkäfer aller Länder; Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 284—311.

Stierlin liefert die Beschreibung einiger neuen europäischen Rüsselkäfer; Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 9—20.

F. P. Pascoe bringt Part V seiner Descriptions of some new genera (3) and species (16), of Curculionidae, mostly Asiatic; Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 409—418.

G. Quedenfeldt stellt ein Verzeichniss der in Angola und am Quango-Strom gesammelten Curculioniden und Brenthiden zusammen; Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 271—308, Taf. VI.

Amotus (n. g. Ophryastin. *Mimeti proximum*) *longisternus* S. 244, *gracilior* S. 245 (Los Angeles, Calif.); Casey, a. a. O.

Anosius (n. g. prope *Iphisomum*) *angustulus* (Ovambo); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 199.

Barisoma (n. g. Baridiin.) *carbo* (Hongkong); J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 310.

Echinodes! (n. g. Cossonin., bereits bei Käfern vergeben) *Ravouxi* (Nyon); Jacquet, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXLIV.

Elissa (n. g. Tanymecin.) *laticeps* (El Paso, Texas), *constricta* (Yuma, Arizona) S. 272; die Arten leben unter Wasser; Casey, a. a. O.

Geodercodes (n. g. Otiorrhynchin.) *latipennis* (Monterey Co., Calif.); Casey, a. a. O., S. 266.

Miloderes (n. g. Ophryastin. *Cimbocerae propinquum*) *setosus* (Kern Co., Calif.); Casey, a. a. O., S. 253.

Misynus (n. g. Ithyporin., a *Mecocoryno* et *Ectatorrhino elytris angustis diversum*) *dissimilis* (Niam-niam, Insel an Sumatras Westk.); F. P. Pascoe, Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 414.

Nemopterus (n. g. Eriirrhin.) *picus* (Philippinen); J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 290.

Odontobarus (n. g. Prionomerin.) *hodiernus* (Ceylon); J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 308.

Onychogymnus (n. g. Diabathrar.) *Mechowi* (Angola); G. Quedenfeldt, a. a. O., S. 292, Fig. 9.

Opseoscapha (n. g. Prionomerin.) *alternans* (Malacia); J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 306.

Orophiosis (n. g. Cyphid. Ischnomiae *Faust* affine) *Fausti* (Angola); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 280, Taf. VI, Fig. 3.

Orthoptochus (n. g. Otiorrhynchin. Paraptocho affine) *squamiger* (Calif.); Casey, a. a. O., S. 261.

Panormus (n. g. Otiorrhynchin.?) *setosus* (Monterey Co., Calif.); Casey, a. a. O., S. 270.

Peritelinus (n. g. Otiorrhynchin.) *variegatus* (Lake Tahoe, Calif.); Casey, a. a. O., S. 263.

Peritelodes (n. g. Otiorrhynchin.) *obtectus* (Monterey Co., Calif.); Casey, a. a. O., S. 262.

Pimelata (n. g. Balaninin. Erganiae affine; funicul. antenn. 6-artic.) *maculata* (Indien); F. P. Pascoe, Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 411.

Pseudelissa (n. g. Tanymecin. Elissae affine) *cinerea* (El Paso, Texas); Casey, a. a. O., S. 274.

Pterotomus (n. g. Molytin. prope Plinthum) *Moebiusi* (Angola); G. Quedenfeldt, a. a. O., S. 290, Taf. VI, Fig. 8.

Sapotes (n. g. Ophryastin.) *puncticollis* (El Paso, Texas); Casey a. a. O., S. 241.

Stamoderes (n. g. Brachyderin. Barynoto et Amnesiae affine) *uniformis* (Sonoma Co., Calif.); Casey a. a. O., S. 237.

Stenoptochus (n. g. Otiorrhynchin. inter Paraptochum et Thricolepidem) *inconstans* (Los Angeles, Calif.); Casey a. a. O., S. 260.

Zantes (n. g. Metatygin.? Metatygi affine) *limbatus* (Madagaskar); F. P. Pascoe, Ann. a. Mag. N. H. (6) II, S. 415 mit Holzschn.

Acalles albopictus (Nyons); Jacquet, Bull. Soc. Entom. France 1887, S. CLXXVIII, *Henoni* (Bône); Bedel, ebenda, 1888, S. XXXVI, *horridulus* (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 268.

Alcides carbonarius (Rangun), *obtusus* (Sarawak), *gallarius* (Saylee); F. P. Pascoe, Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 412.

Allodactylus Weisei (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 272

Stierlin gibt eine Übersicht der in Europa und Syrien einheimischen Arten der Gattung *Alophus* mit *A. hebraeus* (Caifa) S. 67, *asturiensis* (A.) S. 68; Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 64—68.

Alophus compressicauda (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 129.

Amalactus carbonarius (Cayenne); J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 295.

Casey stellt a. a. O. S. 247 eine Tabelle der Amnesia-Arten auf, mit *A. granulata* (Humboldt und Siskiyou Cos., Calif.) S. 248, *tesselata*! (San Francisco) S. 249, *sculptilis* (Mendocino Co., Calif.) S. 250.

Amorbaeus? cavicollis (Angola); G. Quedenfeldt, a. a. O., S. 301, Fig. 10.

Nach Buddeberg bohren die Weibchen von *Anthonomus Rubi* Ende Mai die Knospen von *Rosa* (canina, tomentosa) an, legen ein Ei hinein und

beissen die Knospe ab, die zur Erde fallen und vertrocknen. Die Larve nährt sich von den Staubfäden und verpuppt sich in den Knospen; nach etwa 8tägiger Puppenruhe entwickelt sich der Käfer, vom 9. August an. Die spät im Jahr auskriechenden überwintern noch in der Knospe, die anderen verlassen sie bald nach ihrem Auskriechen. Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk., 41, S. 22—25; vgl. Westhoff im 15. Jahresb. Westf. Provinzial-Ver. f. 1886, S. 14 und in Natur und Offenbarung, 83, Heft 1, wo angegeben wird, dass die Larve zur Verpuppung in die Erde geht.

A. *Levrafi* (Mt. Edough, bei Bône); Desbrochers des Loges, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CCV.

Anthonomus *Grouvellei* (Vaugranier, Alpes Marit.); Desbrochers des Loges, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXI, *Krugii* S. 487, *nigrovariegatus*, *annulipes* S. 488 (Puerto-Rico); Fischer, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888.

Aphiocephalus *castanescens* (Madagaskar); Fairmaire, Le Naturaliste, 1888, S. 12 mit Holzschn.

Desbrochers des Loges unterscheidet von Apion Genistae Kby. eine gedrungener Form, die vielleicht blosse Varietät der genannten Art, var. *compactum*, ist; auf Korsika kommt eine kleinere Form, *subparallelus*, vor, sowie eine bisher für vernale gehaltene, sich aber mehr dem rufulum nähernde Art, *distinctirostre*. Die unter dem Namen curtulum von Korsika vertheilten Exemplare sind von dieser aus den Alpen beschriebenen Art verschieden: *corsicum*. Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXCIIL.

Ueber Apion dispar Germ., Hookeri Kby. und Sorbi F. s. Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 172—174; eine Form von A. Sorbi wird als var. *extinctum* bezeichnet, S. 174.

A. *phocopus*! (Nikaria, Sporaden) S. 380, *macrorrhynchum* (ibid.) S. 381; Eppelsheim, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, *irkutense* (Irkutsk) S. 174, *fissile* (Raddefka) S. 175, *dauricum* (Dauria) S. 176; J. Faust, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII.

Aplemonus *Aurivillii* (Damara); J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 296.

Aragnomus *hispidulus* (Los Angeles, Calif.); Casey, a. a. O., S. 266.

Auletes *laticollis* (Süd-Calif.); Casey, a. a. O., S. 233, *Emgei* (Griechenland); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 60.

Bagous *compertus* (Indien) S. 291, *Nymphaeae* Nietner i. l. (Ceylon) S. 292; J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888.

Balaninus *hispanus*; Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 19.

Baridius *melaleucus* (Kipalapala); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1887, S. 321.

Die als Baris nitens F. bekannte Art ist richtiger timida Rossi (Oliv.) zu benennen; das Synonym nitens F. ist sogar mit einem? zu versehen; J. Faust, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 177—180.

Baris *sqamipes* (Alai-Geb.); J. Faust, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 48.

Barypithes *graecus* (Thessalien); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 52.

Blosyrus *caesicollis* (Malange) S. 272, *callosicollis*, *ovatus* S. 273, *signaticollis* S. 274 (Angola); G. Quedenfeldt, a. a. O.

Brachybamus *Pipitzi* (Ri Grande do Sul); J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 294.

Brachycerus Kumbanensis (Luschikeffuss) S. 192, *dorsomaculatus* (Baluba-Land) S. 193, *varipictus* S. 284, Taf. VI Fig. 7, *cincticollis* (Angola), *Schalowi* (Tanganjika) S. 285, *ferrugatus* S. 286, *carbunculus* S. 287 (Angola); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, *maculicollis* (Natal; Delagoa-B.; Damaraal.), *brachyceropsides*! (Natal); L. Péringuey, Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 222, *madecassus* (M.) S. LXXVII, *Lafertei* Chev. i. l. S. LXXVIII; derselbe, Bull. Soc. Ent. Belg. 1888.

Bradybatus Abeillei (Cypern); Desbrochers des Loges, Bull. Soc. Ent. France, 1888, S. CCV.

The food-habits of North American Calandridae; Insect life, I, S. 198 f.

Domaison fand bei den Ausgrabungen eines alten gallo-römischen Kirchhofes bei Reims in einem Glase Reste der *Calandra granaria*, welche das Vorkommen in Gallien dieser aus Asien stammenden Art schon zur Römerzeit beweisen; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CCIV.

Cathormiocerus Korbi (Spanien); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 15.

C. socius and *maritimus*. — An entomological comedy of error. — C. Champion und D. Sharp führen die vielen Irrthümer, die namentlich hinsichtlich des Vaterlandes des *C. socius* verbreitet wurden, an, und melden dann, dass *C. socius* von ihnen sowohl auf der Insel Wight als an den Schneefeldern der Sierra Nevada gefunden und dass *C. maritimus* Rye eine ganz verschiedene Art sei; beide Arten lassen sich leicht an der Fühlerbildung unterscheiden. Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 121—124.

Centrinus Sipolisi (Minas Geraes; Larve in den Blättern der Ananas; zur Verpuppung verfertigt sie ein leicht zusammengedrücktes Cocon aus dichten, feinen Fäden, die durch einen Leim verbunden sind); Fairmaire, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXXX.

Zur Unterscheidung des *Ceutorrhynchus Urticae* und *pallidicornis* siehe Jacquet, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CV.

Ceutorrhynchus Brisouti! (Budapest); Frivaldszky, Termész. Füzet., XI, S. 163, *Brisouti*! (Turkestan) S. 167, *bituberculatus* (ibid.) S. 168, *sartus* (ibid.) S. 169, *inclemens* (Ussuri) S. 170, *Stachydus Baudi* i. l. (Kaukasus; Süditalien) S. 171, *abchasicus* (Arabica-Geb.) S. 173; J. Faust, Hor. Soc. Entom. Ross. XXII.

Chaerodrys Korbi (Amasia); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 55.

Cleonus caucasicus (K.); Reitter, Wien. Entomol. Zeitschr., 1888, S. 270. *Cleonus* (*Coscinoderus*) *lutulentus* (Somáli-Isa); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France 1887, S. 321, Pl. 3, Fig. 7, *oculiventris* S. 292, *ovulum*, S. 294 (Angola); G. Quedenfeldt, a. a. O.

Oviposition of the plum gonger, *Coccotorus scutellaris*; Insect life, I, S. 89, mit Holzschn.

Coeliodes tener (Attika); Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 432.

Coelostethus syriacus (Beirut); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 59.

Conocoetus gracilis (Griechenland) S. 14, *femoratus* (ibid.) S. 56; Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII.

Coissonus strangulatus (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 195.

Curculionites striata (lithogr. Schiefer); Oppenheim, Palaeontogr. 34, S. 241, Taf. XXXI, Fig. 27, *senonicus* (Fischschiefer von Sahil Alma im Libanon); Kolbe, Zeitschr. Deutsch. Geol. Gesellsch., XL, S. 136.

Otenomerus tessellatus (Cap); J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 298.

Cyclomaurus syriacus (Beirut); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 54.

Dactylorrhinus tristis (Spanien); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 16.

Desmidophorus lanosus (Madagaskar), *maculatus* (Batchian) S. 415, *funebis* (Waigiu), *morbosus* (Siam) S. 416; F. P. Pascoe, Ann. a. Mag. N. H. (6), II.

Dichotrachelus pygmaeus (Tirol); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 18.

O. Ritsema Cz. katalogisiert the (7) species of the *Rhynchophorus* genus *Ectatorrhinus Lacord.*; Notes Leyden Museum, X, S. 168.

Emplesis remissa (Westaustralien); J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 294.

Endatus Helferi (Birma; Nepal); J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 292.

Enteles vicinus Dohrn i. l. (Australien); J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 309.

Epicaerus texanus (T.), *sulcatus* (Neu-Mexiko); Casey, a. a. O., S. 233 mit einer Tabelle sämtlicher (Amerikanischer) Arten auf S. 234.

Eupagoderes Dunnianus (El Paso, Texas); Casey, a. a. O., S. 240.

Eupholus cinnamomeus (Neu-Guinea); F. P. Pascoe, Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 410.

Eutinopus pallidosparsus (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 185, *mus* (Tschifu); J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 285.

Exomias pellucidus Boh. auf Staten Isl.; A. C. Weeks, Entomol. Americana, III, S. 188.

Foucartia Schoarzi (Korfu); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 71.

Gasterocercus Richteri (Portorico); Fischer, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 154.

Geoderces puncticollis (Monterey Co., Calif.); Casey a. a. O., S. 262.

Gronops pygmaeus (Beirut); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 60.

Buddeberg beschreibt Eier, Larve und Puppe des *Gymnetron bipustulatum*, der seine Entwicklung in den Kapseln von *Scrophularia nodosa* durchmacht. Von Mitte August an verlassen die Käfer die Kapseln und suchen Winterquartiere; Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk., 41, S. 20—22.

Von G. Verbaschi *Rosenh.* überwintern ebenfalls die Käfer, nicht die Eier; J. Ott, Societ. Entomol., II, S. 180.

Gymnetron tenuirostre (Beirut); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 59, *seriatus* (Vaugneray, Rhone, auf *Plantago carinata*); Jaquet, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XCVII.

Heteromias tibetanus Oberth. i. coll. (Th.); J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 285.

Heteroptochus obesus (Peking); J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 285.

P*

Holcorrhinus metallicus Desbr. = *Omius indutus* Kiesen.; Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 333.

Holonychus viridistinctus (Madagaskar); Fairmaire, Le Naturaliste, 1888, S. 32 mit Holzschn.

Hoplitotrachelus foveiceps (Angola); G. Quedenfeldt, a. a. O., S. 288.

Hylobius Pipitzi (Neu-Caledonien), *distinctus* (Kodikanel Berge, Indien); F. P. Pascoe, Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 410.

Hypera arcuata Desbr. = *gracilentia* Capiom.; Bedel, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XXXVII.

Hypera damascena (D.); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 58, *circassicola* (Fischt; Abago; Atschischcho); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 264.

Ischnomias nobilis Faust abgebildet Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, Taf. VI, Fig. 2.

Ischnotrachelus viridi-pallens S. 276, *elongatus* S. 277 (Angola); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888.

Ithyporus margaritatus (Angola); G. Quedenfeldt, a. a. O., S. 297.

Lepyrus Ganglbaueri (Kaukasus); J. Faust, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 155.

Limnobaris scutellaris (Utsch-Dere) S. 273, *Bedeli* (Lenkoran) S. 274; Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888.

Liosomus Hopffgarteni (Siebenbürgen); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 19.

Lixus perplexus (Krim) S. 157, *Salicorniae* (Rubas, südlich von Derbent) S. 158, *Linnei* (Samara; Sarepta; Turkestan), *amoenus* (Derbent; Kasumkent; Manglis) S. 160; J. Faust, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, *obliquenubilis* S. 295, *crispipes* S. 296 (Angola); G. Quedenfeldt, a. a. O.

Mecistocerus fasciatus (Angola) S. 298, *Hildebrandti*, *albocinctus* (Madagaskar) S. 299 Anm.; G. Quedenfeldt, a. a. O.

Megarrhinus infidus (Birma) S. 299, *brachmanae* (ibid.) S. 300, *bifasciatus* (Indien) S. 301, *cingalensis* (Ceylon) S. 302; J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888.

Meira Sassariensis, *Seidlitsi* (Sardinien); Desbrochers des Loges, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CCVI.

Meleus Elekesi (Remete und Nagy-Enyed in Siebenbürgen); Ormay, Supplem. S. 40, und Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 167, *syriacus* (Beirut); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 58, *alternans* (Fischt); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 265, *Starcki* (Kaukasus) S. 161, *dolosus* (Abas-Tuman) S. 162, *causticus* (Utsara) S. 163; Faust, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII.

M. grusinus Reitt. ist auf ein Exemplar des *caucasicus* Desbr. mit ungezählten Schenkeln aufgestellt; *Schneideri* Reitt. = *difficilis* Faust; Faust, a. a. O., S. 165 und 167.

Minyops planicollis (Griechenland); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 57.

Mylacus Krüperi (Griechenland); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 9.

Nastus Fausti (Fischt) S. 259, *Lederi* (ibid.), *circassicus* (ibid.; Abago) S. 260; Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888.

Nanophyes gallicus (Paris); Bedel, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXX.

Nellocarus Danieli (Pyrenäen) S. 15, *Stussineri* (Thessalien) S. 53; Stierlin, Mitth. Schweiz. Entom. Gesellsch., VIII.

Nocheles vestitus (Washoe Co., Nevada); Casey, a. a. O., S. 251.

Ochryomera fasciata (Indien) S. 303, *heteroclyta* (Schanghai) S. 304; J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888.

Omius circassicus (C., mit Uebersicht der Arten mit der Länge nach gestricheltem Kopf auf S. 263) S. 262, *georgicus* (Kaukasus und Armenien) S. 263, *mingrelicus* (Meckisches Geb.) S. 264; Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888.

Ophryastes Shufeldti (Fort Wingate, Neu Mexiko) S. 238, *sulcipennis* (ibid.) S. 239; Casey, a. a. O.

Orchestes Populi F. ein Weidenschädling; v. Thümen, Oesterr. Forstzeitung, 1887, S. 284.

Orchestes fagi var. *geniculatus* S. 270, var. *sanguinipennis* S. 271 (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888.

Otiorrhynchus sulcatus Verwandlungsgeschichte; Letzner, 65. Jahresbericht Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur S. 340—344.

Schädliches Auftreten des *O. singularis* L. (*picipes* F.) (bei Ibbenbüren auf dem Weinstock); F. Westhoff, Jahresb. zool. Sekt. westf. Provinzial-Ver. 1887—88, S. 18.

O. (Tournieria) laevipennis (Creta) S. 373, *magnicollis* (Sporaden) S. 374, (*Aramnichus*) *scabripes* (Attika; Euböa) S. 375, (*O.*) *Koracensis*, *carcelloides* S. 376 (Korax-Geb.), *pretiosus* (ibid.) S. 377, *flavoguttatus* (ibid.), *crassicornis* (Samos) S. 378, *O. subnudus*, nahe verwandt mit *gemellatus* und von diesem und *bicostatus* in analytischer Tabelle unterschieden S. 80; Stierlin, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1888, *brusinae* (Croatien) S. 9, *Ormayi* (Siebenbürgen) S. 10, *italicus* (J.), *cornutus* (Mittelitalien) S. 11, *longiusculus* (Spanien) S. 49, *rhilensis* (Rhilo Dagh), *punctifrons* (Steiermark) S. 50, *rugoso-granulatus* (Bosnien), *Ganglbaueri* (Rumelien) S. 51, *boenicus* (B.) S. 52; derselbe, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, *montigena* (Görgény, Maros-Comit.); Frivaldszky, Termész. Füzet., XI, S. 161, (*O. confinis* Friv. ist ebenda, S. 162 Anm., nochmals diagnostizirt), *Heinzi* (Nordseite des Fischt) S. 231, (*Tournieria*) *circassicus* S. 233, (*brachialis* var. *dentisibia*), *Schamlyanus* S. 234, *kubonensis*, (*Aramnichus*) *abagoensis* S. 235, *impressiceps* S. 236 (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, *concinus* var. *step-pensis* (Samara; Orenburg) S. 147, *infensus* n. sp. (Krim) S. 149, *Königi* (Utsch-Dere) S. 150, *nefandus* (Krim) S. 151, (*Tournieria*) *Siewersi*! (Manglis) S. 152, (*Aramnichus*) *venalis* (Dauria) S. 153, *Popovi* (Kjachta) S. 154; J. Faust, Hor. Soc. Entom. Ross. XXII.

Pachyonyx mucoreus Chev. var. *maculiventris* (Angola); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 300.

Kraatz' Beiträge zur Kenntniss der Pachyrrhynchus-Arten in der Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 25—32 sind durch Behrens' vorjährige Arbeit (s. dies. Ber. S. 192) veranlasst. Kraatz zeigt, wie die Gruppierung der Arten in solche mit gefleckten und gestreiften Flügeldecken leicht zu Missverständnissen führen könnte, da thatsächlich die Längsbinden auf den Flügeldecken durch Zusammenfliessen von Flecken entstanden sind. Einzelne Formen sind neu benannt: *P. immarginatus* S. 28, *coeruleans* S. 29, *flavopunctatus* (Mindanao) S. 30, *purpureus* (Luzon) S. 31, und die von Behrens und Kraatz be-

schriebenen Arten (der gemmatus-Gruppe) nach der Zeichnung des Thorax in eine Übersicht gebracht.

Peritaxia perforata (Texas); Casey, a. a. O., S. 246.

Peritelus Juniperi (Sardinien) S. CCV, *grandis* (Sizilien) S. CCVI; Desbrochers des Loges, Bull. Soc. Entom. France, 1888.

Phloeophagus spadix Herbst in Amerika (Rockaway Beach); W. Jülich, Entomol. Americana, IV, S. 35.

Pholicodes maculosus (Smyrna); Desbrochers des Loges, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CCV.

Phyllobius saltuarius (Amasia); v. Heyden, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 46, *Krüperi* (Griechenland), *ophthalmicus* (Croatien) S. 12, *Apfelbecki* (Tatra), *fallax* (Griechenland) S. 13; Stierlin, Mitth. Schweiz. entomol. Gesellsch., VIII, *circassicus*, S. 237, *mediatus* Desbr. i. l., *oblongus* var. *biformis*, S. 238 (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, *hungaricus* (Ungarn, Bosnien); G. Stierlin, Societ. Entom., III, S. 97.

Zur näheren Kenntniss des *Ph. croaticus* s. Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 42.

Phytonomus carinicolis (Siebenbürgen); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 17.

Piazomias parumstriatus, *breviusculus* (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 182.

Die Merkmale des Männchens von *Pissodes affinis* sind: Die hinteren Schienen in der Endhälfte gekrümmt, ihre innere Ecke flach, glatt und glänzend, in dem letzten Drittel mit einer Bürste langer, schwarzer Haare; E. A. Schwarz, Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 176.

Platyomicus laesipes? S. 189, *cavicollis*, S. 190 (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin, Entom. Zeitschr. 1888, Taf. VI, Fig. 6, *tuberosus* (Angola); derselbe, ebenda, S. 283.

Polydrosus (Eustolus) *virginalis* (Alai-Geb.) S. 43, *ponticus* (Amasia) S. 46; Faust, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, *villosus* (Spanien); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 14, (Eustolus) *Starchi* (Novorossisk); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 261.

Poropterus afflictus (Saylee), *basiliacus* (Kairo) S. 417, *irritus* (Ceram) S. 418; F. P. Pascoe, Ann. a. Mag. N. H. (6) II.

Rhigopsis scutellata (Los Angeles, Calif.); Casey, a. a. O., S. 242.

Rhinoncus albicinctus am Jakobsdorfer See bei Liegnitz gefunden; 65. Jahresb. Schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur, S. 344.

Buddeberg beschreibt Ei, Larve und Puppe von *Rh. castor*, dessen Larve an und in den Wurzeln von *Rumex acetosella* lebt; Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk., 41, S. 28 f.

Nach Buddeberg's Beobachtungen bohrt *Rhynchites aequatus* die jungen Früchte von Pflaumen, Schlehen und *Crataegus* an, legt ein Ei hinein und beisst den Fruchtsiel durch, so dass die unreife Frucht zur Erde fällt. Die Larven nähren sich von dem Fruchtinhalt, sind erst gegen Mitte September erwachsen und begeben sich dann in die Erde, wo sie sich erst gegen Ende Juli, manche noch später, verpuppen. Die Puppenruhe dauert etwa 8 Tage, aber die Käfer bleiben meist noch den Rest des Jahres in der Erde. Jahrb. d. Nass. Ver. f. Naturk., 41, S. 26—28.

Rh. foveipennis (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 136, *longiceps* (Schweden); C. G. Thomson, Opusc. entom., XII.

Rhynchophorus quadrangulus (Angola); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 302.

Rhytidosomus filirostris (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 271 mit Uebersicht der bekannten Arten.

Rhytirrhinus Krüperi (Griechenland); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 17.

Sciaphilus pallide-squamosus (Beirut); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 55.

Casey stellt a. a. O. S. 254 eine Tabelle der Sciopithes-Arten auf mit *Sc. significans* (Mendocino u. Humboldt Cos., Calif.) S. 255, *brumalis* (Marin Co., Cal.) S. 256, *arcuatus* (Mendocino Co.), *angustulus* (Napa Co.) Calif.) S. 257, *setosus* (Napa u. Marin Cos.) S. 258.

Scythropus lateralis (Lake Co., Calif.) S. 275, *ferrugineus* (Marin Co., Calif.) S. 276, *cinereus* (Lake Tahoe, Col.), *crassicornis* (Fort Wingate, Neu-Mexiko) S. 277; Casey, a. a. O.

Desbrochers des Loges erkennt die von Marseul angegebene Synonymie, *Sibynes velutifer Desbr.* = *phaleratus*, für richtig an, indem sein vermeintlicher *phaleratus* eine neue Art, *subtriangulifer*, ist; dagegen ist der von Marseul ebenfalls mit *phaleratus* vereinigte *algericus Desbr.* eigene Art; auch die Vereinigung von *subellipticus* und *fugax* ist nicht gerechtfertigt; der *fugax Germ.* ist vielleicht eine etwas länglichere Form von *viscaria*; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXCV.

Sipalus chinensis (Tchekiang); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 130.

Sitona cylindricollis var. *molitor* (Alai-Geb.); Faust, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 44, *extrusus* (St. Julian, Calif.) S. 282, *variatus* (Calif.) S. 283, *margaritosus* (Sa. Cruz u. Monterey Cos., Cal.), *procerus* (Napa Co., Cal.) S. 284, *occidentalis* (Sonoma Co., Calif.) S. 285, *eximius* (Washoe Co., Nevada) S. 286, *montanus* (Placer Co., Cal.) S. 287, *nebulosus* (San Diego, Cal.), *alternans* (Calif.) S. 288, (*sordidus* Lec. S. 289), *osculans* (Hoopa Valley, Calif.) S. 290, *prominens* (San Diego) S. 291, *hispidiceps* (Arizona), *angustulus* (Monterey Co., Cal.), *explicitus* (San Diego) S. 293, *apacheanus* (Arizona; Südkalif.) S. 294, *sparsus* Hoopa Valley S. 295; Casey, a. a. O.

Sitophilus impressicollis, reticulatus (Angola); G. Quedenfeldt, a. a. O., S. 307.

Smicronyx kubanicus (Novorossisk); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 267.

Sphenophorus vitticollis (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 194.

A Sandwich Island sugar-cane borer ist *Sph. obscurus* Boisd.; Riley, Insect life, I, S. 185–189 mit mehreren Holzschn.

Sphenophorus (Calyptrix) *procerus* S. 303, *politus* S. 304, *nigroplagiatus* S. 305, *cruciatus* (vielleicht Hanetii var.) S. 306 (Angola); G. Quedenfeldt, a. a. O.

Strophosomus denticollis (Angola); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 275, Taf. VI, Fig. 1.

Styphlus Krüperi (Smyrna; Balkan); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 18.

Systates luminifer (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Ent. Zeitschr., 1888, S. 191, *quadrispinosus* S. 281, Taf. VI, Fig. 4, *angulipennis* S. 282, Fig. 5 (Angola); derselbe ebenda.

Tetragonothorax Badeni (Madagaskar); J. Faust, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 288.

Chr. Aurivillius behandelt die Brachyceriden-Gattung *Theates Fahr.* und ihre (4) Arten, Entom. Tidskr., 1888, S. 149—154, Taf. 2, mit *Th. Magnus* (= *Brachyc. spectrum Chev.* i. coll.) (Kapstadt) S. 153, Fig. 1—3.

Thinoxenus Nevadensis (Washoe Co, N.); Casey, a. a. O., S. 267.

Thylacites alaiensis (Alai-Geb.); Faust; Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 42.

Trachodes oblongus (Fischt), *elongatus* (Talyach; Lenkoran); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 266 mit Uebersicht der (4) kaukas. Arten, S. 267.

A. Fauvel gibt eine révision du genre *Tropiphorus* mit *Tr. obesus* (= *micans Stierl.* nec *Boh.*; Kärnthen; Steiermark; Siebenbürgen; Krim) S. 164; Revue d'entomol., 1888, S. 161—168.

Marseul hat mit Unrecht in seinem Katalog *Tychius confusus Desbr.* mit *Morawiczi* vereinigt; der *T. carinicornis Tourn.* ist dagegen eine einfache Abänderung von *Morawiczi*; die Vereinigung von *3-virgatus* und *Astragali* ist richtig; *T. Raffrayi Tourn.* = *longitubus Desbr.*; Desbrochers des Loges, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXCV. †

Oedemeridae. *Ithaca* (n. g. *Nacerdi* et *Anancae* affine, sed articulis 5—7 antennarum extus valde dilatatis) *anthina* (Longford, Tasmania, auf Blüten von *Leptospermum*); A. S. Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 153 bis 155.

Ananca lateralis (Mossman River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 325.

Oedemera analis (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 131.

Sparedrus Davidis (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 131.

Meloidae. *Horia cephalogona* (Kongo); L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X, S. 269.

Lytta Thibetana (Atentse); E. Olivier, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LVI, (*Cantharis metasternalis* (Humpata) S. 269, *laminicornis* (ibid.) S. 270; L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X.

J. Nusbaum macht eine vorläufige Mittheilung über die Entwicklung der Keimblätter bei *Meloë proscarabaeus*; Biolog. Centralbl., VIII, S. 449—452.

Meloë subcordicollis, modesta (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 129, *Conradti* (Alai-Geb.); v. Heyden, Deutsch. Ent. Zeitschr. 1888, S. 42.

Ueber einige (10) europäische *Meloë*-Arten s. C. Escherich, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 241f.

Mylabris haemacta (Namaqua); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 198.

Palaestrada concolor S. 323, *flabellicornis* (Russell River), *nigripennis* (Mossman R.) S. 324; Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II.

Zonitis pallida (Barron River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 325, *geniculata* (Kongo); L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X. S. 271.

Mordellidae. *Mordella pulverulenta* (Mossman River), *notabilis* (Barron R.) S. 317, *ovalisticta*, *undosa*, *hamatilis* S. 318, *nigrans*!, *obscuripennis*, *flavicans* S. 319, *elongatula* (Mossman River), *subvittata* (Russell River) S. 320; Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II.

Rhipidophoridae. *Emenadia cucullata* (Mossman River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 321.

Pelecotomoides marmoratus, S. 321, *aureotincta*, S. 321, *serraticornis*, S. 322 (Mossman River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II.

Anthicidae. *Notoxus serridens* (Casablanca, Marocco), *semipunctatus* (Süd-Turkestan); Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 431

Pedilidae. *Egestria hirtipennis* (Russell river) S. 322, *rubicunda* (Cairns) S. 323; Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II.

Lagriadae. *Lagria ruficeps* (Russell River), *alborillosa* (Mossman R.) S. 316, *purpuripennis* (Mulgrave R.) S. 317; Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, *foveicollis* (Onanda); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 187.

Porrolagria ferruginea (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 188.

G. H. Horn unterscheidet in analytischer Tabelle die (6) nordamerikanischen *Statira*-Arten und beschreibt *St. pluripunctata* (Arizona) S. 29, *opacicollis* (ibid.) S. 30, *basalis* (Georgia; Florida; Louisiana) S. 31; Trans. Americ. Entom. Soc., XV, S. 29—32. Ausser dieser Gattung ist in Nordamerika noch *Arthromacra* mit *A. (Lagria) aenea* Say vertreten.

Melandryadae. G. H. Horn gibt eine neue Uebersicht der Unterabtheilungen dieser Familie; Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 43 f.

Holostrophus (n. g., von *Eustrophus* verschieden durch das hinter die Hüften verlängerte und dieselben trennende Prosternum; Flgld. fein, zusammenfliessend punktiert; für (*Eustr.*) *impressicollis* Lec., *bifasciatus* Say und) *discolor* (Virginia); G. H. Horn, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 37.

Mallodrya (n. g.) *subaenea* (Ohio); G. H. Horn, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 42. Die Gattung bildet die Tribus der *Mallodryini*, in die Horn auch die früher zu den *Pythiden* gerechnete *Sphalma quadricollis* einschliessen möchte.

Conopalpus testaceus Oliv. in Belgien (Tervueren); Remy, Bull. Soc. Ent. Belg., 1888, S. O.

G. H. Horn gibt eine Uebersicht und Beschreibung der (5) nordamerikanischen *Eustrophus*-Arten mit *E. repandus* (verbreitet) S. 33, *arizonensis* (A.; N. Mexiko) S. 34; Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 32—35.

Hypulus bicinctus (Sylvania, Kalif.); G. H. Horn, Trans. Amer. Entom. Soc., XV, S. 40.

Orchesia Kamberskyi und var. *fusco-fasciata* (Cirkassien); E. Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 213, *ornata* (Washingt. terr.; Oregon); G. H. Horn, Trans. Americ. Entom. Soc., XV, S. 38, mit Beschreibung der beiden übrigen Arten.

Pythidae. *Trimitomerus* (n. g.) *Riversii* (Arizona); G. H. Horn, Trans. Americ. Entom. Soc., XV, S. 45.

Die Gattung *Chanopterus Bohem.* gehört nicht zu den Helopini, sondern zu den Pythiden, in die Nachbarschaft von *Salpingus*; G. H. Horn, Entomol. Americana, IV, S. 48.

Salpingus Lederi (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 212.

Tenebrionidae. *Afrinus* (n. g. *Derosphaerio Westw.* affine) *striolifrons* (Namaqua), *grandicornis* (Kaffarien), *furcillabris* (Kap); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 190.

Callimaria (n. g. *Pseudocamarariae* affine) *impressipennis* (Madagaskar); Fairmaire, Le Naturaliste, 1888, S. 12 mit Holzschn.

Nemanes (n. g. prope *Caedium?*) *expansicollis* (Damara); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 195.

Nicandra (n. g. prope *Horatomam*) *costulipennis* (Namaqua); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 191.

Paraphanes (n. g. *Cyphalein.*) *nitidus* (Mossman River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2. S.) II, S. 309.

Rozonia (n. g. prope *Rhytinotam*, oculis convexis, prominentibus diversum) *strigicollis* (Ovambo); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 184.

Tynthlobia (n. g. *Trachynoto* affine) *quadricostata* (Benguela, Afrika); L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X, S. 261.

Urielina n. g. für (*Podhomala*) *nitida Baudi*; Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 331; vgl. unten bei *Pimelia*.

Adesmia tenuigranata (Ovambo), *lobicollis* (Namaqua); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. de France, 1888, S. 188.

G. H. Horn beschreibt die Mundtheile von *Aegialites*; Trans. Americ. Entomol. Soc., XV, S. 27, Pl. III, Fig. 23.

Anatolica externocostata (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 125.

Anomalipus signaticollis (Humpata, Afrika); L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X, S. 264.

Asphaltesthes impressipennis (Ovambo); Fairmaire; Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 184.

Aspidosternum violaceum (Congo); L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X, S. 266.

Atractus flavipes (Russell River), *vittipennis* (ibid.); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 313.

Ueber die Stinkdrüsen der Gattung *Blaps* s. oben S. 199.

E. Ballion setzt seine kurze Notizen über einige russische *Blaps*-Arten fort; Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1888, S. 269—276, 694—704. — *Bl. lusitanica*, *gigas*, *producta*. — *Bl. miliaria Fisch.* ist wohl nicht von Motschoulsky und Allard richtig erkannt worden. — *Bl. damascena Fisch.* = *fatidica*, wie schon Kraatz ausgesprochen hatte. — *Bl. Clotzeri Fisch.* ist vom Autor falsch beschrieben worden, und *Bl. Clotzeri Allard's* ist die Fischer'sche Art (vgl. den vor. Ber. S. 201); de Haani *Baudi* ist mit ihr synonym. — *Bl. rectangularis Sol.* ist nicht synonym mit *Bl. gibba Cast.*, wie Cat. Gemm. Har. angibt. — *Bl. orientalis Sol.*, *spathulata Sol.*, *punctato-striata Sol.* — *Bl. cribrata Sol.* und *angulata*

Reiche sind wahrscheinlich nicht identisch, wie Gemm. Har. und Allard angeben. — *Bl. graeca* Sol., *Ledereri* Fairm. — *Bl. proxima* Sol. — *Bl. Emondi* Sol., nicht Edmondi, wie Gemm. Har. schreiben. — Unter *Bl. sulcata* (F.) mit ihren Synonymen des Gemm. Har. Catalogs stecken wahrscheinlich 4 Arten, deren Synonymie nach Ballion folgende ist: 1. *Bl. polychresta* Forst., *All.* = *Bl. lineata* Sol.; 2. *Bl. lineata* Küst. = *Kusteri* Ball. S. 276; 3. *Bl. sulcata* Küst. = *sarda* Ball. S. 276; 4. *Bl. sulcata* F. = *sulcata* Sol., *All.* — *Bl. (Rhizoblaps) superstitionosa* *All.* ist nicht die Erichson-Küster'sche Art, sondern eine neue, *Bl. algerica*, S. 694f.; *Bl. verrucosa* Adams ist kein Blaps, sondern vielleicht ein *Trigonoscelis*; — *Bl. taeniolata* Ménétr.; — *Bl. producta* Brullé, gages L.; — *Bl. indagator* *Reiche*, abbreviata Ménétr.; *Bl. muricata* Fisch. und *deplanata* Ménétr. sind verschiedene Arten; vgl. den vor. Ber. S. 201; — *Bl. vicina* Mannh.-Ménétr.; *Bl. tenuicollis* *All.* ist nicht die Solier'sche Art, sondern neu und einstweilen *suspecta* benannt, S. 704; eine aus dem Kaukasus stammende, von Allard ebenfalls für *tenuicollis* erklärte Art, ist ebenfalls eine andere Art, *Bl. pudica*, S. 704.

Bl. armeniaca Fald. = *ominosa* ♀ Ménétr.; *plana* Sol. ist wie *armeniaca* von Allard vollständig verkannt worden; Kraatz, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 66f.

Bl. cychroides, *gentilis* S. 127, *dorsogranata* S. 128 (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg, XXXI, (Rhizoblaps) *eusoma* (Alai) S. 195, (*Bl. i. sp.*) *carbonaria* (ibid.) S. 197; Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888.

Über die Gattung *Chanopterus* Bohem. s. oben bei den Pythidae.

Chartopteryx glaber (Mossman River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2. S.) II, S. 810.

Cholipus atroviridis (Mossman River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2. S.) II, S. 811.

Clitobius immarginatus (N'Gami); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 195.

Coelocnemodes inermis (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 127.

Cyptus minor (Congo); L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X, S. 264.

Decialma striatopunctata (Russell River) S. 810, *viridipennis* (Mossman River) S. 811; Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II.

Fairmaire hält es für angezeigt, den Namen *Derosphaerius Westw.* als zu ähnlich dem *Derosphaerus Thoms.*, in *Derostrongylus* zu ändern; die Gattung ist in die Nachbarschaft von *Himatismus* zu stellen. Neue Arten sind *D. castaneorufus* (Damara, Ovambo), *xanthopus* (Kaffrarien) S. 187, *rugifrons*, *stricticollis* S. 188, *seriepunctatus* S. 189 (alle aus Kaffr.); Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Dichillus sanguinipes (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 126.

Dichtha acutecostata (Benguella und Humpata, Afrik.); L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X, S. 260.

Distretus seminitidus (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 184.

Ueber die Unterschiede der Gattungen *Dordanea* Reitt. und *Microdera* Eschsch. s. Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 294.

Dysgena subscabrosa (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 188.

Endostomus parallelogrammus (Humpata, Afrika); L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X, S. 265.

Eurychora rotundipennis (Ovambo); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 191.

Geophanus plicicollis (Ovambo); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 192.

Gonopus amplipennis (Humpata); L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X, S. 268.

Helops pekinensis (P.); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 130.

Himatismus lineatopunctatus, *sphenarioides* (Namaqua); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 185.

Hybrenia subvittata (Cairns), *laticollis* (Mossman River) S. 314, *angustata*, *sublaevis* (Cairns) S. 315; Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II.

Lyprops Yunnanus (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 128.

Metriopus perforatus (Benguella, Afrika); L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X, S. 257.

Microdera Fasioti (Kaukasus); Kraatz, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1888, S. 294.

Mycetochares quadrimaculata var. *Schwarzii* (Korfu); Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 431.

Oncotus planiusculus (Namaqua); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 194.

Opatroides (Penthicus) *cribellatus* (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entom., 1888, S. 127.

[H] *Opatrum strangulatum* S. 128, *hadroide*! S. 129 (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888.

Opatrum Grenieri Perr. = *melitense* Küst. = *sabulosum* L. var. *distinctum* Villa; v. Heyden, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 216.

Reitter nimmt für (*Pimelia*) *gigantea* und *Kessleri* (statt *Pisterotarsa Motsch.*) *Sympiezocnemis Solsk.* an, lässt seine Gattung *Uriela* fallen, gründet dagegen auf (*Podhomala*) *nitida Baud.* die n. g. *Urielina* und stellt eine Tabelle der Gattungen *Pimelia*, *Sympiezocnemis*, *Podhomala* und *Urielina* auf; Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 329—331.

Sénac lässt Zweifel durchblicken, ob Reitter die richtige *Podh. nitida Baud.* vor sich gehabt habe, hält aber *Urielina* unter keinen Umständen, selbst als Untergattung, für gerechtfertigt, und will *Sympiezocnemis* nur als Untergattung gelten lassen; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXCVIII f.

Platynotus pekinensis (P.); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 127.

Platyphanes elongatulus (Mossman River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 308.

Platyscelis Provostii (Peking); Fairmaire, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CCI.

Psammodes asperulipennis (Namaqua), L. Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 193, *pedator* (Humpata) S. 257, *misolampoides* (ibid.) S. 258, *cardiopterus* (ibid.) S. 259; derselbe, Notes Leyden Museum, X.

Pseudolyprops Belonii (Indien); Fairmaire, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXXXII.

Pterohelaeus pusillus (Barron River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 307.

Sepidium transversum (Humpata, Afrika); L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X, S. 262.

Stenocara compacta (Humpata, W. Afrika); L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X, S. 256.

Stenomax aeneipennis (Cirkassien); Reitter, Wien Entom. Zeitzg. 1888, S. 212.

Stenosis Fausti (Taschkent); Reitter, Deutsch. Ent. Zeitschr. 1888, S. 430.

Strongylium sulcipectus (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 185.

Tagonoides ampliatus (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 126.

Tentyria fossulata (Philippeville, Alger); Brisout, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CXCI.

Trachynotus rufosonatus (Namaqua); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 194.

Sénac findet die Gattung *Uriela* Reitt. nicht begründet, da die Tarsen bei *U. Fausti* nicht schlanker sind als bei *Podhomala bicarinata*; vgl. den vor. Ber. S. 200; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LV.

Cistelidae. *Mycetocharoides Baumeisteri* (Baltischer Bernstein); L. W. Schaufuss, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 269.

Synatractus (n. g. Cistelin.) *variabilis* (Mossman River; Russell R.; Cairns) Macleay, Proc. Linn. Soc. N.-S.-Wales (2. S.) II, S. 812.

Allecula flavicornis (Mossman River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 815, (*Dietopsis*) *longipennis* (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 188, *cruralis* (Humpata); L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X, S. 267.

Cteniopius gracillimus (Congo); L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X, S. 268.

Cylindrothorus (= *Othelecta Pascoe*) *Bohemanni* (N'Gami); L. Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 196, *rufulus* (Benguella, Afrik.); derselbe, Notes Leyden Museum, X, S. 267.

Bostrychidae. Ch. O. Waterhouse macht some observations on the Coleopterous family Bostrychidae; Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 348 bis 350. — In Apate sind die Geschlechter stets verwechselt worden; die stärker behaarten sind die Weibchen. — *Xylopertha Guér.* ist auf die Arten *truncata*, *sinuata* etc. zu beschränken. — Da *substriatus Steph.* (nec Payk.) Type der Gattung *Dinoderus Steph.* ist, so wird für (Apate) *substriata Payk.* der Name *Stephanopachus* vorgeschlagen, S. 349. — *Bostr. mutilatus Walk.* ist eine *Xylopertha*; ebenso sind *Sinoxylon fumatum*, *nitidipenne* und *pubescens Murray* *Xyloperthen*. Neu ist *Caenophrada* (n. g. Bostrycho affine) *anobioides* (N.-Indien) S. 350.

Breeding habits of *Amphicerus bicaudatus* (Larve in unterirdischen Stammtheilen einer *Smilax*); H. G. Hubbard, Entomol. Americana, IV, S. 95f.

H. S. Gorham erkennt die von L. Fairmaire (s. den vor. Ber. S. 204) behauptete Identität von *Apoleon Gorh.* = *Dysides Party* nicht als richtig an, und ebenso wenig die Zugehörigkeit beider Gattungen zu den Ptiniden (Anobiiden); die Fühler von *Apoleon* stimmen weit mehr mit denen von *Polycaon*

und Psoa, als von irgend einem Anobiaden überein; Notes Leyden Museum X, S. 158.

Sinoxylon rufobasale (Namaqua); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. de France, 1888, S. 179.

Unter zahlreichen normalen Exemplaren von *S. basillare* fand E. A. Schwarz ein abnormes mit nur 9 Fühlergliedern; Proc. Entom. Soc. Washing., I, S. 177.

Ptinidae. *Bruchus Oertzeni* (Doris, Griechenland), *leucaspis* (Griechenland) S. 428, (*Heteroptinus*) *calcarifer* (Morea) S. 429, (*Gynopteris*) *subroseus* (Kumani, Morea) S. 430; Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888.

Reitter bleibt dabei, dass die Angabe Kolbe's von der weiten (kosmopolitischen) Verbreitung des *Gibbium scotias* auf einer theilweisen Verwechselung dieser Art mit *G. aequinotiale* beruhe; Entom. Nachr., 1888, S. 59—61; vgl. dazu Kolbe, ebenda, S. 180—184; Reitter S. 252—254.

Niptus (*Niptodes*) *lusitanus* (Portugal); Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888 S. 427.

A new Herbarium-pest in San Francisco ist *Sphaericus gibboides* Boield.; E. A. Schwarz, Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 175.

Cleridae. *Clerus communimacula* (Peking); L. Fairmaire, Revue d'ent., 1888, S. 124.

Eurymanthus pustulosus (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 182.

L. Fairmaire erkennt in seinem zu den Cleriden gestellten *Mutilloides albidofasciatus* den Chrysomeliden *Poecilomorpha mutillaria* Clark; Notes Leyden Museum, X, S. 271; vgl. den vor. Ber., S. 204.

Opilus vagedorsatus (Ovambo); Fairmaire, Ann. Soc. Entomol. France, 1888, S. 182

Stigmatium Delatouchii (Fokien); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 126.

Trichodes-ähnliche Larve in den Eierhäufchen von *Stauronotus maroccanus*, s. ob. S. 91 f.

Malacodermata. *Aethra limbipennis*, *Latreillei*, S. 38, *festiva*, *jucunda*, S. 39, *decorata*, S. 40, *delegantula*, S. 41 (Brasilien); Olivier, Ann. Soc. Entom., France, 1888.

Amydetes lucioloides (Rio Grande, Bras.) S. 60, *flavicollis* (Banda oriental, Uruguay) S. 62; Olivier, Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Apodistrus lobicollis (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888.

Aspidosoma (*maculatum* De Geer, S. 49, Fig. 5), *roseiventer* (Faro, Amazon.) S. 50, *perplexum* (Faro) S. 51, *pallens* (Paraguay) S. 52, *Buyssoni* (Argentin.) S. 53, Fig. 6; Olivier, Ann. Soc. Entom. France, 1888, Pl. 1.

Cerallus Pekinensis (P.); Fairmaire, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CCL

Chauiognathus disparipennis Bourg. (s. Ber. 1887, S. 205) = *xanthomelas* Pertz; Bourgeois, Bull. Soc. Ent. France, 1887, S. CXCIIL

Ch. domitus (Quito); derselbe, ebenda, 1888, S. CCL

Oladophorus posticalis (Cairns; Barron River), *testaceicollis* (Cairns) S. 234, *miniatus* (Barron River) S. 235; Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2 S.) II.

Dasytes puncticollis (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 211.

Diaphanes notaticollis (Gabon); Olivier, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 57, Pl. 1, Fig. 7.

Ditoneces Fabrei (Ramnad); Bourgeois, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XXV.

Hapalochrus flavosellatus (Tchekiang); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 125.

Haplocnemus xanthopus Kew. = *rufomarginatus* Perr. = *marginatus* Rottbg. = *Koziorowiczi* Desbr. = *limbipennis* Kew.; v. Heyden, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 215.

Hedybius coronatus (Damara); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 181.

J. Bourgeois stellt eine Synopsis du genre *Henicopus* Steph. zusammen, die 29 Arten enthält, darunter *H. Baudii* (Südspanien) S. 28, Fig. 2; Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 5–34, Pl. 2.

Lamprocera thoracica (Rio-Janeiro); Olivier, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 47.

E. Olivier schreibt weitere Études sur les Lampyrides; Ann. Soc. Ent. France, 1888, S. 35–62, Pl. 1.

Lampyrus (?) *platyptera* (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 123.

Luciola stigmaticollis (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 123, *gigas* (Kalkutta; Silhet) S. 58, Fig. 8, *coarcticollis* (Viktoria, Austral.) Fig. 9, *septemmaculata* (Senegal) S. 59, *hypocrita* (Fidschi-I.) S. 60; Olivier, Ann. Soc. Entom. France, 1888, Pl. 1, *tetrasticta* (Ovambo); Fairmaire, ebenda S. 180.

Malachius Dama (Küleik; Smyrna); Abeille, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 70.

Malchinus Bourgeosi (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 210.

Malthodes castanicollis S. 208, *sulphuribasis* S. 209 (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888.

Megalophthalmus confusus (Faro, Amazon.); Olivier, Ann. Soc. Entom. 1888, S. 48.

Melyris testaceipes (Ovambo); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 182.

Metriorrhynchus elongatus (Barron River) S. 229, *centralis* (Cairns), *serraticornis*, *foliatus* S. 230, *hirtipes* S. 231 (Mossman River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, *miniatipennis* (Ramnad); Bourgeois, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XXV.

E. Haase's Beiträge zur Kenntniss von Phengodes, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 145–167, Taf. I, II, beschäftigen sich zumeist mit dem bereits 1886 (s. dies. Ber. S. 284) von Haase bekannt gemachten larvenähnlichen Weibchen (von Ph. Hieronymi Haase), das eben wegen seiner Larvenähnlichkeit (Fühler viergliederig, Punktaugen, fünfgliederige Beine mit einfacher Endklaue) bisher für eine Larve gehalten worden ist. Höchst wahrscheinlich sind die von Azara Reinhardt, Murray (Astraptor!), Weljenbergh, Ihering beschriebenen leuchtenden Käferlarven Weibchen von Arten der Gattung Phengodes, bzw. einer dieser verwandten Gattung gewesen. Dass diese Larvenähnlichen Formen wirklich ausgebildete Weibchen sind, wurde durch die Beobachtung der Copula mit nach-

heriger Eiablage von *Ph. Hieronymi*, sowie auch durch den anatomischen Befund erwiesen, der ein rec. seminis an der Scheide aufdeckte. Die Gattung *Phengodes* ist, soweit unsere jetzigen Kenntnisse reichen, diejenige Molacodermen- und überhaupt Käfergattung, die am meisten an ursprüngliche Entwicklungsverhältnisse erinnert. — Von *Ph. Hieronymi* werden Ei und die (dem Weibchen ähnliche) junge Larve beschrieben und abgebildet. Ausserdem ist die Larve von *Pyrophorus* abgebildet, für welche man die leuchtenden *Phengodes*-Weibchen vielfach gehalten hat.

Bourgeois macht einige Bemerkungen über das Weibchen von *Phosphaenus hemipterus*; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. LXV.

E. A. Schwarz beschreibt das Weibchen von *Photinus collustrans*; Proc. Entom. Soc. Washington, I, S. 176.

Photinus frigidus (Cap Breton) S. 54, *Bergi* (Uruguay) S. 55, *atomarius* (?), *melanodactylus* (Jamaika) S. 56; Olivier, Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Photuris aurea (Sa. Rita, Bras.); E. Oberthür, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CCVII.

Podabrus exophthalmus (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 122.

Psilocladus grandis (Minas-Geraez) S. 45, *marginellus* (Petropolis), *capillatus* (Santa Rita) S. 46; Olivier, Ann. Soc. Entom. France, 1888.

Pyrocoelia Foochowensis Gorh. = (*Lampyris*) *analis* F.; Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 121.

Rhagonycha bothridera (Fokien); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 125, *circassicola* (Fischt); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 207.

Selenurus apicalis (Mossman River) S. 237, *annulatus* (Mulgrave River), *viridipennis* (Russell River) S. 238; Macleay; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II.

Telephorus Mossmani, S. 235, *rubriceps*, *rufocentris*, S. 236, *Froggatti*, S. 237. (Mossman River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, *nigroverticilis*, S. 123, *metallicipennis* (Yunnan), *gibbicollis* (Fokien) S. 124, *pluricostatus* (ibid.) S. 125; Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, *stigmaticus* (Peking); derselbe, Revue d'entomol., 1888, S. 123.

Trichalus angustulus (Barron River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 235.

Xylobanus fumosus (Cairns) S. 231, *longicornis* (Russell River), *miniaticollis* S. 232, *amphiatius*, *ater* (Barron River), (*Bulenides*?) *Froggatti* (Cairns) S. 233, *atripennis* (Barron River) S. 234; Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II.

Cebriionidae. Die verschiedene Erscheinungszeit der *Cebrio*-Arten (Juni—September) ist durch Feuchtigkeitsverhältnisse bedingt, indem die Käfer erst nach einem ergiebigen Regen der Erde entsteigen. Die Weibchen werden weit seltener gefunden als die Männchen; A. Erdmann, Societ. Entomol., II, S. 180f.

Elateridae. H. du Buysson macht Bemerkungen zu einigen Arten: *Athous austriacus Desbr.* (= *circumscriptus Cand.* var.), *Olbiensis Muls. & Guilb.* var., *haemorrhoidalis* F. var. *faeculentus*, *semirufus* und *aeneithorax Desbr.* = *alpinus Redt.* var.; *strictus Reiche* = *Grandini Desbr.* = *subtruncatus Muls. & Guilb.*; Bull. Soc. Ent. France, 1888, S. L, LVII.

Derselbe gibt eine Note sur les larves d'Élatérides; Revue d'entom., 1888, S. 14—17.

C. Dury zählt Eucneminae aus der Umgegend von Cincinnati, Ohio, auf; Entomol. Americana, IV, S. 163f.

Pittonotus Kiew. ined. (subg. n. von *Corymbites*, für *Theseus Germ.*); Seidlitz, Fauna.

Athous transsylvanicus (Siebenbürgen); Frivaldszky, Termész. Füzet XI, S. 160, *circassicus* (C.); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 180.

Camposternus Davidis (Fokien); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 120.

Ein neuer Schädling an Kartoffeln und Tabakpflanzen ist die Larve des *Corymbites aeneus*; Mitth. Mährisch-Schles. Ges. f. Ackerbau etc., 1888, S. 119.

Dicronychus lamellicornis (Congo); L. Fairmaire, Notes Leyden Museum, X, S. 255.

Elatér Lederi (Lirik im Talyschgeb.); Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 426.

Elatér priscus Fig. 5, *robustus* Fig. 22 (lithogr. Schiefer); Oppenheim, Palaeontogr. 34, S. 241, Taf. XXXI.

Logesius (*Idolus*) *picipennis* Bach var. *adrastoides* (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitschr., 1888, S. 180.

Ludius Montandoni (Bukarest); du Buysson, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CCII.

Tetralobus cribricollis (Äquator. Ostafrika); Ch. O. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 86.

Buprestidae. Ch. Kerremans unterzog die Buprestiden des Museums von Kalkutta einer Durchsicht und zählt dieselben auf; Bull. Soc. Entom. Belgique, séance du 23 Septbr. 1888.

Acmaeodera picturella (Uruguay); Kerremans, Bull. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. VI, *varicolor* Chevrol. i. l. (Karachi); derselbe a. a. O., *Königi* S. 193, *caspica* S. 195, *Ballionis* S. 196 (Turkmenien); L. Ganglbauer, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII.

Ein Lindenverwüster ist *Agrilus auricollis* Ksw., dessen Larven unter der Rinde von Lindenästen leben; Ei, Larve, Puppe, Imago und Frassgänge sind beschrieben und abgebildet von F. A. Wachtl, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 293—297, Taf. III.

Agrilus coriaceus (Uruguay) S. VI, *foveicollis* (Banda oriental) S. VII; Kerremans, Bull. Soc. Entom. Belg., XXXI, *ampliocollis* (Johore), *plicaticollis* (Ahsonn); derselbe a. a. O., *obscuripennis*, *ventricosus* S. 120, *planipennis* S. 121 (alle von Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888.

Anthaxia canaliculata (Buenos Aires), *maculicollis* (Uruguay); Kerremans, Bull. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. VI.

Brachys Tucumana (Tucuman); Kerremans, Bull. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. VII.

Buprestis Nikolskii (Aral-See); A. Semenow, Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, 1888, No. 4, S. 682—685.

Buprestites suprajurensis (lithogr. Schiefer); Oppenheim, Palaeontographica 34, S. 240, Taf. XXXI, Fig. 21.

Caeculus fulvovittis Reitt. = *turcomanicus* Kraatz; Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 41.

Chrysobothris Sinensis (Kiangsi), *Delavayi* (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 119.

Chrysochroa alternans (Loo Choo); Chal. Waterhouse, Ann. a. Mag. N. H. (6) I, S. 264.

Coraebus Sidae (Himalaya), *circularis* (Khasia H.); Kerremans, a. a. O., *aequalipennis* (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 121.

Cryptodactylus gracilis (Hiogo); H. v. Schönfeldt, Entom. Nachr., 1888, S. 209.

Dierca Plasoni (Südarmenien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 70.

Endelus Weyersi (Padang, Sumatra); C. Ritsema Cz., Notes Leyden Museum, X, S. 175.

Julodis rufolimbata (Damara); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 180.

Melibaenus murinus (Andaman-I.); Kerremans, a. a. O.

Melobasis circumflexa (Johore); Kerremans, a. a. O.

Melyboeus carinatus (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Ent. Zeitschr., 1888, S. 181.

Philanthaxia andamana (And.-I.); Kerremans, a. a. O.

Poecilnota Davidis (Fokien); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 120, *diceroides* (Wladiwostok); Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 426.

Sphenoptera foveipennis (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 180.

Ueber die (Farben-) Varietäten der *Sternocera* Boucardi s. Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 416, Taf. V, Fig. 19—23.

Kerremans gibt einen Essai monographique du genre *Sternocera* Eschsch. mit dichotomischer Tabelle, Synonymie, Diagnosen und Beschreibung der (28) Arten, deren 9 in kolorierten Abbildungen dargestellt sind. St. Fischeri Gerst. ist wegen der gleichnamigen Quedenfeldtschen Art Gerstäckeri neu benannt, S. 78; St. orissa Bug. var. elliptica Kerr. ist in Fig. 8, die neue St. tricolor vom Tanganjika, S. 90, in Fig. 9 abgebildet. Ann. Soc. Entom. Belg., 1888 (XXXI), S. 49—100. Pl. I.

Trixagidae. A. Fauvel zitiert eine Bemerkung von Fauconnet, welche Fauvel's Angabe, dass die Exemplare von *Throscus dermestoides* mit ungefranzten Flügeldecken die Männchen sind, bestätigt; Revue d'entomolog., 1888, S. 69.

Scarabaeadae. A. Preudhomme de Borre stellt zusammen eine liste des cent et cinq espèces de Coléoptères Lamellicornes actuellement authentiquement capturées en Belgique avec un tableau synoptique de leur distribution géographique dans le pays; Ann. Soc. Entom. Belg., 1888, S. 1—5. (4 Lucanid., 101 Scarab.)

Achranoxia n. g. für (Polyphylla) Königi Brenske (s. unten); Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 208.

Atopocerus nov. nom. für *Westwoodia Laporte* (praeocc.); Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 86.

Cryptotrogus (n. g. Melolonthin. prope Cyphonotum) Weisei (Asiat. Russland); Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 206.

Goniorrhina (n. g. Pachypodin.) *flaviceps* (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Ent. Zeitschr., 1888, S. 172.

Metabolus (n. g. Lasiopsidi et Monotropo simile) *tumidifrons* (Tchekiang); Fairmaire, Annal. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 107.

Ochranoxia n. g. für (Anoxia) *semiflava* Kraatz; Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 208.

Oxychirus (n. g. Melolonth., Clavipalpin.?) *semisericeus* (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 175.

Parammoecius (subg. n. von Aphodius, für gibbus Germ.); Seidlitz, Fauna.

Pilinopyga n. g. Porphyronotae Burm. affine, für (Diplognatha) *ornatipennis* Hope; Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 415, Taf. V, Fig. 7.

Polyblastus (n. g. Trichiin., Platygeniae, Myodermae et Stringophoro affine) *assarius* (Liberia); O. E. Janson, Notes Leyden Museum, X, S. 115.

Porphyrobapta (n. g. Ceton. Porphyronotae Burm. et Apocnosi Thoms. affine) *tigrina* (Benne); Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 411, Taf. V, Fig. 6.

Sophrops (n. g. Rhizotrogo affine) *parviceps* (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 106.

Taphrocephala (n. g. Pachypodin.) *polita* (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 174.

Allorrhina insignis (Chiriqui); O. E. Janson, Notes Leyden Museum, X, S. 119.

Amphimallus tekensis Kraatz i. l. (Turkmenien); E. Brenske, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 355.

Anachalcus aurescens (Usambara) S. 202, *magnus* (Lujenda-Fl.) S. 203; Bates, Entom. Monthl. Mag., XXIV.

Ancylonycha (Holotrichia) *amphipennis* (Tchekiang); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 109, *carmelita* (Baluba-Land) G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 170.

Anomalites fugitivus, aus dem tertiären Stüsswasserquarz von Nogent le rotou und selbst ganz silifiziert; Fritsch, Sitzgeber. kgl. böhm. Gesellsch. d. Wissensch., 1884, S. 168. und M. Boule, Le Naturaliste, 1888, S. 103 mit Abbild; vgl. dies. Bericht üb. 1885, S. 296.

Anomala cruralis S. 110, *costulata*, *opalina* S. 111, *bioculata*, *rufosomula* S. 112 (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, *russaticeps* (Ovambo); derselbe, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 179, (*Paraspilota*) *impicta* (Genhan, Korea); H. W. Bates, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 374.

Ellis kommt nach einer eingehenden Vergleichung der Britischen Exemplare des angeblichen *Aphodius melanostictus* Schup. mit kontinentalen Exemplaren und mit Mulsant's Beschreibung der Varietäten des *A. inquinatus* zu dem Schluss, dass die englischen *A. melanostictus* nur eine Farbenvarietät des sehr veränderlichen *A. inquinatus* sind; Proc. Entom. Soc. London, 1888, S. XV—XVIII.

Über die Unterschiede des *Aphodius punctato-sulcatus* Sturm, prodromus *Brahm*, (*pubescens* Sturm, *tabidus* Er. und *consputus* Creutz.) s. nach brieflicher Mittheilung v. Harold's Freundhomme de Borre, Mem. Soc. R. des Sci. Liège, (2. S.) XV, S. 31—34 mit 4 Holzsehn.

Q*

Schilsky's 4. Beitrag zur Kenntniss der deutschen Käferfauna behandelt und benennt die deutschen Aphodius-Varietäten; Deutsch. Ent. Zeitschr., 1888, S. 305—321.

A. (*Acrossus*) *impressiusculus* (Peking); Fairmaire, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CCI, (*Nialus*) *Bilimeckii* (Schweiz; Abbruzzen) S. 149, *Schlumbergeri* (Pyrenäen) S. 150; Seidlitz, Fauna.

O. E. Janson beschreibt das bisher unbekannte ♂ von *Argyripa subfasciata* Rits.; dasselbe stammte von Chiriqui; Notes Leyden Museum, X, S. 118 mit 2 Holzschn.

Ateuchus sulcipennis (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 161, *canaliculatus* (Namaqua); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 177, *platyolus* (Nguru) S. 201, *porosus* (Mpwapwa) S. 202; Bates, Entom. Monthl. Mag., XXIV.

Callinomes opacus (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 118.

Callistethus compressidens (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 112.

Camenta brevicollis (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 169.

Cephalodesmus cornutus (Mossman River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 220.

Ueber die Variabilität von *Ceratorrhina Harrisii* Westw. s. C. A. Dohrn, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 363 f.

Ueber *Cetonia Seulensis* Kolbe, und ihr Verhältniss zu *brevitarsis* Lewis, nigrocyanea und var. cyaniventris Kraatz, ferner *viridiopaca* Motsch. und *cupreola* Kraatz s. Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 199—201.

Cetonia atomaria (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 116, (*Potosia*) *sternohirta* (Frankreich); Seidlitz, Fauna, S. 165, (ist nach Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888 S. 364, *floricola* ab.), *Lewisii* S. 194, *Pryeri*, S. 195 (Loo Choo Isl.); O. E. Janson, Ann. a. Mag. N. H. (6), I.

Charadronota quadrilunulata (Aschanti); Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 413 f mit Bemerkungen über die bekannten Arten, *curvata* (Niger-Distrikt); O. E. Janson, Notes Leyden Museum, X, S. 110.

Chiroplatys inconspicuus (Cairns); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 229.

Clinteria Davidis (Fokien); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 116.

Coryphocera versicolor (Jolo Isl.); O. E. Janson, Notes Leyden Museum, X, S. 207.

Ueber die Gattung *Cyphonotus* Fisch. s. Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 205.

Diastellopalpus acuminicollis (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 162, *quinquedens* (Mamboia) S. 239, *Thomsoni* (Kilimanjaro), *eberinus* (Kamerun; Alt-Kalabar) S. 240, *monapoides* (Mamboia) S. 241; Bates, Entom. Monthl. Mag., XXIV.

Dicranorrhina (*Daedycorrhina*) *macularia* (Mamboia); Bates, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 242.

Discopeltis Wissmanni (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 179.

Doryscelis Humbloti (Comoren); als neue Art angedeutet von R. Oberthür, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CCII.

Epilissus globulus (Cairns); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 222.

Fornasinius vittatus (Süd-Masailand); Bates, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 241.

Genyodonta Jacksoni (Massai, S.-O.-Afrika); Ch. O. Waterhouse, Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 261.

Tableau synoptique des espèces Belges du genre *Geotrupes* L.; F. Meunier, Il Naturalista Siciliano, VII, S. 298 f.

Kraatz tritt nochmals für die Identität des *Geotrupes foveatus Marsh.*, Har. mit kleinen ♂ von *G. stercorarius* ein; Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 333.

Geotrupes (*Ceratophyus*) *sulcicornis* (Sikkim); Fairmaire, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CXCII, (*Odontotrypes*) *impressiusculus* S. 101, *semirugosus*, *cribripennis* S. 102 (Yunnan), *biconiferus* (Moupin), *scutellatus*, *temuestriatus* (Yunnan) S. 103; derselbe, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI.

Glycyphana lateriguttata (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 117, *Louisae* (ibid.); derselbe, Bull. Soc. Ent. France, 1888, S. XXXV.

Gnorimus flavitarsis (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 118.

Gn. variabilis var. *Heydeni* (Rheydt; Flügeldecken mit einer durch das Zusammenfließen der Flecken entstandenen Querbinde); Beckers, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 24.

Über *Goliathus Atlas Nickeri* und die Varietäten des *G. cacicus* Voss s. Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 269–272, Taf. VI.

G. Atlas ist wahrscheinlich eine Varietät von *G. cacicus*; von letzterem unterscheidet Kraatz noch die Varr. *maculatissimus*, *conjunctus* im männlichen, *humeralis*, *triangulum*, *maculatissimus* und *litturatus* im weiblichen Geschlecht.

Über die südamerikanische *Gymnetis pantherina Burm.* und die mit ihr verwechselten und verwandten Arten s. Kraatz, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1888, S. 295–300, Taf. V, Fig. 12–18.

Heteronychus curtulus (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 115, *brevis* (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berl. Entom. Zeitschr., 1888, S. 177.

Heterophana fuscocostata (Madagaskar); Fairmaire, Le Naturaliste, 1888, S. 11 mit Holzschn.

Hoplia Gabriellina, *Harpagon* S. 104, *citrinella*, *campestris* S. 105 (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, *elongata* (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 165.

Incala Stampflii (Junk river, Liberia); O. E. Janson, Notes Leyden Museum, X, S. 113.

Isodon glabricollis (Mulgrave River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 228.

In seinen Notes on *Lachnosterna fusca auct.* unterscheidet J. B. Smith unter diesem Namen nach der Penisbildung 4 Arten: *L. fusca emend.*, *grandis* S. 181, *dubia*, *arcuata* S. 183; Insect life, I, S. 180–185 mit Holzschn.

L. diomphalia (Fusan, Korea); H. W. Bates, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 273.

G. H. Horn gab in Trans. Amer. Entom. Soc., XIV, S. 209—296, eine Revision of the species of *Lachnosterna* of America north of Mexico, die in Entomol. Americana, IV, S. 52—56, im Auszuge mitgetheilt ist.

Lepidiota Froggatti (Barron River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (2. S.), II, S. 227.

Ueber *Lethrus cephalotes* s. Nature, 38, S. 134, 172.

Leucocelis Franki (Ovampo, S. W. Afrika); O. E. Janson, Notes Leyden Museum, X, S. 109.

The sugar-cane beetle injuring corn (*Ligyrus rugiceps* Lec.); L. O. Howard, Insect life, I, S. 11—13. — Der Käfer zerstört die jungen Samenpflänzchen.

Macroma ochreipennis (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 117, *Oberthüri* (Yerkalo, Thibet); O. E. Janson, Notes Leyden Museum, X, S. 112.

Macronota ochraceipes (Koimbatour), *flavosparsa* (ibid. und in 4 Varietäten ebenda und French Rocks); Ch. O. Waterhouse, Ann. a. Mag. N. H. (6), I, S. 262.

Nach Kraatz schliessen sich *Melolontha Hippocastani* und *vulgaris* in ihren Larvenformen gegenseitig aus, indem die erstere Sandboden bevorzugt und von den Wurzeln der Kiefer lebt, letztere Sandboden meidet; Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 363. (Hierzu sei bemerkt, dass die Larve von *Mel. Hipp.* sich jedenfalls nicht ausschliesslich von den Wurzeln der Kiefer nährt, da ich den Käfer in seiner Puppenwiege im Winter am Fusse von Pappeln fand, wo auf stundenweite Entfernung keine Kiefer war. Refer.).

Mel. Hippocastani var. *Schwarzi*; derselbe, ebenda, S. 362.

Om... *M. Hippocastani* som skadeinsekt; W. M. Schöyen, Entom. Tidsskrift, 1888, S. 15 f.

Mendidius rufescens (Astrachan; = *Cnemargus rufescens* Motsch. i. l.); Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 425.

Merodontus squalidus (Cairns); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, (2. S.), II, S. 221.

Preudhomme de Borre bestätigt die Vermuthung Kraatz', dass *Micro-poeila Breweri* Janson das Weibchen von *M. cincta* Gor. Perch. sei, als richtig; Bull. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. X.

Mimela fusana (Fusan, Korea); H. W. Bates, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 375.

Oniticellus incurvicornis S. 100, *denticornis* S. 101 (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, *semimetallicus* (Madagaskar); derselbe Le Naturaliste, 1888, S. 11 mit Holzschn.

Onthophagus Froggatti S. 222, *Walteri*, *parallelicornis* S. 223, *lobicollis*, *emarginatus* S. 224 (Cairns); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, *sycophanta* (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 100, *Katualensis* (Luschika-Flus); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr. 1888, S. 163, *Lujendae* (Lujenda Fl.), *Plato* (Damaraland) S. 203, *panoplus* (Mamboia) S. 237, *chrysopes* (Nguru), *cometes* (Gabun), *dicella* (Mamboia), *croesusulus* (Natal) S. 238, *epilampus* (Kamerun) S. 239; Bates, Entom. Monthl. Mag., XXIV.

Orphnus oryctoides (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entomol. Zeitschr. 1888, S. 164.

Oryctites fossilis (lithogr. Schiefer); Oppenheim, Palaeontogr. 84, S. 238, Taf. XXXI, Fig. 2.

Nach R. Oberthür ist *Enoplotarsus costatus* Luc., Tropinota Fatima Coq. und *Oxythyrea niveopicta* Fairm. = *deserticola* Luc.; Bull. Soc. Entom. France 1887, S. CCIf.; *O. pantherina* Gor. = *Amina* Coq.; derselbe ebenda S. CCII.

Pachysoma Schinsii (Namaqua); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 178.

Phalops euphynes (Damara-Land); Bates, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 241.

Phyllopertha cribricollis S. 105, *humeralis*, *suturata* S. 106 (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI.

Reitter gibt eine Uebersicht der Arten von *Phyllopertha* aus Europa, den angrenzenden Ländern, Sibirien mit Central-Asien, mit *Ph. Lederi* (Turkmenien) S. 293, *caucasica* (Aralysch), *puncticollis* (Nord-China) S. 294; Entom. Nachr., 1888, S. 289—294.

Phyllotocus vittatus (Mossman River, Cairns); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 225.

Platydesmus sulcipennis, *flavipennis* (Cairns); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 226.

J. B. Smith übersetzt Gerstäcker's Aufsatz über die systematische Stellung der Gattung *Pleocoma* Lec.; Entomol. Americana, III, S. 202—211; vgl. dies. Ber. für 1888, S. 243.

G. H. Horn schliesst sich in seinen Ansichten über die systematische Stellung dieser Gattung *Leconte* an, da sie nach ihm eine *Laparosticta* ist; sie gehört demnach als selbständige Gruppe in die Nachbarschaft der *Geotrupini*; eine tabellarische Uebersicht der Arten weist folgende neue aus Kalifornien auf: *Pl. Rickseckeri*, *conjungens*, *Ulkei*; ebenda, S. 233—235; und ausführlicher in den Trans. Americ. Entom. Soc. XV, S. 1—18, Pl. I, II mit einem Holzschnitt des Hinterleibes, der die *laparosticta* Natur des Insekts verdeutlicht.

Pogonotarsus flavovirgulatus (Madagaskar); Fairmaire, Le Naturaliste, 1888, S. 32 mit Holzschn.

G. H. Horn beschreibt und bildet ab die Larve von *Polyphylla decemlineata* Say; Trans. Amer. Entomol. Soc., XV, S. 21 f., Pl. III, Fig. 8—16.

Polyphylla Koenigi (Turkmenien); E. Brenske, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, S. 353 (wird von Kraatz, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1888, S. 208, zum Typus der neuen Gattung *Achranoxia* gemacht; vgl. oben), *Mongola* (China, Grenze der Mongolei) S. XVI, *Chinensis* (Peking), *Davidis* (China) XVII; L. Fairmaire, Bull. Soc. Entom. Belg., 1888.

Popilia flavomaculata (Barron River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 227, *cinnabarina*, *metallicollis* (Yunnan) S. 113, *pustulata* (Tschekiang), *phylloperthoides* S. 114, *sexguttata* S. 115 (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, *crenatipennis* S. 176, *violaceipennis* S. 177 (Baluba-Land); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, *difficilis* (Peking); Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 119, *atrocoerulea* (Fusan und Gensan, Korea); H. W. Bates, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 376.

Proagosternus Reichei Thoms. ist eine Lepidiota und identisch mit *L. unicolor* van Lansb., wie schon van Lansberge vermuthet hatte; de Borre, Bull. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. XI.

Progeotrupes jurassicus (Lithogr. Schiefer); Oppenheim, Palaeontographica 34, S. 239, Taf. XXXI, Fig. 17.

*Pseudotrochalis Böhm*i (Tanganjika See) S. 194, *sex-lineatus* (Malange) S. 195; G. Quedenfeldt, Entom. Nachr., 1888.

Rhizotrogus glabricollis (Tekke-Turkmenien), *Brenskei* (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 68, *turcomanus* (T.) S. 356, *Ballioni* (Turkestan) S. 357, *vulpinus* Gyllh. var. *persicus* (Taschkent; Turkestan) S. 359; E. Brenske, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII, mit analytischer Tabelle der „bestäubten“ Arten auf S. 351 f.

Schizonycha tenebrosa, *mucorea* (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI, S. 108.

Serica clypeata, *subtruncata* (Yunnan) S. 109, *lignicolor* (Tschekiang) S. 110; Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, *Muelleri* (Baluba-Land) S. 165, *disparicornis* (ibid.) S. 166; G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, *piceorufa*, *verticalis* (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 118.

Smaragdesthes Guerini (Senegal); O. E. Janson, Notes Leyden Museum, X, S. 107.

Stalagmosoma baliola (Abyssin.); O. E. Janson, Notes Leyden Museum, X, S. 108.

Temnoplectron politulum (Cairns); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 221.

Trochalis corpulentus (Bangalla-Gebiet) S. 167, *camaruensis*! (Kuango) S. 168; G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888.

Lucanidae. *Dorcus tenuicostatus* (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 116.

Hexarthrus Davisoni (Koimbatour); Ch. O. Waterhouse, Ann. a. Mag. N. H. (6) I, S. 260.

P. de Borre stellt eine Liste des Passalides rec ... Brésil zusammen; Bull. Soc. Ent. Belg., 1888, S. XLIf.

Parnidae. *Elmormorphus* (n. g. Elmithi simile, Parno affine) *brevicornis* (Kobé); D. Sharp, Ann. a. Mag. N. H. (6) II, S. 243.

Leptelmis (n. g. Stenelmithi affine) *gracilis* (Tokio); D. Sharp, Ann. a. Mag. N. H. (6) II, S. 244.

Helichus sinensis (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 115.

Parnus bicolor, *sulcipennis* (Sardinien); Costa, a. a. O., I No. 2, S. 86, *hirsutus* (Livland); Seidlitz, Fauna, S. 133.

Stenelmis foveicollis (Hiogo); H. v. Schönfeldt, Entom. Nachr., 1888, S. 198.

Georyssidae. *Georyssus canalifer* (Sapporo); D. Sharp, Ann. a. Mag. N. H., (6), II, S. 245.

Byrrhidae. *Cytilus avunculus* (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 98.

Dermestidae. Karl M. Heller beschreibt die postembryonalen Entwicklungsstände des *Dermestes peruvianus* Cast., der mit einer Sen-

dung Vogelbälge in Braunschweig eingeschleppt wurde und sich fortpflanzte. Er hatte im Jahr 2 Generationen; die Larve häutete sich sechs Mal; die Puppenruhe dauerte etwas über einen Monat (bei der im Sommer erscheinenden Generation); Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, 1888, S. 157—160.

Ueber die Frage, ob *D. vorax* Art oder Rasse von *lardarius* sei s. Reitter, Entom. Nachr., 1888, S. 57—59.

D. bicolor als Feind der jungen Haustauben; F. C. Noll, Zool. Garten, 1888, S. 307—309.

Mycoetophagidae. *Atritonus irregularis* (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 174.

Lathridiadae. *Dasycerus Grouvellei* (Mariposa, Kalif.); M. J. Belon, Bull. Soc. Ent. Belg., 1888, S. LCVIII, mit analytischer Tabelle sämtlicher 6 Arten.

Holoparamesus atomus (Sizilien, Casteldaccia); Ragusa, Il Natural. Siciliano, VIII, S. 87.

Cryptophagidae. E. Reitter behandelt in dem XVI. Heft seiner Bestimmungen-Tabellen, S. 11—56, diese Familie, mit der die Telmatophiliden vereinigt werden. Die Abtheilung der Paramecosomini ist eingezogen, da es sich herausgestellt hat, dass das dafür angegebene Merkmal, die in beiden Geschlechtern fünfgliederigen Füße, nicht einmal generischen Werth hat; die Gattung *Micrambe* Thoms. ist mit *Cryptophagus* zu vereinigen. Die Familie wird jetzt zunächst in die 4 Abtheilungen der Diphyllina (Seitenrand des Halsschildes mit erhabener Längslinie), Telmatophilina (Fühler unter dem Seitenrand der Stirn eingefügt; das 3. (oft auch 2. Fussglied gelappt), Cryptophagina (Fussglieder alle einfach, schlank), Atomariina (Fühler frei auf der Stirn, vor den Augen, eingefügt) eingetheilt.

Eurhanius (n. g. Diphyllin.) *humeralis* (Japan); E. Reitter, a. a. O., S. 13.

Mnionomidius n. g. Cryptophagin., für (Cryptoph.) *serricollis* Reitt.; E. Reitter, a. a. O., S. 35.

Pteryngium n. g. Cryptophagin., für (Cryptoph.) *crenulatus* Erichs. = *crenatum* Gyll.; E. Reitter, a. a. O., S. 34.

Atomaria singularis (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 172, (Agathengis) *punctipennis* (Baikal; Ussuri; Jenisseisk), *punctithorax* (Dalmatien) S. 37, *nigroscutellata* (Chabarofka) S. 38, *cribrella* (Balkan; Kaukasus), *Edithae* (Chabarofka) S. 39, *gracilicornis* (Kaukasus; Ostsibirien), *bescidica* (Beskiden; Böhmerwald), *peltatula* (Chabarofka) S. 40, *talyschensis* (Lenkoran) S. 41, (*Atomaria*) *atripennis* (Syrien) S. 42, *convexiuscula* (Wladiwostok, Chabarofka), *xeniella* (Chabarofka) S. 44, *lateralis* (Wladiwostok) S. 45, *subapicalis* (Chabarofka) S. 46, (*marginicollis* = *ruficollis*, *rubricollis* Woll. praecoc.) S. 47, *cretica* (Kreta) S. 48, *Graeseri* (Wladiwostok) S. 49, *basicornis* (Kaukasus) S. 51, *cephennoides* (ibid.) S. 54; derselbe, Bestimmungs-Tabellen.

Cryptophagus Jakowlewi (Irkutsk) S. 424, *posticus* (Banat) S. 425; Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, *corpulentus* S. 170, *circassicus* S. 171 (Cirkassien); derselbe, Wien. Entom. Zeitg., 1888, (*Mnionomus*) *seriatus* (?) S. 20, (*Cryptophagus*) *Erichsoni* (Lenkoran), *nigritulus* (Spanien; Lenkoran) S. 22, *dilatipennis* (Kaukasus), *subvittatus* (Sarepta) S. 29; derselbe, Bestimmungs-Tabellen.

Spaniophaeus caucasicus (Helenendorf unter Steinen bei Ameisen); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 105.

Sternodea Grilati (Edough, Algier); E. Reitter, a. a. O., S. 54, *Miki* (Cirkassien); derselbe, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 173.

Cucujidae. *Cucujus opacus* (Yezo); G. Lewis, Entom. Monthl. Mag., XXV, S. 84 mit Bemerkungen über die anderen japanischen Arten.

Hectarthrum modestum Fairm. = *lineicolle* Reitt.; Grouvelle, Ann. Soc. Entom. France 1887, S. CLXXIX.

H. Harmandi (Kambodja); Grouvelle, a. a. O.

Sylvanus frumentarius mit Sämereien aus Palermo nach Schlesien gekommen; Letzner, 65. Jahresh. Schles. Ges. f. vaterl. Cultur S. 344.

Silvanus Surinamensis in Mehl- und anderen Nahrungsvorräthen bei Münster und Ibbenbüren; Jahresh. zool. Sektion westf. Prov.-Ver. 1887—88, S. 43.

Rhysodidae. G. Lewis macht Bemerkungen über die japanischen Arten dieser Familie; Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 76—85, mit einem Verzeichniss sämtlicher Arten (41). Aus Japan sind nur 6 Arten bekannt. *Stemmoderus Spin.*, *Ips* (*Rhysodes*) *monilis* Oliv. und *Rhysodina* sind aus dieser Familie auszuschliessen. Die Männchen sind seltener als die Weibchen; von den 87 in Japan gefundenen Exemplaren sind 23, von 30 in Ceylon gefundenen 11 Männchen.

Derselbe desgl. on the mouth-organs of two species of *Rhysodidae* (*Rh. niponensis* und *Clinidium veneficum*; s. unten); ebenda S. 483f. mit 8 Holzschnittfiguren. — Matthews, der die Präparation der Mundtheile gemacht hatte, sagt darüber bei *Clinid.*: „Die Oberlippe ist sehr klein; der Clypeus und das Kinn gross; die Kiefertaster sehr lang; Unterlippe, Unterkiefer und Zunge ausserordentlich schwach und zerbrechlich. Die Unterlippe scheint, gleich der von *Stenus*, vorstreckbar zu sein. Die Mandibeln sind in einer an der Innenseite geöffneten hornigen Umhüllung eingeschlossen.“ — Ausser den Mundtheilen ist auch das Hinterleibsende von *Clinid.* in beiden Geschlechtern abgebildet.

Epiglymmius (n. g., für *sulcatus* F. und) *comes* (Nikko; Sapporo); G. Lewis, a. a. O., S. 79.

Clinidium veneficum (Higo); G. Lewis, a. a. O., S. 83.

Rhysodes crassiusculus (Nikko; Hakone; Sapporo) S. 80, *sulcicollis* (Oyayama), *rostratus* S. 81, *niponensis* (Hakone; Higo), *Lederi*, (Kaukasus) S. 82; G. Lewis, a. a. O.

Colydiadae. *Cerylon grandicolle* (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 176.

Trogositidae. *Gymnochila angulicollis* Thoms. = *sparsuta* Thoms; *G. squamosa* Gray = *laticollis* Boh. ♂ = *adpersa* Boh. ♀ = *varia* F.; diese letztere Art bewohnt ganz Afrika von Guinea und Abessinien an südlich bis zum Cap; Lèveillé, Bull. Soc. Ent. France, 1888, S. CXCIII.

Nemosoma fasciatum Reitt. ist kein Trogositide, sondern ein Heteromere in in der Nachbarschaft von *Hypophloeus*; Lèveillé, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CCVII.

C. Rey beschreibt die Larve von *Ostoma Yvani* Allib., die nebst Imagines in Soja hispida aus Saïgun nach Frankreich gekommen war; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. XXXVIII f.

Lèveillé gibt folgende Synonymie an: *Phanodesta cordaticollis* Reitt. = *picea* Germain = (*Toxicum*) *cribraria* Blanch.; *Ph. costipennis* Reitt. = *variegata* Germ.; Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CCVII.

Nitidulidae. Synonymisches über europäische Nitiduliden in Wien. Entom. Zeitg. 1888, S. 255—258. — Reitter spricht von Seidlitz in dessen 2. Aufl. der Fauna baltica abweichende Ansichten aus.

Pocadius ferrugineus F. var. *adustus* (Kaukasus); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 175.

Rhizophagus bipustulatus (in feuchten Kellern) in Weinkorken; de Borre, Bull. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. XXVII f.

Die Frage: Ist *Rhiz. parallelocolis* wirklich ein Leichenfreund? verneint Kraatz und ebenso v. Heyden; die bei Leichen gefundenen *Rhizophagus* haben sich vielmehr wahrscheinlicher aus Eiern entwickelt, die an Sargbohlen abgelegt waren; was wir sonst von ihrer Lebensweise wissen, spricht dafür, dass dieser Käfer unter Rinde lebt; Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 191 f.; vgl. den vor. Ber., S. 3.

Phalacridae. Die Europäischen Arten dieser schwierigen Familie finden in K. Flach einen sorgfältigen Bearbeiter in dem XVII. Heft der Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren; Verh. naturf. Vereins in Brünn, XXVII. Bd. (1888) S. 1—28 (Sonderabdr.) mit 1 Taf. In der Einleitung sind die Unterschiede von den nahe verwandten Nitiduliden und von den Erytyliden, welche letztere ebenfalls gewisse Analogieen bieten, hervorgehoben; ferner sind die Skulpturverhältnisse auf ein allgemeingültiges Schema zurückgeführt. Die beigefügte Tafel enthält die sauber ausgeführten Zeichnungen theils des ganzen Körpers, wenn auch meist nur den Umriss, theils der für die Gattungs- und Artunterscheidung wichtigen Brustplatten mit den Hüften, Beine, Mundtheile und Fühler. Die neuen Arten sind nicht nur durch die Tabellen, sondern auch durch ausführliche Diagnosen und Beschreibungen charakterisiert. (Ich werde dieses Werk zitieren: K. Flach, a. a. O., I.)

Derselbe veröffentlicht kurze Diagnosen (14) neuer Phalacriden-Arten in Societ. Entomol., III, S. 187; (K. Flach, a. a. O., II.)

Olibrus metallescens (Sibirien) S. 18, *Koltzii* (Kaukasus), *Baudneri* Tourn. i. l. (Südeuropa) S. 19, *Reitteri* (Kroatien), *fallax*? (Oesterreich), *Demaisoni*, Fig. 6 (Südspanien; Algier) S. 20, *Baudii* (Sizilien), *Heydeni* (Südrussland) *Seidlitzii* (ibid.) S. 21, *Gerhardti* (Schlesien), *Stierlini* Fig. 8 (Südeuropa) S. 22, *Dohrni* (Turkestan), *coccinella* (Oesterreich; Südfrankreich; Krim; Balkan; Spanien) S. 23; K. Flach, a. a. O., I und II, S. 187.

Phalacrus hybridus (Siebenbürgen), *incommodus* (Krim); K. Flach, a. a. O., I, S. 18 und II, S. 187, *frater* (Araxesthal); derselbe, a. a. O., I, S. 27.

Stilbus Reitteri (Syrien), *polygramma* (ibid.) Fig. 9; K. Flach, a. a. O., I, S. 24, und II, S. 187.

Tolyphus Simonii (Syrien); K. Flach, a. a. O., I, S. 17, Fig. 1, u. II, S. 187.

Histeridae. G. Lewis handelt on new species of Formicarius Histeridae, and notes on others (Arten von Hetaerius, Sternocoelis, Satrapes); Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 144—155.

Hetaerius Bonnairei (Bona) S. 236, *politus* (ibid.) S. 237, *fuscus* (Andalusien) S. 238; J. Schmidt, Entom. Nachr. 1888.

Hister Königi (Sophsisk, Amur); J. Schmidt, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 189.

Nach J. Schmidt hat Marseul unter *H. Leselenci Mars.* 2 Arten kon-

fundirt: Die Exemplare von Humpata sind *H. Mechowi Schmidt*, die von Liberia *H. tropicalis Mars.*, mit welcher letzteren Art der *H. Mechowi* die meiste Verwandtschaft besitzt; Notes Leyden Museum, X, S. 122.

Nach J. Schmidt ist *Hololepta parvifossa Mars.* eine Varietät des Männchens mit schwach entwickeltem Geschlechtscharakter von *H. sternincisa Mars.*; Notes Leyden Museum, X, S. 121 f.

Macrosternus Alluaudi, (?) *assinus* (Assinie); Marsoul, Bull. Soc. Entom France, 1888, S. IX.

Saprinus aspernatus Mars. (?), zuerst aus Daurien beschrieben, im Norden Frankreichs (Dunkerque) gefunden; Leprieur, Bull. Soc. Ent. France, 1888, S. CXXIV; CXXXI.

S. atrocyaneus (Turkmenien); J. Schmidt, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 190.

Satrapes Reitteri (Talytschgeb.); G. Lewis, a. a. O., S. 153.

Sternocoelis cancer (Algier) S. 147, *Walkeri* (ibid.) S. 149, *fulvus* (ibid.), *extructisternum* (ibid.) S. 150, *mauritanicus* (Marocco), *pectoralis* (Tlemcen) S. 152; G. Lewis, a. a. O.

Trichopterygidae. *Ptilium Sahlbergi* (Finnland), *Hopffgarteni* (Kroatien) S. 101, *Lederi* (Lenkoran), *Oertzeni* (Nauplia) S. 102; Flach, Wien. Entom. Zeitg., 1888.

Trichopteryx rufilabris (Talytsch; Lenkoran); Flach, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 103.

Silphidae. *Attumbra* nov. nom. (= *Catopomorphus Reitt.*); Des Gozis, Recherche de l'espèce typique, Montluçon, 1888, S. 17; nach Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 421.

Agathidium circassicum S. 154 und var. *laticolor*, *filicorne* n. sp., *Lederi* S. 155 (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888.

Attumbra femoralis (Araxesthal, unter Ameisen); Reitter, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1888, S. 421.

Bathyscia Murialdi (Italien), beschrieben von E. Balbi; s. Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 381, nach dem die Art = *B. pumilio Reitt.* ist.

Reitter unterscheidet in analytischer Tabelle die mit *Catopomorphus arenarius Hampe* und *Weisei Reitt.* verwandten n. *A. angustus* (Talytschgeb.) S. 422, *colchicus* (?), *funebis* (Parnass) S. 423; Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888.

Catops circassicus (C.); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 152.

Choleva (Nargus) *phaeacus* (Korfu); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 133, (Ch.) *obscuripes* (Abago) S. 151, (Nargus) *ovata* S. 152 (Cirkassien); derselbe ebenda.

Eucinetus strigosus (Irkutsk); Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 423.

Peltis (Phosphuga) *atra* L. var. *rostrata* (Cirkassien); Reitter, Wien. Ent. Zeitschr., 1888, S. 153.

Silphites cetoniiformis Taf. XXXI, Fig. 16, *angusticollis* Fig. 6 (lithogr. Schiefer); Oppenheim, Palaeontogr. 34.

Silpha bituberosa (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 114.

Platypsyllidae. G. H. Horn beschreibt die (noch nicht völlig ausgewachsene?) Larve von *Platypsylla Castoris Rits.* Während bei der Imago Mandibeln nicht aufgefunden wurden, besitzt die Larve solche; in ihren Be-

wegungen auf einer glatten Fläche erinnert sie an die Larven von Staphyliniden. Die kleinen Eier werden auf die Haut, zwischen die Haare, abgelegt. Die systematische Stellung beurtheilt Horn ebenso wie Leconte. Trans. Americ. Entom. Soc., XV, S. 23—26, Pl. VI, Fig. 17—22. — S. auch Riley, (National Academy of Science und) Nature, No. 995 S. 94 und Scientific American, 2. June 1888; die Larve ist am nächsten mit der von Leptinillus verwandt, dessen Käfernatur Niemand bezweifelt.

Scydmaenidae. *Cephemium austriacum* (Niederösterreich); Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 420.

Neuraphes imperialis, *saucius* S. 319, *Vulcanus*, *Satyris* S. 320 (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888.

Scyrtoscydmus successor (Elisabethpol, Kank.); Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, 421, *circassicus* (C.); derselbe, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 321.

Paussidae. *Lebioderus Candezai* (Sintang, Borneo); C. A. Dohrn, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 243.

Paussus adinventus (Bagamoio); C. A. Dohrn, Stett. Entom. Zeitg., 1888, S. 393.

Pselaphidae. C. Schaufuss stellt einen Catalogus synonymicus Pselaphidarum adhuc descriptarum zusammen; Tijdschr. v. Entomol. XXXI, S. 1—102. Nach demselben beträgt die Zahl der beschriebenen Arten 1651.

Reitter beschreibt Neue ... um Blumenau ... gesammelte Pselaphiden; Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 225—259.

E. Brendel stellt eine Bestimmungstafel der Gattungen der Pselaphiden der Vereinigten Staaten von Nord-America auf; ebenda S. 260—264 und Trans. Acad. Sci. St. Louis, V, S. 298—302.

F. Guillebeau gibt Notes pour servir à l'étude des Psélaphiens, die zumeist in der Beschreibung neuer Arten bestehen; Revue d'entomol., 1888, S. 203—220.

E. Reitter macht Bemerkungen zu der Arbeit „Ueber Pselaphiden und Scydmaeniden des Königl. zool. Museums zu Berlin von Dr. Schaufuss; Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 465—482; vgl. d. vor. Ber. S. 216.

Conoplectus n. g. Trogasterin. für (*Euplectus*) *canaliculatus*; E. Brendel, Trans. Acad. Soc. St. Louis, V, S. 301 und Deutsch. Ent. Zeitschr., 1888, S. 263.

Cylindrembolus Schauf. = *Xybaris Reitt.*; Reitter, a. a. O., S. 259.

Phamisulus (n. g. Hamoto, Phamiso et Neophamiso affine) *Hetschkoi* (Blumenau); Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 235.

Verticinotus n. g. Pselaphin. (Scheitel mit 2 Gruben, in beiden Geschlechtern verschieden; das ♂ ist als *Decarthron cornutum*, das ♀ als *Bryaxis inornata* beschrieben); E. Brendel, Trans. Acad. Sci. St. Louis, V, S. 300 und Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 261.

Aplodea praeses Schauf. = *valdiviensis Blanch.*; Reitter, a. a. O., S. 259.

Aplodea hirta (Blumenau). *pilifera* (Sao Paolo); Reitter, a. a. O., S. 243.

Reitter stellt a. a. O. S. 244—248 eine Uebersicht der Batrisus-Arten aus Brasilien auf und beschreibt B. (*Syrbatus*) *divergens* (Blumenau) S. 248, *nasutus*, *antennator*, *bythinocerus* S. 249, *Hetschkoi* S. 250, *scitus*, *quadri-oculatus* S. 251, *Martha*, *solvagus* S. 252, *curvispina*, *atricapillus* S. 253 (Blumenau),

soror (Sao Paolo), (*Arthmius*) *primarius* (Blumenau) S. 254, *melanocephalus*, *platycerus* S. 255, *sublaminatus*, *Edithae*, *bituberculatus* S. 256, *hiatusus*!, *minax* S. 257, *patruelis*, *rostellatus*, *humikior* (alle von Blumenau), *adulator* (Sao Paolo), *lubricus* S. 258, *dichrous*, *manifestus* S. 259.

Biblopectus affinis (Südfrankreich), *Reitteri* (verbreitet; unter *minutissimus* *Aubé* vermischt) S. 212, *obtusus* (Dalmatien) S. 218; F. Guillebeau, a. a. O.

Bibloporus (*bicolor* *Denny* S. 205), *pyrenaeus* (Hautes-Pyr.) S. 206, *Mayeti* (La Massane, Ost-Pyrén.), *Abeillei* (Korsika) S. 207, *Chamboosi* (St. Étienne) S. 208, *Reyi* (St.-Genis-Laval) S. 209; F. Guillebeau, a. a. O.

Bythinus tscherkessicus S. 284 und var. *inermis*, *Lederi* n. sp. S. 285 und var. *fluctuosus*, *argiolus* n. sp. S. 286 (Cirkassien); Reitter, Wien. Ent. Zeitg., 1888, *Xambesi* (Montélimart) S. 203, *Abeillei* (Le Plantey) S. 204; F. Guillebeau, a. a. O.

Decarthron bipunctatum *Reitt.* = *Bryaxis laevicollis* *Aubé*; Reitter, a. a. O., S. 259.

Euphalepsus fusco-capillus S. 236, *Hetschkoi*, *bilineatus*, *longicornis* S. 237, *puncticollis*, *laevicollis* S. 238, *Lothari*, *punctatissimus*, *laevissimus* S. 239, *longiceps* S. 240, sämtlich von Blumenau; Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, mit einer Uebersicht sämtlicher bekannten Arten auf S. 240 f.

Euplectus strix *Reitt.* = *Octomicrus*; Reitter, a. a. O., S. 259.

E. puncticeps (Cirkassien); derselbe, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 318, *Reyi* *Saulcy* i. l. (Lyon) S. 214, *sulciventris* (Amélie-les-Bains), *corsicus* *Saulcy* i. l. (K.) S. 215, *Abeillei* *Saulcy* i. l. (Voiron) S. 216, *Fairmairei* (Lyon), *Tholini* (Sos) S. 218, *Fauveli* (Plantay), *laticeps* *Rey* i. l. (Lyon); F. Guillebeau, a. a. O. *Fustiger Hetschkoi* (Blumenau); Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 226.

Hamotus inflatipalpis S. 225, *angusticollis* S. 226, *appendiculatus*, *brevicornis*, *vulpinus* S. 227, *fuscopilosus*, *gracilipes* S. 228, *impunctatus*, *centralis* S. 229, *parviceps* S. 230, *gracilicornis* *Reitt.* ♂, alle von Blumenau, Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, mit einer Uebersicht sämtlicher bekannten Arten, auf S. 230—233.

Phalepsus marelloides (Blumenau); Reitter, a. a. O., S. 242.

Pygoxyon bythiniforme (Fischt); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 317.

Staphylinidae. A. Fauvel fährt in seinen *Notes sur l'ouvrage de M. F. Lynch Arribalzaga* fort. *Revue d'entom.*, 1888, S. 24 f.

E. Eppelsheim beschreibt (14) neue Staphylinen Central-Asiens; *Deutsch. Entom. Zeitschr.* 1888, S. 49—67.

D. Sharp behandelt *The Staphylinidae of Japan*; *Ann. a. Mag. N. H.*, (6), II, S. 277—295, 369—387, 451—464. Während 1874 190, und in Schönfeldt's neuem Verzeichniss 218 Arten aufgeführt sind, wird die Zahl der japanischen Arten durch Hinzufügung von 249 hier auf 467 gebracht.

Aspidobactrus (n. g. *Homoeusae* affine) *claviger* (Nikko); D. Sharp, a. a. O. S., 284.

Bembicidiodes (n. g.) *inaequicollis* (Baltischer Bernstein); L. W. Schaufuss, *Berlin. Entom. Zeitschr.*, 1888, S. 267.

Bryocharis *Lynch Arrib.* = *Megacronus*; die beschriebene Art, *pulchella*, findet sich auch in Para; A. Fauvel, *Revue d'entomol.*, 1888, S. 24.

Ectolabrus (n. g. Myrmedoniin. inter Homoeusam et Dinardam) *laticollis* (Miyanoshita; Nikko); D. Sharp, a. a. O., S. 370.

Porocallus (n. g. Callicero affine) *insignis* (Yuyama); D. Sharp, a. a. O., S. 287.

Protinodes (n. g. Oligotin., Tarsi omnes breves, 4-art., posteriores art. basali brevissimo; antennae 11-art.; coxae interm. fere contiguae) *puncticollis* (Tokio); D. Sharp, a. a. O., S. 378.

Saphocallus (n. g. Myrmedoniin.) *parviceps* (Nagasaki); D. Sharp, a. a. O., S. 288.

Aleochara brevicornis (Taschkent); Eppelsheim, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 50, *niponensis* (Kiga; Nagasaki; Nikko); D. Sharp, a. a. O. S. 281.

Araeocerus fasciculatus lebend mit Kaffeebohnen von Liberia nach Schweden gebracht; O. Sandahl, Entom. Tidskr., 1888, S. 124, 126.

Astilbus Akinini (Taschkent); Eppelsheim, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 51.

Atemeles sinuata (Chiuzenji); D. Sharp, a. a. O., S. 288.

E. Wasmann bringt weitere Beiträge zur Lebensweise der Gattungen *Atemeles* und *Lomechusa*; Tijdschr. v. Entomologie, 31. Deel, S. 245—328.

Antalia rufula (Nagasaki); D. Sharp, a. a. O., S. 371.

Bledius Akinini (Kasalinsk); Eppelsheim, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 65.

Bolitobius principalis (Nikko; Miyanoshita), *daimio* (Nikko) S. 456, *semirufus* (Nikko; Chiuzenji) S. 457, *cinctiventris* (Oyama; Miyanoshita), *breviceps* (Nikko) S. 458, *simplex* (Nagasaki, Bukenji), *felix* (Nikko; Yuyama; Kashiwagi; auch Ost-sibirien) S. 459; D. Sharp, a. a. O.

Bolitochara varipes (Kashiwagi); D. Sharp, a. a. O., S. 371.

Calodera Desdemona (Yokohama); D. Sharp, a. a. O., S. 286.

Conosoma fimbriatum (Yokohama; Nikko), *tibiale* (Nikko, Oyayama) S. 454, *varicorne* (Japan), *armatum* (Kashiwagi; Nikko; Oyayama) S. 455, D. Sharp, a. a. O.

Epipeda graeca (Morea); Eppelsheim, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 406, *granigera* (Nagasaki) S. 375, *fraterna* (Miyanoshita) S. 376; D. Sharp, a. a. O.

Falagria myrmecophila (Kashiwagi; Nara; Sheba; Bukenji; Sapporo; bei Ameisen in Bäumen); D. Sharp, a. a. O., S. 294.

Gyrophæna sapporensis (S.); D. Sharp, a. a. O., S. 376.

Homalium Balossogloi (Issyk-Kul); Eppelsheim, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 66.

Homalota (Anopleta) congenita (Issyk-Kul) S. 53, (*Meotica*) *dissoluta* (Turkmenien) S. 54, *praecox* (ibid.) S. 56; Eppelsheim, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, (*Aloconota*) *subaenescens* (Beyrut; Korfu) S. 404, (*Geostiba*) *Oertzeni* (Attika; Parnass) S. 405; derselbe ebenda, *niponensis* (Nagasaki) S. 292, *lutulenta* (ibid.; Yokohama), *oligotinula* (Suyayama; Kumamoto) S. 293, *gyrophænula* S. 294; D. Sharp, a. a. O.

Homoeusa laevigata (Saba), *longicornis* (Sapporo); D. Sharp, a. a. O., S. 283.

Hypopycna subrugata (Hyères); Cl. Rey, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CXIX.

Lathrobium (*Lobathrium*) *Ludyi* (Görz); Eppelsheim, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 175, (*Glyptomerus boenicus* (Travnik); Reitter, ebenda S. 420.

Czwalina benutzte die Forcipes der Staphyliniden-Gattung *Lathrobium* s. str. *Rey* zur Artunterscheidung, wozu sich dieselben in hohem Grade eignen, und liefert eine Beschreibung und Abbildung derselben; Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 337—355, Taf. III, IV. Als neue Arten werden aufgestellt *L. hamatum* (Kaukasus) S. 343 Taf. III Fig. 4, *furcatum* Fauvel i. l. (Ungarn; Türkei; Kaukasus) S. 356 Fig. 11, (*Eppelsheimii* Reitt. i. l. Fig. 18), *Tetartopoeus* subg. nov. *decepiens* (Smyrna) S. 353 Taf. IV Fig. 27. — *L. (Glyptomerus) cavicola* Müll. und *apenninum Baudi* sind nach ihrer Penisbildung verschiedene Arten.

Leptusa abdominalis Motsch. = *piceata* Muls.; Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 338.

L. Oertzeni (Süd-Euböa) S. 401, *asperata* Fauv. i. l. (Cumani auf Morea) S. 402; Eppelsheim, ebenda, *impressicollis* (Yokohama; Nagasaki); D. Sharp, a. a. O., S. 371.

Megacronus formosus Grav. var. *dimidiatus* (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 147, *prolongatus* (Nara; Chiuzenji) S. 460, *optatus* (Kiga), *gracilis* (Otsu; Kobé; Fukushima) S. 462; D. Sharp, a. a. O.

Microglossa (*Crataraea*) *Solskyi* (Taschkent); Eppelsheim, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1888, S. 49.

Mycetoporus dubius, (*Ischnosoma*) *convexus* (Hitoyoshi; Hosokuté), *discoidalis* (Yokohama; Kiga; Miyanoshita) S. 463, *duplicatus* (Chiuzenji) S. 464; D. Sharp, a. a. O.

Myllaena Lynchi (= *parvicollis* Lynch nec Kraatz); A. Fauvel, Revue d'entomol., 1888, S. 24, *japonica* (Nagasaki; Miyanoshita); D. Sharp, a. a. O., S. 377.

Myrmecopora (*Ilyusa*) *turanica* (Turkmenien); Eppelsheim, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1888, S. 52.

Myrmedonia optata (Kashiwagi; Chiuzenji), (*Zyras*) *fugax* (Kioto) S. 289, *particornis* (ibid.), cognata var. *japonica* (Bukunji, in Nestern der Form. jap.) S. 290, *indiscreta* (Seba; Hakodate), *spreti* (Sapporo; Hakodate) S. 291; D. Sharp, a. a. O.

Nazeris pallidipes (Fischt); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 149.

Ocalea ruficollis (Attika); Eppelsheim, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 408.

Ocypus testaceipes (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 97, (Goërius) *angustulus* (Taschkent); Eppelsheim, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 61.

Oedichirus Quedenfeldtii (Marocco?); Schaufuss, Entom. Nachr., 1888, S. 313.

Oxyopoda (*Derocala*) *Ulixis* (Zante); Eppelsheim, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1888, S. 407, *luridipennis* (Yokohama; Oyama), *subrufa* (Nagasaki), *hilaris* (Nikko; Yokohama); D. Sharp, a. a. O., S. 285.

Zu *Philonthus ebeninus* Grav., concinnus Sharp und *dimidiatus* Sahlb., die wohl in vielen Sammlungen unter *ebeninus* vereinigt, aber drei verschiedene Arten sind, s. Gerhardt, Zeitschr. f. Entomol., Breslau (N. F.) 13, S. 7—9.

Phloeodroma (?) *tricolor* (Issyk-Kul); Eppelsheim, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1888, S. 56.

Quedius (*Ediguus*) *mutilatus* (Issyk-Kul) S. 58, (*Sanridus*) *cohaesus* (Turkmenien) S. 60; Eppelsheim, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888.

Scimbalium minimum (Macedonien); Eppelsheim, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1888, S. 408.

Scopaeus microphthalmus (Korfu; Kreta; Griechenland; Syrien); Eppelsheim, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 409.

Silusa areolata S. 144, *uniplicata* mit var. *proxima* und var. *planuscula* (Cirkassien) S. 145; Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, *rugosa* (Nagasaki) S. 372, *rorida* (Oyama), *punctipennis* (Nikko) S. 373, *conferta* (Miyanoshita), *crassicornis* (Yokohama) S. 374, *lanuginosa* (Nagasaki) S. 375; D. Sharp, a. a. O.

Staphylinus cervinipennis (Central-Afrika); G. Quedenfeldt, Berlin. Ent. Zeitschr., 1888, S. 159.

Stenus longipennis (Turkmenien); Eppelsheim, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 64.

Sunius Fauveli (Taschkent); Eppelsheim, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1888, S. 63.

Tachinus japonicus (Awomori; Chiuzenji; Nikko) S. 379, *trifidus* (Kiga; Nikko; Miyanoshita), *bidens* (Nikko; Sapporo) S. 380, *luridus* (Hakone; Kiga) S. 381, *nigrinus* (Kiga; Miyanoshita) S. 382, *sibiricus* (Baikal-S., Chiuzenji) S. 383, *nigriceps* (Japan), *impunctatus* (Junsai-See; Sapporo) S. 384, *diminutus* (Kiga; Sandai), *punctiventris* (Oyayama, Nikko) S. 385; D. Sharp, a. a. O.

Tachyporus terminalis (Shimonosuka lake) S. 451, *suavis* (Yuyamah; Fukushima; Chiuzenji), *oculatus* (Miyanoshita; Hakone) S. 452, *orthogrammus* (Kiga) S. 453; D. Sharp, a. a. O.

Tachysida velox (Kashiwagi); D. Sharp, a. a. O., S. 372.

Thamiaraea diffinis (Japan) D. Sharp, a. a. O., S. 292.

Thectura armata (Japan); D. Sharp, a. a. O., S. 294.

Thiasophila oxypodina (Hakone; Suyama, Miyanoshita; in Gesellschaft von Ameisen); D. Sharp, a. a. O., S. 284.

Hydrophilidae. *Fähræa* n. g. für (*Helophorus*) *sculpturatus Bohem.*; die Gattung *Helophorus* ist damit auf die palä- und nearktische Region beschränkt; Bergroth, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 221.

Helobata nov. nom. für *Helopeltis Horn* (wegen *Helopeltis Sign.* bei Rhynchoten); Bergroth, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 221.

Kuwert stellt eine Uebersicht der (18) *Berosus*-Arten Europas, der Mittelmeer-Fauna und der angrenzenden Länder auf; Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 129–139. Die Arten werden in die Untergattungen *Acanthoberosus* (= *Enoplurus Hope* „in partibus“) und *Berosus* i. sp. vertheilt. Als neu sind beschrieben (*Acanthoberosus*) *aegyptiacus* (A.) S. 139, *numidicus* (Aegypten; Abessinien) S. 140, *asiaticus* (Bagdad) S. 141, *Lenkoranus* (Kleinasien; Persien), *Samarkanti* (Turkestan) S. 142, *fronti-foveatus* (Sarepta), *Schusteri* (Ungarn), S. 143, *aethiops* (Aegypten) S. 144.

Cercyon agnotum! (Sizilien); Kuwert, II Naturalista Siciliano, VIII, S. 38.

Embolimnebius Baudii, *angusticonus* S. 234, *laticonus* S. 235 (Sizilien); A. Kuwert, II Natural. Siciliano. VII.

Helochaeres mentinotus (Aegypten); Kuwert, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 292.

Kuwert gibt eine Generalübersicht der 45 Hydraenen der europäischen Fauna, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 113—120, und beschreibt *H. Kiesenwetteri* (Montebaldo; Valombrosa) S. 120, *croatica* (Cr.), (*Sph[a]enhydraena*) *caucasica* (K.) S. 121, (*H.*) *africana* (Nordafr.) S. 122, (*Grammhydraena*) *Stussineri* (Bilbao) S. 123. Die Arten werden in die Untergattungen *Taenhydraena*, *Phothydraena*, *Hoplydraena*, *Holcohydraena*, *Hydraena* i. sp., *Sph[a]enhydraena* und *Grammhydraena* vertheilt.

H. dentipalpis (Fischt); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 143.

Schilsky's fünfter Beitrag zur deutschen Käferfauna bezieht sich auf die Hydrobiini; Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 366f.

Laccobius elongatus Town. = *leucaspis* Kiesenw.; Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 176.

Paracymus Schneideri (Kaukasus); Kuwert, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 273.

Paracymorphus! globuloides! (Sizilien); Kuwert, II Natural. Siciliano VIII, S. 39.

Kuwert gibt eine General-Uebersicht der (37) *Philydrus*-Arten Europas und der Mittelmeerfauna, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 273—281, und schliesst daran die Beschreibung der neuen an: *Ph. hispanicus* (Sp.) S. 281, *caspius* (Kleinasien; Ungarn?) S. 282, *vultur* (Salasteppe Südrusslands) S. 283, *segmenti-notatus* (Konstantinopel; Griechenland), *maculipex* (Aegypten) S. 284, *apicinotus* (Bagdad) S. 285, *Sahlbergi* (Weisses Meer), *atricornis* (Spanien) S. 286, *unguidabilis* (Sarepta) S. 287, *sternospina* (Deutschland; Oesterreich) S. 288, *Lederi* (Lenkoran; Spanien?), *ater* (Aegypten) S. 289, *nitidulus* (Syrien) S. 290, (*Agraphilydrus*) *latus* (Alexandria), *nitiduloides* (ibid.) S. 291.

Ph. (Agraph.) *Ragusae* (Sizilien); derselbe, II Naturalista Siciliano, VIII, S. 38.

Gyrinidae. *Dinentes Kelatensis* (Bondo-Gebiet); G. Quedenfeldt, Berlin, Entom. Zeitschr., 1888, S. 159, *Kaiseri* (Sinai); Stierlin, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 48.

Dyticidae. *Agabus subtilis* Erichs. in Belgien (Groenendal, Tervueren); P. de Borre, Bull. Soc. Ent. Belg., 1888, S. XXXVI.

Landois untersuchte die Geschlechtsorgane von Weibchen des *Dyticus marginalis* mit glatten Flügeldecken, konnte aber keinen Unterschied gegenüber denen mit gefurchten Flügeldecken auffinden; Jahresber. zool. Sekt. d. westf. Prov.-Ver. 1887—88, S. 36.

Unter den Flügeln eines Männchens dieser Art fand er die rothen Larven von *Hydrachna cruenta* (9 Stück) 9 mm. (!) lang; ebenda S. 36.

F. Rühl will die Annahme, dass die Weibchen mit glatten Flügeldecken eine Zwitterform repräsentieren, nicht gelten lassen, konstatiert die grosse Variabilität in der Flügeldeckenskulptur und kommt auf den Gedanken, dass dieselbe durch Vermischung von zwei vordem geographisch getrennten Arten hervorgerufen sei; Societ. Entom. II, S. 170f.

Valéry Mayet beschreibt die (muthmassliche) Larve von *Eunectes sticticus* L.; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CCIII f.

Hydroporus fulviventris (Sardinien); Costa a. a. O., I, No 2, S. 85, *numidicus* (Bone; Krumirie; = dorso-plagiatus Seidl. nec Fairm.; die Fairmaire'sche Art ist von *bimaculatus* Duf. nicht zu trennen); Bedel, Ann. Soc. Entom. France, 1888, S. 286.

Den *Pseudohydrophilus longispinosus* *Deichm.* (dies. vorjäh. Ber. S. 221) erklärt Oppenheim für einen *Prodytiscus*; *Palaeontogr.* 34, S. 237f; derselbe beschreibt ebenda S. 238, Taf. XXXI, Fig. 19, 20 einen *Pr. Eichstadtensis*.

Carabidae. A. Fauvel liefert die *Description de Carabiques nouveaux de France*; *Revue d'entomolog.*, 1888, S. 220—223.

P. Mingazzini beginnt im *Bull. Soc. Entom. Ital.*, 1888, S. 113—128 einen *Catalogo dei Coleotteri della provincia di Roma*, appartenente alla famiglia dei Carabici.

A. Semenow gibt ein *Aperçu des genres paléarctiques de la tribu des Anchoméniides*, in welchem auch mehrere in den *Hor. Soc. Entom. Ross.* zu beschreibende neue Gattungen Aufnahme gefunden haben; *Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou*, 1888, No. 4, S. 686—693.

Acalathus n. g. Anchomenin., für *A. semirufescens* n. sp.; A. Semenow, a. a. O., S. 691.

Agonopsis subg. nov. Anchomen., für *A. humerosus* n. sp.; A. Semenow, a. a. O., S. 692.

Calliscapterus n. g. Carenid. für (*Carenum*) *coruscus*, *smaragdulus* etc.; Macleay, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* (2. S.) II, S. 121.

Untergattungen von *Carabus* sind: *Archicarabus* (für *hortensis* und *nemoralis*), *Autocarabus* (für *auratus*), *Rhabdotocarabus* (für *melancholicus*); Seidlitz, *Fauna baltica* und *Transsylvanica*.

Carenoscaphus (n. g. Scarit. für (*Carenum*) *scaritioïdes*, *atronitens*, u. s. w. und) *lucidus* (Dawson River); Macleay, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* (2. S.) II, S. 120 und 131.

Chlaeniomimus n. g. Anchomenin., für (*Chl.*) *gracilicollis* *Jakowl.*; A. Semenow, a. a. O., S. 687.

Laccopterus n. g. Carenid. für (*Caren.*) *Spencei*; Macleay, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* (2. S.) II, S. 121 (*Laccoptera* bereits bei Käfern vergeben).

Harpalodema (n. g.) *lutescens* (Astrachan), *Fausti* (ibid.); Reitter, *Deutsch. Entom. Zeitschr.*, 1888, S. 419.

Morphodactyla n. g. Anchomenin., für *M. Potanini* n. sp.; A. Semenow, a. a. O., S. 690.

Paradolichus n. g. Anchomenin., für *P. Przewalskii* n. sp.; A. Semenow, a. a. O., S. 691.

Philoscaphus n. g. Carenid. für (*Carenum*) *tuberculatus*, *Mastersi*, *costalis*, *carinatus*, *lateralis*; Macleay, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* (2. S.) II, S. 123.

Platythorax n. g. (von Hesse bei Krebsen bereits vergeben) für (*Carenum*) *rectangulare*, *transversicollis*; Macleay, *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales* (2. S.) II, S. 121.

Protoscalidion (n. g.) *Rugiae* (Baltischer Bernstein); L. W. Schauffuss, *Berl. Entom. Zeitschr.*, 1888, S. 266.

Pseudobrosco (n. g.; tarsi antici in utroque sexu simplices, articuli dilatatis nullis, cetera ut in *Brosco*) *leucocnemis* (Samarkand, an den Ufern des Saraffschan); A. v. Semenow, *Wien. Entom. Zeitg.*, 1888, S. 248.

Pseudohaptoderus (n. subg. von *Haptoderus*; letztes Tarsenglied auf der Unterseite nicht mit Haaren besetzt) *Semenovi* (Plateau von Amdo); Tschitscherin, *Hor. Soc. Ent. Ross.*, XXII, S. 366.

Pseudolimnaeum n. g., von *Limnaeum* durch kleineren Kopf, längeres

R*

Halsschild, noch mehr parallele Fld. unterschieden; während die Linnaeum-Arten Küstenbewohner sind, wurde die Art dieser Gattung, *Ps. Eichhoffi*, in Saarlouis im Keller gefunden; Kraatz, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 365.

Neue Untergattungen von *Pterostichus* sind: *Parapedius* (für *coarctatus* L., *baeticus* Ramb.), *Pseudoderus* (für *leptoderus*, Kraatzii, *carbonicolor* Solsk.), *Pseudopedius* (für *crenatus* Dej., *crenuliger* Chaud.), *Lyropedius* (für *lyroderus* Chaud.); Seidlitz, Fauna.

Steganomma (n. g. Scaritin.) *porcatum* (Russell River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 133.

Stenolepta (n. g. Anchomenin.) *cylindrica*; A. Semenow, a. a. O., S. 688.

Acorius Ghilianii Baudi var. *salinarius* (Ufern des Rio Salado und Teichs von Montalvo, Ulcés); Pantel, An. Soc. Esp. Hist. Nat., XVII, S. 235.

J. Keys unterscheidet *Aëpus marinus* und *Robinii* in folgender Weise: Spitze der Flügeldecken abgestutzt (*marinus*); Spitzen der Fld. einzeln lappenförmig vorgezogen, klaffend (*Robinii*); Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 276.

Agonum semicupreum (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 97, *Birtheri* (Kleinasien. Olymp); v. Hopffgarten, Entom. Nachr., 1888, S. 177.

Amara (Celia) *solicita* (Ulcés); Pantel, An. Soc. Esp. Hist. Natur., XVII, S. 236 mit Holzschn., (*Cyrtotus*) *aulica* var. *circassica* (C.); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 86, *lantoscana* u. sp. (St.-Martin-Lantosque); A. Fauvel, Revue d'entomol., 1888, S. 222.

Ed. Everts stellt eine tabellarisch overzicht der in Nederland waargenomen soorten van het geslacht *Amara Bonelli* auf; Tijdschr. v. Entomol., 31. Deel., S. 329—338.

Amathitis Yunnan (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entomol. Belg., XXXI, S. 95.

Anchomenus unceus (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, S. 96.

Anillus explanatus (Alabaster cave, Kalif.); G. H. Horn, Trans. Americ. Entom. Soc., XV, S. 26 mit Tabelle der (4) nordamerikanischen Arten.

Anopthalmus (ruissandau) (Grotte d'Estellas, Ariège); Argod, Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXIX, *Herculis* (Höhle des Domogled); Frivaldszky, Termész. Füzet., XI, S. 159, *circassicus* (höhere Waldregion); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 85.

Anthia praesignis (Mamboia) S. 200, *pulcherrima* (Lujenda Fl.) S. 201; Bates, Entom. Monthl. Mag., XXIV.

Bembidium Synchostictus Lederi (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 82 (Braceton) *Güntheri* (Petrosawodsk); Seidlitz, Fauna, S. 74, (*Endromus*) *rufotibiellum* (Peking); L. Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 112.

Sur le *Bembidium biguttatum* Fab. et les formes voisines (*aeneum*, *inoptatum*, *iricolor*) s. P. de Borre, Bull. Soc. Ent. Belg., 1888, S. LXXXIII bis LXXXVIII.

Nach der Penisbeschaffenheit kann *Calathus micropterus* nicht mit *melanocephalus* vereinigt werden, wie *Ragusa that*; Schilsky, Deutsch. Ent. Zeitschr. 1888, S. 125.

Calathus Delavayi (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 96, *punctibasis* (Peking); derselbe, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CC.

Valéry Mayet beschreibt die Larve von *Calosoma Maderae* F. und Olivieri Dej.; Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CCLXXI—CLXXIV.

C. Thibetanum (Moupin); Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXI, S. 92.

A. Sémenow theilt Notes synonomiques et systématiques sur diverses espèces du genre *Carabus* L. mit; Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 207—212. (*C. Mac-Leayi* var. *splendidulus* Sem.; *C. striatulus* Geh.; *C. vicinus* Sem. von *variabilis* Ball. unabhängige Art; *C. Dokhturowi* Ganglb. gehört mit *Standingeri* Ganglb. in die Untergattung *Paraplesius* Mor.; *C. miles* Sem. ist wahrscheinlich das Weibchen von *C. (Axinocar.) melanochrus* Mor.).

Carabus auratus var. *Brullei* Geh. nach Beckers bei Rheydt, und vielleicht an Kalkboden gebunden; Entom. Nachr., 1888, S. 17; nach Kraatz handelt es sich hier um eine Zwischenform zwischen *Brullei* und *auratus*, die auch anderwärts vorkommt und eine leichte Verkrüppelung andeutet, die bei *Brullei* stärker zum Ausdruck gelangt ist; Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 23.

C. brevisculus Kraatz (s. den vor. Ber. S. 224) gehört als Var. zu *glabratus*; derselbe ebenda S. 48.

C. monilis v. *Kronii* var. *varicolor* (Traversthal, Ct. Neuchatel); E. Joerin-Gerber, Mitth. Schweiz. entom. Gesellsch., VIII, S. 69; *cumanus* Fisch. var. *laetulus*, var. *submicans* (Cirkassien); Reitter, Wien. Ent. Zeitg., 1888, S. 25, *C. Mac-Leayi* var. *splendidulus* S. 207; Guérini var. *callisthenoides* (Turkestan) S. 208, *striatulus* Geh. var. *obscurior* (Ili) var. *progressus* (Issyk-kul) S. 210; der Name des *C. vicinus* Sem. wird wegen *Procrustes vicinus* Walll durch *confinis* ersetzt, S. 211; A. Semenow, a. a. O.

Carabus viridifossulatus (Moupin); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 91, *Königi* Ganglb. i. l. (Cirkassien); Reitter, Wien. Ent. Zeitg., 1888, S. 25, *Provostii* (Peking); Fairmaire, Revue d'entomol., 1888, S. 111, *Kiukiangensis* (China); H. W. Bates, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 381.

Carenidium Darlingense (Darling River) S. 124, *Chaudoirii* (Endeavour River) S. 125, *septentrionale* (Peak Downs) S. 126, *tropicale* (Endeavour River) S. 127; Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II.

Carenium purpureo-marginatum (Cornabarabran); Macleay, a. a. O. S. 132.

A. v. Kraatz-Koschlau wendet sich in einem „die Umtaufungen und Ausgrabungen alter Namen und Beschreibungen der *Ceroglossus*-Gruppe“ gegen die von A. Morawitz und G. Kraatz vorgenommenen, von der Gerstäcker'schen Monographie abweichenden Umdeutungen der älteren Arten, Stett. Ent. Zeitg., 1888, S. 85—127, und beschreibt *Chiloënsis* var. *suturelevatus* (Chiloë) S. 311, *gloriosus* var. *incertus* S. 312.

A. Semenow gibt eine Notice sur les Chlénienens de la région Transcaspienne und beschreibt Chl. *Königi* S. 219 und bildet den forceps von Chl. *indieriensis* Motsch. und *spoliatus* Rossi ab, S. 216; Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 213—223.

Chlaenius Lederi (Arazesthal); Reitter, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 417.

Colpodes mucronatus (Mossman River); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 218, *superlita* (Kiukiang); H. W. Bates, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 383.

Conopterum violaceum (Mudgee district) S. 127, *littorale* (Richmond River), *bicornutum* (Endeavour River) S. 128, *Barnardi* (Dawson River), *incornutum* (Richmond River) S. 129; Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II.

Coptolabrus Branickii (Korea bei Seül); L. Taczanowski, Hor. Soc. Entom. Ross., XXII, S. 187 Tab. XI Fig. 8, *Leechi* (Gensan, Korea); H. W. Bates,

Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 369, *augustus* und var. *ignimetalia* (Kin-Kiang); derselbe, ebenda S. 381.

Cychnus convexus Mor. am Amur; Bergroth, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888, S. 222.

C. Hampei v. Heyd. (intermedius Hamp.) nicht = meridionalis. Chaud., wie v. Seidlitz wollte; v. Heyden, Wien. Entom. Zeitg. 1888, S. 216.

Cychnus yunnanus (Y.); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 90, *Starcki* Ganglb. i. l. (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg. 1888, S. 19. C. aeneus Fisch. var. *Balkonis* (Novorossisk und Utsch-Dere; Bindeglied zwischen *Starcki* und *aeneus*, weshalb ersterer auch nur als Var. zu *aeneus* angesehen wird); O. Retowski, ebenda S. 244.

Die centraleuropäischen Arten der Gattung *Cymindis* Latr. in tabellarische Uebersicht gebracht und beschrieben von L. Ganglbauer (als Probe aus dessen Käferfauna von Central-Europa); Societ. Entom., II, S. 161—163.

Cymindis Ganglbaueri (Oscht, Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg. 1888, S. 90.

Demetrias rufescens (Cairns); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 217.

Drimostoma explanatum (Kameroon), *euglyptum* (Alt-Kalabar); Bates, Entom. Monthl. Mag., XXIV, S. 200.

Dyschirius Lederi (Cirkassien, Waldregion); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 85.

Elaphrus Davidis (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, S. 89.

Eutoma punctulatum (Dawson River), *magnificum* (Peak Downs) S. 130, *brevipenne* (Moreton Bay) S. 131; Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II.

Gigadema atrum (Cairns); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 217.

G. H. Horn beschreibt und bildet ab die Larven von *Glyptus sculptilis* Brullé; dieselben entstammten einem Termitennest, und waren anfänglich für kleinere Königinnen desselben gehalten worden; Trans. Americ. Entom. Soc., XV, S. 19—21, Pl. III, Fig. 1—7.

Graphipterus postfasciatus (Namaqua); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. de France, 1888, S. 176, *angolensis* (A.), *velox* (ibid.); L. Péringuey, Ann. a. Mag. N. H. (6), II, S. 221.

Harpalus Smyrnensis (S.); v. Heyden, Deutsch. Entom. Zeitschr., 1888, S. 69, (Erpeinus) *ibericus* (Rio Salado, Montalvo, bei Ulcés, auf feuchtem Salzboden) S. 219 mit Holzschn., *Aesculanus* (Rio Salado) S. 223, *Perezii* Vuill. var. *salinator* (Rio Salado; Aranjuez; auf Salzboden) S. 224; Pantel, An. Soc. Esp. Hist. natur., XVII.

Helluosoma viridipenne S. 216, *latipenne* S. 217 (Cairns); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II.

Homalosoma opacipenne (Mulgrave River) S. 219, *obscuripenne* (Mossman River) S. 220; Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.), II.

Laccopteryx (s. oben) *lacunosum* (Coonabarabran); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 132.

Lebia coelestis S. 381, *chrysomia*, *caligata*, *xanthophana* S. 382 (Kiukiang); H. W. Bates, Proc. Zool. Soc. London, 1886.

Licinus planicollis (Basses Alpes; Alpes-maritimes); A. Fauvel, Revue d'entomol., 1888, S. 221.

Lipostratia cyaniventris (Damara); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. de France, 1888, S. 176.

Megadontus exaratus var. *multicostis*, var. *septemlineatus* S. 24, *septemcarinatus* var. *fischensis* S. 25 (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888.

Nebria livida bei Ostende und Scheveningen; nicht bei Bordeaux; Bull. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. XVII, XXIV, XXIX.

N. Lederi (Schneefelder des Fischt, Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 81, *pictiventris* (Briançon); A. Fauvel, Revue d'ent., 1888, S. 220.

Neoplectes Reitteri var. *Retowskii* S. 20, *compressus* var. *Schneideri*, var. *latitans* S. 21, *Promethes* var. *Zugmayeriae*, var. *Wolfianus*, *obtus* var. *Ganglbaueri* S. 22 (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888.

Olisthopus anomalus Perris ist ein *Badister*; v. Heyden, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 215.

Omasens acutidens (Peking); Fairmaire, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CC.

Omphreus morio var. *Beckianus* (Viscucca-Geb., Bosnien); L. Ganglbauer, Societ Entom., III, S. 89.

Oodes piceolus (Fokien); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 98.

Ophonus cephalotes Fairm. ist eine *Scybalicus*; v. Heyden, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 215.

Ueber *Pedius sículus Levrat* s. M. J. Belon, Revue d'entomol., 1888, S. 71.

Physodera Davidis (Fokien); Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXI, S. 92.

Platysma latecostata, *Yunnan* S. 94, *aeneocuprea* S. 95 (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI.

Plectes (?) *concinus* (Saraffschan-Geb.); A. v. Semanow, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 246.

Pogonus castaneipes (Peking); Fairmaire, Bull. Soc. Entom. France, 1888, S. CC, *approximans* (Peking); derselbe, Revue d'entomol., 1888, S. 112.

Pristodactyla Horsti (Schneefelder des Fischt); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 88.

Pristonychus picescens (Yunnan); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg. XXXI S. 95.

Procarabus Zitteli S. 236 Taf. XXXI Fig. 14, *reticulatus* Fig. 28, *tripartitus* Fig. 120 S. 237 (lithogr. Schiefer); Oppenheim, Palaeontogr. 24.

Über die Rassen des *Procrustes coriaceus* L. s. Ganglbauer, Deutsch. Entom. Zeitschr. 1888 S. 384—397; kurze Bemerkungen zu Ganglbauer's Auffassung der *Procrustes*-Arten von Kraatz ebenda S. 396 f.

Pseudolimnaceum Eichhoffi (Saarlouis); Kraatz, Deutsch. Ent. Zeitschr. 1888 H. 365.

Pterostichus Etelkae (Siebenbürgen, bei Abrudbanya); Ormay, Supplem. S. 13 und Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 165, *Przewalskii* (Thibet) S. 362, *validipes* (zw. By-thu und dem blauen Fluss) S. 364; Tschitscherin, Hor. Soc. Ent. Ross., XXII.

Macleay widmet No. 3. seiner *Miscellanea Entomologica* den neuholländischen Scaritiden; Proc. Linn Soc. N. S. Wales (2. S.) II S. 115—134. Die Mehrzahl der 180 Arten gehören den Australien eigenthümlichen Careniden an, welche 14 Gattungen (*Monocentrum*, *Teratidium*, *Carenidium*, *Conopterum*, *Neocarenum*, *Eutoma*, *Carenoscaphus*, *Carenum*, *Calliscapterus*, *Plathythorax*, *Laccopterum*, *Philoscaphus*, *Euryscaphus*, *Scaraphites*) enthalten. Die andere

Gruppe ist in Australien mit den Gattungen *Geoscaptus* (6 A.), *Dyschirius* (3 A.), *Scolyptus* (8 A.), *Clivina* (33 A.) und der n. G. *Steganomma* (1 A.) vertreten.

Valéry Mayet liefert eine Beschreibung der Larve von *Scarites buparius* Forst. (gigas F.). Diese Larve ist blind, mit weichhäutigem Hinterleib, und geht tief im Sande der Dünen eingegraben ihrer Beute nach. Bull. Soc. Entom. France, 1887, S. CLXII—CLXIV.

S. estriatus (Fokien); Fairmaire, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 93.

Scopodes fasciolatus (Cairns); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 219.

Tachys scutellaris var. *atrata* (Sardinien); Costa, a. a. O., I, No. 2, S. 85.

Reitter taufte seinen *T. unistriatus* wegen der gleichnamigen Putzeys'schen Art in *unilineatus* um; Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 104.

Thermoscelis insignis var. *Kamberskyi* (Atschischcho und Oschten); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 89.

Thyreopterus impressiusculus (Madagaskar); Fairmaire, Le Naturaliste, 1888, S. 11 mit Holzschn.

Trachycarabus var. *cribratus* (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, S. 25, *decorus* (Siebenbürgen; = *marginalis* Biels nec F.); Seidlitz, Fauna, S. 14.

Trechus Ithae, *Fischtenensis* S. 83, *alpigradus* S. 84 (Cirkassien); Reitter, Wien. Entom. Zeitg., 1888, *Cantalicus* (Le Lioran); A. Fauvel, Revue d'entom., 1888, S. 221.

Cicindelidae. W. Dokhtoureff's weitere Matériaux pour servir à l'étude des Cicindélides in den Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI, S. 149—158 bestehen aus (IV) einer Note complémentaire et synonymique à la „liste ... de J. Demoor, und (V) description d'espèces nouvelles ou inédites.

Cicindela hybrida var. *Korbi* (Andalusien), *gallica* var. *alpestris* (Gadmenthal), *campestris* var. *Saxesenii* *Endrulat*; Beuthin, Entom. Nachr., 1888, S. 81. — Zu *C. Saxesenii* *Endr.* = *farellensis* *Graells* = *tartarica* *Mnnh.* s. auch Kraatz ebenda S. 129.

Cicindela Froggatti (Mossman River, Cairns); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II, S. 213, *Desgodinsii* (Yunnan) S. 87, *Davidis* (Moupin), (Heptadonta) *Yunnana* (Yunnan) S. 88; Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg., XXXI, (*Habroscelis*) *Dohrni* (Venezuela) S. 152, (*Cic.*) *tenebrosa* (Congo) S. 153, *Friedenreichi* (Blumenau, Bras.), (*Euryoda auripennis* *Luc.* ♀) S. 154, (*Cylindera*) *Aruana* (Aru-I.) S. 155, *litoralis* var. *Massaniensis* (Massana), (*Thopoeutica*) *Chloë* Laf. i. l. (Indien) S. 156; Dokhtoureff ebenda, *leucopicta*! (zwischen Kuango und Loango); G. Quedenfeldt, Berlin. Entom. Zeitschr., 1888, S. 157, *lobipennis* (Kiu Kiang); H. W. Bates, Proc. Zool. Soc. London, 1888, S. 380.

Distysidera flavipes S. 214, *Pascoci*, *parva* S. 215 (Cairns); Macleay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2. S.) II.

Mantichora congoensis (Congo); L. Péringuey, Ann. a. Mag. N. H.; (6), II, S. 219.

Odontochila propinqua (= *Cayennensis* *Dej.* nec F.) S. 156, *Chaudoiri* (Petropolis, Brasil.) S. 157; Dokhtoureff, Ann. Soc. Entom. Belg., XXXI.

Ophryodera Bohemanni (Angola), *rufomarginata* *Boh.* var. *Bradshawii* (Sambesi) S. 220, var. *Oberthueri* (ibid.) S. 221; L. Péringuey, Ann. a. Mag. N. H. (6), II.

Bericht

über

die Leistungen in der Carcinologie während des Jahres 1887.

Von

Dr. G. Herbert Fowler

in London.

(Uebersetzung von Dr. F. Hilgendorf.*)

I. Verzeichniss der Publicationen.

Aurivillius, C. W. S. Hafsevertebrata från Nordligaste Tromsö-
amt och Vestfinnmarken. Bih. Sv. Ak. Handl. XI, No. 4. — Crustacea
pp. 38—47.

Baird, S. F. (The American Lobster.). Rep. U. S. Fish Comm.
1887, pp. CII—CIV.

Barrois, T. (1) Note sur quelques points de la morphol. des
Orchesties, suivie d'une liste succincte des Amphipodes du Boulonnais.
Lille, 1887, 20 pp., 1 Tf. (Nicht vom Ref. gesehen.)

— (2) Note sur le Palaemonetes varians Leach, suivie de quel-
ques consid. sur la distribution géogr. de ce crustacé. Bull. Soc.
Zool. France XI 691—707, 1 Tf. — Vf. nimmt an, dass hier eine
marine Art sich in Süsswasser einbürgere; im Süden ist die Um-
änderung schon vollendet, während sie im Norden noch vor sich geht.

Beddard, F. E. Note on a New Type of Compound Eye. Ann.
N. H. (5) XX 233—6, 1 Xyl. — Bei den Serolidae u. Cymothoidae
umgeben die Retinulae nur den oberen Theil des Rhabdom; der
untere Theil geht zwischen hyalinen sphaerischen Zellen hindurch,
welche im Centrum der Retinulae liegen. Beobachtungen zu Gunsten
der Grenacher'schen Ans. üb. die Morph. des Auges.

Biedermann, W. Ueber die Innervation der Krebssehne.

*) Betreffs der Zusätze und Aenderungen des Uebersetzers vergl. die Note
im Crustaceen-Bericht über 1885/6 (58. Jahrg., Bd. II, Heft 2, S. 320). Die An-
gaben über fossile Crustaceen hat der Uebersetzer wiederum gestrichen. Der
Leser wird hierfür auf die entsprechenden Referate des Neuen Jahrbuches für
Mineralogie verwiesen.

F. Hf.

Beitr. z. allg. Nerven- u. Muskel-Physiologie. S.-B. Ak. Wien XCV, Abth. 2, 7—46, 3 Tf. — Physiol. Forschungen, mit Curventafeln.

Bonnier, J. Catalogue des Crustacés malacostracés recueillis dans la baie de Concarneau. Bull. scient. de la France et Belg. (2) X 199—262, 296—356, 361—422. — Liste der Arten mit Lokaltäten u. Syn.; Bibliographie p. 400 u. Index p. 417.

— [Vergl. Giard (6), (7).]

Bovallius, C. (1) Systematical List of the Amphipoda Hyperidea. Bih. Sv. Ak. Handl. XI, Nr. 16; 50 S. — Vollst. Liste mit vielen neuen Gatt. u. Arten.

— (2) New or imperfectly known Isopoda II. Ebd. Nr. 17; 19 S., 2 Tf.

— (3) Dasselbe III. Ebd. XII, No. 4; 23 S., 4 Tf.

— (4) Amphipoda Synopidea. N. Acta Ups. XIII; 36 S., 3 Tf. — Vf. theilt die Amph. in: Tanaidea, Gammaridea, Synopidea, Hyperidea, Caprellidea. Die Synopidea zerfallen in 3 Fam.: Synopidae, Trischizostomatidae und Hyperipsidae; die ganze Gruppe wird eingehend behandelt.

— (5) Arctic and Antarctic Hyperids. Vega-Exped. Vetensk. Jakttag. IV S. 545—582, 8 Tf.

Brandt, E. Vergl. anat. Unters. des Nervensystems der Isopoden. Horae ent. Ross. XX 245—9. — Titel russisch.

Brandt, K. Die koloniebildenden Radiolarien (Sphaeroz.) des Golfes von Neapel. Fauna u. Fl. d. G. v. N. XIII, S. 139—140. — In den Kolonien Hyperidae als Parasiten.

Brock, J., siehe Möbius (2).

Brook, G. Notes on the Reproduction of Lost Parts in the Lobster (Hom. vulg.). Pr. Physic. Soc. Edinb. IX 370—85, Tf. XVII. — Beob. üb. Repr. der Antennen und Scheeren.

de Buen, O. Materiales para la Fauna Carcinológica de España. Anales Soc. Española Hist. nat., Madrid, XVI 405—34. — Liste der Sp., Bem. üb. Verbreitung S. 432.

Cameron, P. White Aberration of Gammarus pulex. Pr. Nat. H. Soc. Glasgow (n. s.) I 301.

Cattaneo, G. Sulla struttura dell' intestino dei Crostacei decapodi e sulle funz. delle loro glandule enzimatiche. Vorl. Notiz in Boll. scientif. (Maggi etc.), Pavia, IX 60—61; ausführlich in Atti soc. ital. sc. nat., Milano, XXX 238—72, Tf. 3. — Histol. des Darms; Exper. üb. die Funkt. der sog. Leber, welche nach Vf. nicht nur amylytisch, tryptisch u. peptisch, sondern auch wirklich hepatisch ist.

Chevreux, E. (1) Sur les crustacés amphipodes de la côte ouest de Bretagne. C. rend. Ac. Paris CIV 90—3.

— (2) Descr. de 3 esp. nouv. d'Amphipodes du Sud-ouest de Bretagne. Bull. soc. zool. France XI, proc. verb. XL—XLII.

— (3) Cat. des crust. amphipodes marins du Sud-ouest de la

Bretagne, suivi d'un aperçu de la distr. géogr. des Amphip. sur les côtes de France. Ebd. XII 288—340, 1 Tf. — Abb. der spp. nn. aus (2).

Chilton, C. A new sp. of Philougria. Trans. Pr. New Zealand Inst. (Well.) XVIII 159—61, Tf. V.

— [Vergl. Thomson, G. M.].

Chimkewitch [s. Schiemkewitsch].

Chun, C. Ueb. d. geogr. Verbreit. der pelagisch lebenden See-thiere. Zool. Anz. IX 1886, 55—9, 71—5.

Claus, C. (1) Ueber Lernaescus nematoxys Cls. u. die Fam. der Philichthyden. Arb. z. Inst. Wien, VII 281—315, 4 Tf. — An die Beschreib. des ♂ (S. 283), der Jugendstadien (291) u. des ♀ (293) schliesst Vf. eine Erörterung über die Weibchen von Philichthys u. Sphaerifer (302) und Definitionen der Gen. der Philichthydae (310).

— (2) Ueber d. morphol. Bedeutung der lappenförmigen An-hänge am Embryo der Wasserassel. Anz. Ak. Wien, XXIV 21—3. — Betrachtet sie als homolog mit dem „Panzerschild“ von Tanais.

— (3) Die Platysceliden. Wien, 1887, 4^o. 77 S. 26 Tf.

— (4) Ueber den Organismus der Apseudiden. Anz. Ak. Wien, 1887, 156—161. — Morphol. Schlüsse nach Unters. des Triester A. latreillei. Das Auge ist zweifellos sessil; eine rud. Drüse an der Basis der 2. Ant.; die Schalendrüse ist gleichfalls vorhanden.

— (5) Ueb. Apseudes latreillei Edw. u. die Tanaiden. II. Arb. z. Inst. Wien, VII 139—220, 7 Tf. — Betrachtet die Anisopoden als verwandt mit den Isopoden sowohl als mit den Cumaceen. Eine ein-gehende morph. Unters. von Apseudes wird geliefert.

— (6) Ueber Lernaescus nematoxys, eine seither unbekannt gebliebene Lernaea. Anz. Ak. Wien, 1886, 231—3. — Morph. Be-schreib.; parasitisch unter den Schuppen von Solea monochir.

Cornish, F. Livid Swimming Crab at Penzance. Zoologist (3) XI 309. — Bindeglied zw. Portunus marmoreus u. holsatus, welche wahrsch. identisch.

Cunningham, J. T. [Vergl. Vallentin, R.].

Czerniawsky, V. Monographia Mysidarum, imprimis Imperii Rossici, I: Trudui St. Petersburg obshtchestva estestvoes pytatelei XII (1882) 170 S.; II: ebd. XIII (1882) 85 S., Tf. 1—4; III: ebd. XVIII (1887) 102 S., Tf. 5—32. — Meistens lateinisch. Ein Index zu allen 3 Theilen im 3. Th., dieser Th. ist ein Verzeichniss aller bekannten Genera u. Sp. Die neuen Gen. u. Sp. aus den ersten Theilen werden in diesem Berichte unten nachgeholt werden.

Delage, L. Sur une fonct. nouv. des Otocystes comme organes d'orientation locomotrice. Arch. zool. exp. (2) V 1—26. — Vgl. Ber. 1885/86 S. 328. Die Exper. wurden an Schizopoden u. Dekapoden an-gestellt.

Dollfus, A. Diagn. d'esp. nouv. et catalogue des esp. françaises

S*

de la tribu des Armadillidiens (Crust. isop. terr.). Bull. soc. d'études scient. de Paris, IX, 7 S.

Engelmann, T. W. Ueb. d. Function der Otolithen. Zool. Anz. X 439—444. — Discussion u. Erweiterung von Delage's Ansicht (s. Ber. 85/6 S. 328).

Fickert. Ueb. das Zusammenvorkommen von Apus u. Branchipus. Naturforscher XX, S. 5, 6.

Fischer, P. Descr. d'un nouv. g. de Cirrhipedes (*Stephanolepas*) parasite des tortues marines. Actes soc. Linn. de Bordeaux (4) X, 193—6, Tf. 4. — Auf Chel. imbr.; Zwischenform von *Platylepas* u. *Tubicinella*.

G. H. Fowler, Crustacea in: The Zoological Record for 1886, London, 8^o. 44 S.

— Bericht über Carcinologie während 1885/6. Arch. f. Naturg., Jg. 53, II S. 320—87. (Uebers. von Hilgendorf.)

Fredericq, L. L'autotomie chez les étoiles de mer. Rev. scient. XL 589—592. (Vergl. Giard, ebd. 629). — Aufzählung der Erwähnungen hierüber bei verschiedenen Gruppen.

Garbini, A. Contribuzione all' anat. ed alla istol. delle Cypridinae. Bull. soc. ent. ital. XIX 35—51, 5 Tf. — Beob. Cypridina mediterranea von Triest. Antennula: Die 2 Saugnapf-Formen beschr.; in der Basis, dicht am Cerebralganglion grosses Ganglion für die Sinneshaare. Verdauungsapp.: In der Oberlippe viele schlauchf. Drüsen ohne Ausführg. und 2 grössere, in d. Oesoph. mündende Braun'sche Speicheldrüsen. Leberschläuche mangeln dem Mitteldarm ganz, die 2 von Claus u. Huxley angegebenen sind keine solche, wie ihr Vorkommen bei *Pagurus* neben den Lebschl. zeigt. Nervensystem: Hinter d. infraoes. Ganglion noch 2 Bauchg. Sinnesorg.: Nur Frontalorg. u. Medianauge beschr. Geschlechtsorg.: Am Penis die scherenf. „Geschlechtstatzen“ (*Zampe sessuali*) beim ♂, beim ♀ kleiner, mit 2 ovalen Drüsen voll nadelf. Krystalle. Methode: Sublimat.

Giard, A. [Vergl. Fredericq.].

— (1) Sur la castration parasitaire chez l'*Eupagurus bernhardus* (L.) et chez la *Gebia stellata* (Mont.). C. rend. CIV 1113—5. — Einwirkungen ähnlich, wie sie vom Parasitismus der Rhizocephalen Parasiten früher beschrieben wurden, entstehen auch durch den von Phryxus u. Gyge.

— (2) La castr. paras. et son influence sur les caractères extér. du sexe male chez les Crust. Décap. Bull. scient. France Belg. (2) X 1—28, 7 Xyl.; Uebers.: Ann. Mg. N. H. (5) XIX 325; Ausz.: Naturforscher XX 367—9. — Allg. Discussion der vom Vf. anderweitig beschriebenen Fakten.

— (3) Sur un Copépode (*Cancerilla tubulata* Dal.), parasite de l'*Amphiura squam.* (Delle Chi.). C. rend. CIV 1189—92.

— (4) Fragments biologiques, VIII. Sur les *Danalia*, genre de

cryptonisciens parasites des Sacculines. Bull. scient. Fr. Belg. (2) X 47—53.

— (5) Sur les parasites Bopyriens et la castr. paras. C. rend. soc. biol. (8) IV 371—3.

— (6) et Bonnier, J. Sur la phylogénie der Bopyriens. C. rend. CIV 1309—11. — Die Larvenformen u. Phylogénie der Bopyriden und ihre biolog. und phylogenet. Bezieh. zu Decapoden und Rhizocephalen.

— (7) et —. Contributions à l'étude des Bopyriens. Tr. Inst. Zool. Lille V, 272 S., 10 Tf.; Ausz.: Bull. scientif. IX 122. — Diese Monographie behandelt sehr ausführlich die Morphol., Embryol. und Biol. von Cepen und dessen Verwandten (S. 7—78) und der Entonisci (79—247). Die interessanten Schlüsse betreffs der Beziehungen des Parasiten zum Wirth und zu andern Parasiten, über die Castration, welche er bewirkt, üb. Dimorphismus und Hermaphroditismus bei einigen Formen, die eine Parallele zu den Cirripeden bilden, sind zu lang, um hier wiedergegeben zu werden.

Giles, G. M. On six new Amphipods from the Bay of Bengal. J. As. Soc. Beng. LVI 212—229, Tf. 3—8.

Gourret, P. (1) Sur quelques Crustacés parasites des Phallusies. C. rend. CIV 185—7.

— (2) Sur quelques Décapodes macroures nouveaux du golfe de Marseille. Ebd. CV 1033—5.

— (3) La faune der Crust. podophth. du golfe de Marseille. Ebd. 1132—5.

Grobben, C. Die grüne Drüse des Flusskrebsses. Arch. f. mikr. Anat. XXX 323—6. — Vertheidigung gegen Rawitz.

Groszlik, S. Schizocöl oder Enterocöl? Zool. Anz. X 116—8. — Betrifft Nusbaum's abweich. Angaben über das Mesoderm von Oniscus.

De Guerne, J. (1) Sur q. Amphipodes marins du Nord de la France. Bull. soc. z. France, XI. Proc. verb. XLII—XLIV. — Liste der Arten.

— (2) Sur les genres Ectinosoma Boeck et Podon Lilljeborg, à propos de deux Entomostracés (Ect. atlant. Br. et Rob., P. minutus G. O. Sars), trouvés à la Corogne dans l'estomac des Sardines. Ebd. XII 341—367, 1 Tf. — Abb. u. ausf. Beschr. der 2 Sp. nebst e. Discussion üb. Verbreit. u. Wanderung der Polyphemidae.

Gundlach, J. Apuntes para la fauna Puerto-Riquena; VI, Crustáceos. Anales soc. Esp. hist. nat. (Madrid) XVI 115—136. — Speciesliste, keine n. Sp.

Hamann, O. Die Urkeimzellen (Ureier) im Thierreich u. ihre Bedeutung. Jen. Zeitschr. f. Natw. XXI 517—538. — [Crust., S. 524.]

Henderson, J. R. The Decapod and Schizopod Crustacea of the Firth of Clyde. Pr. n. h. soc. Glasgow (n. s.) I 315—353. — Liste der Sp. u. Localitäten; ein n. Subg. (von Spiropagurus).

Hensen, V. Ueb. d. Bestimmung des Plankton's oder des im Meere treibenden Materials an Pflanzen und Thieren. Ber. Komm. wiss. Unters. deutsch. Meere, V 1—109, Tf. 1—6. — Crust. 45—57; Beob. üb. Zahlenverhältn., Gewicht etc. in e. bestimmten Wasserkquantum; üb. Laichzeiten etc.

Herrick, C. L. (1) The Metamorphosis and Morphology of certain Phyllopod Crustacea. Bull. sc. lab. Denison Univ. I (1885) Tf. 5—8, 10.

— (2) Mud-inhabiting Crustacea. Ebd. 37—42, Tf. 9 (1885).

— (3) Contribut. to the Fauna of the Gulf of Mexico and the South. List of the Freshwater and Marine Crustacea of Alabama. Mem. Denison Ass. I 56 S., 7 Tf.

Hoeck, P. P. C. (1) On *Dichelaspis pellucida* Darw. from the Scales of an Hydroid obtained at Mergui. J. Linn. Soc. XXI 154—5, Tf. 13. — Kleine Abweich. vom Orig.-Expl.

[Hoeck, P. P. C.]. (2) Crustacea Neerlandica. Nieuwe lijst van tot de fauna van Nederland behoorende schaaldieren. Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (2) I 93—105, Tf. 7. — Abb. von *Mysis kervillei*.

Howes, G. B. An abnormal *Palinurus*. Pr. Z. Soc. Lond., 1887, 468—70, Xyl. — Besch. u. Abb. des antennenförmigen Ophthalmits, der urspr. von A. Milne-Edwards beschrieben wurde.

Imhof, O. E. (1) On the Microscopic Fauna of Elevated Alpine Lakes (600—2780 m.). Ann. Mg. N. H. (5) XIX 276—286 u. Zool. Anz. X 13—17, 33—42. — Allg. Schlüsse üb. die Verbreitung der Crustaceen S. 285—6.

— (2) Studien über die Fauna hochalpiner Seen, insbes. des Kantons Graubünden. J. B. Ges. Graub. XXX 45—164. — Crust. S. 130; Bem. üb. die „blassen Kolben“ der Calanidae S. 138.

— (3) Notizen üb. die pelag. Fauna der Süßwasserbecken. Zool. Anz. X 577—582. — Allg. Schlüsse u. Beob. üb. die Ephippien der Phyllopoden etc.

Ischikawa, C. [Siehe Weismann].

Kellicot, D. S. A note on *Argulus catostomi*. Pr. Amer. Micr. Soc. IX 144.

Kingsley, J. S. (1) The development of *Crangon vulgaris*. Bull. Essex Inst. XVIII 99—153. — Eingehende Darstellung der Stadien bis zum Ausschlüpfen. Taf. 1, 2.

[Kingsley, J. S.]. (2) The devel. of the Compound Eyes of *Crangon*. Journ. of Morph. (Boston) I 49—66, 1 Tf. — Vorl. Mitth. u. die hauptsächl. Schlüsse s. Ber. 85/6 S. 338.

Kirk, T. W. On a new species of *Alpheus*. Tr. New Zeal. Inst. XIX 194—6, Tf. VI D.

Köhler, R. (1) Sur la structure des fibres musculaires chez les Crustacés édriophthalmes. C. rend. CIV 592—5. Die ausf. Bearb. in: J. de l'Anat. Phys. XXIII 113—123, Tf. 11. — Beschäftigt sich mit einigen Amphip. u. Isopoden.

— (2) Rech. sur la structure du cerveau du *Gammarus pulex*. Monthly Intern. J. Anat. Hist. IV 21—36, Tf. 1.

— (3) Rech. sur la struct. du cerveau de la *Mysis flexuosa*. Ann. Soc. Nat. III 159—188, 2 Tf.

Krause, Arth. Einige Crust. u. Würmer aus der Ostsee (Rügen). S. B. natf. Freunde, Berlin, 1887, 34—36.

Krukenberg, C. Fr. W. Fortgesetzte Unters. zur vergl. Muskelphysiologie. Vergl.-physiol. Studien, 2. Reihe, 4. Abth., S. 143—171. — Behandelt das ungleiche Verhalten der unsymmetr. Scheren von *Gelasimus*, *Ocypode*, *Alpheus*, *Pagurus*. Der Muskel der grössern Schere ist reicher an jungen (schmalern) Fasern, welche feinere Querstreifung zeigen und keine Verästelungen bieten. Die Muskelzunahme daher durch Hyperplasie (nicht Hypertrophie) bedingt. Die Zeichn. (Tf. II) nur makroskop. Darst. der Thiere.

Lahille, F. Les Crust. Branchiopodes de Toulouse. Bull. Soc. H. Nat. Toulouse, Proc. verb. XLVII—XLVIII.

Landois, H. Lebende blaue u. rothe Flusskrebse, *Astacus fluv.* J. B. westf. Ver. XV 16, 17. In Westfalen auf kalkhaltigem Grunde häufig blaue Krebse. [Expl. auf einer Seite blau, auf der Gegens. braun vom Ref. beob.]

Léger, M. Obs. sur une pince monstrueuse d'*Astacus fluv.* Bull. Soc. Philom. (7) XI 112—6.

Leichmann, G. Ueb. Bildung von Richtungskörpern bei Iso-poden. Zool. Anz. X 533—4. — Beim Ei von *Asellus aq.* ist ein Nucleus durchgehends vorhanden, u. 2 Polkörper werden ausgestossen.

Lovett, E. Notes and observ. on British Stalk-Eyed Crustacea. Zoologist (3) XI 145—151. — Bem. üb. Lebensweise, Verbreitung etc.

Lucas, H. (1) Sur le *Cecrops latreillei*. Ann. Soc. ent. Fr. (6) VII (Bull.) XXXI—XXXII.

— (2) Sur le *Sphaerifer cornutus* Rich. Ebd. LI.

Lucas, A. S. H. Note on the Habits of Hermit Crabs. Tr. R. Soc. Victoria XXII 61—63. — *Clibanarius* reißt eine *Fasciolaria* heraus u. occupirt deren Schale.

Lütken, C. F. Tillaeg til „Bidrag til Kundskab om Arterne af Slaegten *Cyamus* Latr.“ Dan. Vid. Selsk. Skr. (6) IV 316—22, 1 Tf. — Beschr. u. Abb. von *C. scammoni*; Ausz. in Französisch.

Mackay, W. J. The intercoxal lobe of certain Crayfishes Pr. Linn. Soc. N. S. W. (2) II 966—7.

De Man, J. G. (1) Report on the Podophthalmous Crustacea of the Mergui Archipelago, coll. for the Indian Mus. by Dr. J. Anderson. I, II. J. Linn. Soc., London, XXII 1—128, Tf. 1—8. — Enthält einen Theil der Brachyuren, worunter eine Zahl neuer Sp.; diese wie auch manche bekannte beschr. u. abgebildet. Die Liste der erbeuteten Sp. auf S. 5, Aufzählung der sonstigen, von der Bay von Bengalen schon bekannten Arten S. 7.

— (2) Uebers. der indo-pacif. Arten der Gatt. *Sesarma* Say, nebst e. Kritik der von Hess und Nauck 1865 u. 1880 beschr. Decapoden. Zool. Jahrbücher II 639—722, Tf. 17. — 11 n. sp. von *Sesarma* u. 1 v. *Eupagurus* beschr.; 13 der von Hess u. 4 der von Nauck aufgestellten Arten werden als schon früher beschrieben eingezogen.

— (3) Bericht üb. die von J. Brock im Indischen Archipel gesamm. Decapoden u. Stomatop. Arch. für Natg. 1887 I 215—285, Tf. 7—10. — Der 1. Theil der Arbeit, der die Cancridae behandelt. Nur die neuen Sp. sind unten berücksichtigt.

Marchal, P. Sur l'excrétion chez les Crustacés décap. brachyours. C. rend. CV 1130—2. — Excretionsdrüse von *Maja squina*.

Marshall, C. F. Obs. on the Structure and Distrib. of Striped and Unstr. Muscle in the Animal Kingdom, and a Theory of Musc. Contraction. Q. J. Micr. Sc. XXVIII 75—107, Tf. 6. — Crustacea S. 89.

Matthews, J. D. *Aega crenulata* Ltk. Ann. Mg. N. H. (5) XX 445. — Neu f. Brit. See, bei Stonehaven auf einem Hai.

May, K. Ueb. das Geruchsvermögen der Krebse nebst einer Hypothese üb. die analyt. Thätigkeit der Riechhärchen. Kiel 1887, 8°. 39 S., 1 Tf. — Unters. *Carc. maenas*, *Palaemon squilla*, *Mysis flex.*; Ehrlich's biolog. Methylenblaufärbung giebt sichere Resultate für die Nerventheile der Riechhaare. Nur der Basalthheil der letzteren enthält Nervensubstanz (gestreifte), die Spitze aber Riechgallerte. Vor dem Eintritt in das Riechhaar durchsetzt der Nerv unter Auflösung in Fibrillen einen Leydig's Ganglion ähnlichen „Sack“, beim Verlassen des Sacks schliessen d. Fibr. wieder zusammen. Säuren und in Wasser lösl. Riechstoffe, besonders H_2S , bewirken Gerinnung der Riechgallerte und histol. Veränd. am Sack. Hensen führt aus, wie eine Vermehrung der Riechhaare nicht nur die Intensität der Empfind. steigern, sondern auch die Analyse der Riechstoffe verschärfen kann. Es wird auch der Wechsel der Riechhaare (ohne Spitzenöffnung) u. die Anatomie der Tastnerven des Fühlers berührt.

Mercanti, F. Sur le développ. postembr. de la *Telphusa fluvi.* Arch. Ital. Biol. VIII 58—65. — Nur franz. Uebers. (ohne Tafel) der früheren Arbeit (Ber. 1885 S. 342).

Miani, I. Di alcuni Crostacei Isopodi terrestri osservati nel Veneto. Atti Soc. Ven.-Trent. sc. nat., Padova, XI 11—16.

Miers, E. J. Crustacea from the Channel Islands. Zoologist (3) XI 443—4. — Liste der dem Brit. N. H. Museum geschenkten Sp.

Milne-Edwards, A. Observ. sur les Crabes des Eaux Douces de l'Afrique. Ann. Sc. nat. (7) IV 121—149, Taf. 7—9; Abdr. in: Bibl. haut. études XXXIII, 29 S., 3 Tf. — Ueb. versch. *Telphusidae*.

M'Intosh, W. C. The Pelagic Fauna of our shores in relation to the Nourishment of Young Food-Fishes. Ann. Mg. N. H. (5) XIX 137—145. — Crust. S. 144—5.

Möbius, K. (1) System. Darst. der Thiere des Plankton, gewonnen in der westl. Ostsee u. auf e. Fahrt in den atlant. Ocean. Bericht

Komm. wiss. Unters. deutsch. Meere V 109—126, Tf. 7, 8, — Crust. S. 113—6, mit Abb. der Amphion-Larve von e. Dekapoden.

— (2) Wahlvermögen der thierischen Instinkte. Sitzb. Ges. natf. Fr., Berlin, 87, S. 192—3. — Betrifft Brock's Notiz über abnorme Wohnung von (Glasflaschen) Pagurus (in Spengel's Zool. Jahrb. II, 980).

Moniez, R. (1) Sur des parasites nouveaux des Daphnies. C. rend. CIV 183—5. — Amoebidium u. mehrere Psorospermien.

— (2) Liste des Copépodes, Ostracodes, Cladocères et de q. autres Crust. rec. à Lille en 1886. Bull. Soc. Z. Fr. XII 508—18. — Nur Artenliste.

Müller, F. Zur Crustaceen-Fauna von Trincomali. Verh. Ges. Basel, VIII 470—485, Tf. 4, 5. — Mit n. Sp. von Brachyuren und Stomatopoden.

Nassonow, N. B. Zur Entwicklgesch. der Krebsformen Balanus und Artemia. Iswest. imper. obschtschestwa jubit. Estest. Antrop. Mosk. Univ. LII 1—14. — Russisch. Vom Ref. nicht gesehen.

Nordqvist, O. Die pelagische Tiefsee-Fauna der grösseren finnischen Seen. Zool. Anz. X 339—45, 358—62. — Mit Bem. üb. Verbreit. u. Ursprung der Fauna.

Norman, A. M. On some Crustacea new to the British seas. Ann. Mg. N. H. (5) XIX 89—103; auch in: 4. Ann. Rep. Fish. B. Scotland S. 155—166 (1886). — Haupts. Schizop. und Cumaceen; Siriella sp. n.

Nusbaum, J. L'Embryologie de Mysis chamaeleo. Arch. Zool. exp. (2) V 122—202, Tf. 5—12. Auch in: Zapiski Novoross. Obsch. Estest. XII 149—236, 8 Tf.; Kosmos, Lemberg, XII 267—334, 8 Tf. Vorlf. Notiz in Biol. Centbl. VI 663—7, 2 Xyl. — Segmentation meroblastisch; Hypoblast durch Delamination gebildet; Dorsalorgan als Homologon der Embryonalmembranen der Insekten betrachtet; Entw. des Nervensystems wie bei Astacus; Herz nicht von einem Theil der zwischen Splanchno- u. Somatopleura befindl. Höhle gebildet, sondern von e. Theil der Höhle zw. Epiblast u. Somatopleura.

Nussbaum, M. Ueber die Lebensfähigkeit eingekapselter Organismen. Zool. Anz. X 173—4. — Widerstand der Daphnia-Embryonen gegen die Nematocysten u. den Verdauungssaft von Hydra.

Osborne, H. L. Elementary Histological Studies of the Crayfish Amer. Micr. I. VIII 81—7, 101—5, 121—5, 149—52, 167—9, 181—5, 201—3.

Ozorio, B. Liste des Crustacés des possessions Portugaises d'Afrique occidentale dans les coll. du Mus. d'Hist. Nat. de Lisbonne. Jorn. Sci. Lisboa XI 220—231. — Liste der Expl. nebst Beschr. von 5 n. Sp. von Brachyuren. Nur die letzteren unten berücksichtigt.

Packard, A. S. The Cave Fauna of North America, with remarks on the Anatomy and Origin of Blind Forms. Amer. Nat. XXI 82—3. — Ausz. aus e. Abh., welche vor der Nation. Ac. Sc. (Wash.) gelesen.

Parize, P. L'Amputation réflexe des pattes des crustacés. Rev. scient. XXXVIII 379, u. Bull. scient. Fr. et Belg. (2) IX 306—8.

Parker, F. J., Remarks on *Palinurus lalandii* M. E. and *P. edwardsii* Hutt. Tr. New Zeal. Inst. XIX 150—5.

Pfeffer, G. (1) Beitr. zur Morphologie der Dekapoden u. Isopoden. Abh. Natw. Ges. Hamburg X, 10 S.

— (2) Zoologische Kleinigkeiten, XVII. Ueb. d. Bedeut. des Wortes „Krabbe“. Verh. Ver. natw. Unth. Hamburg, VI 126—8.

Pocock, R. I. Report on the Crustacea coll. by the „Flying-Fish“ on Christmas-Isl. Pr. Zool. S., London, 1887, 520.

Poppe, S. A. [Vergl. Zacharias (1)].

Rank, O. F. Der Flusskrebs, seine Beschreibung u. Zucht. Bibliothek für Naturfreunde, Nr. 3, 1887, 19 S.

Rathbun, R. Descr. of Parasitic Copepoda belonging to *Pandarus* and *Chondracanthus*. Pr. U. S. Nation. Mus. IX 310—24, Tf. 5—11. — 4 n. Sp.

Rawitz, B. Ueb. d. grüne Drüse des Flusskrebses. Arch. f. mikr. Anat. XXIX 471—94, Tf. 28, 29, u. ebd. XXXI 98, 99. — Histol. Studie, Controverse mit Grobben.

Reinhard, W. Sur le développement de *Porcellio scaber*. Trudui Kharkoff Univ. XX 91—6; Notiz in: Zool. Anz. X 9—13. Die Produkte der Segmentation sind amöboid u. wandern an die Oberfläche des Eies, um das Epiblast zu bilden; das Mesenteron wird als selbständige Bildung vom Hypoblast angelegt. Die Beob. widersprechen den von Nusbaum u. Bobretsky an *Oniscus* gemachten.

Report (First) on the Marine Fauna of the South-West of Ireland. Pr. R. Irish Ac. (2) IV 599—638. — Crust. S. 632—8.

Richard, J. (1) Sur la faune pelagique de quelques lacs d'Auvergne. C. rend. CV 951—3.

— (2) De la récolte et la conservation des Entomostracés d'eau douce, Cladocères et Copépodes. Feuilles des jeunes naturalistes (Paris) XVII.

— (3) Liste des Cladocères et des Copépodes d'eau douce observés en France. Bull. Soc. Zool. Fr. XII 156—164. — Mit 2 n. Var. von Cyclops.

Ruijs, J. M. Zoologische Bijdragen tot de Kennis der Karazee. I. Inleiding en algemeene mededeelingen. Bijdr. Dierk. (Amsterdam) XIII 1—38. — Liste der Crust. S. 28.

Sars, G. O. (1) Nye Bidrag til Kundskaben om Middelhavets Invertebratfauna. Arch. Math. Naturv. XII 173—324, Tf. 1—20. — Viele neue u. alte Mittelmeerspecies.

— (2) On *Cyclestheria hislopi* (Baird), a new Generic Type of Bivalve Phyllopoda raised from dried Australian Mud. Forh. Vidensk.-Selsk. Christiania 1887, 65 S., 8 Tf. — Eingehende morph. u. physiol. Studie.

Seneschall, R. Le. Contr. à l'Étude de la faune Normandie. Bull. Soc. Linn. de Normandie, 37, X, 219—221.

Schedel, J. Die Schutzfärbung der Thiere (mit Berücks. der Fauna der Ost-See). Zool. Gart. 1887, 140—5. — Crust. S. 143.

Schiemkewitsch, W. Des caractères spécifiques et de la distr. géogr. du genre *Astacus*. Isv. ob. lioub. iest., T. L. fasc. 1, S. 9. Ausz. in: Arch. slaves biol. III 268—272. — Erkennt 3 gute Sp. an, welche 3 Regionen charakterisiren, mit 3 Varietäten und Subregionen.

Schneider, R. (1) Ein bleicher Asellus in den Gruben von Freiberg im Erzgebirge. Sitzb. Ak. Wiss. Berlin, 87, 723—42, Tf. 13. — *As. aquat. var. freibergensis* in manchen Bezieh. eine Mittelstufe zwischen der typischen Form u. *A. cavaticus*; Tabelle der Unterschiede etc. S. 741; Auge sehr reducirt; Eisenoxyd in den Kalkconcretionen.

— (2) Amphibisches Leben in den Rhizomorphen bei Burgk. Ebd. 1886, S. 883—900, Tf. 7. — Behandelt *subterrane Canthocamptus minutus var. (Abb.)*, *Cyclops fimbriatus var. (Abb.)*, *Gammarus puteanus*.

Schneider, A. Ueber den Darmcanal der Arthropoden. Zool. Beitr. II, 82—96, Tf. 8—10. — Haupts. Insekten behandelnd, aber auch Crust. berücksichtigt.

Scott, T. Natural History from Tarbert. Pr. N. H. Soc. Glasgow, (n. s.) I 369—78. — Liste der Crust. mit einer provisor. n. Sp.

Selys-Longchamps, E. de. Note sur deux Crust. Entomostracés de Belgique. C. rend. ent. Belg. (3) 1887, S. LIV—LV. — *Apus cancrif. neu* (u. 1. bekannter *Phyllopo*) für Belgien; *Argulus* in B. nicht selten. Ob *Caridina* in Belgien (cf. Pelseneer 86), (nach Preudh. de Borre) zweifelhaft.

Stebbing, T. R. R. On some new Exotic Amphipoda from Singapore and New Zealand. Tr. Zool. Soc. London, XII 199—210, Tf. 38—39. — Die 3 n. Arten der vorl. Mitth. betreffend. (Vergl. Ber. 1885/6 S. 353.)

Sye, C. G. Beitr. z. Anat. u. Hist. von *Jaera marina*. Inaug. Diss. Univ. Kiel, 37 S., 3 Tf. Kiel, 1887. 8°.

Terfve, O. Rech. sur la spermatogénèse chez *Asellus aquaticus*. Bruxelles, 1887, 8°. 27 S., 3 Tf. (Nicht vom Ref. gesehen.)

Thomson, G. M. u. Chilton, C. Critical List of the Crustacea Malacostraca of New Zealand. Trans. N. Zeal. Inst. XVIII 141—159.

Thompson, I. C. On some Copepoda new to Britain found in Liverpool Bay. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1887, 734—5.

Underwood, L. M. List of the Descr. Sp. of Freshwater Crustacea from America, North of Mexico. Bull. Illin. Lab. N. H. II 323—386.

Vallentin, R. u. Cunningham, J. T. The Photospheria of

T*

Nyctiphanes norvegica G. O. Sars. Q. Journ. Micr. Sc. XXVIII 319 bis 341, Tf. 23. — Vf. weicht von Sars ab bezügl. des lichtproducirenden Theils des Leuchtorgans der Schizopoden.

De Varigny, H. Rech. expérimentales sur les fonctions du coeur chez le *Carcinus maenas*. Journ. de l'Anat. Phys. XXIII 660 bis 672, 8 Xyl. (Curven); Ausz.: C. rend. Soc. Biol. (8) IV 34—6.

Viallanes, H. (1) Et. histol. et organologiques sur les centres nerveux et les organes des sens der animaux articulés, V. Ann. sc. nat. (7) IV 1—120, Tf. 1—6. — Die 2. Abth. der Arbeit giebt eine „Vergleichung des Gehirns der Insekten u. Crust.“ (S. 98—109), die 3. behandelt das Gehirn u. die Morphol. des Kopfskeletts (S. 111—8).

— (2) La morph. comp. du cerveau des Insectes et des Crust. C. rend. Ac. CIV 444—7. — Die Supraoesophageal-Ganglien lassen sich bei beiden in 3 Regionen theilen, nämlich die für Innervirung der Augen, der Antennulae u. der Antennae bei den Crust., der Augen, Antennen u. des Labrum bei den Insekten. Vf. hält sie für homolog.

— (3) La morphol. du squelette céphalique des Insectes. Bull. Soc. Philom. (7) X 84—6 (1886).

Walker, A. O. Notes on a Coll. of Crustacea from Singapore. J. Linn. Soc. London XX 107—117, Tf. 6—9. — Liste der erhaltenen Crust.; Beschr. u. Abb. von 6 n. Sp., auch Abb. einiger bekannter Arten.

Walter, A. Vorl. Diagnose u. Beschr. zweier neuer Branchiopoden aus Transkaspien. Bull. S. imp. Nat. Moscou, 1887, 924—7.

Weismann, A. u. Ischikawa, C. Ueber die Bildung der Richtungskörper bei thierischen Eiern. Ber. natf. Ges. Freiburg (i. Br.) III 1—44, Tf. 1—4. — Polkörper bei parthenogen. Eiern von Phyllop. u. Ostracoden. Vergl. Ber. 85/6, S. 356.

Weithofer, A. Bem. üb. eine fossile Scalpulum-Art . . . , sowie üb. Cirrhipeden im Allgemeinen. J.-B. k. k. geol. Reichsanst. XXXVII 371—86, Tf. 15. — Mit Bem. üb. die phylogenet. u. stratigraphischen Beziehungen der versch. Cirrhipeden-Gattungen.

Weltner, W. Die von Dr. Sander 1883—5 ges. Cirrhipeden (*Acasta scuticosta* sp. n.). Arch. f. Natg. 1887, I 98—117, Tf. 3, 4. — Schlüssel zu den Sp. der Gatt. *Acasta*, S. 114—5.

Wierzejsky, A. Krajowych Skorvpiakach z rodziny Calanidae (die einheimischen Calanidae). Rozpraw Wydz. matem.-przyr. Akad. Umiej. XVI, 13 S., 1 Tf.

Wood-Mason, J. Descr. of a new sp. of Crustacea belonging to the Raninidae. Journ. As. S. Bengal LVI 206—9, Tf. 1.

Wright, J. M'N. Fiddler-crabs. Am. Natur. XXI 415—8. — Gewohnheiten etc. von *Gelasimus*.

Zacharias, O. (1) Zur Kenntniss der pelag. u. littoralen Fauna Norddeutscher Seen. Z. wiss. Zool. XLV 255—81, Tf. 15. — Crust. S. 257—66. Anhang von S. A. Poppe, welcher 1 sp. n. u. 2 n. Var. behandelt, Abb. von Schnitten und einigen bekannten Formen. —

- (2) Zur Kenntn. der Fauna des süßen und salzigen Sees bei Halle a/S. Ebd. XLVI 217—32. (Crust. S. 225—7.)
 — (3) Faunistische Studien in westpreuss. Seen. Neue Schr. natf. Ges. Danzig (2) VI, 4. Th., 43—72, Tf. 1. — Entomostr. S. 46—56, Notizen u. Abb. betreff. n. Var. von *Hyalodaphnia* u. *Bosmina*.
 — (4) Zur Entomostraken-Fauna der Umgebung von Berlin; Biol. Centralbl. VII 137—9.
 — (5) Zur K. der Entomostr.-F. holsteinischer und mecklenburg. Seen. Zool. Anz. X 189—193.

II. Uebersicht nach dem Stoff.

(Systematik siehe unter III.)

Anatomie und Physiologie.

Allgemeine Anatomie:

<i>Apsoudes</i> , Claus (¹ , ²).	<i>Jaera</i> , Sye.
<i>Lernaeascus</i> , Claus (²).	<i>Cyclestheria</i> , Sars (²).
<i>Bopyridae</i> , Giard (¹).	

Nervensystem und Sinnesorgane;

Viallanes (¹ , ²).	Brandt.
Beddard.	May.
Koehler (² , ³).	Packard (²).

Embryologie, Metamorphose und Larvenformen:

Spermatogenesis, Terfve.	<i>Crangon</i> , Kingsley (¹ , ²).
Polkörper, Weismann, Leichmann.	<i>Decapoda</i> , Möbius.
Urkeimzellen, Hamann.	<i>Porcellio</i> , Reinhard.
<i>Mysis</i> , Nusbaum.	<i>Telphusa</i> , Mercanti.
<i>Phyllopoda</i> , Herrick (¹).	<i>Acellus</i> , Claus (²).
	<i>Balanus</i> u. <i>Artemia</i> , Nassonow.

Physiologie:

Funktion der Otocysten, Delage, Engelmann.	Excretion, Marchal.
Herz (<i>Carcinus</i>), de Varigny (¹ , ²).	Geruchssinn, May.
Darm und Anhänge, Cattaneo.	Nerven (<i>Isop.</i>) E. Brandt.
	Nerven und Muskel, Biedermann.

Histologie:

Grüne Drüse, Grobben, Rawitz.	Darm und Anhänge, Cattaneo,
Muskelfaser, Koehler (¹), Marshall, Krukenberg.	Schneider, A.
Nervensystem, Viallanes (¹ , ²).	Gesammte (<i>Astacus</i>), Osborne.

Miscellanea:

Reproduktion verlorener Theile, Brook.	Castration, Giard (¹ , ²).
Albinismus, Cameron.	Höhlenformen, Packard (¹).
Abnormitäten, Léger, Howes.	Schneider, R.
Phosphorescenz, Vallentin.	Schutzfärbung, Schedel.
Autotomie, Fredericq (¹), Parize.	Instinkt, Möbius (²), Brock.

Geographische Verbreitung.

Meeresfaunen.

Allgemeines:

Verbreitung von *Palaemonetes*,
Barrois (²).
Samml. des „Prinz Adalbert“,
Weltner.

Arct. und antarct. *Hyperidae*,
Bovallius (²).

Arktisches Meer:

Kara-Meer, Ruijs.

Grönland, Hansen.

Atlantischer Ocean.

Tromsø, Aurivillius.
Ostsee, Hensen, Krause (¹), Mö-
bius, Schedel.
Firth of Clyde, Henderson.
Britannien, Normann.
Tarbert (Schottl.), Scott.
Liverpool-Bay, Thompson.
Irland (S.-W.), Report on Fauna.
Canal-L, Miers.
Holland, Hoek (²).
Frankreich, de Guerne.

Brétagne, (*Amphip.*), Chevreux (^{1, 2, 3}).
Concarneau, Bonnier.
Marseille, Gourret.
Boulogne (*Amphip.*), Barrois (¹).
Lille, Moniez (²).
Spanien, de Buen.
Mittelmeer, Sars (¹).
Russland, (*Mysidae*), Czerniawsky.
Afrika, Ozorio.
Puerto Riqueña, Gundlach.

Indo-pacifische Region:

Decapoda, de Man (^{2, 3}).
Mergui-Arch., de Man (¹).
Trinkomali, Müller.
Singapore, Walker, Stebbing.

Bay von Bengalen, Giles.
Neuseeland, Parker, Stebbing,
Thomson.

Land- und Süßwasser-Faunen.

Allgemeines.

Verbreitung von *Astacus*, Schiemkewitsch.

Europa:

Finland, Nordqvist (¹).
Polen, (*Copepoda*), Wierzejsky.
Deutschland, Zacharias (^{1, 2, 4, 5}),
Imhof (³).
Halle, Zacharias (²).
Belgien (*Entomotr.*), de Selys
Longchamps.

Alpen-Seen, Imhof (^{1, 2}).
Frankreich, Richard (²); (*Arma-*
dill), Dollfus.
Auvergne, Richard (¹).
Venetien (*Isop.*), Miani.

Afrika:

Decapoda, Milne-Edwards.

Amerika:

Underwood.

III. Systematik.

NB! Die neuen Arten sind durch *cursiven* Druck gekennzeichnet.

Decapoda.

Larvenformen, Möbius. — Physiol. des Herzens (Brachyura), de Varrigny (¹, ²).

Inachidae. *Doclea hybrida* (Fabr.) von Mergui, beschr., de Man (¹), S. 9; *andersoni* ebd., S. 11; sp. indet., ebd., S. 18. — *D. tetraptera*, Walker, S. 114.

Majadae. *Maja miersii*, Walker, S. 113.

Micropisa bocagei, Ozorio, S. 223.

Hyastenus hilgendorfi, de Man (¹), S. 14; pleione Hb., ebd., S. 18; *H. brockii*, de Man (²), S. 221.

Naxia (*Naxioides*) *petersii* (Hilg.), de Man (¹), S. 19.

Schizophrys aspera, ebd., S. 20.

Micippa haanii, ebd., S. 20.

Periczeridae.

Parthenopidae. *Lambrus longimanus*, de Man (¹), S. 21.

Harrovia elegans, ebd., S. 21.

Canoridae. *Liomera guttata* u. *semigranosa*, de Man (²), S. 239.

Carpilodes stimpsoni, de Man (¹), S. 25. — *C. striatus*, de Man (²), S. 232.

Atergatis integerrimus u. *floridus*, von Mergui; de Man (¹), S. 24.

Lophactaea maculata; de Man (²), S. 250.

Actumnus setifer (de H.), *elegans*, nudus, de Man (¹), S. 47, 49.

Actaea areolata, rufopunctata, parvula, sp. indet.; ebd., S. 25, 26, 27, 29.

Euxanthus mamillatus; ebd., S. 30.

Actaeodes sundaisicus, modestus; de Man (²), 253, 257.

Lophozozymus simplex, ebd., S. 271.

Xantho impressus; de Man (¹), S. 30. — *X. scaberrimus*, Walker, S. 115

Medaeus distinguendus, de Man (¹), S. 31.

Menippe rumphii; ebd., S. 36.

Myomenippe granulosa (M.-E.) = *duplicidens* Hilg.; ebd., S. 40.

Panopneus latifrons, de Man (²), S. 265.

Heteropanope indica, eucratoides; de Man (¹), S. 53, 56.

Chlorodius niger u. *sculptus*, de Man (¹), S. 32.

Leptodius exaratus u. *nudipes*, ebd., S. 33; *cavipes* u. sp. indet., ebd., S. 34.

Chlorodopsis pilumnoides, ebd., S. 35.

Cyclodius granulatus, de Man (²), S. 283.

Cymo andreossi, de Man (¹), S. 35.

Ozius tuberculosus; ebd., S. 45. — *O. corrugatus*, Ozorio, S. 224.

Epixanthus, de Man (¹), S. 45; *frontalis* u. *dentatus*, ebd., S. 40.

Eriphidae. *Pilumnus verspertilio*, de Man (¹), S. 57; *andersoni*, ebd., S. 59; *P. seminudus* u. *laevis*, ebd., S. 65, 66.

Eurycarcinus (= *Pilumnopaeus* M.-E.) *maculatus*; de Man (¹), S. 43.

Eriphia laevimana; de Man (¹), S. 68.

Trapezia cymodoce; ebd., S. 69.

Portunidae. *Neptunus pelagicus, gladiator*, de Man ⁽¹⁾, S. 69; N. (Hellenus) *andersoni*, ebd., S. 70.

Thalamita savignyi, de Man ⁽¹⁾, S. 73, *integra*, S. 74, *sima u. prymna*, S. 75, *spinimana*, S. 76, *danae*, S. 78, *crenata*, S. 79.

Goniosoma cruciferum, de Man ⁽¹⁾, S. 79, *affine*, S. 80, *merguienae*, S. 82. — *G. inaequale*, Walker, S. 116.

Caphyra archeri, Walker, S. 116

Lissocarcinus pulchellus, sp. n.?, Müller, S. 482.

Corystidae siehe hinter Lycosiidae.

Telphusidae. *Telphusa stoliczkana*, de Man ⁽¹⁾, S. 94, *callianira*, S. 96, *carinifera*, S. 100. — *T. aubryi*, Milne-Edwards, S. 122; *africana*, S. 124, Fig. 8; *decazei*, S. 127, Fig. 7; *madagascariensis*, S. 131, Fig. 5; *ballayi*, S. 132, Fig. 2; viele andre afrikanische Telphusen ausserdem erwähnt. — *T. (Oziotelphusa) hippo-castanum*, Müller, S. 482. — *T. fluviatilis*, Entwicklung, Mercanti.

Hydrotelphusa agilis, Milne-Edwards, S. 189, Fig. 9.

Paratelphusa nilotica, ebd., S. 141; *brazzae*, S. 142, Abb.; *pocili*, S. 143, Abb.; *chaperi*, S. 144, Abb.; *chavanesi*, S. 145.

Platytelphusa n. gen. mit der einzigen Sp. *armata* vom Tanganyika. Diese Gatt. ist durch 8 Stacheln an dem Medianrand der Orbita ausgezeichnet; die Basis der äuss. Ant. liegt zwischen den 2 unteren derselben. Sie ähnelt *Eriochirus*. Milne-Edwards, S. 146.

Deckenia imitatrix, ebd., S. 149.

Gecarcinidae.

Ocypodidae. *Ocypode ceratophthalma, cordimana*; de Man ⁽¹⁾, S. 107, 108. *Gelasimus dussumieri, acutus, annulipes, triangularis*; de Man ⁽¹⁾, S. 108, 109, 118, 119.

Eucrate, de Man ⁽¹⁾, S. 88, *affinis*, S. 89.

Carcinoplax setosus u. integer, de Man ⁽¹⁾, S. 93.

Macrophthalmus tomentosus, de Man ⁽¹⁾, S. 422; *depressus*, S. 124; *erato*, S. 125.

Grapsidae. *Sesarma*, die indo-pacifischen Arten, de Man ⁽²⁾; darunter folgende neu: *neglecta*, S. 643 u. 661, *meinerti*, S. 648 u. 668, *minuta*, S. 650, *brockii*, S. 651, *kraussi*, S. 652, *polita*, S. 654, *melissa*, S. 656, *andersoni* und *edamensis*, S. 657, *haswelli*, S. 658; mehrere andre Arten werden ausführlich beschrieben.

Sarmatium, subg. von *Sesarma*, de Man ⁽²⁾, S. 659, mit *inermis*, S. 660, 687.

Pinnoteridae. *Pinnoteres edwardsi*, de Man ⁽¹⁾, S. 103, *parvulus*, S. 105. *P. marioni*, Gourret ⁽¹⁾, S. 186.

Xanthasia murigera u. sp. indet., de Man ⁽¹⁾, S. 106.

Rhisopidae. *Typhlocarcinus villosus*, Abb.; Walker.

Calappidae.

Leucosidae. *Nursia rubifera*, Müller, S. 480.

Onychomorpha lamelligera, Abb.; Walker.

Corystidae. *Kraussia rastripes*; Müller, S. 480.

Raninidae. *Lyreidus channeri*, Wood-Mason.

Dorippidae.

Porcellanidae. *Porcellana mattsii* u. *bella*, Ozorio, S. 229.

Porcellanella picta, Abb.; Walker, S. 116.

Polyonyx cometes; Walker, S. 116.

Dromiidae, Lithodidae, Hippidae.

Paguridae. *Eupagurus filholi*, de Man (?).

Spiropagurus, dazu als Subg. n.: *Anapagurus*; Henderson.

Clibanarius, Gewohnheiten; Lucas, A.S.H.

Petrochirus cavitarius, Ozorio, S. 229.

Galateidae. *Galatea parroceli*, Gourret (?), S. 1034. — Discussion mehrerer Species, Bonnier.

Pylochelidae, Thalassinidae.

Callianassidae. *Callianassa subterranea* var. n. *minor*, Gourret (?), S. 1034.

Axiidae, Thaumatochelidae, Eryonidae.

Palinuridae. *Palinurus lalandii*, dieser Name ist auf die beim Cap lebende Form zu beschränken, *P. edwardsii* ist die einzige bei Neuseeland vorkommende Species; Parker. — Abnormer Augentitel, Howes.

Astacidae. *Homarus*, Reproduktion verlornen Theile, Brook. — Hummer-Industrie, Baird.

Astacus: Grüne Drüse, Grobben; abnorme Scheere, Léger; Histologie, Osborne; Verbreitung der Species, Schiemkewitsch; allgemeine Naturg., Rank; vergl. auch Landois.

Thalassinidae.

Crangonidae. *Crangon*, Entwicklung; Kingsley (1, 2). — *Cr. (Cheraphilus) neglectus* (Sars) u. *Cr. fasciatus* (Risso), Britannien; Norman, S. 90. — *Cr. lacazei*, Gourret (?), S. 1033.

Atyidae, Stenopidae.

Alpheidae u. Palaemonidae. *Alpheus halesii*, Kirk. — *A. gabrieli*, Gourret (?), S. 1033.

Hippolyte marioni, Gourret (?), S. 1033.

Gnathophyllum elegans, var. n. *brevirostris*, Gourret (?), 1034.

Pontonia phallusiae (Marion), Gourret (?), S. 187.

Palaemonetes varians, Verbreitung; Barrois (?).

Miersidae, Peneidae, Sergestidae.

Schizopoda.

Struktur etc. der Photosphaere; Vallentin.

Euphausiidae. *Boreophausia raschii* (M. Sars), Britannien, Norman, S. 91.

Nyctiphanes norvegica (M. Sars), Britannien; ebd. S. 92.

Petalophthalmidae, als eigene Fam. von den Mysidae abgezweigt, Czerniavsky, Fasc. I, S. 55.

Mysidae. Von Czerniavsky, Fasc. I S. 57—72 in 6 Subf. u. 35 Genera zerlegt (Petalophth. s. oben, *Pseudomysis* Sars 79 u. *Ctenomysis* Norman 31. meet. Br. ass. dem Vf. nur dem Namen nach bekannt). Subf. *Mysidellinae* (1 Gatt.), Sbf. *Mysinae* (Gatt. 2—17), Sbf. *Hemimysinae* (1 G.), Sbf. *Protomysidellinae* (Gatt.

Parerythroptus u. *incertae sedis Onychomysis*), Sbf. *Siriellinae* (mit 3 Divisionen; *Anchialidae* mit Gatt. *Anchialus*, *Leptomysidae* mit Gatt. 23—32 u. *Pontomysidae* mit *Pontomysis* u. *Gastrosaccus*), Sbf. *Archaeomysinae* (mit *Divisio Archaeomysidae*, einz. Gatt. *Archaeomysis* u. *Div. Protomysidae* mit der problematischen Gatt. *Protomysis*). In dem beschreibenden Theil umgekehrt geordnet.

Archaeomysis g. n. Char. der Subf. *Archaeomysinae*: Pleopoda maris et feminae omnia biramea; pleopoda maris semper natatoria. Char. d. *Divisio*: Pleop. feminae non natatoria, semirudimentaria, ramis plerumque uni-articulatis et pr. p. sub-tri-artic.; par primum ceteris major. — Einz. Art.: *A. grebnitaki*, aus e. *Gadus*-Magen bei Berings-Insel. Czern. I, S. 73, Tf. 30, 32.

Protomysis n. g. problematicum. (s. oben), „omnium Mysidarum prototypus“. Von *Archaeom.* als *Divisio* versch. durch: Pleop. feminae bene natatoria, ramis multi-artic. — Tarsus pedum multi-art., ungue nullo. Anguli antero-later. scuti dorsalis inermes. Antennae sup. flagellis tribus instr. (sicut in *Macrurus* inferioribus). Czern. I, S. 71.

Pontomysis g. n. Anguli ant.-lat. scuti spina libera valida instr., rostrum breve supine curvatum, scuto tectum. Sonst ähnl. *Gastrosaccus*. — *P. caucasica*, Suchum-Bai (Taf. 4 u. 30) u. *widhalmi* (Tf. 3, 4), Bai v. Odessa. Czerniavsky, Fasc. I, 77—85.

Gastrosaccus santus ? (Ben.), Forma *suchumica* u. *maeotica*; Schlüssel für 3 Sp. Czern. I, 85—88.

Leptomysis pontica, nahe *lingvura*; Schlüssel für 6 Sp.; ebd. 88—93, Tf. 8, 9. — *Leptom. lingvura*, britisch; Norman S. 93.

Mysidopsis gibbosa S. u. *angusta* S. in Britannien; Norman S. 93.

Erythroptus pygmaea S., neu f. Brit., Norman 93.

Siriella in 3 Subg. zerlegt. *Rhinomysis* sbg. n.; Rostrum oculis longius (1 sp. excepta), appendicum later. caudae lamina exterior interiore longior. — *Rh. diversa* (= *S. armata* S. nec Edw.), *Rh. sarsi* (= *frontalis* S. nec Edw.); Schlüssel für 6 Sp. — *Siriellides* sbg. n.: Mandibulae processu molari forti armatae, corona plus minusve dilatata. *S. indica*, Tf. 31, Ind. Oc.; *paulsoni*, Roth. M. (= *jaltensis* P. nec Cz.); *similis* (= *Edwardsi* P. nec Claus); Schlüssel für 7 Sp. — *Siriella* s. str.; Mand. processu mol. nullo; appendices maris antenn. sup. cum art. 3. coalitae, foliiformes nullae; lamina frontalis brevis. *S. messiniensis* (= ? *gracilis* Claus), Schl. für 9 Sp. — Czerniavsky, Fasc. I, S. 98—109.

Siriella clausii, norvegica *crassipes*, *brookii*, armata von Britannien erwähnt, mit Beschreibungen; Norman S. 95—100.

Protosiriella g. n. Mandibularum pars terminalis maxime angustata, paste incisiva angusta et parum dentata, proc. molari nullo; lamina front. brevis; tarsus pedum biartic. — 2 Sp.: *jaltensis* Cz. 1868 (Abb. Tf. 5, 6) u. *thompsoni* (M. E.). Czern. I, 109—116.

Hemimysis, eigne Subf. s. oben; „Pleop. maris pr. p. natatoria, biramea.“ *H. pontica*, Bai von Suchum; Czern. I, 117, Tf. 7.

Lymnomysis n. g. Pleop. maris 1., 2., 5 paria rudimentaria, 3. et 4. dissimilia non vero natatoria, 4. valde elongatum styliforme; pedes 1. par posterioribus similes, tarso triartic. Squama antenn. inf. utrimque setifera. Scuti anguli ant.-lat. spiniformes. Telson apice incisum, incisura paucidentata. Pedum ungue sat forti, segmento 4. plus minusve dilatata. [S. 58.] *L. brandtii*, Lenkoran. (am Caspi) in Brackwasser, Tf. 9, 10, S. 121; *benedeni*, 1. forma *estuarica* (= M.

relicta var. *pontica* Grebn.), Estuar. des Dniestr, S. 124, Tf. 10, 11, 2. f. *intermedia*, Liman Berezan (bei Oczakow, nördl. Schwarzes M.), S. 126, Tf. 11, 3. f. *similis*, mit vorig., S. 127, Tf. 11; *schmankewiczii*, mit vorigen, S. 128, Tf. 12. Czern. I, 119—129.

Potamomysis n. g. Von *Limnomysis* (? Subg. davon) abw. durch: *Incisura telsonitis* dense spinosa; ungue pedum duobus secundariis praedito (S. 58). — *P. pengoi*, Fluss Udy bei Charkow, Czern. I, 130, Tf. 14.

Euxinomysis n. g. Ungue pedum setiforme; palpi mandib. subprehensiles (spina apicali plicata). Zwischen *Mysis* u. *Limnom.* — *E. mecznikowi*, Liman Berezan, S. 133, Tf. 12, 13.

Acanthomysis g. n. zwischen *Mysis* u. *Pseudomysis*. Durch unbewehrte Vorderecken des Schildes von den 3 vorigen Gatt. versch.; Telson ohne Einschnitt, dessen Seiten nackt oder mit 1—2 subbasalen Dornen. — *A. spinosissima*; Czern. I, 135, Tf. 31, 32. — *A. platydens* (= *M. longicornis* Sars nec Edw. nec Heller), beide Neapel; ebd.

Onychomysis n. g. Palpi mandibulares subchelati, validi. Stellung unsicher. — *O. mingrelica*, nahe *latitans* Kr. (wozu aber *M. mixta* Lillj. nicht synonym); See Palaeostom bei Poti, Mingrelien; Czern. I, 138, Tf. 13.

Podopsis, in 2 Sbg. zerlegt; *Mesopodopsis* mit *Pod. slabberi* Ben. und *Parapodopsis* (Vorderecke des Schildes u. Telson vor der Spitze mit Dorn, welcher bei *M.* fehlt.) mit *goësi* (= *Pod. slabberi* Goës u. *Macropopsis* slabb. Sars) und *Par. cornuta* (= *pontica* Cz. 69, ähnl. auch von Neapel) nebst var. *major* (= *Pod. slabberi* Marcusen u. *P. pontica* Widhalm.). Czern. I, 143—55, Tf. 1—3.

Mysis (restr.), Schlüssel für die 6 sicher. russ. Sp. u. zweifelh. r. Sp. *M. baltica* (= *M. mixta* Lov. nec Lillj.) S. 6, Tf. 15. — *M. relicta* Lov. forma n. *major*, Ladoga-See, S. 10, Tf. 15, 16, f. n. *orientalis*, Onega-, Putko- u. Keno-See, S. 11, Tf. 17. — *M. oculata* Fabr. f. n. *orientalis*, Weisses M., S. 14, Tf. 17. — *M. mixta* Lillj. (von *latitans* Kr. versch.), f. n. *orientalis*, Weisses M., S. 18, Tf. 18. — *M. mertensi* (ob *Pseudomysis*?), Kamschatka; S. 19, Tf. 14. — *M. schrenckii*, de Castries-Bay, S. 20, Tf. 19. — *M. awatschensis* Br. 61, S. 22, Tf. 18. — Ob *lamornae*, Cch. *aurantia* S., *grandis* G. in Russl.?. — (Czerniavsky Fasc. II, S. 1—23.

Mysis inermis, *arenosa*, *lamornae* bei Britannien, Norman, 94, 95.

Neomysis n. g. Zw. *Mysis* und *Heteromysis* Cz.; dazu *vulgaris* Th. mit forma n. *baltica* u. *lapponica*, Czern. II, 23—26, Tf. 18, 19, 30.

Synmysis n. g., Schlüssel für 8 bek. u. 2 n. Sp. — *S. flexuosa* Müll. (nec Norm., welche = *chamaeleon*), forma n. *baltica* (= *flex.* Grimm 77), bei Libava, S. 30, Tf. 19. — *S. chamaeleon* Th. (nec Ben.), England; S. 31. — *S. benedeni* (= *cham. B.* nec Th.), Belgien; S. 31. — *S. mecznikovi* (? = *spinul.* Leach u. M. E.), Helgoland, S. 32. — Im Schlüssel erw.: *neglecta* S., *assimilis* S., *ornata* S., *normani* (= *flex.* Norm.!, vergl. *flexuosa*!), *spiritus* Norm. Czerniavsky II, 26—33.

Mysis chamaeleo, Embryologie; Nusbaum. Nervensystem; Koehler (*)

Heteromysis n. g. [praeocc. Smith, = *Chiomysis*] *Pedes* elongati, debiles, tarso 8—12-artic.; *pedes* anteriores debiles, ungue tenuissime setiformi; *pedes* poster. majores, articulis tarsi plus numerosis, ungue brevissimo, forti et maxime curvato. Pleop. ♀ unartic. et gracilia; pleop. ♂ paris 1., 2., 5., 3. ut in ♀; tan-

sum 4. longa, multiart. et biramea (ut in g. Myside). — *H. mirabilis*, de Castris-Bai, Tf. 20; *intermedia*, Berings-I., Tf. 30. — Czern. II, 33—36.

Kesslerella n. g. für *M. cornuta* Kr. (wozu var. *aberrans*, Lappland. Tf. 30) u. *K. similis* nebst var. *affinis*, Gabrilow-I. (Eismeer); Czern. II, 36—41.

Mesomysis n. g. Zw. Mysis u. Paramysis. Pedes robusti, articulis 3. et 4. abbreviatis et dilatatis, tarso 4-artic., brevi et incrassato, articulo 1. brevissimo, ungue tenni setiforme. 5 südruss. Sp. — *M. lacustris*, Tf. 24, 25, Abrau-See im Caucasus, 250 Fuss h.; *M. kröyeri*, mit forma *kerczensis* u. *berezanica*, Schwarzes M., Tf. 25, 26; *M. kowalevskii*, f. typica (Caspi) u. *major* (Liman Berezan), Tf. 21, 22; *M. intermedia*, f. typica (Caspi) u. *truncata* (Odessa), Tf. 22, 23; *M. aberrans*, Caspi, Tf. 23. — Czerniavsky II, 41—55.

Paramysis g. n. Pleop. ut in Mesom. et Myside; pedes robusti, articulis 3. et 4. abbrev. et dilatatis, complan., tarso 4-art. brevi et incrassato, articulo 1. brevissimo, ungue plus minusve forti (non setiformi). Nahe Mesomysis. — *P. baeri*, f. *valida* u. *litoralis*, Tf. 27—29; *P. armata*, Tf. 29; *P. ulitskyi* (im Schlüsselstranchi!) f. typ. u. *occidentalis*, Tf. 26. Alle 3 vom Caspi-See. Czern. II, 55—67.

Arctomysis n. g., Czern. III 6. *Heterosiriella* n. g., ebd. 38.

Austromysis n. g., ebd. 66.

Stomatopoda.

Protosquilla ectypa, Müller, S. 476 u. *stoliura*, S. 477.

Iysiosquilla sarasinorum, Müller, S. 478.

Cumacea.

Lamprops fasciata, britisch; Norman, S. 100.

Hemilamprops rosea u. *cristata*, britisch; Norman, S. 100—1.

Diastylis rugosa, britisch; Norman, S. 102.

Pseudocuma cercaria (van Ben.), n. für Britannien; ebd.

Leptostraca.

Amphipoda.

Allgemeine Eintheilung der Gruppe; Bovallius (?).

Orechestiidae, Bemerkungen hierüber; Barrois (?).

Talorchestia tumida, Beschr.; Stebbing.

Gammaridae. *Gammarus* (*Gammarella*?) *dubius*; Herrick (?), S. 41. — *G. pulex*, Albinismus; Cameron.

Microtopus longimanus, Chevreux (?), S. XLI.

Byblis kallarthrus, Beschr.; Stebbing.

Phernusa coerulea, Beschr.; Stebbing.

Microdentopus armatus; Chevreux (?), S. XLI.

Corophiidae. *Ptilocheirus tricristatus*; Chevreux (?), S. XL.

Eurytheus hirsutus; Giles, S. 227.

Synopiidae. 3 Gatt. bekannt, alle 8 Sp. abgebildet. — *Synopia carabica* u. *schéeleana* u. 4 bek. Sp.; Bovallius (?), S. 16.

Trischizostoma, nur 1 Sp.; ebd., S. 22 ff.

Hyperlopsis, nur 1 Sp.; ebd., S. 31.

Hyperiididae. In Radiolarien; K. Brandt. — Arctische und antarct. Hyperiden; Bovallius (?). Alle aufgeführten Sp. sind unten referirt. Es

fehlen in den kalten Meeren ganz die Abtheilungen: Paraphronimidae, Phronimidae, Phorcididae, Oxyceph., Pronoidae, Scelidae, Typhidae.

Tyro pacifica; Bovallius (¹), S. 4. — *T. borealis*, clausi (Abb.), tullbergi (Abb.); Bovallius (²), S. 551—2.

Lanceola clausi (Abb.), loveni, serrata; Bovallius (²), S. 553—4.

Vibilia, 10 sp. n.; id. (¹): *macropis*, *gibbosa*, *robusta*, S. 7; *kroyeri*, *longipes*, S. 8; *viatrix*, *gracilis*, *gracilentia*, S. 9; *armata*, *pyripes*, S. 10. — *V. kroeyeri* id. (²) S. 555.

Cyllopus armatus u. *laevis*; Bovallius (¹), S. 11, 12. — *C. magell.*, *lucasi*, *danae*, *armatus* (Abb.); id. (²) S. 555—7.

Cyllias g. n. für *tricuspidatus* (Streets), id. (¹), S. 12.

Paraphronima pectinata, ebd., S. 13.

Thaumatops longipes; Bovallius (²) S. 558.

Mimonectes steenstrupi; ebd. 558 (Abb.).

Hyperia medusarum (Abb.), *latreillei* (Abb.), *galba* (Abb.); ebd. S. 560—8.

Julopis g. n. Körper behaart. Kopf sehr gross, höher als lang. Antennen wie bei *Hyperia*. Segm. des Pereion erhoben, Rollen bildend. Pereiop. I u. II subcheliform; der 10. f. Carp. process. compress., schmal. Carpus von III u. IV nicht verbreitert; V, VI, VII subaequal, Metacarpi kurz aber breit. Epimeren distinct, Uropoda kurz und breit, Telson gross. — Mit *loveni* und *mirabilis*; Bovallius (¹), S. 17, 18.

Hyperoche g. n. Körper glatt. Kopf gross, höher als lang. Ant. wie *Hyperia*. Segm. d. Per. eben. Pereiop. I, II cheliform; Crp. proc. lang., messerf. Carpi von III u. IV nicht verbreitert; V, VI, VII subaequal, Metacarpi nicht verlängert, schmal. Epim. distinct, Urop. zieml. kurz u. breit, Telson gross. — Mit 4 älteren u. 1 n. Sp.: *lütkeni*, ebd., S. 18. — *H. kroeyeri*, *abyssorum* (Abb.), *lütkeni* (Abb.); id. (²), S. 564—5.

Tauria macroc., Bovallius (²) S. 565.

Hyperisella g. n. Körper glatt. Kopf gross, höh. als l., vorn flach; Ant. wie *Hyperia*. Segm. des P. eben. Pereiop. I, II subchelif., Carppr. wie *Hyperia*. Carpi von III u. IV nicht verbreitert. V länger als folgende, mit verläng. Metacarp. VI u. VII mit kurzem Metac. Epim. distinct, Urop. verlängert, T. mittelgross. — Mit *antarctica*; id. (¹), S. 19 u. (²) S. 566 (Abb.).

Lestrignon bengalensis; Giles, S. 224.

Parathemisto japonica; Bovallius (¹), S. 21. — *P. abyssorum* Boeck (70) Abb.), *compressa*, *oblivia*, *trigona*; id. (²), S. 566—8.

Euthemisto nordenskiöldi; id. (¹), S. 22. — *E. gaudich.*, *libellula* (Abb.), *hispin.* (Abb.), *antarct.*, *nordensk.* (Abb.); id. (²), S. 568—570.

Themistella g. n. Körper glatt, Kopf mittelgross, höh. als l.; 3 erste Glieder des Flag. von Ant. I mit Riechfortsätzen; Ant. II wie *Hyperia*. Pereiop. I, II subchelif.; Carppr. schmal „gauge-shaped“; Carpi von III u. IV nicht verbreitert; V am längsten, VI, VII abnehmend; Metac. von V, VI, VII etwas verläng.; Epim. nicht distinct, Urop. lang u. schmal, T. mittelgross. — Für *steenstrupi*; ebd., S. 22, 23.

Phronimopsis sarsi; ebd., S. 23.

Dairella g. n. bildet in den Phronimidae die Subf. *Dairellinae*: Kopf rundlich (nicht conisch), Pereiop. sämtlich einfache Schreitfüsse, Epim. markirt, aber nicht artikulirt. Diagn. d. Gatt.: Pereiop. I, II einfach, mit gradem, kurzem

Dactylus; Carpus aller Pereiop. verläng.; Urop. mit sehr breitem Stiel u. distanten Aesten; T. sehr kurz u. breit. — Mit *D. latissima*; ebd., S. 24.

Phronima spinosa u. *colletti*, ebd., S. 25.

Phronima bucephala; Giles, S. 215.

Phronimella hippocephala; Giles, S. 217.

Phronimella filiformis; Bovallius (*), S. 26.

Anchylomera abbreviata, antipodes; Bovallius (*), S. 571—2.

Die **Platysceliden**. Claus. (*). Vf. liefert in diesem Werke eine Ergänzung seiner früheren Arbeit (1879) über die gleiche Gruppe. Besonders ist eine anatomisch-morphologische Einleitung neu hinzugefügt (S. 4—29), welcher auch ein Theil der Abb. zu Gute kommt. — Allg. Erscheinung und Körperform (S. 4—5): „Allgemein erscheint der hintere Abschnitt des Abdomens durch Verschmelzung des 5. und 6. Segmentes vereinfacht,“ mit welchen auch das Telson ohne Naht vereinigt sein kann. — Gliedmaassen (5—12): Die Nebengeißel der 1. Ant. fehlt stets; was man bei Phorcus dafür angesehen, ist Hauptg., während die sog. Hauptg. der scheinbar gegliederte Fortsatz des Schaftgliedes ist. Das Coxalglied der 2. Ant. ist nur bei Pronoe deutlich, sonst aber mit dem Integument des Kopfes verschmolzen (selbst schon bei Larven). Der Taster der Mandibeln zeigt in ähnlicher Weise Geschlechtscharaktere (Rückbild, beim W., starke Entw. bei M.), wie die 2. Ant. Die zwei Maxillen und der Kieferfuss, sind immer sehr vereinfacht, bei den Oxycephaliden sind erstere ganz geschwunden; die feinen Anhänge des letzteren vielleicht Tastorgane. Bezüglich der Scheerenbildung unterscheidet Vf.: Greifhand (mit kurzem Index), Scheere (mit langem), doppelte Scheere (Glieder 7 und 6 bilden eine, Gl. 5 gegen 6 + 7 eine zweite Sch.), zusammengesetzte Sch. (5 gegen 6 + 7, aber nicht 6 gegen 7). — Integument und Hautdrüsen: Im Panzer oft concentr. Concremente. In den Beinen Drüsen (wie bei Phronima) sehr häufig; auch oft am Vorderrand der Segmente; stets Antennendrüse, selbst bei ♀, wo nur die Coxa der 2. Ant. geblieben. Zahlreiche Drüsen in der 2. Ant. des ♂ scheinen mit den Hakenhaaren der 4 Endglieder Beziehung zu haben (S. 8). — Nervensystem und Sinnesorg. (14—18): 1. und 2. Brustganglion stösst zum unt. Schlundg., das (kleine) 7. zum 6., das 4. Abdomggl. (klein) zum 3. Bei gestrecktem Leib auch die Längscommissuren lang, und dann treten auch aus diesen Seitennerven aus. Die Form des Gehirnggl. von der des Kopfes abhängig; daraus seitlich ein sympath. Nerv; vor dem Hirn die Otolithenblasen (bei Eutyphis, Thamyras, Simorh., Oxy., Rhabd.) Auge ähnlich Phronima; auch hier bleibt unter der Cornea die Hypodermis stets erhalten. Für die sog. Riechhaare nimmt Verf. eine Empfindung an, die einem „Uebergangssinn“ zw. Geruch und Geschmack entspricht [Sinn für chemische Beschaffh.]. Deren Nerv zwar in der Axe des Haars bei Phronima, Argulus und Daphnia erkannt (für Platyscel. nicht untersucht), aber vom Verf. nie als allg. nachweisbar behauptet (Polemik). — Darmcanal: 1 Paar Leberschläuche, bei Typhiden wegen der weiten Mündung als Zipfel des Mitteldarmsacks erscheinend. Keinerlei dahinterliegende Darmanhänge. Gefässsystem und Athmung (S. 20—26). Herz hat nur im 3. und 4. Segment ein Ostium; ausser der vorderen und der hinteren Arterie noch (8) seitliche aus dem Herzen wie bei Isopoden. Die Rhabdosoma ♂ [u. Lycacopsis, S. 66] besitzen Kiemen nur am 5. u. 6. Bein, alle übr. Platysc. auch am 2., 3. und 4.; die Hypodermis des Kiemenblattes scheidet auch an der centralen Seite

eine Cuticula ab (Basalmembran). — Geschlechtsorgane, Entwicklung: Ovarien und Hoden ähnl. Phronima. Beim Ausschlüpfen aus der Eihülle sind die Jungen ziemlich entwickelt, auch Abdominalbeine schon da (wie auch bei *Hyperia*, gegen Fr. Müller). Aber Körperform sehr abweichend, bei *Rhabd.* (Abb.) noch sehr knrz, bei *Eutyphis* (Abb.) sehr lang. Beschr. einer *Parascelus*-Larve: Kieme am 2. Bein fehlt noch. Kopf klein, Seitenauge winzig mit 4 bis 5 Kegeln, also mehr Gammariden- als *Hyperiatypus*. Die *Hyperiden* stammen nach Verf. von den *Crevettinen*, und die *Platysc.* sind wieder ein aberranter Zweig der *Plat.* — Systematik: Wenig versch. von 1879: 4 sp. nov. (nicht 8!), auch fast alle alten Sp. abgebildet. *Phorcus* (vom Verf. nicht gesehen) steht mit *Lycaeopsis* bei der Fam. *Lycaeidae*, doch ist *Lycaeopsis* (S. 8) wegen völliger Gleichheit der 2. Ant. bei ♂ und ♀ nur zweifelhaft ein *Platyscelide* zu nennen. Bei *Pronoe* ist dieser Unterschied, wenn auch schwächer, vorhanden.

Phorcus loveni; *Bovallius* (1), S. 29.

Lycaeopsis lindbergi, ebd., S. 29.

Tryphaena nordenskiöldi, ebd., S. 30. — *Tr. malmi*, nordensk.; *Bovallius* (4), S. 578.

Thamyris elegans, id. (1), S. 31. — *Th. antipodes*; id. (4), S. 574.

Thamyris lycaeoides, Claus (7) S. 60, Tf. 16 u. 21; *Th. mediterranea*, ebd., S. 60, Tf. 16.

Thamneus n. g. mit depressen Kopf u. Körper. Dahin *debilis* Dana u. *rostatus*; *Bovallius* (1), S. 31.

Lycaea stebbingi, ebd., S. 33.

Paralycaea newtoniana, ebd., S. 33.

Simorhynchus liljeborgi, ebd., S. 34.

Glossocephalus n. g. mit dickem, abgerundetem, zungenf. Rostrum; Tibia, Carpus u. Metac. von Pereiop. V sehr verbreitert; nicht geschwollen; Uropoda kurz und breit; nahe *Oxycephalus*. — Dazu *milne-edwardsi* und *spiniger*, ebd., S. 35.

Oxycephalus clausi (S. 35), *pectinatus* (S. 36), *pronoides* u. *steenstrupi* (S. 37); *Bovallius* (1).

Leptocotis lindströmi; ebd., S. 38.

Tullbergella n. g., einz. Sp.: *cuspidata*; Diagn.: Rostrum kurz, scharf, keilförmig; Körper, dick, breit; Pereiop. I, II stark scherenf.; Femora von V, VI stark verbreitert; VII rudimentär; Urus u. Urop. kurz, innere Rami nicht mit dem Stiel verwachsen. Nahe *Leptocotis* u. *Calamorh.* (Ind. Oc.); *Bovallius* (1), S. 38.

Rhabdonectes nom. n. für *Rhabdosoma* (präocc.); ebd., S. 39.

Rhabdosoma investigatoris; Giles, S. 219.

Eupronoë serrata, Claus (7), S. 52, Tf. 14, Lagos.

Eupronoë macrocephala; *Bovallius* (1), S. 41.

Parapronoë agilis, *atlantica*; ebd., S. 42.

Amphipronoë longicornuta; Giles, S. 224.

Thyropus atlanticus, *Bovallius* (1) S. 43

Parascelus nasutus, ebd., S. 44.

Euthyphes forfex, ebd., S. 46.

Dithyrus stellatus, ebd., S. 46.

Paratyphes theéli, ebd., S. 47.

Paratyphis parvus Claus (*), S. 40, Tf. 7, Lagos und Atlantischer Ocean.
Tetrathyrus rectangularis Bov. (*), (S. 47) u. *inscriptus* (S. 48), ebd.
Amphithyrus inermis, ebd., S. 48.

Caprellidae.

Isopoda.

Histologie der zusammengesetzten Augen bei einigen Gatt., Beddard;
 Polkörper, Leichmann; Nervensystem, E. Brandt.

Apseudidae u. Tanaidae. *Apseudes latreillei*, Claus (*, *).

Anthuridae.

Anceidae. *Anceus normani* (? sp. n.), Scott.

Cymothoidae (incl. Cirolanidae u. Aegidae). *Slabberina gracilis*, Bovallius (*) S. 12.

Aega lovéni (S. 1), *ventrosa* (Sch. u. M.) (S. 6), *ventrosus* (M. Sars); Bovallius (*). — *Aega crenulata* in brit. Meeren, Matthews.

Rocinela dumerilii, Bemerk.; Bovallius (*), S. 9.

Syscenus lilljeborgii, Bem.; ebd., S. 17.

Nerocila philippensis, Bovallius (*), S. 1; *lovéni*, Java, ebd., S. 6; *laticeps*, Westafrika, ebd., S. 10.

Anilocra leptosoma, var. n.: *caudata*; ebd., S. 18; *A. hedenborgi*, ebd., S. 15; *guinensis*, ebd., S. 17.

Sphaeromidae. *Sphaeroma bolivarii*; de Buen, S. 415.

Aroturidae, Idotheidae, Munnopsidae.

Asellidae. *Asellus*, embryonale Anhänge, Claus (*). — Weisse Var.: *A. aquat.* var. *fribergensis*, R. Schneider. — *Spermatogenesis*, Terfve.

Jaera marina, Anatomie u. Histologie; Sye.

Oniscoidae.

Porcellio, Entwicklung; Reinhard.

Die Armadillinae Frankreichs; Dollfus.

Bopyridae u. Dajaidae.

Vergl. Giard u. Bonnier (*, *, *, *).

Grapsicepon n. g. für *C. messoris* Kossm. u. *frutii* Giard (*), S. 69, 70.

Cancericepon n. g. für *elegans* u. *pilula* auct.; ebd., S. 72.

Portunicepon n. g. für *C. portuni* Kossm.; ebd., S. 73.

Entoniscoidae u. Cryptoniscoidae.

Cryptoniscus sp., Gourret (*), S. 187.

Danalia g. n., begründet auf einen an *Sacculina* schmarotzenden *Cryptonisciden*; Giard (*).

Laponiscus n. g., mit *anatifae* u. *pollicipedis*; ebd., S. 52.

Entoniscus mülleri (Giard u. Bonnier 1886), Giard (*), S. 284; *brasilensis*, ebd., S. 235; *creplini*, S. 236.

Entione uchaei, Giard (*), S. 237.

Grapsion n. g. (Giard und Bonnier 1886) mit der einz. Sp. *cavolinii* (Giard); ebd., S. 237.

Cancrion n. g. (1886) für *cancrorum* (F. Müller), *miser* (Giard u. Bonnier) u. *floridus* (G. u. B.); ebd., S. 239.

Portunion n. g. (1886), für einige ältere Sp. u. für *salvatoris* u. *moniezii* (sp. n. 1886); ebd., S. 245.

Phyllopoda.

Metamorphose etc., Herrick (¹).

Apodidae. *Apus haeckelii*, Walter, S. 924.

Branchiopodidae. Beziehungen zwischen *Artemia* u. *Branchipus*; Brauer. *Artemia asiatica*; Walter, S. 926. — Entwicklung, Nassonow.

Estheridae. *Cyclestheria* n. g. mit (*Estheria*) *hislopi*; Sars (²). Die Augen vollständig in eins verschmolzen. Antennulae ohne laterale Lappen. Am oberen Ast der Antennae starke rückwärts gekrümmte Stacheln. Beine (16) geringer an Zahl als bei *Esth.* u. *Limnadia*, nur das 1. Paar beim ♂ prehensil. An der Caudalplatte 7—8 Paar (statt 1 Paar) starke, gekrümmte Dorsaldornen. Die grosse lappige Leber der bivalven Phyllop. mangelt. Entwicklung ähnlicher den Cladoceren als den Phyllop.

Cladocera.

Bemerkungen über die Ephippien, Imhof (³).

Podontidae. *Podon minutus*, de Guerne (²).

Daphniidae. *Hyalodaphnia* und *Bosmina*, neue Varietäten, Zacharias (²). *Ceriodaphnia echinata*, Moniez (²).

Moinodaphnia n. g. für die einzige Sp. *alabamensis*; Herrick (²), S. 85..

Von *Moina* unterscheidet sich diese Gatt. durch Vorhandensein der dorsalen Fortsätze am Abdomen (zum Abschliessen des Brutraums dienend), von *Ceriodaphnia* durch undentliche Felderung und viereckige (statt ovale) Form der Schale. Kopf oben stark gewölbt, vorn winklig, hinten fast ein Schnabel; Antennulae lang, beweglich. Auch *Moina macleayi* King von Australien dürfte hierher gehören.

Ostracoda.

Anatomie etc. der Cypridina, Garbini.

Cyprididae. *Cypris dugesii*, Herrick (²), S. 26; *perlegans*, ebd., S. 27; *minnesotensis* und *modesta*, ebd., S. 28.

Cypridopsis hystrix, ebd., S. 30.

Candona neglecta, Sars (¹), S. 279.

Cytheridae. *Cythere amnicola*, Sars (¹), S. 309.

Halocypridae. *Conchoecia pellucida*, Sars (¹), S. 252; *tetragona*, ebd., S. 254; *striolata*, ebd., S. 256.

Cypridinidae. *Cypridina angulata*, Sars (¹), S. 215.

Copepoda.

Bemerkungen über die „blassen Kolben“; Imhof (²).

Argulidae. *Argulus catastomi*, Kelliecot.

Calanidae. Die Calanidae Polens, Wierzejsky.

Calanus americanus, Herrick (²), S. 6.

Acartia gracilis, ebd., S. 7.

Temora und *Temorella*, ebd., S. 7, 8; affinis, S. 9.

Temorella lacustris Poppe, siehe Zacharias (¹).

Harpactidae. *Amyone intermedia*, Herrick (?), S. 22.

Laophonte mississippiensis, ebd., S. 20.

Canthocamptus mobiliensis, ebd., S. 22.

Corycaidae. *Corycaeus subulatus*, Herrick (?), S. 48.

Notodelphyidae. *Doropygus* (*Notopterophorus*) *papilio* (Hess.), var. *massiliensis*, Gourret (?), S. 185; *D. elongatus* var. *maculatus*, ebd., S. 186.

Lernaeidae. *Lernaeascus nematoxys*, Anatomie; Claus (?), ?).

Sphaerifer cornutus, H. Lucas (?).

Caligidae. *Pandarus sinuatus*, Beschr. und Abb., Rathbun, S. 110; *smithii*, ebd., S. 315.

Cecrops latreillei, H. Lucas (?), Claus (?).

Chondracanthidae. *Chondracanthus galeritus*, Rathbun, S. 317; *phycidis*, ebd., S. 320; *cottunculi*, ebd., S. 322.

Cancerilla tubulata, Giard (?).

Cirripedia.

Phylogenie und Vertheilung nach der Zeit; Weithofer.

Balanidae. *Balanus*, Entwicklung; Nassonow.

Acasta scuticosta, Schlüssel zu den Sp. dieser Gatt.; Weltner.

Stephanolepas n. g. mit *St. muricata*, Fischer.

Lepadidae. *Dichelaspis pellucida*, Hoek (?).

Xiphosura.

§m
Bericht
über die
**wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der
freilebenden Würmer während des Jahres 1888.**

Von
Prof. Dr. M. Braun
in Königsberg i. Pr.

I. Vermes im Allgemeinen.

In Lief. 5/6 des Bandes „Vermes“ von Bronn's Klassen- u. Ordnungen des Thierreichs behandelt **Pagenstecher** den Schluss der „älteren Quellen“ und giebt eine allgemeine Geschichte der Würmer bis um das Jahr 1830 (*Leipzig 1887 pg. 145—208. 2 Taf.*).

In der trefflichen Neubearbeitung des O. Schmidt'schen Handbuches der vergleichenden Anatomie von **A. Lang** (Jena 1888) stellt sich der Autor auf die Seite derer, welche die „Würmer“ auflösen; erstens kommen die Dicyemiden und Orthonectiden ganz aus den Würmern heraus und bilden mit den Phyllosomariiden die erste Classe (Gastraeadae) der Coelenteraten, wobei *Trichoplax* als Anhang der Gastraeaden auftritt; zweitens werden die Plathelminthes zu einem besonderen Stamme erhoben und definirt als Metazoen mit wohl entwickeltem, vom Ecto- und Entoderm scharf gesondertem Mesoderm; Darm mit einer einzigen Oeffnung nach aussen mündend; Leibeshöhle und Blutgefässsystem fehlen; Excretionsorgane vorhanden; Nervensystem centralisirt.“ Die „Vermes“ im engeren Sinne bilden nach Lang einen weiteren Kreis, der nach wie vor keine natürliche, wohl umgrenzte Abtheilung darstellt und kaum anders als durch negative Charactere characterisirt werden kann; die Eintheilung ist folgende:

1. Cl. Nemertini (Rhynehocoela) mit Palaeonemertini, Schizonemertini, Hoplonemertini und Malacobdellini.
2. Cl. Nemathelmia mit Nematodes und Acanthocephali.
3. Cl. Annulata
 1. Hirudinei mit Rhynchobdellida und Gnathobdellida.
 2. Chaetopoda mit a. Oligochaeta, b. Polychaeta incl. den beide Unterordnungen verbindenden Capitelliden und Opheliaceen, und c. Echiuridae.
 3. Myzostomida.

4. Cl. Prosopygii

1. Sipunculacea mit Sipunculidae und Priapulidae.
2. Phoronidea.
3. Bryozoa mit Pterobranchia, Ectoprocta und Entoprocta.
4. Brachiopoda.

5. Cl. Rotatoria — Anhang Dinophilus, vielleicht auch Gastrotricha und Echinoderes.

Anhang zu den Vermes als 6. Cl. die Chaetognatha, die man vielleicht als Annulaten mit geringer Segmentzahl (3) betrachten kann.

Ähnlich reformirend wie A. Lang — nur zum Theil noch weiter — geht B. Hatschek in seinem „Lehrbuch der Zoologie“ (Jena 1888) vor; er theilt die Metazoa in zwei grosse Gruppen: Protaxonia (Coelenterata) und Heteraxonia (Bilateria) und unterscheidet in jeder drei Typen; die erste Gruppe interessirt hier nur in so weit, als die Dicyemiden und Orthonectiden als Planuloidea im Anhang zu den Cnidarien erscheinen. Die Typen der Heteraxonier sind Zygoneura, Ambulacralia (Echinodermen und Enteropneusten) und Chordonier (Tunicaten, Leptocardier und Vertebraten). Die Zygoneura zerfallen:

1. Subtypus: **Autoscolecida** (= Protonephridiozoa)

1. Scolecida mit Platodes, Rotifera, Endoprocta, Nematodes, Acanthocephali — als Anhang Nemertini.

2. Subtypus: **Aposcolecida** (= Metranephridiozoa)

1. Articulata mit a. Annelida (+ Sipunculoida + Chaetognathi), b. Onychophora, c. Arthropoda.
2. *Tentaculata* (= Molluscoidea) mit Phoronida, Bryozoa (ectoprocta) und Brachiopoda.
3. Mollusca.

Die Autoscoleciden zeichnen sich durch den dauernden Besitz des Protonephridiums aus, das bei den Aposcoleciden nur als Larvenorgan auftritt und durch das charakteristische Metanephridium ersetzt wird; bei einigen Gruppen ist letzteres allerdings secundär unterdrückt; nur provisorisch ist die Gruppe der *Tentaculata* aufgestellt.

a) **Anatomie u. Entwicklung.**

Nach Chatin kommen Myelocyten, die man angeblich nur aus der grauen Substanz von Hirn und Rückenmark der Wirbelthiere kennt, auch bei Wibellosen vor; es sind echte, mit allen wesentlichen Attributen versehene Zellen, die bei Pontobdella, Arenicola, Sabella etc. einen Fortsatz entsenden; die letzteren verästeln und verflechten sich und bilden die sogenannte Punktsubstanz (*Sur les myelocytes des invertébrés in Compt. rend. Ac. Paris P. 107 1888. II. pg. 504—506*). Die grössere Arbeit desselben Autors über das gleiche Thema hat Ref. nicht gesehen (*Mém. soc. philom. [Paris] centen. Scienc. nat. pg. 87*—107*. 1 pl.*).

C. F. Marshall publicirt: „Observations on striped and unstriped muscle“ und berücksichtigt von Würmern *Hirudo* und *Lumbricus terrestris*, ohne Neues zu bringen (*Quart. journ. micr. sc.* vol. XXVIII. 1888 pg. 86—87. 1 pl.).

In seinen „Etudes sur le sang, son role et sa formation dans la série animale“ berücksichtigt L. Cuénot auch die Würmer und zwar *Lumbricus terrestris*, *Aulostomum gulo*, *Glossiphonia sexoculata* und *bioculata*, *Nephelis octoculata*, *Phascolosoma* sp. und *Sipunculus nudus*; da es sehr leicht ist, sich bei *Lumbricus* zu überzeugen, dass die Amöbocyten der Leibeshöhlenflüssigkeit von den Chloragogenzellen herkommen, so muss die braune Bekleidung des Darmes besser „Couche lymphatique“ genannt werden; bei den Hirudineen, bei denen die Leibeshöhle fast ganz verschwunden ist, kommen trotzdem Zellen mit albuminogenem Ferment vor — es sind die grossen, gelbe oder grünliche Granula einschliessenden Zellen, die Leydig als Leber, Ray-Lankester als Botryoidalgewebe bezeichnet. Im Blute der Gephyreen findet C. Amöbocyten mit einem gelblichen Ferment und gekernte Blutkörperchen; sie entstehen in einem gelappten, auf dem Hirn gelegenen Organ, das die Rolle der Milz spielt (*Arch. Zoolog. expér. et gén.* 2 sér. Tom. V. 1887 Notes pg. XLIII—XLVII.).

Eine Arbeit Vejdovsky's in böhmischer Sprache dürfte mit der Notiz über larvales und definitives Excretionssystem (cf. F. Ber. 1886/87 pg. 103) zusammenfallen (*Morphologie der Excretionsorg.* — *Stzgsb. d. K. böhm. Ges. Wiss. Prag.* 1887. pg. 696—717).

b) Physiologie, Biologie.

Graber prüfte in Neapel die Empfindlichkeit einiger Meerthiere gegen Riechstoffe: *Thysanozoon Brocchii* Gr. ist vorn gegen Rosenöl reizbarer als hinten — doch reagiren manche Exemplare gar nicht; *Cerebratulus marginatus*, von dem nur Bruchstücke geprüft werden konnten, ist gegen Rosen- und Rosmarinöl ganz unempfindlich, reagirt aber local auf *Asa foetida*, wogegen Ammoniak über den ganzen Körper verlaufende Contractionswellen hervorruft; unempfindlich sind *Sternaspis*, *Eunice*, *Nereis*, *Leprea* und *Amphitrite*, die nur ausnahmsweise reagiren. *Sagitta*, deren jüngere Individuen empfindlicher sind, beginnt bei Wirkung von Rosenöl mit dem Vorderende zu vibriren; diese Bewegungen sind unter dem Einflusse von Rosmarinöl stärker und schneller, das Thier krümmt sich kreisförmig zusammen und schnell fort oder entflieht rückwärts schwimmend der Spitze des Geruchsträgers (*Biol. Centralbl.* VIII. 1888 pg. 750—752).

Salvatore Lo Bianco's „Notizie biologiche riguardanti specialmente il periodo de maturità sessuale degli animali del golfo di Napoli“ geben die entsprechenden Daten für eine Anzahl Turbellarien, Nemertinen, Gephyreen, Enteropneusten, Chaetognathen und Anneliden (*Mitth. d. zool. Stat. Neapel* VIII. 1888 pg. 398—405).

A. Lang beschäftigt sich mit dem „Einfluss der fest-sitzenden Lebensweise auf die Thiere“ und constatirt zuerst, dass bei dem Uebergang von der freien zu der festsitzenden oder einer ihr nahe verwandten Lebensweise die activen Bewegungsorgane entweder mehr oder weniger verkümmern oder zu anderen Functionen benutzt werden, die gewöhnlich vorher schon neben der Hauptfunction bestanden haben.

Ein bestimmter, mittelbarer Einfluss der festsitzenden Lebensweise auf das Nervensystem (durch Sinnes- und Bewegungsorgane) lässt sich bei Anneliden etc. nicht constatiren, nur bei einem Vergleich der Echiuriden mit ihren Jugendstadien und mit echten Anneliden ergiebt sich, dass im gesammten Centralnervensystem die Gliederung bei festsitzenden Formen verwischt ist. Die veränderte Ernährungsweise bedingt den Wegfall des Rüssels, die starke Ausbildung der Fühlercirren, Tentakel etc., also einen Fang- und Sammelapparat, der gleichzeitig der Athmung dient. Dass die Haut, die Locomotionsorgane, die Musculatur beeinflusst werden, liegt auf der Hand; doch geht der Einfluss weiter, vielfach kann das Vorderende des Körpers eingestülpt werden, womit bei Sipunculiden ein Verlust der Dissepimente verbunden ist; Verlagerungen des Afters, Unterdrückung der Nephridien in der mittleren und hinteren Körperregion sind auch anzuführen, ebenso die zahlreichen Schutzmittel festsitzender Thiere, die übrigens die hohe Ausbildung des Regenerationsvermögens nicht beeinträchtigt haben (Jena 1888. 166 pg. 8°).

Anschliessend an eine frühere Untersuchung über das Sauerstoffbedürfniss der Darmparasiten (Zeitsch. f. phys. Chemie VIII. 1883 pg. 48) constatirt G. Bunge, dass auch bei im Schlamm wohnenden Würmern, Hirudo, Haemopsis, Clepsine, Nephelis, Planaria und Lumbriculus, das Sauerstoffbedürfniss ein geringes ist, indem Vertreter dieser Gattungen, in ausgekochtem Wasser und unter ausgekochtem Quecksilber gehalten, ein bis vier Tage am Leben blieben, während Schnecken, Crustaceen, Asseln etc. schon nach 1—5 Stunden nach Luftentziehung zu Grunde gehen. (*Ueber das Sauerstoffbedürfniss der Schlammbewohner, Zeitschrift f. phys. Chemie XII. 1888. pg. 565—567*).

In den „researches on the problematical organs of the Invertebrata“ bespricht A. B. Griffiths kurz auch die Segmentalorgane von Lumbricus terrestris, in denen Harnsäure, aber kein Harnstoff, kein Guanin und kein phosphorsaurer Kalk nachgewiesen werden konnte (*Proc. R. soc. Edinburgh vol. XIV. 1886/87 pg. 230 bis 238*).

c) Faunistik und Systematik.

C. Chun unternahm mit dem Dampfer der zoologischen Station in Neapel mehrere Fahrten an tiefe Stellen des Mittelmeeres, um zu constatiren, ob zwischen der unteren Verbreitzungszone der oberflächlichen pelagischen Thierwelt (etwa 150 mtr.) bis zum Grunde

pelagische Thiere in grösserer Zahl vorkommen; hierzu bediente er sich eines in bestimmter Tiefe sich schliessenden Netzes und fand, dass in allen untersuchten Tiefen (bis 1400 mtr.) ein reiches pelagisches Thierleben existirt, dem Thiere angehören, die nie oder nur selten an die Oberfläche kommen; ein Theil der pelagischen Oberflächenthierwelt geht im Sommer in die Tiefe. Als typische, pelagische Tiefseethiere können betrachtet werden einige Radiolarien, *Tomopteris euchaeta* n. sp., vielleicht auch *T. elegans* n. sp., einige Phronimiden, Euphausiden, mehrere Decapoden, drei Spirialis-Arten, 2 Cephalopoden und 2 Appendicularien (*Die pelagische Thierwelt in grösseren Meerestiefen und ihre Beziehungen zu der Oberflächenfauna in: Bibliotheca zoologica hrsg. von Leuckart u. Chun. Hft. 1. Cassel 1888. 70 pg. fol. 5 Taf.*).

Der „second rep. on the mar. fauna of the south-west of Ireland“ von **Haddon** und **W. S. Green** berichtet im ersten Theile über die Fahrten und deren Ausbeute (Echinodermen, Mollusken etc.) und beschreibt im zweiten Abschnitte die Dredge- und Sondirungsapparate (*Proc. roy. irish Acad. III ser. vol. I Dublin 1888/89 pg. 29—56*).

In dem „first report upon the fauna of Liverpool Bay“ etc. (London 1886 pg. 144—160.) bearbeitet **R. J. Harvey Gibson** die Würmer:

Nemertea.

- Malacobdella grossa* Müll. in *Cypripina islandica*.
- Carinella linearis* Mont.
- Lineus marinus* Mont.
- Borlasia octoculata* Johnst.

Chaetognatha.

- Sagitta bipunctata* Qu. a. Gaim.

Gephyrea.

- Thalassema* sp.?

Hirudinea.

- Pontobdella muricata* L.

Oligochaeta.

- Lumbricus lineatus* Mull.

Polychaeta.

- Hermione hystrix* Lav.
- Aphrodite aculeata* L.
- Lagisca propinqua* Malmgr.
- Harmothoe lunulata* D. Chiaje.
- Acholoë astericola* D. Chiaje.
- Harmothoe haliaeti* Mc Int.
- Harmothoe imbricata* S.
- Malmgrenia castanea* Mc. Int.
- Iphione muricata* Lav.
- Polynoë floccosa* Lav.
- *squamata* L.

Hermadion assimile Mc Jnt.

Sthenelais zetlandica Mc Jnt.

Pholoë minuta Fabr.

Sigalion sp.?

Nephtys longisetosa Oerst.

— *margaritacea* Sars.

Eulalia viridis Müll

Phyllodoce lamelligera Johnst.

— *vittata* Ehl.

— *attenuata* Carr.

— *clava* Carr.

Syllis armillaris Müll.

— *prolifera* Müll.

Pollicita peripatus Johnst.

Syllis noctiluca Sav.

Myrianida fasciata M.-Edw.

Nereis pelagica L.

— *viridis* L.

Nereis brevimana Johnst.

— *margaritacea* Leach.

— *Dumerilii* Aud. et M.-Edw.

Nereis bilineata Johnst.

Lumbriconereis fragilis Müll.

Eunice sp.?

Goniada maculata Johns.

— *alcockiana* Carr.

Glycera alba Müll.
Ophelia coarctata M.-Edw.
Maea mirabilis Johnst.
Spiochaetopterus typicus Sars.
Spio seticornis Fabr.
 — *quadricornis* Lam.
Nerine vulgaris Johnst.?
 — *coniocephala* Johnst.
Arenicola poscatorum Lam.
Cirratulus borealis Lam.
 — *cirratus* Müll.
Sabellaria alveolata Sav.
 — *crassissima* Lam.
Sabella unispira Sav.?
Pectinaria belgica Pall.
 — *auricoma* Müll.
Ops spp.?
Amphitrite ventilabrum Rost.

Siphonostomum gelatinosum
 Hilbr.
Terebella conchilega Pall.
 — *crysodon* Mont.
 — *constrictor* Mont.
 — *nebulosa* Gr.
Thelepus circinatus Fabr.
Sabella penicillus L.
Dasychone luullana D. Ch.
Serpula vermicularis L.
 — *triquetra* L.
Spirorbis borealis Dav.
 — *lucidus* Mont.
 — *minutus* Mont.
Filograna implexa Berk.
Protula protensa Gr.
Tomopteris onisciformis Eschsch.

Das von Herdman ebendasselbst (pg. 318) gegebene Verzeichniss der Invertebraten der Insel Man umfasst 2 Planarien, 2 Nemertinen, 1 Sagitta und 24 Polychaeten (pg. 332–333).

„Faunistische Untersuchungen in der Bucht von Wismar“ hat M. Braun mit Unterstützung des „Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg“ im Herbst 1887 ausgeführt; die Ausbeute an Würmern ergab 3 Species Turbellarien, 3 Nemertinen, 1 Chaetognathen, 1 Hirudineen, 11 Polychaeta und 1 Gephyreen und zwar lauter Formen, die bereits aus der Ostsee bekannt sind (*Archiv d. Ver. d. Frde. d. Naturgesch. i. Mecklenburg* 42. Jahrg. 1888 *Güstrow* pg. 57–84).

R. Schneider hat die Gewässer verschiedener Gruben auf ihre Fauna untersucht, die besonders aus Crustaceen gebildet wird; er erwähnt aus den Erzgruben von Clausthal im Oberharz rhabdocoele Turbellarien (*Stenostomum*, *Prostomum* (? die angezogene Abbildung entspricht einem Vortex), ferner *Polycelis nigra* Müll., *Tubifex rivulorum* Lam., *Ichthydium* sp. und *Aeolosoma* sp., letztere Art aus den Braunkohlewässern bei Halle (*Ueber subterrane Organismen* — Ber. d. Kgl. Realschule zu Berlin, Programm für Ostern 1884 — Ostern 1885. Berlin 1885).

Die Notiz von Zacharias: „Die Thierwelt der Eifelmaare“ berichtet nur über die Thatsache der erfolgten Untersuchung und macht einige Kruster und Rotatorien namhaft (*Biol. Centralbl.* VIII pg. 574); das Gleiche gilt von der Mittheilung desselben im *Zool. Anz.* XI. 1888. pg. 705–706).

O. Zacharias hat nunmehr auch die beiden zwischen Halle und Eisleben gelegenen Salzseen befishet, um das „faunistische Inventar“ derselben seinen Nachuntersuchern zu überliefern und giebt unter Benutzung früherer Arbeiten, welche Protozoen, Coelenteraten, Mollusken und Crustaceen betreffen, eine Liste der vorkommenden

Arten — 37 Protozoen, 8 Coelenteraten, 8 Rotatorien, 7 Turbellarien, 3 Oligochaeten, 85 Crustaceen und 20 Mollusken! Die Fauna ist eine reine Süßwasserfauna, was bei dem geringen Salzgehalt (0,15 bis 0,30%) nicht anders zu erwarten war (*Zur Kenntniss der Fauna des süßen und salzigen Sees bei Halle a. S. Zeitsch. f. wiss. Zool.* 46 Bd. 1888. pg. 217—232).

Nach Zacharias besteht „die Microfauna fliessender Gewässer Deutschlands (von denen, beiläufig gesagt, der Autor behauptet, dass sie überhaupt noch nicht systematisch durchforscht seien!) ihrem Haupttheile noch aus Protozoen und Würmern — scheint also recht arm; doch der eifrige Durchforscher unsrer süßen Gewässer betont selbst, dass man mit einer einzigen Excursion zu einem abschliessenden Resultate nicht gelangen könne; gefischt wurde, zum Theil nur vom Ufer aus, in der Saale, der Elster, der Mulde, der Elbe, der Oder und dem Rheine und zwar mit Ausnahme der Saale an je einem Orte; so ist es nicht zu verwundern, dass die Liste der erbeuteten Thiere fast nur weit verbreitete Rotatorien, Infusorien, einige Turbellarien und wenige Kruster anführt (*Biolog. Centralbl.* III. 1887/88 pg. 762—765) Vergl. hierzu die Bemerkungen von Imhof: *Zool. Anzeig.* XI. 1888 pg. 1888).*)

II. Ringelwürmer.

A. Polychaeta (incl. Archiannelidae).

a) Anatomie und Entwicklung.

Ed. Meyer hat in den Fortsetzungen seiner „Studien über den Körperbau der Anneliden“ es unternommen, eine Erklärung für das so abweichende Verhalten der Nephridien im Thoracalabschnitte der Serpulaceen und Hermellen zu geben (vergl. J. Ber. Vermes 1886/87 pg. 80) wozu er die Gesamtorganisation dieser Thiere bearbeitete und zu der Anschauung gelangte, dass beide Gruppen nahe verwandt sind und dass Hermella den Schlüssel zum Verständniss der vielfach sehr sonderbaren Verhältnisse der Serpularien abgibt. Der Grund für die Umgestaltung der Thoracalnieren liegt nicht in diesen Organen selbst, sondern in der abweichenden allgemeinen Körperform, die wiederum durch die fest-sitzende Lebensweise und den Röhrenbau bedingt ist. Eine ganze Reihe von Umgestaltungen und Verschiebungen haben an verschiedenen Organsystemen stattgefunden, die alle im Einzelnen zu verfolgen hier nicht möglich ist; wir heben daher aus dem Capitel: „Vergleiche und Schlussfolgerungen“ einige Punkte hervor:

Die in den Bauchschildern angehäuften Bauchdrüsen kommen bei den typischen Serpulaceen und Hermellen als die Ursprungsstätten des Röhrenkittes in Betracht; sie finden sich auch bei Terebelliden und Chaetopteriden und über-

*) Verzeichniss derjenigen Werke, welche dem Ref. nicht vorgelegen haben, befindet sich am Schlusse des Berichtes.

all am stärksten entwickelt am Vorderende, welches für die Verlängerung und Vergrößerung der Wohnröhre zu sorgen hat. Ursprünglich auf der Bauchseite gelegen breiten sich die tubiparen Organe der vorderen Körperregion allmählich von der Mitte nach beiden Seiten hin aus, wie das auch während der entogenetischen Entwicklung geschieht, und zwar um so mehr, je näher sie sich dem Vorderende des Wurmes befanden. Die direkte Folge hiervon ist nun eine derartige Verschiebung der beiden Seitenlinien nebst allen ihren Organen, den neuralen und haemalen Parapodien, den Nephridien etc. nach oben, dass sie in der Brustregion nicht mehr einen horizontalen, sondern einen von hinten nach vorn gegen den Rücken hin aufsteigenden Streifen an beiden Seiten des Körpers einnehmen. Analoge Organe sind die Drüsencomplexe an den Parapodialpolstern und die drüsigen hämalen Schwanzschilde der Serpuliden. Die bei den Eriographiden vorkommende, gleichmässige Vertheilung der Drüsen über die ganze Haut dürfte als Anpassung an die wieder beweglichere Lebensweise dieser Würmer gedeutet werden. Auch die Abweichung der Kothrinne nach dem Rücken des Thorax zu dürfte mit der stärkeren Entfaltung der thoracalen Bauchschilde im Zusammenhange stehen. — Als Werkzeuge beim Röhrenbau dienen der Halskragen der Serpulaceen und die Thoracalmembran der Serpuliden i. e. S.; das Collare legt sich in mehreren getrennten Particen an: der neurale Kragenlappen dürfte auf das — fehlende — Bauchschild des ersten Somites, die lateralen Kragenlappen auf neurale Parapodialcirren des ersten Somites zurückzuführen sein, während bei den Hermellen die Bauchzapfen des ersten Somites dem neuralen Kragenlappen der Serpulaceen homolog sind. Die Thoracalmembran der Serpuliden fasst Meyer als das Produkt der Verwachsung der sämtlichen, zuerst blattförmig gewordenen Bauch- und Rückencirren unter einander auf beiden Seiten des Thorax auf; in anderen Serpulaceengruppen sind diese Cirren ganz verloren gegangen. — Die Kopfkienestützen der Serpulaceen sind die umgestalteten, haemalen Chaetopodien des ersten Somites, in denen die Borstenbildung unterdrückt ist und die beiden Hälften des zur Vertheidigung dienenden Paleenapparates der Hermellen sind den Kopfkienestützen der Serpulaceen homolog, da sie die median vereinigten, über das Prosoma nach vorn hinaus gewachsenen haemalen Chaetopodien des ersten Segmentes sind; dies wird auch durch die Innervationsverhältnisse dieser Organe bei den Hermellen bewiesen, wogegen die Anordnung der Gefässe als zu stark abgeändert keine Anhaltspunkte für diese Auffassung giebt. Die stärkere Ausbildung der Borsten in den Paleen der Hermellen wird dadurch erklärt, dass deren Vorfahren sich in den Meeresboden einwühlten und ihre vorderen Fusstummel hierbei benutzten, wie es die Amphoretiden und Amphicteniden thun; in Folge dessen kräftigten sich die Borsten und deren Musculatur und konnten später nach Aufgabe des Grabens um so besser zum Schutze verwerthet werden. Bei den Serpulaceen mussten die Borsten mit der Ausbildung der Kopfkien überflüssig werden, da sie den Röhreneingang nicht mehr beherrschten, und allmählich ganz verschwinden. — Die terminale Lage des Mundes bei den tubicolen Anneliden ist eine Errungenschaft dieser; in Folge des Vorrückens der Mundöffnung wurde auch der Kopflappen aus seiner ursprünglichen Lage auf die Rückenseite des Thieres zurückgedrängt, wie es bei den heutigen Spioniden, Polydoren und Chaetopteriden der Fall ist. — Die Kopfkien der Serpulaceen müssen, wie es ihre Entwicklung und die Inner-

virung beweist, als umgewandelte neurale Kopftentakel gedeutet werden, denen die Mundtentakel der Hermellen entsprechen. — Das stark entwickelte sympathische Nervensystem der Hermellen und Serpulaceen deutet darauf hin, dass ihre Vorfahren eine kräftige Schlundbewaffnung besessen haben und dennoch dürfte der gerade, aller Anhangsorgane entbehrende Vorderdarm keinen ursprünglichen, sondern einen vereinfachten Zustand repräsentiren. Die Veränderung der Mundstellung musste den sonst nach unten gebogenen Vorderdarm sich grade nach vorn ausstrecken lassen, womit eine Lageveränderung der seitlich-unteren Hirncentren Hand in Hand ging. — Was endlich das Nephridialsystem anlangt, so geht aus der Entwicklungsgeschichte hervor, dass nicht nur der Nephridialporus, sondern auch der ectodermale Abschnitt des medianen Canales eine praeorale Bildung ist, die erst secundär mit den in umgekehrter Richtung ihr entgegenwachsenden, paarigen Anlagen der Nierenschläuche in Verbindung tritt. Der ectodermale Canalabschnitt wird bei der Larve über dem Gehirn als offene, hämale Wimperrinne angelegt, welche, da sich die oberen, hinteren Hirnlappen ihr dicht anlagern, als Homologon der Wimperorgane erscheint. Durch das Aufrücken des Rumpfes auf den Kopflappen kamen die beiden ursprünglichen Mündungen des ersten Nephridienpaares in so nahe Beziehungen zur Wimperrinne, dass sie bei der Umwandlung derselben in ein abgeschlossenes Rohr in dieses hineingeriethen. Es sind also keine mit den Functionen des Excretions-systemes selbst in Zusammenhang stehenden Vorgänge gewesen, welche diese merkwürdigen Verhältnisse zu Stande gebracht haben, sondern die ganze Reihe jener durch den beständigen Aufenthalt in Wohnröhren und durch den Röhrenbau bedingten Verschiebungen und Gestaltveränderungen am vorderen Körperabschnitte — und so ist die abweichende Thoracalnierenform der Serpulaceen und Hermellen eine Folge der bis zum Extrem gesteigerten tubicolen Lebensweise, der diese Würmer sich hingegeben haben (*Mittheilungen des zool. Stat. Neapel VIII. 1888. pg. 462—462. 3 Taf.*).

Nach A. Soulier benützt Myxicola das zwischen den Kiemen secernirte Schleimband nicht zum Aufbau der Röhre, vielmehr hüllen sich solche Würmer, denen der Kiementrichter abgeschnitten wurde, gleichfalls in Schleim ein; ebenso verhält sich Branchiomma; der Schleim stammt aus kleinen Haufen von Hautdrüsen der Ventralseite des Körpers. (*Sur la formation du tube chez quelques Annelides tubicoles — Compt. rend. Ac. Paris. Tom. 106. 1888. I. pg. 505—507* — hiernach ist das Citat der Arbeit im vorig. J. Ber. pg. 91 zu verbessern).

In der Fortsetzung seiner Studien über Chaetopterus Valencinii berichtet J. Joyeux-Laffule (vergl. J. Ber. 1886/87 pg. 69) nunmehr über das Nervensystem; in der mittleren und hinteren Region findet sich eine doppelte Ganglienketten, die im Grunde der grossen Längsfurche gelegen ist; jedes Segment besitzt zwei spindel-förmige Ganglien, die unter einander durch 2 Paar Connective und durch mehrere, an Zahl und Dicke variirende Commissuren verbunden sind. Von jedem Ganglien gehen drei Nerven dorsal, drei ventral ab, bilden jedoch nicht, wie Jourdain will, ein Netzwerk in den blasig aufgetriebenen Ringen — letzteres besteht vielmehr aus Muskelfasern. In der vorderen Region zeigen sich andre Verhält-

nisse, doch weichen diese nicht so sehr ab, als man bisher annahm; die Ganglien sind auseinander gezogen und bilden breite Streifen, die Zahl der Commissuren ist vermehrt etc., doch lässt sich immer eine Hirnpartie mit den Nerven für die Sinnesorgane und eine ventrale Partie unterscheiden (*Sur le système nerveux du Chætoptère* — *Compt. rend. Ac. Paris. Tome 106. 1888. I. pg. 148 bis 151*). Vergl. über denselben Gegenstand C. Cosmovici (Rev. scientif. (3) T. 41 pg. 669) und Joyeux-Laffuie (ibid. T. 42 pg. 29).

Die von F. E. Beddard beschriebene *Chloeia merguensis* n. sp. besitzt wie andere Amphinomiden 2 Paar Augen, die aber gleich gebaut sind; sie zeichnen sich aber dadurch aus, dass ihre Linse wie bei Insekten in direktem Zusammenhang mit der Körpercuticula steht (*Rep. Annel. Merg. Arch. — Journ. Linn. soc. Zool. vol. XXI No. 131. London 1888 pg. 264—266 with fig.*); vergl. hierzu: Kennel, die Ableitung der sog. einf. Augen der Arthrop. von Augen der Anneliden — *Stzgsb. d. Dorp. Naturf.-Ges. VIII. 3. 1888. Dorpat 1889 pg. 405—406*.

Die kleinen auf den Spitzen der Kiemenfäden stehenden Augen von Branchiomma sind nach C. Brunotte ebenso gebaut wie die beiden grossen Augen der starren Fäden und erweisen sich als zusammengesetzte Augen, wie sie bisher von anderen Anneliden nicht bekannt sind (*recherches sur la structure de l'oeil chez un Branchiomma* — *Compt. rend. Ac. Paris Tom. 106. 1888. I. pg. 301—303, Journ. R. micr. soc. London 1888. pg. 219—220, Americ. Naturalist XXII. pg. 403*).

C. Grobben führt seine Mittheilungen über „die Pericardialdrüse der chaetopoden Anneliden nebst Bemerkungen über die perienterische Flüssigkeit derselben“ (vergl. J. Ber. Vermes 1886/87 pg. 77) weiter aus und zieht Litteraturangaben über das Vorkommen dieser Drüse heran; es handelt sich um drüsige Differenzierungen des Epithels der secundären Leibeshöhle, wie sie in den Chloragogenzellen, den mit solchen Zellen bedeckten Anhängen des Rückengefässes bei Lumbriculiden vorkommen; auch über Polychaeta existiren solche Angaben. Die Leibeshöhlenflüssigkeit ist ein Excret, doch kann dasselbe nutritive Eigenschaften besitzen. (*Stzgsber. d. K. Akad. d. Wiss. math.-nat. Cl. XCVII Bd. Jahrg. 1888. I. Abth. pg. 250—263. Wien 1888*).

J. F. Cunningham giebt kleinere Notizen zur Anatomie der Polychaeten: bei *Arenicola marina* L. bestätigt er die Angabe Cosmovici's von der Lage der Geschlechtsdrüsen an den Nephridien; dagegen gelang es nicht, die Bildungsstätte der Keimzellen bei *Cirratulus cirratus* Malmgr. zu finden. Bei *Nerine cirratulus* Clap. liegt dieselbe an einem blasig erweiterten Abschnitte des Nephridiums. Es folgt eine Beschreibung der Segmentalorgane von *Lanice conchilega* M., *Pectinaria belgica* Lam., bei welcher Art an der Basis der Kieme ein drüsiges Organ von zweifelhafter Function gelegen ist; sie besitzt nur 3 Paar Nephridien von dem gewöhnlichen Bau; dagegen sind die Organe von *Nereis virens*

Sars sehr stark aufgewunden und von sehr kleinem Caliber. Sodann wird der sogenannte Herzkörper (Horst) bei verschiedenen Anneliden geschildert und schliesslich die Neuralcanäle, die nicht mit Ganglienzellen in Verbindung stehen und deshalb keine nervösen Elemente sind, als Stützorgane erklärt, welche Knickungen des Bauchmarkes verhindern sollen (*some points in the anatomy of polychaeta* — *Quart. journ. micr. sc.* vol. XXVIII. 1888 pg. 239—278. 3 pl.) Vergl. hierzu: **Horst R. Mr. Cunningham on the „cardiac body“** — *Zool. Anz. XI.* 1888. pg. 135—138).

Nach **Chun's** Beobachtungen an *Tomopteris elegans* und *euchaeta* n. sp. haften ohne Ausnahme an den Eizellen je sieben kleine Zellen an, die auch noch bei einem Theil der in der Leibeshöhle flottirenden Eier sich nachweisen lassen, bei anderen abgefallen sind; ihr späteres Schicksal ist fraglich. Bei Untersuchung der Ovarien stellte es sich nun heraus, dass dieselben aus Fächern von je 8 gleich grossen Zellen sich zusammensetzen, von denen nur immer eine Zelle zur Eizelle wird (*Pelag. Thierwelt etc. in: Bibl. zoolog. Heft. I. Cassel 1888 pg. 19—24*).

Ein ausführliches Referat über „**Kleinenberg on the development of Lopadorhynchus**“ (cf. J. Ber. Vermes 1886/87. pg. 81) giebt **G. C. Bourne** (*Quart. journ. micr. sc. tom. XXVIII. 1888. pg. 531—546*).

Nach den kurzen Bemerkungen von **W. A. Haswell**: „on the embryology of *Vermilia caespitosa* and *Eupomatus elegans*“ verläuft die Furchung aequal; es entsteht eine Blastosphaera, dann eine Invaginations-Gastrula, deren ursprünglich terminaler Blastoporus ventralwärts rückt und sich stark verlängert; der vordere Theil desselben wird zum Mund und in der Nähe des hinteren bildet sich später der Anus; die Larve streckt sich, bildet ihre Darm- und Wimperringe aus und entwickelt vom Ectoderm her eine dünnwandige Blase, die durch einen neben dem Anus gelegenen Porus nach aussen mündet (*Jott. fr. biol. labor. Sydney Univ. — Proceed. Linn. soc. New South Wales. II ser. vol. II. for 1887. Sydney 1888 pg. 1032—1034*).


L. Roule kommt auf seine schon früher vertretene Ansicht zurück, dass bei den Anneliden, speciell *Dasychone lucullana* und *Enchytraeoides Marionii*, die innere Zellschicht als ein Mesoendoblast zu betrachten ist, da sie sich mit der Ausbildung des Darmlumens in eine centrale (Endoblast) und periphere Lage (Meso-blast) spaltet; das Endoblast einer Coelenteraten-Gastrula entspricht demnach nicht dem Endoblast der Gastrula (oder Planula) eines Coelomaten (*Observ. sur la genèse et l'évolution des feuilletés blastodermiques chez les annelides in: Rev. biolog. du Nord de la France ann. 1888/89. No. 1. pg. 1—6*).

b) Systematik, Faunistik, Biologie.

„In seinen „Notes on some of the polychaeta collected by the L. M. B. C.“ behandelt **R. J. Harvey Gibson** zuerst den Werth der Borsten bei der Artbestimmung, — dieselben variiren oft; hierauf

folgt die Beschreibung von *Malmgrenia castanea* Mc. Int. und *Hermadion assimile* Mc. Int. und endlich die Synonymie von *Pectinaria belgica* Pallas und *P. auricoma* Müll. (*The first rep. up. fauna Liverpool Bay London 1886 pg. 342—353. pl. VII. VIII.*)

Ed. Meyer (Mitth. zool. Stat. Neapel VIII. 1888 pg. 643—656) weist nach, dass die Vorfahren der Serpulaceen und Hermellen ein Stadium durchgemacht haben, auf dem sie den Spioniden sehr ähnlich waren, aber von ihrer mit diesen gemeinsamen, freilebenden Stammform noch gewisse Charaktere beibehalten hatten, welche die heutigen Spioniden nicht mehr besitzen; mit den letzteren sind die Hermellen näher verwandt als die Serpulaceen, da sie in direkterer Linie von ihnen herstammen. Die Verwandtschaft der in Betracht kommenden Formen stellt der Autor wie folgt dar:



Baron de Saint-Joseph setzt seine Studien über „annélides polychètes des côtes de Dinard“ fort (cf. J. B. 1886/87 pg. 88) und behandelt:

A. Fam. *Aphroditiens* Sav.

I. Tribus *Hermionea* Gr.

1. Gen. *Aphrodite* L. mit *aculeata* L.
2. Gen. *Hermione* Blv. mit *hystrix* Sav.

II. Tribus *Polynolna* Gr.

3. Gen. *Lepidonotus* Leach mit *squamatus* L., *pleiolepis* Marenz.
4. Gen. *Halosydna* Kgb. mit *gelatinosa* Sars (Angaben über den Bau der Elytren).
5. Gen. *Harmothoë* Kbg. mit *imbricata* L., *impar* Johnst., *coeliaca* n. sp., *maxillospinosa* n. sp., *Macleodi* Mc. Int., *areolata* Gr., *spinifera* Ehl., *picta* n. sp., *arenicolae* n. sp. — auf *Arenicola marina* — und *H. reticulata* Olap.
6. Gen. *Hermadion* Kbg. mit *pellucidum* Ehl.
7. Gen. *Lagisca* Mgr. mit *extenuta* Gr.
8. Gen. *Polynoë* s. str. mit *scolopendrina* Sav. var. *brevipalpa*.

III. Tribus *Sigallonia* Gr.

9. Gen. *Pholoë* Johnst. mit *synophthalmica* Clp. var. *dinardensis*.
10. Gen. *Stenelais* Kbg. mit *idunae* Rathke.

B. Fam. *Amphinomiens* Sav.

11. Gen. *Euphrosyne* Sav. mit *foliosa* Aud. Edw., *intermedia* n. sp.

C. Fam. *Eunicieus* Gr.

I. Tribus *Labidognatha* Ehl.

- 12. Gen. *Hyalinoecia* Mgr. mit *Grubii* Mrs.
- 13. Gen. *Eunice* Cuv. mit *Harassii* Aud. Edw.
- 14. Gen. *Marphysa* Qfg. (= *Nausicaa* Kbg. — *Nauphanta* Kbg.) mit *sanguinea* Mont., *Bellii* Aud. Edw., *fallax* Mar. Bobr.
- 15. Gen. *Amphiro* Kbg. mit *Johnsoni* Lang.
- 16. Gen. *Nematonereis* Schm. mit *unicornis* Gr.
- 17. Gen. *Lysidice* Sav. mit *ninetta* Aud. et Edw.

II. Tribus *Lumbriconereidea* Schm.

- 18. Gen. *Lumbriconereis* Blv. (incl. *Zygodobus* Gr.) mit *tingens* Kef., *labrofmbrata* n. sp., *paradoxa* n. sp.
- 19. Gen. *Labrorostratus* n. gen. Tête sans appendices; quatre yeux sur une seule rangée transversale; les deux premiers segments achètes, tous deux de longueur égale; les segments suivants avec soies simples bordées d'une seule espèce. Pieds uniramés, sans cirre dorsal apparent; mâchoire inférieure composée de deux pièces juxtaposées portant en avant de leur point de jonction deux rostrs recourbés réunis à leur base par une barre transversale; mâchoire supérieure rudimentaire, formée d'un long support et de deux très petites pièces dentaires dentelées.“ Lebt parasitisch in der Leibeshöhle von *Odontosyllis ctenostoma*, *Ensyllis monilicornis*, *Syllis prolifera*, *Prionosyllis lamelligera* und *Grubea clavata*; die bis 8 mm. lang werdende Art (*L. parasiticus* n. sp.) hat im Vergleich zu den von ihr bewohnten Syllideen eine enorme Grösse.
- 20. Gen. *Drilonereis* Clpd. mit *macrocephala* n. sp., *flum* Clpd.
- 21. Gen. *Arabella* Gr.

Subg. *Marlovia* Gr. mit *gigantea* Gr.

- 22. Gen. *Ophryotrocha* Clpd. et Mecn. mit *puerilis* Cl.-M.

III. Tribus *Staurocephalidea* Kbg.

- 23. Gen. *Staurocephalus* Gr. (*Anisoceras* Gr. *Prionogonathus* Kef.) mit *rubrovittatus* Gr., *ciliatus* Kef., *pallidus* Lang.
- 24. Gen. *Paractius* Lev. mit *mutabilis* n. sp.

D. Fam. *Lycoridiens* Gr.

- 25. Gen. *Nereis* Quo.
Subg. *Leptonereis* Kbg. mit *Vaillanti* n. sp. (Fortpflanzung!)
Subg. *Leontis* Mgr. mit *Dumerillii* Aud.-Edw.
Subg. *Lipephile* Mgr. mit *cultrifera* Gr., *floridana* Ehl.
Praxitheia Mgr. *irrorata* Mgr.
Nereis str. *procera* Ehl.
- 26. Gen. *Micronereis* Clpd. mit *variegata* Clpd.

E. Fam. *Phyllodoceus* Gr.

- 27. Gen. *Phyllodoce* Sav. (Erörterungen über das Mundsegment) mit *laminosa* Sav., *maculata* Oerst., *splendens* n. sp. *macrophthalma* Schm. und *rubiginosa* n. sp.

28. Gen. Eulalia Oerst. mit *viridis* Müll., *Claparedii* n. sp., *pusilla* Oerst., *splendens* n. sp., *punctifera* Gr., *ornata* n. sp., *trilineata* n. sp., *rubiginosa* n. sp., *pallida* Olpd. *rufescens* n. sp., *venusta* n. sp., *parva* n. sp., *macroceros* Gr., *limbata* Olpd.
29. Gen. Eteone Sav. mit *incisa* n. sp., *foliosa* Quatr.
30. Gen. Mystides Théel mit *bidentata* Lang., *limbata* n. sp.
31. Gen. Notophyllum Oerst. mit *alatum* Langerh.
32. Gen. Lacydonia Mar.-Bobr. mit *miranda* M.-Bobr.

F. Fam. *Hésioniens* gr.

33. Gen. Magalia Mar. Bobr., *perarmata* M.-B.
34. Gen. Oxydromus Gr., *propinquus* M.-B.
35. Gen. Kefersteinia Afg. *cirrata* Kef.
36. Gen. Ophiodromus Sars mit *flexuosus* D. Ch.

(Ann. des scienc. natur. VII sér. Zool. tom. V. 1888 pg. 141—338. pl. 6—13).

Für die grösseren Tiefen des Mittelmeeres (zwischen 500 bis 1300 mtr.) sind nach Chun zwei Tomopteris-Arten ausserordentlich charakteristisch;

die eine, *T. elegans* n. sp. wird 5—6 mm., die andere, *T. euchaeta* n. sp. bis 30 mm. lang. Ferner wurden erbeutet *Alciope Contarinii* Clap. (von der Oberfläche bis 1300 mtr.), *Asterope candida* Clap. (100 mtr.), *Vanadis pelagica* Greeff (in allen Tiefen), *V. crystallina* (150 mtr.), *V. ornata* (800 mtr.), *Callizona* sp. (900 mtr.), *Alciope cirrata* Gr. (600 mtr.) und *Lopadorhynchus brevis* Gr. (1000—1200 mtr.).

(Pel. Thierw. etc. in: Biblioth. zool. Hft. 1. Cassel 1888 pg. 18—25. Taf. III).

A. F. Marion hat im Etang de Berre, in Wasser von 1—2,5%, Salzgehalt die aus Sebastopol von Bobretzky beschriebene *Polynoë incerta* entdeckt, die auch hier von *Phyllodoce lineata* und *lugens*, sowie von *Nereis cultrifera* begleitet wird. (*Les faunes des étangs saumâtres des Bouches-du-Rhône. Discours, Marseille 1886, 8°*)

Braun fand in der Wismarer Bucht: *Arenicola marina* L., *Scoloplos armiger* Müll., *Spio seticornis* Fabr., *Terebella zostericola* Oerst., *Amphitrite Johnstonii* Malmgr., *Spirorbis nautiloides* Lmb., *Polynoë cirrata* Pall., *P. squamata* L., *Nereis diversicolor* M., *N. Dumerili* M.-Edw. und *Nephtys coeca* M. (*cf. l. c. Arch. Ver. d. Frde. d. Naturg. Mecklenb. 42. Jahrg. 1888/89. pg. 72.*)

Aus dem Mergui-Archipel beschreibt F. E. Beddard folgende Anneliden: *Eupompe indica* n. sp., *Chloeia merguensis* n. sp., *Eurythoë alcyonia* Sav., *Branchiomma intermedium* n. sp. und *Dasychone serratibranchus* Gr. (*Report on Annel. f. Merg. Arch. — Journ. Linn. soc. Zool. vol. XXI. No. 131. London 1888, pg. 256—266. 1 pl.*)

E. Ehlers hat die Chaetopoden, welche im Florida-Gebiet von Graf Pourtales und von der „Blake“-Expedition gesammelt worden sind, in einem stattlichen Quart-Bande (335 pg.) mit 60 Taf. dargestellt; es sind im Ganzen 101 Arten in 64 Gattungen, darunter 67 neue Arten. Die Fauna charakterisirt sich als eine tropische, auch entspricht der Besonderheit des durchforschten Gebietes das

Vorkommen der Corallenriffe bewohnenden grösseren Amphinomiden. Auffallend ist die grosse Zahl der Euniciden (13 Gattungen mit 30 Arten, darunter einzelne in sehr zahlreichen Individuen). Beziehungen der Floridaner Annelidenfauna zu anderen faunistischen Bezirken sind wegen der geringen Kenntniss der nicht europäischen Anneliden nur in geringem Grade zu erkennen; einzelne Arten der brasilianischen, westindischen und afrikanischen Küste kommen auch bei Florida vor, Tiefseebewohner sind *Aphrodite oblecta* n. sp. (155 Fdn.), *Onuphis gracilis* n. sp., *Sthenelais simplex*, *Leanira hystricis*, *Rhamphobrachium Agassizii*, ferner zwei Serpuliden (*Hypolopomatus Langerhansi* und *Protis simplex*) und alle gefundenen Vertreter der Maldaniden, Amphicteniden und Amphoretiden, die jedoch wohl durch die lokalen Verhältnisse des Gebietes Tiefseebewohner geworden sind. (*Rep. on the results of dredging under the direction of L. F. Pourtalès und Al. Agassiz etc. XXXI. rep. on the Annelids by E. Ehlers in: Mem. Mus. comp. Zoology Harvard Coll. vol. XV. Cambridge October 1887. 4^o.*)

H. E. Webster und **J. E. Benedict** zählen resp. beschreiben von Eastport, Maine folgende Chaetopoden:

Spinter citrinus St., *Enphrosyne borealis* Oest., *Aphrodite aculeata* L., *Laetmonice armata* Verr., *Lepidonotus squamatus* Kinb., *Nychia cirrosa* Malmgr., *Eunoe nodosa* M., *Lagisca rarispina* M., *Harmothoe imbricata* M., *Pholoë minuta* Oe., *Nephtys ciliata* R., *N. coeca* Oe., *N. incisa* M., *N. discors* Ehl., *Anactis speciosa* Webst., *Phyllodoce groenlandica* Oe., *Ph. badia* M., *Ph. mucosa* Oe., *Eulalia bilineata* n. sp., *E. dubia* W. et B., *Eteone Sarsi* Oe., *E. trilineata* n. sp., *Mystides viridis* n. sp., *abberrans* n. sp., *Gyptis vittata* n. sp.; *Taphus* n. gen.

„Hesionidae with three antennae, two palpi, no tentacular cirri; dorsal setae simple, ventral setae compound; two maxillary pieces in the form of stylets“

mit *hebes* n. sp.; *Syllis pallida* Verr., *Syllides convoluta* Webst. et B., *S. longocirrata* Oe., *Streptosyllis varians* n. sp., *Spaerosyllis brevifrons* W. et B., *Sph. longicauda* n. sp., *Paedophylax hebes* W. et B., *P. brevicornis* n. sp., *P. longicirris* n. sp., *Autolytus cornutus* Ag., *Au. solitarius* n. sp., *Proceraea gracilis* Verr., *Pr. ornata* V., *Nereis pelagica* L., *N. virens* Sars, *Nothria conchylega* Malmgr., *Ninoë nigripes* Verr., *Lumbrinereis fragilis* Aud. et M. Ed., *L. hebes* V., *L. acicularum* n. sp., *Drilonereis magna* n. sp., *Euglycera dibranchiata* V., *Rhyuchobolus capitatus* V., *Goniada maculata* Oe., *Ophelina aulogastra* Gr., *Scalibregma minutum* n. sp., *Arenicola marina* L., *Ephesia gracilis* R., *E. minuta* n. sp., *Trophonia plumosa* Johnst., *Tr. aspera* V., *Zorus* n. gen.

„Tentacles and branchiae arise from a protrusible cylindrical stalk; setae of anterior segments prolonged to form a cephalic cage; setae all capillary; body covered with papillae“ —

mit *Sarsi* n. sp., *Siphonostomum Grubei* n. sp.; *Flabelligera affinis* S., *Brada sublevis* St., *B. granosa* St., *Sternaspis fossor* St., *Etocles* n. gen. Chaetopteridarum

„Head without appendages; buccal segment without setae, with two canaliculate tentacles; dorsal rami (branchiae) situated dorsally, each with concealed seta; ventral rami of first seven setigerous seg-

ments, with superior lingula (cirrus) situated dorsally, and with several rows of simple setae, which arise in front of a lateral plate, which varies in form from segment to segment. Middle region composed of few segments; the ventral rami of this region are elongate, cylindrical, furnished with an external, lateral membrane; the posterior region is composed of numerous segments and differs from the middle region only in the absence of the lateral membrane from the ventral rami; anal cirri, two" —

mit *typicus* n. sp., *Scolecoplepis cirrata* M., *Spionides* n. gen. *Spionidarum*

„Much like *Scolecoplepis*, but distinguished from it by the possession of lateral pouches between the ventral rami, beginning near the anterior end, and continued to the posterior third" —

mit *cirratus* n. sp., *Spio filicornis* Fabr., *S. Rathbuni* W. et B., *Streblospio Benedicti* W., *Prionospio Steenstrupi* M., *Polydora ciliata* Ag., *P. gracilis* V., *Dipolydora concharum* V., *Scoloplos armiger* Oe., *Naidonereis quadricuspida* M., *Aricidea quadrilobata* n. sp., *A. Nolani* n. sp.; *Cirratulus cirratus* M., *Dodecaceria concharum* Oe., *Chaetozone setosa* M., *Tharyx* n. gen. *Cirratulidarum*:

„Head and first two segments without appendages; one pair of tentacular cirri; next segment with dorsal cirri, but without setae; all other segments (normally) with dorsal cirri; setae capillary" —

mit *acutus* und *similis* n. n. sp. sp.; *Cossura* n. gen. *Cirratulidarum*:

„Head and first two segments without appendages; fourth segment with single median cirrus; no lateral cirri (branchiae). Capillary setae dorsal and ventral from the third segment; anal segment with three anal cirri" —

mit *longocirrata* n. sp.; *Ledon* n. gen. *Cirratulidarum*:

„Head with antennae projecting from the anterior margin; branchiae beginning on the buccal segment, limited to the anterior segments, second segment with a pair of short cirri in addition to the branchiae; ventral setae compound, found first on the third segment; dorsal setae capillary, appearing first on the fourth segment" —

mit *sesoculata* n. sp.; *Capitella capitata* v. Ben., *Notomastus capillaris* Verr., *Rhodine Loveni* M., *Nicomache lumbricalis* M., *Praxillella zonalis* V., *P. praeterrimissa* V.; *Clymenella torquata* V., *Owenia assimilis* Sars, *Myriochele Heeri* M., *Cistenides granulata* M., *Ampharete cirrata* n. sp., *A. trilobata* n. sp., *Sabellides octocirrata* S., *Melinna cristata* M., *Amphitrite brunnea* V., *A. cirrata* Müll., *Nicolea zostericola* M., *Scione lobata* M., *Thelepus cincinnatus* M., *Ereutho Smitti* M., *Polycirrus? phosphoreus* V., *Artacama proboscidea* M., *Trichobranchus glacialis* M., *Terebellides Stroemi* S., *Sabella spitzbergensis* M., *Potamilla reniformis* M., *Othonia Fabricii* Johnst., *Myxicola Steenstrupi* Pr. und *Filigrana implexa* Berkl.

(*Annelida chaetopoda* from Eastport, Maine—Un. St. comm. of fish and fisher. p. XIII. report of the comm. for 1885. Washingt. 1887 pg. 707—755. 8 pl.)

Chaetopterus pergamentaceus Cuv. an der Mündung des Manatee-Flusses, Florida (Leidy: *Chaetopterus from Florida* — *Proc. Acad. nat. scienc. Philadelphia* 1888 pg. 73—74).

B. Gephyreæ.

C. Ph. Sluiter beschreibt: zwei merkwürdige Gephyreen aus der Bai von Batavia; die eine Form (*Diphtera octoplax* n. g. n. sp.) entpuppte sich bald als eine Octactinie, eine Edwardsia, die andere ist eine neue Art von *Thalassema* (*Th. diaphanes* n. sp.), die in 10—12 Faden Tiefe lebt und eine sehr dünne, durchsichtige Haut besitzt (*Natuurk. Tijdschr. voor Nederl. Indie XLVIII. 1888. pg. 233—250. 2 Taf. und Zur Berichtigung — Zool. Anz. XII. 1889 pg. 47—48*).

Aus dem Mergui-Archipel zählt **E. Selenka** folgende Gephyreen auf: *Phascolosoma pellucidum* Kef., *Phymosoma japonicum* Gr., *Sipunculus robustus* Kef., *S. porrectus* n. sp. mit deutlichen Quer- ringen und *Bonellia* sp. (*On the Gephyreans of the Merg. Arch., collect. f. the trustees of the Ind. Mus. Calcutta — Journ. Linn. soc. Zool. vol. XXI No. 130. London 1887 pg. 220—222*).

J. de Guerne's Bearbeitung der von der Cap-Horn-Expedition erbeuteten Priapuliden ist erschienen, vergl. Jahresber. 1886/87 pg. 95 (*Priapulides Zoologie T. VI. Miss. scientif. du cap Horn. Paris 1888. 20 pg. 4^o*).

Halicryptus spinulosus v. Sieb. in der Wismarer Bucht cf. **Braun** (*Arch. d. Ver. d. Frde. d. Naturg. Mecklenb. 42. Jahrg. 1888/89 pg. 72*).

C. Oligochaeta.

a) Anatomie und Entwicklung.

Nach den Untersuchungen von **N. Kulagin** ist die Cuticula der Lumbricidae kein Chitin, sondern eine Vorstufe desselben; auch löst sie sich in ganz schwacher Salzsäure auf, wie solche im Humus sich befindet; hiergegen sind die Regenwürmer durch ein schwach alkalisch reagirendes Secret ihrer Hautdrüsen geschützt; die Substanz des Cocons ist von der der Cuticula verschieden. Die Zahl der Falten auf den Kalkdrüsen vermindert sich im Winter und vergrößert sich im Sommer. Die Färbung von *Lumbricus rubellus* wird durch ein grünes, in Wasser lösliches und ein rothes, durch Aether fällbares Pigment bewirkt. An *Tubifex* n. sp. von Roscoff werden Kalkdrüsen beobachtet. Die aus der Mundhöhle und dem Pharynx ausgeschiedene Flüssigkeit hat eine alkalische Reaction und verwandelt Stärke in Zucker, Fibrin in Pepton; die Kalkdrüsen verwandeln Stärke in Zucker; der Magensaft steht in der Wirkung dem Tripsin nahe, wirkt aber kräftiger bei schwach saurer Reaction; auch die Zellen der Typhlosolis erzeugen ein pancreatisches Ferment. (*Zur Anatomie und System. d. in Russland vorkommenden Fam. Lumbricidae — Zool. Anz. XI. 1888. pg. 231—236; Journ. R. micr. soc. London 1888. pg. 581*).

F. E. Beddard beschreibt *Allurus tetraëdrus* Eis. anatomisch und giebt die Unterschiede zwischen *Lumbricus* und *Allolobophora*

an (*On the anatomy of All. tetr.* — *Quart. journ. micr. sc.* vol. XXVIII. 1888. pg. 365—371. 1. pl.)

Ueber *Hormogaster Redii* (cf. Jahr. Ber. 1886/87 pg. 107) macht D. Rosa folgende anatomische Angaben: Haut reich an Drüsenzellen, Rückenporen fehlen; Gehirn im dritten Segment wie bei *Lumbricus*; vordere Dissepimente dick und trichterförmig, vom 8—9 zum 15—16. Segment schräg. Darm mit drei Magensäcken im 6. 7. und 8. Segment, Oesophagus endet im 20. Segment; vom 21 bis 29 incl. laterale Blindsäcke. Typhlosolis vorn in 7 grosse Längsfalten getheilt, hinten einfach. Circulationsapparat mit Rückengefäss und 7 Paar vorderen, pulsirenden Schlingen. 2 Paar freie Hoden im 10 und 11, ein Paar Ovarien im 13. Segment; zwei Paar Samenblasen im 11 und 12, 2 Paar Pavillon der Vasa deferentia im 10 und 12. Segment; die Vasa deferentia jeder Seite vereinigen sich im 12—13. Segment und münden zwischen 15 und 16 nach aussen; Prostata, Penisborsten etc. fehlen; die beiden Oviducte beginnen im 13. und münden im 14. nach aussen; sie besitzen ein *Receptaculum ovarum*; die einfachen Spermatheken liegen zwischen 9—10, 10—11 und 11—12. Segment; die Nephridien münden ein wenig dorsal von der zweiten Borstenreihe aus. Es sei bemerkt, dass in Folge schrägen Verlaufes der Dissepimente in der Region der Geschlechtsorgane die äusseren Ringel der Zahl nach nicht mit den inneren Segmenten übereinstimmen, wenigstens nicht auf der Rückenseite (*Sulla struttura dell'Hormogaster Redii in: Bollett. Mus. Zool. Anat. compar. di Torino. Vol. III. No. 35. 1888. 2 pg. u. Mem. R. Accad. sc. Torino (2). Tom. 39.*)

Auch in diesem Berichtsjahre erhalten wir eine Studie über „*Criodrilus lacuum Hoffm.*“ (cf. J. Ber. 1886/87 pg. 97) und zwar durch A. Collin: nach geschichtlichen Angaben, Mittheilung der Behandlungsmethoden, Schilderung der äusseren Merkmale, der Lebensweise und Verbreitung wird die Anatomie dargestellt. Die Fasern der Cuticula schneiden unter 45° die Längsachse; zwischen den Cylinderzellen der Hypodermis finden sich nur spärliche Drüsenzellen; im Kopflappen und ersten Segment kommen becherförmige Organe vor. Die Anordnung der Muskeln findet der Autor wie sie Rosa darstellt, nur kann er an der dorsalen Längsmuskulatur keine mediane Unterbrechung sondern nur eine Verdünnung der Schicht sehen; die einzelnen Muskelfasern sind bandartig abgeplattet. In Bezug auf Bau- und Anordnung des Nervensystems werden die Angaben *Vejdovsky's* bestätigt und z. Th. erweitert. *Criodrilus* besitzt ein dorsales, ein ventrales und ein subneurales Gefäss, wie die *Lumbriciden*; alle Gefässe stehen vorn und hinten durch Anastomosen in Verbindung und ausserdem gehen in jedem Segment vom Rückengefäss seitliche Gefässe zum Bauchgefäss; die des 7.—11. Segmentes sind gross und contractil. Die im Rückengefäss vorkommenden Klappen, welche segmental angeordnet sind, sind nicht blutbereitende Organe, sondern schliessen bei der Contraction des Gefässes zwei benachbarte Kammern gegen einander ab. Wegen des grossen

Reichthums an Blutcapillaren in der Haut des Schwanzes wird dieser vorzugsweise zum Athmen benutzt. Segmentalorgane finden sich auch in den Geschlechtssegmenten; eine Typhlosolis im Magendarm kommt vor. Die Hoden liegen paarweise im 10. und 11. Segment, vier Paar Samenblasen im 9.—12. Segment; die vier Samenleiter vereinigen sich jederseits im 12. Segment zu einem Vas deferens, das im 15. Segment ausmündet; zwei Ovarien im 13. Segment, receptacula ovarum im 14. Segment, Trichter des Eileiters im 13., Ausmündung des Canales im 14. Segment vor den männlichen Genitalporen; Samentaschen nicht gefunden; das Clitellum bildet eine leichte, wenig sichtbare Anschwellung des Körpers von den Geschlechtssegmenten ab bis etwa zum 50. Segment; es ist reich an Drüsenzellen (Zeitschr. f. wiss. Zool. 46 Bd. 1888 pg. 471—497. Taf. XXXIII).

Eine grössere Arbeit **W. B. Spencer's**: *The anatomy of Megascolides australis* (Trans. Roy. Soc. Victoria vol. I. 1888. pg. 1—60 with 6 pl.) ist Ref. nicht zugänglich; er beschränkt sich daher auf die Wiedergabe des allgemeinen Theiles dieser Arbeit, die unter dem Titel „The giant eathworm of Gippsland“ (*Nature* vol. 39 1888/89 pg. 394—395) erschienen ist:

Megascolides bewohnt gern die von Landkrabben gegrabenen Höhlungen, die er mit einer schleimigen, aus den Rückenporen hervortretenden Masse auskleidet; letztere wird, wenn man den Wurm in der Hand hält, einige Zoll hoch herausgespritzt. Frische Thiere riechen nach Creosot, welcher Geruch beim Absterben stärker hervortritt; dies mag die Ursache sein, dass Hühner diesen Regenwurm verschmähen. So lebhaft das Thier in seinen Gängen sich bewegt, so träge ist es ausserhalb derselben, da es seine Borsten kaum zur Fortbewegung benutzt. Beim Zurückziehen in die Röhren giebt *Megascolides* einen gurgelnden Ton von sich. Leere Röhren enthalten Kothmassen und bis zwei Zoll lange Cocons, in denen gewöhnlich nur ein Embryo sich findet.

Das neue *Aelosoma Headleyi*, das **F. E. Beddard** untersucht hat, verdankt seine grüne Farbe Oeltropfen der Haut, aber nicht parasitischen Algen; es besitzt ausserdem in der Haut eine gelbe Substanz, die wie eine ähnliche in den Zellen des Peritoneums wohl eine Excretmasse darstellt. Die Borstensäcke stehen wie das Hirnganglion in direkter Continuität mit der Haut und werden durch einzellige Muskelfasern, wie solche auch direkt von der Körper- zur Darmwand ziehen, bewegt. Der muskulöse Pharynx wird wie ein Saugnapf gebraucht; Blut farblos. Die Nephridien finden sich in grosser Zahl, je ein Paar einem Körpersegment entsprechend; ihr Trichter wird, wie es scheint, nur aus zwei Zellen gebildet. Die schon erwähnten Muskelfasern, die auch im Prostomium sich finden, treten hier im Centrum des Hohlraumes dieses Leibesabschnittes zusammen resp. strahlen von diesem Knotenpunkte wie bei *Dinophilus* aus. (*On a worm of the genus Aelosoma*. — *Proceed. zool. soc. London for 1888* pg. 213—215. 1 pl.)

B. Friedländer fasst die Resultate seiner Untersuchungen über

das Centralnervensystem von Lumbricus, dessen Behandlungsmethode ausführlich mitgetheilt wird, wie folgt zusammen:

1. Die kurzen Connective zwischen den dicht an einander liegenden Ganglien des Bauchstranges von Lumbricus liegen vor den Abgangstellen der einfachen Nerven.
2. In jedem Ganglion liegt eine beschränkte Anzahl von grossen, multipolaren Ganglienzellen von constanter Lage und eigenthümlicher, chemischer Beschaffenheit, wahrscheinlich vergleichbar den medianen Zellen von Hirudo (Hermann) und von Travisia (Kükenthal).
3. In jedem Ganglion finden auf dem Niveau der Nervenabgänge Faserkrenzungen statt („Nervenquerbrücken“).
4. Die Seitennerven beziehen mit Ausnahme der ersten Wurzel des Doppelnerven ihre Fasern zum Theil aus den eben erwähnten Querbrücken; die erste Wurzel des Doppelnerven ist vorwiegend ventralen Ursprungs, die zweite vorwiegend dorsalen.
5. Im Bauchmark von Lumbricus verläuft zwischen beiden Hauptfasersträngen ein dritter, schwächerer, unpaarer, der namentlich auf Querschnitten der Connective als medianer Nerv deutlich abgegrenzt ist.
6. In den beiden lateralen Hauptfasersträngen des Bauchmarkes treten je drei Gruppen eng an einander liegender, stärkerer Nervenfasern hervor; in der ventralen Gruppe liegt eine besonders dicke Nervenröhre. In der Nähe der letzteren befindet sich eine differente Gewebspartie, ähnlich den Fibrillen des Gehirns.
7. Das Unterschlundganglion ist wahrscheinlich ein Verschmelzungsprodukt zweier Bauchmarksganglien.
8. Die Hüllen der Neuralkanäle sind rein bindegewebiger Natur und mit dem Myelin der Wirbelthiernerven nicht zu vergleichen. Sie tragen — als Nebenfunktion — vermuthlich dazu bei, Knickungen des Bauchstranges bei Contractionen des Wurmes zu verhüten.
9. Der Inhalt der Neuralkanäle besteht aus Ganglienzellfortsätzen, die wahrscheinlich zu einer homogenen Masse mit einander verschmolzen sind. Die beiden lateralen Neuralkanäle beginnen im hinteren Ende des Bauchmarkes als Fortsätze zweier ventral gelegener Ganglienzellen von besonderer Beschaffenheit, aber nicht ungewöhnlicher Grösse; mitunter erstrecken sich die Neuralkanäle über diesen am weitesten nach hinten gelegenen Zusammenhang mit Ganglienzellen ein wenig fort, um blind zu enden. In ihrem weiteren Verlaufe nehmen sie auch noch die Fortsätze anderer Ganglienzellen gleicher Beschaffenheit auf, welche auf dem Niveau der Wurzeln der Doppelnerven in den hinteren Ganglien auf der Ventralseite in symmetrischer Vertheilung liegen. Vor dem Eintritt in die Neuralkanäle gehen die Fortsätze derselben complicirte Anastomosen sowohl mit einander, als auch mit dem medianen Kanal ein.
10. Die nervöse Centralsubstanz des Gehirns weicht wesentlich von der des Bauchmarkes ab. Das Gehirn besitzt einen weit complicirteren Bau, als bisher angenommen wurde.

Beiträge zur Kenntn. d. Centralnervensyst. von Lumbricus — *Zeitschr. f. wiss. Zool.* 47 Bd. 1888. pg. 47—84. Taf. IX. X.

Die Speicheldrüsen von *Perichaeta* sind nach der Meinung *Beddard's* als ein Homologon der Septaldrüsen der Enchytraeiden und Lumbriculiden zu betrachten, wogegen Haufen von einzelligen Drüsen in den Genitalsegmenten vielleicht den capsulogenen Drüsen von *Lumbricus* entsprechen (*prel. notes on the anat. of Perichaeta* — *Zool. Anz. XI. 1888 pg. 91—94*).

Die sogenannten Schleimdrüsen von *Urochaeta* bestehen nach *Beddard* aus einem Rohr, das sich nach aussen durch einen Porus öffnet und mit der Leibeshöhle durch bewimperte Trichter in Verbindung steht, die unregelmässig und nicht metamer angeordnet sind, sie sind also Segmentalorgane (*Preliminary note on the mucous gland of Urochaeta* — *Zool. Anzeig. XI. 1888 pg. 90 bis 91*).

F. E. Beddard's „*prelim. note on the nephridia of Perichaeta*“ bezieht sich auf *Perichaeta aspergillum* Perr. und behandelt Verhältnisse, die ausführlicher in der folgenden Arbeit dargestellt sind (*Proc. R. soc. London vol. 43. 1887/88 pg. 309—310*).

Bei *Acanthodrilus multiporus* *F. E. Bedd.* findet derselbe mehr als ein Paar Nephridioporen in jedem Segment; er zeigt, dass im hinteren Körpertheile auf jede der 8 Borsten jedes Segmentes etwa ein Nephridium mit einem Porus kommt, dass dagegen vorn nicht nur zahlreiche Verbindungen zwischen den Nephridien selbst, sondern auch Verästelungen der ausführenden Canäle vorkommen, so dass mehr als hundert Nephridioporen in einem Segment auftreten; innere Mündungen (Trichter) wurden nicht beobachtet. Aehnliche Verhältnisse finden sich bei *Perichaeta aspergillum* Perr., *Typhaeus* *Bedd.* und *Dichogaster* n. gen., doch bilden die Nephridien bei *Perichaeta* ein ununterbrochenes Netzwerk nicht nur in dem einzelnen Segment, sondern im ganzen Körper, während die in grosser Zahl vorhandenen Nephridioporen ziemlich regelmässig und zwar in Ringen angeordnet sind. Diese Verhältnisse scheinen dem Autor darauf hinzudeuten, dass sich die Excretionsorgane der Anneliden von denen der Plathelminthen ableiten lassen (*On the occurrence of numerous Nephridia in the same segment in certain earthworms and on the relationship between the excretory system in the Annelida and in the Platyhelminths* — *Quart. journ. micr. etc. vol. XXVIII. 1888 pg. 397—411. 2 pl.*).

Veranlasst durch die Mittheilungen *Beddard's* berichtet *W. B. Spencer* über das Nephridialsystem des 6—8 Fuss langen *Megascolides australis* *Mc. Coy*; dasselbe besteht aus kleinen, gefässähnlichen Büscheln, welche innerer Mündungen entbehren und besonders in den Genitalsegmenten (11—19) vorkommen; sehr viel grössere Nephridien mit Trichtern finden sich paarweise vom 120—500 Segment. Die kleinen Nephridien münden durch zahlreiche Pori nach aussen, während für die grösseren ein langer Sammelgang zu existiren scheint, der jedoch dem von *Lanice* nicht homolog ist. (*The nephridia of Earthworms* — *Nature vol. 38. London 1888*

pg. 197—198.) — Vergl. hierzu die Bemerkungen von F. E. Beddard (*ibidem* pg. 221—222).

Nach A. B. Griffiths findet sich Harnsäure in den Schleifen-canaln von *Lumbricus* (*Renal organs of the oligochaeta* — *Proc. R. soc. Edinburgh XIV. 1888 pg. 233—234*).

Von G. Goehlich's Arbeit: „Ueber die Genital- und Segmentalorgane von *Lumbricus terrestris*“ liegt uns nur die Ausgabe als Dissertation (ohne Tafeln!) vor; der Autor neigt in Bezug auf die Entstehung der Eier der Ansicht von Claparède (aus den Stromazellen des Ovariums) zu; der Wimpertrichter der Tube ist nicht mit einem Segmental- oder Samentrichter zu vergleichen, da er aus zottenförmigen Verdickungen des Dissepimentes $13/14$ besteht; die Wimpern des Trichters schlagen nicht constant. Die Samentaschen sind im October etwa am grössten und im Frühjahr winzig klein, da während der kalten Jahreszeit Blutkörperchen in die Samentaschen eindringen und das übrig gebliebene Sperma verzehren! Der Spermatophor enthält niemals Samen von einem der in der Begattung befindlichen Thiere, sondern von einem dritten, das ihn früher auf eins der beiden übertragen hat. Die zwei Paar Hoden liegen an der Hinterseite der Septa $9/10$ und $10/11$ zu beiden Seiten des Bauchstranges und zwar zu zwei in besonderer Kammer eingeschlossen; die Entstehung der Samenzellen noch unbekannt, jedenfalls gelangen solche auf dem Brombeer-Stadium in die Samenblasen, wo sie reifen. Die Schilderung der Segmentalorgane bietet, abgesehen von den räthselhaften Wimperschnüren in den Wimpertrichtern, wenig Neues (*In. Diss. Breslau 1888. — Zool. Beir. hreg. v. A. Schneider II. pg. 163—167. 2 Taf. u. Journ. R. micr. soc. London 1889 pg. 57*).

F. E. Beddard giebt weitere Mittheilung über Ovarien (cf. J. B. 1886/87 pg. 100) und die Eibildung bei *Eudrilus*; die Ovarien werden nämlich durch Muskelsepta in Kammern abgetheilt, in denen Eier und Keimzellen sich finden; ein Theil der letzteren degenerirt, andere dienen zur Ernährung der wenigen sich ausbildenden Eier, auf denen sie eine uhrglasförmige Kappe bilden (*On the reproductive organs in the genus Eudrilus* — *Proc. R. soc. Edinburgh 1888 pg. 672—682; note on the structure and development of the ovum in an Annelid* — *Journ. of anat. and physiol. vol. XXII. n. ser. vol. II. London 1888 pg. 9—14. pl. I. u. Rep. 57 meet. Brit. assoc. adv. scienc. 1887 pg. 771*).

Bei *Rhynchelmis* und den *Lumbriciden* entstehen die Geschlechtsdrüsen nach Fr. Vejdovsky sehr früh; bei *Rhynchelmis* ist die ursprüngliche Anlage jeder Geschlechtsdrüse eine Zelle, die sich fortschreitend theilt; am Ende des Coconlebens besitzt der junge Wurm in 8.—10. Segment 3 Paar traubenförmiger Geschlechtsdrüsen, von denen später die beiden vorderen zu Hoden, das hintere Paar zu Ovarien wird. Durch die sehr rasche und bedeutende Entwicklung der Samenblasen werden die Ovarien bis in das 50., selbst 54. Segment verschoben, wozu auch die enorm langen Samenleiter

beitragen. Die reifen Eier (0,65—0,8 mm. gross) lösen sich von den Eierklumpen ab und drängen sich zwischen dem 30.—40. Segmente derart, dass sie ganz unregelmässige Gestalt annehmen.

Die jüngste Eizelle von *Rhynchelmis* besteht aus ganz homogenem Cytoplasma, besitzt einen Kern und ein Kernkörperchen; erst später tritt als Folge der Ernährung, Assimilation und des Wachstums ein Fadennetzwerk auf, indem man verdichtete und vergrösserte Körperchen bemerkt, die jedoch nicht aus dem Kern stammen, sondern nach V. Cytoplasma und ein Reservematerial für die künftige Bildung von Fäden darstellen. An der Peripherie unter der sehr zarten Dotterhaut findet sich eine verdichtete Plasmaschicht mit schichtenweise eingelagerten Körnchen; sie steht in directer Verbindung dem Netzwerk, in dessen Maschen Dotterkörnchen liegen und mit einem perinucleären Hofe, dem Periplast, der stets hyalin ist. Der Kern der jungen Eizelle liegt zuerst central, später peripher; er besteht anfangs aus einer homogenen Grundsubstanz, die erst später zum Kerngerüst sich umwandelt; das eine Kernkörperchen theilt sich meist in 2, seltener in 3—4 Tochterelemente, die mit dicken Hüllen umgeben sind; ihr Inhalt ist chromatische Substanz, eigentliche Kernfäden, entsprechen also nicht den Nucleolen der Autoren, sondern dem „*boyau nucléinien*“ von Carnoy. Die Eizelle führt sämtliche Eigenschaften der gewöhnlichen somatischen Zellen, doch besitzt das reife Ei Ausrüstungen für die künftige Entwicklung. Das Spermatozoon dringt mit dem Kopfe voran in das Ei ein und verändert hier seine Gestalt; der lange stäbchenförmige Kern ist anfangs homogen und structurlos, lässt aber, sobald er nach dem Eintritt in das Ei anschwillt, deutlich reticuläre Structur erkennen. Der um den Spermakern vorhandene helle Hof (Periplast) geht aus dem Protoplasma des Spermatozoons hervor, das bei seinem Auftreten hinter dem Kopf liegt, während später dieser in das Centrum des hellen Hofes gelangt — das befruchtende Element kehrt demnach in die Gestalt der ursprünglichen kugligen Spermazelle zurück. Diesem Periplast wird vom Autor eine sehr grosse Bedeutung zugeschrieben: er allein führt die Theilung des Eies ein und zwar bereits zu einer Zeit, wo die Geschlechtskerne selbst sich noch nicht vereinigt haben; die erste Theilung ist ein einfaches Zerfliessen der Substanz des Periplastes nach zwei entgegengesetzten Richtungen; hierdurch wird die erste Theilungsachse des Eies bestimmt und es entstehen schliesslich zwei neue, die Tochterperiplaste, die bekannten hellen Höfe an den Polen der Kernspindel; während der Conjugation der Geschlechtskerne legen sich bereits die Enkelperiplaste an und zwar noch ehe die Tochterkerne (aus dem befruchteten Eikern) hervorgegangen sind; doch entstehen sie nicht durch Zerfliessen der Tochterperiplaste, sondern endigen innerhalb derselben als je ein hyalines Kügelchen u. s. f. Die bekannte Strahlenbildung hängt mit der Bildung und Theilung des Periplastes resp. mit der Nahrungszufuhr zu diesem und zu dem darin steckenden Kerne zusammen. — Auch die Eizelle enthält Periplast, stösst

diesen aber fast ganz bei der Bildung der Richtungskörperchen mit aus und erhält durch die Befruchtung nicht nur männliche Kernsubstanz, sondern Plasma des Spermazootoons, welches zum Periplast wird und die Theilung der Eizelle veranlasst; der männliche wie der weibliche Pronucleus selbst haben die Theilungsfähigkeit eingeübt. In den Kernen der ersten Blastomeren lässt sich der männliche und weibliche Antheil nachweisen, beide müssen für alle Kerne angenommen werden; ebenso lässt sich männliches und weibliches Cytoplasma nachweisen; folglich ist jede Zelle heramphroditisch, dasselbe muss sich auch für einzellige Organismen herausstellen. (*Entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen, Hft. I. Reifung, Befruchtung u. die ersten Furchungsvorgänge des Rhynchelmis — Eies. Prag 1888. 166 pg. 10 Taf.*)

Nach L. Roule ist der Nahrungsdotter im Ei von *Enchytraeoidis Marionii* n. gen. n. sp. zwar sehr reichlich, aber doch gleichmässig vertheilt und so entstehen bald nach der Befruchtung zwei fast gleiche Blastomeren; die weitere Furchung ist sehr unregelmässig, doch trennt sich der Bildungsdotter niemals vom Nahrungsdotter. Die peripheren Zellen der Morula werden cubisch, die centralen, das Meso-Entoderm, behalten die polyedrische Gestalt der Blastomeren; eine Furchungshöhle fehlt. Im Centrum entsteht zuerst eine unregelmässige Höhle, die Anlage der Darmhöhle, deren begrenzende Zellen das Entoderm darstellen; kleine Spalten treten dann zwischen denjenigen Zellen auf, welche zwischen Ecto- und Entoderm liegen; sie fliessen zusammen und bilden die Leibeshöhle, die nie mit dem Darm in Verbindung stand. Alle peripheren Zellen des Mesoderms, die niemals eine epitheliale Anordnung aufweisen, gehen wie bei den Mollusken in Muskelfasern über. (*Sur la formation des feuilletés blastodermiques et du coelome chez un Oligochaete limicole — Compt. rend. Acad. Paris. Tom. 106. 1889. I. pg. 1811—1813.*)

Aus dem R. S. Bergh'schen Untersuchungen „zur Bildungsgeschichte der Excretionsorgane bei *Criodrilus*“ geht hervor, dass die Segmentalorgane dieser Art ganz und gar in der Hautmuskelpatte entstehen und dass die Anlage eines Segmentalorgans, wenn auch noch so jung, zu den entsprechenden Anlagen in vorhergehenden und folgenden Segmenten in gar keiner Beziehung steht. Trichter-, Schlingen- und Endabschnitt jedes Segmentalorganes differenziren sich aus einer von Anfang an gemeinsamen, einheitlichen Anlage heraus. Der Trichter bildet sich jedenfalls hauptsächlich aus einem zelligen Material, das durch die Theilungen der Trichterzelle entsteht; durch Auseinanderweichen ihrer Descendenten kommt der Hohlraum des Trichters zu Stande. Das Lumen des Schlingentheils entsteht dagegen durch Vacuolenbildung in den Zellen und durch Zusammenfliessen der Vacuolen; das Endstück bohrt sich zwischen den Epidermiszellen hinaus und bricht hier durch, so bildet sich die äussere Mündung. Den Embryonen von *Criodrilus* kommt ein Paar Urnieren zu, die aus durchbohrten

Zellen zusammengesetzt sind; die Organe beginnen vorn neben dem Oesophagus mit blindem Ende und liegen in der Kopfhöhle dem Darmepithel dicht an; von hier verlaufen sie unverzweigt im Bogen gegen den Rücken und nach hinten, biegen dann wieder nach der Ventralseite um und münden seitlich am Körper aus. (*Arbeiten a. d. zool.-zoot. Inst. d. Univ. Würzburg VIII. 1888. pg. 223—248 mit Taf. XIII u. XIV.*)

b. Physiologie.

Nach **B. Friedländer** verhalten sich Regenwürmer, denen das Hinterende abgeschnitten wurde, wie normale Thiere, während decapitirte Würmer bald nach der Operation sich lebhaft winden, auch eine Zeit lang herumkriechen, bald aber zur Ruhe kommen und auf feuchter Erde mit feuchtem Fließpapier bedeckt Tage und Wochen lang ruhig daliegen, ohne auch nach Vertheilung der Wunde autonome Bewegungen zu machen, doch reagiren sie auf Reize. Thiere, denen ein 0,5—1,0 cm. langes Stück des Bauchmarkes herausgeschnitten wurde, kriechen ganz wie normale Thiere — eine Contraction der Längsmuskeln beginnt am vorderen Ende, schreitet nach hinten fort, überspringt die Resectionsstelle und setzt sich hinter denselben fort; nach mehreren Wochen getödtete Würmer ergeben das Fehlen des Bauchmarkes an der operirten Stelle. Zur Erklärung kann man nicht an eine Fortleitung des Reizes durch die Längsmuskeln selbst denken, derart, dass die bei der Contraction auftretende Längsdehnung der folgenden Segmente eine Längscontraction dieser als Reflexbewegung auslöst; dafür spricht das Verhalten geköpfter Würmer, bei denen auf Zug der vordersten Segmente Längscontraction eintritt sowie die harmonischen Bewegungen von Regenwürmern, die in der Mitte entzweigteschnitten sind und deren beide Stücke durch ein etwa 1 cm. langes Fadenstück verbunden werden; das hintere Ende kommt meist bald zur Ruhe, während das vordere kriecht; sowie aber die Contractionswelle an das Hinterende des vorderen Stückes gelangt, entsteht ein Zug, der auf den Faden und durch ihn auf das Vorderende des hinteren Stückes wirkt und dieses zur Bewegung veranlasst. (*Ueber das Kriechen der Regenwürmer — Biol. Centralbl. VII. 1888/89 pg. 363—366 u. Journ. R. micr. soc. London 1888 pg. 952.*)

Ein sorgfältig abgetrockneter Regenwurm hinterlässt, wenn er auf einer Glastafel kriecht, eine schleimige Spur, in der sich bei mikroskopischer Untersuchung Chloragogenzellen wie lymphoide Zellen, bei geschlechtsreifen Thieren auch Geschlechtsprodukte nachweisen lassen. Bei Reizung des Wurmes vermehrt sich die Absonderung und die Drüsenzellen der Haut selbst treten nach aussen. **Kükenthal** fütterte nun Regenwürmer mit Carmin und fand, dass die amoeboide werdenden Darmzellen Carminkörnchen aufnehmen und dass in den Chloragogenzellen das Carmin (wahrscheinlich durch Vermittlung des Blutgefäßsystems) in Tropfenform vorhanden ist. Auffallender Weise theilnehmen sich die Nephridien an der Heraus-

schaffung des Carmins aus der Leibeshöhle nicht; vielmehr nehmen Lymphzellen, die sich direkt an die Darmepithelzellen anlagern, das Carmin auf und transportiren dasselbe in die Hypodermis resp. in die Drüsenzellen derselben, von wo es nach aussen abgestossen wird. Gelegentlich kommen Carminkörner zwischen Matrix und Cuticula, veranlassen Ausbuchtungen der letzteren, die sich schliesslich ab schnüren. (*Beobachtungen am Regenwurm — Biol. Centralbl. VIII. 1888/89. pg. 80—86 u. Journ. R. micr. soc. London 1888. pg. 735.*)

Den »remark. case of phosphoresc. in a earthworm« (cf. J. Ber. 1886/87. pg. 118) beschreibt G. F. Atkinson auch in: Journ. Elisha Mitchell scientif. soc. IV. 1887. pg. 89—91.

c) Systematik u. Faunistik.

D. Rosa kritisirt die Systeme von Perrier, Beddard und Vejdovsky und giebt eine »nuove classificazione dei Terricoli«

1. Fam. Lumbricidae Claus (= Lombr. antéclit. P. — Lumbric. + Criodrilidae Vejd.)

»Aperture maschili anteriori al clitello fra le setole ventrali e le dorsali; clitello a sella di posizione e lunghezza variabili. Setole in 8 serie, geminate o distanti, ma sempre parallele fra loro. Setole copulatrici poco diverse dalle normali; ventriglio posteriore agli apparati sessuali. Vescicole seminali normalmente 4, raramente 3 paia. Mancano prostate e setole peniali.«

Lumbricus Eis., Allolobophora Eis., Allurus Eis., Tetragonurus Eis. und Criodrilus Hoffm. (Syn. Enterion Sav., Dendrobaena Eis., Octoclosion Oerl., Aporrectodea Oerl., ?Hypogeon Kieb.)

2. Fam. Geoscolecidae n. (= Lombr. intracit. P. p., Eudrilidae Claus. p. p.)

»Aperture maschili sotto al clitello fra le setole ventrali e le dorsali, occupanti segmenti o spazii intersegmentali molto variabili di posizione. Clitello generalmente a sella, di posizione e lunghezza variabile. Setole 8 per segmento, disposte a paia o distanti o in diverse disposizioni sperso variabili dalla parte anteriore alla posteriore. Setole copulatrici molto piu lunghe delle altre e di forma diversa. Il ventriglio (che può esser molteplice) è collocato anteriormente. Vescicole seminali 1 o 2 paia. Mancano prostate e setole peniali.«

Geoscolex Leuck., Anteus Perr., Thamnodrilus Bedd., Microchaeta Bedd., Urobenus Benh., Urochaeta P., Diachaeta R., Hormogaster Rosa, Rhinodrilus P., Geogenia Kieb. und Tritogenia K. (syn. Titanus P., Eurydame? K., Pontoscolex?? Schmarda und Brachidrilus?? Bedd.)

»3. Fam. Moniligastridae Claus (= Lombr. aclitellicus P.).

»Manca il clitello; aperture maschili un paio, poste fra due segmenti, nello spazio fra le setole dorsali e le ventrali, anteriormente alle aperture femminee che sono at 14 (Horst). Setole strettamente geminate in quattro paia. Vescicole seminali un paio. Esistono prostate.«

Moniligaster E. Perr.

4. Fam. *Acanthodrilidae* s. str. (= *Lombr. postclitell.* P. p. p., *Acanthodril.* Claus, Vejd. p. p.)

*Apertures maschili 4 paia sotto il clitello o dietro di esso su due segmenti non consecutivi. Clitello di lunghezza e posizione variabile, ora acingolo completo (forme postclitelliane), ora con una interruzione ventrale per tutta la sua lunghezza o solo nella regione delle aperture maschili. Setole in 8 serie più o meno geminate. Ventriglio collocato anteriormente (ve ne sono talora 203). Vescicole seminali due paia. Esistono 4 prostate e 4 fascetti di setole peniali in relazione colle aperture maschili.

Acanthodrilus P., *Trigaster* Benh.

5. Fam. *Eudrilidae* (= *Lombr. intraclitell.* P. p. p. + *L. postclitell.* P. p. p.; *Eudrilidae* Claus p. p. + *Acanthodrilidae* Cl. p. p.; *Pontodrilidae* p. p. + *Acanthodrilidae* p. p. + *Plutellidae* Vejd.).

*Apertures maschili un paio al segmento 17 o 18, sotto allo setole ventrali o sotto alla 1ª setola ventrale, nel clitello o posteriormente ad esso. Clitello a cingoli completo occupante generalmente i segmenti (13, 14—16, 18) = 3—6. Setole in 8 serie, geminate o distanti, ma sempre parallele. Ventriglio anteriore. Vescicole seminali generalmente due paia. Esistono prostate e fascetti di setole peniali.

Eudrilus P.; *Typhaeus* Bedd., *Microscolex* Ros., *Photodrilus* Giard, *Pontodrilus* P., *Digaster* P., *Notoscolex* Fl., *Didymogaster* Fl., *Cryptodrilus* Fl., *Perissogaster* Fl. ?*Patellus* P.

6. Fam. *Perichaetidae* Cl. (= *Lombr. postclitell.* P. p. p.; *Lombr. postclitelliani* + *infracit.* Bedd.; *Perichaetidae* + *Pleurochaetidae* Vejd.).

*Apertures maschili al 18° segmento; aperture femminee al 14°, vicinissime o fuse in una sola. Clitello in forma di cingolo completo, occupante generalmente tre segmenti (14, 15, 16), con rarissime eccezioni; setole in numero molto maggiore di 8 per segmento, disposte su cicli continui o interrotti; esistono spesso papille copulatrici. Esistono sempre prostate, ma rarissimamente setole peniali.

Megascolex Templ., *Perichaeta* Schm., *Perionyx* P. (Syn. *Pleurochaeta* Bedd., *Amyntas* Kieb., *Nitocris* K., *Pheretima* K., *Rhodopis* K., *Lampito* P.).

(*Boll. Mus. Zool. Anat. compar. di Torino* vol. III. 1888. No. 41.)

W. B. Benham beschreibt einen Regenwurm von unbekannter Herkunft als *Brachydrilus* n. gen., der ausserordentlich kleine Borsten, zwei Paar Nephridien in jedem Segment, die Samentaschen im 10. und 11., die Ovarien im 12. (!) Segment besitzt; die Spermatheken liegen im hinteren Theile des 11. Segmentes als zwei, manchmal drei schmale, oblonge Körper, die bis in das folgende Segment hineinragen; vier Eiweissdrüsen liegen unter ihnen. (*Note on a new Earthworm* — *Zool. Anzeig.* XI. 1888. pg. 72—74.)

In den »entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen« giebt F. Vejdovsky einige Bemerkungen zur Synonymie (*Allolob. trapezoides* Dug. = *All. turgida* Eis. = *L. trapezoides* Kleinenb.; *Allob. putra* Hoffm. = *All. subrubicunda* Eis. Rosa, non *Dendrobaena rubida* Vejd.; *Dendrobaena octaedra*

Sav. ist nicht *Ent. rubidum* Sav. und *L. puter* Hoffm.) und beschreibt *Dendrobaena octaëdra* Sav., sowie *Allurus tetraëder* Sav. Des Weiteren folgt eine Schilderung der Eiablage, Coconbildung bei *Rhynchelmis* und der Verschiedenheiten der Cocons bei den Lumbriciden. (*Frag* 1888. *Hft. I. pg. 11—13, 33—36*).

W. B. Benham constatirt das Vorkommen von *Allurus tetraëdrus* in England und vermuthet, dass auch *Criodrilus* zur englischen Fauna gehört. (*British earthworms — Nature vol. 38. London 1888 pg. 319.*)

D. Rosa beschreibt einen neuen *Lumbricus* (*Allolobophora Tellinii* n. sp.) von Ragogna im Friaul, der 50 cm. lang wird. (*Di un nuovo Lumbrico italiano — Boll. Mus. Zool. Anat. comp. di Torino vol. III. 1888. No. 44.*)

Nach Kulagin leben *Lumbricus rubellus* und *Allolobophora foetida* an der Lenamündung; *Allolob. tenuis* kommt auch in Sibirien vor. Die von Grube und Gerstfeld beschriebenen *Lumbr. multispinus* und *brevispinus* gehören zu *Allolobophora mucosa* Eis. In Mittellussland findet man: *Allolob. mucosa*, *carnea*, *pellucida*, *foetida*, *Dendrobaena Boeckii*, *Lumbr. rubellus* und *agricola*; in Südrussland, der Krim und dem Caucasus ausserdem noch *All. arborea*, *A. profuga*, *A. longa*, *A. subrubicunda* und im Caucasus noch drei neue Arten: *Lumbricus caucasicus* n. sp., *Dendrobaena Bogdanovii* n. sp. und *D. Nassonovii* n. sp. (*I. c. Zool. Anz. XI. 1888 pg. 234. — Die ausführliche Arbeit ist in russ. Sprache in den: Nachr. d. Kais. Ges. d. Frdr. d. Naturw. Moskau T. 50 1888. Protok. d. zool. Abth. Sp. 142—148 erschienen.*)

Seinen Angaben über *Microscolex modestus* (cf. J. Ber. 1886/87 pg. 106) fügt Rosa noch hinzu, dass die Länge etwa 60 mm. beträgt, dass dem Darm die Magenblindsäcke und die Typhlosolis fehlt, ebenso fehlt das unter dem Bauchmark verlaufende Gefäss; im 10., 11. und 12. Segment finden sich pulsirende Querschlingen; die Spermatheken haben einen seitlichen Blindsack; ferner findet sich eine wohl entwickelte und gelappte Prostata. (*Boll. Mus. Zool. ed. Anat. comp. di Torino III. 1888. No. 39.*)

Der von F. S. Leuckart 1841 (*Zool. Bruchst. I.*) beschriebene *Geoscolex maximus* ist nach Rosa identisch mit *Titanus brasiliensis* Perrier (1872), welcher letzterer Name demnach einzuziehen ist. (*Sul Geoscolex maximus Leuck. — Boll. Mus. Zool. Anat. comp. di Torino vol. III. 1888. No. 40.*)

D. Rosa beschreibt folgende Perichaeten aus Birmania: 1. *Perionyx excavatus* Perr., 2. *Megascolex armatus* Bedd., 3. *Perichaeta Feae* n. sp. und 4. *P. birmanica* n. sp., und theilt die Perichaetiden in folgender Weise:

- A. Orifizi maschili contigui, orifizi delle spermatheche pure contigui *Perionyx* E. P.
- B. Orifizi maschili distanti, orifizi delle spermatheche pure distanti
 - a. setole in cicli interrotti, mancano ciechi intestinali *Megascolex* Templ.
 - b. setole in cicli continui, esistono ciechi intestinali *Perichaeta* Schm.

(*Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regione vicine. V. Perichetidi — Ann. mus. civ. stor. nat. Genova ser. 2. vol. VI. 1888. pg. 155 bis 167. 1 tav.*)

Die neue Gattung *Teleudrilus*, von der Dr. Ragazzi eine neue Art (*T. Ragazii* n. sp.) in Scioa erbeutet hat, unterscheidet sich von allen bisher bekannten Oligochaeten dadurch, dass sie (im 19. Segment) nur eine einzige, median gelegene, männliche Geschlechtsöffnung besitzt; auch die Mündung der Spermathecan ist unpaar (zwischen Segment 13 und 14 gelegen); die weibl. Oeffnungen sind paarig und verhalten sich wie bei *Eudrilus*. Des Weiteren wird kurz beschrieben *Acanthodrilus scioanus* n. sp., *Perichaeta Feae* n. sp. aus Birmania und *P. birmanica* n. sp. (*D. Rosa: Lombrichi della Birmania, del Tenasserim e dello Scioa — Boll. Mus. Zool. Anat. comp. di Torino vol. III. 1888. No. 50.*)

Dieser Beschreibung von *Teleudrilus* fügt *Beddard* hinzu, dass *Eudrilus*, eine nahe verwandte Form, zwei Paar Ovarien im 13. und 14. Segment besitzt und dass jedes derselben in eine musculöse Scheide eingebettet ist, die mit dem Oviduct zusammenhängt und wahrscheinlich dem Receptaculum anderer Regenwürmer entspricht; die beiden Oviducte münden in den Gang der Spermathecan (*further notes upon the reproductive organs of Eudrilus — Zool. Ans. XI. 1888. pg. 643—646.*)

Horst giebt einen kurzen Bericht über *Rhinodrilus* sp. aus Surinam (*Tijdsch. neederl. dierkdg. Vereen. (2) D. 1. Versl. pg. CLII.*).

Der von *R. Horst* beschriebene *Acanthodrilus Beddardi* n. sp. (aus Liberia) zeichnet sich durch den Besitz besonderer Copulationsborsten, die in der Nähe der Spermathecan sitzen und von einem bandförmigen Drüsenkörper umhüllt sind, aus (*Descriptions of earthworms. IV Ac. Bedd. — Notes fr. the Leyden Museum vol. X. note VI. pg. 123—128. 1 pl.*).

F. E. Beddard stellt ein neues Genus der Terricolen mit dem Namen *Dichogaster* auf, erwähnt jedoch nur, dass dasselbe sich durch den Besitz zahlreicher Nephridioporen auszeichne (*l. c. Quart. journ. micr. sc. vol. XXVIII. 1888 pg. 401.*).

Ein Vergleich der Genera *Pontodrilus*, *Microscolex* und *Photodrilus*, den *Rosa* unternimmt, ergiebt eine sehr nahe Verwandtschaft derselben, während Beziehungen zu anderen Genera viel entfernter sind; nur *Eudrilus? dubius* Fl. aus Australien ist heranzuziehen, erweist sich aber als identisch mit *Rosa's Microscolex modestus*. (*Sui generi Pontodrilus, Microscolex e Photodrilus in: Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino vol. III. 1888. No. 39.*)

F. E. Beddard beschreibt *Acanthodrilus neglectus* n. sp. aus Neuseeland, ferner *Neodrilus monocystis* n. gen. n. sp., ebendaher und dem *Acanthodrilus dissimilis* *F. E. Bedd.* in Bezug auf Stellung der Borsten, der Nephridialporen, sowie der Ausdehnung des Clitellums (Segm. 13—17) ähnlich, aber unterschieden dadurch, dass zwischen Segment VII und VIII nur ein Paar Spermathecanöffnungen vorhanden sind (statt zwei Paar); möglicherweise ist *Neodrilus* nur ein *Acanthodrilus*, bei dem das hintere Paar der männlichen Geschlechtsporen sowie die zugehörigen Drüsen nicht entwickelt sind. Bei einer nicht benannten *Urochaeta* aus Queensland stehen die Borsten der ersten 8 Segmente wie bei *Lumbricus*, darauf unregelmässig und erst weiter hinten alternierend. Es folgen endlich Mittheilungen über Nephridien, Samentaschen und das Clitellum von *U. corethrurus*, sowie die Beschreibung von *Perichaeta newcombei? n. sp.*

(Australien), *P. upoluensis* n. sp. (von Insel Upolu, süd-pazifischer Ocean) und Angaben über *Perichaeta antarctica* Baird. (*Observ. on the structur. character of certain new or little-known earthworms. Proc. R. soc. Edinburgh XIV. 1886/87. pg. 156—176. 1 pl.*)

J. J. Fletcher setzt seine notes on australian earthworms (cf. J. Ber. 1886/87 pg. 109—110) fort; er bemerkt zuerst, dass seine *Alloleobophora australiensis* die europäische *A. turgida* Eis. ist, dass ferner aus Europa nach Sydney und Melbourne *All. foetida* Sav. und aus Mauritius *Perichaeta peregrina* nach Australien verschleppt worden ist. Beschrieben werden darauf folgende Arten: *Eudrilus? dubius* n. sp. aus Sydney und Adelaide; *Cryptodrilus rubens* n. sp. von den Wilson-Bergen; *Perissogaster excavata* n. gen. n. sp., die später genauer beschrieben und abgebildet werden soll; *Perichaeta exigua* n. sp. aus der Umgebung von Sydney, und var. *Murrayana* von Mulwala N. S. W., *P. monticola* n. sp. von den Wilson-Bergen; *P. canaliculata* n. sp. von Moosman river, Cairns district, N. Q., *P. Stirlingi* n. sp. bei Adelaide, *P. Raymondiana* n. sp. von Raymond Terrace, Hunter river, N. S. W., *P. Hamiltoni* n. sp. von Guntawang, N. S. W., *P. Wilsoniana* n. sp. von den Wilson-Bergen, *P. secunda* n. sp. ebendaher; in Note IV werden beschrieben: *Notoscolex gippelandicus* n. sp. (Gippsland Victoria), *N. tasmanianus* n. sp. (Tasmania), *N. tuberculatus* n. sp. (Gippsland), *Cryptodrilus mediterraneus* n. sp. (Darling river N. S. W.), *Perichaeta Bakeri* n. sp. (Gippsland), *P. dorsalis* n. sp. ebendaher. (*Proceed. Linn. Soc. N. South Wales II. ser. vol. II. 1887. pg. 375—402; 601—620.*)

„Die Oligochaeten von Südgeorgien nach der Ausbeute der deutschen Station von 1882—83“ hat W. Michaelsen bearbeitet;

es sind *Pachydrius maximus* n. sp. unter Tangmoder auf Steinen lebend und bis 40 mm. lang werdend; *P. georgianus* n. sp. nur 8 mm. lang, zwischen Tangwurzeln und in dem Kanalsystem von Spongien am Strande von Süd-georgien lebend; *Enchytraeus monochaetus* n. sp. mit einzeln stehenden und in vier Längsreihen angeordneten Borsten — mit der vorigen Art zusammen; *Acanthodrilus georgianus* n. sp. bis 60 mm. lang. (*Jahrb. d. wiss. Anst. zu Hamb. V. Beilage z. Jahresber. üb. d. naturhist. Museum Hamburg für 1887. Hamb. 1888 pg. 55—73. 1 Taf.*)

Oriodrilus lacuum Hoffm. muss zu den Lumbriciden gestellt werden. (*Collin — Zeitschr. f. wiss. zool. 46 Bd. 1888 pg. 496.*)

In seinen „Beiträge zur Kenntniss der deutschen Enchytraeiden-Fauna“ beschreibt W. Michaelsen zuerst einen in Fischdünger lebenden Enchytraeiden unter dem Namen *Stercutus* n. gen.

Die Stercuten sind Enchytraeiden mit S-förmig gebogenen Borsten: ein Kopfporus fehlt; das Rückengefäß entspringt vor den Gürtelsegmenten und ist von einem Herzkörper durchzogen; Blut farblos; Speicheldrüsen fehlen; der Darm ist nur für die Aufnahme flüssiger oder gallertiger Nahrung geeignet, da das Epithel des Magendarmes sich in ein unregelmässiges, das ganze Darmlumen durchsetzendes Zellgerüst aufgelöst hat und der Enddarm in einen compacten Zellstrang verwandelt ist; die Samenleiter sind lang.

Die 6 mm lang werdende Species (*niveus* n. sp.) ist von blendend weissem, schneeeartigem Aussehen. Des weiteren wird eine neue Varietät (*glandulosus*) des *Pachydrilus sphagnetorum* Vejd. aus dem Eppendorfer Moor bei Hamburg beschrieben, ferner *Mesenchytraeus setosus* n. sp., in Gesellschaft von *Mes. Beumeri* am Elbstrande bei Hamburg zwischen Detritus, faulendem Laub und an modernden Baumstümpfen lebend. (*Arch. f. mikr. Anat.* XXXI. 1888. pg. 483—498. 1 Taf.)

Der von R. Saint-Loup als *Pachydrilus enchytraeoides* (cf. J. Ber. 1884/85 pg. 192) beschriebene *Oligochaete* ist nach L. Roule der Vertreter eines neuen Genus: *Enchytraeoides* sp. n. *Marioni*; derselbe unterscheidet sich von *Pachydrilus* durch den einfacheren Circulationsapparat und durch die Hoden, welche letztere denen von *Enchytraeus* gleichen. Auch ist das Nervensystem noch im Ectoderm gelagert, es entbehrt besonderer Ganglienknotten, die Ganglienzellen liegen vielmehr am ganzen Bauchmark unter der Punktsubstanz (*Sur la structure histologique d'un Oligochaete marin appartenant à un genre nouveau — Compt. rend. Ac. Paris T. 106. 1888. I. pg. 308—310 u. Journ. R. micr. soc. London 1888. pg. 735.*)

Unter dem Namen *Vetrovermis hyalinus* n. g. n. sp. beschreibt O. E. Imhof kurz „ein neues Mitglied der Tiefseefauna der Süßwasserbecken“; es handelt sich um einen in den Tiefen einiger Schweizer Seen lebenden Borstenwurm, der *Ctenodrilus* und *Parthenope* nahe steht und sich durch Theilung vermehrt. (*Zool. Anz. XI. 1888. pg. 48—49.*)

E. C. Bousfield bringt in seiner „Natural history of the genus *Dero*“ wenig Neues zur Anatomie, umgrenzt dagegen die Arten sicherer; er gruppiert dieselben in solche ohne secundäre Kiemen (*D. latissima* Bousf., *D. Perrieri* B., *D. obtusa* d'Ud., *D. Mülleri* n. sp.), mit secundären Kiemen (*D. limosa* Leidy, *D. acuta* B.) und mit secundären Kiemen und Palpen (*D. furcata* Ok.). (*Journ. Linn. soc. Zool. vol. XX. No. 117 London 1887. pg. 91—107. 3 pl. und Rep. Brit. assoc. adv. sc. 1885. pg. 1097.*)

Nais proboscida, *N. elinguis* und *Aeolosoma variegatum* in den Salzseen bei Halle (cf. *Zeitschr. f. wiss. Zool. 46 Bd. 1888. pg. 224.*)

Nais hamata Timm in den kleineren Koppenteichen (Zacharias: *Zur Fauna des Riesengebirges — Biol. Centralbl. VIII. 1889. pg. 542.*)

Aeolosoma Headleyi n. sp., cf. oben unter *Beddard* in: *Proced. zool. soc. London for 1888. pg. 213—515. 1 pl.*

D. Hirudineae.

a. Anatomie und Entwicklung.

St. Apathy hat sich mit einer „Analyse der äusseren Körperform der Hirudineen“ beschäftigt; die Resultate seiner über 20 Arten sich erstreckenden Studien, welche die wichtigen Mittheilungen Whitman's verwerthen, sind folgende:

Der meist langgestreckte Körper verjüngt sich in der Regel gegen seine beiden Enden; er ist entweder glatt oder mit regelmässig vertheilten Verdickungen, Warzen, resp. Falten der Haut versehen; letztere ist immer deutlich geringelt. Der Querschnitt des Körpers ist kreisförmig oder oval; eine grössere Abflachung erfolgt nur durch secundäre Anpassung. Ohne Ausnahme bestehen die Hirudineen aus 33 auch äusserlich nachweisbaren Somiten; auf jedes derselben kommt ein vollständiges Ganglion mit sechs Ganglienkapseln. Die verschiedene Körperlänge der einzelnen Arten wird theils durch Reduction theils durch Abbreviation einzelner Somite — in der Regel an den beiden Körperenden, selten auch mitten im Körper — bedingt. Die Zahl der vollständigen d. h. nicht reducirten Segmente characterisirt die Gattung, wogegen der Grad der Reduction und die Art und Weise der Verkürzung meist nur für die Art massgebend ist. Der ganze Körper theilt sich in 6 Regionen: Kopf-, Clitellar-, Mitteldarm-, Hinterdarm-, Anal- und Haftscheibenregion; jede dieser besteht aus 6 Somiten, allein die Analregion hat nur drei Somiten. In der ganzen inneren und äusseren Eintheilung des Somites ist die Dreizahl die herrschende. Im Dienste der mehr oder weniger parasitischen Lebensweise hat sich die Kopfregion zu einem verschieden grossen Saugnapf ausgebreitet, der aus einer Verdickung (nicht Einstülpung) des vorderen Körperendes entsteht und an dem eine ventrale mediane Längsspalte als Mundöffnung dient, resp. zu dem Napfrande auseinandergezogen werden kann. Die Analregion trägt den wahrscheinlich secundär, aus einem einfachen Durchbruch der Haut entstandenen After an der Dorsalfäche. Zwei bis drei Somite der sechsten Region sind bei allen Gattungen der Ordnung in die Haftscheibe eingestülpt. Zu dem eigentlichen Clitellum hat sich, in Grad und Form nach den Familien resp. Subfamilien verschieden, das X., XI. und XII. Somit in der Regel secundär, ja sogar theilweise nur postembryonal umgestaltet; die männliche Geschlechtsöffnung liegt constant im XI., die weibliche im XII. Somit. Immer typisch, die Gattung resp. die Art bezeichnend sind die Somite XIV—XXIII, die zehn mittleren des Körpers; falls die einzelnen Ringe gewisse eigene Merkmale besitzen, so sind diese in regelmässiger Reihenfolge auf jedem Somit des Körpers aufzufinden, von welchem der betreffende Ring durch Reduction nicht eliminirt wurde. Der wohl entwickelte Tastsinn besitzt bei den Hirudineen eine allgemeine Verbreitung und ist an 18 Längslinien von Tastkegelchen gebunden, die letztere im Umkreise eines jeden „Piscicolaringes“ eine Querreihe bilden — ursprünglich fallen nämlich zwölf äussere Ringe auf ein inneres Somit, wie bei der heutigen *Piscicola*; alle anderen Arten der Ringelung sind von verschiedener Gruppierung der ursprünglichen zwölf Ringe herzuleiten; als „Piscicolaring“ wird jeder Ring oder Ringtheil einer Hirudinee bezeichnet, der mit einem Ring der *Urpiscicola* gleichwerthig ist. Von den oben erwähnten 18 Längslinien befinden sich jederseits der Mittellinie sowohl am Bauch als auch am Rücken je 4 und ausserdem eine rechts und links an der Grenze von Rücken- und Bauchfläche; sie werden als innere und äussere Paramedian-, innere und äussere Paramarginal- und Marginallinie bezeichnet. Die Tastkegelchen können auf hervorspringende Warzen der Haut gerathen sein; sie stellen eine kleinere oder grössere Gruppe von specifischen, epitheloiden Zellen dar, welche die *Calicula* in ein retrahirbares Kegelchen emporwölben und ausnahmslos je ein Tasthärchen besitzen. Die Tastkegelchen können ferner mit einer Unterlage von gelblichen, opaken, fetthaltigen

Zellen oder von eigenthümlichen Pigmentzellen versehen sein; je nachdem dieser oder jener Fall, mit einer bestimmten Anordnung der betreffenden Gebilde vorliegt, sind auch die einzelnen Ringe zu unterscheiden, deren weitere Merkmale in einer dichterem Lagerung des oberflächlichen, reticulären Pigmentes und in der Stellung der Nephridialapertur zu suchen sind. Die Marginallinie zeichnet sich bei gewissen Gattungen, besonders der Gnathobdelliden durch grössere Tastkegelchen aus — sie ist der Seitenlinie der Capitelliden homolog. Die Augen, welche in ihrer höchsten Entwicklung nicht bloss Licht und Farbe sondern wahrscheinlich auch Formen unterscheiden können, sind besonders bei den Süsswassergattungen ausgebildet und hervorgegangen aus den dorsalen Tastkegelchen der ersten Ringe resp. ersten Somitdrüsen der Kopfregion. Von specifischen Drüsen sind die in der Umgebung der Geschlechtsöffnung liegenden und zur Bildung des Cocons bestimmten Chitinoiddrüsen zu erwähnen, die bei den nicht Cocons bereitenden Clepsine-Arten, falls sie noch nicht vollkommen rückgebildet sind, als embryonale Haftdrüse Verwerthung finden; die Rückenplatte von Clepsine bioculata ist der postembryonale Rest dieser Drüse (*Mith. a. d. zool. Stat. Neapel VIII, 1888, p. 153—232, 2 Taf.*).

J. F. Heymans findet bei Hirudineen ausser dem auf der Ventralseite des Darmes verlaufenden Sympathicus noch zwei dorsale Stämme, die in ihren Verzweigungen mit dem ventralen Stamme anastomosiren und so einen zwischen Rings- und Längsmuskelschicht des Darmes liegenden Plexus darstellen. Nach Behandlung mit der Citronensaft-Goldmethode sieht man aus dem Plexus sowohl Terminalfibrillen mit Endplatten, als solche ohne Endplatten hervorgehen; letztere Fasern sind vielleicht sensibler Natur; erstere begeben sich zu den Muskelfasern des Darmes, von denen jede mit mindestens einer, mitunter bis vier Endplatten versehen ist. Eigenthümlich verhält sich die Muskulatur in den lateralen Gefässen, indem jede Ringmuskelfaser ihren Verlauf ändert und zu einer Längsfaser wird; in Wirklichkeit haben daher diese Gefässe zwei Muskelschichten, die sich aber stets gleichzeitig contrahiren, also eine Verkürzung und Verengerung des Gefässes bewirken müssen. In dem zu dieser Muskulatur gehörigen Plexus fehlen die Ganglienzellen und die Nervenfasern enden bald in der Peripherie der contractilen Scheide oder irgendwo auf der Länge der Muskelfaser in einem ovoiden Knoten. (*Ueber die Nervenendigung in der glatten Muskelfaser beim Blutegel. — Anat. Anz. III, pg. 721 u. Arch. f. Anat. u. Phys., physiol. Abth. 1888 pg. 556—560.*)

A. G. Bourne wendet sich gegen die Ausführungen Jaquet's in Bezug auf das Gefässsystem der Hirudineen (cf. J. B. 1884/85 pg. 198), (*The vascular system of Hirudinea. — Zool. Anz. XI, 1888, pg. 16—18*); hierher auch **A. E. Shipley** (*on the existence of communications between the body-cavity and the vascular system. — Proceed. Cambridge philos. society VI, 1888, pg. 213—220*), der constatirt, dass die Trichter bei Nephelis und Clepsine offen mit als Leibeshöhle anzusprechenden Sinus in Verbindung stehen.

In „On the nephridia of *Hirudo medicinalis*“ theilt A. B. Griffiths mit, dass Harnsäure und Natron nachgewiesen werden konnten, dagegen Harnstoff, Guanin und Calciumphosphat fehlen (*Proc. R. soc. Edinburgh* vol. XIV, 1886/87, pg. 346—348).

In Fr. v. Leydig's „Beiträge zur Kenntniss des thierischen Eies im unbefruchteten Zustande“ werden auch eine Anzahl Hirudineen berücksichtigt und zwar *Piscicola respirans*, *Aulostomum nigrescens*, *Clepsine* sp. und *Nephele vulgaris*. Die Eier von *Piscicola* bieten so viel Eigenthümliches dar, dass noch manche Zweifel bestehen bleiben; im Eierstock lassen sich erstens die von Plasma umgebenen Kerne unterscheiden, welche die Matrix der Grenzhaut des Ovariums bilden und aus denen wahrscheinlich die in der häutigen Umhüllung des fertigen Eies sich findenden Kerne sich ableiten lassen, zweitens die Eikeime selbst; diese — aus Kern und protoplasmatischer Umhüllung bestehend — kapseln sich ab und innerhalb der Hülle erfolgt eine Vermehrung der Keimzelle; nur eins der Theilprodukte wird zum Ei, die übrigen dienen zu seiner Ernährung. Bei *Aulostomum* hält L. die Lichtung des die Keimstränge umschliessenden Sackes für eine abgegrenzte Partie der Leibeshöhle, da bei Thieren, die im Frühjahr beobachtet worden sind, Blutflüssigkeit die Keimstränge umspült. Verschiedene Beobachtungen am *Nephele*-Ei deuten darauf hin, dass Bestandtheile des Keimbläschens in den Dotter austreten, wobei gleichzeitig eine Verkleinerung des Bläschens eintritt; zwischen Dotterhaut und Eihülle scheint eine *Membrana granulosa* vorzukommen (*Zool. Jahrbücher, Abth. f. Anat. u. Ontog. d. Thiere, III. Bd., Jena 1889, pg. 287 bis 432, mit 7 Taf.*).

b. Systematik und Faunistik.

St. Apathy kann in der Ordnung der Hirudineen nur zwei Familien annehmen, die *Rhynchobdellidae* und die *Gnathobdellidae*; die *Branchiobdellen* gehören keineswegs zu den Hirudineen. Die Charaktere der *Rhynchobdelliden* sind: im Schlunde befindet sich ein vorstreckbarer Saugstecher; jedes typische Somit des Mittelkörpers ist aus 3, 6 resp. 12 Ringen zusammengesetzt; die sechsringeligen sind sämtlich Salzwasserformen. *Gnathobdellidae*: Der Oesophagus hat einen graden Verlauf, ihm fehlt ein vorstreckbarer Saugstecher; das typische Mittelkörpersegment besteht aus 5 Ringen; die äusseren Nephridialaperturen befinden sich an dem Hintersaume des 5. Ringes und zwar mit Ausnahme von *Haemadipsa*, an der Bauchfläche. Innerhalb der *Gnathobdelliden* lassen sich zwei Gruppen bilden:

- A. Die Zahl der vollständigen Somite des Körpers ist 19; die Geschlechtsöffnungen sind von einander durch einen Zwischenraum von 2 Ringen entfernt; das VI. Somit trägt nie Augen; der Anus liegt zwischen dem ersten und zweiten Somit der Analregion; die Mundöffnung erstreckt sich nach hinten vom II. Somit bis zum IV. (beide exclusive), besitzt also die Länge des dritten Kopfsomits; die Körperländer ver-

laufen im ganzen Mittelkörper parallel zu einander Fam. Nephelidae mit Nephelis incl. Trocheta Dutr.

- B. Die Zahl der vollständigen Somiten des Körpers ist 16; die Geschlechtsöffnungen sind von einander durch einen Zwischenraum von 5 Ringen (eine Somitlänge) getrennt; am VI. Somit fehlen die Augen nur ausnahmsweise, obwohl sie gelegentlich rudimentär und immer kleiner als die anderen sind. Der Anus liegt hinter dem zweiten Somit der Analregion; die Mundspalte befindet sich zwischen dem II. und V. Somit, besitzt also die Länge des III. und IV. Somits. Die Körperländer verlaufen nicht in der ganzen Länge des Mittelkörpers parallel zu einander. Fam. Hirudinidae mit (Hirudo + Haemopsis, Aulastoma + Typhlobdella).

Die Gattung Nephelis, von der übrigens für Europa nur zwei Arten (octocolata Bergm. und trocheta Dutr.) angenommen werden, wird folgendermassen charakterisirt:

Die Geschlechtsöffnungen liegen zwischen dem 4. und 5., resp. 1. und 2. Ring der betreffenden Somite; die in gleichem Grade convexe Bauch- und Rückenfläche treffen sich in einem kleineren oder grösseren Winkel, aber immer in einer ausgeprägten Kante (spindelförmiger Querschnitt), mit Ausnahme der Kopfregion, die vollkommen cylindrisch ist. Der Mittelkörper ist in seiner ganzen Länge gleich dick. Der Durchmesser der Haftscheibe ist $\frac{2}{3}$ der Mittelkörperbreite; die Zahl der Augen in der Regel 8; im Pharynx nie harte Kiefer.

Hirudo:

Die Geschlechtsöffnungen befinden sich zwischen dem 2. und 3. Ring des zweiten resp. dritten Clitellumsomites; der Anus liegt zwischen dem dritten Somit der Analregion und dem ersten der Haftscheibenregion; der Durchmesser der Haftscheibe ist grösser als der des hinteren Endes des Mittelkörpers und misst mindestens $\frac{2}{3}$ der grössten Breite des letzteren. Die Ränder des Mittelkörpers sind konvex. — Der Gattung Hirudo wird auch Haemopsis eingereiht und in dieser für Mitteleuropa nur H. medicinalis mit zahlreichen Varietäten angenommen.

Aulastoma:

Die Geschlechtsöffnungen befinden sich auf dem dritten Ringe der betreffenden Somiten; der Anus liegt zwischen dem zweiten und dritten Somit der Analregion. Die Haftscheibe besitzt einen geringeren Durchmesser als das Hinterende des Mittelkörpers und zwar ist sie halb so breit wie der Mittelkörper in seinen vorderen drei Vierteln. Die Ränder des Mittelkörpers verlaufen vom Clitellum bis zum letzten Viertel desselben parallel; von da ab verjüngt sich der Mittelkörper conisch nach hinten. — Auch von dieser Gattung giebt es in Europa nur eine Art (gulo Braun); die Typhlobdella Kowatsi Dies. kann höchstens eine der Höhlenbewohnenden Lebensweise angepasste Varietät von Aul. gulo sein!

Auch die Rhynchobdelliden theilt Apathy in 2 Subfamilien:

A. Ichthyobdellidae: Der Körper ist immer cylindrisch, bei erschlafter Muskulatur sind die Thiere mindestens 10 mal so lang wie breit; das Clitellum besteht aus reducirten Somiten und wenigstens das dritte bildet immer eine entschiedene Einschnürung des Leibes. Beide Geschlechtsöffnungen be-

finden sich im vorderen Drittel des betreffenden Somits. Die Analöffnung liegt immer zwischen dem ersten und zweiten Somit der Analregion; der Saugstecher ist nicht länger als das Praeclitellum und überragt die Grenzen des letzteren, wenn er nicht in Gebrauch ist, in keiner Richtung.

Gattg. Piscicola:

Der vollkommen cylindrische Körper ist ungefähr 20 mal so lang wie breit; der Mittelkörper ist in der ganzen Länge gleich dick; die Ringe sind mit unbewaffnetem Auge nicht wahrnehmbar: 12 derselben fallen auf je ein vollständiges Somit. Die Haftscheibe ist zweimal so breit wie der Saugnapf resp. der Mittelkörper; auf letzterem befinden sich 11 resp. 12 Paar, mehr oder weniger hervorragende, pulsirende Seitenausstülpungen. Augen auf dem IV. und V. Somit.

Einzigste Art: *P. piscium* Rös. (!)

B. Clepsinidae: Der Körper, wenigstens der Mittelkörper, ist nie cylindrisch; die Länge ist bei erschlafener Muskulatur resp. nach langsamen Absterben höchstens das 6–7fache der Breite. Das Clitellum bildet einen allmählichen Uebergang vom Mittel- zum Vorderkörper; die männliche Geschlechtsöffnung befindet sich zwischen dem zweiten und dritten, die weibliche zwischen dem ersten und zweiten Drittel des betreffenden Somits. Die Analöffnung liegt zwischen dem Hinterende der Analregion und der Haftscheibe, nur in einigen Fällen zwischen dem ersten und zweiten Ring des dritten Analsomits. Der Saugstecher ist wenigstens so lang wie das Praeclitellum.

Einzigste Gattung Clepsine mit 6 Arten, für welche folgende Bestimmungstabelle gegeben wird:

- | | |
|---|------------------------------|
| a) Der Saugstecher ist nicht länger als das VII, VIII. und IX. Somit: | |
| α) Der Saugstecher ist ebenso lang als das VII, VIII. und IX. Somit. | <i>Cl. marginata</i> M. |
| β) Der Saugstecher ist noch kürzer als das VII, VIII. und IX. Somit | <i>Cl. tessulata</i> M. |
| b) Der Saugstecher ist um ein Bedeutendes länger als das VII, VIII. und IX. Somit. | |
| γ) Der Saugstecher ist länger als die ganze Clitellarregion | <i>Cl. bioculata</i> Bergm. |
| δ) Der Saugstecher entspricht der Clitellarregion (6 Somite) | <i>Cl. heteroclita</i> L. |
| ε) Der Saugstecher misst die ersten fünf Somite der Clitellarregion | <i>Cl. concolor</i> n. sp. |
| ζ) Der Saugstecher ist kaum länger als die vier ersten Somite der Clitellarregion | <i>Cl. sexoculata</i> Bergm. |

Die hier in ihren Resultaten wiedergegebene Arbeit Apathy's ist im Wesentlichen eine Kritik der dem Ref. nicht zugänglichen, in ungarischer Sprache geschriebenen (Diagnosen lateinisch) „Fauna Hirudinearum Hungariae“ von L. Oerley (Math. u. naturw. Mitth. d. Ung. Akad. XXII. 1888), betrifft demnach gleichzeitig die mitteleuropäischen „Süßwasser-Hirudineen“, von denen Oerley 8 Gattungen mit 25 Arten anführt, die bei Apathy auf 5 Gattungen

mit 10 Arten zusammenschmelzen. Ref. muss stark bezweifeln, dass diese so weit gehende Zusammenziehung von Gattungen und Arten sich wird halten lassen; auch die Bestimmungstabelle von Clepsine dürfte kaum praktische Bedeutung gewinnen. (*Süsswasser-Hirudineen, ein systematischer Essay* — *Zool. Jahrbücher, Abth. f. System. III. Bd. 1888* pg. 725—794).

In ähnlich radicaler Weise wie mit den Süsswasser-Hirudineen verfährt St. Apathy auch in seinen „Systematische Streiflichter“ mit den marinen.

Nach ihm gehören zu den Ichthyobdelliden die Gattungen *Ichthyobdella* Blainv., *Piscicola* Blainv., *Calliobdella* v. Ben. et H., *Branchellion* Lav. und *Pontobdella* Leach. In der mit *Pontobdella* und *Calliobdella* sich beschäftigenden Arbeit zieht derselbe *Pontobdella muricata* Lam., *P. verrucata* Leach, *P. areolata* Leach und *P. laevis* Blainv. zu einer einzigen Species (*P. muricata* Lam.) zusammen; als neu kommt hinzu *P. Vosmaeri* n. sp., die wiederholt in Neapel im Dredgematerial aus grösserer Tiefe heraufgeholt wurde. *P. campanulata* Dal., *P. lubrica* Gr., *P. oligothela* Schmar. und *P. littoralis* Johnst. gehören — vielleicht mit Ausnahme von *P. littoralis* — zusammen zur Gattung *Calliobdella*, innerhalb welcher *C. lubrica* Gr. und *C. nigra* n. sp. aus Neapel zu unterscheiden sind (*Arch. f. Naturgesch. 54. Jahrg. 1888. I. pg. 43—61*).

F. v. Leydig giebt Bemerkungen über die Lebensweise von *Piscicola geometra* und *respirans* sowie einige anatomische Daten, welche die Unterschiede beider Arten illustriren (*Zool. Jahrb., Abth. f. Anat. d. Thiere III. 1889. pg. 289—291*).

Piscicola geometra L. in der Wismarer Bucht cf. Braun im *Arch. Ver. d. Ferde. d. Naturg. Mecklenb. 42. Jahr. 1888/89* pg. 71).

C. Massa berichtet über das Vorkommen von *Clepsine marginata* M. (*Una nuova specie di sanguisuga del Modenese-Atti soc. nat. Modena Rendic. (3) III. 1887. pg. 124*).

III. Aberrante Formen.

A. *Myzostomida*.

Vergl. oben pg. 1 bei A. Lang.

B. *Enteropneusta*.

Die schon im vorigen Bericht (1886/87 pg. 129, 130) referirte Arbeit von R. Koehler: Rech. anat. sur une nouv. esp. de *Balanoglossus*, le Bal. sarniensis ist erschienen im Bull. soc. sc. Nancy (2) T. VIII fasc. XIX pg. 154—201 3 pl., résumé — ibid. fasc. XX pg. VI—VII.

A. Glard giebt eine Uebersetzung der Note von G. B. Haldeman (cf. J. B. 1886/87 pg. 131) über *Tornaria* and *Balanoglossus* (Bull. scientif. du Nord de la France (2) T. X 1888 pg. 532—535).

Den von N. Wagner (cf. J. Ber. f. 1884/85 pg. 177) beschriebenen *Balanoglossus Mereschkowskii* macht W. Schimkewitsch zum Gegenstand einer besonderen Studie. Der Körper besteht aus dem Kopflappen, einem einzigen Körpersegment (Kragen) und dem hinteren nicht segmentirten Abschnitte; das unpaare Kopfcoelom mündet durch

Vermittlung des linken excretorischen Kanales nach aussen. Das Coelomendothel des Rüssels biegt auf der Rückenseite um und geht auf den inneren Organcomplex über, denselben umhüllend. Die Falten des inneren Peritonealblattes der Rüsselhöhle (innere Kieme) verhalten sich zum Gefässsystem ähnlich wie die Pericardialdrüse der Anneliden und haben wohl excretorische Function. Die Rüssel-drüse (Bateson, Herz Spengel) besitzt eine eigene Muscularis, während ihr Epithel dem Endothel einiger Theile des Rüsselperitoneums ähnlich ist; sie ist vielleicht der contractilen Schwanzblase von Pulmonaten-Embryonen gleich zu setzen. Das Gefässsystem erscheint einfach, da abgesehen vom Dorsal- und Ventralstamme andere Gefässe nicht zur Entwicklung kommen. Die Nervenfaserschicht ist zwar unter der ganzen Haut entwickelt, aber die dorsale Verdickung besitzt keine Höhle und keine Neuporen. Das Scelet stellt nur eine locale Verdickung der Membrana propria dar. Die perihämalen Höhlen können den Muskelplatten der Wirbelthier-embryonen gleichgestellt werden (?), sind aber wie das dorsale Centralnervensystem auf ein Körpersegment beschränkt. Der einige Windungen bildende Kiementhail des Darmes besitzt eine kleine Rinne, deren Boden mit Papillen besetzt ist und dem Diverticulum des Kragentheils ähnlich ist. — Beide können als Homologen des Endostyles, der Hypobranchialrinne und der Schilddrüse der Cyclostomen angesehen werden. Die seitlichen Ausstülpungen des Kragentheiles sind wahrscheinlich nicht zum Durchbruch gekommene Kiemensäcke des ersten Segmentes. Die Geschlechtsorgane haben mit der Epidermis nichts zu thun. B. Mereschkowskii kann man als eine Trochophora ansehen, die nur mit einem Körpersegment versehen ist und das Kopfganglien unter den Augen der Tornaria eingebüsst, dafür aber einige Merkmale erworben hat, die sie den Chordaten nähern (*Zool. Anz. XI, 1888, pg. 280—283; Archives Zool. expér. et gén. (2) T. VI, 1888, notes pg. XXIII und in russ. Sprache in den Arbeiten der St. Petersb. Naturf. Ges. Petersb. 1889*).

W. F. R. Weldon beschreibt *Balanoglossus*-Larven von den Bahama-Inseln, an denen er eine Rückbildung der Coelomsäcke beobachtet hat; auch die Scheitelplatte und die sogenannte Chorda werden davon betroffen (*prel. note on a Bal.-Larva from the Bahamas in Proc. R. soc. London vol. 42, 1887, pg. 146—150, 3 Fig.*).

C. Echinodermidae.

D. Gastrotricha.

Hierher:

Stokes, C. A. Observations sur les Chaetonotus et les Dasydytes (suite) Journ. de micrographie XII. Paris 1887, pg. 19—22, 49—51, 1 pl.

Schimkewitz, Will. Ueber eine neue Species Ichthyidium (J. Bogdanovii) Nachr. d. K. Ges. der Freunde der Natur etc. T. 50, 1886, pg. 148—150.

E. Chaetognathi.

A. Bolles Lee fasst die Resultate seiner Untersuchungen über die „Spermatogénèse chez les Chétognathes“ wie folgt, zusammen: Der Hoden der Sagitten entsteht aus derselben Urgeschlechtszelle, welche das Ovarium derselben Seite bildet; in dem soliden Hodenstrang entstehen Polyplasten, denen von Lumbricus ähnlich, die einen kernlosen Blastophor haben; sie werden frei und fallen in die Leibeshöhle; hier theilen sie sich in toto durch eine einfache Segmentation ihres Protoplasmas, wogegen ihre Kerne sich zu distincten Zellen, Spermatocyten, umwandeln, welche um den Blastophor vereinigt bleiben. Die nun folgende Vermehrung der Spermatocyten geht immer unter den Erscheinungen der Karyokinese vor sich (Scission en anses parallèles — Carnoy). Spermatocyten und Spermatiden besitzen einen Nebenkern von fadiger Structur, der im Nucleus selbst zu entstehen und dann ausgestossen zu werden scheint. Die Spermatozoen haben einen aus dem Kern der Spermatiden hervorgehenden Kopf; das Plasma des Kerns scheint dem Zellleibe nach der Bildung des Kopfes einverleibt zu werden. Aus einer Verlängerung des Cytoplasma der Spermatide entsteht ein filament procéphalique an den Spermatozoen, deren Schwanz einen Achsenfaden besitzt. Kopf und Schwanz werden von einer im Cytoplasma entstehenden undulirenden Membran spiralgig umgeben. Die den Spermatozoen von den Autoren zugeschriebene Querstreifung wird durch die Spiraltouren der undulirenden Membran vorgetäuscht. In den Polyplasten liegen die Spermatozoen so, dass ihre Köpfe nach aussen, die Nebenkern nach innen, nach dem Blastophor zu gerichtet sind. Der Blastophor kann während der Entwicklung der Spermatiden resorbirt oder am Ende der Spermatogenese ausgestossen werden (*La Cellule, recueil de cytologie et d'histol. génér. publ. par Carnoy, T. IV, fasc. 1. Louvain (ohne Jahreszahl) p. 107 bis 133, 2 pl.*).

Zu den gemeinsten Thieren zwischen 100 und 1300 m des Mittelmeeres gehört nach Chun *Sagitta hexaptera*; fast ebenso häufig ist *S. serratodentata*, während *S. bipunctata* in der Tiefe zu fehlen scheint (*Pelag. Thierwelt etc. in: Biblioth. zool. Hft. 1, Cassel 1888, pg. 17, 18*).

Sagitta germanica L. und Pag. in der Wismarer Bucht (*Braun Arch. Ver. Frde. Naturg. Mecklenb. 42. Jahrg. 1888/89, pg. 71*).

IV. Freilebende Plathelminthes.

A. Nemertini.

M. Braun giebt ein Referat „über parasitische Schnurwürmer“ (*Centralbl. f. Bacter. u. Parasitenkde. III, 1888, pg. 16—19, 56—58*).

Auf O. Bürger's Mittheilung „Beiträge zur Kenntniss des Nervensystems der Nemertinen“ sei hier nur verwiesen, da die ausführliche Arbeit erschienen und demnächst referirt wird (*Nachr. d. Kgl. Ges. d. Wiss. Göttingen 1888, No. 17*).

Mit Rücksicht auf die von den Sarasin's bei *Helix Waltonii* beschriebenen Cerebraltuben spricht sich W. Salensky dafür aus, dass die Seitenorgane der Nemertinen, die wie jene aus Ectoderm-einstülpungen hervorgehen, ihnen und den Geruchsorganen der Anneliden entsprechen und die ursprüngliche Eorm solcher Organe repräsentiren (*Seitenorgane der Nemertinen*. — *Biol. Centralbl.* VIII, 1888, pg. 79—80).

In einem Altwasser des Embach bei Dorpat (Thaste), welches schon dem Ref. interessante Thiere geliefert hat, entdeckte Kennel eine Nemertine, die er für *Tetrastemma clepsinoideum* Dug. hält. Der Autor will die Nemertinen von den Plathelminthen getrennt wissen (*Stegsb. d. Naturf.-Ges. Dorpat* VIII. Bd., 3. Hft., 1888, pg. 427).

Tetrastemma subpellucidum Oerst.; *Polystemma roseum* Müll. und *Nemertes gesserensis* Müll. in der Wismarer Bucht (cf. Braun: *Arch. Ver. Frde. Naturgesch. Mecklenb.* 42. Jahrg. Güstrow pg. 71.

B. *Turbellaria*.

a. Anatomie und Entwicklung.

E. Sekera's Dissertation: „*Príspevky ku známostem o Turbellariích sladkovodních*“ behandelt zuerst die Geschlechtsverhältnisse von *Microstoma*: Bei *Microstoma* kann die geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung bei demselben Individuum und zu derselben Zeit stattfinden. Die Geschlechtsorgane, die sich sowohl in den Einzelindividuen als in den Zooiden ausbilden, sind meist nur eingeschlechtlich, selten zwittrig (*Atavismus?*), wobei dann die männlichen den weiblichen in der Entwicklung vorangehen. Die Hoden der einheimischen Arten sind immer paarig. Die abgelegten Eier entwickeln sich erst im nächsten Frühjahr. Der zweite Theil betrifft die *Stenostomiden*, die der Autor von den *Microstomiden* trennt; er unterscheidet 3 Gattungen: 1. *Catenula* (*C. lemnae* Dug. aus dem Böhmerwald wird beschrieben): mit Otolith, mit bewimpertem Mundsaume, ohne Wimpergrübchen und lichtbrechende Körperchen. Nervensystem ein einfaches Ganglion; Leibeshöhle höchst unbedeutend; Excretionsorgan ein einfacher, hinten ausmündender Längskanal. 2. *Stenostoma*: mit Wimpergrübchen, lichtbrechenden Organen, ansehnlich entwickeltem Nervensystem mit voluminösen Ganglien der Wimpergrübchen, Leibeshöhle und Darmdrüsen wohl entwickelt; Excretionsorgan ein doppelter Stamm. 3. *Rhynchoscolex* Leidy 1854: mit rüsselartigem, muskulösem Haftapparat, ohne Wimpergrübchen und lichtbrechende Körperchen; Nervensystem reducirt; Excretionsorgan ein doppelter Stamm; Darmdrüsen in paarigen Reihen; eine feinkörnige Masse mit grossen Zellen füllt die Leibeshöhle aus (*Rh. Vejdoskyi* n. sp. aus Böhmen). Im dritten Theil werden folgende Arten genau beschrieben: 1. *Mesostomum hirudo* O. Schm.; 2. *Vortex coronarius* O. Schm., 3. *V. paucispinosus* n. sp. und 4. *Bothrioplana alacris* n. sp. planarienartige Form, 5—8 mm lang, mit Wimpergrübchen und Geisselhaaren am Vorderrande, vierkantigem

Gehirnganglion, ohne Augen, mit lappigem Darm und Pharynx plicatus. Doppelreihen der Hodenbläschen, langgestreckte, gebuchtete Dotterstöcke, paarige Keimstöcke in der Höhe des Pharynx, mit einfacher Vesicula seminalis, geräumigem Atrium, ohne Uterus. Geschlechtsöffnung befindet sich unterhalb des Pharynx. Die Oeffnungen der Excretionsstämme sind oberhalb der Darmklappen zu beiden Seiten des Gehirnganglions. Im Integument zahlreiche Stäbchenpackete und birnförmige, grobkörnige Drüsen. (47 pg. 8^o 4 Taf. 1888. — *Stzgsber. d. Kgl. böhm. Ges. d. Wiss. Prag.*)

In einer weiteren Arbeit handelt E. Sekera über Anatomie und Histologie der *Planaria albissima* Vejd., die eine Länge von 8 bis 10 mm, eine Breite von 1—1,5 mm erreicht; die Farbe ist ganz schneeweiss, jedes Pigment fehlt. Das Integument, Parenchym, die Drüsen und das Nervensystem stimmen mit den entsprechenden Organen der bisher bekannten Planarien überein. In der Augenregion findet sich ein flaches Grübchen, das auch bei *Pl. polychroa* vorkommt, und vielleicht dem Kopfporus der Anneliden und Nemeriten homolog ist. Bei der Schilderung des Darmes werden Beobachtungen über intracelluläre Verdauung (Fig. 8) mitgetheilt. Die Excretionsorgane bestehen aus zwei, vorn und hinten durch eine Queranastomose verbundenen und der ganzen Länge nach an den Körperseiten hinziehenden Hauptstämmen, von denen in regelmässigen Zwischenräumen je acht Aestchen nach der Dorsalseite abgehen und dort ausmünden. Terminalzellen mit Wimperflammen wurden ebenfalls beobachtet. Zahlreiche Hodenfollikel liegen auf der Bauchseite im ganzen Körper; die nur neben der Pharyngealtasche deutlich erkennbaren Samenleiter treten in eine kleine Vesicula seminalis ein. Der Penis ist ein muskulöses, vorstreckbares Organ, das in einer langen, muskulösen Penistasche liegt. Die Spermatozoen sind lang und fadenförmig. Die beiden elliptischen Keimstöcke liegen hinter dem ersten oder zweiten Darmast; junge Keimzellen lassen deutliche, amöboide Bewegungen erkennen; Keimleiter und bandförmige Dotterstöcke bieten nichts Besonderes; der lange Stiel des kugelförmigen Drüsenorganes hat ein drüsiges Epithel. In der Umgebung des Endabschnittes der Geschlechtsorgane finden sich zahlreiche Drüsenzellen, ein Theil derselben mündet in das Drüsenorgan. Zum Schluss theilt der Autor Beobachtungen über die spontane Theilung der Planarien mit: noch nicht geschlechtsreife Individuen von *Pl. albissima* theilen sich bei reichlichem Futter ziemlich häufig; auffallend ist, dass allen sich theilenden Exemplaren der Pharynx fehlte, der wohl nicht willkürlich ausgestossen, sondern durch eine Laesion verloren worden ist; dann würde man diese spontane Quertheilung als einen Act auffassen müssen, der die leichtere Selbsterhaltung des Individuums bei körperlicher Beschädigung ermöglicht; der hintere Theil nämlich starb des öfteren ab, während der vordere sich stets regenerirte, also einen neuen Pharynx mit neuem hinteren Körperabschnitt bildete. Aehnliche Beobachtungen sind auch bei *Pl. subtentaculata* und *Pl. polychroa*

gemacht worden. Der Autor will in diesen Quertheilungen einen Rückschlag in Verhältnisse sehen, wie sie den Micro- und Stenostomiden noch heut zukommen (*Prispevky ku známostem o Planariích sladkovodních. — Sitzgsber. d. Kgl. böhm. Ges. d. Wiss. Prag 1888. pg. 404—421. 2 Taf.*)

Braun giebt ein Referat über „parasitische Strudelwürmer“ (*Centrabl. f. Bact. und Parasitenkde. V. Bd. 1888 pg. 41—44*).

J. v. Kennel berichtet in seinen „Untersuchungen an neuen Turbellarien“ zuerst über eine Süßwasserdendrocoele, die er mit *Planaria alpina* Dana identificirt und in der Alandsquelle bei Würzburg gefunden, sowie aus Gewässern der Alpen erhalten hat; er schildert die Lebensweise, Bewegung, äussere Form sowie anatomisch besonders den Geschlechtsapparat.

Den sogenannten Uterus zählt er zwar den weiblichen Geschlechtsorganen zu, betrachtet ihn aber als *Receptaculum seminis* und deutet das „muskulöse Drüsengorgan“ als ein Organ, das bei der Ablage und Befestigung der Cocons Hilfe leistet oder als ein Reizorgan bei der Begattung dient. Die Penistasche besitzt eine sehr stark entwickelte Muskulatur, während der Penis selbst muskelschwach ist und einer Längsmuskulatur entbehrt. Die Excretionsorgane weichen nicht wesentlich von denen von *Dendrocoelum* ab, doch finden sich constant auch vor den Augen 1 oder 2 Pori. Beim Nervensystem wird ein dem Schlundring von *Microstoma* zu vergleichende Bildung von *Pl. alpina* erwähnt. Des Weiteren folgt eine Beschreibung von *Planaria aurita* n. sp. und *Pl. fissipara* n. sp., beide von Trinidad; letztere Art ist durch ihre Quertheilungsfähigkeit ausgezeichnet.

Die Rhabditen betrachtet Kennel mit Keferstein als ein geformtes Drüsensecret, das zum Fang der Beute dient. An rhabdocoelen Turbellarien fand der Autor eine dem *Mesostomum Ehrenbergii* sehr nahe stehende Form, ferner *Prorhynchus applanatus* n. sp., der einen nach vorn unter den Pharynx sich fortsetzenden Darmblindsack und zahlreiche seitliche Divertikel im übrigen Darm besitzt; *Stenostoma bicaudatum* n. sp. stets in Ketten von 2 oder 3 Individuen gefunden (*Zoolog. Jahrbücher. III. Bd. Abth. f. Anat. und Ontog. d. Thiere pg. 447—486. 2 Taf.*; ferner: „einige dendrocoele Turbellarien“ und „einige rhabdoc. Turb. aus Trinidad“ in: *Sitzgsber. d. Naturf.-Ges. Dorpat VIII. 2. 1887. pg. 333; VIII. 3. 1888 pg. 372.*)

B. Systematik, Faunistik.

Zu dem im vorigen Bericht (1886/87 pg. 160) gemeldeten Auftreten von *Bipalium kewense* Mos. in verschiedenen botanischen Gärten sei hier auf eine Mittheilung J. J. Fletcher's verwiesen, der diese Landplanarien in Sydney beobachtete und Bemerkungen über die Farbe, Regeneration giebt (*rem. on. an introduced species of Landplanarian, appar. Bip. kew.-Proceed. Linn. soc. N. South Wales. II ser. vol. II. 1887 pg. 244—249*).

J. J. Fletcher u. A. G. Hamilton schildern die Lebensweise, Nahrung, Eiablage und Fundorte australischer Landplanarien, von denen sie folgende Arten beschreiben: *Geoplana tasmaniana* Darw., *G. coerules* Mos., *G. sanguinea*

Mos., *G. subviridis* M., *G. variegata* n. sp., *G. sulphureus* n. sp., *G. quinquelineata* n. sp., *G. viridis* n. sp., *G. ornata* n. sp., *G. virgata* n. sp., *G. munda* n. sp., *G. rubicunda* n. sp., *Rhynchodemus Moseleyi* n. sp., *Rh. Cozii* n. sp., *Rh. obscurus* n. sp., *Rh. guttatus* n. sp., *Rh. trilineatus* n. sp. und *Rh. niger* n. sp. Anatomische Daten sollen später folgen (*notes on austr. Landplan., with descr. of some new species* — *Proceed. Linn. soc. N. South Wales. 2 ser. vol. II. 1887 pg. 349 bis 374. 1 pl.*)

Fasciola terrestris O. F. Müll. in Pilzen bei Hirschberg (Zacharias: *Landplanarien auf Pilzen* — *Biol. Centralbl. VIII. 1888/89 pg. 542*).

Unter den pelagischen Thieren der Tiefe fand Chun bei Neapel einmal im 600 m Tiefe eine unbestimmbare, rhabdocoele Turbellarie von 2,5 mm Länge (*Pel. Thierwelt etc. in Biblioth. zoolog. Hft. 1. Cassel 1888 pg. 17.*)

W. Replachoff beschreibt kurz, ohne zu benennen, „noch eine an Nebalien lebende Turbellarie“, die er an Nebalien aus dem Golf von Marseille antraf und die sich in manchen Punkten von der Triester Art (cf. J. Ber. 1884/85. pg. 215) unterscheidet (*Zool. Ans. XI. 1888. pg. 141—144*).

M. Braun fand in der Wismarer Bucht: *Monocelis agilis* M. Sch., *Dendrocoelum lacteum* Oerst. und *Gunda ulvae* Oerst. (*Arch. Ver. Frde. Naturg. Mecklenburg. 42. Jahrg. Güstrow pg. 71*).

Die Turbellarien des 1168 m hoch gelegenen kleinen Koppenteiches (Riesengebirge) zählt O. Zacharias auf (*Ueber die Verbreitung der Turbellarien in Hochseen in Zool. Ansg. XI. 1888 pg. 704—705*).

Weltner berichtet über „die Planarien bei Berlin:“ *Polycelis nigra*, *Planaria torva*, *lugubris*, *Dendrocoelum lacteum* und *punctatum* (*Sitzgsber. d. Ges. naturf. Frde. Berlin 1888. Nr. 5*).

Derselbe erwähnt ferner das Vorkommen von *Dendrocoelum punctatum* im Werbellinsee bei Berlin (in 80 Fuss Tiefe), in der Spree oberhalb Berlins, im Krinensee und in der Dievenow bei Kamin in Pommern (*Ueber das Vorkommen von Bythotrephes longimanus Leyd. und Dendr. punct. etc. — Ges. naturf. Frde. Berlin 1888 Nr. 9*).

An Turbellarien fand Zacharias in den beiden Salzseen bei Halle: *Stenostoma unicolor*, *St. leucops*, *Microstoma lineare*, *Mesostoma viridatum*, *Vortex truncatus*, *Polycelis nigra* und *Dendrocoelum lacteum* (*Zeitsch. f. wiss. Zool. 46. Bd. 1888 pg. 224*).

Die Arbeit von G. du Plessis „sur les monotides d'eau douce“ spricht sich dahin aus, dass der *Monotus relictus* Zacharias dem *Monotus morgiensis* D. Pl. gleich ist; auch dieser Autor hält die Monotiden des süßsen Wassers als Reste einer alten marinen Fauna (*Bull. soc. Vaud. sc. nat. XXI. 93. Lausanne 1886 pg. 265—273, 1 pl.*).

Trotz der grossen Ansbeute, welche Ref. bei seinen Untersuchungen der rhabdocoelen Turbellarien Livlands erhalten hat, ist der Reichthum an Arten daselbst noch nicht erschöpft, wie eine Notiz Kennel's meldet, der eine grosse Zahl neuer oder für Livland neuer Formen gefunden hat; die farbigen Abbildungen dieser später zu beschreibenden Arten wurden vorgelegt (*Sitzgsber. Naturf.-Ges. Dorpat VIII. 2. 1887 pg. 298*).

Anhang.

A. *Dicymidae* und *Orthonectidae*.

Vergl. oben pg. 1 bei Lang und Hatschek.

B. *Trichoplax*.

Vergl. oben pg. 1 und 2 bei Lang und Hatschek.

C. *Haplodiscus*.

Unter dem Namen *Haplodiscus piger* n. g. n. sp. beschreibt W. F. R. Weldon einen rundlichen, 1,3 mm grossen pelagischen Organismus von den Bahamas, den der Verf. zwar den Plathelminthen einreihet, aber zu Cestoden oder Trematoden stellen möchte, obgleich es viel näher liegt, in diesem im geschlechtsreifen Zustande beobachteten Thier ein Turbellar und zwar eine Alloiocoele zu sehen; freilich wird die Existenz eines Hautepitheles geläugnet und an Stelle dessen eine dicke, auf der Bauchseite zweischichtige Cuticula beschrieben; doch da, wie aus den Abbildungen ersichtlich, der Erhaltungszustand von Darm und Parenchym ein sehr precärer ist, so ist vielleicht auch die Haut schlecht conservirt gewesen (*Hapl. piger, a new pelag. organism from the Bahamas-Quart. journ. micr. sc. XXIX 1888/89 pg. 1—8, 1 pl.*).

Folgende Schriften hat Ref. nicht erhalten können:

- Colombo, A. Fauna sottomarina del golfo di Napoli. Roma 1888, 107 pg., 7 tav.
- Durègne ... Distribution bathym. des espèces mar. dans le golfe de Gascogne (Act. soc. Linn. Bordeaux vol. 41 (5) I. Compt. rend. pg. XXXIII bis XXXV).
- Fewkes, J. W. New marine larva and its affinities (The microscope June 1888, 1 pl.).
- Chaney, L. W. Biological notes (worms). Americ. monthl. micr. journ. IX pg. 206).
- Haddon, A. C. On the irish marine fauna (Proc. R. irish acad. I 1888 pg. 29—56 und Journ. R. micr. soc. London 1889 pg. 194).
- Fewkes, J. W. Vermes etc. in The Lady Franklin Bay Expedit. vol. II, append. No. 133 pg. 47—52, 1 pl.
- Shipley, A. E. On the existence of communications between the body-cavity and the vascular system (Proc. Cambridge philos. soc. VI pg. 213—220).
- Kusta, J. Annelidenreste aus der Steinkohlenformation von Rakowitz (Stzgsb. d. K. böhm. Ges. d. Wiss. Prag 1887 pg. 561—564).
- Brunotte, C. Rech. anatom. sur une esp. du genre Branchioma (Trav. de la stat. zool. de Cotte. Nancy 1888, 77 pg., 4°, 2 pl.).
- Wirén, A. Om en hos eremitkräftor lefvande Annelid (Bih. Kgl. svens. vet. akad. Handl. XIV No. 5 pg. 1—14, 3 pl.).
- Prince, E. E. On the ova of Tomopteris onisciformis (Rep. 57 meet. brit. ass. f. adv. sc. 1888 pg. 769).

- Prince, E. On a ciliated organ in *Tomopt. oniscif.* (ibid. pg. 769).
 Benham, W. B. Rec. researches on earthworms (ibid. pg. 749—750).
 Harker, A. On a luminous *Oligochaete* (ibid. pg. 767).
 Rosa, D. *Lombrichi della Scioa* (Ann. mus. civ. stor. nat. Genova (2) T. VI 1888 pg. 571—592 e. 1 tav).
 Garman, H. On the anatomy and histology of a new Earthworm (*Diplocardia communis* n. g. n. sp.) in Bull. Illin. stat. labor. nat. hist. III pg. 47—77, 5 pl.).
 Giard, A. Sur une nouvelle station de *Phreoryctes menkeanus* (Bull. scientif. de France et de la Belg. (3) I pg. 298).
 Eisen, G. New annelid, *Sutroa rostrata* (fam. *Lumbriculina*) (Mem. Californ. Acad. sc. vol. II 1888 pg. 1—8, 2 pl. u. Journ. R. Micr. soc. London 1888 pg. 582).
 Stokes, A. C. Two new aquatic worms from N. — Amer. (*Aeolosoma*) in The microscope VIII pg. 33—41, 1 pl. u. Journ. R. micr. soc. 1888 pg. 582.
 Vaillemín, P. Sur un procédé pour étudier le syst. vascul. de la sangsue (Bull. soc. sc. Nancy (2) T. VIII fasc. 20 pg. VIII—IX).
 Dutilleul, G. Rech. anatom. et histol. sur la *Pontobdella muric.* (Assoc. franc. avanc. sc. Congrès de Nancy 1886. Nancy 1887 16 pg. 1 pl.).
 Félix, K. Mém. sur l'*Haemopsis* (Journ. sc. méd. Lille 1888, 8 pg., 8°).
 Marchesini, R. Organi digerenti e digestione delle sanguisughe (Lo Spallanzani (2) VIII 1888 pg. 138—142).
 Loman, J. C. C. Ueber den Bau von *Bipalium* nebst Beschreibung neuer Arten aus dem indisch. Archipel (Bijdr. tot de Dierkde. N. art. mag. 14. Afl. pg. 61—88, 2 Taf.).
-

Bericht

über die
wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte
der Helminthen im Jahre 1888.

Von
Dr. von Linstow
in Göttingen.

Allgemeines.

Blanchard giebt eine kurze Uebersicht über das gesammte Gebiet der Würmer und bemerkt, dass den Aneurien nicht immer ein Mesoderm fehle, da es bei den Orthonectiden vorhanden sei; *Filaria inermis* Grassi, welche im Menschen, im Pferde und im Esel lebt, hält Verf. für identisch mit *Filaria papillosa* Rud., mit *F. conjunctivae* Addario, *F. equina* Abildgaard, *F. peritonei hominis* Babès und einer von Pace im Auge des Menschen gefundenen Filarie. *Gordius aquaticus*, *tolosanus*, *varius* und *chilensis* sind, zufällig mit Trinkwasser aufgenommen, als Pseudoparasiten des Menschen beobachtet worden. *R. Blanchard. Vers. Dictionnaire encyclopédique des sc. méd. Paris 1888, 5. ser., t. III pag. 35—54.*

Parona bespricht die Geschichte der Helminthologie des Menschen in Italien. *C. Parona. Appunti storici di elmintologia italiana a contributo della corologia elmintologica umana. Milano 1888. Gazz. med. Ital. Lombard. 21 pg.*

Besondere Erwähnung erfahren Redi, Vallisnieri, Malpighi und unter den neueren Forschern Delle Chiaje, De Filippi und Ercolani. Die erste Kenntniss mancher Parasiten verdanken wir vorwiegend italienischen Forschern, so die von *Rhabdonema strongyloides*, *Filaria palpebralis*, *F. labialis*, *F. conjunctivae*, *F. inermis*, die genauere Kenntniss von *Ankylostomum duodenale* und die Kenntniss des Vorkommens von *Gordius tolosanus* im Menschen.

Lutz macht Bemerkungen über den Parasitismus von *Ascaris lumbricoides*, deren Anwesenheit am besten aus dem Auffinden der Eier in den Fäces durch das Microscop geschieht; es werden *Oxyuris vermicularis* und *Ankylostomum duodenale* besprochen, ferner

Trichocephalus dispar und die den Menschen bewohnenden Taenien; *Rhabdonema longum* Grassi = suis Lutz fand Verf. in São Paulo in Brasilien in 20 Exemplaren in einem Schwein wieder. Ausgewachsene, zum Theil mit der abgestossenen Larvenhaut noch bekleidete Larven von *Ankylostomum duodenale* verfütterte Verf. mit Erfolg an einen Menschen, der zuvor frei von diesem Parasiten war; eine weitere Entwicklung der Larven im Freien findet nicht statt. Wenn Johnes unter den Ankylostomen des Hundes auch *A. duodenale* anführe, so sei das wohl eine Verwechslung mit *A. caninum* Ercolani. In der Hauskatze lebt eine kleine, noch unbeschriebene *Trichocephalus*-Art und in cystenartigen Hohlräumen des Pankreas von *Sciurus aestuans* fand Verf. eine geschlechtsreife *Strongylus*-Art. *A. Lutz. Klinisches über Parasiten des Menschen und der Haustiere. Centralbl. für Bact. und Parask. II. Jahrg., III. Bd., Jena 1888, No. 18—25.*

Die Arbeit von **J. Ritzema Bos**, *De dierlijke Parasieten van den Mensch en de Huisdieren*, Zwolle 1888, 279 pg., 100 Holzschn. ist nicht für Zoologen geschrieben.

Blanchard veröffentlicht eine populäre Darstellung des Parasitismus von *Ascaris lumbricoides*, *Trichocephalus dispar*, *Ankylostomum duodenale*, *Filaria Bancrofti*, *Dracunculus medinensis*, *Distomum hepaticum*, *Gynaecophorus haematobius*, *Trichina spiralis*, *Taenia solium*, *saginata* und *echinococcus* und *Bothriocephalus latus*, *R. Blanchard. Les ennemis de l'espèce humaine. Revue scientifique, Paris 1888.*

Moniez stellt die gesammten thierischen und pflanzlichen Parasiten des Menschen zusammen und behandelt in diesem Werke pag. 47—200 die Helminthen, wobei er die neuesten Entdeckungen mit berücksichtigt; er bespricht 10 Trematoden-, 12 Cestoden-, 1 Acanthocephalen- und 16 Nematoden-Arten. In der Einleitung behandelt Verf. die Frage nach dem Ursprung der Parasiten, den Einfluss derselben auf die von ihnen bewohnten Thiere und bemerkt, wie einzelne Nematoden dem Parasitismus gleichsam indifferent gegenüber stehen, da sie im Freien mehrere Generationen hindurch leben können, um sich dann gelegentlich in einem Thiere weiter zu entwickeln, während andere regelmässig eine freilebende und eine parasitische Generation bilden, noch andere in der Jugend parasitisch, erwachsen frei leben, wieder andere umgekehrt. Der Parasitismus degradirt die Thiere, wie z. B. die Cestoden den ganzen Verdauungstract verloren haben. Die Frage nach dem Wirthswechsel und der Wanderung wird erörtert, deren Erklärung man in einer raison d'ordre morphologique und in des considérations d'une autre nature suchen muss. Die Fresser fauliger Körper, die animaux saprophages, sind zuerst zu Entozoen geworden, von denen einige sich direkt im Darm von Thieren entwickelten, die sie gelegentlich gefressen haben. Die Embryonen der für den Parasitismus geeigneten Thiere verliessen den Darmkanal eines Thieres, in den sie gelangten, und bohrten sich durch die Darmwand in das

Innere, weil sie dem Darminhalt auf die Dauer nicht widerstehen konnten; in den inneren Organen kapselten sie sich ein; der definitive Wirth war bereits vorhanden. Kein Parasit ist im Darm eines Thieres entstanden, ursprünglich lebten alle im Freien. Der Einfluss der Parasiten auf den Wirth wird bei einer jeden Art besprochen. *R. Moniez. Les parasites de l'homme. Paris 1889 (erschienen 1888). 307 pg., 72 fig.*

Kessler untersuchte die Excremente von 600 Petersburgern auf Parasiteneier und fand die von *Trichocephalus dispar* 30, *Ascaris lumbricoides* 35, *Oxyuris vermicularis* 43, *Bothriocephalus latus* 47, *Taenia solium* 18 und *Taenia mediocanellata* 22 mal. *Kessler (Menschliche Darmparasiten) (russisch), Wratsch 1888, Nr. 6—7.*

Vergl. auch **P. Sonsino.** *Le condizioni di Massaua per rispetto alla vita e diffusione di certi elminti perniciosi all'uomo, in paragone a quelle dei paesi dove questi elminti sono già conosciuti. Process. verbal. soc. Toscan. sc. natur. Pisa, 1. Luglio 1888. Atti soc. Toscan., vol. 6, pag. 119—131, und S. Calandruccio. Animali parassiti nell'uomo in Sicilia. Bollet. Accad. Gioenia sc. nat. Catania, nuov. ser., fasc. 3, Catania 1888—89.*

v. Jaksch findet Eier von *Ascaris lumbricoides*, *Oxyuris vermicularis* und *Trichocephalus dispar* fast stets in den Excrementen kleiner Kinder, nur 2 mal die von *Taenia saginata*. *R. v. Jaksch. Ueber das Vorkommen von thierischen Parasiten in den Fäces der Kinder. Wiener klin. Wochenschr. 1888, No. 25, pag. 511—513.*

Zehender bespricht die Parasiten des menschlichen Auges und erwähnt *Monostomum spec.?* *Distomum spec.?* *Echinococcus* und *Cysticercus cellulosae*. *W. Zehender. Die parasitischen Erkrankungen des Auges. Deutsche med. Wochenschr. 1887, No. 50—51.*

Ueber die Fischparasiten schreibt **Prenant,** *Recherches sur les vers parasites des poissons. Bullet. soc. sc. Nancy, ser. 2, t. 7, fasc. 18, pag. XXIV—XXV, pag. 206—230, 2 plches.*

Die in den hierunter angeführten Arbeiten **Leydy's** beschriebenen Helminthen werden an entsprechender Stelle angeführt: **J. Leydy.** *Entozoa of the Terrapin. Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1888, pag. 127—128. Trematodes of the Muskrat, ibid. pag. 126. Parasites of the striped Bass, ibid. pag. 125. Parasites of the Rock fish, ibid. pag. 166—167. Parasites of the Pickerel, ibid. pag. 169.*

Dasselbe gilt von der vom Ref. beschriebenen Helminthen-Sammlung, welche auf der Weltumsegelung durch die Naturforscher der Challenger-Commission gefunden wurden. **O. v. Linstow.** *The zoology of the voyage of H. M. S. Challenger. Report on the entozoa, London 1888, vol. XXIII, part. LXXI.*

Nematoden.

Cobb bespricht die Entwicklungsgeschichte und Anatomie von Nematoden, welche in Thieren des nördlichen Eismeers gefunden wurden. *Ascaris Kükenthalii* n. sp. ist 70—100 mm lang und 2,5—3 mm breit und lebt im Magen von *Beluga leucas*; die Anatomie wird eingehend besprochen; das männliche Schwanzende trägt jederseits etwa 100 Papillen, die Spicula sind ungleich; von dem Nervenring verlaufen 8 Nerven nach vorn, von denen 4 stärkere Submediannerven und in die Lippen verlaufende Sinnesnerven sind; nach hinten gehen ebenfalls 8, 1 Bauch-, 1 Rücken-, 2 Lateral- und 4 Submediannerven. Verf. verfolgt die Dotterfurchung und findet, dass das Ektoderm von sehr kleinen, zerstreuten, das Entoderm dagegen von viel grösseren, zusammenhängenden Zellen gebildet wird. *Ascaris bulbosa* n. sp. aus *Phoca barbata*, deren Magen sie bewohnt, hat eine Grösse von 70—80 mm; auch hier sind die Spicula ungleich; am Schwanzende stehen jederseits etwa 70 Papillen. Das Excretionsorgan mündet, wie bei voriger Art, zwischen den Seitenlippen unterhalb des Mundes nach aussen und steht im Zusammenhange mit der linken Seitenlinie. *Strongylus arcticus* n. sp. findet sich im Gehörorgan von *Beluga leucas*; das Männchen ist 18—22 mm lang und 1,04 mm breit, das Weibchen misst 21—28 und 1,05 mm; die männliche Bursa zerfällt in 6 Lappen; die Spitzen der Spicula sind verwachsen. *Dorylaimus Langii* n. sp., 1,2 mm lang, mit abgerundetem Schwanzende und spiraligen Seitenorganen, findet sich in fließendem Wasser, *Tylenchus gracilis* n. sp. (bereits von de Man gebrauchter Name) an Graswurzeln, *Spilophora impatiens* n. sp. aber in feuchtem Moos. N. A. Cobb. *Beiträge zur Anatomie und Ontogenie der Nematoden. Jenaische Zeitschr. für Naturwissensch. XXIII, neue Folge XXI, Heft 1, Jena 1888, pag. 41—76. Tab. III—V.*

Kultschitzky untersucht die Befruchtungsvorgänge an den Eiern von *Ascaris marginata*, die er mit Alkohol und Essigsäure zu gleichen Theilen fixirte und mit Essigcarmin (100 ccm einer 30procentigen Essigsäure mit 1 grm Carmin 2 Stunden gekocht und nach dem Erkalten filtrirt) färbte. Die Eihülle bildet sich sofort nach dem Eindringen des Samenkörperchens; das Keimbläschen besitzt eine Membran und ein chromatisches Kernkörperchen, welches in 2 Theile zerfällt, von denen eins chromatisch ist, das andere aber sich in die blasser gefärbte Kernkörperchensubstanz umwandelt. Das erstere zerfällt in ein Häufchen einzelner Chromatinkörner, das letztere ist das spätere Kernkörperchen. Nach dem Eindringen des Samenkörperchens schwinden das Kernkörperchen und die Hülle des Keimbläschens, welches amöboid wird und Fortsätze in das Eiprotoplasma sendet, um dann ganz zu verschwinden; die Gruppe der Chromatinkörner aber bleibt, welche nun frei im Protoplasma liegt. Die Körnchen bilden sich in Stäbchen um, die sich in 2 Hälften

theilen und sich in einer Kreisebene gruppieren, welche die Aequatorialebene einer Spindelfigur wird, deren achromatische Theile sich aus dem Eiprotoplasma bilden; die Hälfte der Stäbchen rückt nach dem einen Pole, und diese Metakinese ist eine typische Caryokinese; die eine Hälfte wird als erstes Richtungskörperchen ausgeschieden; die im Ei verbliebenen Stäbchen erleiden wieder eine Längsspaltung, und in gleicher Weise wird das zweite Richtungskörperchen gebildet und ausgestossen. Um das im Ei verbliebene Chromatin bildet sich eine Membran, welche auch ein sehr grosses Kernkörperchen einschliesst, und so ist der pronucleus femininus entstanden, der ebenso gebildet ist wie der pronucleus masculinus. Das Gerüst der pronuclei wird von achromatischer Substanz gebildet. *N. Kultschitzky. Ueber die Eireifung und die Befruchtungsvorgänge bei Ascaris marginata. Archiv für microscop. Anatomie, Bd. 32, Bonn 1888, Heft 4, pag. 671—682, tab. XXVI—XXVII.*

Derselbe Verfasser untersucht auch die Eier von *Ascaris megalocephala*, die er mit Alcohol und Essigsäure zu gleichen Theilen oder 3 Theilen Aether mit 1 Theil absolutem Alcohol fixirte; gefärbt wurde mit Aurantia und Gentiana in Creosot gelöst, in Spiritus und Essigsäure ausgewaschen, in Creosot aufgehellt und in mit Creosot verdünntem Balsam eingeschlossen. Die Chromatinsubstanz des Kerns oder Keimbläschens besteht aus 4 leicht gebogenen Stäbchen, die je 2 und 2 genähert liegen und sich zur Bildung des ersten Richtungskörperchens in der Länge spalten, so dass 2 Gruppen von 4 Stäbchen entstehen; die 4 Stäbchen jeder Gruppe sind durch Chromatinfäden mit einander verbunden; zur Bildung des 2. Richtungskörperchens spaltet sich ein Stäbchen aus jeder Gruppe ab, so dass 2 im Ei zurückbleiben. Der Bildungsvorgang der Richtungskörperchen vollzieht sich „nach dem Typus“ der echten Karyokinese, ohne mit einer solchen identisch zu sein. Das im Centrum des Ei's liegende Spermatozoon macht amöboide Bewegungen; die Fortsätze reissen ab und bleiben frei im Eiprotoplasma liegen, wodurch das Zoospermprotoplasma verkleinert wird; vielleicht wird auch nicht das ganze Chromatin des Spermatozoonkerns zum Aufbau des Pronucleus masculinus verwendet. Beide Pronuclei bilden sich selbstständig von einander; der eine ist nur männlich, der andere nur weiblich, was im Gegensatz zu Zacharias' Meinung betont wird. Die Pronuclei enthalten ausser der Hülle, der chromatischen und achromatischen Substanz auch Kernkörperchen; ihre Zahl beträgt meistens 2, selten 3, sehr selten 1; es giebt Spermatozoen mit 2 Kernen, woraus das Auftreten von 3 Pronuclei erklärt wird. Die karyokinetischen Veränderungen beginnt jeder Pronucleus selbstständig für sich; die Knäuelbildung beginnt, die Membran und die Kernkörperchen verschwinden; der Knäuel wird compact und die Chromatinschleifen bilden sich; meist bilden sich 4 Schleifen, selten 3 und 5; normaler Weise liefert jeder Pronucleus 2; die 4 Schleifen erliegen dann im Aster-Stadium einer Längsspaltung; hierauf gehen die getheilten Schleifen zu dem Dyasterstadium auseinander; nun bilden sich

Tochterknäuel und die Kerne der Blastomeren führen ein Kernkörperchen. Van Beneden's sphères attractives bezeichnet Verf. als Richtungssonnen, welche zum Protoplasma gehören. Die Befruchtung besteht also nicht in der Verschmelzung der Pronuclei; letztere sind Kerne und nicht Halbkerne; das Wesen der Befruchtung beruht darin, dass der Spermakern in einen Kern des Ei's umgewandelt wird, nicht in einem Wiederersatz abgestossener Theile des Keimbläschens. N. Kultschitzky. *Die Befruchtungsvorgänge bei Ascaris megaloccephala*. Archiv für microscop. Anat. Bd. 31, Bonn 1888, Heft 4, pag. 567—593, tab. XXIX—XXX.

Den wesentlichen Inhalt vorstehend besprochener Arbeit theilte der Verf. vorher an anderer Stelle mit. Nicht nur im Ei- und Spermakern, sondern auch in den Blastomerenkernen finden sich deutliche achromatische Kernkörperchen. Die Bildung der Richtungssonnen gehört nicht mehr zur Befruchtung, sondern zur Segmentation. Nach dem Ausscheiden des 2. Richtungskörperchens wirft der Pronucleus masculinus den Rest seines Protoplasma's ab und der Kern gehört nun untrennbar zum Ei; damit ist der Befruchtungsvorgang beendet. Findet wirklich in seltenen Fällen eine Verschmelzung des männlichen und weiblichen Pronucleus statt, so würde dieselbe zu den karyokinetischen Furchungserscheinungen, nicht mehr zur Befruchtung gehören. N. Kultschitzky. *Ergebnisse einer Untersuchung über die Befruchtungsvorgänge bei Ascaris megaloccephala*. Sitzungsber. der Preuss. Akad. d. Wissensch. Berlin II, III, 19. Januar 1888, pag. 17—21.

Boveri behandelt die Bildung der ersten Blastomeren in den Eiern von *Ascaris megaloccephala* in erschöpfender Weise. Dass mehr als ein Spermatozoon in das Ei dringt, ist äusserst selten, zweimal beobachtete Verf. deren 2 unter einer Unzahl von Eiern. Das Spermatozoon kann an jeder Stelle in das Ei eindringen; eine Micropyle giebt es nicht; nach dem Eindringen erleidet das Ei Veränderungen, welche das Hineingelangen weiterer Spermatozoen hindern; es könnten also nur ganz gleichzeitig 2 eindringen. Das Spermatozoon liegt bei der Ausscheidung des 2. Richtungskörperchens mitten im Ei; um diese Zeit besteht der Spermakern aus 2 getrennten Portionen von verschiedener Form; das Spermatozoon reift gleichzeitig mit der Ausstossung der Richtungskörper; im Kern sind stets 2 selbstständige Chromatin-Elemente vorhanden bei dem Typus Carnoy, während das Spermatozoon bei dem Typus van Beneden nur 1 chromatisches Element enthält, wonach man 2 Varietäten von *Ascaris megaloccephala* unterscheiden muss. Bei der Bildung des 1. Richtungskörperchens endigen die Verbindungsfasern aussen an der Kernmembran; die 2 chromatischen Elemente im Eikern selbst liegen völlig getrennt von einander. Nach dem Ausstossen des 1. Richtungskörperchens wird der Eikern kugelig und von einem netzförmigen Kerngerüst durchzogen, das zur Hälfte aus dem einen, zur Hälfte aus dem anderen Element entstanden ist. Das Kerngerüst überzieht nur die Innenfläche der Kernmembran, letztere

selber wird nicht chromatisch. Das Kerngerüst ist ein Product der chromatischen Elemente. Bei der Entwicklung der Spermakerne bildet sich, ebenso wie bei derjenigen der Eikerne, um die chromatischen Elemente eine Vakuole, in welche die letzteren anastomosirende Fortsätze senden, und auch hier lösen sich die soliden Chromatinmassen in ein Gerüst auf, das sich nach der Kernmembran zurückzieht. Es bilden sich, im Gegensatz zu der Ansicht von Zacharias, wahre Vorkerne, Pronuclei; dieselben sind nicht, wie Zacharias meint, bereits conjugirte Kerne, halbe erste Furchungskerne. Eine Verschmelzung der beiden bläschenartigen Gerüstkerne zu einem gleichartigen ersten Furchungskern kann vorkommen; in anderen Fällen bildet sich eine Vereinigung der Kerne erst in der Spindel aus. Aus dem Gerüst eines jeden der beiden Vorkerne entstehen 2 Schleifen, die in der Spindel zu einer einheitlichen Figur vereinigt werden. Der Kernfaden ist normaler Weise überall gleich breit und zeigt keine knotigen Verdickungen; wo sie sich finden, stellen sie Contractionszustände dar. Das Stäbchen, das aus diesem rhizopodenartig hervorgehende Kerngerüst und die aus letzterem gebildete Schleife sind dasselbe chromatische Element. Im Zustande des Gerüsts findet ein Wachsthum statt. Die achromatische Theilungsfigur entsteht aus der Zellsubstanz; der Knäulfaden theilt sich in 2 Hälften, die sich allmählich verkürzen und verdicken, und so werden aus dem einen Knäulfaden zwei. Archoplasma nennt Verf. die Zellsubstanz, welche sich um die Zeit zwischen der Abtrennung des 1. und 2. Richtungskörpers in Form eines dichten, kugelförmigen Hofs um das Spermatozoon legt; das Archoplasma breitet sich zur Zeit der Entstehung von Ei- und Spermakern im ganzen Eikörper aus, um sich dann wieder in der Eimitte zu contrahiren; im Centrum desselben liegt nun ein kleines, kugeliges Körperchen, das Centrosoma; dieses theilt sich in 2 Theile, das umgebende Archoplasma wird erst ei-, dann hantelförmig und theilt sich in 2 Kugeln, jede mit einem Centrosoma im Mittelpunkt; die Kugeln sind dicht und körnig; wahrscheinlich stammt das erste Centrosoma vom Spermatozoon; die Kugeln sind den *sphères attractives* und die Centrosomen den Polkörperchen van Beneden's identisch, der indessen ihre Abstammung nicht erkannte. Die Körnchen der Kugeln nehmen nun eine zum Centrosoma radienförmige, strahlenförmige Gruppierung an; vom Centrum der Kugeln aus bilden sich fädige Radien, die kegelförmig nach der Aequatorialplatte strahlen. Die Körnchen werden als Archoplasma-Microsomen bezeichnet; diejenigen derselben, welche den Kegel bilden sollen, treten durch Fäden mit einander in Verbindung, wodurch mit Knötchen besetzte, radiäre Fäden entstehen; die beiden Kugeln lagern sich nun so, dass sie die 4 chromatischen Elemente in die Mitte nehmen, so dass die Centrosomen die Pole, die 4 Schlingen die Aequatorialplatte der Spindel werden. Die Richtungsspindeln gehen aus Kernbestandtheilen hervor und zeigen die erwähnten Polkugelchen, während die Furchungsspindeln aus den Archoplasmakugeln aufgebaut werden. Die Archo-

plasmafibrillen setzen sich an die chromatischen Elemente fest; letztere sind bandartig und an beiden Enden verdickt, und die genannten Fädchen der einen Kugel setzen sich stets an eine der beiden Schmalseiten fest, die der anderen Kugel an die andere Seite. Die Centrosomen schwellen dann auf das 4 bis 6 fache ihres ursprünglichen Durchmessers an. Die Spindel besteht somit aus 2 kegelförmigen Hälften mit der gemeinsamen, durch 4 chromatische Schleifen gebildeten Basis. Nun contrahiren sich die von einem Centrosoma ausstrahlenden Fädchen, die muskulöse Fibrillen geworden sind; die 4 chromatischen Schlingen spalten sich selbstständig ihrer ganzen Länge nach und die Aequatorialplatte wird durch Zug der Fibrillen in 2 Tochterplatten gespalten, die jede die Hälfte der 4 Schleifen enthält. Wenn keine Trennung der beiden Schlingenhälften von einander stattfindet, so hat dies seinen Grund darin, dass die noch zusammenhängenden Enden in dem Masse, in dem die Tochterplatten auseinander weichen, sich verlängern, wodurch die sogenannte Tonnenform entsteht. Das Auseinanderweichen der Tochterplatten wird nicht nur durch eine Contraction der Spindelfasern, sondern auch durch eine Bewegung der Centralkörper nach den Eipolen bewirkt, welche die Chromatinschlingen nachziehen, wobei die Polkegel, die Verbindung der Centralkörper mit den Polen, verkürzt werden. Sind die Tochterplatten etwas auseinander gewichen, so bestehen zwischen ihnen noch Verbindungsfasern, die mit den Spindelfasern nichts zu thun haben. Die Archoplasmafibrillen wandeln sich nun wieder in körnige Radian der Polstrahlung zurück, aus denen sie entstanden waren; sie lösen sich von den 4 Schleifen los, das Centrosoma ist wieder klar und stark lichtbrechend geworden und das Archoplasma wird wieder kugelförmig; sie werden der Mittelpunkt der Zellsubstanz und so entsteht eine Theilung des ganzen Eiinhalts in 2 Hälften, die beiden ersten Blastomeren, die durch das Auftreten einer Zellplatte eingeleitet wird, auf die eine seichte, ringförmige Einschnürung der Zelloberfläche folgt. Die Theilungsebene halbirt stets die Verbindungslinie der beiden Centrosomen senkrecht. Die 4 Kernschleifen in einer jeden der beiden Furchungskugeln erleiden weiter eine Umwandlung und Structurveränderung; sie schlängeln sich, werden unregelmässig, bekommen Fortsätze, verbinden sich unter einander, werden segmentirt und es bildet sich wieder ein Kerngerüst aus; aus einem flächenhaft ausgebildeten Chromatinnetz wird ein körperliches Gerüst, für den ruhenden Kern typisch. Der Kern ist bläschenartig geworden, hat ein centrales Kernbläschen und die Vakuole sendet fingerförmige Fortsätze aus. Die Kerne machen in der Karyokinese active und passive Veränderungen durch; die activen bestehen in einer Contraction des Kerngerüstes zu soliden Körpern, in Theilung derselben und in Neubildung eines Gerüstes aus den Hälften; die passiven in Gruppierung der Kernelemente durch die Archoplasmakugeln. Das Kerngerüst contrahirt sich zu 4 Schleifen, ohne zuvor einen continuirlichen Knäuel gebildet zu haben. Von den 4 Schleifen einer Furchungs-

zelle stammen 2 vom Vater und 2 von der Mutter, denn jedes Element der Tochterplatte ist mit einem aus dem Kerngerüst wieder hervorgehenden Element identisch. In jeder der beiden Furchungskugeln verdoppelt sich das Centrosoma, die beiden neugebildeten rücken auseinander, die dasselbe umgebende Archoplasmakugel theilt sich gleichfalls in 2 fädige Strahlensonnen; diese nehmen die 4 chromatischen Elemente zwischen sich, auch hier ordnen sich die Archoplasma-Microsomen in radiären Reihen, von denen ein Theil sich in Fibrillen umwandelt, welche die Spindel bilden. Als Abnormität beobachtete Verf., dass sich im Ei ein weiblicher Kern mit 2 Chromatinschleifen bildete, während das Spermatozoon ganz unverändert geblieben war; die Zahl der Centrosomen und Archoplasmakugeln kann mehr als 2 betragen. Die chromatischen Elemente sind selbstständige Individuen, die auch im ruhenden Kern ihre Selbstständigkeit bewahren. Die Geschlechtszellen haben eine Verschiedenheit der Vererbungstendenzen, weshalb die Kinder derselben Eltern einander nie ganz gleich sind; die Aehnlichkeit mit den Eltern beruht auf der Zusammenführung väterlicher und mütterlicher Kernsubstanz im Ei. Eine pathologische Weiterentwicklung der Eier, welche das Stadium der bläschenartigen Vorkerne überschritten haben, kommt nicht vor; unter Umständen können Ei- und Spermakern in einzelnen Fällen zu einem ruhenden Furchungskern verschmelzen.

Das befruchtete Ei ist ein Verschmelzungsproduct aus 2 Zellen, das Archoplasma stammt von der Eizelle und das Centrosoma wird wahrscheinlich vom Spermatozoon geliefert. Der Kern theilt sich nicht, er wird getheilt. Das Keimbläschen besitzt 2 chromatische Elemente in Gestalt von je 4 zu einem prismatischen Körper vereinigten Stäbchen; in der ersten Richtungsspindel werden sie halbt; in den 1. Richtungskörper gelangen 2 Doppelstäbchen, die beiden anderen werden im Ei abermals halbt, zwei einfache gelangen in den 2. Richtungskörper und 2 andere bilden sich zum Eikern um; für jedes in den Richtungskörpern fehlende Stäbchen findet sich im Ei eine Schleife über die normale Zahl. Die Anzahl der aus einem ruhenden Keim hervorgehenden chromatischen Elemente entspricht derjenigen der Elemente, aus denen der Keim sich aufgebaut hat. Die Zelltheilung ist vom Kern unabhängig. *F. Boveri. Zellen-Studien. Heft 2. Befruchtung und Theilung des Eies von Ascaris megalocephala. Jenaische Zeitschr. für Naturwissensch. Bd. 20, neuer Folge Bd. 15, Heft 3—4, Jena 1888, pg. 685—882, tab. XIX—XXIII. vergl. auch F. Boveri, über den Anteil des Spermatozoon an der Theilung des Eies. Sitzungsber. d. Gesellsch. für Morphol. und Physiol. in München, Bd. III, Heft. 3.*

Zacharias sieht das Wesen der Befruchtung in der Verschmelzung des männlichen und weiblichen Pronucleus im Ei von *Acaris megalocephala*, wobei die Kernsubstanz beider verschmilzt; wenn van Beneden angiebt, dass in 97 Procent aller Fälle eine solche Conjugation nicht stattfindet, so muss die Möglichkeit im Auge

behalten werden, ob nicht eine heterotypische Conjugation in den Halbkernen bereits stattgefunden, welche, scheinbar isolirt von einander, Fadenschlingen ausbilden; wenn die beiden Pronuclei sich an einander legen, so können durch eine kleine Communicationsöffnung durch amöboide Bewegungen Pseudopodien der Kernsubstanz dringen und so einen Austausch von chromatischer Substanz zwischen beiden Halbkernen zu Wege bringen. *O. Zacharias. Ueber Abweichungen vom Typus bei Conjugation der Geschlechtskerne. Anat. Anz. III. Jahrg., Nr. 2 und 3, Jena 1888, pag. 48—53.*

Derselbe Verfasser betont gelegentlich einer Besprechung der Arbeiten von Weismann und Ischikawa über Bildung der Richtungskörper, dass entgegen der Ansicht van Beneden's nach Ansicht der beiden genannten Forscher, denen Nussbaum, Boveri und der Verf. bestimme, die Abschnürung der Richtungskörper den Charakter einer echten Zelltheilung zeigt, während sie nach van Beneden ein pseudokaryokinetischer Vorgang ist, weil nach des letzteren Ansicht die Abtrennung in einer rechtwinklig gegen die Richtungsspindel gelegenen Ebene erfolgt, was nach den Beobachtungen der übrigen Autoren nicht zutrifft. *O. Zacharias. Ueber die Bildung der Richtungskörper bei thierischen Eiern. Anatom. Anz. III. Jahrg., Jena 1888, No. 14, pag. 401—403.*

Die Präparationsmethode desselben Verf. ist die, dass er die Uterusschläuche von *Asaris megaloccephala* in eine Flüssigkeit bringt, welche aus 4 Volumtheilen starken Alkohols, 1 Volumtheil Eisessig und 10 Ccm. dieser Flüssigkeit auf 2—3 Tropfen eines 1% wässrigen Ueberosmiumlösung besteht; etwas Glycerin oder Chloroform dient zur Aufhellung; 20—25 Minuten lange Einwirkung genügt, oder bei 25° C. schon eine von 10—15 Minuten zur Abtödtung; 2—3 Stunden werden die Schläuche in absolutem Alkohol ausgewaschen und in 70% Alkohol aufbewahrt; die Färbung geschieht in Essigcarmin oder in alkoholischer Carminlösung, Methylgrün oder einer Modebraun genannten Anilinfarbe. *O. Zacharias. Ueber Abtödtung und Färbung der Eier von Ascaris megaloccephala. Anatom. Anz. III. Jahrg., Jena 1888, No. 1, pag. 24—27.*

Ferner bemerkt Verf., er habe gleichzeitig mit Carnoy und unabhängig von ihm den Alcohol acétique als gutes Fixationsmittel für die Eier von *Ascaris megaloccephala* gebraucht, das von Leuckart seit vielen Jahren angewandt werde; zur Färbung sei Grenacher's alkoholische Carminlösung besonders zu empfehlen. *O. Zacharias. Einige Worte zur Richtigstellung in Betreff des van Gehuchten'schen Aufsatzes in No. 8 des Anat. Anz.; daselbst Jahrg. III, Jena 1888, No. 10, pag. 286—287.* Kultschitzky's Arbeit bespricht Verfasser, *O. Zacharias. Zum Befruchtungsvorgang bei Ascaris megaloccephala. Biolog. Centralbl. Bd. 8, No. 12, pag. 367.*

van Gehuchten bestätigt die Mittheilung von Zacharias, dass absoluter Alcohol und Eisessig allein oder mit Chloroform das beste Mittel sei, die Eier von *Ascaris megaloccephala* schnell abzutöden, und dass dieses Mittel bereits früher von Carnoy mitgetheilt sei;

kochend, wie Boveri es anwende, rufe es tiefe Alterationen in den Eiern hervor; neu sei die Methode also nicht. *A. van Gehuchten. L'Alcool acétique comme fixateur des oeufs d'Ascaris megaloccephala. Anatom. Anz. III. Jahrg., Jena 1888, No. 8, pag. 237—240.*

van Beneden erklärt, er habe seine Ansicht in Betreff des Befruchtungsvorganges in den Eiern von *Ascaris megaloccephala* gegen früher nicht geändert, welche nicht in der Conjugation eines Spermakerns mit einem Eikern, sondern in der Substitution eines Halbkerns, geliefert von dem Samenkörperchen für den in Gestalt der Polkörperchen ausgeschiedenen Halbkern besteht. *E. van Beneden. Sur la fécondation de l'Ascaride megalocéphale. Anatom. Anz. III. Jahrg., Jena 1888, No. 4, pag. 104.*

Waldeyer giebt eine Uebersicht über die gesammten Erscheinungen der Karyokinese im Thier- und Pflanzenreich nach eigenen Untersuchungen und in einer kritischen Besprechung der ganzen bis jetzt über dieses Thema erschienenen Litteratur, die in 210 grossen oder kleineren Schriften besteht. Einen Auszug aus der Arbeit zu geben, ist nicht gut möglich, wenn man nicht die gesammten, so sehr complicirten Erscheinungen der Zelltheilung anführen will, und möge es genügen, anzugeben, dass Verf. die zahlreichen Widersprüche der einzelnen Autoren erklärt und berichtigt und die bereits recht verworrene Nomenclatur der karyokinetischen Erscheinungen ausgleicht. Verf. findet, dass die Kerngerüstbalken an der Peripherie dicht zusammenschliessen und eine durchbrochene Begrenzungsschicht bilden; im ruhenden Kern und zu Anfang des Knäuelstadiums können von Anfang an getrennte Fadenschlingen vorhanden sein; beim segmentirten Knäuel tritt eine Längstheilung sämmtlicher Fadenschlingen ein, welche Verf. Chromosomen nennt; in der Metakinese weichen die so entstandenen chromatischen Schwesterfäden auseinander. Zur Zeit der Muttersternbildung schwindet die Kernmembran, so dass Kernsaft und Zellprotoplasma sich berühren, der Kernumriss aber bleibt erhalten. Verf. erkennt nur eine Art der Kerntheilung, bei welcher der Kern und dann die Zelle in 2 meist gleiche Hälften getheilt werden. Bei der Bildung der weiteren Furchungskugeln von *Ascaris megaloccephala* zeigt die Mehrzahl keine chromatischen Schleifen mehr, sondern nur zahlreiche Chromatin-Körner. Die gesammten Erscheinungen bringt Verf. in folgende Reihenfolge:

A.	B.	C.
Ruhender Mutterkern.	Metakinese.	Tochterstern (Dyaster).
Mutterknäuel (Spirem).		Tochterknäuel (Dispirem).
Schleifentheilungs- und		Ruhende Tochterkerne.
Spindelstadium.		
Mutterstern (Monaster).		

Die Bildung und Ausstossung der Richtungskörperchen wird im Anschluss hieran besprochen und angegeben, dass die Eier 1, 2 oder 3 derselben bilden; aus dem ursprünglichen Keimbläschen müssen sie entfernt werden, bevor ersteres copulationsfähig wird;

jeder Kern der beiden Furchungskugeln enthält die Hälfte des Spermakerns und des weiblichen Kerns. Die beiden Pronuclei lagern sich an einander, eine Verschmelzung konnte Verf. in keinem einzigen Falle feststellen. Bei Thieren, deren Eier sich theils parthenogenetisch, theils durch Befruchtung entwickeln, wurde gefunden, dass das parthenogenetische Ei ein, das durch Befruchtung sich entwickelnde zwei Richtungskörperchen bildet; das erste derselben ist das histogene Kernplasma, das zweite das Keim- oder Ahnenplasma, welches den parthenogenetischen Eiern fehlt. Die Keime der Samenbildungszellen erleiden ähnliche Verluste wie die Eikerne durch Ausstossung von Richtungskörperchen: Beide Pronuclei bei *Ascaris* haben ein Kernkörperchen, sind also vollkommene Kerne. *W. Waldeyer. Ueber Karyokinese und ihre Beziehungen zu den Befruchtungsvorgängen. Archiv für microscop. Anat. Bd. 32, Heft 1, Bonn 1888, 122 pag., 14 Fig.*

van Beneden demonstrierte in den Verhandlungen der anatomischen Gesellschaft auf der zweiten Versammlung in Würzburg am 20.—23. Mai 1888 microscopische Präparate die Copulation der Geschlechtsproducte, Reifung des Ei's, Befruchtungsvorgang und Mitose der Eier von *Ascaris megaloccephala* betreffend. *E. van Beneden. Präparate über Copulation der Geschlechtsproducte, Reifung des Ei's, Befruchtungsvorgang und Mitose bei Ascaris megaloccephala. Anatom. Anz. III. Jahrg., No. 23—25, pag. 707—709.*

Dostolewsky beobachtete den vielbeschriebenen Vorgang der Furchung der Eier von *Ascaris megaloccephala* und fand, dass mitunter Eier vorkommen, welche statt 4 chromatischer Schleifen, welche bei der Furchung eine Längsspaltung erleiden, nur 2 bilden, weil die Querspaltung der Knäuel in den Vorkernen unterbleibt; in einzelnen später gebildeten Blastomeren fanden sich auch nur 2 Schleifen. *A. Dostolewsky. Eine Bemerkung zur Furchung der Eier der Ascaris megaloccephala. Anatom. Anz. III. Jahrg., Jena 1888, No. 22, pag. 646—648.*

Lameere findet eine abnormale Eibildung bei *Ascaris megaloccephala*, unbefruchtete und befruchtungsunfähige von birnförmiger Gestalt; auch befruchtete von birnförmigem Aussehen fanden sich; Verf. bemerkt, dass das Keimbläschen zur Ausstossung der Polkörperchen nach der Seite hin strebt, welche dem pôle d'imprégnation van Beneden's entgegengesetzt liegt. Bei den unbefruchteten bemerkt man an dem verdünnten Ende des birnförmigen Ei's an der an dieser Stelle verdünnten hyalinen Hülle, welche sie zeigen, Faltungen; hier bildet sich später am normalen Ei der disque polaire und später der bouchon d'imprégnation, so dass man eine Verbildung der Micropyle, die den Eintritt des Samenkörperchens hindert, erkennt. *A. Lameere. Sur des oeufs anormaux de l'Ascaris megaloccephala. Bullet. Acad. sc. Belge, 3. sér., t. 15, Bruxelles 1888, 57. ann., No. 6, pag. 980—984.*

Nach **Schneider** wird die äussere Begrenzung der Fibrillenschicht der Muskeln von *Ascaris megaloccephala* nicht durch eine

structurlose Membran, ein Sarkolemma gebildet, vielmehr ruhen die einzelnen Muskelfasern nach aussen auf der Hypodermis; letztere wird nach der Muskelschicht zu homogener und erfüllt die Lücken zwischen den Muskelschichten, so dass sie die Abgrenzung zwischen ihnen bildet. Ein Sarkolemma existirt überhaupt nicht, es ist ein Trugbild. *A. Schneider. Ueber das Sarkolemma. Zoolog. Beitr. Bd. II, Heft 2, Breslau 1888, pag. 212—218, tab. XVII.*

Lukjanow findet, dass in den Zellen des Darmepithels von *Ascaris mystax* kleine Fettkörnchen enthalten sind, besonders in den Seitentheilen und an dem dem Darmlumen zugewandten Ende; der sphärische Kern liegt im Axentheile und enthält ein Kernkörperchen, mitunter auch zwei, die als Plasmosomen zu bezeichnen sind; in anderen Organen finden sich auch Karyosomen. Porencanälchen fand Verf. nicht; zwischen der homogenen Membran und dem äusseren Ende der Zelle besteht ein lichter, von der Längsaxe der Zelle paralleler, sehr feiner Fädchen durchzogener Saum; jede Zelle besitzt fadenförmige Fortsätze, die in das Darmlumen hineinragen und etwa $\frac{1}{6}$ der Zelllänge messen; sie bewegen sich nicht. *Lukjanow. Notizen über das Darmepithel bei Ascaris mystax. Archiv für microscop. Anatomie, Bd. 31, Heft II, Bonn 1888, pag. 293—302.*

Mégnin meint mit Unrecht, dass Leuckart für alle Wurmparasiten des Menschen und der höheren Thiere einen Zwischenwirth annimmt; ist es doch eben Leuckart, der die Entwicklung von *Rhabdonema strongyloides* ohne einen solchen gefunden hat. Verf. beobachtete, dass die Eier von *Ascaris mystax* in 10 Wochen im Wasser oder in einem trockenen Medium den Embryo entwickeln, der 0,44 mm lang und 0,025 mm breit ist; Embryonen enthaltende Eier an junge Hunde verfüttert lassen die Embryonen in dem Magen ausschlüpfen und in 8 Tagen werden die Thiere im Darm geschlechtsreif. *P. Mégnin. Développement et propagation de l'Ascaris mystax chez les tout jeunes chiens. Compt. rend. soc. biol. Paris 28. VII. 1888.*

Lutz untersucht die Entwicklung der Eier von *Ascaris lumbricoides* und giebt an, wie Grassi den Parasiten direct ohne Zwischenwirth durch embryonenhaltige Eier übertragen zu haben; ähnliche Versuche sind bisher resultatlos geblieben, weil die Entwicklung der Eier unter unnatürlichen Verhältnissen vor sich gegangen war, bei denen dieselben u. a. die sie umgebende Eiweisschülle verloren hatten; nicht im Wasser, sondern in feuchter Erde soll dieselbe verlaufen, wo die Hülle erhalten bleibt. Die Schale von Eiern, welche bei Körpertemperatur Lösungen von *Fel tauri* inspissat. mit oder ohne Pankreatinzusatz ausgesetzt waren, zeigten in 3—4 Stunden keine Veränderung; in 2 Tagen wurden dagegen im Hundedarm die Eihüllen gelöst und die Embryonen wurden frei. Eier mit gebuckelter Hülle wurden in ein Säckchen von Pergamentpapier gethan, von einem Menschen verschluckt und nach 12 Stunden untersucht, in einem anderen Falle nach 20 Stunden; beide Male wurden lebende, ausgeschlüpfte Embryonen beobachtet. Zu 8 verschiedenen Malen gab Verf. einem Menschen Eier von *Ascaris lumbricoides* mit ent-

wickelten Embryonen, welche die äussere, maulbeerartige Hülle noch besaßen, jedesmal etwa ein Dutzend, und 27 Tage nach der ersten Uebertragung, 4 nach der letzten wurden 35 junge Ascariden von $5\frac{1}{2}$ —13 mm Länge entleert. *A. Lutz. Weiteres zur Frage der Uebertragung des menschlichen Spulwurms. Centralb. für Bact. u. Parask. II. Jahrg., Bd. III, Jena 1888, pag. 265—268; No. 10, pag. 297—299, 299—300; No. 14, pag. 425—428.*

Pelcynski beobachtete, dass ein Ballen von 22 Spulwürmern von einem Typhuskranken entleert wurde. *J. Pelcynski. (Spulwürmer, welche während einer Typhuserkrankung eine Geschwulst gebildet haben) (polnisch). Gazeta Lekorska 1888, No. 3.*

Stossich stellt alle Species des Genus *Heterakis* zu einer Monographie zusammen und beschreibt im Ganzen 44 Arten, die meistens auch abgebildet werden, wobei Verf. die Genera *Dacnitis*, *Stelmus* und *Subulura*, sowie *Ascaris compar* mit *Heterakis* vereinigt. *M. Stossich. Il genere Heterakis Dujardin. Societas historico-naturalis croatica. Glasnik hrv. naravoslovnoga društva, Gad. II, Zagreb (Agram) 1888, pag. 277—301, tab. III—IX.*

Möbius findet *Heterakis inflexa* in einem Hühnerei. *K. Möbius. Ein Fadenwurm aus einem Hühnerei (Heterakis inflexa Rud.). Schriften d. naturwissensch. Ver. für Schleswig-Holstein, Bd. 7, Heft 1, pag. 19.*

de Magalhães findet in der Augenhöhle vom Haushuhn und Pfau Nematoden, von denen das Männchen 14 mm lang und 0,25 mm breit ist, am Schwanzende stehen jederseits 5 prä- und 3 postanale Papillen; das Weibchen ist 14—18 mm lang und 0,42 mm breit; die Vulva liegt dicht vor dem Schwanzende und meint Verf., die Form möchte mit *Filaria Mansoni* Cobbold identisch sein. *P. S. de Magalhães. Nematoides encontrados nos olhos do gallo commun e do pavo — Filaria Mansoni Cobbold. Revista Brasileira de Medicina, ann. 1, Rio de Janeiro, No. 1, pag. 5—12, fig. 1—6.*

Steel berichtet über die durch *Filaria papillosa* im Pferde hervorgerufenen Veränderungen. *J. H. Steel. On the influence of Filaria papillosa on the health of horses. Veterinary Journ., November 1888, pag. 327.*

Lancereaux beobachtet, dass ein an Chylurie und Hämaturie leidender 21 jähriger Seemann, ein Mulatte aus Guadeloupe, seit 4 Jahren in Europa lebend, in Paris Filarion im Blut zeigte; auf seinen Seereisen war er auch in Südamerika gewesen; die microscopische Untersuchung des Blutes ergab die Anwesenheit von *Filaria Bancrofti* in demselben. *Lancereaux. Sur un cas de filaire hématique chez l'homme. Bullet. Acad. méd. sér. 3, t. XIX, Paris 1888, No. 24, pag. 864—870.*

Ders. Verf. beschreibt die durch den Parasitismus der *Filaria Bancrofti* im menschlichen Körper hervorgerufenen Veränderungen, die an 2 Studenten in Paris beobachtet wurden, welche die Parasiten von der Insel de la Réunion und Haïti importirt hatten. Die Krankheitserscheinungen waren die bekannten, schon oft beobachteten

und es wurde die Menge der im Blute enthaltenen Filarien-Larven auf 36—40 Millionen geschätzt. Das Verschwinden aus den Hautcapillaren am Tage und ihr Wiedererscheinen am Abend wurde auch hier beobachtet. Hämaturie, Lymphurie, Lymphorrhagie, Lymphscrotum, starke Schwellung der Inguinaldrüsen, Lymphectasie waren auch hier die wichtigsten Erscheinungen: Verf. bemerkt, dass Demarquay im Jahre 1862 die menschlichen Blutfilarien entdeckt hat (*Gaz. méd. Paris* 1863, pag. 665). Die *Trichina cystica* von Salisbury scheint auch hierher zu gehören (*Hay's American Journ.* t. I, 1868); die Bezeichnung bezieht sich auf Eier und Embryonen von Nematoden, die im Urin von 3 Kranken gefunden wurden. *Lancereaux. La filariose. Bullet. Acad. méd., 3. sér., t. XIX, Paris 1888, No. 36, pag. 343—378.*

Ueber einen ähnlichen Fall berichtet Laboulbène; derselbe behandelte in Paris einen aus Brasilien stammenden Kranken, der an Chylurie und Hämaturie litt und glaubt, dass die Ursache *Filaria Bancrofti* sei. *M. Laboulbène. Sur un cas de filaire hématurique chez l'homme. Bullet. Acad. méd., 3. sér., t. XIX, Paris 1888, No. 25, pag. 881—882.*

vid. auch W. M. Mastin. *The history of the filaria sanguinis hominis, its discovery in the United States and especially the relationship of the parasite to chylocele of the tunica vaginalis testis. Annales of Surg.* 1888, Nov., pag. 321—362.

Sarcani beobachtet in Rumänien bei einer mit Geschwüren behafteten Kranken einen kleinen Nematoden, der angeblich im Blute gefunden wurde. Derselbe ist 1 mm lang und 0,03 mm breit, das Schwanzende ist zugespitzt, aus der Mundöffnung soll ein zungenartiger Ansatz heraushängen (!); das Thier ist geschlechtsreif, das Ei hat die Grösse eines rothen Blutkörperchens, in dem aufgerollt der Embryo liegt, welcher die zarte Hülle verlässt. Verf. hält diesen Parasiten für *Dracunculus medinensis* (!), identificirt ihn gleichzeitig mit *Filaria sanguinis hominis* (!) und überschreibt seine Arbeit „*Filaria Romanorum orientalis*.“ *A. Sarcani. Filaria Romanorum orientalis. Wiener medic. Presse* 1888, No. 7, pag. 222.

K. N. Ikow berichtet in russischer Sprache über die Infection der Cyclopen mit Filarien. *Nachricht. d. kais. Gesellsch. d. Freunde d. Wissensch. Moskau* 1886, t. 50, Heft 1, pag. 96—99.

Nach Sonsino gehören die Hämatozoen des Hundes nicht zu Spiroptera sanguinolenta, sondern zu *Filaria immitis*, die in der linken und rechten Herzkammer, in der Lungenarterie sowie im subcutanen und intermuskulären Bindegewebe lebt. Die im Blut vorkommenden Larven werden vom pulce del cane und der Hundelaus mit dem Blute aufgesogen, um mit dieser in Larvenform wieder in den Hund zu gelangen. Die Blutfilarien können auf der Blutbahn auch in die Hundeembryonen gelangen. *P. Sonsino. Notizie elmintologiche 1. sul ciclo vitale di un nematode ematozoo del cane. Atti soc. Toscan. sc. natur. Process. verbal. 1. Lugli 1888, Pisa, vol. VI pag. 113—115.*

Ausführlicher berichtet Verf. über die Blutfilarien des Hundes, welche in Frankreich bei etwa 4—5 Procent der Hunde, übrigens in Malacca, in Brasilien, Nordamerika, Italien, ungemein häufig aber in China vorkommen. Sie sind 0,19—0,3 mm lang und 0,003 bis 0,006 mm breit, können also die Capillaren passiren, da die rothen Blutkörperchen des Hundes 0,007 mm gross sind. Mit dem Kopfe setzen sie sich oft fest und machen mit dem hinteren Körpertheile wirbelnde Bewegungen; die Menge in einem Hunde wird auf über 2 Millionen geschätzt; mitunter haften Blutkörperchen an ihrer Aussenfläche. Sie stammen ab von *Filaria immitis* Leidy = *Filaria haematica* Gruby et Delafond, welche in der linken und rechten Herzhälfte, in den Lungenarterien, im subcutanen und intermusculären Bindegewebe, in der Vena cava superior, der Lunge und der Leber des Hundes wohnt, in Folge des versteckten Aufenthalts aber oft nicht gefunden wird. *Spiroptera sanguinolenta* wohnt in Tumoren aussen an dem Oesophagus und der Aorta und von ihr stammen nicht die Blutfilarien. Das Weibchen producirt keine freien Embryonen, wie *Filaria immitis*, sondern Eier, die 0,036 mm lang und 0,015 mm breit sind und also die Capillaren des Hundes nicht passiren könnten. Die Eier gelangen in den Oesophagus und von da durch den Darm nach aussen; die Art gehört nicht zu den Hämatozoen. Leben nur Männchen oder nur Weibchen von *Filaria immitis* im Herzen des Hundes, so fehlen natürlich die Blutfilarien. Der Zwischenwirth von *Spiroptera sanguinolenta* ist nach Grassi *Blatta orientalis*, von *Filaria immitis* aber nach des Verf. Beobachtungen *Haematopinus piliferus* und *Pulex serraticeps*; bei mit Blutfilarien behafteten Hunden fand Verf. in 75 *Haematopinus* 5 und in 116 *Pulex* 15 mal die Filarien, welche sich hier in eine Larvenform umwandeln, während man die Blutfilarien als Embryonalform bezeichnen kann; von 0,2 mm Länge und 0,004 mm Breite wachsen sie auf 0,75 mm Länge und 0,02 mm Breite; vorn steht eine protractile Kopfspitze und das Schwanzende ist fein fadenförmig; in einigen Fällen wächst die Länge auf 1,2—1,5 mm und die Breite auf 0,03—0,04 mm, wobei das Schwanzende abgerundet erscheint. Auffallend ist, dass die Embryonen von Hündinnen, welche Blutfilarien beherbergten, ebenfalls solche enthielten, da zwischen den Uterus- und Placentargefässen eine directe Verbindung nicht existirt; der Grund kann nur eine pathologische Gefässverbindung sein. *Strongylus vasorum* Baillet aus dem rechten Herzen und der Lungenarterie ist ovipar wie *Spiroptera sanguinolenta* und hat doppelt so grosse Eier wie letztere Form. *Pulex* und *Haematopinus* saugen natürlich die Filarien mit dem Blute auf. *P. Sonsino. Ricerche sugli ematozoi del cane e sul ciclo vitale della Tenia cucumerina. Atti soc. Toscana di sc. natur., vol. X, Pisa 1888, pag. 1—48, tav. II.*

Nach Grassi ist *Blatta orientalis* der Zwischenwirth von *Spiroptera sanguinolenta*; zu einem anderen Nematoden gehörige Larven, das Hämatozoon Lewis, wurden in *Pulex serraticeps* gefunden,

welche denen ähnlich sehen, die Manson in *Culex pipiens* entdeckte und auf *Filaria Bancrofti* bezog; auch mit den zu *Filaria immitis* gehörigen Blutfilarien haben sie nichts gemein; ihre Herkunft und Weiterentwicklung ist unbekannt. Die Larve von *Filaria sanguinolenta* findet sich in Cysten in der Leibeshöhle von *Blatta orientalis* und wurden solche Cysten mit Erfolg an Hunde verfüttert; die Schaben fressen die Eier dieses Parasiten mit den Fäcalien der Hunde; in 8 Hunden fand Verf. zahlreiche Exemplare der *Filaria sanguinolenta* und keine Blutfilarien, weshalb er meint, dass die Larven dieser Art nicht im Blute des Hundes leben und constatirt ferner, dass die Blutfilarien in Hunden vorkommen, in denen auch *Filaria immitis* nicht gefunden wurde; es ist daher noch ungewiss, wohin diese Blutfilarien gehören; auch Sonsino fand in Pisa einen Hund mit vielen Hämatozoen, der aber keine *Filaria immitis* beherbergte; wenn Sonsino und Bancroft meinen, dass *Trichodectes latus* mit dem Blute des Hundes die kleinen Filarien aufnehmen, so sei das wohl eine Verwechslung mit *Haematopinus piliferus*, da ersterer kein Blut sauge, wohl aber letzterer. Weder innerhalb noch ausserhalb des Darms entwickelt sich die Larve weiter, doch stellt Verf. die Möglichkeit nicht in Abrede, dass derselbe den Zwischenwirth der Blutfilarien abgeben könne. Später findet Verf. Blutfilarien im Hunde, die zu *Filaria immitis* gehören, und wurden in diesen Hunden auch stets erwachsene Exemplare von *Filaria immitis* gefunden; die Blutfilarien entwickelten sich aber weder in *Pulex* noch in *Haematopinus* weiter.

Die zu *Filaria attenuata* gehörigen Blutfilarien in *Corvus* finden sich auch in *Garrulus glandarius*; sie entwickeln sich nicht in Federläusen.

Wahrscheinlich entwickelt *Ascaris mystax* sich ohne Zwischenwirth. B. Grassi. *Ciclo evolutivo della Spiroptera sanguinolenta*. Catania 1888. *Ancora sul ciclo evolutivo delle Spiroptera sanguinolenta e sulle larve di nematodi della pulce*. Rovellasca 1888. *Beiträge zur Kenntniss des Entwicklungszyclus von fünf Parasiten des Hundes* (*Taenia cucumerina* Goeze, *Ascaris marginata* Rud., *Spiroptera sanguinolenta* Rud., *Filaria immitis* Leidy und *Haematozoon* Lewis). *Centralbl. für Bact. u. Parask.* 2. Jahrg., Jena 1888, IV. Bd., No. 20, pag. 609—620, No. 25, pag. 776—777.

Nach Lewis sind in Indien etwa ein Drittel aller Pariahunde mit Blutfilarien, zu *Filaria immitis* gehörig, inficirt. Lewis. *Physiological and pathological researches, being a reprint of the principal scientific writings*. London 1888, pag. 615.

Nach Steel giebt Manson an, dass in China von je 3 Hunden 2 mit Blutfilarien (*Filaria immitis*) behaftet sind. Steel. *A treatise of the diseases of the dog, being a manual of canine pathology*. London 1888, pag. 76.

vide auch W. Sokolow. (*Fall des Vorkommens von Filaria immitis im Herzen des Hundes*) (russisch). *Arb. d. naturf. Gesellsch.* Charkow, Bd. 15, Beil. pag. XXI—XXIII und

F. Reuther. *Erkrankung eines Hundes an Filaria immittis.* Wochenbl. für Thierheilk. u. Viehzucht 1888, No. 49, pag. 429—430.

Chatin beschreibt *Strongylus paradoxus* Mehlis = *Str. longevaginatus* Diesing; die Embryonen bleiben im Wasser Monate lang am Leben, mit dem sie, ohne dass ein Zwischenwirth aufgesucht wird, in den Menschen und das Schwein gelangen; der Nematode wurde in den Darmausleerungen eines an Magen- und Darmbeschwerden leidenden Mannes gefunden, während er beim Schweine nur in den Luftwegen, besonders in den Bronchien vorkommt. *M. J. Chatin. Le strongle paradoxal chez l'homme. Bullet. Acad. méd. Paris* 1888, No. 15, pag. 483—491; *Bullet. soc. Philomatique, Paris, sér. 7, t. 12, No. 3, pag. 96—97.*

Railliet hält *Strongylus strigosus* Dujardin für identisch mit *Strongylus Blasii* des Ref.; Ref. bemerkt dazu, dass Dujardin's Beschreibung auf viele Arten passen kann, weil sie die männliche Bursa, welche zur Artdiagnose beim Genus *Strongylus* unentbehrlich ist, unberücksichtigt lässt, dass aber Molin's Beschreibung und Abbildung von *Strongylus strigosus* in keinem Punkte mit *Str. Blasii* passt, von welchem Autor zwar Verf. sagt, er zeige keine Genauigkeit, die gross genug sei, um seine Diagnose ohne weiteres acceptiren zu können. *A. Railliet. Sur l'identité du Strongylus Blasii v. Linstow et du Strongylus strigosus Dujardin. Bullet. soc. zoolog. France, t. XIII, Paris* 1888, pag. 210—214.

Moniez beschreibt *Strongylus Leporum*, früher als *Spiroptera Leporum* bezeichnet, aus der Darmwand der Hasen und Kaninchen. *R. Moniez. Sur un Strongle de la paroi stomacale et des Lièvres des Lapins de Garenne. Revue biol. du Nord de la France* I, Lille 1888—89, No. 9—10.

Aducco findet ein 765 mm langes Weibchen von *Eustrongylus gigas* in der Niere eines Hundes; die Eier fanden sich im Urin des Hundes und im Darm des Helminthen, waren also von diesem mit dem Urin verschluckt. Die Haut und eine von dieser in der Perivisceralhöhle eingeschlossene Flüssigkeit in der Menge von 25 ccm waren lebhaft roth gefärbt und fand Verf. durch zahlreiche physikalische und chemische Versuche, dass der rothe Farbstoff der Cuticula und Hämolymphe dem Oxyhämoglobin des Wirbelthierbluts sehr ähnlich ist, von dem es sich nur durch die Temperatur, in der es coagulirt und eine grössere Widerstandskraft gegen gewisse Reagentien unterscheidet. *V. Aducco. Un caso di Eustrongylus gigas. Riforma medica ann. IV, No. 60, Roma* 1888, pag. 359. *La sostanza colorante rossa dell'Eustrongylus gigas. Atti R. Acad. Lincei, ann. 285, Roma* 1888, ser. 4, vol. IV, *Rendiconti, fasc. VI pag. 187—194, fasc. VII pag. 213—220.*

Blanc beschreibt das Excretionsgefässsystem von *Oxyuris longicollis*; die 4 Hauptstämme münden in einen gemeinschaftlichen Porus und stehen andererseits durch eine kleine, mit Wimpern versehene Oeffnung mit der Körperhöhle in Verbindung. *H. Blanc. Sur le système excréteur des Oxyures. Arch. sc. phys. natur., 3. sér., t. 20,*

Genève 1888, No. 10, pag. 347. *Verhandl. d. Schweizer naturf. Gesellschaft.*, Solothurn 1888, pag. 58.

Leichtenstern giebt einen geschichtlichen Ueberblick über unsere Kenntniss von *Ankylostomum duodenale* vom Jahre 1851 an, in welchem v. Siebold den Parasiten zum ersten Male beschrieb; darauf erkannte Griesinger seine krankmachende Wirkung und nannte die Krankheitserscheinungen tropische Chlorose; Wucherer entdeckte den Parasiten in Brasilien, Dubini in Italien, worauf Grassi, Parona, Bozzolo, Perroncito und andere zeigten, dass er in Italien eine Anämie der Ziegelerbeiter hervorrufe; Grassi und Parona wiesen die Eier in den Fäces der Kranken nach; hierauf brach die viel besprochene St. Gotthard-Epidemie aus und der Parasit wurde nach der Schweiz, Baden, dem Elsass, Frankreich, Ungarn, den Rheinlanden und nach Belgien verschleppt, wo er die Anämie der Bergwerks- und Ziegelei-Arbeiter hervorrief. Gelegentlich erwähnt Verf. eine der *Rhabditis aspera* sehr ähnliche Art, welche in den menschlichen Fäcalien lebt und sich in ihnen, wenn sie ins Freie gelangt sind, fortpflanzt. *Leichtenstern. Ankylostomum duodenale. Deutsche medic. Wochenschr.* 1888, No. 42, pag. 849—851.

Nach Seifert kommt *Ankylostomum duodenale* seit 1885 bei Ziegelerarbeitern in Heidingsfeld bei Würzburg vor, wo 2 italienische Arbeiter an den Folgen des Parasitismus erkrankten, und meint Verf., dass die Embryonalform in Deutschland im Winter zu Grunde gehe; die Lehmfelder werden also im Frühling stets von neuem durch Arbeiter inficirt werden, am Rhein durch Wallonen, in Süddeutschland durch Italiener; in tiefen Bergwerken halten sich die Helminthen wohl das ganze Jahr am Leben; die Abbildungen sind nach Bizzozero, Schulthess und Leuckart reproducirt. *O. Seifert. Ueber Ankylostomum duodenale. Verhandl. d. phys. med. Gesellsch. Würzburg, n. F., Bd. XXI, 1888, pag. 283—294, tab. IV.*

Ernst bespricht Fälle von *Ankylostomiasis* nebst Sectionsbefunden und berichtet über neue in Köln zur Beobachtung gekommene Fälle des Vorkommens von *Ankylostomum duodenale*; die Lebensdauer erstreckt sich auf mindestens 4 Jahre; in einem Falle fanden sich 145 *Ankylostomen*, die lange Zeit im Menschen gelebt hatten, ohne Anämie zu erzeugen; in einem anderen fanden sich 2763 *Ankylostomen* im Dünndarm, welche den Tod herbeigeführt hatten; in einem dritten überwog die Zahl der Männchen die der Weibchen; erstere massen 12—15, letztere 15—18 mm. *J. Ernst. Einige Fälle von Ankylostomiasis nebst Sectionsbefunden. Deutsche medic. Wochenschr. Leipzig u. Berlin 1888, No. 15, pag. 291—294.*

Schopf beobachtet *Ankylostomum duodenale* in 87 Fällen, 8,7 % aller Arbeiter, bei Bergleuten in Resicza in Ungarn. *J. Schopf. Ueber Ankylostomum duodenale. Wiener medic. Presse, XXIX, Wien 1888, No. 34, pag. 1232—1234. Orrosi hetilap 1888, No. 37 (ungarisch). Allgem. Wiener medic. Zeitung No. 46—48, pag. 556 bis 557, 571, 583—584.*

vid. auch **O. Baker.** *The Anchylostomum duodenale, its wide prevalence and connection with jail debility.* Indian. med. gaz. 1888, No. 12, pag. 353—355. **R. N. Rake.** *Anchylostomum duodenale.* Transact. of the pathol. soc. of London 1887/88, No. 39, pag. 111. **R. Blanchard.** *L'Ankylostome duodénal et l'anémie des mineurs.* Revue scientif., 3. sér., t. 41, No. 22, pag. 701. **A. Roussel.** *L'anémie des mineurs et l'Ankylostome duodénal.* Revue scientif., 3. sér., t. 41, No. 20, pag. 635.

Leidy fand in einer Schildkröte im Darm *Cucullanus microcephalus* (l. c.), ferner *Agamonema capsularia* an der Aussenwand des Magens beim Rock fish (*Labrax lineatus*) (l. c.).

Walsingham bespricht die Arbeiten Walker's und Mégnin's über *Syngamus trachealis*, ohne neue Beobachtungen zu bringen. *Lord Walsingham.* *The gape worm in fowls (Syngamus trachealis).* Nature vol. 38, No. 979, London 1888, pag. 324—325.

Moniez beschreibt als neu *Hedruris Orestiae* aus Orestias. *R. Moniez.* *Recherches sur le genre Hedruris à propos d'une espèce nouvelle, Hedruris Orestiae.* Revue biol. du Nord de la France, t. I, No. 9—10, Lille 1888/89.

Sonsino hält *Ophiostomum* = *Rictularia plagiostomum* Wedl, *O. spinosum* v. *Willemoes-Suhm*, *O. mucronatum* Rud. und *O. Bovieri* Wedl. für identisch; die Art hat 2 Reihen von flossenartigen Dornen an der Bauchseite, das Männchen 90 in jeder Reihe; früher in Insektenfressern, *Plecotus auritus*, *Vespertilio Daubentonii*, *murinus*, *mystacinus*, *Nattereri*, *Vesperugo noctula* und *pipistrellus* und in *Erinaceus auritus* gefunden, entdeckte Verf. die Art in einem Fuchs in Egypten, der auch mitunter Insekten frisst. *Ophiostomum cristatum* Rud. hat nur eine Reihe Dornen und lebt in Nagethieren, *Myoxos dryas*, *glis* und *avellanarius* und in *Mus sylvaticus*. *P. Sonsino.* *Rictularia plagiostoma e specie affini.* Atti soc. Toscana sc. natur. Process. verbal. Pisa 1. Luglio 1888, vol. VI. pag. 113—115.

Ref. beschreibt von den auf der Challenger-Expedition gefundenen Helminthen *Ascaris simplex* Rud. aus dem Magen von *Otaria jubata*, *Ascaris spiculigera* Rud. aus dem Magen von *Phalacrocorax verrucosus*, *Ascaris biloba* n. sp., deren Wirth nicht bekannt ist; *Ascaris Diomedaeae* n. sp. aus dem Magen von *Diomedea brachyura*, *Ascaris Macruri* n. sp. aus *Macrurus rudis*, *Ascaris Macruroides* n. sp. aus dem Magen eines *Macrurus*, *Filaria cirrohamata* n. sp. aus dem Magen von *Phalacrocorax verrucosus*, *Filaria flabellata* n. sp. unter der Haut und in der Bauchhöhle von *Paradisea apoda* gefunden, *Filaria Paradiseae* n. sp. aus demselben Vogel; *Prothelminis profundissima* n. gen., n. sp., eine grosse, bis 65 mm lange, geschlechtlich nicht entwickelte, in einer Tiefe von 1950 Faden gefundene, freilebende Form (l. c.).

Railliet giebt an, dass in den Chabins, d. h. den Bastarden zwischen Ziege und Schaf, *Trichocephalus affinis* Rud., *Sclerostoma (Strongylus) hypostomum* Rud. und *Oesophagostoma venulosum* Rud. leben; was die beiden ersteren Arten betrifft, so sind sie den beiden

Stammarten eigene Parasiten, während *Oes. venulosum* bisher nur in *Capra hircus* gefunden war; indessen ist nach dem Verf. *Oesophagostomum acutum* Molin, ein Parasit von *Ovis aries*, nicht, wie Molin angiebt, mit *Strongylus contortus* Rud., sondern mit *Oes. venulosum* gleichbedeutend, so dass auch diese Form in Schaf und Ziege vorkommt; auch die von Carità im Schaf beobachtete Form soll hierher gehören. A. Railliet. *Les parasites du chabín et l'Oesophagostome des petits ruminants. Bullet. soc. zoolog. France, t. XIII, Paris 1888, pag. 216—218.*

Griffith beobachtet das Vorkommen von *Dracunculus medinensis* im Hunde. G. R. Griffith. *Dracunculus medinensis in the dog. Veterinary Journ. November 1888, pag. 317—318.*, und **Ostroglasow** im Menschen. W. M. Ostroglasow. (Ueber einen Fall von *Filaria medinensis* bei einem Kranken) (russisch). *Nachricht d. kais. Gesellsch. d. Freunde d. Naturwissensch. Moskau t. 50, Heft 1, pag. 29—32.*

Beorchia Nigris berichtet über das Vorkommen von *Trichocephalus* in der Harnblase des Hundes. A. Beorchia Nigris. *Di un caso di Tricocephalo nella vesica urinaria di un cane. Annal. Univers. libera di Perugia, fac. med.-chir. 1887—88, Nr. 3, pag. 107—112.*

Lutz macht Vorschläge zur Behandlung der Trichinose, die zoologisch nichts neues bieten. A. Lutz, *Vorschläge und Betrachtungen zur Frage der Trichinostherapie und ihrer experimentellen Begründung. Deutsche Medicinal-Zeitung, Berlin 1888, No. 13—15.*

Volk giebt eine gute Uebersicht über die Lebensgeschichte von *Trichina spiralis* als Veröffentlichung eines in Ratzeburg gehaltenen Vortrages. R. Volk. *Zur Trichinenfrage. Lauenburg 1888* siehe übrigens *Trichinose in Nürnberg. Veröffentl. des Kaiserl. Gesundheitsamtes, Berlin, 1888, Nr. 16, pag. 269.* **Riedel**, die *Trichinose* zu Obercunewalde in Sachsen; *Centralbl. für allgem. Gesundheitspflege, 1888, Nr. 9—10, pag. 340—348.* *Trichinen-Epidemien im Königreich Sachsen. Veröffentl. des Kaiserl. Gesundheitsamtes, Berlin 1888, Nr. 15, pag. 227.* *Trichinose in Goes (Niederlande), ibid. No. 12, pag. 187.* *Compte rendu au Ministre de l'Intérieur d'une épidémie de trichinose ayant régné à Givès. Annal. méd. vétérin. Dec. 1888.* **Roquette**. *Trichinosis in Inowrazlaw. Zeitschr. für Medicinalbeamte, 1888, Nr. 2, pag. 54—56.* **J. Johné**. *Der Trichinenbeschauer, 2. Aufl., 139 pg., Berlin 1888.*

Rovelli studirt den Bau der weiblichen Geschlechtsorgane von *Strongyloides* = *Rhabdonema* und *Angiostomum* und den Modus der Eibildung in denselben; besonders untersucht Verf., ob die parasitische Generation sich hermaphroditisch oder parthenogenetisch entwickelt. Der von Leuckart vorgeschlagene Gattungsname für den früher *Ascaris nigrovenosa* genannten Parasiten der Froschlunge und den anfänglich *Anguillula intestinalis* und *stercoralis* genannten Parasiten des Menschen, welchen Leuckart

Rhabdonema strongyloides nennt, wird in *Strongyloides* geändert, da *Strongyloides* nicht, wie Leuckart angiebt, in der parasitischen Form eine hermaphroditische, sondern eine parthenogenetische Fortpflanzung zeigt. Dasselbe gilt von *Strongyloides* (*Rhabdonema*) *longus* und einer *Strongyloides*-Art aus *Mus decumanus*. *Strongyloides longus* aus *Mus decumanus* und *Sus scrofa* lässt die Uteri mit reifen Eiern aus der Vagina heraustreten, worauf dieselben sich auflösen und frei im Darm des Wirths gefunden werden, wie eine solche Ausstülpung auch bei *Sphaerularia* und *Atractonema* vorkommt; Spermatozoen werden nicht gefunden, ebenso fehlt ein *Receptaculum seminis*, und beobachtete Verf. die Entwicklung der Eier aus den Ovarialzellen ohne Gegenwart von Samenkörperchen. *Angiostomum nigrovenosum* ist dagegen in parasitischer Form hermaphroditisch, da Spermatozoen und Eier gebildet werden; die Samenkörperchen treten zuerst auf, so dass ein protandrischer Hermaphroditismus besteht. Bei *Angiostomum* wechselt also eine parasitische, hermaphroditische Generation regelmässig mit einer freilebenden, zweigeschlechtlichen; bei *Strongyloides* kann die freilebende, zweigeschlechtliche Generation fortfallen; die Männchen bei letzterer sind selten; bei *Str. intestinalis* zählt man 1 auf 8 Weibchen, bei *Str. longus* 1 auf 1000 Weibchen; die parasitische Form pflanzt sich hier parthenogenetisch fort. G. Rovelli. *Ricerche sugli organi genitali degli Strongyloides* (*Anguillula*, *Rhabdonema*), Como 1888, 11 pg., 1 tav.

de Man beschreibt eine Anzahl in dem Canal, welcher die Insel Walcheren durchschneidet, und bei der Festung Flessingen gefundene freilebende Nordseenematoden, welche in der bei dem Verf. bekannten vortrefflichen Manier abgebildet werden, in Zeichnungen, welche z. Th. nach enormen Vergrösserungen angefertigt sind, da die Linearvergrösserungen bis zu 2700 gehen. Verf. beschreibt aufs genaueste und bildet ab *Halalaimus gracilis* n. gen., n. sp., dem Genus *Oxystoma* verwandt; eine Mundhöhle fehlt und die Seitenorgane bestehen aus schmalen, langen Longitudinalfurchen; *Monohystera ocellata* Bütschli, *Monohystera* = *Tachyhodites parva* Bastian, *Monohystera ambigua* Bastian = *ambiguoides* Bütschli, *Monohystera setosa* Bütschli, *Monohystera oxycerca* n. sp. mit Cirren, welche etwa ein Drittel der Schwanzlänge einnehmen. *Terschellingia communis* n. gen., n. sp., hat einen kurzen, mit starkem Bulbus endigenden Oesophagus und eine doppelte weibliche Geschlechtsröhre; *Enchelidium marinum* Ehrenb., ferner *Araeolaimus elegans* n. gen., n. spec. hat eine Cuticula ohne Querringel und röthlich braune Augenflecken; *Anoplostoma Blanchardi* n. sp. hat fast gerade Spicula, die etwas länger als der halbe Schwanz sind; die Bursa zeigt 4 Papillen jederseits; *Anoplostoma spinosum* Bütschli, *Thoracostoma* (*Enoplus*) *denticaudatum* Schneider, *Eurystoma filiforme* n. sp., mit halbkreisförmig gebogenen Spicula von der Länge des Schwanzes; *Symplocostoma longicolle* Bast., *Dolicholaimus Marionis* n. gen., n. spec., ohne alle Tastborsten und mit sehr

langer, cylindrischer Mundhöhle; *Syringolaimus striatocaudatus* n. gen., n. spec. zeigt eine glatte Cuticula und ebenfalls eine lange, cylindrische Mundhöhle, der Oesophagus endet in einen Bulbus; *Halichoanolaimus* n. gen. hat eine von 3 starken Chitinstücken gestützte Mundhöhle und Längsreihen von Papillen vor dem Anus; in dieses Genus setzt Verf. *Spilophora robusta* Bastian und Bütschli; *Hypodontolaimus* n. gen. zeigt auf jedem Leibesringel Querreihen von Punkten und ein an der Bauchseite der Mundhöhle gelegenes Chitinstück, das nach vorn in einen starken Zahn endigt; hierher zieht Verf. *Spilophora inaequalis* Bastian; *Spilophora paradoxa* n. sp. ist ausgezeichnet durch 2 Reihen von Punkten in jeder Lateralinie, der Oesophagusbulbus ist so lang wie ein Drittel des ganzen Oesophagus; präanale Papillen fehlen; endlich *Chromadora nudicapitata* Bastian mit rothbraunen Augenflecken.

J. G. de Man. *Sur quelques Nématodes libres de la mer du Nord, nouveaux ou peu connus. Mém. soc. zoolog. de France, vol. I, fasc. 1, Paris 1888. pag. 1—51, plche I—IV.*

Strubell beschreibt ausführlich den Bau, die Entwicklungs- und Lebensgeschichte von *Heterodera Schachtii*; die Cuticula besteht aus 3 verschiedenen Schichten, von denen die oberste Querstreifung zeigt, während die innerste die mächtigste ist; am Kopfende bemerkt man einen calottenförmigen Aufsatz, der von 6 radienförmigen, im Scheitel vereinigten Chitinstäben gestützt wird und als Bohrinstrument dient; er wird bei den Larven und den Männchen gefunden, fehlt aber bei den sesshaft gewordenen Weibchen. Unter der Cuticula liegt die Subcuticula; die Seiten- und Medianfelder werden als Linien bezeichnet und in dem linken Seitenfeld verläuft das Excretionsgefäß; die 4 Seitenlinien theilen die Muskulatur in 4 Längsabtheilungen; die Muskelzellen verlaufen in einem Winkel von etwa 35 Grad gegen die Richtung der Seitenfelder und stehen im Querschnitt in jedem der 4 Muskelzüge 5 Zellen; Verf. meint, dieser Anordnung nach müsste *Heterodera* zu den Polymyariern, der flachen Gestalt der Zellen nach zu den Platymyariern gerechnet werden. Der Nervenschlundring liegt auffallenderweise nicht vor, sondern hinter dem Oesophagus-Bulbus. Der Oesophagus endet vorn in einen Stachel, welcher an der Basis 3 rundliche Anschwellungen zeigt und seiner ganzen Länge nach durchbohrt ist; durch 2 Muskelpaare wird er vor- und zurückbewegt; das Oesophaguslumen nimmt dicht hinter der Stachelbasis den Ausmündungsgang einer kleinen, kolbigen Drüse auf; der Oesophagus-Bulbus enthält einen dreitheiligen Klappen-Apparat, der Oesophagus zeigt eine Anzahl grosser Kerne. Die beiden gleichen Spicula sind gekrümmte Chitinlamellen; im oberen Theile des Hodens befindet sich eine Rachis, um welche herum die Keime der Samenzellen gruppirt sind. In den weiblichen Körper gelangt, bewegen sich die Spermatozoen durch active, selbstständige Bewegungen mittels Pseudopodien; dieselben werden ausgestreckt und wieder eingezogen und die Fortsätze schlagen peitschenförmig. Die weibliche Geschlechtsröhre ist doppelt

und besteht aus Ovarium, Ovidukt und Uterus; die Vagina liegt am Hinterende des Körpers. Bei den Weibchen, die man Eiersäcke nennen kann, liegt hinten ein von gallertartiger Haut umschlossener Hohlraum, der als Eiersack bezeichnet werden kann. Ein sogenanntes Kopffutteral des Weibchens entstammt einer Absonderung der von ihm bewohnten Rübe und die subkrystallinische Schicht, ein dünner Ueberzug der Körperoberfläche, ist die alte Larvenhaut des Weibchens, die wegen der Bewegungslosigkeit nicht abgestreift werden konnte. Der Uterus platzt bald und die Eier gelangen in die Leibeshöhle, die Muskulatur schwindet und das Thier stirbt endlich und stellt nur eine Brutkapsel vor. Von den beiden ersten Furchungskugeln wird die eine zum Ektoderm und die andere zum Entoderm; die Ektodermzellen umwachsen das Entoderm zuerst am Schwanzende, wo eine stärker hervortretende Zellengruppe als Schwanzzellen bezeichnet werden; vorn in der Bauchlinie lässt das Ektoderm eine rundliche Lücke, das Prostoma, das sich später schliesst; der erste Abschnitt des Schlundrohrs und das Rectum sind Invaginationen des Ektoderms, Oesophagus und Darm aber entstehen aus dem Entoderm. Zwischen Ekto- und Entoderm liegen symmetrisch 2 Zellen, die einander bald näher rücken und schliesslich zu einer zweikernigen Zelle verschmelzen, welche die erste Geschlechtsanlage darstellt, noch innerhalb der Eischale häutet sich der Embryo. Bald nach dem Verlassen der Eischale bohren sich die jungen Larven in die zarten Wurzelfasern der Zuckerrübe ein. Austrocknen vertragen die Thiere nicht, ebensowenig eine Erwärmung über 35° und Frost. Unter der Wurzelrinde angekommen, machen sie eine zweite Häutung durch und nun entsteht eine zweite Larvenform von flaschenförmiger Gestalt, mit halsartigem Vorder- und bauchigem Hinterleib, die Kopfkappe schwindet und das Thier wird völlig bewegungslos; die Epidermis der Wurzel wird immer mehr hervorgedrängt und umgiebt das Thier mit einer Cyste; bei den Weibchen platzt die Wurzelepidermis bald und lässt das Hinterende frei heraustreten; das Weibchen wird in diesem Stadium befruchtet und entwickelt in seinem Innern Eier; es wird zu einer braunen, citronenförmigen Brutkapsel, die endlich von der Wurzel abfällt und frei in der Erde liegt; manchmal dringen die Thiere auch nur mit dem Vorderkörper in die Wurzel ein. In der männlichen zweiten Larve bildet sich ein langgestreckter Wurm von gewöhnlicher Nematodengestalt, der in 3—4 Windungen aufgerollt in der flaschenförmigen Hülle, der Haut der zweiten Larvenform liegt; er durchbohrt diese Hülle und das bedeckende Wurzelgewebe und gelangt so in die Erde, um das Weibchen aufzusuchen und zu befruchten. In einem Jahre können 5 Generationen entstehen und ein Paar kann in einem Jahre eine Nachkommenschaft von 22781 Milliarden erzeugen. Die zweite, bewegungslose Larvenform, über welche das Weibchen nie hinauskommt, vergleicht Verf. mit dem Puppenstadium der Insekten, besonders der Cocciden, bei denen auch das weibliche

Geschlechtsthier den larvalen Charakter bewahrt und zu einer Brutkapsel wird, welche nur die Aufgabe hat, die Nachkommenschaft zu schützen. *A. Strubell. Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung der Rüben-Nematoden, Heterodera Schachtii Schm. Bibliotheca zoologica, Heft II, Cassel 1888, 52 pg., 2 Tfln.*

Nach *Chatin* zeigen die jungen Weibchen von *Heterodera* eine Cuticula und eine Hypodermis über der Muskulatur; später schwindet letztere mehr und mehr; die braune Cyste der Weibchen ist ihrer Abstammung nach gemischter Natur, denn sie ist weder allein eine pathologische Neubildung der Rübe, noch eine Verhärtung des Integuments des Helminthen. *M. J. Chatin. Helminthologie. Sur la structure des téguments de l'Heterodera Schachtii et sur les modifications qu'ils présentent chez les femelles fécondées. Compt. rend. Acad. sc. Paris, t. CVII, 1888, No. 2, pag. 134—141.*

Willot findet, dass *Heterodera Schachtii* durch Seesalz in 5 procentiger wässriger Lösung getödtet wird. *M. Willot. Sur l'Heterodera Schachtii. Compt. rend. Acad. sc. Paris, t. CVII, 1888, No. 11, pag. 507—509.*

Göldi untersuchte die Ursache der in der brasilianischen Provinz Rio, besonders am unteren Parahyba seit etwa 20 Jahren herrschenden Krankheit des Kaffeebaums und fand, dass die feinen Faserwurzeln kleine knollige Auftreibungen zeigten, welche eigenthümliche Nematoden enthielten, wodurch das Absterben der Pflanzen bedingt wird. Die Weibchen produciren Eier, in denen Embryonen entstehen, welche sich wieder in die nahe liegenden Wurzelfasern einbohren und hier wiederum knollige Verdickungen hervorrufen. Obgleich Verf. die nahe Verwandtschaft des hier beschriebenen Nematoden mit dem Zuckerrüben-nematoden erkennt, stellt er ersteren doch in das neue Genus *Meloidogyne* und nennt die Art *Meloidogyne exigua*. Ref. hält die Art für eine *Heterodera* und zwar wahrscheinlich für *Heterodera radicola* Müller, die als Parasit der Wurzeln des Kaffeebaums in Brasilien bekannt ist. *E. Göldi. Relatorio sobre a molestia do cafeeiro na proviencia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro 1887.*

Magnus fand an den Wurzeln von Exemplaren von *Passiflora*, die nicht gedeihen wollten, kleine Gallen mit *Heterodera radicola*. *P. Magnus. Ueber Wurzeln von Passiflora mit kleinen seitlichen Verdickungen, verursacht von Heterodera. Sitzungsber. d. Gesellsch. d. Naturf. Berlin 1888, No. 9, pag. 170, s. auch J. Kühn, Nouvelles recherches sur les plantes-pièges des nématodes, trad. par Blanchard. Ann. sc. agronom. 1888, II, pag. 372—387.*

Ritzema Bos setzt seine Untersuchungen über *Tylenchus devastatrix* fort; über den ersten Theil der Arbeit wurde bereits im vorigen Jahresbericht pag. 36 referirt; die Art ist mit *Anguillula Dipsaci* Kühn identisch und kommt im Roggen, Hafer, Weizen, Buchweizen, Klee und *Dipsacus fullonum* vor; ebenso ist sie identisch mit *Tylenchus Hyacinthi* Prillieux der Hyacinthen, mit *Tylenchus Allii* Beyerinck aus *Allium cepa*, mit *Tylenchus Havensteinii* Kühn

aus *Medicago sativa* und *Trifolium pratense*, wahrscheinlich auch mit *Tylenchus Askenaysi* Bütschli aus *Hypnum cupressiforme*, *Tylenchus intermedius* de Man und *Tylenchus putrefaciens* Kühn aus *Allium cepa*, sowie mit einer von Berkeley und W. G. Smith in Nelken gefundenen Art, was Verf. ausser aus dem Vergleich der verschiedenen Formen auch experimentell nachweist, indem er z. B. mit Hyacinthen-Nematoden Haferpflanzen und Zwiebeln inficirt. Der Nematode lebt ausserdem in *Ranunculus*, *Thlapsi*, *Spergula*, *Geranium*, *Centaurea*, *Bellis*, *Sonchus*, *Myosotis*, *Plantago*, *Polygonum*, *Narcissus*, *Scilla*, *Galtonia*, *Anthoxanthum*, *Holcus* und *Poa*. Verf. meint, dass die verschiedenen Generationen, einmal an eine Pflanze gewöhnt, nicht leicht in eine andere eindringen. Vielleicht ist *Tylenchus intermedius* eine freilebende Form, die Stammform, von der die parasitischen abstammen. Auch *Tyl. devastatrix* kann länger als ein Jahr frei in der Erde leben. Die Veränderung der von dem Nematoden bewohnten Pflanze führt Verf. auf eine von ihm ausgeschiedene Flüssigkeit zurück. Ohne die Lebensfähigkeit einzubüssen, können unentwickelte Eier 2 Monate, Eier mit 2 Furchungskugeln nur einige Tage, Larven einen Monat austrocknen, geschlechtsreife Thiere dagegen sterben durch das Austrocknen; höhere Temperaturen des Wassers beschleunigen das Wiederaufleben; 16 mal konnte Verf. eine kleine Anzahl Larven austrocknen und durch Befeuchten wieder beleben, aber jedesmal dauerte es länger, bis die Wiederbelebung erfolgte und bei jedem Versuche starben einige Exemplare. Die Thiere vertragen hohe Kältegrade, wenn sie langsam zu wärmeren Temperaturen zurückkehren; auch faulige Substanzen versetzen sie in einen lethargischen Zustand, aus dem sie wieder erwachen können. Die weiteren Mittheilungen beschäftigen sich mit den durch den Parasitismus in den Pflanzen hervorgerufenen Veränderungen. *J. Ritzema Bos. Untersuchungen über Tylenchus devastatrix Kühn. Biolog. Centralbl. Bd. VII, Erlangen 1888, No. 8 pag. 232—243, No. 9 pag. 257—271, No. 21 pag. 646—654; Bd. VIII, No 5 pag. 129 bis 138, No. 6 pag. 164—178.*

Chatin fand in Zwiebeln 3 Arten von Nematoden, nämlich *Pelodera strongyloides*, *Leptodera terricola* und *Tylenchus putrefaciens*; die letztere Art zerstört die Zwiebeln und in den bereits erkrankten oder abgestorbenen Gewebstheilen siedeln sich die beiden ersteren Arten an. *M. J. Chatin. Des diverses Anguillules, qui peuvent s'observer dans la maladie vermineuse de l'oignon. Compt. rend. Acad. sc. Paris, t. CVII, 1888, 14. Mai. Compt. rend. soc. Biolog. Paris, Fevrier 1888.*

Nach **Prillieux** leben im Gewebe des Stengels und der Blattscheidenbasis des Hafers in Frankreich 2 Nematoden, ein *Tylenchus* und eine *Heterodera*; eine nähere Beschreibung und Bestimmung ist nicht gegeben; im Larvenzustand sind beide Formen fadenförmig und die Haferkultur wird durch den Parasitismus erheblich beeinträchtigt. *Prillieux. Pathologie végétale. Maladie vermiculaire des Avoines. Compt. rend. Acad. sc. Paris t. CVII, 1888, No. 51—53.*

Horn findet, dass die Blüten von *Phleum Boehmeri* durch *Tylenchus Phlei* n. sp. geschädigt werden; im Innern eines flaschenförmigen, rothbraunen Körpers in den hohlen Deckspelzen liegen 1—7 Nematoden, entweder 1 Männchen oder 1 Weibchen allein, oder 1 Männchen und 1 Weibchen, oder 3—4 Männchen und 2—3 Weibchen, das Männchen gerade oder zweimal gebogen, das Weibchen spiralig aufgerollt; ersteres ist 1,2—1,6 mm lang und 0,048 mm breit; letzteres 2—3 mm lang und 0,2 mm breit; die Vulva liegt dicht vor dem Anus, der Oesophagus hat eine doppelte Anschwellung und das Kopfende einen Stachel, wie das Genus *Tylenchus* ihn zeigt; die Eier sind 0,24 mm lang und 0,085 mm breit; die 0,9 mm langen und 0,015 mm breiten Embryonen überdauern den Winter und bohren sich im Frühling vermuthlich in neue Pflanzen ein. (Die Form ist übrigens identisch mit *Anguillula Phalaridis* Braun aus *Phalaris phleoides* Lin. = *Phleum Boehmeri* Wib. und muss also *Tylenchus Phalaridis* Braun heißen). P. Horn. *Die Aelchen-Gallen auf Pleum Boehmeri* Wib. Arch. d. Verh. für Naturgesch. in Mecklenburg, Güstrow 1888, pag. 139—155, 2 Tfn.

s. auch A. M. Desmoulins. *Les anguillules du vinaigre. Moniteur vinicole* 1888, Nr. 100, pag. 398 und H. Dimmock. *A. Sphaerularia-like worm, (Atractonema gibbosum* Leuckart). *Psyche*, vol. V, No. 141—142, pag. 14.

Gordien.

Vejdovsky studirt den Bau von *Gordius tolosanus* und findet, dass die cuticularen Areolen des Weibchens manchen Schwankungen unterworfen sind. *Gordius Preslii* ist eine wohlcharakterisirte Art und keineswegs ein Entwicklungsstadium von *Gordius violaceus*, wie Villot meint. Der das Centralnervensystem darstellende Bauchstrang, der an der Bauchseite in der Mittellinie zwischen Darm und Muskelschicht liegt, besteht aus einer in die sogen. Punktsubstanz, bisher als Nervenetz oder neurales Cuticulum zu bezeichnendes eingebetteten Ganglienschicht, einer Querkommissur und Fortsätzen der Ganglienzellen gegen die Hypodermis; sie bilden einzelne Stiele und keine continuirliche Lamelle. Die älteren Eierstöcke sind lappenförmige Gebilde von traubiger Gestalt; die Eierstockshöhle communicirt mit dem Lumen der mit einem Epithel ausgekleideten Ei- behälter; später sich bildende Eier fallen aus Mangel an Raum in den Eierstockklappen direkt in die Leibeshöhle und die ursprünglichen Ovarien schwinden. Das vor der Cloake gelegene Atrium hat vorn zwei angeschwollene Hörner, in welche die Enden der Eileiter übergehen; in das Atrium mündet auch die Samentasche durch einen unpaaren Gang. Die Ei- behälter sind von einem deutlichen Mesenterium umgeben; die Leibeswand besteht aus Cuticula, Hypodermis und Muskelschicht, an die sich ein Peritoneum legt, welches aus schönen Epithelzellen besteht. Die Kerne der Hypodermis liegen

in der körnigen Matrix; jede Muskelfaser ist gekernt, ein Parimysium ist nicht vorhanden. Verf. wendet sich gegen die wesentlich anderen Darstellungen Villots, welche sich auf diese Verhältnisse beziehen. *F. Vejdovsky. Studien über Gordiiden. Zeitschr. für wissenschaft. Zoolog. Bd. XLVI, Heft 2, Leipzig 1888, pag. 188—216, tab. XVIII.*

Camerano bringt eine ausführliche Untersuchung über die Anatomie und Histologie der Gordien, bei der besonders *Gordius tolosanus*, Villoti, de Filippii, Rosae, Pioltii, Preslii und *tricuspidatus* als Untersuchungsmaterial dienten. Die äussere Hülle zerfällt in eine äussere Cuticularschicht, eine sehr starke fibrilläre Cuticularschicht und eine zellige Epidermis oder Matrix; mitunter findet sich über und unter der fibrillären noch ein von granulöser Substanz unterbrochenes Stratum. Um den Oesophagus legt sich ein Nervenring; zwei durch eine Commissur verbundene Dorsal- und Ventralganglien findet Verf. nicht. Meissner's Bauchstrang ist der Hauptnerv, welcher sich vorn am Kopfe in 2 Aeste theilt und den Oesophagus umfasst; nach vorn von jedem der beiden Aeste zweigt sich an der Rückenseite ein nach der Kopfcalotte gehender Nerv ab; ausserdem finden sich 2 fast zu einer Masse verschmolzene Supraösophagealganglien, in Faserstränge eingesprengte Ganglienzellen, 2 starke Nervenmassen, die von dem vorderen und oberen Theil des Supraösophagealganglion austreten, mit einander verschmelzen und nach dem oberen Theil der Kopfcalotte ausstrahlen. Die Längsmuskeln sind cölomiar wie bei den Nematoden, Ringmuskeln fehlen. Der parenchymatöse Zellkörper ist vielfach in eine Art Bindegewebe umgewandelt, welches den Reproduktionsorganen als Stütze dient. Der Digestionskanal atrophirt bei geschlechtsreifen Formen; am wenigsten noch bei *G. tolosanus*, und mündet bei beiden Geschlechtern in eine Cloake; das Atrium Vejdovsky's oder der Uterus Villot's ist eine Dilatation des untersten Endes des Digestionscanals. Der Rückenkanal ist nicht ein fünfter Ast des Ovarium, Rücken- und Seitenlinien fehlen. Das Männchen hat 2 lange Hoden und 2 Vasa deferentia, die in die Cloaken-Dilatation des Darms münden; das Weibchen führt 2 lange Ovarien und 2 Ovidukte, die gleichfalls in die Cloakendilatation des Darms einlaufen, in welche auch ein langes und weites Receptaculum seminis tritt. Die freilebenden, geschlechtsreifen Gordien sind gewissermassen nur grosse Reproduktionsorgane; der vordere Theil kann des Lebens fast beraubt sein, während der hintere, von einem Ganglion caudale innervirt, sich lebhaft bewegt. Villot's Wassergefässsystem existirt nicht; die Gordien sind mit den Nematoden näher verwandt als mit den Acanthocephalen. *L. Camerano. Ricerche intorno alla anatomia ed istologia dei Gordii, Torino 1888, 63 pg., 9 tab. Bollet. Mus. Zoolog. anat. comp. vol. 3, No. 38. Recherches sur l'anatomie et l'histologie des Gordiens. Arch. Ital. biolog. t. 9, fasc. 3, pag. 243—248.*

Camerano beschreibt ferner *Gordius Villoti* Rosa = *aquaticus*

Villot, zu welcher Art als Localvarietäten vielleicht auch *G. Peronciti*, *G. Rosae* und *G. Pioltii* des Verf. gehören; ferner *Gordius tolosanus* Duj., *G. affinis* Villot, *G. violaceus* Baird, *G. alpestris* Villot, *G. Preslii* Vejdovsky, *G. tricuspidatus* Duf., zwei neue Arten sind *Gordius Wolterstorffi*, 140–260 mm lang, bei Frankfurt gefunden; die Cuticula ist mit länglich runden Feldern versehen, deren Ränder eingebuchtet sind, zwischen denselben stehen kleine rundliche Knötchen; *Gordius Tellinii* ist *Chordodes* verwandt; die Form wurde im Valle del Tagliamento gefunden, ist 100–160 mm lang und zeigt auf der Cuticula an der Basis verwachsene Gruppen von kleinen cylindrischen Hervorragungen. *L. Camerano. Ricerche sopra i Gordii d'Europa e descrizione di due nuove specie. Bollet. Mus. di zoolog. ed anat. comp. Torino vol. III, 1888, No. 42, pag. 1–10, 1 tav.*

Ders. Verf. beschreibt auch einen in Birmanien gefundenen männlichen *Gordius* von 150 mm Länge und 0,8 mm Breite, unter dem Namen *Gordius Feae*; das Schwanzende mündet in 2 kegelförmige Spitzen; hinter der Cloakenmündung liegt eine Scheibe, welche ihre beiden spitzen Ausläufer in die Kegel hineinsendet; die Haut ist durch 2 unter sich parallele, sich kreuzende Liniensysteme in Rhomben getheilt, in ihr stehen unregelmässig rundliche Alveolen mit glänzendem, punktförmigem Mittelpunkt und ausserdem kleine griffelförmige Erhabenheiten. *L. Camerano. Descrizione di una nuova specie del genere Gordius, raccolta in Birmania dal S. L. Fea. Annale Mus. civic. di stor. natur., ser. 2, vol. VI (XXVI), Genova 1888, pag. 168–170.*

Verf. und Cerruti berichten auch, dass von einem an Leibes-schmerzen leidenden 7 jährigen Knaben ein 190 mm langes Exemplar von *Gordius Villoti* Rosa ausgebrochen wurde, und führen Verf. die übrigen im Menschen beobachteten Arten an, nämlich *G. tolosanus* Duj., *G. varius* Leidy, *G. Villoti* Rosa, und einige unbestimmte Exemplare. Obgleich Bacounin feststellte, dass Gordien in einer Temperatur von 38° nicht leben können und im Menschen bald völlig verdaut werden, obgleich erwachsene Gordien häufig genug in Bächen, Brunnen und Wassertrögen vorkommen, so meinen Verf. doch, die microscopischen Larven könnten sich, mit dem Trinkwasser in den Magen gelangt, im Menschen weiter entwickeln; sie hielten den Menschen für einen Wirth der Gordien, wenn auch nicht für einen normalen. *G. B. Cerruti e L. Camerano. Di un nuovo caso ai parassitismo di Gordius adulto nell' uomo. Giornale R. Accad. medic. Torino 1888, No. 6–7.*

Michel findet, ohne von Camerano's Arbeit Kenntniss gehabt zu haben, dieselben Verhältnisse wie dieser, nämlich dass die subcuticulare Schicht der Gordien zelliger Natur und daher keine Hypodermis, sondern ein Epidermis sei. *A. Michel. De l'existence d'une véritable épiderme cellulaire chez les Nématodes et spécialement chez les Gordiens. Compt. rend. Acad. sc. Paris, t. CVII, 1888, No. 27, pag. 1175–1177.*

Villot hält nur die Gordien für erwachsen, bei denen nicht nur die Geschlechtsorgane völlig entwickelt sind, sondern auch die Cuticula ganz chitinisirt ist; die Entwicklung der Geschlechtsorgane geht oft der Chitinisirung der Cuticula voraus; freilebende Exemplare mit noch nicht chitinisirter Cuticula werden als junge bezeichnet. Von G. Preslii, impressus, Perronciti, Rosae, Pioltii sind die Artrechte nicht erwiesen. M. A. Villot. *Encore un mot sur le développement et la détermination spécifique des Gordiens adultes*. Zoolog. Anz. XI, Leipzig, 1888, No. 271, pag. 70—72.

Bertkau fand früher wahrscheinlich zu Mermis gehörige Helminthen von 20—30 mm. Länge in Salticus formicarius und Tegenaria atrica, unumehr aber eine wahrscheinlich zu Mermis albicans gehörige Form in einem Exemplar von 113 mm. Länge in Tarentula inquilina, das von selbst den Wirth verliess, um sich in die Erde zu begeben. P. Bertkau. *Ueber Mermis in Tarentula inquilina und die durch den Parasiten bedingte Sterilität des Wirthes*. Verhandl. d. naturhist. Vereins der preuss. Rheinlande, Westfalen u. d. Reg.-Bez. Osnabrück, Bd. 45, Bonn 1888, pag. 91—92.

Acanthocephalen.

Knüpfner untersucht die Anatomie, besonders den Bau der weiblichen Glocke von Echinorhynchus haeruca, polymorphus, globulosus, strumosus und einer neuen, 8—14 mm langen, mit einem 8 Längsreihen von Haken tragenden Rostellum versehenen Art aus Spermophilus citillus. Der Eileiter ist doppelt; den Fundus der Glocke, des muskulösen Schluckapparates, bilden die grossen Glockenschlundzellen, welche die beiden Leitungsröhren bilden und Glockenschlundgänge genannt werden; sie führen von der Glocke in den Uterus oder Eileiter, dessen Ende die Vagina bildet und stehen dorsal durch je eine Oeffnung mit der Leibeshöhle in Verbindung; die Glocke ist muskulös und aussen von einem Sphincter umgeben. P. Knüpfner. *Beitrag zur Anatomie des Ausführungsganges der weiblichen Geschlechtsproducte einiger Acanthocephalen*. Mém. Acad. Imp. sc. St. Petersbourg, t. XXXVI, 1888, No. 12, pag. 1—18, tab. I—II.

Grossi und Calandruccio berichten über einen im Menschen parasitirenden Echinorhynchus, dessen Zwischenwirth eine Blaps ist. Echinorhynchus moniliformis Brems., früher in Arvicola arvalis und Cricetus vulgaris gefunden, lebt in Sicilien auch in Mus decumanus und Myoxus quercinus, wenigstens ist die Identität mit Ech. moniliformis sehr wahrscheinlich; das Rostellum hat Haken in 15 Quer- und 14 Längsreihen. Die Larve lebt, oft sehr zahlreich, encystirt in Blaps mucronata Latr. Calandruccio verschluckte zahlreiche dieser Larven und entleerte nach 3 Wochen 53 erwachsene Echinorhynchen; ein Fütterungsversuch bei einer Ratte war ebenfalls erfolgreich. (Die Sicilianerinnen, welche Blaps-Larven als Schönheitsmittel essen, sollen viel an diesem Echinorhynchus leiden). B. Grassi und S. Calan-

druccio. Ueber einen Echinorhynchus, welcher auch im Menschen parasitirt und dessen Zwischenwirth ein Blaps ist. Centralbl. für Bact. u. Parask. II. Jahrg., Bd. III, Jena 1888, No. 17, pag. 521—525.

Leidy findet in allen Exemplaren der Terrapin (welche Schildkröte gemeint ist, lässt Verf. rathen) *Echinorhynchus hamulatus* (l. c.), ferner *Echinorhynchus proteus* im Darm vom Striped Bass (*Labrax lineatus*) (l. c.).

Trematoden.

Monticelli giebt eine schätzenswerthe Uebersicht über die Anatomie und Entwicklungsgeschichte der gesammten bis jetzt bekannten Trematoden und bespricht dabei die Körperform und die Bewegungen, die Cuticulaergebilde, das Muskelsystem, das Parenchym, die Verdauungsorgane, das excretorische Gefäßsystem mit den Wimpertrichtern, das Nervensystem, die Geschlechtsorgane, die Embryologie, die embryonale und die postembryonale Entwicklung und die systematische Eintheilung. Einen Auszug des Inhalts zu geben ist nicht gut möglich und müssen wir uns auf einige kurze Notizen beschränken. Der Laurer'sche Canal der digenetischen Trematoden ist morphologisch der Vagina der monogenetischen gleichzusetzen; er ist ein sehr zurückgebildetes Organ von zweifelhafter Function; mit Recht hält Verf. es für unnöthig und unzweckmässig, für Larvenformen, deren Zugehörigkeit zu bekannten Gattungen man kennt, neue Gattungsnamen zu schaffen, wie es noch in letzter Zeit bei Cestodenlarven geschehen ist. *Nitzschia*, *Epibdella*, *Phyllonella*, *Placunella* und *Encotyllabe* mit *Tristomum* zu vereinigen, wie Taschenberg es will, hält Verf. nicht für richtig; den älteren Namen *Phylline* ersetzt Verf. mit Unrecht durch den jüngeren *Epibdella*, ebenso *Gynaecophorus* (1858) durch *Bilharzia* (1872); *Benedenia* ist ganz gleichbedeutend mit *Phylline*. *Microbothrium apiculatum* Olsson wird identisch sein mit *Pseudocotyle squatinae* Hesse und van Bened., *Echinella* und *Pteronella* sind nicht gleichbedeutend mit *Udonella*; *Temnocephala* rechnet Verf. nach dem Vorgange von Haswell zu den Trematoden; *Eurycoelum Brock* ist ein *Distomum*.

Die Eintheilung der gesammten Trematoden ist folgende:

- I. Monogena. 1. Familie *Tristomeae*. 1. Subfamilie *Tristomidae*.
 Gen. *Nitzschia*, *Epibdella* (*Phylline*), *Phyllonella*, *Trochopus*,
Placunella, *Tristomum*, *Acanthocotyle* n. gen., männliche
 Geschlechtsöffnung in der Mitte, weibliche an der rechten
 Seite.
2. Subfam. *Encotyllabidae*.
 Gen. *Encotyllabe*.
3. Subfam. *Monocotylidae*.
 Gen. *Pseudocotyle*, *Callicotyle*, *Monocotyle*.
4. Subfam. *Udonellidae*.
 Gen. *Udonella*, *Echinella*, *Pteronella*.

2. Familie Temnocephaleae.

Gen. Temnocephala.

3. Familie Polystomeae.

1. Subfam. Octocotylidae.

Gen. Octocotyle (Subgen. Octocotyle, Glossocotyle, Ophicotyle, Choricotyle, Dactycotyle, Pterocotyle), Pleurocotyle, Diplozoon, Anthocotyle, Phyllocotyle, Hexacotyle, Platycotyle, Plectanocotyle.

2. Subfam. Polystomidae.

Gen. Polystomum, Erpocotyle, Onchocotyle, Diplobothrium, Sphyranura.

3. Subfam. Microcotylidae.

Gen. Microcotyle, Axine, Gastrocotyle.

4. Subfam. Gyrodactylidae.

Gen. Calceostoma, Tetraonchus, Dactylogrus, Gyrodactylus, Diplectanum.

II. Digena. 1. Familie Amphistomeae. 1. Subfam. Amphistomidae.

Gen. Amphistomum, Gastrothylax, Diplodiscus, Gastodiscus, Homalogaster.

2. Subfam. Aspidobothridae.

Gen. Aspidogaster.

2. Familie Diplostomeae.

1. Subfam. Diplostomidae.

Gen. Diplostomum, Holostomum.

2. Subfam. Polycotylidae.

Gen. Polycotyle.

3. Familie Distomeae.

1. Subfam. Distomidae.

Gen. Cephalogonimus, Urogonimus n. gen., Geschlechtsöffnungen am Körperende; Distomum, Rhopalophorus, Mesogonimus n. gen., Geschlechtsöffnungen hinter dem Bauchsaugnapf; Bilharzia (Gynaecophorus).

2. Subfam. Gasterostomidae.

Gen. Gasterostomum.

4. Familie Monostomeae.

1. Subfam. Monostomidae.

Gen. Monostomum, Notocotyle, Opisthotrema.

2. Subfam. Didymozoonidae.

Gen. Didymozoon, Nematobothrium.

Ein vollständiges Litteratur-Verzeichniss beschliesst die dankenswerthe Arbeit. *F. L. Monticelli. Saggio di una morfologia dei Trematodi. Napoli 1888, 130 pag.*

Brandes behandelt in eingehender Weise die Familie der Holostomeen, welche aus den Gattungen Diplostomum, Polycotyle, Hemistomum und Holostomum besteht; der Arbeit soll bald eine zweite mit Abbildungen versehene Ausgabe folgen. Nach einer historischen Einleitung bespricht Verf. die Körperform, das Verdauungssystem, das Geschlechtssystem, das Wassergefäßsystem und die Entwicklungsgeschichte. Die bisher als Bauchseite aufgefasste Fläche ist in Wirklichkeit die Rückenseite. Nicht nur die bisher zu Tetracotyle gestellten Formen, sondern auch Codonocephalus Diesing, alle v. Nordmann'schen Diplostomum-Formen, Tylodelphys

und Heptastomum Diesing's und Schomburgk's, Monocerca Heterobranchi Wedl's und Holostomum musculicola Waldenburg's sind als Larven hierher zu ziehen. Stets ist ein Mund- und Bauchsaugnapf vorhanden, ausserdem aber vorn ein eigenthümlicher Haftapparat; der Körper ist durch eine Ringfurche in einen vorderen und hinteren Theil geschieden. Im vorderen Drittel des hinteren Körpertheils liegt das Ovarium; dahinter finden sich die beiden Hoden; der Oviduct lässt den Laurer'schen Kanal nach der Rückenseite austreten; am hinteren Körperende liegt der Geschlechtskegel, den der Uterus durchsetzt; am Grunde des Geschlechtskegels mündet in den Uterus die Samenblase. Im vorderen Körpertheil liegt ein Drüsenzapfen, in den Drüenschläuche einmünden; er wird von den Seitenlamellen tutenförmig umhüllt. Der Körper ist über die Rückenfläche zusammengekrümmt. Bei Diplostomum ist der hintere Körpertheil abgeflacht und der Haftapparat besteht in einer mit Papillen ausgekleideten Höhlung; bei Hemistomum sind die Seitenwände des flachen Vorderkörpers stark nach der Bauchseite hin eingerollt und der Haftapparat wird von einem compacten Zapfen gebildet; Polycotyle zeigt saugnapfartige Gebilde auf dem Rücken und bei Holostomum sind die lamellosen Seitenwände des Vorderkörpers verschmolzen, so dass ein Becher gebildet wird, in dem ein conischer Zapfen mit tiefer Centralhöhle steht. Folgende Arten beschreibt Verf. z. Th. als neu; Diplostomum spathula (= Hemistomum spathula) aus dem Darm von Falco palumbarius; Diplostomum spathulaeforme aus dem Darm von Strix otus, wahrscheinlich aus Tetracotyle Colubri erzogen; Diplostomum abbreviatum aus Crocodilus; Diplostomum pseudostomum Poirier = Distoma pseudostomum von Willemoes-Suhm; Diplostomum longum aus Crocodilus; Diplostomum bifurcatum = Distoma bifurcatum Wedl.; Hemistomum pileatum = Holostomum erraticum von Linstow aus Sterna caspica, Larus glaucus, Colymbus arcticus und Mergus merganser; Hemistomum ellipticum aus Piaya cyanea, Holostomum vaginatum aus Cathartes spec.?, Holostomum bursigerum = Holostomum longicollis aus Larus ridibundus, Holostomum sphaerocephalum Dies. = Amphistomum sphaerocephalum Westr. = Holostomum Westrumi Cobbold; Holostomum eustemma = Eustemma caryophyllum Dies., Holostomum cruciforme scheint Holostomum sphaerula aus Oriolus cristatus gleich zu sein; Holostomum cinctum aus Ardea spec.?, Holostomum bulbosum aus dem Datum von Geronticus albicollis und Nauclerus furcatus, Holostomum ellipticum aus Bubo magellanicus, Holostomum megaloccephalum aus Stomias spec.?, Holostomum lagena Molin ist wahrscheinlich gleichbedeutend mit Holostomum variabile aus Strix passerina. G. Brandes. Ueber das Genus Holostomum Nitzsch. Zoolog. Anz., IV. Jahrg., Leipzig 1888, No. 285, pag. 424—426. Die Familie der Holostomeae, ein Prodrömus zu einer Monographie derselben, Leipzig 1888.

Hoyle giebt eine Uebersicht über die Anatomie und die Entwicklungsgeschichte von Distomum hepaticum im besonderen und

eine Systematik der Trematoden und eine Schilderung ihres Baues und ihrer Fortpflanzung im allgemeinen; weil der Ruderschwanz einer von Fewkes beschriebenen frei im Meere schwimmenden Cercarie in Ringen angeordnete Borsten zeigt, glaubt Verf. hieraus eine Verwandtschaft der Trematoden mit den Anneliden erkennen zu können. *W. E. Hoyle. General sketch of the Trematoda. Edinburgh. 1888, 19 pg., 4 pltes.*

Pachinger studirt die Anatomie von *Distomum clavigerum*, *cylindraceum*, *cynoides*, *hepaticum* und *lanceolatum*, und findet, dass die Flimmertrichter nicht wandungslose Lücken in den Körpergeweben sind, sondern kleine Bläschen darstellen, in deren Wandungen Fasern sichtbar sind. Die als Protoplasmafortsätze bezeichneten Ausläufer sind feine Capillarröhrchen; in den mit ihnen in Verbindung stehenden Lacunen finden sich einzeln stehende Flimmerhaare. Die Excretionsgefässe haben kein Endothel und keine Drüsenzellen, sehr zahlreiche Capillaren aber münden in sie hinein; das Grundgewebe ist eine strukturlose Gallertmasse. *Distomum clavigerum* hat auffallend grosse Centralganglien, von jedem, durch eine Commissur verbunden, gehen 3 starke Längsnerven nach hinten, von denen der äussere sich jederseits im hinteren Körperdrittel gabelt und sich an das Ende des Darms legt. In Bezug auf die Art der Begattung folgt Verf. der Anschauung Sommer's; Verf. findet in beiden Arten ein eiförmiges Organ, das mit dem Ovarium in Verbindung steht und Uterus genannt wird; in demselben soll die Befruchtung der Eier stattfinden. Die Darmepithelzellen senden Pseudopodien aus. Der Laurer'sche Kanal kann als Begattungsorgan nicht dienen, befindet sich Sperma in ihm, so ist es vom Uterus aus hineingelangt. *D. cylindraceum* hat keine Schalendrüse (nicht richtig, Ref.), aber Zellen von der Innenwand des Oviducts lösen sich von der Wandung ab, bersten und liefern so den Stoff zu den Eischalen. *A. Pachinger. Negyedik hőzlemény béhaink pazitaihoz s újabb adatok a Trematodák boncz-és élettanához. Orv. Term. tud. Ertesítő. Neuere Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Trematoden. (Ungarisch u. deutsch). Klausenburg 1888, 18 pg., 2 Tfn.*

Stossich beschreibt ausser mehreren bekannten Arten als neu *Distomum polyorchis* aus dem Darm von *Corvina nigra*, *Distomum Brusinae* aus der Cloake von *Oblata melanura*, *Distomum albocoeruleum* aus *Sargus Salviani*, *Distomum Giardii* aus dem Darm von *Naucrates ductor*, *Distomum Carolinae* aus dem Darm von *Alosa finta*, *Distomum tergestinum* aus den Append. pylor. von *Oblata melanura* und *Distomum micracanthum* aus dem Darm von *Pagellus erythrinus*. *M. Stossich. Appendice al mio lavoro. „J. Distomi dei pesci marini e d'acqua dolce“. Programm. Ginnasio comm. sup. Trieste, ann. XXV, 1888.*

Lopez beschreibt als neu *Distomum Richiardii*, ein *Distomum* von 18 mm Länge und 13,5 mm Breite mit grossem Bauchsaugnapf aus *Acanthias vulgaris*. *C. Lopez. Un Distoma pro-*

babilmente nuovo. Atti soc. Toscana sc. natur. process. verbal. Pisa, Luglio 1888, vol. VI, pag. 137—138.

Leidy findet im Darm von *Fiber zibethicus* (Muskrat) *Distomum echinatum*, wahrscheinlich aus Enten stammend, also als Pseudoparasit, da Enten von *Fiber* gefressen werden; ferner *Amphistomum subtriquetrum*, das auch in *Castor fiber* vorkommt (*l. c.*). Ferner entdeckt Verf. im Terrapin, einer Schildkröte, vielleicht *Terrapena carinata* Latr. im Darm *Amphistomum grande*, in der Harnblase *Polystomum oblongum*, dem von Wright in *Aromochelys odoratus* gefundenen ähnlich; im Schlund und in der Nase *Polystomum ocellatum*, das als *Polystomum coronatum* n. sp. beschrieben wird (*l. c.*). An den Kiemen und im Pharynx von *Labrax lineatus* (Rock fish) lebt nach demselben Verf. *Distomum galactosomum* n. sp., es ist 8—12 mm lang und 2 mm breit, der Bauchsaugnapf ist etwas grösser als der Mundsaugnapf (*l. c.*).

Nach **de Magalhães** waren 3 Enten unter den Erscheinungen der Erstickung gestorben und beherbergten in der Trachea und den Bronchien zahlreiche Monostomen von 12 mm Länge und 5 mm Breite; die 0,1 mm langen und 0,065 mm breiten Eier enthielten einen bereits entwickelten Embryo mit schwarzen Augenflecken (ähnlich wie bei *Monostomum mutabile* und *nigropunctatum* Ref.) *l. c. pag. 12—19. fig. 1—5.*

Fritsch bespricht *Gynaecophorus haematobius* und meint, die Infektionsquelle werde unreines Trinkwasser sein; das Weibchen trägt auf seiner Körperoberfläche feine, cylindrische Stacheln, die von hinten nach vorn gerichtet sind; dicht über dem Bauchsaugnapf theilt sich der Darm in 2 Schenkel, und an der Grenze zwischen dem 1. und 2. Körperviertel vereinigen sie sich wieder zu einem Rohre, das hinten im Körper blind endigt. Hinter dem Bauchsaugnapf liegt die Vulva und der Eileiter geht etwa 0,6 mm von ersterem in die birnförmige Schalendrüse über, in deren Hohlraum ein Ei Platz findet. Das Ovarium liegt unmittelbar hinter dem Wiedervereinigungspunkt der Darmschenkel, die Dotterstöcke sind mächtig entwickelt und um den unpaaren Darmtract gelagert; die beiden Hauptstämme des Excretions-Apparates vereinigen sich unterhalb des Darmblindsackes, der hinten in einen Porus excretorius ausmündet. Der Hautmuskelschlauch wird in der hinteren Körperhälfte mächtiger, Ringmuskeln sind nirgends deutlich, der unpaare Darmtract hat muskulöse Ringfasern und das Epithel zeigt körnige Protoplasma-Fädchen; die Eier tragen einen Seiten-, selten einen Endstachel. Beim Männchen fehlen an der eingerollten Bauchseite, dem *Canalis gynaecophorus*, die Stacheln; der Darm verhält sich ähnlich wie beim Weibchen; die Mündung des Samenleiters liegt nicht am Rande des Bauchsaugnapfes, sondern in der Tiefe des Anfangsstückes des *Canalis gynaecophorus*; Begattungsorgane fehlen. Der mit 5 Ausstülpungen versehene Hoden ist, wie die weibliche Keimdrüse, sackförmig. Die Samenblase ist eine seitliche Ausbuchtung des Hodenausmündungsganges. Die Cuticula zeigt warzenförmige Erhebungen;

auch beim Männchen fehlen Ringmuskeln, dagegen sind die Dorso-ventralmuskeln stark entwickelt; das Weibchen ist in der Regel viel länger und schlanker als das Männchen. *Fritsch. Zur Anatomie v. Bilharzia haematobia. Arch. f. microscop. Anat., Bd. 31, Bonn 1888, Heft II, pag. 293—302, 2 Tfn.*

Nach **Grassi** und **Rovelli** findet sich *Bilharzia crassa* bei 75 Procent aller Rinder bei Catania auf Sicilien, ist also nicht auf Afrika beschränkt. *G. B. Grassi und G. Rovelli. La Bilharzia in Sicilia. Atti Accad. Lincei Rendicont., ser. 4, vol. IV, fasc. 3, Roma 1888, pag. 799.*

S. auch **J. A. Nunn. The Bilharzia haematobia. Veterinary Journ. 1888, pag. 407—410.**

Zeller schildert den Geschlechtsapparat von *Diplozoon paradoxum* und giebt an, dass die Anordnung desselben dem bei den übrigen Trematoden vorkommenden Typus gleicht, jedoch ist nur ein Hoden vorhanden und der Dottergang schwillt an seinem Ende zu einem grossen Dottersack an; der Laurer'sche Canal mündet nicht auf der Rückenfläche, sondern neben der männlichen Geschlechtsöffnung und entspringt von dem Canal, welcher Dottersack und Ovarium verbindet; er wurde mit Samen gefüllt gefunden; die Begattung ist eine gegenseitige und hält Verf. an der Meinung fest, dass der Laurer'sche Canal als Vagina functionirt; ein Cirrus und eine Schakendrüse fehlen hier. *E. Zeller. Ueber den Geschlechtsapparat von Diplozoon paradoxum. Zeitschr. für wissensch. Zoolog. Bd. XLVI, Leipzig 1888, Heft 2, pag. 233—237, tab. XIX.*

Voeltzkow studirt die Lebensgeschichte und den Bau von *Aspidogaster conchicola*, der im Herzbeutel, der Niere und dem rothbraunen Organ von *Anodonta* und *Unio*, meistens zu 4—6 Exemplaren bei einander lebt, aber niemals in der Leber. Die ovale Saugscheibe ist durch 3 Längsleisten in 4 Reihen rechteckiger Fächer getheilt; in einer 1 procentigen Salzlösung leben sie 4—5 Wochen. Die structurlose Cuticula ist ungemein dünn, darunter folgt eine dickere Subcuticula, unter dieser liegt eine Ring-, eine Längs- und wieder eine Ringfaserschicht. Ein Septum scheidet den Körper in einen oberen und einen unteren Theil; im oberen liegen der Verdauungsapparat, Begattungsorgane und Dotterstöcke, im unteren Hoden, Ovarium und Dotterblase. Das Körperparenchym wird durch grosse, blasige Zellen gebildet, welche ovale Kerne zeigen; ausserdem finden sich spindelförmige, durch Ausläufer unter einander anastomosirende Zellen mit körnigem Protoplasma, Kern und Kernkörperchen. Der Verdauungsapparat besteht aus Mund, Schlundkopf und Darm; ersterer zeigt eine Ober- und eine Unterlippe; der Schlundkopf ist muskulös, er kann in den Mundsaugnapf vorgestossen werden und ist von traubigen Speicheldrüsen eingefasst. Der Darm endet blindsackartig und hat an der Innenwand flaschen- oder pallisadenförmige, lange Zellen, die in das Lumen hineinragen und an ihrer Spitze ein oder mehrere lichtbrechende Kügelchen tragen, die Fetttröpfchen sind und von der aufgenommenen Nahrung

herführen. Das Gefäßsystem besteht aus dem Expulsionsschlauch mit der Endblase und dem nach aussen führenden Porus, den zuleitenden, flimmernden Gefässen mit dem nicht flimmernden Verbindungsstück und den Capillaren, die in die Enden der flimmernden Gefässe münden. Zwei grosse Expulsionsschläuche verlaufen an der Bauchseite innerhalb der Bauchscheibe, um hinten in einen gemeinsamen, becherförmigen Hohlraum zu münden. Der Schlauch hat starke äussere Ring- und schwache innere Längsmuskeln und zeigt regelmässige Pulsationen; in das Vorderende jedes Schlauches inserirt sich ein stark geschlängeltes, nicht flimmerndes Gefäss, das nach vorn läuft, dort nach hinten umbiegt und nun Flimmerung zeigt und sich stark verästelt; der linke Stamm tritt an die Geschlechtsorgane und den Bauchsaugnapf, der rechte an den Darm und die Rückenseite; Flimmertrichter wurden nicht gefunden. Das Centralnervensystem besteht aus einem schmalen, dem vorderen Ende des Pharynx aufliegenden Bande, von dem nach vorn jederseits ein Nervenstrang zum Mundnapf, nach hinten jederseits ein starker Nerv in die Saugscheibe tritt; nach unten geht links und rechts ein Strang ab, der sich um den Pharynx legt, jedoch ohne sich mit dem der anderen Seite zu einem Ring zu verbinden.

Am Rande der Saugscheibe liegen, entsprechend den Einkerbungen, becherförmige Organe, welche Tastorgane zu sein scheinen und vorgestülpt und durch einen Musculus retractor zurückgezogen werden; in der Bauchscheibe liegen ausserdem flache, drüsige Gebilde dicht unter der Haut, vielleicht Schleimdrüsen. In der Haut finden sich überall, besonders vorn, flaschenförmige, einzellige Hautdrüsen und runde oder ovale Zellen. Die weiblichen Geschlechtsorgane bestehen aus Ovarium, Eileiter und Vulva, Dotterstöcken und Dotterbehälter. Hinter dem Eierstock liegt der Hoden; ausserdem findet sich ein Vas deferens und ein Penis mit Vesicula seminalis. Die Tuba, ein gefächerter Gang, führt vom Ovarium in einen Ootyp genannten Raum; hier setzt sich der stark flimmernde Eiergang an, welcher den gemeinschaftlichen Dottergang aufnimmt; die Dotterstöcke münden in 2 Dottergänge, welche in einen gemeinschaftlichen Dotterbehälter führen. Die Vulva findet sich vor dem Vorderende der Bauchscheibe an der Bauchseite unter dem Penis. Der nierenförmige Hoden liegt an der Bauchseite hinter dem Ovarium, von ihm geht nach oben und vorn das Vas deferens ab, welches in die Vesicula seminalis mündet, die sich an den Sack des Penis heftet. Letzterer ist muskulös und hat an seiner Wurzel einen starken Bulbus, einen in der Achse durchbohrten, eiförmigen Muskelapparat mit strahlenförmigen Scheidewänden; der Penis kann vorgestülpt werden wie der Finger eines Handschuhs; um seine hintere Hälfte legt sich eine als Prostata bezeichnete Drüsenmasse. Die Dotterstöcke liegen zu jeder Seite des Darmes; die Dotterblase hat eine eigenthümliche, rhythmische Bewegung. Von dem flimmernden Eileiter geht an der Strecke zwischen dem Ovarium und der Einmündungsstelle des Dotterganges ein Kanal ab, der ganz bis an

das hintere Körperende führt und hier in ein birnförmiges Dotterreservoir, ein Receptaculum vitelli führt. Ein inneres Vas deferens oder V. d. posterior giebt es nicht und eine innere Befruchtung findet nicht statt. Das erweiterte Ende des Ausführungsganges des Receptaculum vitelli, wo es in den Eileiter mündet, hat stark flimmernde Wandungen und wird als das bereits erwähnte Ootyp bezeichnet. Die männlichen Geschlechtsorgane reifen vor den weiblichen und die Befruchtung geht in der Weise vor sich, dass der biegsame Penis in die weibliche Geschlechtsöffnung eingestülpt wird, was Verf. mehrmals beobachtete. Im Ootyp werden die Eier befruchtet; die Wandung des Eileiters fungirt als Schalendrüse; die Embryonalentwicklung im Ei geht im Körper des Thieres vor sich; sie beginnt mit einer totalen Furchung; eine Zelle umwächst den ganzen Eihalt als Hüllmembran, die in der Schale zurückbleibt; man bemerkt an dem jungen Thiere Mund- und Bauchsaugnapf, den Schlundkopf, den Darm und ein Ursecretionsorgan, das anfangs aus 2 stark lichtbrechenden Concretionen besteht, an die sich später jederseits ein Expulsionsschlauch setzt. Die Einwanderung in die Muscheln geschieht wahrscheinlich durch den Darm. Penis, Vulva und Receptaculum vitelli werden vom Ectoblast, Hoden und Ovarium vom Mesoblast gebildet. An dem jungen Saugnapf bilden sich erst Querleisten, dann die mittlern, hierauf die äusseren Längsleisten.

Bei *Aspidogaster limacoides* ist der Hals kürzer und dicker als bei *A. conchicola*, der $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{6}$ der ganzen Körperlänge einnimmt; die Saugnäpfe sind breiter, die Tastorgane in der Saugscheibe stärker entwickelt; die Geschlechtsöffnung liegt weiter vorn und mündet vor dem Schlundkopf; der Hinterleib ist kegelförmig erhaben und von der Saugscheibe scharf abgesetzt. *A. Voeltzkow. Aspidogaster conchicola. Arbeiten des zootom. Inst. Würzburg, Bd. VIII, Wiesbaden 1888, Heft 3, pag. 249—289, tab. XV—XX. Aspidogaster limacoides, ibid. pag. 291—293.*

v. **Daday** findet im Golf von Neapel eine freischwimmende Cercaria, eine Distomumlarve mit 2 Augenflecken, welche als *Histrio-nella setosicauda* n. sp. bezeichnet wird. Der dünne, cylindrische Schwanz ist etwa dreimal so gross wie der Körper und ausgezeichnet durch 24 Reihen von Borsten, welche aus Gruppen von je 6 Borsten bestehen; der Körper ist 0,5—0,6 mm lang und 0,28—0,3 mm breit; der Schwanz misst 1,5—1,7 mm bei einer Breite von 0,008—0,1 mm; die Form wird mit *Cercaria setifera*, *Histrio-nella echinocerca* und *Histrio-nella elegans* verglichen und ist am nächsten mit der letztgenannten Art verwandt. *E. v. Daday. Eine neue Carcarienform aus dem Golfe von Neapel. Termesz. Füzetek. Bd. XI, Budapest 1888, No. 2, pag. 107—109, tab. III, Fig. 12 u. 13. (Deutsch u. ungarisch).*

Monticelli beobachtete an den Eiern eines Teleosteers, wahrscheinlich von *Scorpaena*, eingekapselte Cercarien und beschreibt die Art und Weise der Schwimmbewegungen derjenigen, die ihren Schwanz noch nicht verloren hatten; letzterer war mit Borsten besetzt, die wie kleine Ruder wirkten. An der Oberfläche des Wassers im

Aquarium der zoologischen Station zu Neapel schwimmende Cercarien waren mit dem Schwanzende in einander verwickelt, das auch mit kleinen Borsten besetzt war, so dass die Thiere gewissermassen einen Rattenkönig (re di topi) bildeten; die Form wird *Cercaria Clausii* benannt; der Bauchsaugnapf ist kleiner als der Mundsaugnapf und vorn stehen 2 Augenflecken. *F. S. Monticelli. Breve nota preliminare sulla Cercaria setifera Müller. Bollet. soc. natur. Napoli, ser. 1, vol. II, Napoli 1888, fasc. II.*

Cestoden.

Zschokke beschreibt als neu *Taenia argentina* aus *Rhea americana* und findet, dass die Art unbewaffnet ist, am Scolex aber einen fünften, scheitelständigen Saugnapf hat. In der subcuticularen Zellschicht liegen lange, schlanke, flaschenförmige Elemente von granulösem Inhalt; man findet Längs-, Transversal- und Dorsal-ventral-Muskeln; die Gliederkette durchziehen 4 Hauptstämme des Gefässsystems; am Grunde des Frontalsaugnapfes werden sie durch eine Ringcommissur verbunden, und die beiden dorsalen Stämme verschwinden schon im ersten Viertel des Körpers, während die ventralen am Hinterende jedes Gliedes durch eine Quercommissur verbunden werden und im letzten Gliede sich zu einem durch einen Porus nach aussen mündenden Gang vereinigen. Die beiden Längsstämme des Nervensystems bilden dicht unter dem Frontalsaugnapf eine starke Quercommissur. Der Cirrus kann handschuhfingerartig aus seiner Tasche vorgestülpt werden; er ist ein selbstständiges Organ und trägt in vorgestrecktem Zustande die cilientragende Innenfläche aussen; ein Eindringen in die Vagina ist leicht möglich. In jeder Proglottide findet sich nur ein grosser Hoden; die Kalkkörperchen umgeben denselben dicht und in regelmässigen Lagen. Der Keimstock ist doppelt, fächerartig verbreitert und der Dotterstock quer am Hinterende der Proglottide. *P. Zschokke. Ein Beitrag zur Kenntniss der Vogeltänien. Centralbl. für Bact. u. Parasit. 2 Jahrg., Bd. III, Jena 1888, No. 1, pag. 2—6; No. 2, pag. 41—46.*

Béranger-Féraud bespricht in ausführlicher Weise die Tänien des Menschen vom clinischen Standpunkt aus. *L. J. B. Béranger-Féraud. Leçons cliniques sur les Ténias de l'homme. Paris 1888, 384 pg.*

Nach **Grassi** ist *Pulex serraticeps* der gewöhnliche Zwischenwirth von *Taenia cucumerina* = *elliptica*; der *Cysticercus* ist derselbe, welcher in *Trichodectes* gefunden wurde; bis zu 50 leben in der Leibeshöhle, wurden aber nie in Flohlarven gefunden; Fütterungsversuche mit *Cysticercen* enthaltenden Flöhen gelangen fast immer (*l. c.*).

Grassi und **Rovelli** finden, dass die Eier von *Taenia proglottina* *Dav.* sich in 20 Tagen in *Limax cinereus* zu *Cysticercoiden* entwickeln, die sich im Hühnerdarm wieder zur Tänie umwandeln.

Finnen von *Bothriocephalus latus* des Barsches entwickeln sich im Menschendarm. Ein 10 Tage alter Hund wurde mit Eiern von *Taenia elliptica* gefüttert und 85 Stunden darauf fanden sich 5 einen halben Centim. lange Exemplare von *Taenia elliptica* im Darm. *B. Grassi und G. Rovelli. Bandwürmerentwicklung. Centralblatt für Bact. u. Parask. II. Jahrg., Bd. III, Jena 1888, pag. 173—174.*

Dieselben Verf. beobachten, dass der Embryo von *Taenia elliptica* sich in *Pulex* in eine Blase, *lacuna primitiva* genannt, verwandelt; der vordere Theil derselben wird zum Rostellum, zu den Saugnäpfen und dem Körper des *Cysticercoiden*, der hintere zum Schwanz mit den Haken; das Rostellum entwickelt sich aus einer vorderen Einstülpung; bald bildet sich ein Excretionsgefässsystem mit Wimpertrichtern; *Cysticercus Taeniae murinae*, *T. leptocephalae* und zweier unbestimmter Tänien werden ebenfalls auf ihre Entwicklung studirt. Die *Lacuna primitiva* ist bei den *Cysticercoiden virtual*, bei den *Cysticercen real*. *B. Grassi und R. Rovelli. Intorno allo sviluppo dei Cestodi. Atti Accad. Lincei, Rendiconti, anno 285, vol. IV, ser. 4, Roma 1888, fasc. 12, pag. 700—702.*

Grassi und Calandruccio meinen, dass *Taenia elliptica* sich im Hunde direct ohne Zwischenwirth aus den Eiern entwickeln könne. *B. Grassi und S. Calandruccio. Bandwürmerentwicklung. Centralbl. für Bact. u. Parask. 2. Jahrg., Bd. III, No. 6, pag. 174.*

Auch **Sonsino** findet, dass ausser *Trichodectes latus* auch *Pulex serraticeps* der Zwischenwirth von *Taenia cucumerina* ist; da die Eier etwa 4—6 mal grösser sind als das Lumen des Saugrüssels des Floh's, so meint Verf., die Aufnahme der Eier müsse im Larvenstadium des Floh's vor sich gehen. *l. c. pag. 44—47.*

Lutz meint, dass die Uebertragung von *Taenia elliptica* nicht nothwendig durch den Zwischenwirth *Trichodectes* zu erfolgen brauche; eine directe Entwicklung finde wohl bei Tänien nicht statt, doch könne der *cysticercoid*e Zustand in dem definitiven Wirth durchgemacht werden. Damit will Verf. Leuckart's Beobachtung nicht anfechten, sondern nur die angegebene Möglichkeit offen lassen, wie sie bei *Taenia nana* angeführt wird; eine directe Entwicklung, ohne dass die Eier den Darm verlassen hätten, nimmt Verf. nicht an. *A. Lutz. Zur Frage der Uebertragung von Taenia elliptica. Centralbl. für Bact. u. Parask., 2. Jahrg., Bd. III, Jena 1888, No. 16, pag. 489 bis 490.*

Nach **Brandt** beherbergte ein 14jähriger Bauernknabe in Russland 48 Exemplare von *Taenia cucumerina*, der viel mit einem reichlich mit *Trichodectes* behafteten Hunde gespielt hatte; dasselbe gilt von einem 8jährigen Mädchen, das 30 Tänien entleerte; in den Kopfharen des Kindes wurden zwei *Trichodectes* gefunden. *E. Brandt. Zwei Fälle von Taenia cucumerina beim Menschen. Zoolog. Anz. XI. Jahrg., Leipzig 1888, No. 287, pag. 481—484.*

Bieler findet, dass *Taenia elliptica* in Exemplaren von nur 5—6 mm Länge massenhaft im Magen der Hunde vorkomme und macht dazu die Bemerkung, dass die Larven dieser Tänie in der

Leber der „Schweine und anderer Thiere“ lebe (!). Archives sc. phys. et nat., 3. sér., t. 19, Genève 1888, No. 6, pag. 558—559.

S. auch P. Grassi. *La pulce del cane (Pulex serraticeps Gervais) è l'ordinario ospite intermedio della Taenia cucumerina. Nota preventiva, Catania, 16. Genn. 1888.* W. S. Gotthell. *Note of Taenia elliptica. Journ. Comp. Medic. and Surg.*, vol. 9, No. 2, pag. 126—127. F. Krüger. *Taenia cucumerina s. elliptica beim Menschen. St. Petersburg. med. Wochenschr.* 1887, No. 41. Ein 16 Monate altes Kind in Dorpat beherbergte 4 Exemplare.

Tuckermann beobachtet ein Exemplar von *Taenia saginata*, das die ungewöhnliche Länge von 7,655 Metern hatte; es bestand aus 1061 Proglottiden, welche verschiedene Abnormitäten zeigten, so hatte eine derselben 2 Genitalöffnungen, an jeder Seite eine, 6 auf einander folgende hatten Genitalöffnungen an derselben Seite; es fanden sich eingeschaltete Proglottiden, andere zeigten seitliche Ausbuchtungen am einen Rande. In einem anderen Falle fanden sich flaschenförmige Proglottiden, auch hier wieder eingeschaltete von herzförmiger Gestalt, welche den gegenüberliegenden Rand nicht erreichten, Trennungen in der Längsachse, Abzweigungen im rechten Winkel zur Längsachse. F. Tuckermann. *An interesting specimen of Taenia saginata. Zool. Anz. XI. Jahrg., Leipzig 1888, No. 272, pag. 94—95. Supplementary note on Taenia saginata. ibid. No. 287, pag. 374—375.*

Danysz beobachtete ein Exemplar von *Taenia saginata*, dessen Cuticula an einzelnen Stellen aufgetrieben und fettig degenerirt war; dadurch war sie von der sie ernährenden Unterlage getrennt; sie degenerirte, wurde vom Darmsaft aufgelöst und die darunter folgenden Schichten erlagen alsdann der Digestion bis zur Perforation des Gliedes, welche noch zu Lebzeiten der Tänie erfolgt. J. Danysz. *Recherches sur un Taenia fenêtré. Journ. Anat. et Phys.* 1888, No. 5, pag. 518—524, pl. XVII.

Auch Blanc bespricht perforirte Glieder von *Taenia saginata* und *Bothriocephalus latus*; die Perforation soll von Veränderungen der Rindenschicht herrühren, so dass hier eine partielle Verdauung durch den Darmsaft eintritt. H. Blanc. *Arch. sc. phys. et natur.*, 3. ser., t. 20, Genève 1888, Nr. 10, pag. 347—348. *Bullet. soc. Vaud. sc. natur.* 3. sér., vol. 24, No. 98, pag. 9—16.

Siehe auch E. Perroncito e P. Airoidi. *Caso di tenie medio-canellata e di molte tenie nane in un bambino di 6 anni. Gazz. d. ospit.* 1888, No. 70, pag. 554—555.

Moniez zeigt, dass, entgegen der Ansicht Grassi's *Taenia nana* und *Cysticercus tenebrionis* nicht als Entwicklungsstufen derselben Art zu einander gehören, dass genannter *Cysticercus* vielmehr die Larve von *Taenia microstoma* ist. Dieser und der bezeichnete *Cysticercus* führen am Scolex 30 Haken von 0,012 mm Länge, während *Taenia nana* und *murina* 24 Haken von 0,015—0,018 mm Länge besitzen; ebensowenig ist die Ansicht Grassi's richtig, dass *Taenia nana* und *murina* identisch sind. Der Embryo von *Taenia*

nana ist rund und 0,018 mm gross, der von *Taenia murina* oval 0,021 resp. 0,027 mm gross, abgesehen davon, dass letztere Tänie viel grösser ist als erstere. R. Moniez. *Sur le Taenia nana, parasite de l'homme, et sur son cysticerque supposé (Cysticercus tenebrionis)*. *Compt. rend. Acad. sc. Paris, t. CVI, 1888, No. 5, pag. 368—370*.

Ransom hat im Jahre 1854—55 in den Fäces eines Mädchens in Nottingham dieselben Tänien-Eier, wie Grassi sie bei *Taenia nana* beschreibt, gefunden. W. H. Ransom. *On the probable existence of Taenia nana as a human parasite in England*. *The Lancet, London 1888, vol. II, No. III, No. 3386, pag. 109—110*.

Siehe auch E. Comini. *Ulteriore decorso di due casi di Tenia nana*. *Gazzetta med. ital. Lombard. 1888, No. 9, pag. 81—82*.

Nach Grassi bilden *Taenia flavopunctata* Parona, *leptocephala* Crepl. und *T. diminuta* Rud. nur eine Art; die Eier sind 0,084 bis 0,086 resp. 0,070—0,078 mm gross; die Embryonalhäkchen messen 0,011 mm, die Tänie lebt in *Mus decumanus*, *alexandrinus*, *rattus* und *musculus*; am Scheitel des Scolex steht ein Rostellum, kein fünfter Saugnapf. Die von Parona kürzlich bei einem Kinde beobachtete *Taenia flavopunctata* (Parona) ist mit *T. leptocephala* identisch; vielleicht ist auch *T. flavopunctata* Weinland mit dieser Art gleichbedeutend, indessen sind hier die Eier kleiner, nach Leuckart und Weinland 0,054—0,060 mm gross, nach Leidy aber 0,072 mm. Identisch sind also *Taenia diminuta* Rud., *T. leptocephala* Duj., *T. flavopunctata* oder *varesina* Parona, vielleicht auch *T. flavopunctata* Weinland. Verf. fand in Gemeinschaft mit Rovelli mehrere Zwischenwirthe dieser Tänie, eine *Microlepidopteren*-Raupe, *Anisolabris*, *Forficula annulipes*, *Akis spinosa*, *Scaurus striatus* und erzog aus den Cysticerken die Taenie im menschlichen Darm; nach 15 Tagen zeigten sich die ersten Eier in den Fäces und auf Eingeben von Felix mas wurden zahlreiche Exemplare von *Taenia leptocephala* entleert. B. Grassi. *Taenia flavopunctata* Weinl., *Taenia leptocephala* Crepl., *Taenia diminuta* Rud. *Atti R. accad. sc. Torino, vol. 23., disp. 12, pag. 492—501, c. tav.*

Nach Leidy wurde mitten in einer Gurke, die in Salzwasser aufbewahrt war, im Staate Iowa in Nordamerika im Jahre 1876 eine Tänie gefunden, die den Haken nach zu *Taenia crassicolis* gehört (!). J. Leidy. *Reputed Tape-worm in a Cucumber (? Taenia crassicolis)*. *Proceed. Acad. nat. sc. Philadelphia 1888, No. 81*.

Schmidt untersucht die Entwicklung der Geschlechtsorgane von *Bothriocephalus latus* und *Triaenophorus nodulosus* und findet, dass das Körperparenchym bisher als Zwischensubstanz bezeichnet ist; was früher in den älteren Arbeiten Parenchymzellen genannt wurde, sind Hohlräume oder auch Formelemente, die nicht zum Parenchym gehören; bei *Bothriocephalus* wird die Grundsubstanz von einer einheitlichen Masse, einem feingranulirten Protoplasma gebildet; die Sagittalmuskeln junger Proglottiden sind schlanke, spindelförmige Zellen, die an beiden Enden in lange, zarte Fasern auslaufen; erstere sind die Myoblasten. Die erste Anlage der Ge-

schlechtsorgane sind rundliche Ansammlungen von Zellkernen, die sich in 3 über einander liegenden, zunächst parallelen Strängen anordnen und später zur Vagina, zum Vas deferens und Uterus werden. Ein centraler Strang der Anlage des Vas deferens und der Vagina liefert das Epithel und die umhüllenden Massen der Muskulatur. Der Uterus besitzt eine epitheliale Auskleidung, die später schwindet. Hoden, Ovarien und Dotterstöcke entwickeln sich ebenfalls aus der Körpergrundsubstanz, dem Parenchym. Zuerst werden die Leitungsapparate, dann die keimbereitenden Organe gebildet, letztere bald im Zusammenhange mit ersteren, bald unabhängig von ihnen. *F. Schmidt. Beiträge zur Kenntniss der Entwicklung der Geschlechtsorgane einiger Cestoden. Zeitschr. für wissensch. Zoolog., Bd. XLVI, Leipzig 1888, Heft 2, pag. 155—187, tab. XVI—XVII.*

Ijima giebt an, dass *Bothriocephalus latus* in Japan sehr gemein ist; *Taenia mediocanellata* kommt sehr viel seltner vor, *T. solium* wurde noch garnicht beobachtet. Verf. findet, dass, während in Europa *Esox lucius*, *Lota vulgaris* und *Perca fluviatilis*, in seltenen Fällen auch *Salmo umbla* die Träger der Larven von *Bothriocephalus latus* sind, in Japan *Onchorhynchus Perryi* Hilg. der Zwischenwirth ist, ein Fisch, von dem die Japanesen glauben, dass der Bandwurm von seinem Genuss herstamme; 7 Larven, die ganz mit Braun's Formen übereinstimmten, wurden in der Muskulatur gefunden, von denen Verf. 2, ein heiles und ein nicht intaktes Exemplar verschluckte, nachdem die microscopische Untersuchung der Fäces die Abwesenheit von *Bothriocephalus*-Eiern ergeben hatte; 22 Tage darauf wurde ein 315 Centim. langer *Bothriocephalus* mit 1467 Proglottiden entleert. Später wurden bei 7 Exemplaren dieses Fisches 6 mal die genannten Larven gefunden; derselbe wird vielfach roh genossen; andere Fische wurden ohne Erfolg auf Larven untersucht. *J. Ijima. The source of Bothriocephalus latus in Japan. The Journ. of Coll. of science Imp. Univers. Japan, vol. II, part 1, Tokyo 1888, pag. 49—56.*

Zschokke beobachtet, dass die Larve von *Bothriocephalus latus* ausser in *Salmo umbla*, *Trutta vulgaris* und *Thymallus vulgaris* auch in einem im Rhein bei Basel gefangenen Exemplar von *Trutta lacustris* vorkam, und zwar in etwa 200 Exemplaren von 6—18 mm Länge. *F. Zschokke. Ein weiterer Zwischenwirth von Botriocephalus latus. Centralbl. für Bact. u. Parask. II. Jahrg., Bd. IV, Jena 1888, No. 14, pag. 417—419.*

Parona verwahrt sich nochmals gegen Grassi und Ferrara (s. d. vorigen Jahresbericht pag. 35) in Betreff der Prioritätsfrage in Bezug auf die Entwicklungsgeschichte von *Bothriocephalus latus*, und bemerkt, er habe zuerst in Italien, und zwar im September 1885 in den Hechten einiger italienischer Seen die *Bothriocephalus*-Larven gefunden und demonstrirt; keiner vor ihm habe beobachtet, dass diese Larven auch in Barschen leben; am 1. Juli 1886 habe er veröffentlicht, dass diese Larven mit denen Braun's gleich seien; am selben Tage habe er ferner mitgetheilt, dass die in Hechten italiener-

scher Seen gefundenen Larven sich im Menschen und im Hunde zu *Bothriocephalus latus* entwickeln, ebenso die in Barschen lebenden, und dass die dortigen Seen Infectionsherde für *Bothriocephalus latus* seien. *E. Parona. Ancora sulla questione del Bothriocephalus latus (Bremser) e sulla priorità nello studio delle sue larve in Italia. Gazz. med. Italiana-Lombardia* 1888; s. ferner *B. Grassi. Brevi spiegazioni a proposito dell' articolo del Parona sui botriocephali. Gazz. med. Italiana-Lombardia* 1888, No. 2.

Ijima und **Murata** fügen den 2 Fällen, in welchen *Bothriocephalus liguloides* beim Menschen gefunden wurde, 7 neue an; ein Exemplar wurde aus der Urethra eines Knaben entleert, je eins aus der Urethra zweier Männer, drei aus der Orbita von zwei jungen Leuten, nachdem der Conjunctivalsack eröffnet war; eins fand sich unter der Haut der rechten Kniekehle eines Soldaten, der den Parasiten 9 Jahre beherbergt hatte. Eine Cestoden-Larve, *Sparganum*, fand Verf. auch in *Inuus speciosus* und *Mustelus itatsi*, die dem *Bothriocephalus liguloides* ähnlich. *I. Ijima und K. Murata. Some new cases of the occurrence of Bothriocephalus liguloides Lt. Journ. of the Coll. of science Imper. Univers. Japan, vol. II, part. 2, Tokyo* 1888, 14 pg., 1 plie.

Nach **Monticelli** sind bei *Bothriocephalus microcephalus* sowohl der Scolex als auch die Geschlechtsöffnung mit einem Hakenkranz (diadema) bewaffnet; die Geschlechtsorgane liegen marginal, unregelmässig abwechselnd, Cirrus und Vagina münden in ein Atrium genitale. *S. Monticelli. Osservazione sul Bothriocephalus microcephalus Rud. Nota preliminare, Napoli* 1888.

Leidy findet im Darm und Magen von *Esox reticulatus* (Pickerel) *Taenia leptosoma* n. sp., ohne Hakenbewaffnung (*Taenia leptosoma* ist ein längs von Diesing für einen Parasiten von *Psittacus aestivus* gebrauchter Name). (l. c.)

Ref. beschreibt als auf der Challenger-Expedition gefunden *Taenia clavulus* n. sp. aus dem Darm von *Ptilorhis Alberti*, *Taenia increscens* n. sp. aus *Haematopus unicolor*, *Taenia Diomedaeae* n. sp. aus *Diomedea brachyura*, *Taenia Trichoglossi* n. sp. aus dem Darm von *Trichoglossus Swainsoni*, *Tetrabothrium torolosum* n. sp. aus dem Magen von *Diomedea brachyura* und *Tetrabothrium auriculatum* n. sp. aus dem Darm von *Thalassoeca glacialis* und *Daption capensis* (l. c.).

Crety giebt eine morphologische Notiz über *Solenonophorus megacephalus*. *Crety. Note morfolog. int. al Solenophorus megacephalus Crepl. Bollet soc. Naturalist Napoli, ser. 1, vol. II, ann. II, Napoli* 1888, fasc. 2, pag. 124—130.

Villot bezeichnet die Cysticerkoïden als Zwischenformen zwischen den Cysticerken und den wahren Scoleces und nennt sie Pseudocysticerken; die Schwanzblase entsteht bei ihnen durch einen Knospungsprocess (bourgeonnement); sie ist ein neuer Theil, der sich dem Prosclex anfügt; die Schwanzblase knospet aber nicht immer von dem hinteren Theil des Prosclex; bei den Cysticerkoïden kann

sie innen und aussen am Blastogen sprossen, und hiernach werden endogene und exogene Cysticerkoiden unterschieden. Die Larve von *Taenia elliptica* hat weder Körper noch Schwanzblase und gehört zu den Pseudocysticerken (pseudocystiques). *A. Villot. Sur la classification des Cystiques. Revue biol. du Nord de la France, 1, Lille 1888—89, No. 9—10.*

Nach **Kunstler** lebt in *Solen vagina* eine Cestodenlarve, die microscopisch klein und birnförmig ist und ausser 4 Saugnäpfen einen grossen, scheitelständigen besitzt; in *Sepiola atlantica* und *Pleurobranchia pileus* finden sich ähnliche Cestodenlarven, denen aber der grosse Saugnapf fehlt; ausserdem fand Verf. in *Solen vagina* ein *Echinobothrium* im Körperparenchym, besonders im Fuss und in letzterem auch häufig eine Redie. *M. Kunstler. Sur de nouveaux vers remarquables. Compt. rend. Acad. sc. Paris, s. CVI, 1888, No. 8, pag. 553—554.*

Monticelli behandelt in einer ausführlichen und erschöpfenden Monographie *Scolex polymorphus* Rud., eine Larve, welche Verf. ausser an manchen bekannten Fundorten auch in *Arnoglossus laterna* Walb; *A. conspersus* Canestr. und *A. Grohmanni* Bonat findet. Durch Fütterungsversuche an *Torpedo narce* (ocellata) stellt Verf. fest, dass *Scolex polymorphus* die Larve von *Calliobothrium filicollis* Zsch. ist. Die Entwicklung der Saugnäpfe vollzieht sich in der Weise, dass die ursprünglich runde Anlage länglich wird, darauf wird dieses Organ durch quere Scheidewände in 2, 3 und endlich 4 Abtheilungen geschieden; die Haken an der vordersten Scheidewand werden erst am geschlechtsreifen Thiere gefunden. Die radiäre Muskulatur der Scheidewände ist sehr mächtig; unter sich sind sie durch schwache vordere und hintere Diagonalmuskeln verbunden; die beiden Längsnerven werden im *Scolex* durch eine starke Quercommissur vereinigt, von der Aeste nach vorn gehen. Die Cuticula ist mit Borstenhaaren besetzt; in der Subcuticula liegen gekernete Drüsen. Die Stämme der Excretionsgefässe bilden netzartige Anschwellungen und haben blind endigende Ausläufer sowie zahlreiche, nach aussen mündende foramina secundaria; Wimpertrichter sind durch Capillaren mit ihnen verbunden. Im *Scolex* ist die Muskulatur von sehr complicirtem Bau und findet man Längs- und Quermuskeln der Haken (bei *Calliobothrium*) und Retractoren der Saugnäpfe. *Calliobothrium filicollis* wurde gefunden in *Torpedo marmorata* Risso und *T. narce* (ocellata), *Raja asterias* M. u. H., *R. batis* L., *Trygon violacea* Bonap., *Scyllium canicula* L. und *Mustelus laevis* Risso. *F. Monticelli. Contribuzione allo studio della fauna elmintologica del golfo di Napoli, I. Ricerche sullo Scolex polymorphus Rud. Mitth. aus d. zoolog. Station zu Neapel, Bd. 8, Berlin 1888, Heft 1, pag. 85—152, tab. 6—7. Intorno allo Scolex polymorphus Rud. Bollet. soc. Naturalist Napoli, ser. 1, vol. II, ann. II, Napoli 1888, fasc. I.*

Blanchard vertritt gegenüber der in jüngster Zeit ausgesprochenen Ansicht, der *Cysticercus cellulosae* gehöre nicht zu

Taenia solium, die bisher stets gültige und wohlbegründete Meinung, dass dieses doch der Fall ist. *R. Blanchard. Le cysticercus cellulosae est la larve du Taenia solium. Lyon. méd. 1888, No. 7, pag. 252—253.*

Bollinger fand beim Menschen unter 14000 Sectionen *Cysticercus cellulosae* 2 mal im Gehirn, auch einmal in 70—80 Exemplaren einen *Cysticercus*, der wahrscheinlich auch zu *C. cellulosae* gehört im Gehirn des Hundes. *O. Bollinger. Ueber Cysticercus cellulosae im Gehirn des Menschen. Münchener medic. Wochenschr. 1888, No. 31.*

D. Kallmann berichtet über das Vorkommen der Rinderfinne. *Wochenschr. für Thierheilk. u. Viehzucht 1888, No. 52, pag. 457—460.*

Vogel erzog durch Verfütterung von Eiern oder eierhaltigen Proglottiden von *Taenia crassicolis* den *Cysticercus fasciolaris* in der Leber von Mäusen. Die Entwicklung ist eine langsame; 6—8 Tage nach der Infection haben sich nur noch Bläschen gebildet, welche eine Differencirung der Schichten oder eine bestimmte Lagerung der Zellen nicht erkennen lassen; am 19. Tage ist die erste Anlage der Muskulatur bemerkbar, nach 28 Tagen erkennt man einen aus polygonalen, grossen Zellen gebildeten, ovalen Zapfen, als erste Anlage des Kopfzapfens; nach 50—70 Tagen haben sie erst die doppelte Grösse eines Stecknadelknopfes erreicht; nach 74 Tagen ist der Kopffortsatz hohl und birnförmig geworden, nach 84 Tagen ist er nach innen eingestülpt. Die Cyste, in welcher der *Cysticercus* liegt, steht mit letzterem in keinem Zusammenhange, sondern ist entzündlich verändertes Lebergewebe. Die Cuticula besteht aus 3 Schichten, von denen die innere die hellste, die mittlere die stärkste und dunkelste, die äussere fein gezähnt ist; das Bindegewebe enthält massenhaft Kalkkörperchen; die Cuticula wird von äusserst feinen Porencanälchen durchzogen; unter der Cuticula liegt ein aus grossen, pallisadenförmigen Zellen gebildete Subcuticula, dann folgt eine Längsmuskelschicht, darauf Bindegewebe und hierauf eine innere, starke Längsmuskelschicht; in den Seiten des Körpers verlaufen Dorsoventralfasern. In den Excretionsporus mündet ein kurzer, einfacher Gefässstamm, von dem 4 Längsgefässe entspringen; die beiden grösseren Stämme sind am hinteren Ende eines jeden Gliedes durch ein Ringgefäss verbunden; überall gehen feine Capillaren ab und im Scolex bilden die beiden Gefässe jederseits vielfach gewundene Gefässknäuel, um dann hinter dem Rostellum blind zu endigen. Das Nervensystem besteht aus einem Längsnerven jederseits, der hinter dem Rostellum durch einen Bogen mit dem der anderen Seite vereinigt ist und die Gliederkette bis zur Schwanzblase durchzieht; in der Nähe des Excretionsporus gehen beide Stämme in einander über. Das linsenförmige Kissen im Rostellum wird aus Längs-, Ring- und Radiärmuskeln gebildet. *L. Vogel. Ueber Bau und Entwicklung von Cysticercus fasciolaris (Rudolphi). Rundschau auf dem Gebiete der Thiermedizin, 4. Jahrg.,*

1888, No. 6, pag. 41—44; No. 7, pag. 49—57; No. 8, pag. 57—60; sep. Osterwick 1888.

Dardel veröffentlicht eine Monographie der Echinococcen der Schilddrüse, in der 17 Fälle aufgeführt werden. *Dardel. Les kystes hydatiques du corps thyroïde. Paris 1888.* s. ferner **A. Knie.** *Echinococcus der Niere. St. Petersburg. med. Wochenschr. 1888, No. 37.* **R. Creutz.** *Ueber Echinococcus der Leber und seine Behandlung. Bonn 1888.* **A. Demars.** *Des kystes hydatiques du foie. Paris 1888.* **Fehleisen.** *Zwei Fälle von Echinococcus der Milz. Deutsche med. Wochenschr. 1888, No. 49.* **A. Wiegandt.** *(Ein Fall von Echinococcus im Wirbelcanal) (russisch). Annal. d. Ujäsow'schen Hospitals in Warschau, 1888, Heft 3.* **H. Hirschberg.** *Ueber Milzechinococcen. Berlin, 1888.* **P. Vuillemin.** *Développement des Echinocoques. Bullet. soc. sc. Nancy, 2. ser., t. 7, fasc. 17, pag. XII.* **W. Behrendsen.** *Ueber die Verbreitung des Echinococcus im menschlichen Organismus. Berlin 1888.* **F. Krause.** *Ueber den cystischen Leberechinococcus und über die von R. v. Volkmann eingeführte Operation desselben. Leipzig 1888.* **O. Blümcke.** *Beitrag zur Statistik der Echinococcenkrankheit in Vorpommern. Greifswald 1888.* **C. Rosenthal.** *Ueber den Echinococcus der Muskeln. Berlin 1888.* **P. Fischer.** *Beitrag zur Statistik der Echinococcus-Krankheit in Pommern, speciell in Neuvorpommern. Greifswald 1888.*

Jahresbericht

über die Bryozoën für 1888.

Von

Dr. W. Michaelsen
in Hamburg.

A. Anatomie, Physiologie, Biologie.

S. F. Harmer hat die Entwicklung von *Alcyonidium polyoym* zum Gegenstand seiner Untersuchungen gemacht. Nach einer kurzen Einleitung erörtert H. einige kleine Abweichungen seines Untersuchungs-Materials von den Beschreibungen Hassall's und Hinck's, giebt einige Notizen über seine Untersuchungsmethoden und geht dann auf das eigentliche Thema seiner Abhandlung über. Den Schluss bilden vergleichende Betrachtungen der Bildungen bei Ectoprokten und bei anderen Bryozoen-Gruppen. (*Sur l'embryogénie des Bryozoaires ectoproctes*; in: *Arch. Zool. expér. (2 ser.)* Vol. V, 1887, pag. 443—458 und Pl. XVII u. XVIII. — Auszug in: „*Journ. R. micr. Soc.* 1888, pag. 721—722.)

Desselben Abhandlung über *Cephalodiscus dodecalophus* M'Intosh. (Vergl. diese Zeitschrift, Jahrg. 1888, Bd. II, Heft 3, pag. 14) ist auch erschienen in: *Bull. Sci. Fr. Belg.* Vol. I; pag. 272 bis 273.

Fr. Braem weist nach, dass die Knospung bei Süßwasser-Bryozoen nicht an beliebigen Stellen der Körperwand vor sich geht, sondern sich stets an die Praeexistenz älterer Knospen knüpft und zwar in gesetzmässigster Weise. Je nachdem die Knospengenerationen langsamer oder rascher folgen, entstehen die schlankeren oder die mehr kompakten Kolonien. Wenn die Cystide in ihrer Ausbildung zurückbleiben, so gehen daraus Kolonien vom Habitus der *Plum. punctata*, von *Lophopus*, *Pectinatella* und endlich *Cristatella* hervor. Braem verfolgte dann die Entstehung der Statoblasten und kam zu der Erkenntniss, dass dieselben eher Knospen als Eiern zu vergleichen sind. Sie sind gleichsam verpackte Cystide, in denen bei der Keimung secundär die Anlage der ersten Knospe vor sich geht. Der Autor hält es für zweifelhaft, ob die Knospen der *Phyllactolaemen* denjenigen von *Paludicella* direkt zu vergleichen sind. Den Schluss bilden Mittheilungen über die Keimung der

Statoblasten. (*Untersuchungen über die Bryozoen des süßen Wassers; in: Zool. Anzeig. Nr. 288 und 289; pag. 503—509. — Auszug in: Journ. R. microsc. Soc. London; 1888, P. 6, pag. 937—938.*)

K. Kraepelin behält sich vor, auf die Mittheilungen Braems (siehe oben) später zurückzukommen und reproducirt den Wortlaut eines auf der Naturforscherversammlung zu Berlin (1886) zu Protokoll genommenen Satzes, aus dem hervorgeht, dass er die Knospennatur der Statoblasten schon damals erkannt hatte. (*Bemerkung zu den Mittheilungen von F. Braem über Süßwasserbryozoen; in: Zool. Anz. No. 293, pag. 646—647.*)

Von **desselben** Monographie „Die Deutschen Süßwasserbryozoen; I. T.“ (*Abh. Geb. Naturw. Verein Hamburg, Bd. X, 1887; siehe diese Zeitschr. Jahrg. 1888, Bd. II, Hft. 3, pag. 12—14*) ist ein Auszug erschienen in: *Journ. R. microsc. Soc. London; 1888, P. 4, pag. 566—567.*

A. Korotneff veröffentlicht seine Untersuchungen über die Spermatogenese von *Alcyonella fungosa* (*Comptes rend. Acad. Sc. T. CV, pag. 953—955 — s. diese Zeitschrift, Jahrg. 1888, Bd. II, Hft. 3, pag. 15*) in ausführlicherer Form und veranschaulicht seine Auseinandersetzungen durch zahlreiche Abbildungen. (*Beiträge zur Spermatologie; in Arch. Mikr. Anat., 31. Bd., pag. 334—341 und Taf. XIX. — Ein Auszug aus dieser Abhandlung ist erschienen in: Journ. R. microsc. Soc. 1888, Part. 4, pag. 566.*)

W. Freese giebt eine eingehende anatomisch-histologische Beschreibung von *Membranipora pilosa* L. und ihren verschiedenen Varietäten. (*Anatomisch-histologische Untersuchung von Membranipora pilosa L. nebst einer Beschreibung der in der Ostsee gefundenen Bryozoen; in: Arch. Naturgesch., Jahrg. 1888, Bd. I, Hft. 1, pag. 1—42 und Taf. I u. II.*) (s. auch unten.)

A. Wm. Waters beschreibt die Ovicellen von *Hornera fissurata* Bush, *Idmonea irregularis* Meneghini, *I. Milneana* d'Orb und *Gephyrophora polymorpha* B. Die Gestaltung bei den drei ersten Arten ist durch Abbildungen veranschaulicht. (*On some Ovicells of Cyclostomatous Bryozoa; in: Journ. Linn. Soc. Zool. Vol. XX. No. 121; pag. 275—280 mit Taf. 14.*)

Derselbe berichtet über die Ovicellen einiger *Lichenopora*-Arten: *L. californica* Busk (= *Discoporella californica* Busk), *L. echinata* M' Gill, *L. victoriensis* nov. (für *Discoporella reticulata* M' Gill. und *Discotubigera? lineata* M' Gill.) Jede dieser Formen und ausserdem auch noch *Lichenopora Holdsworthii* B. ist durch Abbildungen veranschaulicht. (*On the Ovicells of some Lichenopora; ebendasselbst pag. 280—285 mit Taf. 15.*)

J. Jullien bespricht gewisse Nebenerscheinungen beim Austreten der Polypide (von *Catenicella ventricosa*) aus ihren festen Kammern. Der durch ihr Austreten hinten frei werdende Raum füllt sich mit Seewasser; und zwar tritt dieses Seewasser durch eine Oeffnung ein, welche sich beim Aufklappen des Operculums bildet. Das Operculum ist nämlich nicht mit seinem Hinterrande, sondern

an seinen Seiten unterhalb des Hinterrandes eingelenkt. Es hat eine doppelte Funktion; es deckt nicht nur vorne die Tentakelscheide, sondern mit seinen hinteren Partien eine zweite Höhlung, in die das Seewasser eintritt. — (*Sur la sortie et la rentrée du polypide dans les zoecies chez les Bryozoaires cheilostomiens monodermes* in: *Bull. Soc. Zoolog. France*, 1888, XIII. Vol., pag. 67—68. — *Auszug* in: *Journ. R. microsc. Soc. London*; P. 6, pag. 936).

Derselbe hat monosexuelle, männliche Stöcke von *Cristatella mucedo* beobachtet. Die männlichen Geschlechtsprodukte bilden sich nicht an den Polypiden, sondern zwischen denselben an intracolonialem, muskulösen Trabekeln. (*Sur la Cristatella mucedo* in: *Bull. Soc. Zoolog. France*, 1888, XIII. Vol., pag. 165—166).

Derselbe hat *Catenicella ventricosa* und *C. alata* einer anatomischen Untersuchung unterzogen; er bespricht die Kompensations-Wasserkammern, die Natur der „Fenestrae“ und „Vittae“ (G. Busk) und die zoeciale Knospung. Den Schluss bilden einige allgemeine Bemerkungen. (*Observations anatomiques sur les Catenicelles*; in: *Mém. Soc. zool. France*, 1888; pag. 274—280 und *Taf. IX*).

Derselbe hat die Hoden von *Lepralia figularis* Johnst. und anderer Bryozoen untersucht und unterscheidet 4 verschiedene Formen der Hodenbildung: 1. Bei den *Cristatellen* ist das die männlichen Geschlechtsprodukte bildende Zelllager unabhängig von den Polypiden, intracolonialem, 2. bei den *Plumatellen* entwickelt es sich am Funiculus, 3. bei der Mehrzahl der marinen Bryozoen entsteht es an der Innenseite des Zoeciums, und 4. bei *Lepralia figularis* sowie bei einer neuen, nicht benannten Art bildet der Hoden einen cylindrischen, drüsenartigen Körper, der vermittelt eines Ausführungsganges am äusseren Rande des Irisoides (*diaphragme obturateur de la gaine tentaculaire*) ausmündet. (*Du Testicule chez la Lepralia figularis* Johnst. et des variétés de cet organe chez les Bryozoaires en général; in: *Mém. Soc. zool. France*, 1888; pag. 270—273 und *Taf. X*.)

W. J. Vigellus fasst kurz seine Ergebnisse bei Untersuchung der Metamorphose von marinen Bryozoen dahin zusammen, dass er seine Uebereinstimmung mit den Ansichten Barrois' ausspricht und seine nicht ganz vollständigen Angaben über die Gattung *Bugula* ergänzt. (*Zur Ontogenie der marinen Bryozoen*; in: *Mittheil. Zool. Station Neapel*, Bd. VIII; pag. 374—376 mit *Taf. 19*. — *Auszug* in: *Journ. R. microsc. Soc. London*; 1888, P. 6, pag. 936.)

A. Saeftigen hat das Nervensystem von *Cristatella* und *Plumatella* untersucht. Die Ganglienhöhle ist bei geschlechtsreifen, aus Statoblasten entsprossenen Thieren stets vorhanden und setzt sich in die sogenannten Ganglienhörner fort. Sie wird nicht allseitig von Nervelementen umgeben, sondern grenzt an der oesophagealen Seite unmittelbar an das Endothel, welches Ganglion und Hörner allseitig bezieht. Ganglion nebst Hörnern entsenden eine den Tentakeln entsprechende Anzahl von Radialnerven. Um zu den Ten-

takeln der Suboesophagealseite zu gelangen, müssen die betreffenden Radialnerven dem breiten Oesophagus ausweichen und bilden so, jederseits zu 4—5 aneinandergedrückt, einen Schlundring. Es konnte die suboesophageale Verbindung der beiden Aeste sicher nachgewiesen werden. Ein dem Schlundring ähnlicher Nervenring kann sich (bei paariger Tentakelzahl) durch die Radialnerven der Tentakeln der Analseite bilden (um den Epistomhohlraum herum). Bevor die Radialnerven die Tentakelbasis erreichen, werden sie von kleinen intertentakulären Ganglien durchsetzt, die nicht nur die Tentakeln versorgen, sondern auch einen feinen Nerv an die Sinneszellen an der Basis der sogenannten Tentakelmembran senden. Jenseits der intertentakulären Ganglien theilen sich die Radialnerven dichotomisch. Zur Innervirung eines Tentakels tragen zwei Radialnerven bei. Zur Innervirung der unteren Körpertheils dienen zwei Nerven, die dem tiefsten Theile des Supraoesophagealganglions entspringen. Die hintere Körperwand wird von einer grösseren Anzahl von Nerven versorgt, die wie jene beiden aus dem Grunde des Ganglions, dann aber auch aus dessen hinterem Theil paarweise über einander austreten. (*Das Nervensystem der phylactolaemen Süsswasser-Bryozoen; in: Zool. Anz. No. 272; pag. 96—99.*)

M. Verworn hat *Cristatella mucedo* Cuv. eingehend untersucht. Nach Darstellung der anatomischen und histologischen Verhältnisse, welcher eine Schilderung der eigenartigen Kriechbewegung der Kolonie angefügt ist, geht Verworn auf die Statoblastenentwicklung über. Das zu lösende Problem wird in folgenden Fragen zu präcise Ausdruck gebracht: Nimmt ausser der Zellschicht des Funiculus noch eine andere, genetisch verschiedene Zellschicht an der Bildung des Statoblasten Theil, oder nur das Mesoderm des Funiculus? — und bei Annahme des letzteren Falles: Entwickelt sich der Statoblast in der That aus einem Haufen von Zellen oder entsteht er aus einer einzigen Zelle dieses Haufens? Die erste Frage wird dahin entschieden, dass nur das Mesoderm des Funiculus bei der Statoblastenbildung thätig sein könne, da im andern Falle eine Einwanderung ektodermaler Zellen (aus der Sohle) oder entodermaler Zellen (des Magenepithels) angenommen werden müsse; während die Thatsache, dass das Lumen des Funiculus bei den ersten Entwicklungsstufen der Statoblasten noch frei und leer erscheint, gegen eine Einwanderung spräche. In Betreff der zweiten Frage wird festgestellt, dass nur eine einzige Zelle an der Statoblastenbildung Theil nimmt. An einer bestimmten Stelle des Funiculus vermehren sich die Epithelzellen desselben zu einer kleinen Anschwellung und drängen dadurch gegen das Lumen. Eine Zelle davon tritt in das Lumen hinein und wird zur Eizelle, während die andern sich zu einem Follikel formiren. Die Eizelle macht einen regelmässigen Furchungsprocess durch, dessen Resultat schliesslich eine solide Morula ist. Die weitere Entwicklung des Statoblasten von *Cristatella* verläuft im Grossen und Ganzen in der Weise, wie sie Nitsche bei *Alcyonella* schildert. Die Statoblasten sind als parthenogenetische

Wintereier aufzufassen, welche sich im Gegensatz zu den befruchteten Eiern am Funiculus entwickeln. (*Beiträge zur Kenntniss der Süßwasserbryozoen in: Zeitschr. wiss. Zool., Bd. 46, pag. 99—130. Auszug in: Journ. R. microsc. Soc. London; 1888, P. 1, pag. 27 bis 29; und in: Journ. de Microgr. Vol. XII, No. 93, pag. 73—79 (par Kunstler).*)

J. Whitelegge bespricht die Gestaltung der Oral-Oeffnung bei *Porina inversa* Waters von Port Jackson und berichtigt Waters Ansicht hierüber dahin, dass die Oeffnung nicht in der Gestalt, wohl aber in der Stellung von dem für die Gattung *Porina* und die Bryozoen im Allgemeinen normalen abweicht. (*Note on Porina inversa; in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales; II. Ser., Vol. II; pag. 680.*)

S. Lo Bianca veröffentlicht Notizen über die Perioden der geschlechtlichen Reife der Thiere des Golfes von Neapel, darunter verschiedener Bryozoen. (*Notizie biologiche riguardanti specialmente il periodo di maturità sessuale degli animali del golfo di Napoli; in Mitth. Zool. St. Neapel, Bd. VIII; Bryozoa: pag. 406 u. 407.*)

Ueber **W. W. Reinhardt's** Otscherk strajenija i raswitija prjasnawodnuch mipanok (*Skizze des Baues und der Entwicklung der Süßwasser-Bryozoen*); in *Arb. Naturf. Ges. Charkow, Bd. 15, pag. 207—310 und 1 Taf.*) kann der Referent nichts aussagen.

B. Systematik, Faunen.

1. Marine Formen.

Mac Gillivray giebt Beschreibungen und Abbildungen verschiedener Bryozoen von Victoria. (*Natural History of Victoria: Dec. XVI, 1888; Pl. 156—158 und pag. 209—220, sowie Dec. XVII, 1888; Pl. 165—168 und pag. 241—253*): *Lagenopora tuberculata* Mc. G., *L. nitens* Mc. G., *Lekythopora hystrix* Mc. G., *Poecilopora anomala* Mc. G., *Fasciculipora gracilis* Mc. G., *F. bellis* Mc. G., *F. fruticosa* Mc. G., *F. ramosa* D'Orb., *Farciminaria aculeata* Busk, *F. uncinata* Hincks, *F. simplex* Mc. G., *Bracebridgia pyriiformis* Busk; — *Cellepora simplex* Mc. G., *C. diadema* Mc. G., *C. spicata* Mc. G., *C. cidaris* Mc. G., *C. bispinata* Busk, *C. verrucosa* Mc. G., *C. foliata* Mc. G., *C. intermedia* Mc. G., *C. prolifera* Mc. G., *C. albirostris* Smitt., *C. fusca* Busk, *C. lirata* Mc. G., *C. magnirostris* Mc. G.

E. Pergens hat die manuscriptische Figuren-Erklärung zu den in wenigen Exemplaren zur Verteilung gelangten Tafeln „Desmarest et Lesueur: Sur les polypiers flexibles“ mit den im Museum zu Havres niedergelegten Originalen verglichen. Er stellt sowohl die Bezeichnungen Desmarests und Lesueurs wie auch seine eigenen Bestimmungen des Original-Materials in je einer Liste zusammen. Kritische Notizen begleiten die zweite Liste. (*Contributions à l'histoire des Bryozoaires et des Hydrozoaires récents; in: „Proc.-verb. Séances Soc. R. Malacologique Belgique T. XVI, 1887; pag. CII*

bis CVII und in: *Bull. Soc. malac. Belg. T. XXII; pag. LXXXV bis XC*).

W. Freese veröffentlicht eine Uebersicht über die bekannten Bryozoen der Ostsee. Die kurzen Beschreibungen der einzelnen Formen sind begleitet von einer Zusammenstellung der Synonymie und der Literatur, sowie von Angaben über den Fundort in der Ostsee und die geographische Verbreitung; auch sind die meisten Formen durch Abbildungen veranschaulicht. Die Zusammenstellung enthält folgende Arten:

Pedicellina gracilis Sars (Fig. 17); *Crisia eburnea* L. forma *eburnea* Smitt (Fig. 18), forma *producta* Smitt (Fig. 19); *Diastopora repens* Wood (Fig. 20); *Alcyonidium Mytili* Dal. (Fig. 21); *A. polyomum* Hass. (Fig. 22); *A. gelatinosum* L.; *A. papillosum* Hass. (Fig. 23); *A. hispidum* Fabr. (Fig. 24); *Vesicularia uva* L.; *V. cuscuta* L. (Fig. 25); *Gemellaria loricata* L. (Fig. 26); *Flustra foliacea* L. (Fig. 27); *Membranipora lineata* L. (Fig. 28); *M. nitida* Fabr. (Fig. 29); *M. Flemingii* Busk forma *trifolium* Wood (Fig. 30); *M. pilosa* L. forma *pilosa* L., Smitt (Fig. 1), forma *membranacea* Müll., Smitt (Fig. 3), forma *monostachys* Busk, Smitt (Fig. 5); *Escharipora punctata* Hass. (Fig. 31). (Anatomisch-histologische Untersuchung von *Membranipora pilosa* L. nebst einer Beschreibung der in der Ostsee gefundenen Bryozoen; in: *Arch. Naturgesch. Jahrg. 1888, Bd. I, Heft I pag. 1—42 und Taf. I und II — auch separat, als Inaugural-Dissertation erschienen, Kiel, Berlin 1888*).

A. Glard bespricht die faunistischen Untersuchungen am Laboratorium von Wimereux und giebt dabei auch einige Notizen über Bryozoen (*Le Laboratoire de Wimereux en 1888, Recherches fauniques*; in: *Bull. scient. France Belg. T. XIX; Bryozoa pag. 497 und 498*).

J. Joyeux-Laffuie giebt eine eingehende Beschreibung von *Delagia Chaetopteri* nov., für die er die neue Familie der *Delagiidae* aufstellt. *D. Chaetopteri* ist eine ectoprocte, gymnolaemate, ctenosome Bryozoe, die in den noch von den Würmern bewohnten Röhren des *Chaetopterus Valenciinii* lebt. Die Stolonen der Kolonie sind zum Teil frei an der Innenwand der Röhre befestigt, zum Teil in die Masse der Röhre eingesenkt und zwar in Folge späterer Schleim-Absonderung von Seiten des Wurms. Der Autor giebt folgende Diagnose, die gleicherweise für die Art, Gattung und Familie Geltung haben soll:

Stolon. — Rampant, avec renflements régulièrement disposés. Sur chaque renflement est fixée le plus souvent une seule zoécie, rarement deux.

Zoécie. — Adhérente, ovoïde, en forme d'urne avec un orifice ovalaire sub-terminal. Une sphérule de chaque côté de l'orifice. Fixée au stolon par le côté.

Polypide avec un petit nombre de tentacules (12—14) et un gésier.

(Description du *Delagia chaetopteri* (J. J.-L.), type d'un nouveau, genre de Bryozoaires; in: *Arch. zool. expér. (2) Tome VI, pag. 135 bis 154 mit Tafel VIII. — Auszug in: Journ. R. microsk. Soc. London, 1888, P. 6, pag. 936—937).*

H. de Lacaze-Duthiers veröffentlicht zwei Briefe „au sujet du genre *Delagia*“, einen von Joyeux-Laffaie, einen von E. Ehlers, welche beide die Identität der *Delagia chaetopteri* J. J.-L. mit der älteren *Hypophorella expansa* Ehlers. feststellen, (in: *Arch. zool. expér. (2) Tome VI, Note XII; pag. XLIV—XLVI).*

T. Whitelegge stellt für eine kleine Gruppe von Arten, die von den betreffenden Autoren verschiedenen Gattungen zugeordnet wurden, die neue Gattung *Bipora* auf:

Bipora, n. g., Zoarium uni- or bilaminate, conical, or forming lobate or flabellate expansions; growth intercalary; zoecia immersed, erect, side by side, with their bases resting on a cancellated lamina, forming alternating rows directed to the primary part of the zoarium; oral aperture with a well-marked sinus in the lower lip. A special pore above the mouth; peristomial orifice formed by the gradual extension of a narrow slit on the removal of a portion of the calcareous lamina. Ooecia external, globose.

In diese Gattung stellt Whitelegge die Arten: *Lunulites cancellata* Busk, *L. philippinensis* Busk, *Conescharrellina depressa* Hasw., *Lunulites* (*Cupularia*) *crassa* Ten.-Woods, *L. angulopora* Ten.-Woods = *L. incisa* Hincks = *Conescharrellina conica* Hasw., *Eschara umbonata* Hasw. und (?) *Flabellopora elegans* d'Orb.“ — (*Notes on some Australian Polyzoa; in Ann. Mag. Natur. Hist. 6. Ser. Vol. I; pag. 13—22.*)

R. Kirkpatrick hat eine Kollektion von Polyzoen von Mauritius untersucht, die sich durch die grosse Zahl neuer Arten auszeichnete:

- Fam. *Bicellariidae*: *Diplocium* n. g. (1 Art). — Neu *D. simplex*.
- Fam. *Cellulariidae*: *Scrupocellaria* (1 Art). — Neu *S. minuta*; *Nellia* (1 Art).
- Fam. *Membraniporidae*: *Membranipora* (3 Arten). — Neu *M. defensa*, *M. marginalis* und *M. mauritiana*.
- Fam. *Microporidae*: *Micropora* (1 Art).
- Fam. *Steganoporellidae*: *Steganoporella* (1 Art).
- Fam. *Cribrilinae*: *Cribrilina* (1 Art). — Neu var. *flabellifera* der *C. radiata*.
- Fam. *Microporellidae*: *Stephanopora* n. g. (1 Art). — Neu *S. cribrispinata*; *Microporella* (1 Art).
- Fam. *Porinidae*: *Anarthropora* (1 Art). — Neu *A. horrida*.
- Fam. *Myriozoidae*: *Schizoporella* (2 Arten). — Neu *Sch. ampla*; *Mastigophora* (1 Art); *Gigantopora* (1 Art); *Rhynopora* (1 Art).
- Fam. *Escharidae*: *Lepralia* (4 Arten). — Neu *L. judex* und *L. mosaica*; *Phylactella* (1 Art). — Neu *P. columnaris*; *Smittia* (6 Arten). — Neu *S. tubula*, *S. rostriformis*, *S. latiavicularia* und *S. murarmata*; *Porella* (1 Art); *Mucronella* (2 Arten).

Neu *M. porelliformis* und *M. cothurnica*; *Escharoides* (1 Art).
— Neu *E. discus*.

Fam. Reteporidae: *Retepora* (2 Arten). — Neu *R. tenuis* und *R. Hincksii*.

Fam. Tubuliporidae: *Idmonea* (2 Arten). — Neu *I. radiata* und *I. tortuosa*; *Hornera* (1 Art). — Neu *H. spinigera*.

Diploecium n. g.: „Zoarium dichotomous. Zooecia in pairs back to back, each pair at right angles to those above and below; the pairs separated by short cylindrical corneous internodes; orifice of cell with notch in lower border.“

Stephanopora n. g.: „Zooecia with semilunar orifice, lower margin straight, not dentate, without sinus; peristome raised posteriorly; from anterior margins of wall thus formed a process is given off on each side uniting in front to form with posterior wall a tubular peristome incomplete below. From lower margin of peristome a broad branched process is given off uniting with process from other zooecia to form a secondary cribriform roof. Special pore wanting.

Polyzoa of *Mauritius*; in *Ann. Mag. Natur. Hist.* 6. Ser. Vol. I; pag. 72—85 mit Taf. VII—X.

Derselbe bespricht ferner eine Sammlung von Polyzoen, die Herr J. B. Wilson in der Nähe von Port Phillip gedredget hat.

Fam. Flustridae: *Flustra* (1 Art).

Fam. Cribrilinidae: *Cribrilina* (1 Art).

Fam. Escharidae: *Lepralia* (2 Arten); *Haswellia* (1 Art). — Neu *H. victoriensis*; *Porella* (1 Art).

Fam. Tubuliporidae: *Idmonea* (1 Art).

Fam. Horneridae: *Hornera* (1 Art).

Fam. Tubuliporidae: *Entalophora* (1 Art); *Bidiastopora* (1 Art). Neu *B. torquata*.

Fam. Heteroporidae: *Heteropora* (1 Art). — Neu *H. maeandrina*.

Fam. Alcyonidiidae: *Alcyonidium* (1 Art).

Fam. Vesiculariidae: *Amathia* (8 Arten). — Neu *A. Wilsoni* und *A. pinnata*.

Fam. Cyandroeciidae: *Cyandroecium* (2 Arten). — Neu *C. altum*.

Fam. Pedicellinidae: *Pedicellina* (1 Art); *Ascopodaria* (1 Art).

Polyzoa from Port Phillip; in *Ann. Mag. Natur. Hist.* 6. Ser. Vol. II pag. 12—21; mit Taf. II.

Derselbe beschreibt eine neue Bryozoe: *Retepora sinuosa*.

Description of a new Species of *Retepora* from Port Western, Victoria; in *Ann. Mag. Natur. Hist.* 6. Ser. Vol. II; pag. 299; mit Holzschnitt.

A. W. Waters hat die Bryozoen der Challenger-Expedition einer nochmaligen Untersuchung unterzogen und kommt dabei zu manchen neuen oder von den Ergebnissen der Untersuchung Busks abweichenden Resultaten: Bei *Retepora columnifera* findet sich ein die Zooecien umgebendes, gemeinsames Parenchym und ferner sowohl bei *Retepora* wie bei einigen anderen Gattungen ein drüsenähnlicher Sack an jede Seite der Oral-Oeffnung befestigt. Analog diesen

Säcken sind wohl zwei doppelte Drüsen- oder Sack-ähnliche Körper in der Avicular-Kammer von *Lepralia margaritifera* (Vergl. Joliets „organe segmentaire“ in *Pedicellina*). Waters trifft folgende Aenderungen in der Benennung.

Waters:	Busk:
<i>Scrupocellaria marsupiata</i> Jullien	— <i>Menipea clausa</i> Busk.
<i>Urceolipora nana</i> M. Gillivr.	— <i>Calymnophora lucida</i> Busk.
<i>Flustra cribriformis</i> Busk.	— <i>Carbasa cribriformis</i> Busk.
<i>Monoporella? capensis</i> Busk.	— <i>Amphiblestrum capense</i> Busk.
<i>Membranipora falcifera</i> Busk.	— <i>Faveolaria falcifera</i> Busk.
<i>Thalamoporella steganoporoides</i> Goldst.	— <i>Vincularia gothica</i> Busk.
„ <i>labiata</i> Busk.	— „ <i>labiata</i> Busk.
<i>Cellaria australis</i> M. Gillivr.	— <i>Salicornaria clavata</i> Busk.
„ <i>rigida</i> M. Gillivr.	— „ <i>simplex</i> Busk.
<i>Calwellia sinclairii</i> Busk.	— <i>Onchophora sinclairii</i> Busk.
<i>Retepora tessell. Hincks var imperati</i> Bus.	— <i>Retepora imperati</i> Busk.
„ <i>porcellana</i> M. Gillivr.	— „ <i>crassa</i> Busk.
„ <i>monilifera</i> M. Gillivr.	— „ <i>victoriensis</i> Busk.
„ „ M. Gillivr.	
„ <i>forma umbonata</i> M. Gillivr.	— „ <i>hirsuta</i> Busk.
„ <i>avicularis</i> M. Gillivr.	— „ <i>jacksoniensis</i> Busk.
<i>Diporula hastigera</i> Busk.	— <i>Flustramorpha hastigera</i> Busk.
<i>Microporella distoma</i> Busk	— <i>Adeonella distoma</i> Busk.
<i>Bracebridgia geometrica</i> Reuss.	— <i>Mucronella pyriformis</i> Busk.
<i>Smittia delicatula</i> Busk.	— „ <i>delicatula</i> Busk.
„ <i>smittiana</i> Busk.	— <i>Smittia stigmatophora</i> Busk.
<i>Lepralia mucronata</i> Smitt.	— <i>Lepralia celleporoides</i> Busk.
„ <i>occlusa</i> Busk.	— <i>Escharoides occlusa</i> Busk.
„ <i>castanea</i> Busk.	— <i>Mucronella castanea</i> Busk.
<i>Schizoporella polymorpha</i> Busk.	— <i>Gephyrophora polymorpha</i> Busk.
„ <i>challengeria</i> nov.	— <i>Myrizoum immersum</i> Busk.
„ <i>vitrea</i> M. Gillivr.	— <i>Lepralia incisa</i> Busk.
<i>Porina coronata</i> Reuss var. <i>labrosa</i> Reuss.	— <i>Haswellia australiensis</i> Busk.
<i>Cellepora megasoma</i> M. Gillivr.	— <i>Cellepora cylindrifformis</i> Busk.
„ <i>pumicosa</i> Busk (non L.) var.	„ <i>eatonensis</i> Busk.
„ <i>eatonensis</i> Busk.	

Neu sind: *Schizoporella challengeria* (*Myrizoum immersum* Busk), *Cellepora armata* Hincks var. *erecta*, *Farciminaria biseriata*, *Flustra separata* und *Porina proboscidea*.

(Supplementary Report on the Polyzoa collected by. H. M. S. Challenger during the years 1873—76; in *Rep. Sc. Res. Voy. Challenger, Zool. V. XXXI, Part. LXXIX; 41 pag. und 3 Taf.*).

Mac Intosh beschreibt eine bei Gelegenheit der Challenger-Expedition südlich von den Philippinen gedredete *Phoronis* (*Ph. Buskii* = *Pp. spec. M!* Int. in: *Proc. R. Soc. Edinb. XI, pg. 211 bis 217*). Mac Intosh kommt nach eingehender Untersuchung dieser Art zu der Ansicht, dass die Gattung *Phoronis* eine aberrante Form der Polyzoen sei und dass sie in die Nähe der Gruppe *Aspidophora*

gestellt werden müsse (Report on *Phoronis Buskii* n. sp., dredged during the Voyage of H. M. S. Challenger, 1873—76; in: *Rep. Soc. Res. Voy. Challenger, Zool. V. XXVII, P. LXXV; pg. 1—27 and Taf. I—III*).

A. Dendy beschreibt zwei Polyzoen von Port Phillip, für die er die neue Gattung *Cryptozoon* aufstellt:

„*Ctenostomatous Polyzoa*, with tubular, chitinous zooecia enveloped in common aggregations of sand. Polypides provided with a muscular gizzard containing two horny teeth.“

Die Gattung *Cryptozoon* steht der Gattung *Bowerbankia* nahe. *Cryptozoon* mag für eine *Bowerbankia* gehalten werden, welche zwecks besseren Schutzes die Eigenschaft erworben hat, sich mit Sandkörnern zu bedecken. Dendy nennt die beiden Arten: *C. concretum* und *C. Wilsoni*. (On the Anatomy of an Arenaceous Polyzoan; in: *Proc. R. Soc. Victoria (N. S.) Vol. I; pag. 1—11, mit Taf. I—III*).

J. Jullien hat die Bryozoen der „Mission scientifi du Cap. Horn“ bearbeitet. Nach einer Erörterung der älteren Ansichten über die systematische Gliederung der Klasse der Bryozoen stellt Jullien seine Auffassung von derselben in einer Tabelle zusammen. Die Hauptabteilungen in dieser Tabelle sind folgende:

- I. Ordo Bryozoa lophopoda.
 - 1. Tribus Br. loph. caduca.
 - 2. Tribus Br. loph. perstita.
- II. Ordo Bryozoa paludicellina.
- III. Ordo Bryozoa ctenostomata.
 - 1. Sub Ordo. Utricularina.
 - 1. Tribus Ct. Ut. campilonemida.
 - 2. Tribus Ct. Ut. orthonemida.
 - 2. Sub-Ordo. Halcyonellina.
- IV. Ordo Bryozoa norodoniana.
- V. Ordo Bryozoa cheilostomata.
 - 1. Sub-Ordo Monodermata.
 - 1. Tribus Inovicellata.
 - 2. Tribus Subovicellata.
 - 3. Tribus Superovicellata.
 - 2. Sub-Ordo Diplodermata.
 - 1. Tribus Anopesiata.
 - 2. Tribus Opesiata.
 - 3. Tribus Opesiulata.
- VI. Ordo Bryozoa cyclostomata.
 - 1. Tribus Tubulinata.
 - 2. Tribus Fasciculinata.
 - 3. Tribus Foraminata.

Jullien berichtet über Arten folgender Familien und Gattungen:

Lophopodes.

Fam. Pedicellinidae: *Pedicellina* (2 Arten). — Neu *P. hirsuta* und *P. australis*.

Ctenostomes.

Fam. Valkeridae: *Monastesia* nov. (1 Art). — Neu *M. per-tenuis*.

Monastesia nov. gen.: „Zooecies chitineuses cylindroconiques, un peu arrondies à chaque extrémité, fixés inférieurement par des griffes cornées au stolon d'origine; ces zooecies son portées par un stolon grêle et irrégulièrement tortueux, sur lequel on les voit toujours isolées.“

Fam. Vesicularidae: *Bowerbankia* (3 Arten). — Neu *B. Francorum*, *B. Hahni* und *B. minutissima*; *Buskia* (1 Art). — Neu *B. australis*.

Cheilostomiens.

Fam. Aetaeidae: *Aetaea* (3 Arten). — Neu *A. fuegensis*, *A. curta* und *A. australis*.

Fam. Diazeuxidae nov.: *Diazeuxia* (*Cellepora*) (2 Arten). — Neu *D. reticulans*.

Diazeuxia nov. gen.: „Paroi frontale entière, n'étant perforée, parce que l'endocyste ne donne pas d'origelles au-dessous de cette paroi; elle s'accroît d'arrière en avant par zones, laissant à la surface des lignes saillantes, plus ou moins en relief, qui sont des lignes d'accroissement; les joncturies, ou bourgeons zooeciaux produisent les zooecies soit isolément, soit après leur coalescence; origelles toujours interzooeciales fournissant soit des génésies, soit de simples origelles. Zooecies femelles ne contenant jamais de polypides, et prenant en général une forme toute différente de celle des zooecies males. Paroi dorsale toujours largement ouverte; zooecie mère ou ancestrule (ancestrula) affectant différentes formes.“

Fam. Fenestrulinidae: *Fenestrulina* nov. (3 Arten). — Neu *F. Hyadesi*; *Inversiula* nov. (1 Art). — Neu *I. nutrix*.

Fenestrulina nov. gen.: „Zooecies dont la paroi frontale est perforée sur nombre de points par les origelles. Orifice sémi-circulaire avec la lèvre inférieure droite et entière. Fenestrule en croissant à concavité supérieure.“

Inversiula nov. gen.: „Zooecies dont la paroi frontale est perforées par les origelles. Orifice ovale, transversale. Fenestrule en croissant, à concavité inférieure.“

Fam. Buffonellidae: *Buffonella* nov. (1 Art). — Neu *B. rimosa*.

Buffonella nov. gen.: „Orifice à lèvre antérieure arrondie, à lèvre inférieure droite, portant sur son milieu une entaille à peu près sémi-circulaire, plus étroite que la moitié de la longueur de cette lèvre.“

Fam. Lacernidae: *Lacerna* nov. (1 Art). — Neu *L. hosteensis*; *Phonicosia* nov. (1 Art). — Neu *P. Jousseaumei*.

Lacerna nov. gen.: Orifice à lèvre postérieure droite portant une entaille arrondie sur son milieu. Ovicelle pourvue d'un double paroi."

Phonicosia nov. gen.: „Orifice à lèvre postérieure droite portant une entaille allongée sur son milieu, avec l'extrémité coupée carrément.

Fam. Smittidae: *Smittia* (3 Arten). — Neu *S. monacha*, *S. sigillata* und *S. purpurea*; *Exochella* nov. (1 Art). — Neu *E. longirostris*; *Porella* (2 Arten). — Neu *P. Hyadesi* und *P. malouinensis*; *Lepralia* (2 Arten). — Neu *L. collaris*; *Aimulosia* nov. (1 Art). — Neu *A. australis*.

Exochella nov. gen.: „*E.* ne diffère du genre *Smittia* que par la dent de la lèvre inférieure de l'orifice qui se prolonge en avant, formant une sorte d'éperon, et divisant la lèvre inférieure du péristome en deux portions distinctes. Les petites dents latérales de l'orifice peuvent rejoindre les prolongements latéraux de la dent médiane et former un pore arrondi de chaque côté de cette dernière."

Aimulosia nov. gen.: „Orifice subcirculaire, à lèvre inférieure légèrement concave, portant sur son milieu une dent arrondie. Frontale ne portant d'origelles que sur ses bords; la coalescence des origelles peut déterminer la naissance d'un avicellaire médian. L'ovicelle a ses deux membrures séparées à leur origine, mais elles se confondent de bonne heure."

Fam. Romancheinidae: *Romancheina* nov. (1 Art). — Neu *R. martiali*.

Romancheina nov. gen.: „Frontale épaisse remplie intérieurement par de volumineuses origelles qui la perforent plus ou moins régulièrement; orifice dépourvu d'épines marginales et subcirculaire ou un peu ovale transversalement."

Fam. Chapéridae: *Chapéria* (1 Art).

Fam. Arachnopusidae: *Arachnopusia* nov. (1 Art).

Arachnopusia nov. gen.: „Orifice trapézoïdal, dont ses deux lèvres sont droites ou presque droites; sur chacun des côtés du trapèze que forme l'orifice existe soit une épine articulée, assez épaisse et creuse, soit un avicellaire plus ou moins facile à voir; ancestrule membraniporoïde à bord libre garni d'épines."

Fam. Osthimosidae nov: *Osthimosia* nov. (2 Arten). — Neu *O. otopeta* und *O. evexa*.

Osthimosia nov. gen.: „Orifice à lèvre postérieure légèrement concave, portant sur son milieu une entaille plus large en haut qu'en bas, ou affectant grossièrement la forme d'un V; se prolongeant en dehors en une sorte de manchon portant des avicellaires, et l'ovicelle dans les zoecies femelles. Origelles marginales chez les individus couchés, dispersées chez ceux qui sont dressés au milieu des colonies. Il existe souvent des avicellaires dispersés sur les zoecies ou parmi elles. Pas d'épines orales."

Fam. Meliceritidae: *Melicerita* (1 Art).

Fam. Flustridae: *Scrupocellaria* (3 Arten); *Bugula* (1 Art). — Neu *B. Hyadesi*; *Diachoris* (5 Arten). — Neu *D. Hyadesi* und *D. maxilla*; *Carbasea* (1 Art). — Neu *C. ramosa*; *Eucratea* (1 Art); *Caberea* (1 Art); *Membranipora* (4 Arten). Neu *M. Hyadesi*; *Aspidostoma* (1 Art).

Fam. Opsiulidae nov: *Andreella* nov. (1 Art).

Andreella nov. gen: „Cryptocyste complet, portant de chaque coté une opésule en croissant; opésie en forme d'orifice et sémi-lunaire. Onychocellaire épizoociaux.

Cyclostomes.

Fam. Crisidae: *Crisia* (1 Art); *Tubulipora* (1 Art).

Fam. Horneridae: *Hornera* (1 Art).

Fam. Galeidae nov: *Disporella* (1 Art). — Neu D. spinulosa.

(Mission scientifique du Cap. Horn 1882/83; Tome VI; Zool. Bryozoaires; Paris 1888; 92 pag. und 15 Taf.).

Th. Hincks beschreibt eine Collection Polyzoen vom St. Lawrence:

Fam. Bicellariidae: *Corynoporella* n. g. (1 Art). — Neu C. tenuis.

Corynoporella n. g.: Stems slender, consisting of cells disposed in single series and facing one way, dichotomously branched; zooecia more or less clavate, each cell originating from the dorsal surface of the one beneath it, immediately below the summit, elongate, the inferior portion (from a little below the aperture) much attenuated, tubular; aperture at the top of the cell, occupying a small proportion of its length. Avicularia articulated, attached to the side of the aperture.

Fam. Cellulariidae: *Cellularia* (1 Art).

Fam. Cribrilinidae: *Membraniporella* (1 Art). — Neu M. crassicosta.

Fam. Membraniporidae: *Membranipora* (1 Art).

Fam. Escharidae: *Escharoides* (1 Art); *Porella* (3 Arten). — Neu P. proboscidea und var. plana der P. Skenei Ellis und Sol.; *Mucronella* (1 Art); *Smittia* (1 Art).

Fam. Pedicellinidae: *Barentsia* (1 Art). — Neu B. major.

The Polyzoa of the St. Lawrence: a Study of Arctic Forms; in: *Ann. Mag. Natur. Hist.* 6. Ser. Vol. I; pag. 214—227 mit Taf. XIV und XV.

A. Agassiz giebt eine Uebersicht über einige interessantere Bryozoen der Expedition des „Blake“. Abgebildet sind *Crisia denticulata*, *Diastopora repens*, *Farciminaria delicatissima*, *Membranipora canariensis*, *Cellularia cervicornis*, *Caberea retiformis*, *Vincularia abyssicola*, *Escharipora stellata*, *Tessadroma boreale*, *Hippothoa biaperta*, *Cellepora margaritacea*, *Bifustra macrodon*, *Porina subsulcata*, *Retepora reticulata* und *Heterepora* spec. (Fig. 323—337). (Three Cruises of the United States Coast and Geodetic Survey Steamer „Blake“; Vol. II — Bryozoa pag. 78—83).

Folgende Arbeiten blieben dem Referenten unzugänglich:

W. Heape: Preliminary Report upon the Fauna and Flora of Plymouth „Sound; in: „*J. Mar. Biol. Ass. Nr. II*; pag. 186—187“. 74 *Species Polyzoa*.

L. Joliet: Etudes anatomiques et embryologiques sur le *Pyrosoma giganteum*, suivies de recherches sur la Faune des Bryozoaires de Roscoff et de Menton. Paris 1888, 8., 116 S. und 5 Taf.

2. Süßwasser-Formen.

Th. Shephard veröffentlicht einige biologische Notizen über Süßwasser-Bryozoen (*The Development of the Freshwater Polyzoa*; in: *Hardwicke's Science-Gossip*, Vol. XXIV, pg. 107—109).

J. Jullien wendet sich gegen verschiedene Stellen in K. Kraepelins. „Die Deutschen Süßwasser-Bryozoen, eine Monographie“ (siehe diese Zeitschrift Jg. 1888, Bd. II, H. 3 pag. 32). Der wesentlichste Gegensatz liegt in den Anschauungen über das Verhältnis zwischen den Gattungen *Fredericella* und *Plumatella* und über die der Benennung der Arten sowie verschiedener Körperteile der Bryozoen. Zum Schluss giebt Jullien eine Liste neuer Fundorte für Süßwasser Bryozoen in Frankreich. (*Sur quelques Bryozoaires d'eau douce*; in: *Mém. Soc. zool. France*, 1888; pag. 231—244).

J. Whitelegge veröffentlicht eine Notiz, betreffend die Entdeckungsgeschichte des australischen, von Ridley beschriebenen *Lophopus*; in: *Ann. Mag. Natur. Hist.* 6. Ser. Vol. I; pag. 62.

S. Ridley spricht seine Zustimmung zu Whitelegges Berichtigung aus. — Note on *Lophopus Lendenfeldi*; in: *Ann. Mag. Natur. Hist.* 6. Ser. Vol. I; pag. 159—160.

Fr. Braem hat auch *Plumatella fruticosa* Allm. und *P. punctata* Hancock var. *prostrata* Krpl. im Osten Deutschlands (erstere bei Danzig, letztere im Pregel) nachgewiesen. Braem hält die von Kraepelin innerhalb der Art *P. princeps* vereinigten *P. fruticosa* Allman und *P. emarginata* Allm. für gesonderte Arten; dagegen will er die amerikanische Varietät von *Cristatella* (*C. Idae*) mit der deutschen (*C. genuina*) vereinen. (Untersuchungen über die Bryozoen des süßen Wassers in: *Zool. Anz.* No. 288 und 289; pag. 503 bis 509 und 533—539. — Auszug in: *Journ. R. microsc. Soc. London*; 1888, P. 6, pag. 937—938).

Ueber **A. Wierzejski**: *O mszywiolade Krajowych*. (Ueber Krakauer Bryozoen); in: *Sprawozd. Kom. fizyjogr.* XXI (2), pag. 95 bis 110.“ kann der Referent nichts aussagen.

C. Palaeontologie.

W. F. Cooper: Tabulated List of Fossils known to occur in the Waverly of Ohio (Bull. Denison Univ. V. IV, pag. 129—130).

R. Etheridge: Fossils of the British Islands, stratigraphically and zoologically arranged. V. I, Palaeozoic. Oxford. (pag. 71—73, 147, 148, 245—250, 358, 359, 411, 412, 457 u. 458).

A. F. Foerste: Sections of Fossils (Science V. XI, pag. 22).

Gautier u. Lambert: Notes pour servir à l'histoire du terrain de craie dans le sud-est du bassin angloparisien, par M. A. Perou (Bull. Soc. Yonne; V. XII, pag. 145—366).

J. Hall: Description of new species of Fenestellidae of the Lower Helderberg, with explanations of plates illustrating species of the Hamilton Group described in the report of the State Geologist for 1886 (41. Annual Report New York. Mus.; pag. 9, mit Taf. VIII—XV).

J. Hall u. G. B. Stimpson: Palaeontology of New York; VI Corals and Bryozoa, containing descriptions and figures of species from the Lower Helderberg, Upper Helderberg and Hamilton Groups; Albany 1887, 298 pag. und 66 Tafeln.

J. F. James: Sections of Fossils, (Science V. XI; pag. 50).

P. F. Kendall: The Pliocene Fossil Polyzoa (Tr. Manch. Microsc. Soc. 1887; pag. 29—34).

C. B. Keyes: On the Fauna of the Lower Coal Measures of Central Iowa (Proc. Acad. Philadelphia, 1888; pag. 225—226 mit Taf. XII).

D. P. Oehlert: Descriptions de quelques espèces dévoniennes du département de la Mayenne (Bull. Soc. Angers V. XVII; pag. 104—109).

A. Stückenberg: Koralli e Inshanke oerkhnyago yarusu Srednerusskago Kammenougoluago ezoestnyaka (Prot. Kasan Univ. N. 92).

Derselbe: Anthozoen und Bryozoen des oberen Mittlerrussischen Kohlenkalks (Mém. Comit. Géolog. V. V).

E. O. Ulrich: List of the Bryozoa of the Waverly Group in Ohio (Bull. Denison Univ. V. IV; pag. 61—96, mit Taf. XIII—XIV).

Vine: Notes on the Polyzoa of Caen and Ranville now presented in the Northampton Museum (J. Northampton Soc. V. V; pag. 1—24).

Derselbe: Notes on the Polyzoa of the Wenlock Shales; P. 1. (P. Yorks. Geolog. Polyt. Soc. V. IX; pag. 179—201, mit Taf. XII).

Derselbe: Note on the Palaeontology of the Wenlock Shales of Shropshire; (P. Yorks. Geolog. Polyt. Soc. V. IX; pag. 224—248).

Derselbe: Notes on Classifications of Cyclostomatous Polyzoa, old and new (P. Yorks. Geolog. Polyt. Soc. V. IX; pag. 346—362).

J. Young: On the Structure of *Fistulipora incrustans* Phill. (F. minor Mac Coy) (Ann. Mag. Nat. Hist. 6. ser. V. I, pag. 234—247).

Bericht

über die

Brachiopoden-Literatur des Jahres 1888.

Von
Dr. A. Collin (Berlin).

Literatur-Verzeichnis*).

Agassiz, A. Three cruises of the United States coast and geodetic survey steamer „Blake“ in the gulf of Mexico, in Caribbean Sea, and along the Atlantic coast of the United States, from 1877 to 1880. London 1888, 8°, 2 Vols., XXII, 314 & 220 pp.; 545 Figg. — Auch in: Bull. Mus. comp. Zool. Harv. Coll. XIV, XV (Brachiop. Vol. II, pp. 75—77, Figg. 313—322).

Davidson, Th. A Monograph of Recent Brachiopoda. Part III. — Trans. Linn. Soc. London. Zool. (2) IV, pt. 3, pp. 183—248, Taf. 26—30.

Grieg, James A. Undersoegelser over dyrelivet i de vestlandske Fjorde. — Bergens Mus. Aarsber. for 1887, Bergen 1888, III, 13 pp. (Brachiop. p. 5).

Heape, W. Preliminary Report upon the Fauna and Flora of Plymouth Sound. Journ. Mar. Biol. Assoc. II, pp. 153—193 (Brach. p. 185).

Heath, A. (Miss). Notes on a tract of modified Ectoderm in Crania anomala and Lingula anatina. Proc. Biol. Soc. Liverpool II, pp. 95—104, Tf. III—V. — Referat nach: Journ. R. Micr. Soc. 1889, pp. 48—49.

Holm, T. Beretning om de paa Fyllas Togt i 1884 foretagne zoologiske Undersoegelser i Groenland, 8°, 19 pp.

Keep, J. West Coast Shells. A familiar description of the Marine, Fresh-water, and Land Mollusks of the United States, found west of the Rocky Mountains. San Francisco, 1888, 8°, 230 pp., 1 Taf., 181 Figg. (Brachiopoda pp. 214—215).

*) Bezüglich der fossilen Brach. verweise ich auf die Referate des „Neuen Jahrbuches für Mineralogie“.

Lang, A. Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. I. Abth., 8°, Jena, 1888 (Brachiopoda pp. 184—185, 190, 195—196, 203, 207 bis 208, 209, 214, 225, 247, 256, 265, 276—277 mit Abbildungen).

Lo Bianco, S. Notizie biologiche riguardanti specialmente il periodo di maturità sessuale degli animali del golfo di Napoli. — Mitth. Zool. Stat. Neapel VIII, pp. 385—440 (Brachiop. pp. 405—406).

Marshall, J. T. (1) On *Terebratula papillosa* Marshall. Journ. of Conch. V, Nr. 9, p. 278.

Derselbe. (2) *Argiope decollata* at Scilly. Ebenda Nr. 12, pp. 361—362.

Norman, A. M. Museum Normanianum, or a Catalogue of the Invertebrata of Europe and the Arctic and North Atlantic Oceans, which are contained in the Collection of the Rev. Canon A. M. Norman. IV. Mollusca marina. V. Brachiopoda. Printed for private distribution. Durham, 1888, 8°, 30 pp.

Rolleston, G. Forms of Animal Life. A Manual of Comparative Anatomy, with Descriptions of Selected Types. 2nd edition, revised and enlarged by W. Hatchett Jackson. Oxford, 1888, 8°, XXXII & 937 pp., 14 Tafeln; Holzschnitte (Brachiop. pp. 692—703).

Servain, G. Catalogue des coquilles marines recueillies à Concarneau et dans la Baie de la Forest (Finistère). Lyon, 1888, 8°, 129 pp. (Brachiop. pp. 128—129).

Vogt, C. und Yung, E. Traité d'Anatomie comparée pratique, 8°, Paris, 1888, Tome I. (Brachiop. pp. 690—724, Fig. 324—336).

Allgemeines, Anatomie, Biologie etc.

Gesammte Anatomie (**Lang**).

Allgemeine Anatomie, mit besonderer Darstellung derselben an *Terebratula vitrea* Born, nebst Literaturverzeichnis (**Vogt u. Yung**).

In der Schlusslieferung der Monographie der recenten Brachiopoden behandelt **Davidson** die Genera *Crania*, *Discina*, Subgen. *Discinisca*, *Lingula* und Subgen. *Glottidia* (cf. Brachiop.-Ber. für 1886 und 1887).

Heath fand an den Seiten der Tentakeln und der Tentakelfalte bei *Crania* und *Lingula* Strecken von modificirtem Epithel, welche sich in das subepitheliale Gewebe einsenken. Diese cylindrischen Epithelzellen sind nach unten in lange farblose Fäden ausgezogen und stehen durch dieselben oft mit den Ausläufern von darunter liegenden sternförmigen Zellen in Verbindung. H. spricht diese Epithelstrecken als Sinnesorgane an.

Argiope cuneata (Risso) und *neapolitana* (Scacchi) bei Neapel mit Eiern und Larven im Februar gefunden, leben bis über 100 m tief. *Terebratula vitrea* Lm. findet sich ebenfalls über 100 m tief auf festen Gegenständen angeheftet (**Lo Bianco**).

Ueber Tiefenverbreitung amerikan.-atlant. Arten vergl. unten **Agassiz**.

Faunistik.

Norwegen: Hardangerfjord (Mosterhavn): *Crania anomala* Müll. gemein.
Waldheimia cranium Müll. gemein.

Terebratulina caput-serpentis L. sehr häufig zwischen Schwämmen (50 bis 80 Faden) (Grieg).

Scilly-Inseln: *Argiope decollata* (Chemn.).

(Verbreitung Mittelmeer, atlant. Küste von Spanien, SW.-Frankreich, Adriatisches, Aegäisches Meer, Madeira, Canarische Inseln, in Tiefen von 18 bis 130 Fad.)

Argiope cistellula (S.Wood) (Marshall [2]).

Ostküste von Nordamerika und Golf von Mexico:

Terebratula cubensis Pourt., Havana und Florida-Riff, 100—270 Fad., auf felsigem Boden gemein.

Waldheimia floridana Pourt. zwischen 100 und 200 Fad. gemein.

Terebratulina cailleti Crosse, bis 500 Fad. tief, weniger häufig.

Terebratulina caput-serpentis (L.), längs der Küste der Ver. Staaten.

Platydia anomioides (Scacchi) 237 Fad.

Crania pourtalesi Dall (von Pourt. gesammelt).

Discina atlantica King, in Tiefen von über 2000 Faden (Agassiz).

Systematik.

Terebratula papillosa Marshall, nicht recent, sondern mit *Terebratulina striata* Orb. (aus der Kreide) identisch (Marshall [1]).

Bericht

über

die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der
Echinodermen im Jahre 1888.

Von

Dr. Maximilian Meissner (Berlin).

I. Verzeichniss der Publicationen*).

Agassiz, A. Three cruises of the U. S. coast a. geodetic survey steamer „Blake“ in the gulf of Mexico, in the Carribean sea and along the Atlantic coast of the U. S. 1877—80. Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard College. Vol. 14 u. 15. Cambridge. — Auch separat, London, 1888. 2 Vol.

Populär. Echinodermen vol. II. (resp. 15.) pp. 84—127. Abbild. von Tiefsee-Typen der Klasse: Fig. 338—421a. In vol. I (resp. 14.) bei der pelagischen Fauna Ech.-Larven abgebildet.

Barrois, Th. Liste des Echinodermes recueillis aux Açores durant les mois d'août et septembre 1887. Revue biolog. du Nord d. l. France (Lille) 1. Année No. 1. pp. 31—33. 2. pp. 69—75. 3. pp. 109—115.

1. Antedon; 2 Asterias, 1 Asterina, 1 Astropecten, 1 Ophiaster; je 1 Ophiothrix, Ophioglypha, Amphiura, Ophiocoma; je 1 Centrostephanus, Arbacia, Strongylocentrotus, Echinus, Sphaerechinus, Echinocardium, Brissus; 1 Holothuria. Diese von Ludwig bestimmten Arten sind sämtlich Mittelmeerspecies mit Ausnahme von Ophiocoma nigra, die in den nordeuropäischen Meeren heimisch ist. (Siehe unten auch Simroth; d. Azorenfauna.)

Bell, J. (I) On the Echinodermata of the sea of Bengal. Rep. 57. meeting Brit. Assoc. for the advanc. of sc. 1888. p. 716.

Ausführliche Aufzählung der Echinoderm. d. Bengal. Meeres in Proc. Zool. Soc. London III. 1888 p. 387—389. [vergl. Bericht 1887. p. 73]. (cf. auch Döderlein Echinod. v. Ceylon.)

*) Bezüglich der fossilen Echinodermen verweise ich auf die Referate im Neuen Jahrbuch für Mineralogie.

Bell, J. (2) Notice of a remarkable Ophiurid of Brazil. Ann. and Mag. Nat. Hist. (6) I. 1888 pp. 368—370. — Ausz.: Journ. Roy. Micr. Soc. 1888 p. 591.

Ophionephthys (?) *sesquipedalis* n. sp. von Itamaraca bei Pernambuco, Brasilien; zeichnet sich durch die ungeheure Länge der Arme im Verhältniss zum Durchmesser der Scheibe aus. Bei *Ophiothrix longipeda*, die bisher die grössten Arme aufwies, ist dies Verhältniss 1:18, bei der n. sp. 1:37,5, da Diskusdurchmesser = 4 mm, während die Arme = 150 mm lang.

Bell, J. (3) Notes on Echinoderms collected at Port Philip by Mr. J. Bracebridge Wilson. Ebenda: (6) II. 1888 pp. 401—407.

Bei Port Philipp (SO.-Austral.) gefunden: 2 *Antedon* (beide neu), 1 *Actinometra*. — Je 1 *Asterias*, *Plectaster*, *Nectria*, *Tosia*, *Palmipes*, *Asterina*, *Patiria*, *Astropecten*. — Je 1 *Pectinura*, *Ophiothrix*, *Ophiomyxa*. — 1 *Goniocidaris*, 2 *Amblypneustes*, 1 *Microcyphus*, 2 *Strongylocentrotus*, 1 *Lovenia*. — Je 1 *Molpadia*, *Cucumaria*, *Colochirus* und 2 od. 3 *Holothuria*. — Vorl. Mittheilg., da Material besonders d. *Holoth.* noch nicht ausreichend zur genügend. Beschreibg. mehrerer wahrscheinlich n. sp.

Bell, J. (4) Descriptions of four new species of Ophiurids. Proceed. Zoolog. Soc. (London) 1888. III. pp. 281—284 pl. XVI.

Schon im vorjährigen Bericht p. 74 besprochen.

Bell, J. (5) Report on a collection of Echinoderms made at Tuticorin, Madras, by Mr. Edg. Thurston. Ebenda: III. pp. 383—389.

Schon im vor. Bericht besprochen p. 73.

Bell, J. (6) A note on *Echinaster decanus* M. T. Proc. Linn. Soc. N. South Wales 1888 (2) II. 4 pp. 1074—1075, cf. Amer. Naturaliste XXII p. 360.

Ech. dec. von Port Jackson (SO.-Austr.).

Brock, J. Die Ophiuriden-Fauna des indischen Archipels. Ztschr. f. wiss. Zool. XLVII (3). pp. 465—539.

Br. sammelte bei Amboina und bei den beiden Koralleninseln Pulo Edam u. Nordwaachter Eiland bei Batavia 60 Ophiurenarten, darunter sind 3 neue Genera und 17 neue Arten (incl. der von Ludwig s. d. (1) beschriebenen *Ophiopteron elegans*); hierzu kommen noch 2 neue Species der Göttinger Sammlung, die Verf. beschreibt. Am Schlusse ist die bisher bekannte Ophiuridenfauna des indisch pacifischen Oceans zusammengestellt, es sind 132 Arten, die sich durch Einziehung unhaltbarer auf ca. 120 verringern werden, d. s. ca. 40 % aller bisher bekannten Flachwasserformen, ein neuer Beweis für den ungeheuren Reichthum der indischen Litoralfauna. — Bestimmungstabellen der bekannten Arten der Gattungen: *Ophioplepis*, *Ophiocoris*, *Ophionereis*, *Ophiarachna*, *Ophiomastix* und *Ophiomyxa*, sowie solche der indopacifischen Species von *Amphiura*, *Ophiocnida* und *Ophiothrix*. — cf. System.

Bury, H. (1) On the early stages in the development of *Antedon rosacea*. Rep. 57. meeting Brit. Assoc. for the advanc. of sc. London 1888 p. 735. — cf. (2).

Bury, H. (2) The early Stages in the development of *Antedon rosacea*. Phil. Transact. Roy. Soc. (London) CLXXIX. 1888 pp. 257 bis 301 pl. XLIII—XLVII. — Ausz.: Proc. Roy. Soc. London Bd. 43 pp. 297—299 und Journ. Roy. Micr. Soc. 1888 p. 232 und Nature 37. Bd. p. 287.

Verf. stellt seine Hauptresultate in Folgendem zusammen: Das Mesoblast entsteht aus den Wänden des Urdarms nach der Einstülpung. — Der Blastoporus schliesst sich sehr früh [am 3. Tage] am oder in der Nähe des hinteren Pols. — Der Urdarm bildet 4 Coelomtaschen, 1) die vordere Leibeshöhle, 2) das Hydrocoel, 3) u. 4) die rechte und linke Leibeshöhle. — Das Hydrocoel bildet einen Ring auf der Ventralseite des Darmkanals und öffnet sich später mittelst des Wasserschlauchs (water tube) in die vordere Leibeshöhle, welche mit der Aussenwelt durch den Wasserporus communicirt. — Die rechte und linke Leibeshöhle werden zur vorderen resp. hinteren und später zur aboralen resp. oralen. Aus der ersteren entsteht das gekammerte Organ [Blutgefässsystem]. — Nach Festsetzung der Larve mit Hülfe des „präoralen Grübchens“ stülpt sich der Mund der Larve ein und bildet das Vestibulum, das an das hintere Ende gerückt ist. — Das axiale Organ [sog. Herz] wächst von dem Stiele auf in der Axe des Körpers. — Ausser den schon aus früheren Beschreibungen bekannten Skeletttheilen werden 3 „Unterbasalstücke“ [Infrabasalia] gebildet, die mit dem ersten Stielgliede verschmelzen [sie bilden also zusammen das Centrodorsalstück]. Der After öffnet sich in demselben Interradius, wie der primäre Wasserschlauch (Steinkanal). — Zum Schluss stellt Verf. noch in einem Addendum die Abweichungen seiner von Barrois' [Recueil Zool. Suisse IV. cf. Bericht 1886 und 1887] Resultaten zusammen.

Carpenter, P. H. (1) Report upon the Crinoidea collected during the voyage of H. M. S. Challenger. Part. II. The Comatulæ. Chall. Rep. Zool. Vol. XXVI. pp. 1—357 pl. I—LXX. 6 Holzschnitte. — Ausz.: Journ. Roy. Micr. Soc. 1888 p. 962 und Ann. Nat. Hist. (6) III p. 504—510.

Carp. bespricht nach einer allgemeinen Einleitung das Centrodorsale und den Calyx und giebt eine Uebersicht über die geogr. u. bathometr. Verbreitung, der sich ein Abschnitt über die geolog. Geschichte der Comat. anschliesst. Ueber das übrige cf. System.

Carpenter, P. H. (2) Report on the Comatulæ of the Mergui Archipelago collected by Dr. J. Anderson. Linn. Soc. Journ. Zool. Bd. 21 pp. 303—316. 2 Tfln.

5 *Antedon* (1 neu), 1 *Actinometra* (neu), cf. System.

Carus, J. V. Echinodermata-Litteratur: Zool. Anz. XI. 1888. pp. 3—4 und 406—408.

Cuénot, L. (1) Études sur le sang, son rôle et sa formation dans la série animale. 2^e partie: Invertébrés. Arch. zool. expér. (2) V. 1887 p. XLIII.

Verf. bestreitet das Vorkommen von Hämoglobin bei den Echinodermen; das albuminogene Ferment von gelber Farbe findet sich in den Amöbocyten die in einer Flüssigkeit schwimmen, welche aus reinem Meerwasser besteht, in dem nur eine geringe Menge von Albumin gelöst ist. Diese Amöbocyten sind also die einzigen nährenden Theile in der Blutflüssigkeit der Echinodermen.

Cuénot, L. (2) Contribution à l'étude anatomique des Astérides. Ebenda: V. (Tome supplémentaire) 1887 pp. 1—144, Tfl. 1—9.

Verf. giebt eine ausführliche anatomisch-histologische Uebersicht der Asteriden mit Berücksichtigung der bisher bekannten Untersuchungsergebnisse. Er bespricht zuerst das Bindegewebe und die Musculatur, sodann das Integument, die Hautkiemen („branchies lymphatiques“), die Pedicellarien und die Autotomie. Es folgen die Capitel über den Verdauungstractus, das Nervensystem, die Blutflüssigkeit das Ambulacralgefäßsystem, das Blutgefäßsystem, die geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung. Einige kurze die Systematik, geograph. Verbr. und die Verwandtschaftsverhältnisse der Echinodermenabtheilungen zu einander berührende Bemerkungen bilden den Schluss der schönen Abhandlung. — Die von Cuénot untersuchten Species sind folgende aus dem Canal (Roscoff & Banyuls sur mer): *Asterias glac.*, *rubens*, sp.; *Cribrella oculata*; *Echinaster sepos.*; *Solaster papp.*; *Asterina gibb.*; *Palmipes membran.*; *Astropecten aurant.*, *spinulosus*, *squamatus*, *platyacanth.*; *Luidia ciliaris* — und aus dem rothen Meer (Obock und Gubbet Kharab): *Ophiaster chinensis*; *Asterina wega*; *Culcita coriacea*; *Pentaceros turritus*; *Gymnasteria carinifera*; *Astrop. hystrix*.

Cuénot, L. (3) Etudes anatomiques et morphologiques sur les Ophiures. Ebenda: VI. 1888 1. pp. 33—82 pls. III—V. — Ausz.: Journ. Roy. Micr. Soc. 1888 p. 958.

Verf. giebt eine genaue anatomische Uebersicht über den Ophiurenkörper immer im Vergleich mit den Asterien. Er bespricht das Tegument, die Autonomie und den Verdauungstractus. Es folgen die Beschreibung des Nervensystems [vergl. Ber. 1887], die Blutflüssigkeit [cf. Cuénot (1)], das Ambulacral- und Gefäßsystem, die Geschlechtsorgane und Angaben über die Fortpflanzung. — In einem kurzen systematischen Abschnitte tritt Verf. für die Gleichwerthigkeit der beiden Unterklassen der Asteriden und Ophiuriden ein und verwirft die Zusammenziehung beider in eine Unterklasse der Asteroidea. Nach Verf. ist *Ophiothrix versicolor* Apostolidés = *O. rosula* Forb. — Seine Resultate stellt er in Folgendem zusammen: Die Ophiuren zeigen gewisse Charactere sehr junger Asterien, hauptsächlich im Verdauungstractus, Ambulacral- und Gefäßsystem, welche beinahe denen junger *Astropecten* oder *Luidien* nachgebildet zu sein scheinen, wenn diese in dem Augenblick verglichen werden, wo bei ihnen der Steinkanal erst einen einzigen Porus hat und der Darm noch keine drüsigen Anhänge besitzt. — Die Ophiuren sind von den Asterien in der Hinsicht verschieden, dass bei ihnen (Oph.) die Kalktheile die Ambulacralrinne vollständig bedecken;

das Nervensystem ist höher entwickelt und mehr differenzirt. — Die Euryaliden bieten neben sehr zahlreichen den Ophiuren eigenthümlichen Characteren bemerkenswerthe Vollkommenheiten des Ambulacralyst. (Madreporenplatte), des Gefäßsyst. (Gefäße der eiförmigen [Lymph-]Drüse und des Oesophagus) und des Nervensyst. (Nervenäste am Oesophagus) dar.

Döderlein, L. Echinodermen v. Ceylon. Ber. üb. d. von d. Herrn Dr^s Sarasin gesamm. Asteroidea, Ophiuroidea u. Echinoidea. Zool. Jahrb. Abth. f. Syst. etc. III. 1888 p. 821—846, Tfl. 31—33.

I. Asteroidea: 1 Acanthaster, 1 Pteraster, 1 Asterina, 1 Disasterina (neu), 1 Linckia, 2 Fromia, 2 Scytaster, 1 Goniodiscus, 1 Pentaceros, 1 Culcita, 1 Gymnasteria, 3 Astropecten (2 neu), 1 Luidia. — II. Ophiuroidea: 2 Pectinura, 2 Ophiolepis, 2 Ophiocoma, 1 Ophiarthrum, 1 Ophiomastix, 1 Ophiothrix, 1 Ophiocnemis. — III. Echinoidea: 1 Diadema, 1 Astropyga, 1 Asthenosoma [neu cf. Sarasin (5)], 1 Echinometra, 1 Stomopneustes, 1 Pseudoboletia, 1 Echinostrephus, 1 Microcyphus, 2 Salmacis, 1 Echinus, 1 Toxopneustes, 1 Tripneustes, 1 Laganum, 2 Echinodiscus, 1 Maretia, 1 Lovenia. — Zusammenstellung der bis jetzt bekannten Echinodermenfauna von Ceylon (excl. Holoth.): 19 Asteroidea, 17 Ophiuroidea und 24 Echinoidea (cf. Bell, Echinod. d. Bengalischen Meers).

Duncan, P. M. On some points in the anatomy of the Temnopleuridae. Ann. and mag. Nat. Hist. (6). 1. 1888 p. 109—131, pl. XI.

D. beschreibt eingehend die Structur der Ambulacralplatten von Temnopleurus, Salmacis, Mespilia, Microcyphus, Amblypneustes und Holopneustes und giebt zu jeder Gattung Abbildungen der aus 3 kleineren Plättchen zusammengesetzten Ambulacralplatte der jeweiligen Hauptspecies mit den 3 Paaren von Porenkanälen, die von aussen nach dem Inneren der Schale zu divergiren. „Diese sogenannte paarige Anlage und Divergenz der Ambulacralporen hat nicht die geringste physiologische Wichtigkeit und ob zwischen den Poren auf der Aussenseite der Schale eine Grube liegt oder ein Körnchen oder Knötchen sich erhebt, kann für eine natürliche Einteilung nicht als Unterscheidungsmerkmal dienen.“ — Verf. bespricht dann noch die Muskelzusammensetzung der primären Stacheln, die Histologie der Kiemen (Abb. entkalkter und unentkalkter K.), Ampullen und Füßchen der Temnopleuriden.

Duncan, M. & Sladen, P. On the Echinoidea of the Mergui Archipelago, collected for the Trustees of the Indian Museum, Calcutta by Dr. J. Anderson. — Linn. Soc. Journ. Zool. Bd. 21 p. 316—319.

1 Temnopleurus, 3 Salmacis, 1 Laganum. 1 Arachnoides. Keine n. sp. Die aufgezählten sind bekannte indische Arten.

Durham, H. E. (1) The emigration of amoeboid corpuscles in the starfish. — Proc. Roy. Soc. London. Bd. 43 1888 p. 327—330 Taf. 3.

Bei *Aster. rubens* wurden die Farbepartikelchen von chinesischer Tusche oder präcipitirtem Anilinblau, die in die Leibeshöhle injicirt wurden, von den amoeboiden Zellen, die in der Cölomflüssigkeit schwimmen, aufgenommen und durch die Wandungen der Kiemenbläschen nach aussen befördert. Auf demselben Wege wandern auch die „*sphaeruliferous corpuscles*“ [Plasma-Wanderzellen] nach aussen.

Durham, H. E. (2) Note on the madreporite of *Cribrella ocellata*. — Ebenda p. 330—332. 2 Holzschn.

Beschr. zweier verticalen Längsschnitte durch das Madreporensystem einer Cribr., bei der 2 Madreporenkanäle mit dem schlauchförmigen Kanal in Verbindung stehen, während die anderen in den Steinkanal münden.

Edwards, Ch. L. Notes on the development of *Holothuria*. *Americ. Naturalist* Bd. 22 1888 p. 845.

Vorl. Mitth., cf. Bericht 1889.

Fewkes, J. W. On the development of the calcareous plates of *Asterias*. *Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll.* Vol. XVII No. 1 1888, p. 1—56, Tfl. I—V. Ausz.: *Journ. Roy. Micr. Soc.* 1889, p. 61 bis 62. — cf. *Amer. Naturaliste* XXII, p. 1030.

Verf. fasst seine Resultate in Folgendem zusammen: 1. Die ersten Platten, die in dem jungen Ast. entstehen, sind die Terminalpl. Die Platten sind einfach (nicht gebildet durch Zusammenschmelzung von mehreren Verkalkungen). Sie bilden eine Schutzkappe, die die frisch gebildeten Ambulacralpl., Interambulacralpl. und möglicherweise Marginalpl. schützt. — 2. Die Genitalpl. entstehen nach den Terminalpl. Die Genitalplatte, welche nahe der Madreporenöffnung liegt, tritt nicht immer früher auf und ist nicht immer grösser als die anderen Genitalpl. — 3. Der Madreporenkörper, Madreporenplatte, ist eine späte Bildung (nach den Rudimenten des Steinkanals). — 4. Die Dorsocentralpl. entsteht nach den Terminal- und Genitalpl. aber vor allen Platten der Bauchseite. — 5. Die ersten Platten, die sich im Körper nach den Genitalpl. bilden, liegen radial in einem Kreise zwischen den Genitalpl. Der 2. Kreis ist ebenfalls radial um diesen ersteren Kreis oder die Radialpl. gelagert. Ein dritter innerer Kreis erscheint vor den Interradialpl. — 6. Die erste Platte im äusseren Kreise um die Genitalpl. ist die erste Dorsalpl. der Arme. Diese Pl. („Radial“ — Sladen) bleibt, wenn der Arm des jungen Seesterns vom Körper abgebrochen ist, immer an dem Arme als Rest. — 7. Die Dorsalpl. oder die Mittel-Reihe der Platten an der Dorsalfläche des Arms, entstehen peripherisch um die erste Dorsalpl. („Radial“) und sind zuerst relativ sehr breit. — 8. Die Dorsolateralpl. erscheinen nicht in derselben Folge wie die Dorsalpl. (Die älteste Dorsolateralpl. bleibt nicht die nächste am Körper). — 9. Die Marginalpl. erscheinen nach den Ambulacralpl. und vor (das ist nicht ganz sicher) den Interambulacralpl. (Adambulacralpl.). 9a. Die oralen Ambulacralpl. sind die ersten Pl., die auf der Bauchseite gebildet werden. Wenn sie erscheinen, sind

schon folgende Verkalkungen auf der Rückenseite vorhanden: 5 Terminal-, 5 Genital-, 1 Dorsocentralpl., 30 Stacheln auf der Terminalpl. — 10. Die oralen Ambulacralpl. sind zuerst den radiären „culs de sac“ des Wassergefäßsystems parallel. Bei ihrem späteren Auswachsen lagern sie sich rechtwinklig zu denselben. Sie sind zuerst 10 an Zahl. — 11. Die interbrachialen Enden der oralen Ambulacralpl. des anliegenden Radius (Arms) wachsen gegen einander zu und bilden 2 parallele Enden in jedem Interradius, von denen jedes 2 Stacheln trägt. Das mittlere Ende von jeder oralen Ambulacralpl. gabelt sich in einen dorsalen und ventralen Theil. — 12. Alle anderen Ambulacralpl., ausser den oralen, entstehen mit Axen, die rechtwinklig zur Radiuslinie liegen. Sie bilden sich in der Nähe der Medianlinie der Armunterseite und wachsen nach der Peripherie hin. Die adoralen Pl. werden zuerst gebildet. Sie gabeln sich in der Nachbarschaft der Medianlinie. — 13. Die ersten Interambul.- (Adambul.-)pl. bilden sich nach den correspondirenden Ambulacralpl. in den Zwischenraum zwischen den Randenden der sich folgenden Paare derselben. Ihr Centrum der Verkalkung ist von Anfang an verschieden von dem der Ambulacralpl. — 14. Die Marginalpl. bilden sich vor (?) den Interambul.- (Adambul.-)pl. — 15. Die ersten Interbrachialpl. (zähnetragende Pl.) entstehen als herzförmige, interrädial gestellte Verkalkungen, 5 an der Zahl, jede rückenständig gestellt zu den interbrach. Enden der oralen Ambulacralpl. In einem Falle wurden 4 primäre beobachtet, diejenige, welche in demselben JR. mit dem Madreporienkanal liegt, war in ihrer Grösse zurückgeblieben. Die primären Interbrachialpl. liegen nicht ganz verborgen, wie bei den Tiefsee-Aster. Wenn die primären (zähnetrag.) Interbrachialpl. sich bilden, haben folgende Pl. zu erscheinen begonnen: 5 Terminal-, 5 Genital-, 1 Dorsocentral-, 10 orale Ambulacral-, 20 Ambulacralpl. — 16. An der Bauchseite wurde eine embryonale Reihe von Stacheln oder Pl. bei den untersuchten genus und spec. nicht beobachtet. — Verf. hat beim Vergleichen der Resultate seiner früheren Arb. (cf. Bericht 1887) über *Amphiura* mit denen über *Asterias* folgende Anschauungen gewonnen: 17. Die Genitalpl. von *Asterias* sind als Homologa der „Basalpl.“ von *Amphiura* anzusehen. — 18. Die primäre (zähnetragende) Interbrachialpl. ist homolog den Oralpl. von *Amphiura*. — 19. Die Madreporen-Oeffnung ist an 2 nicht homologen Pl. bei *Asterias* und *Amph.* gelegen. — 20. Die Genital-, Dorsocentral-, Dorsal-, Interambulacral- und Terminalpl. sind bei *Amphiura* (in gleicher Reihenfolge der Namen) den Basal-, Dorsocentral-, Dorsal-, Lateral- und Terminalpl. homolog. — 21. Die Ambulacralpl. von *Aster.* sind homolog den „löffelförmigen Pl.“ von *Amph.* — 22. Die „primären und secundären Adambulacralpl.“ von *Amph.* haben keine Homologa unter den Mundpl. bei *Aster.* — 23. Die Ventralpl. auch nicht. — 24. Das Dorsocentrale und die Verbindungsstücke der Arme konnten bei *Amph.* nicht erkannt werden. Die Homologie der Marginalpl. ist zweifelhaft, sie haben wahr-

scheinlich keine Homologa bei Amph. Möglicherweise sind die Marginalpl. den Lateral-(Adambulacral-)pl. homolog.

Fleischmann, A. Die Entwicklung des Eies von *Echinocardium cordatum*. Ztschrft. f. wiss. Zool. XLVI. 1888, p. 131—142, pt. XIV. — Ausz.: Journ. Roy. Micr. Soc. 1888, p. 590.

Verf. beschreibt die ersten Furchungsvorgänge, die er in Neapel an künstlich befruchteten Eiern von *Echinocardium cordatum* (Penn.) verfolgte. Das runde Ei wird nach der Befruchtung elliptisch und nach ca. 90 Minuten tritt die I. Furchungsebene und zwar zuerst am animalen und erst später am vegetativen Pole auf. Die Theilungshälften sind also von Anfang an ungleich. Ca. 60 Min. später erscheint die II. (verticale) und nach weiteren 40 Min. die III. (äquatoriale) Furchungsebene. Zur weiteren Furchung des Eies verbinden sich von jetzt an immer 2 Ebenen, von denen der Verf. die der verticalen parallelen als Orthoplane und die der äquatorialen parallelen Furchungsebenen als Isoplane bezeichnet. Nach ca. 45 Min.: IV. und V. Isoplane und zwar tritt IV. wieder zuerst am animalen Pole auf; VI. und VII. Orthoplane und VIII. und IX. Isoplane. Die folgenden Theilungsebenen konnte Verf. nicht mehr so genau verfolgen, er geht deshalb sogleich zur Darstellung der Mesenchymentwicklung über. Nach Ablauf der Furchung streift die entstandene Blastula die Dotterhaut ab und beginnt an der Oberfläche des Wassers ein freies Leben zu führen. Als bald treten am vegetativen (oralen) Pole die 4 Urmesenchymzellen auf, die wahrscheinlich die letzten deutlichen Reste der vegetativen Polzellen sind. Die Urmesenchymzellen schnüren in das Innere der Blastula hin die eigentlichen Mesenchymzellen ab, die sich dort beiderseits in 2 parallelen Reihen ordnen. Die Keimstätte des Mesenchyms sind also die am oralen Pole gelegenen Urmesenchymzellen [gegen Bergh und Greeff]. Aus der Blastula entwickelt sich durch Einstülpung die Gastrula und weiter in gewöhnlicher Weise der Pluteus. — „Das Ei von *Echinocardium* liefert ein ausgezeichnetes Beispiel für die „aequale Furchung mit polarer Differenzirung“ [Selenka].“ Am Schlusse der Arbeit giebt Verf. eine „übersichtliche Zusammenstellung“ der bisher bei den Echinodermen bekannten Furchungsweisen. — Die Tafel enthält neben Abb. von Furchungsstadien auch eine solche eines Pluteus 115 Stunden nach der künstlichen Befruchtung.

Griffiths, A. B. Further researches on the physiology of Invertebrates. Proceed. Roy. Soc. (London) XLIV. 1888, p. 325—327. — Ausz.: Journ. Roy. Micr. Soc. 1888, p. 958. — cf. Amer. Naturaliste XXII, p. 746.

In dem klaren Secretionssafte der 5 Magentaschen von *Asterias rubens* wurde chemisch und mikroskopisch Harnsäure constatirt. Harnstoff, Guanin und Calciumphosphat konnten darin nicht entdeckt werden. Verf. spricht deshalb den 5 Magentaschen der Asteriden Nierenfunktion zu.

Grisard, J. Etoiles de mer comme engrais. — Bull. soc. nationale d'acclimatation de France, (4), Tome V, 35. Jhrg. Paris 1888, 80.

Seesterne werden als Dünger in Holland zur Cultur von Blumenkohl und im Boulonais mit Erfolg zur Cultur von Kartoffeln angewendet, 3—4 Seesterne auf 1 qm.

Hamann, O. Vorläufige Mittheilungen zur Morphologie der Crinoiden. 1. Das Nervensystem. Nachr. d. Kgl. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, 1888, No. 5, p. 127—131. — Ausz.: Journ. Roy. Micr. Soc. 1888, p. 432.

Verf. unterscheidet ein epitheliales (subepithelialer Nervenplexus Ludwig's u. a.) und ein in der Binde substanz gelagertes Nervensystem. Ersteres entspricht dem Schlundring und den Ambulacralnerven der anderen Unterklassen. Das letztere zerfällt in den ventralen (oralen) und in den dorsalen (aboralen) Theil des mesodermalen Nervensystems. Während dem epithelialen Plexus ein Centrum (Schlundring) fehlt, besitzen die beiden Theile des mesodermalen ein Centralorgan. Verf. glaubt in Folge dieser Entwicklung des Nervensystems die Crinoiden als phylogenetisch höchst stehende Unterklasse der Ech. ansprechen zu müssen.

Hartog, M. On the true nature and function of the madreporic system in Echinodermata. Rep. 57. meeting Brit. Assoc. for the advanc. sc. London 1888, p. 736.

cf. Ref. im Bericht 1887, p. 68.

Haycraft, J. B. und Carlier, E. W. On Invertebrate blood removed from the vessels and entirely surrounded by oil. Proc. Roy. Soc. Edinburgh XV. 1888, p. 423—426, Echinod. p. 425.

Seeigelblut, das dem trepanirten Interambulacral-Raum mit einer in Castor-Oel getauchten Pipette entnommen wurde, hielt sich 30 bis 40 Minuten in diesem Medium (Castor-Oel), ohne zu coaguliren.

Heape, W. Echinoderma in: Prelim. Report upon the Fauna and Flora of Plymouth Sound.: Journ. of the Marine Biological Association of the United Kingdom. II, p. 167—168.

Antedon rosac. — *Asterias rub.*, *viol.*, *glac.*; *Asterina gibb.*; *Goniaster equestr.*; *Solaster papp.*; *Porania pulv.*; *Astropecten irreg.*; *Cribr. ocul.*; *Luidia savign.*, *sarsi.* — *Ophiura text.*, *alb.*; *Ophiocoma negl.*, *filif.*, *granul.*; *Ophiothrix frag.* — *Echinus esc.*, *acut.*; *Echinocyamus pus.*; *Spatangus purp.*; *Amphidetus cord.* — *Holothuria nigra*; *Cucumaria hyndm.*, *pentactes*; *Ocnus brunn.*; *Synapta dig.*; *Thyone papillosa.* —

Heilprin, A. Contributions to the Natural History of the Bermuda Islands. Proceed. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1888, pt. 3, Ech. p. 309—318. 2 Tfln.

3 *Holothuria* [1 neu], 1 *Semperia* [neu], 2 *Stichopus* [beide neu] — 1 *Asterias*, 1 *Ophidiaster* — 2 *Ophiocoma*, 1 *Ophiostigma*, 1 *Ophiactis*, 1 *Ophionereis*, 1 *Ophiomyxa* — 1 *Cidaris*, 1 *Diadema*, 1 *Echinometra*, 1 *Toxopneustes*, 1 *Mellita*. Die Ophiuriden hat Ives bestimmt. — cf. System.

Héronard, E. Les Holothuries de Roscoff et de Banyuls-sur-mer. Compte-rend. 16. session (1887). Assoc. Franc. pour l'avanc. des sc. (publ. 1888) pt. 2, p. 678—680.

Liste der Species: 4 Holothuria, 1 Stichopus, 1 Colochirus, 2 Ocnus, 5 Cucumaria, 1 Semperia, 2 Thyone, 2 Synapta. — Einige Bemerkungen über die Bildung der Kalkkörper und das Blutgefäßsystem der neuen Art Colochirus lacazei (schon beschrieben Compt. rend. Tome CV., p. 234—236, vergl. Ber. 1887, p. 77).

Ives, J. E. On two new species of starfish. Proceed. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 1888, pt. 3, p. 421—424. Holzschn.

Pteraster tesselatus n. sp.

Coronaster bispinosus n. sp.

Jickeli, F. Vorläufige Mittheilungen über das Nervensystem der Echinodermen: 2. Ueber das Nervensystem der Asteriden. Zool. Anz. 1888, XI. Jahrg., No. 282, p. 339—342. — Ausz.: Journ. Roy. Micr. Soc., p. 741.

Das Nervensyst. der Ast. besteht nach dem Verf. aus folgenden Theilen: 1. dem Ambulacrarnervensystem, 2. dem subepithelialen Plexus der Körperoberfläche, 3. dem Lange'schen Nerven und 4. dem Darmnervensystem, deren feinerer histiologischer Bau beschrieben wird.

John, G. Ueber bohrende Seeigel. Dissertation Leipzig 1888, 46 p., I. Tfl. cf. Arch. f. Naturg. 1889, I. Bd., p. 268—302.

Verf. hat die von Simroth bei seinem Aufenthalt auf den Azoren losgeschlagenen Gesteinsstücke mit Löchern von Seeigeln untersucht. Simroth fand um und in den Löchern immer Kalkalgen angesiedelt und vermuthete einen Zusammenhang zwischen diesen und dem Bohren der Seeigel. — Verf. giebt den 5 Hauptkapiteln seiner Arbeit folgende Ueberschriften: I. Historisches über Gesteinshöhlen bewohnende Seeigel; II. Die Handstücke von den Azoren und aus der Bretagne; III. Wie und warum bohren die Seeigel; IV. Welche Beziehungen bestehen zwischen den Kalkalgen und den bohrenden Seeigeln; V. Uebersicht über d. Gesteinshöhlen bewohnenden regulären Seeigel. — Seine Resultate fast Verf. in folgendem zusammen:

„Die in den Gesteinen gefundenen und von Seeigeln bewohnten Höhlen rühren von diesen selbst her. Der Echinus erzeugt seine Wohnstätten mittelst seines Kauapparates und sekundär mit Hilfe der Stacheln durch rotierende Bewegung. Er bohrt sich solche Höhlungen, um einen Schutz gegen das brandende Meer zu haben.

Die Kalkalgen, welche die von Seeigeln bewohnten Gesteine bedecken, lagern sich mechanisch auf das Gestein und haben keinen Einfluss auf die chemische Beschaffenheit der Oberfläche desselben, können daher auch nicht mit dem Entstehen der Echinushöhlen in Zusammenhang gebracht werden.“

Lövén, S. On a recent form of Echinoconidae. Bih. till Kongl. Svenska Vet.-Akad. Handl., Bd. 13, Abth. IV, No. 10, p. 1—25, 2 Tfln. Ausz.: Journ. Roy. Micr. Soc. 1889, p. 67.

Verf. beschreibt und bildet ab einen recenten Vertreter der palaeontologisch wichtigen Familie der Echinoconidae, den er früher (1874 in seinen *Etudes sur les Echin.* p. 69 Anm.) als *Pygaster relictus* aufgeführt hat, er nennt ihn jetzt *Pygastrides relictus* (Lov.) Fundort: Caraibisches Meer bei den Virginischen Inseln, 200 bis 300 Faden tief.

Ludwig, H. (1). *Ophiopteron elegans*, eine neue, wahrscheinlich schwimmende Ophiuridenform. *Ztschrift. f. wiss. Zool.*, 47 Bd., p. 459–464, 1 Tfl. — Uebersetzung: *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 1889, III, p. 44–49.

L. beschreibt hier eine Ophiure, *Ophiopteron elegans* n. g. n. sp. [verwandt mit *Ophiothrix*], die er zwischen den von ihm bearbeiteten Holothuriern des ind. Oceans von Brock [cf. (2)], auffand. Das Exemplar zeichnet sich dadurch vor allen bisher bekannten Schlangenternen aus, dass jedes Armglied ein Paar grosser Flossen trägt, die wohl keinen anderen Zweck haben können, als dem Thiere eine schwimmende Fortbewegung zu ermöglichen.

Ludwig, H. (2). Die von Dr. Brock im Indischen Archipel gesammelten Holothuriern. *Zool. Jahrb. Abth. f. Syst. Geog. u. Biol.* 3. Bd. 1888, p. 805–820, 1 Tafel.

Aufgezählt werden von Aspidochiroten: 20 Holothuria, (4 neu), 3 Stichopus, 2 Mülleria; von Dendrochiroten: 1 Orcula, 1 Phyllophorus (neu), 2 Pseudocucumis, 1 Actinocucumis, 1 Colochirus; von Synaptiden: 4 Synapta, 4 Chiridota (1 neu). Die Exemplare stammen von Amboina resp. von Batavia: s. o. Brock; vergl. auch System.

Marshall, W. Die Tiefsee und ihr Leben. Nach den neuesten Quellen gemeinfasslich dargestellt. Leipzig 1888.

Populär. Tiefseeechinodermen. Abb.

Martens, E. von. Vorzeigung eines Echinaster spinosus Retz. Sitz. Ber. Ges. naturf. Freunde Berlin. Jahrg. 1888, p. 149.

Ueber 100 Jahre altes, noch gut erhaltenes Exemplar, welches die Gesellschaft 1781 von Hofrath Gleditsch erhalten hat.

M'Intosh. Reports from F. B. marine station of St. Andrews, III.: Note on Podalirius typicus occuring on Asterias rubens. — 6 ann. Rep. Fish. Board Scotl. part III., p. 274. —

Commensalismus! vergl. Ber. d. Carcinologie 1888, p. 367.

Norman, A. M. Museum Normanianum, a catal. of the Invertebr. of Europe, Arctic. a. Atlantic Oc. — Houghton le Spring. 1886. Gedruckt für Privatvertheilg. — Ech. p. 6–8.

Crinoidea: 6 — Ophiuroidea: 50 + 3 schrift. zugefügte — Asteroidea: 55 + 4 MS. — Echinoidea: 134 — Holothurioidea: 189 + 7 MS.

Perrier, E. Sur la collection d'Etoiles de mer recueillie par la Commission scientifique du cap Horn. *Compt. Rend. Tome 106*, p. 763–765. Ausz.: *Amer. Naturaliste XXII*, p. 540.

Die wissenschaftl. Comm. zur Untersuchung des Cap Horn brachte 553 Seesterne mit, die sich auf 38 species vertheilen, von denen 23

neu sind. — Der Parallelismus zwischen den Arten der arktischen und antarktischen Fauna, der schon von andern Autoren hervorgehoben wurde, ist nach P. bei den Seesternen frappant, wie folgende Liste zeigt, in der die mit gleicher Nummer bezeichneten Species sich entsprechen:

Arktisch.

1. *Brisinga coronata* G. O. Sars
2. *Pedicellaster typicus* Sars
3. *Stichaster roseus* Müll.
4. *Cribrella oculata* Linck
5. *Lophaster furcifer* D. K.
6. *Crossaster papposus* Fabr.
7. *Pentagonaster granularis* Müll.
8. *Hippasteria plana* Linck
9. *Porania pulvillus* Müll.
10. *Goniopecten christi* D. K.
11. *Ctenodiscus corniculatus* Linck
12. *Pteraster militaris* M. T.

Antarktisch.

1. *Labidiaster radiosus* Lov.
2. *Pedicellaster scaber* E. Sm.
3. *Stichaster aurantiacus* Meyen
4. *Cribrella pagenstecheri* Th. Stud.
Cr. hyadesi E. Perr., *Or. studeri*
E. Perr.
5. *Lophaster levinseni* E. Perr.
6. *Crossaster australis* E. Perr.
7. *Pentagonaster austrogranularis* E.
Perr.
8. *Hippasteria magellanica* E. Perr.
9. *Porania antarctica* E. Sm.
10. *Goniopecten fleurbaei* E. Perr.
11. *Ctenodiscus australis* Lüttk.
12. *Pteraster ingouff* E. Perr.
Pteraster inermis E. Perr.

Die schon von den Challenger Naturforschern bemerkte merkwürdige Brutflge konnte Perr. bei *Diplasterias lütkeni* E. Perr., *D. steineri* Th. Stud. und *Asterias spirabilis* Bell constataren und zwar sind die Jungen mit einem interradianalen, bauchständigen Stiel an der Mundhaut des Mutterthiers angeheftet. Ausserdem theilt Verf. mit, dass er bei *Labidiaster radiosus* die Bildung von neuen Armen, die zwischen den alten nach Vollendung des Larvenstadiums hervorsprossen, bemerkte und erklärt hieraus die grosse Anzahl der Arme bei alten Exemplaren.

Prouho, H. Recherches sur le *Dorocidaris papillata* et quelques autres Echinides de la Méditerranée. — Paris 1888, 8°, 173 p., 26 Tfln.

Separat. — Vgl. Arch. zool. expér. (2) V. 1887, p. 289—380. — Cf. Bericht für 1887.

Rosoll, A. Ueber zwei neue an Echinodermen lebende Copepoden: *Ascomyzon comatulae* & *Astericola clausi*. Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, 97 Bd., I. Abth., p. 188—202, Tfl. I—II.

Vergl. Bericht üb. d. Leist. in d. Carcinologie während 1888 von F. Hilgendorf und J. Vosseler p. 372 und 417.

Sarsin, F. (1). Mittheilungen über *Asthenosoma urens*. Sitz. Ber. Ges. naturf. Freunde Berlin, Jg. 1888, p. 33 und 34.

Kurze Mittheilung der Resultate von (5) vergl. auch (2) u. (3).

Sarsin, P. und F. (2). Die Längsmuskeln und die Stewart'schen Organe der Echinothuriiden, Zool. Anz. 1888, XI. Jahrg., No. 273, p. 115, Holzschn. — Ausz.: Journ. Roy. Micr. Soc. 1888, p. 429.

Bei *Asthenosoma urens* Sarsin's finden sich 5 Längsmuskeln.

paare, die als Bewegungsorgane dienen: das lebende Thier führt mit ihrer Hülfe wurmförmige Contractionen aus; ausserdem functioniren diese 10 Muskeln als Suspensorien des Darms. Aus dem Vorhandensein dieser Muskeln schliessen die Verf., dass die Echinothuriden sehr niedrig organisierte Seeigel sind, und dass die ganze Gruppe der Echiniden von den Holothuriern abzuleiten ist. Die von Stewart bei Cidariden entdeckten Organe finden sich bei *Asthenosoma* in ganz gewaltiger Ausbildung. Ueber ihre Function haben sich die Verf. noch keine bestimmte Ansicht gebildet. [cf. (5)].

Sarasin, P. und F. (3). Ueber die Niere der Seeigel, ebenda, No. 277, p. 217. — Ausz.: Journ. Roy. Micr. Soc. 1888, p. 590.

In diesem Vorbericht theilen die Verf. mit, dass das am Steinkanal liegende bräunliche Gebilde nach ihren Untersuchungen, die sie an *Asthenosoma* anstellten, als Niere anzusehen sei. Es gelang ihnen auch auf Schnittserien das Vorhandensein eines von dem Organ seitlich abgehenden Ureters nachzuweisen. [cf. (5)].

Sarasin, P. und F. (4). Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen auf Ceylon 1884—1886, I. 2. 1888: Knospenbildung bei *Linckia multiforis* (Lm.): p. 70—78, Tfl. IX. — Ausz.: Journ. Roy. Micr. Soc. 1888, p. 431.

Bei den Linckien, die einen Arm abwerfen, aus welchem die bekannten Kometenformen durch Bildung von 4 neuen kleineren Armen entstehen, sprosst an dem Stumpfe jenes Armes gewöhnlich nur eine Spitze hervor. Verf. beschreiben nun und bilden ab Linckien, bei denen am Armstumpf Gabelungen oder sogar Knospen mit 4 kleinen Armen entstanden sind. Verf. glauben, dass sich Linckien finden werden, bei denen an mehreren oder vielleicht allen Armen solche Knospen entstanden sind und dass diese Exemplare dann als richtige Thierstöcke angesprochen werden könnten. Genaue Litteraturangaben über den Gegenstand bilden d. Schluss d. Abhandl.

Sarasin, P. und F. (5). Dasselbe: I. 3. 1888: Ueber die Anatomie der Echinothuriden und die Phylogenie der Echinodermen: p. 81—154, Tfl. X—XVII. — Ausz.: Journ. Roy. Micr. Soc. 1888, p. 956.

I. Theil (p. 81—128): Ausführl. Beschr. v. *Asthenosoma urens* n. sp.: Skelett, Längsmuskeln und Stewartschen Organe [cf. (2)] — dieselben sind keine Athmungsorgane (gegen Prouho), sondern haben wahrscheinlich nur mechanische Function, d. h. sie dienen als Schutz-Polster für die Geschlechtsdrüsen gegen Druck. — Niere [cf. (3)] — ist kein Herz — und die Giftköpfchen. —

II. Theil (p. 129—Ende) behandelt die Verwandtschaft der Echinothuriden, sowie d. Echinodermen überhaupt. Die Echinoth. sind eine selbstständige Untergruppe d. Echinoidea und nahe verwandt mit d. Cidariden u. Diadematiden, sie sind die phylogenetisch älteste der 3 Gruppen (gegen A. Agassiz, der sie als Descendenten d. Diademat. anzusehen geneigt ist) und überhaupt die am tiefsten stehende d. Euechinoidea. Mit den Vorfahren der letzteren mit den Palaeoechiniden haben sie die Imbrication der Platten gemeinsam, die

bei d. andern Echinoid. (excl. Irregulares) nur bei *Astropyga* noch angedeutet ist. Dass diese Imbrication das ursprüngliche ist, zeigt sich gemäss dem „Biogenetischen Gesetz“ bei der Ontogenie von *Cidaris*, dessen Jugendstadium nach Döderlein eine solche Imbrication besitzt. Verf. glauben nun gestützt auf diese schuppige Anordnung d. Platten u. d. Vorhandensein d. Längsmuskeln, deren Besitz sie nebst Quermuskulatur der Perischoechiniden (Palaeoec. Gruppe) zuschreiben, dass die Echinoiden sich aus Holothuriern entwickelt haben. Die Ableitung wäre: Apode Holoth., Palaeoecinide, Echinothuride, Diadematide, Echinide. Verf. verweisen zur Bestätigung ihrer Anschauung auf die Imbrication der Platten bei einigen Holothuriern (*Psolus*, etc.) hin; auch die Stacheln sind bei d. Holoth., wenn vorhanden (z. B. bei *Echinocucumis*), wie bei einem jungen Seeigel mit der Basalplatte verschmolzen und umgekehrt entstehen die Stacheln junger Echini aus Kalkkörpern, die an d. Rädchen von *Chiridota* erinnern; die Laterne d. Echinid. ist auf den Schlundkopf, die Retractoren jenes auf diejenigen des Pharynx der Holoth. zurückzuführen; die Tentakel der Holothurie besitzt der junge Echinus in d. 5 Zahl um d. Mund — Beweise, dass die Echinoidea von d. Holothurioidea abstammen und nicht umgekehrt, wie *Häckel* will. — Bekanntlich leitete *Loven* d. Echinoid. von d. Crinoiden ab, da der Apicalpol junger Echinid. d. Crinoidentypus — bei *Salenia* persistirt er — zeigt. Verf. beweisen die Unhaltbarkeit dieser Ansicht. Die Crinoiden stammen nach ihnen ebenfalls von d. Holoth. direct ab. Die Ableitung ist folgende: Holoth., Cystideen (*Caryocystis testudinarius*) Palaeocrinoid., Neocrinioidea.

Von d. Asteroidea u. Ophiuroidea glauben d. Verf., dass sie sich auch auf die Holothurien zurückführen lassen. Eine Apoda-ähnliche Form der Holothur. ist die Urwurzel, aus der der Stamm der Echinodermen entsprossen ist. Mit dieser Form ist der Anknüpfungspunkt an unsegmentirte Würmer und an *Balanoglossus* gegeben. Zum Schluss machen Verfasser darauf aufmerksam, dass ihre Ansicht der Ableitung d. Echinodermen von d. Holoth. nicht neu ist. Schon *Semper* leitete (1868) die Echinoid. u. Asteroid. von Holoth. ab. Die Apoda sind nach ihm die tiefst stehenden Holoth. und mit den Gephyreen verwandt. — cf. *Semon*.

Semon, R. Die Entwicklung der *Synapta digitata* und ihre Bedeutung für die Phylogenie der Echinodermen. Jen. Ztschrft. f. Naturw. (Jena) XXII, 1. 2, p. 175—309, Tfl. VI—XII, auch separat: Jena, Gust. Fischer, 1888. Ausz.: Arch. zool. expér. (2) VI, 1888: Notes, p. XVII—XXII. — Ausz.: Journ. Roy. Micr. Soc. 1889, p. 62—66.

Die Arbeit zerfällt in 2 Haupttheile: I. Die Ontogenie der *Synapta digitata* (p. 180—233): Nachdem Verf. kurz die ersten Entwicklungsstadien nach *Selenka* geschildert, beschreibt er genau die *Auricularia*. Bei den Wimperschnüren derselben führt er an, „dass alle bilateralen Echinodermenlarven 2 getrennte Wimperschnüre

besitzen, eine adorale und eine postorale,“ also auch die Asteridenlarven. (Schemat. Abb. der Wimperschnüre einer Auric. und einer Bipinnaria.) Der Uebergang der Auricularia in die Tonnenform vollzieht sich durch Umlagerung des Hydrocoels (Wassergefäßsystems) und Zerreissung der Wimperschnüre. Der Körper schrumpft dabei bedeutend zusammen: Eine voll entwickelte Larve im Auricularia-Stadium misst 1,4—1,7, die tonnenförmige Puppe derselben nur 0,4—0,5 mm. In dieser tonnenförmigen Larve mit Wimperreifen (Holothurienpuppe) ist besonders die Entwicklung des Enterocoels (Leibeshöhle) hervorzuheben. Sie geht in der Weise vor sich, dass die Wände der Coelomtaschen gegen einander zu wachsen und auf der Ventralseite verschmelzen. Auf der Dorsalseite jedoch erfolgt kein Durchbruch, sondern hier verlöthen sich die Wände zu einer doppelschichtigen Platte. In dieser doppelsch. Platte (dem späteren Mesenterium) erhält sich zeitlebens bei den Holoth. und sämtlichen Echinodermen ein sehr deutliches Andenken ihrer ursprünglichen bilateralen Grundform. — Der Uebergang der tonnenförmigen Larve in die junge Synapta (*Pentactula*) erfolgt in der Weise, dass der Tentakelvorhof aufbricht und die 5 Primärtentakel vorgestreckt werden. Die Wimperreifen lösen sich auf und das Körperepithel wird neu gebildet. Während der Rückenporus verschwindet, bricht der Steinkanal in die Leibeshöhle durch (Anlage der Madreporenplatte). Da die Wimperreifen aufgelöst sind, ist das Thier nicht mehr im Stande, frei zu schwimmen, und kann als Synapta bezeichnet werden. Verf. beschreibt nun eingehend dieses Stadium und führt die Organe desselben nach ihrer Genese auf: 1. Derivate des Ectoblasts: Epidermis, Sinnesepithelien, Nervensystem, Epithel des Vorderdarms. 2. Derivate des Entoblasts: Mittel- und Enddarm, Hydroenterocoel, Blutkörperchen (losgelöste Zellen der Hydrocoelwandungen?), Muskulatur. 3. Produkte des Mesenchyms: Bindegewebe, Blutgefäße (Spaltbildungen im Mesenchym), Mesenchymmuskulatur (nur die mesenchymatöse Ringmuskulatur des Vorderdarms geht in die junge Synapta über, alle andere Muskulatur entstammt dem Hydroenterocoel), Kalkbildungen (Kalkrädchen, -kugeln, -ring, Madreporenplatte). — Aus dieser *Pentactula* entwickelt sich nun die eigentliche ausgebildete Synapta, welche Umwandlung Verf. jedoch nicht selbst beobachtet hat. Die ausgebildete Synapta unterscheidet sich von der *Pentactula* hauptsächlich durch die Anzahl der Tentakel (12), durch das Vorhandensein von Wimpertrichtern und der Geschlechtsorgane. — Der II. Hauptabschnitt der Abhandlung trägt den Titel:

II. Phylogenie der Echinodermen (p. 234—300). Semon leitet alle 5 Echinodermen-Unterklassen von einer Urform, *Pentactaea*, ab, die ungefähr auf dem Stadium der *Pentactula*-Larvenform, die alle Echinodermen durchlaufen, stehen geblieben ist. Er bildet diese thatsächlich vorhandenen Larven von Holothurien, Asteriden (wurm-förmige Larve Joh. Müllers), Echiniden und Crinoiden ab. Aus dieser Urform, *Pentactaea*, haben sich die 5 Abtheilungen

der Echinodermen neben einander von Anfang an divergirend entwickelt. Er giebt folgende natürliche Eintheilung nach dem Verhältniss der Primär-Tentakel und des Coeloms und nach der Lage der Nerven und des Wassergefässsystems:

I. Typus Angiochirota: 1. *Holothurioidea*: Primär-Tentakel erhalten, numerisch vermehrt, stellen einfache Ausstülpungen des Wassergefässsystems dar, die einen Epidermisüberzug (Sinnesepithel) tragen. Die Tentakel werden an ihrer Basis durch interradian (resp. adradial) gelegene Kalkstücke, sog. Kalkring, gestützt. Wassergefässe und Nerven des Körperstammes liegen interradian (resp. adradial). Die inneren Organe, wie Darm, Leibeshöhle, Geschlechtsorgane zeigen keine radiäre Gliederung.

II. Typus Achirota: 2. *Echinoidea*: Primär-Tentakel der Jugendform im ausgebildeten Thiere zurückgebildet. In ihrer Verlängerung gegen den hinteren Pol, also perradian, die 5 Körpergefässe nebst Nerven. Geschlechtsorgane in radiärer Anordnung.

III. Typus Coelomachirota: Coelom erstreckt sich in die Tentakel, die man nur als Arme bezeichnet. Radiärer Typus am höchsten ausgebildet und auf die meisten Organe ausgedehnt.

3. *Crinoidea*: Geschlechtsorgane mit in die Arme übernommen. Darm zeigt keine radiäre Gliederung. Bleibend oder in der Jugend gestielt.

4. *Ophiuroidea*: Geschlechtsorgane und Darm auf Körperstamm (Scheibe) beschränkt radiär gegliedert.

5. *Asteroidea*: Fortsetzungen der Leibeshöhle, des Darms und Geschlechtsorgane erstrecken sich in die Arme. Radiärer Typus und damit Dezentralisation am höchsten entwickelt. —

In der Schlusszusammenfassung formulirt Verf. seine Grundanschauungen in folgenden Thesen:

1. Die Synaptiden sind nicht durch Rückbildung aus pedaten Holoth. entstanden, sondern die Einfachheit ihrer Organisation ist eine ursprüngliche. 2. Aus diesem, sowie aus einer Reihe von anderen ebenso schwer wiegenden Gründen ist es unmöglich, die Hol. von den Echinoideen oder von irgend einer anderen der jetzt lebenden Echinodermenklassen abzuleiten. 3. Es ist ebenso unmöglich, die Echinoideen von den Asteroideen, wie diese von den Crinoideen abzuleiten, oder umgekehrt. 4. Die Echinodermenklassen haben sich divergent aus einer sehr einfachen Stammform entwickelt. 5. Diese Stammform wird ontogenetisch reproducirt durch die Pentactularlarve. 6. Die echten Homologien unter den Klassen lassen sich allein durch Zurückgehen auf die Organisation dieser Stammform erkennen. Viele der bisher angenommenen Homologien sind offenbare Analogien, die dadurch hervorgerufen werden, dass die meisten der verglichenen Gebilde in 5-Zahl vorhanden sind und dass von der Stammform her gewisse Eigenthümlichkeiten (Bau der Skelettelemente, Tendenz des Mesenchyms zur Spaltraumbildung) in gleicher Weise auf alle Klassen vererbt worden sind. 7. Wenn wir die Pentactularlarve als eine in allen Hauptpunkten palingenetische

Larvenform anerkennen müssen, ist dies für die Dipleurula [darunter versteht Verf. die Auricularien, Pluteusarten, Bipinnaria, Brachiolaria] nur mit Vorbehalt gültig. In ihr sind augenscheinlich mehrere phylogenetische Stadien in cenogenetischer Weise vermisch. 8. Dennoch ist nicht zu zweifeln, dass die Echinodermen von bilateralen Geschöpfen mit Enterocoel herkommen. Ob das Wassergefäßbläschen (Hydrocoel) als das Derivat eines ursprünglichen Excretionssystems der bilateralen Voreltern anzusehen ist, lässt sich zur Zeit noch entscheiden. 9. Es sprechen starke Gründe dafür, dass der Uebergang des bilat. Baues in den radiären (zunächst amphipleuren der Pentactaea) durch festsitzende Lebensweise hervorgerufen worden ist. 10. Fasst man gewisse Asteriden als Thierstöcke auf, wozu die physiolog. Thatsachen uns berechtigen, so ist doch sicher, dass solche Stöcke nicht durch Knospung von Personen entstanden sind, sondern dadurch, dass gewisse Organe (Tentakel) immer grössere Selbstständigkeit erlangten, weil sich successive fast alle Organe des Körpers an ihrem Aufbau beteiligten. Diese Selbstständigkeit, die als eine Folge fortschreitender Dezentralisation aufzufassen ist, führte schliesslich dahin, dass in den ausgeprägtesten Fällen die scharfe Grenze zwischen Organ und Person verwischt ist. 11. Die Echinodermen zeigen in ihrer Entwicklung und auch in gewissen Eigenthümlichkeiten ihres Baues unleugbare Beziehungen zu den anderen Enterocoeliern, besonders zu Balanoglossus und den Chordaten. Doch sind diese Beziehungen so wenig bestimmte, und ist die Entstehung des ganzen Enterocoelierstammes noch so dunkel, dass wir vorläufig gezwungen sind, vor dieser Schranke Halt zu machen.

Simroth, H. Zur Kenntniss der Azorenfauna, Arch. f. Naturg., 54. Jahrg. 1888, Bd. I, p. 179—234, 2 Tfln.

Die von E. v. Martens bestimmten Echinod. (p. 231) sind folgende: 1 sp. Asterias, 1 Linckia, 1 Asteriscus, 1 Astropecten; je 1 Ophioglypha, Amphiura, Ophiactis, Antedon; je 1 Arbacia, Sphaerechinus, Toxopneustes, Echinocyamus, Spatangide; 1 Holothuria. Verf. bespricht die Bohrlöcher der Seeigel (cf. John) und die Mimicry zwischen einer Actinie und einem Sphaerechinus; der nachahmende Theil ist das Cölenterat. Einen Grund für diese Mimicry weiss Verf. nicht anzugeben. (Siehe oben auch Barrois: Echinodermes des Açores).

Sladen, W. P. On the Asteroidea of the Mergui Archipelago, Journ. Linn. Soc. Bd. 21, p. 319—331, Tfl. 28.

1 Archaster, 3 Astropecten (2 neu), 2 Luidia, 1 Goniodiscus 1 Nepanthia (neu), 1 Asterina.

Sluiter, C. Ph. Die Evertebraten aus der Sammlung des Kgl. naturwissenschaftl. Vereins in Niederl. Indien in Batavia, Nat. Tijdschrft. voor Neerlandische Indie (Batavia) XLVII, Ech. p. 184—220, Tfl.

In dieser Skizze der Fauna des Java-Meeres gibt Verf. als ersten Theil einen Catalog der Echinodermen des Museums in Batavia.

Neben zahlreichen werthvollen die Systematik betreffenden Angaben, finden sich auch solche über das Leben und die Färbung der lebenden Thiere, die Verf. in Aquarien gefangen hielt und beobachtete. Der vorliegende Abschnitt des Catalogs behandelt die Holothurien und zwar werden folgende genannt: *Aspidochirotae*: *Holothuria* 21 Arten (1 neu), *Stichopus*: 5 (2 neu), *Mülleria*: 2; — *Dendrochirotae*: *Cucumaria*: 4, *Echinocucumis*: 1, *Ocnus*: 3, *Colochirus*: 4 (1 neu), *Thyone*: 2 (1 neu), *Orcula*: 1, *Phyllophorus*: 1; — *Molpadidae*: *Haplodactyla*: 1 (neu), *Eupyrgus*: 1; — *Synaptidae*: *Anapta*: 1 (neu), *Trochoderma*: 1, *Myriotrochus*: 1, *Chirodota*: 3 (1 neu), *Synapta*: 9 (4 n. sp., 1 n. var.) — cf. System.

Folgt, W. *Entocolax ludwigi*, ein neuer seltsamer Parasit aus einer Holothurie, *Ztschr. f. wiss. Z.*, 47 Bd., p. 658—688, 4 Tl.

In *Myriotrochus rincki* Steenstr. aus der Lorenzbaai entdeckte Ludwig einen Parasiten, den Verf. als *Entocolax l.* beschreibt und abbildet. Vergl. den Bericht üb. d. w. L. im Geb. d. Malacologie für 1888 von J. Thiele, p. 407.

Zelinka, C. Studien über Räderthiere. II. Der Raumparasitismus u. d. Anat. v. *Discopus synaptae* n. g. n. sp. *Zeitschr. f. wiss. Zool.*, 47 Bd., p. 353—458, Tfl. 30—34.

Discopus synaptae n. g. n. sp. Rotatorie commensal auf *Synapta*. [Vergl. *Rotator. Ber.* 1888, p. 57—60].

II. Uebersicht nach dem Stoffe.

1. Allgemeines und Vermischtes.

Populäres: Agassiz, Marshall.

Oekonomisch Wichtiges: Asterien als Dünger: Grisard.

Varia: Ueber 100 Jahre altes Sammlungs-Exemplar eines Asteriden: von Martens.

2. Anatomie, Physiologie, Entwicklung etc.

Anatomie:

Morphologie. Ophiuren: Cuénot (3), Schwimmende Ophiure: Ludwig (1), Arme von *Labidiaster radiosus*: Perrier: Asteriden: Cuénot (2).

Anatomie, gesammte: Ophiuren: Cuénot (3), *Temnopleuridae*: Duncan, *Echinothuridae*: Sarasins (5), Asteriden: Cuénot (2).

Muskulatur: Echinothuriden: Sarasins (1) (2).

Nervensystem und Sinnesorgane: Crinoiden: Hamann, Asteriden: Jickeli.

Excretionssystem: Echinothuriden: Sarasins (1) (3) (5).

Wassergefäßsystem: Madreporenplatte v. *Cribrella*: Durham (2).

Abnormitäten: Linckia: Sarasins (4), Asteriden: Cuénot (2).

Histologie: Ophiuren: Cuénot (3), Asteriden: Cuénot (2).

Kalkkörper: Kalkplatten-Entw. von *Asterias*: Fewkes, Vergleich zw. d. Kalkpl. von *Asterias* u. *Amphiura*: Fewkes.

Physiologie.

Zusammensetzung u. Blut d. Echinoderm.: Cuénot (1), Ophiuren: Cuénot (3), Nierenfunction d. 5 Magentaschen d. Asteriden: Griffiths, Blutcoagulation bei Echiniden: Haycraft u. Cardier, Bohren d. Seeigel: John, Funktionen und Wanderungen der amöboiden Zellen und der Plasmawanderzellen von Asterias: Durham (1), Asteriden: Cuénot (2).

Entwicklung.

Ontogenie: Antedon-Entw.: Bury (1) u. (2), Holothuria: Edwards, Echinocardium: Fleischmann, Synapta-Entw.: Semon, Asterias Entw. d. Kalkpl.: Fewkes, Gemmation b. Linckia: Sarasins (4), Asteriden: Cuénot (2), **Phylogenie:** Sarasins (2) (5), Semon, Cuénot (2).

Biologisches.

Bohren d. Seeigel: John, Brutpflege bei Asteriden: Perrier, Holothurien in Aquarien: Sluiter.

Mimicry: Simroth.

Tiefsee: Agassiz, Marshall. Comatuliden: Carpenter.

Parasiten: Schnecke in Holothurien: Vogt, Krebs Commensal von Asterias: M'Intosh, Krebse auf Asteriden und Crinoiden: Rosoll, Rotatorie auf Holoth.: Zelinka.

Faunistik.

1. **Allgemeines:** Geogr. Verbr. d. Crinoidea: Carpenter (1).

2. **Nordpolar- u. Südmeer:** Echinod.: Norman, Asteroiden beider gegenübergestellt: Perrier, Asteroiden von *Cap Horn*: Perrier, Echinodermen von *Port Philipp* (S. O. Austr.): Bell (3).

3. **Nordatlant. M.:** Echinodermen: Norman, Holothurien aus dem *Canal de la Manche*: Hérouard, Asteriden a. d. *Canal*: Cuénot (2), Echinodermen von *Plymouth*: Heape.

4. **Südatlant. M.:** Echinodermen von den *Bermudas Inseln*: Heilprin.

5. **Mittelmeer*):** Echinodermen von den *Azoren*: Barrois, Simroth.

6. **Ind. Polynes. M.:** Asteriden vom *rothen Meer*: Cuénot (2), Echinod. des *Bengal. Meers*: Bell, Crinoiden vom *Mergui Archipel*: Carpenter (2), Ophiuroiden des *Ind. Oc.*: Brock, Ophiur. Aster. Echin. von *Ceylon*: Döderlein, Echinoid. des *Mergui Archipel*: Duncan u. Sladen, Holoth. von *Amboina* und *Batavia*: Ludwig (2), Holoth. d. *Java Meers*: Sluiter, Asteroid. des *Mergui Archipels*: Sladen.

III. Systematik.

N. B. Die neuen Gattungen, Arten, Varietäten sind durch *cursiven* Druck ausgezeichnet!

Allgemeines.

Allgem. neue Eintheilung der Klasse bei Semon. — Nach Cuénot (2) sind die Ophiuridae eine selbständige Unterklasse der Klasse Echinodermata, nicht eine Unterabtheilung der Unterklasse Asteroidea.

*) cf. Möbius, Die Thiergebiete d. Erde, Arch. f. Naturg. 1891, Heft 3.

Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 1889. Bd. II. H. 3.

1. *Orinoidea*.

P. H. Carpenter giebt für die Familie der Comatulidae der Ordnung Neocrinoides folgende Eintheilung.

I. Genus *Thaumatocrinus* H. Crpt.: *Th. renovatus* H. Crpt.

II. Genus *Atelecrinus* H. Crpt.: *A. balanoides* n. sp.
cubensis Pourt.
wyvillei n. sp.

III. Genus *Eudiocrinus* H. Crpt.: *Eu. atlanticus* Perr.
indivisus (Semp.).
japonicus n. sp.
semperi n. sp.
varians n. sp.

IV. Genus *Promachocrinus* H. Crpt.: *Pr. abyssorum* n. sp.
kerguelensis n. sp.
naresi n. sp.

V. Genus *Antedon* Frém.:

Serie I:

1. Gruppe *elegans*:
A. elegans J. Bell.
microdiscus J. Bell.
multiradiata n. sp.

Serie II:

2. Gruppe *basicurva*:
A. aculeata n. sp.
acutiradia n. sp.
basicurva n. sp.
bispinosa n. sp.
brepinna Pourt.
breviradia n. sp.
denticulata n. sp.
duplex H. Crpt.
echinata n. sp.
flexilis n. sp.
gracilis n. sp.
incerta n. sp.
incisa n. sp.
latipinna n. sp.
longicirra n. sp.
lusitanica n. sp.
multispina n. sp.
parvipinna n. sp.
pusilla n. sp.
spinicirra n. sp.
tuberosa n. sp.
valida n. sp.
3. Gruppe *acoela*:
A. acoela n. sp.
discoidea n. sp.

4. Gruppe: *eschrichti*:

- A. antarctica* n. sp.
australis n. sp.
barentsi H. Crpt.
eschrichti (J. Müll.)
magellanica J. Bell
quadrata n. sp.
rhomboidea n. sp.

5. Gruppe: *tenella*:

- A. abyssicola* n. sp.
abyssorum n. sp.
alternata n. sp.
angustipinna n. sp.
armata Pourt.
columnaris H. Crpt.
cubensis Pourt.
dübeni Böhlische
exigua n. sp.
hageni Pourt.
hirtula n. sp.
hystrix n. sp.
laevis n. sp.
lineata n. sp.
longipinna n. sp.
milleri (J. Müll.)
petasus (D. K.)
phalangium (J. Müll.)
prolixa Sladen
remota n. sp.
rosacea (Linck)
tenella (Retz.)
tennicirra n. sp.

6. Gruppe: milberti:

anceps n. sp.
carinata (Lm.)
carpenteri J. Bell
informis n. sp.
laevissima (Gr.)
loveni J. Bell
milberti (Müll.)
parvicirra n. sp.
perspinosa H. Crpt.
pinniformis Crpt.
pumila J. Bell
serripinna H. Crpt.
tessellata (J. Müll.)
variipinna H. Crpt.

Incertae sedis:

A. adeonae (Lm.)

balanoides H. Crpt.
bidens J. Bell
defecta H. Crpt.
impinnata H. Crpt.
laevipinna H. Crpt.

Serie III:

7. Gruppe: spinifera:

brevipinna Pourt.
compressa n. sp.
duplex H. Crpt.
flexilis n. sp.
lusitanica n. sp.
macronema (J. Müll.)
patula n. sp.
pourtalesi H. Crpt.
quinquecostata n. sp.
robusta n. sp.
spinifera H. Crpt.

8. Gruppe: palmata:

A. *aequipinna* H. Crpt.
articulata (J. Müll.)
bimaculata H. Crpt.

VI. Genus *Actinometra* J. Müll.

Serie I:

1. Gruppe: solaris:

A. *brachiolata* (Lm.)
pectinata (Retz.)
solaris (Lm.)

2. Gruppe: paucicirra:

A. *paucicirra* J. Bell

brevicuneata H. Crpt.

clemens n. sp.
conjungens n. sp.
disciformis n. sp.
elongata (J. Müll.)
flagellata (J. Müll.)
gyges (J. Bell)
imparipinna H. Crpt.
indica (Smith)
laevicirra H. Crpt.
manca n. sp.
marginata n. sp.
occulta n. sp.
palmata (J. Müll.)
protecta Lüttk.
regalis n. sp.
reginae J. Bell
similis n. sp.
spicata H. Crpt.
tuberculata n. sp.

Serie IV:

9. Gruppe: granulifera;

A. *angusticalyx* n. sp.
distincta n. sp.
granulifera Pourt.
inaequalis n. sp.
multispina n. sp.
porrecta n. sp.

10. Gruppe: savignyi:

A. *acuticirra* H. Crpt.
anceps n. sp.
angustiradia n. sp.
bipartipinna H. Crpt.
ludovici H. Crpt.
philberti (J. Müll.)
quinduplicava n. sp.
reynaudi (J. Müll.)
savignyi (J. Müll.)
variipinna H. Crpt.

3. Gruppe: typica:

A. *distincta* n. sp.
multibrachiata n. sp.
novaeagueineae (J. Müll.)
typica (Lov.)

Serie II:

4. Gruppe: echinoptera:

A. blakei H. Crpt.
cumingi (J. Müll.)
echinoptera (J. Müll.)
meridionalis (Pourt.)
pulchella (Pourt.)
rubiginosa (Pourt.)

Serie III: ✓

5. Gruppe: stelligera:

A. maculata n. sp.
nigra H. Crpt.
pulchella (Pourt.)
stelligera n. sp.

6. Gruppe: valida:

A. elongata n. sp.
rotalaria (Lm.)
simplex n. sp.
valida n. sp.

Serie IV:

7. Gruppe: fimbriata:

A. borneensis Gr.
coppingeri J. Bell
discoidea H. Crpt.
fimbriata (Lm.)

lineata n. sp.
multiradiata (L.)
sentosa n. sp.

8. Gruppe: parvicirra:

A. alternans H. Crpt.
belli n. sp.
bennetti Böhlische
briarens (J. Bell)
divaricata n. sp.
duplex n. sp.
grandicalyx H. Crpt.
japonica (J. Müll.)
littoralis n. sp.
magnifica H. Crpt.
multifida (J. Müll.)
nobilis n. sp.
parvicirra (J. Müll.)
peroni H. Crpt.
quadrata n. sp.
regalis n. sp.
robustipinna H. Crpt.
schlegeli H. Crpt.
trichoptera (J. Müll.)
variabilis (J. Bell)

Antedon *andersoni* n. sp.: Carpenter (2), Mergui Arch. Abb.; und *wilsoni*,
incommoda n. sp.: J. Bell (3), Port Philipp (S. O. Austr.) — A. *conjungens*
Carp., *spicata* Carp., *milberti* J. Müll.: Carpenter (2), Abb.

Actinometra notata n. sp.: Carpenter (2), Mergui Arch.; Abb.

2. Ophiuroidea.

Ophioglyphidae.

Pectinura rigida Lym. = *septemspinosa* (M. T.): Brock.

Pectinura septemspinosa (M. T.) Abb.: Döderlein.

Ophiolepis irregularis n. sp.: Brock, Ind. Oc.

Ophioglypha indica n. sp. " "

Ophiocoris cincta n. sp. " "

Amphiuridae.

Ophiactis modesta n. sp. Brock, Ind. Oc.

Amphiura ochroleuca, fuscoalba, olivacea n. sp.: Brock, Ind. Oc.

Ophioneptys (?) *sesquipedalis*, n. sp.: Bell (2), Brasilien.

Ophiocnida albobiridis n. sp.: Brock, Ind. Oc.

Ophionereis sophiae, fusca n. sp.: Brock, Ind. Oc.

Ophionereis albomaculata E. Sm. = *schayeri* (M. T.): Brock.

Ophiocoma erinaceus M. T. = *scolopendrina* (Lm.): Brock.

Ophiarachna clavigera n. sp.: Brock, Ind. Oc.

Ophiomastix pusilla, elegans n. sp.: Brock, Ind. Oc.

Ophiopteron elegans n. g. n. sp. Ludwig (1), Ind. Oc.; Abb.

Ophiothrix tenera n. sp.: Brock, Ind. Oc.

Ophiothrix koreana Duncan = *cómata* M. T. und *variegata* Duncan = *parasita* M. T.: Brock.

Ophiothrix nereidina (Lm.) Abb.: Döderlein.

Ophiothrix versicolor Apostolides = *O. rosula* Forb.: Cuénot (2).

Lütkenia cataphracta n. g. n. sp.: Brock, Ind. Oc.

Gymnolophus n. g. für *Ophiothela holdsworthi* E. Sm.: Brock, Ind. Oc.

Ophioaethiops unicolor n. g. n. sp., Brock, Ind. Oc.

Ophiosphaera insignis n. g. n. sp., Brock, Ind. Oc.

Ophiocnemis marmorata (Lm.) Abb.: Döderlein.

Ophiomyxidae.

Ophiomyxa longipeda n. sp.: Brock, Ind. Oc.

3. Asteroidea.

Cryptozonia (Sladen 1889).

Diplasterias n. g. Asterien mit 2 Reihen Adambulacralstacheln: Perrier, Cap Horn.

Asteroderma n. g. Asterien ohne Stacheln und beinahe ohne Rückenskelett: Perrier, Cap Horn.

Poraniopsis n. g. Zwischen *Porania* und *Echinaster*: Perrier, Cap Horn.

Echinaster decanus M. T. von Port Jackson: Bell (6).

Cribraster n. g. Cribellen mit Paxillen auf der Bauchseite: Perrier, Cap Horn.

Coronaster bispinosus n. sp.: Ives.

Linckia multiforis Lm. var. *color.* v. Ceylon: Farbe der lebenden Thiere nicht blassziegelroth, sondern schmutzig-graublau: Sarasins (4).

Pteraster tessellatus n. sp.: Ives.

Phanerozonia.

Asterodon n. g. Eine unpaare Randplatte am Grunde der Arme, hierher die species: *Astrogonium singulare* M. T., *Astrog. meridionale* E. Sm. *Pentagonaster belli* Th. Stud., *Calliderma grayi* J. Bell, *pedicellaris* n. sp., *granulosus* n. sp.: Perrier, die letzten beiden von Cap Horn.

Lebrunaster n. g. Die Randplatten beginnen sich zu differenziren: Perrier, Cap Horn.

Nepanthia subfarcinata n. sp.: Sladen, Mergui Arch.; Abb.

Disasterina ceylanica n. sp.: Döderlein, Ceylon; Abb.

Astropecten indicus, *tamilicus* n. sp.: Döderlein, Ceylon; Abb.; und *andersoni*, *notograptus* n. sp.: Sladen, Mergui Arch.; Abb.

4. Echinoidea.

Regularia.

Asthenosoma urens n. sp.: Sarasins (5), Ceylon; Abb.

Pseudoboletia indiana Mich.: Döderlein, Abb.

Temnopleurus zu trennen von *Temnechinus*: Duncan.

Microcyphus maculatus A. Ag.: Döderlein, Abb.

Salmacis alexandri J. Bell: Döderlein, Abb.

Clypeastridae.

Pygastrides n. g.: Lovén für *Pygaster relictus* Lov. v. West Indien; Abb.

5. Holothuriotidea.**Aspidochirotae.**

Holothuria abbreviata n. sp.: Heilprin, Bermudas; Abb. — *Hol. sluiteri*, sp. n. juv., *pyxoides*, *olivacea* n. sp.: Ludwig (2), Ind. Oc.; Abb. — *Hol. oxur-ropa* n. sp.: Sluiter, Java Meer; Abb. — *H. fuscocoeerulea* Theel = *flavo-maculata* Semp. und *andersoni* J. Bell = *marenzelleri* Ludw.: Ludwig (2).

Stichopus diaboli, *xanthomela* n. sp.; Heilprin, Bermudas; Abb. — *St. laevis*, *vastus*, n. sp.: Sluiter, Java Meer; Abb.

Dendrochirotae.

Cucumaria (Semperia) *bermudensis* n. sp.: Heilprin, Bermudas; Abb. — *C. africana* Semp. und *assimilis* J. Bell = *Pseudocucumis africana* (Semp.): Ludwig (2).

Thyone papillata n. sp.: Sluiter, Java Meer; Abb.

Pseudocucumis theeli Ludw. = *Ps. africana* (Semp.): Ludwig (2).

Actinocucumis difficilis J. Bell = *A. typica* Ludw.: Ludwig (2).

Colochirus scandens n. sp.: Sluiter, Java Meer; Abb. — *Col. australis* Ludw. = *doliolum* (Pall.): Ludwig (2).

Molpadiidae.

Haplodactyla punctata n. sp.: Sluiter, Java Meer; Abb.

Synaptidae.

Synapta reticulata Semp. var. *maculata* n. var., Syn. *striata*, *lactea*, *kalki-peplos*, *psara*, n. sp.: Sluiter, Java Meer; sämtlich Abb.

Anapta subtilis n. sp.: Sluiter, Java Meer; Abb.

Chiridota amboinensis n. sp.: Ludwig (2) Ind. Oc.; Abb. — *Ch. liberata* n. sp.: Sluiter, Java Meer; Abb.

Jahresbericht für 1888

über die

Coelenteraten

mit Ausschluss der Spongien und Anthozoen.

Von

Dr. E. Vanhöffen in Kiel.

1. A. E. V. „Poisonous Jelly-Fish,“ *Science* XI, p. 146.
2. Agassiz, A. „Three Cruises of the United States Coast and Geodetic Survey Steamer „Blake“ in the Gulf of Mexico, in the Caribbean Sea and along the Atlantic Coast of the United States from 1877—1880.“ *Bull. Mus. Harvard Coll.* vol. 14 u. 15. Coelenterata: vol. 14, p. 52—92, vol. 15, p. 128—156, Fig. 422—483. 8°. Boston, New York u. London.
3. Allman, G. J. „Report on the Hydroids dredged by H.M.S. „Challenger“ during the years 1873—76, Part II, The Tubularinae, Corymorphinae, Campanularinae, Sertularinae and Thalamophora.“ *Rep. Challenger* vol. 23, part 70, 69 u. 90 pp. 39 Taf. 1 Karte. London, Edinburgh u. Dublin. *Bericht Am. Nat.* XXII, p. 840.
4. Bale, W. M. „On some new and rare Hydroids in the Australian Museum collection.“ *Proc. Linn. Soc. N. S. W.* (2) III, pp. 745—749, Taf. XII bis XXI. *Bericht J. R. Micr. Soc.* 1889 p. 71—72.
5. Bergh, R. S. „Bemærkninger om Udviklingen af Lucernaria.“ *Vid. Meddel. Naturh. Foren. Kjöbenhavn.* p. 214—220.
6. Bétencourt, A. „Les Hydraires du Pas-de-Calais.“ *Bull. Sc. France. Belg.* (3) 1. année p. 201—214.
7. Brooks, W. R. „The Growth of Jelly-Fish.“ *Pop. Sci. Monthly* Sept. and Oct.
8. Derselbe. „On a new Method of Multiplication in Hydroids.“ *J. Hopkins Univ. Circ.* vol. 7, p. 29—30. *Bericht in J. R. Micr. Soc.* f. 1888 p. 433—434 u. *Am. Nat.* XXII, p. 355.
9. Derselbe. „The Life History of *Epenethesis McCradyi* n. sp.“ *Stud. Biol. Lab. J. Hopkins Univ.* vol. IV, p. 147—162, T. 13—15. *Bericht in J. R. Micr. Soc.* f. 1888 p. 743, *Nature* XXXVIII, p. 356.
10. Carter, H. J. „On two new Genera allied to *Loftusia* from the Karakoram Pass and the Cambridge Greensand respectively.“ *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) I, p. 172—184, Taf. 13.
11. Derselbe. „On the Organic and Inorganic Changes of *Parkeria* together with further Observations on the Nature of the Opaque Scarlet Spherules in Foraminifera.“ *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) II, p. 45—55, Taf. V.
12. Chun, C. „Die pelagische Thierwelt in grösseren Meerestiefen und

ihre Beziehungen zu der Oberflächenfauna.“ Leuckart u. Chun, *Bibliotheca zoologica*. I. Heft. 66 pp. 5 Taf. Bericht in *J. R. Micr. Soc.* f. 1888, p. 558 bis 559.

13. Derselbe. „Bericht über eine nach den Canarischen Inseln im Winter 1887/88 ausgeführte Reise.“ Sitz.-Ber. Acad. Berlin p. 1141–1173, übersetzt *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) III, p. 214–246.

14. Colasanti, J. „Das blaue Pigment der Hydromedusen.“ *Unters. Naturlehre von Moleschott*, 13. Bd., 6. Heft, 20 pp. Bericht *C. B. Physiologie* II, p. 10 u. 11.

*15. Dendy, A. „Note on some Actinian Larvae parasitic upon a Medusa from Port Phillip.“ *Proc. R. Soc. Victoria* 15. Nov. 8°. (3 pp.)

16. Dubois, R. „Sur le rôle de la symbiose chez certains animaux marins lumineux.“ *Compt. Rend. CVII*, p. 592–504.

17. du Plessis, G. „Faune des Hydraires littoraux gymnoblastes observés à Ville-franche-sur-mer.“ *Recueil Zool. Suisse*, Tome IV, p. 525–544.

18. Etheridge, R. „Fossils of the British Islands, stratigraphically and zoologically arranged.“ vol. I, *Palaeozoic*, Oxford, 4°, VIII u. 468 pp., *Hydrocorallinen* resp. *Stromatoporidae* p. 3, 136, 202, 352, 390, 398–400, 428, *Graptolithen* p. 4–14, 391–397, *Hydroidpolyphen* p. 206.

19. Ewart, J. C. „Directions for the Examination of Amoeba, Paramaecium, Vorticella, Hydra, Lumbricus, Hirudo, Asterias and Echinus.“ *Edinburgh*. 4°.

20. Faurot, L. „Rapport à M. le Ministre de l'instruction publique sur une mission dans la mer Rouge et dans le golfe d'Aden.“ *Arch. zool. expér.* (2) VI, p. 117–134, 2 Holzschn.

21. Fewkes, J. W. „Report on the Medusae collected by the Lady Franklin Bay Expedition (Greely).“ In: „Three years of arctic service“ by Ad. W. Greely. London 1886, 8°, vol. II, p. 399–408. Appendix XI.

22. Derselbe. „On a new Physophore Pleophyssa and its Relationships to other Siphonophores.“ *Ann. Mag. N. H.* (6) vol. I, p. 317–322, T. 17.

23. Derselbe. „Are there Deep Sea Medusae?“ *Amer. Journ. Sc.* (3) vol. 35, p. 166–179. *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) vol. 1, p. 247–260.

24. Derselbe. „On certain Medusae from New-England.“ *Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard Coll.* vol. 13, p. 209–240, T. 1–6. Bericht in *Am. Nat.* XXII, p. 354 u. *Journ. R. Micr. Soc.* 1888, p. 592, *Nature* XXXVIII, p. 137.

25. Derselbe. „A new Mode of Life among Medusae.“ *Proceed. Boston Soc. N. H.* vol. 23, p. 389–395. *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) vol. 1, p. 362–368. *Am. Micr. Journ.* IX, p. 207–209. Bericht *J. R. Micr. Soc.* 1888, p. 591–592.

26. Fischer, P. „Note sur des Scyphistomes de Méduse acraspède.“ *Bull. Soc. Z. France* 13 Année, p. 96–99. *Fig. Ber. Journ. R. Micr. Soc.* 1888, p. 965.

27. Ford, S. W. „Notes on certain Fossils discovered within the City Limits of Quebec.“ *Transactions of the New York Academy of Sciences* vol. VII, p. 2–5.

28. Glard, A. „La castration parasitaire. Nouvelles recherches.“ *Bull. Sci. Fr. Belg.* I, p. 12–45 (*Coelenteraten* p. 44).

29. Derselbe. „Fragments biologiques IX. Le Golf-stream sur les côtes du Pas-de-Calais et de la mer du Nord.“ *Bull. Sc. Fr. Belg.* I, p. 296–297.

30. Derselbe. „Fragments biologiques XIV. Sur une Anthoméduse de

la Manche, Rathkea octopunctata Sars.“ Bull. Sc. France Belg. (3) I année, p. 317—319.

31. Derselbe. „Le Laboratoire de Wimereux en 1888, Recherches fauniques.“ Bull. Sc. Fr. Belg. I, p. 492—513.

*32. Greenwood, M. „Digestion in Hydra.“ Journ. of Physiol. vol. IX 1888 p. 317—344, 2 pl. Bericht in Journ. R. Micr. Soc. London 1889, P. 3, p. 395—396.

33. Grieg, J. A. „Undersøgelser over dyrelivet i de vestlandske Fjorde. I. Moster.“ Bergens Mus. Aarsber. 1887, 13 pp. Coelenteraten p. 12 u. 13.

34. Haecke, W. „Zu Herrn R. von Lendenfelds Besprechung einer Arbeit über die Scyphomedusen des St. Vincent Golfes.“ Biol. Centralbl. VIII. Bd., p. 357—359.

35. Haddon, A. C. „On larval Actiniae parasitic on Hydromedusae at St. Andrews.“ Ann. Mag. Nat. Hist. (6) vol. 2, p. 256—259. Bericht in Journ. R. Micr. Soc. f. 1888, p. 965.

36. Haeckel, E. „System der Siphonophoren auf phylogenetischer Grundlage entworfen.“ Jen. Zeitschr. f. Naturw. 22. Bd., p. 1—46. Ber. Journ. R. Micr. Soc. 1888, p. 741—743.

37. Derselbe. „Report on the Siphonophorae collected by H. M. S. „Challenger“ during the years 1873—1876.“ Rep. Scientific results Challenger Zool. vol. 28, p. 77. 380 pp. 50 Taf.

38. Heape, W. „Preliminary Report upon the Fauna and Flora of Plymouth Sound.“ J. Mar. Biol. Ass. II, p. 153—193 (Coelenteraten p. 166—167).

*39. Heilprin, A. „The animal Life on our Sea Shore.“ Philadelphia 1888.

40. Hickson, S. J. „On the sexual cells and the early stages in the development of Millepora plicata.“ Phil. Transact. vol. 179. B., p. 193—204. Taf. 38, 39. Ber. Journ. R. Micr. Soc. 1888, p. 964—965.

41. Hoyle, W. E. „Report on the Biological Investigations carried on in the waters to the West of Lewis in July and August 1887.“ Rep. Fish. Scotl. VI, pt. III, p. 215—222, Taf. XV.

42. Ishikawa, C. „Ueber die Herkunft der weiblichen Geschlechtszellen bei Podocoryne carnea Sars.“ Zeitschr. wiss. Zool. 47. Bd., p. 621—625. 6 Fig. Ber. in Journ. R. Micr. Soc. 1889, p. 231—233.

43. Keller, C. „Die Wanderung der marinen Thierwelt im Suezcanal.“ Zool. Anz. 11. Jahrg., p. 359—364 u. 389—395.

44. Korotneff, A. „Contribution à l'étude des Hydraires.“ Arch. Zool. expér. (2), Tome 6, p. 21—31, Taf. 1, 2. Ber. J. R. Micr. Soc. 1888, p. 963.

45. Krukenberg, C. Fr. W. „Die Durchfluthung des Isthmus von Suez in chorologischer Beziehung. Wissenschaftliche Ergebnisse meiner Reise von Étang de Berre über Marseille und Triest nach Suakin und Massana.“ Vergleichende Physiologische Studien. 2. Reihe. Abth. V. I, p. 1—116.

46. Derselbe. „Neue Thatfachen für eine vergleichende Physiologie der Phosphoreszenzerscheinung bei Thieren und Pflanzen. Das Leuchten des Rothen Meeres.“ Vergl. phys. Studien. 2. Reihe. Abth. V. II, p. 117—141.

47. Lang, A. „Ueber den Einfluss der festsitzenden Lebensweise auf die Thiere und über den Ursprung der ungeschlechtlichen Fortpflanzung durch Theilung und Knospung.“ Jena, 186 pp.

48. Lapworth, Ch. „Preliminary Report on some Graptolites from the

Lower Palaeozoic Rocks on the South Side of the St. Lawrence from Cape Rossier to Tartigo River, from the North Shore of the Island of Orleans, one Mile above Cape Rouge, and from the Cove Fields, Quebec." Transact. of the Royal Soc. of Canada for 1886.

49. Lendenfeld, E. von, „List of Errata in the Catalogue of the Australian Scyphomedusae and Hydromedusae." 7 pp. 1 pl.

50. Derselbe. „Der Character der australischen Coelenteratenfauna." Biol. Centralbl. VII, p. 641—646. Ber. Am. Nat. XXII, p. 353—354.

51. Derselbe. „Ueber Coelenteraten der Südsee. VII. Die australischen rhizostomen Medusen." Zeitschr. f. wiss. Zool. XLVII, p. 201—324, Taf. XVIII bis XXVII. Ber. Journ. R. Micr. Soc. 1889, p. 67—70.

52. Derselbe. „Neue Arbeiten über Australische Polypomedusen." Biol. Centralbl. Bd. VIII, p. 218—220.

53. Leuckart u. Nitzsche. „Zoologische Wandtafeln." Pl. LXIV. *Aurelia aurita*. Kassel 1888.

54. Lo Bianco, S. „Notizii biologiche riguardanti specialmente il periodo di maturità sessuale degli animali del golfo di Napoli." Mitth. Zool. Station Napoli VIII, p. 385—440 (Coelenteraten p. 386—393).

55. McIntosh, W. C. „On *Lesueuria* a Ctenophore new to Britain." Ann. Mag. Nat. Hist. (6) vol. 2, p. 464—466, Ber. Journ. R. Micr. Soc. 1889, p. 71.

56. Derselbe. „On the Appearance and Disappearance of *Lucernaria* and other Forms." Ann. Mag. Nat. Hist. (6) vol. 2, p. 471—472.

57. Neumayr, W. „Die Stämme des Thierreiches." Wirbellose Thiere. I. Bd. Wien u. Prag, 603 pp., 192 Fig. (Coelenteraten p. 238—347, F. 45—76.)

58. Nicholson, H. A. „On the Structure and affinities of the Genus *Parkeria* Carp." Ann. Mag. Nat. Hist. (6) Bd. I, p. 1—12, Taf. 3.

59. Sharp, B. „Ctenophores in Fresh Water." Proc. Acad. N. Sc. Philadelphia p. 82—83. Ber. in Journ. R. Micr. Soc. 1888, p. 565—566.

*60. Suchetet, A. „L'hybridité dans la nature." Rev. Quest. Sci. XXIV, p. 175—244 (Coelenteraten p. 177).

*61. Tlght, W. G. „A Note on a peculiar habit of Fresh-water *Hydra*." Bull. Denison Univ. IV, p. 131.

62. Vallentin. „*Psorospermium Lucernariae*." Zool. Anz. XI. Jahrg. No. 292, p. 622.

63. Vanhöffen, E. „Untersuchungen über semaeostome und rhizostome Medusen." 51 pp. Dissertation. Königsberg.

64. Vayssière, A. „Atlas d'anatomie comparée des invertébrés." Fasc. 2 u. 3. Paris fol. 30 Taf. mit Erklärungen (Coelenteraten Taf. 54, 55, 56 u. 58).

65. Vigulier, C. „Etudes sur les animaux inférieurs de la baie d'Alger." Arch. zool. expér. (2) VI, p. 351—373, Taf. XIX—XX. Ber. Journ. R. Micr. Soc. 1889, p. 393.

*66. Vine, G. R. „Note on the Palaeontology of the Wenlock Shales of Shropshire." P. Yorks. Geol. Polyt. Soc. IX, p. 224—248.

67. Wentzel, J. „Ueber fossile Hydrocorallinen (*Stromatopora* und ihre Verwandten) überhaupt mit besonderer Berücksichtigung der in den Unterperm-schichten, Middle Productus-Limestone der Salt-Range auftretenden Formen." Prag. 8°. 26 pp. 4 Taf. Lotos IX. 1889, p. 1—29, Taf. 1—3.

*68. Wilson, E. B. „Note on the mechanism of the thread cells in *Hydra*." Am. Micr. Journ. IX, p. 79—80.

Allgemeines.

Bei seinen Untersuchungen über den Einfluss der festsitzenden Lebensweise auf die Thiere und über den Ursprung der ungeschlechtlichen Fortpflanzung durch Theilung und Knospung gedenkt **Lang** (47) auch des Generationswechsels bei Coelenteraten und des Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Polypen und Medusen. Verfasser giebt zu, dass die Hydrozoen und Scyphozoen freischwimmende Vorfahren gehabt haben und dass die Gonophoren der Hydroiden reducirte und gewordene Medusen sind. Das Fehlen von Sinnesorganen am aboralen, beim Schwimmen nach vorn gerichteten, Pole, der radiaere Körperbau, die Ausstattung mit Tentakeln im Umkreise des Mundes die Stockbildung und Fortpflanzung durch Knospung und Theilung, alles Charactere, die sonst nur festsitzenden Thieren zukommen, lassen annehmen — entgegen der Ansicht von Brooks, Keller und Vogt — dass die freischwimmende Lebensweise der Medusen gegenüber der festsitzenden der Polypen nicht die ursprüngliche sei.

Als giftige Coelenteraten von New England nennt **A. E. V.** (1) auf eine Anfrage *Cyanea arctica* und *Physalia*.

Giard (28) erwähnt bei einer Zusammenstellung der Thiere, bei denen Zerstörung der Geschlechtsorgane durch Parasiten auftritt (castration parasitaire) folgende Coelenteraten:

<i>Wirth</i>	<i>Parasit</i>
<i>Coryne eximia</i>	<i>Phoxichilidium</i> sp.
<i>Hydractinia echinata</i> .	<i>Phoxichilidium mutilatum</i>
<i>Tubularia</i> sp.	<i>Phoxichilidium</i> sp.
Diverse Geryoniden . .	Diverse Cuninen (Castration wahrscheinlich)
<i>Gorgonia</i> sp.	<i>Tubularia parasitica</i> .

Ueber weitere Parasiten siehe **Giard** (31) p. 140, **Haddon** (35) p. 147, **Valentin** (62) p. 159.

Notizen das Leuchten der Coelenteraten betreffend finden sich bei **Dubois** und **Kruckenber**. **Dubois** (16) führt das Leuchten der *Pelagia noctiluca* auf einen Bacillus, *Bacterium Pelagia* zurück. Die Farbe des Phosphoreszenzlichtes der Beroideen des Mittelmeeres ist nach **Kruckenber** (46) lebhaft lasurblau. Nur *Bolina hibernica* zeichnet sich vor den übrigen durch einen Stich ins Gelbliche aus. Aus Tabellen, die bei derselben Gelegenheit zusammengestellt wurden, ergibt sich:

- für *Aurelia aurita*: Ertragbares Temperaturmaximum 29,5°
Absterbepunkt 34° vorübergehende Kältestarre bei —6,7°
- „ *Rhizostoma Cuvieri*: Ertragbares Temperaturmaximum
30° Absterbepunkt 35°
- „ *Chiaja* (multicornis?) Ertragb. Temperaturmaximum 40
bis 41° Absterbepunkt 40—41°
- „ Beroideen: Ertragbares Temperaturmaximum — Absterbe-
punkt 40—50°.

Kruckenber (45) führt als gemeinsam im Mittelmeer und Rothen Meer vorkommend an von Coelenteraten: *Aurelia aurita* Lam., *Rhizostoma Cuvieri* Pér. et Les. und *Bolina hydatina* Chun.

Als aus dem Rothen Meer eingewandert wurde *Cassiopeia Andromeda* Forsk. im Timsah See beobachtet.

Keller (43) schliesst aus dem Vorkommen eines der *Rhizostoma Cuvieri* des Mittelmeeres nahe stehenden Form von *Rhizostoma*, die auf den Golf von Suez beschränkt ist und südlich von El Tor am Fusse des Sinai nicht gefunden wurde, dass diese Meduse vor langer Zeit durch den Isthmus gewandert sei, wie sie auch heute wieder durch den Isthmus zieht. Er leitet die Erythraeische *Rhizostomencolonie* vom Mittelmeerbecken her und hebt hervor, dass er und nicht Kruckenberg *Cassiopeia Andromeda* im Timsahsee zuerst beobachtete, wo diese Meduse festsitzend, schon in der Grösse eines Pfennigstückes verankert, lebt. Diese Strandmeduse wurde vermuthlich gelegentlich von Strömungen losgerissen und aus dem Rothen Meer in das Canalbett hineingetrieben.

Grieg (33) giebt ein Verzeichniss der bei Moster am Eingange des Hardangerfjords beobachteten Seethiere. Darunter finden sich 25 Hydroidpolypen und die beiden acraspeden Medusen: *Aurelia aurita* und *Cyanea capillata*.

In seinem Bericht über die biologische Untersuchung der See im Westen von Lewis während der Monate Juli und August 1887 erwähnt **Hoyle** (41) ohne bestimmte Angaben, dass von Coelenteraten im Juli Medusen, Ctenophoren, Siphonophoren, *Aurelia aurita* und eine grössere Meduse gefunden wurde.

Lo Bianco (54) macht in einem alphabetischen Verzeichniss Angaben über die Zeit der Geschlechtsreife von 23 Hydroidpolypen, 19 Craspedoten Medusen, 10 Siphonophoren, 4 Acalephen und 11 Ctenophoren aus dem Golf von Neapel und giebt dabei auch einzelne Notizen über das Vorkommen derselben.

Chun (12) berichtet über das Vorkommen von Medusen, Ctenophoren und Siphonophoren in grösseren Tiefen des Mittelmeeres vergl. p. 157.

Giard (31) gedenkt auch der Coelenteraten bei der Zusammenstellung seiner faunistischen Beobachtungen in Wimereux. *Chrysaora hysoscella* erschien daselbst von Juli bis August 1874 in colossaler Menge mit vielen Farbenvarietäten, *Rhizostoma Cuvieri* war besonders häufig von August bis September 1879, *Aurelia aurita* tritt in grösster Zahl im Juni und Juli auf. *Pleurobrachia pileus* erscheint in grosser Menge Jahr für Jahr in den Wintermonaten. Zahlreiche Exemplare derselben erwiesen sich im März und April durch einen Cestoden (*Scolex polymorphus*?) inficirt. Im Frühjahr 1887 waren besonders schön die Stöckchen von *Sertularia argentea* Ell. u. Sol. und *Sertularia cupressina* L. entwickelt und *Lucernaria octoradiata* trat in erstaunlichen Mengen auf. *Tubularia indivisa* L. hatte durch den Frost des Winters 87/88 stark gelitten und *Obelia dichotoma* wurde mit den meisten Exemplaren durch die Kälte getödteter *Portunus*arten ans Land gespült, auf denen sie sich in der Frontalregion angesiedelt hatte.

Nach Notizen und Skizzen von Greely beschreibt **Fewkes** (21)

Coelenteraten von Discovery Harbor unter 81° 44 N. B. und 65° 45' W. L. Es werden erwähnt von Acraspeden: *Nauphanta polaris*, n. sp., die sich von *N. Challengeri* durch die Profilfigur unterscheidet, von Craspedoten: *Solmundella* sp. *Solmundus* sp., und *Tiara conifera* Haeckel, die wahrscheinlich nur eine Varietät von *T. pileata* ist, und deren Jugendform wahrscheinlich eben so wie die Jugendstadien von *Stomotora* und *Dinemetella* keinen Scheitelaufsatz besitzt; von Siphonophoren: *Agalmopsis cara* A. Ag. und von Ctenophoren: *Lesueurina* sp., *Bolina* sp. und *Mertensia ovum* (?) Mörch. Ueber 3 weitere Formen, 2 Tubulariden und 1 Ephyra oder erwachsene Discophore, lassen sich keine genaueren Vermuthungen aussprechen.

Fewkes (24) macht darauf aufmerksam, dass die Coelenteratenfauna der Fundy Bay, da letztere kalte Strömungen aufnimmt, Beziehungen zur arktischen Fauna zeigt, dagegen wesentlich verschiedene ist von der der benachbarten Narragansettbay, die durch südliche Ströme erwärmt wird und erwähnt von der ersteren Localität 3 Ctenophoren, 1 Siphonophore, 8 craspedote und 3 acraspede Medusen. Specieller beschrieben werden davon die Siphonophore *Nanomia cara* A. Ag. von Craspedoten, *Sarsia mirabilis* A. Ag. mit ihrem parasitischen Polypen *Hydrichthys mirus* Fewkes, *Halopsis ocellata* A. Ag. und von Acraspeden *Callinema ornata* Verrill.

Nanomia ist eine Physophoride, die sich von *Agalmopsis* Fewkes nur durch die Oeltropfen („oil globule“) an der Basis der Taster unterscheidet. Von ihr wurden erwachsene Exemplare von 4—5 Fuss Länge mit 15 Paar Schwimmglocken beobachtet, während Agassiz nur jüngere Exemplare mit 4 Schwimmglockenpaaren gefunden hatte. Männliche und weibliche Geschlechtsglocken sprossen an demselben Stock. Die ersteren sind milchweiss, die letzteren durchsichtig. In der weiblichen Glocke findet sich nur ein einziges Ei, das farblos, in Wasser fast undurchsichtig und fast ganz mit spongöser Protoplasma-masse erfüllt ist, ähnlich wie es Metschnikoff bei *Epibulei* beschreibt. Neue Colonien sollten sich nach Agassiz durch Knospung und durch Entwicklung aus dem Ei bilden. Knospung wurde von Fewkes nicht bemerkt, wird angezweifelt und bedarf jedenfalls der Bestätigung. Die Entwicklung der Eier wurde bis zum 8 Zellen Stadium verfolgt. Nach Analogie mit verwandten Physophoriden, deren Entwicklung Metschnikoff schilderte, entwickelt sich aus dem 8 zelligen Stadium eine Planula, deren breiteres dem Munde entgegengesetztes Ende sich zur Pneumatophore ausbildet. Die Pneumatophore entspricht nach Fewkes, der sich an Metschnikoff anschliesst, dem Fuss der jungen Polypen, dem Schirm der Medusen und den primären Deckstück bei *Agalma*.

Callinema ornata wird folgendermassen beschrieben: *Exumbrella* mit Warzen bedeckt. Von der Gastralhöhle verlaufen 16 verzweigte Canäle in der Richtung der Rhopalien zwischen 16 einfachen zum Ringcanal. Tiefe Einschnitte für die Rhopalien trennen den Schirmrand in 16 Randleppen, in welche der Ringcanal blinde Canäle

entsendet. 8—10 Tentakeln entspringen zwischen je zwei Randkörpern am Ringcanal. Die Mundarme gleichen denen von *Cyanea*; 8 grosse Gonaden hängen an der Basis des Mundrohrs herab. *Callinema* ist mit *Heccadecomma ambiguum* Brandt und *Phacellophora*, wozu Haeckel sie rechnet, verwandt, muss jedoch nach Fewkes als besondere Gattung betrachtet werden.

Agassiz (2) schildert die Coelenteratenfauna des Golfstroms. Er erwähnt grosse Ctenophoren, die als leuchtende Kugeln vorüber treiben und Physalien, die als Feuerballons auf der Oberfläche schweben neben vielen kleineren Lichtern, verursacht durch kleinere Medusen. *Tima*, *Zygodactyla* und *Staurophora* sind häufig an der Oberfläche vor 10 Uhr Morgens, während *Polyclonia*, jung und alt, entweder früh Morgens oder spät Nachmittags oder in der Nacht schwimmt; bei Tage liegt sie mit den Tentakeln nach oben im Schlamm halb vergraben.

Besonders charakteristisch für den Golfstrom sind *Porpita*, *Velella* und *Physalia* und der Thätigkeit des Golfstroms muss man auch das gelegentliche Erscheinen dieser Siphonophoren wie auch das von *Eudoxia*, *Epibulia* und *Diplophysa* an der Küste von Neu England zuschreiben. *Agalma* und *Nanomia* dagegen, die bei Newport gefunden wurden, kommen mit nördlicher Strömung herab. Ebenfalls vom Golfstrom nach den Küsten von New England werden *Cunina*, *Eutima*, *Trachynema*, *Liriope*, *Zanclus* u. a. m. heraufgebracht. Ferner werden erwähnt: *Linerges mercurius* als eine der gemeinsten westindischen Medusen, *Glossocodon* und die Ctenophore *Mnemiopsis leidyi*. In den Straits of Florida wurden beobachtet: sehr zahlreich *Velella*, ferner *Stephanomia* und *Pterophysa grandis*, die bis zu einer Länge von 30 Fuss heranwächst. *Pterophysa* hat die Fähigkeit sich herabzulassen und wieder heraufzusteigen, was auch bei einer sehr jungen *Physalia* beobachtet wurde. Stücke von *Rhizophysa*, die sonst der Tiefe angehören soll, wurden nicht selten an der Oberfläche bemerkt. *Aurelia* und *Cyanea* traten in so grossen Scharen auf, dass sie in einiger Entfernung wie mächtige Sandbänke erschienen. Im zweiten Bande in besonderem Capital werden die Tiefsee-Coelenteraten behandelt. Eine Tiefenform, die nur zufällig an der Oberfläche erscheint ist *Ptychogena lactea*. Licht- und Temperaturerhöhung tödten sie leicht, die Gallerte wird undurchsichtig und zerfällt bald nach dem Erscheinen an der Oberfläche. *Ocyroe*, die einzige gelappte Ctenophore ohne Tentakeln, die seit ihrer Entdeckung 1829 nicht wieder gefunden war, wurde im Gebiet des Golfstroms beobachtet. Sie benutzt ihre grossen Seitenlappen, die auf der innern Seite mit Muskelfasern bekleidet sind, als Ruder und bewegt sich so mit grosser Schnelligkeit vorwärts. *Eucharis multicornis* wurde ebenfalls bei den Tortugas und Key West beobachtet.

Zu den Tiefseemedusen des Golfstroms gehören noch: *Dodeca-bostrycha dubia*, *Periphylla* und *Atolla*. Von Siphonophoren ist gemein im Golfstrom: *Agalma Okenii*; *Athorybia formosa*, eine neue

Species, wurde bei den Florida Key's gefunden, ferner *Gleba hippopus*, *Diphyes crenata* 1240 Faden, *Aglaophenia bispinosa* 200 Faden, *Cryptolaria conferta* 450 Faden, *Cladocarpus paradisea* 174 Faden, *Hippurella annulata* 283 Faden, *Callicarpa gracilis*, *Pleurocarpa ramosa* 95 Faden. Letztere zeichnet sich unter den übrigen Plumulariden durch den Mangel beweglicher Nematophoren aus. Hydrocorallinen: *Phiobothrus symmetricus* aus 5—600 Faden Tiefe als Vertreter der Milleporiden, *Cryptohelia Peircei*, *Stylaster filigranus*, *Distichopora foliacea* und *Allopora miniacea* als Vertreter der Stylasteriden.

Von australischen Hydromedusen unterscheidet von **Lendenfeld** (50) mit Einschluss der fossilen Graptolithen 241 Arten, unter denen besonders reich die Plumulariden vertreten sind, während nur 4 Arten die Tracho- und Narcomedusen repräsentiren. Die europäischen Süßwasserpolyphen *Hydra* und *Cordylophora* sind auch in Australien vorhanden. Von den zahlreichen Scyphomedusen sind am meisten verbreitet und in grosser Individuenzahl vertreten: *Cyanea Annascala*, *Cambressa mosaica* und *Phyllorhiza punctata*; auch *Aurelia coerulea* wurde in einem grösseren Schwarm angetroffen. Die übrigen Arten sind selten; im Ganzen überwiegen die Rhizostomen. Nur 2 Ctenophoren, *Bolina Chuni* und *Neis cordigera* und von Siphonophoren *Physalia* und *Velella* gehören zur Coelenteratenfauna Australiens.

Hydromedusen.

Allman (3) berichtet über von „Challenger“ erbeutete Hydroidpolyphen. Nach allgemeinen Mittheilungen über Bau, Gewebe, Entwicklung, Classification und Vertheilung der Hydroidpolyphen (pag. I bis LIX) werden 27 Gattungen mit 76 Arten von Hydroidpolyphen beschrieben, von denen 9 Genera und 64 Arten neu sind. Die neuen Genera werden folgendermassen characterisirt.

1. *Diplocyathus*: Halecinus und Ophiodes ähnlich, mit verästeltstem Stamm und abwechselnd stehenden trichterförmigen Hydrophoren, an deren Basis zwischen Hydrophor und Stamm eine cylindrische Sarcotheca sich findet.

2. *Calamphora*: mit kriechendem Hydrocaulus, mit fast sitzenden bauchigen Hydrotheken, durch die sie sich besonders von *Campanularia*, *Lafoea* und *Calicella* unterscheidet. Gonangien fast sitzend.

3. *Hebella*: mit kriechendem einröhrigen Hydrocaulus und cylindrischer ganzrandiger Hydrothek, deren Höhlung deutlich vom Stiel abgesetzt ist. Von *Lafoea* durch den einröhrigen Hydrocaulus und die deutlich abgesetzte Hydrotheca und von *Campanularia* durch die cylindrische Form des letzteren unterschieden.

4. *Halisiphonia*: Hydrocaulus einröhrig, Hydrothek cylindrisch, ganzrandig, direkt in den Stiel übergehend. Gonangien dem Hydrocaulus aufsitzend.

5. *Lictorella*: Hydrocaulus aus einer axialen und mehreren peripherischen Röhren zusammengesetzt. Hydrotheka cylindrisch, gestielt, ganzrandig, deutlich vom Stiel abgesetzt.

6. *Perisiphonia*: Die von den peripherischen Röhren vollkommen eingehüllte axiale Röhre trägt gestielte Hydrotheken, während auf den äusseren Röhren cylindrische Sarcotheken sich finden.

7. *Hypopyxis*: *Hydrocaulus* in deutliche Interradien getheilt, die zahlreiche Paare von Hydrotheken tragen. Letztere sind paarweise einander gegenüber gestellt und mit einander verwachsen. Von *Desmoscyphus* unterschieden durch 2 tassenförmige Sarcotheken am Grunde der Hydrothek. Gonangien ohne *Marsupium*, in den Zwischenräumen zwischen je zwei Hydrotheken entspringend.

8. *Staurotheca*: Hydrothekenpaare abwechselnd kreuzweise gestellt, dadurch von *Sertularia* verschieden. Gonangien, einfache Kapsel, ohne *Marsupium*, vom *Hydrocaulus* entspringend.

9. *Dictyocladium*: *Hydrocaulus* einröhrig, in einer Ebene ausgebreitet, dichotom verzweigt und so ein Netzwerk bildend. Derselbe ist in unregelmässigen Zwischenräumen gegliedert und trägt nach allen Seiten vertheilt Hydrotheken. Hierdurch besonders von *Thuiaria* verschieden.

Die neu beschriebenen Arten sind:

Stylactis vermicola (Nördlicher Pacif. Ocean 2900 Faden), *Eudendrium vestitum* (Heard Island), *Monocaulus imperator* (Yokohama 2900 Faden), *Halcium robustum* (Kerguelen), *H. telescopicum* (Port Jackson), *H. flexile* (Patagonien), *H. fastigiatum* (Tristan d'Acunha), *H. dichotomum* (Cap), *H. cymiforme* (Patagonien), *Diplocyathus dichotomus* (Torres Str.), *Campanularia insignis* (Bermudas), *C. tulipifera* (Heard Island), *C. retroflexa* (Honolulu), *C. ptychocyathus* (Bahia), *C. cheloniae*, *Thyrosocyphus simplex* (Torres Str.), *Hypanthea aggregata* (Kerguelen), *H. hemisphaerica* (Falklandsinseln), *Calamophora parvula* (Bassstr.), *Hebella striata* (Magellanstr.), *Halisiphonia megalotheca* (Südaustralien), *Lictorella cyathifera* (Neu-Hebriden), *Cryptolaria humilis* (Azoren 1000 Faden), *C. abyssicola* (Südaustralien 2600 Faden), *C. flabellum* (Westindien), *C. pulchella* (Honolulu), *C. crassicaulis* (Ascension), *C. geniculata* (Fidjiinseln), *C. gracilis* (Neu-Seeland), *C. diffusa* (Sierra Leone 2500 Faden), *Perisiphonia filicula* (Australien), *P. pectinata* (Neu-Seeland), *Grammaria stentor* (Kerguelen), *G. magellanica* (Falklands), *G. insignis* (Marion Island), *Sertularia gracilis* (Patagonien), *S. annulata* (Port Jackson), *S. leiocarpa* (Nachtigalinsel), *S. unilaterialis* (Kerguelen), *S. clausa* (Montevideo), *S. implexa* (Cap Virgins—Falklandinseln), *S. exigua* (Azoren), *S. exserta* (Heard Island), *S. echinocarpa* (Kerguelen), *S. catena* (Westindien), *S. geniculata* (Philippinen), *S. cylindritheca* (Bahia), *S. integritheca* (Bahia), *S. articulata* (Kerguelen), *Thuiaria quadridens* (Cap Virgins—Falklandinseln), *Th. pharmacopoda* (Azoren), *Th. vineta* (Flinders passage), *Th. pectinata* (Cap), *Th. hyalina* (Pernambuco), *Desmoscyphus pectinatus* (Bassstr. Bahia), *D. gracilis* (Bermuda), *D. obliquus* (Cap York), *D. acanthocarpus* (Bahia), *Hypopyxis labrosa* (Australien), *Staurotheca dichotoma* (Marioninsel), *Dictyocladium dichotomum* (Bassstr.), *Synthecium campylocarpum* (Port Jackson), *S. alternans* (Port Jackson), *Thecocladium flabellum*.

Bale (4) untersucht eine Sammlung von 60 australischen Hydromedusen, von denen 19 Arten und 2 Varietäten als neu beschrieben werden. Es sind dieses *Obelia angulosa*, *Campanularia* (?)

spinulosa, C. (?) *serrulata*, *Lafoëa scandens*, *Halecium gracile*, H. *parvulum*, *Sertularia divaricata* var. *subdichotoma* und var. *dubia*, S. *longithecata*, S. *variabilis*, S. *cylindrica*, *Sertularia geniculata*, *Thuiaria suinosa*, *Plumularia turgida*, P. *caliculata*, P. *alata*, P. *aurita*, *Aglaophenia sinuosa*, A. *macrocarpa*, A. *phyllocarpa*, A. (?) *Whiteleggei*.

Mehrere der von v. Lendenfeld beschriebenen Typen wurden nachuntersucht und die Diagnosen einiger vervollständigt, andere mit schon früher bekannten Arten identificirt, so *Diphasia symmetrica* v. L. = *Sertularia bispinosa* Gray, *Sertularia fertilis* v. L. = *Thuiaria sub-articulata* Coughtrey, *Plumularia gracilis* v. L. = P. *Ramsayi* Bale, P. *Torresia* v. L. = P. *campanula* Busk, P. *tripartita* v. L. = P. *setacea* Ellis, *Pennaria rosea* v. L. = *Pennaria australis* Bale.

Für *Plumularia producta* Bale wird ein neues Genus *Azygoplon* mit der Art *Azygoplon productum* gegründet. Gattungsmerkmale: Sarkothek fehlt über dem Kelch, die vorderen Sarkotheken sind von der Hydrothek völlig getrennt und ähneln den entsprechenden Organen bei einigen *Eleutheroplea*. Nahe stehend sind: *Halicornopsis* (*Azygoplon* Allman), die vordere der Hydrothek angewachsene Sarkotheken hat und *Diplocheilus*, der sich durch das Vorhandensein einer äusseren Kelchhülle (*external calycine envelope*) unterscheidet. Der Gattungsname *Azygoplon* ist hier brauchbar, weil *Halicornopsis* vor *Azygoplon* Allm. Priorität hat. Für *Ceratella fusca* Gray wird die Familie der *Ceratellidae* von den *Hydractiniden* abgetrennt, mit nackten auf Fortsätzen eines netzartigen chitininigen Polypars sitzenden Hydranthen mit geknöpften Tentakeln, die über den Körper zerstreut sind. Gonosom unbekannt.

Vignier (65) erwähnt gelegentlich einige Hydroidpolypen von Algier ohne weitere Angaben: Es sind: *Campanularia*, *Eudendrium*, *Clava*, *Sertularia*, *Aglaophenia* und *Tubularia larynx*.

Bétencourt (6) führt vom Pas-de-Calais 14 Arten *Athecata* und 41 *Thecaphoren* auf mit Angaben über Artunterschiede, Vorkommen, Häufigkeit und Fortpflanzungszeit.

Du Plessis (17) constatirt bei Villafranca 28 Arten von *Gymnoblasten* oder *Athecaten*, von denen als neu für das Mittelmeer angegeben werden: *Coryne vaginata* Allm., *Coryne fucicola* F. de Filippi (*Halobotrys fucicola*), *Bimeria vestita* T. S. Wright, *Acharadria larynx* T. S. Wright.

Heape (38) zählt aus der Fauna des Plymouth Sound 12 Gattungen mit 15 Arten von *Gymnoblasten* und 6 Gattungen mit 21 Arten von *Calyptoblasten* auf.

Korotneff (45) ergänzt seine früheren Beobachtungen an *Myriothele* durch Untersuchung der jüngsten Entwicklungsstadien. Männliche und weibliche Gonophoren sprossen auf demselben Individuum, ja selbst auf demselben Blastostyl, nur sind die männlichen spärlicher, so dass einer männlichen Gonophore eine ganze Gruppe weiblicher entspricht. Die Eier legen sich als Urkeimzellen

im Ectoderm der weiblichen Gonophore an. Aus den Urkeimzellen entstehen secundäre Zellen, die zu Zellhaufen von mehr als 20 Zellen vermehrt werden können. Aus dem Kern einer dieser Zellen jedoch nur bildet sich das Keimbläschen, die übrigen Kerne verschwinden, während ihre Zellen den Bildungs- und Nahrungsdotter liefern. Das Ei wird demnach als Product verschiedenartiger Elemente betrachtet.

Die männlichen Geschlechtszellen entstehen ebenfalls im Ectoderm. Aus einer centralen Zellmasse der Gonophore, die den entodermalen Spadix umgibt, bilden sich zunächst peripherisch die Spermatozoiden aus, die sich dann unter entsprechendem Schwinden der centralen Zellmasse vermehren. Nach der Reife treten die Spermatozoiden durch den Spadix in die Blastostylhöhle und dringen wahrscheinlich zur Befruchtung durch den Eistiel in das Ei ein. Nach der Befruchtung löst sich das Ei von einem Stiel ab, wird jedoch von hervorgesprossenen geknüpften Filamenten oder Wurzeln am Mutterthier festgehalten.

Ishikawa (42) fand bei jugendlichen Medusenknospen von *Podocoryne carnea* in der Tiefe des Ectoderms einige Zellen, die sich von den übrigen Ectodermzellen unterscheiden und von denen eine gerade in der Linie der Stützlamelle lag. An einem Schnitt durch eine ältere Medusenknospe konnte er im Ectoderm Eizellen und Keimzellen beobachten, während ausserdem im Ectoderm grosse unzweifelhafte Eizellen auftraten. Aus dem Vorhandensein dieser Eizellen im Ectoderm ergibt sich, dass die differenten Ectodermzellen der jungen Knospe Keimzellen sind, die sich nur selten auch im Ectoderm entwickeln, gewöhnlich hingegen sehr früh ins Entoderm einwandern, wo sie zu Eizellen werden. Er bestätigt dadurch die Hypothese Weismanns, dass bei *Podocoryne carnea* die Urkeimzellen im Ectoderm der Medusenknospe entstehen, dann ins Entoderm einwandern und sich dort zu Keimzellen differenzieren.

Fewkes (25) beschreibt ausführlich einen Hydroidpolypen (*Hydrichthys mirus*), der auf einem Fisch *Seriola zonata* schmarotzend gefunden wurde. An der Seite des Fischkörpers wurde, durch eine aus verzweigten Röhren zusammengesetzte Platte befestigt, eine Polypencolonie bemerkt, welche aus geschlechtlichen Individuen, Gonosomen, und ungeschlechtlichen, „filiform bodies“, bestand. Die Gonosomen, an denen *Sarsia* ähnliche Medusen knospten, entbehrten ebenso wie die „filiform bodies“ in Folge ihrer parasitischen Lebensweise der Tentakeln. Fewkes sieht wegen des Polymorphismus und der aus verzweigten Röhren zusammengesetzten Basalplatte, die ihn an den Schwimmkörper von *Veella* erinnert, in *Hydrichthys* den nächsten Verwandten dieser Siphonophore unter den festsitzenden Hydroiden.

In *Epenthesis* Mc. Cradyi beschreibt **Brooks** (8. 9.) eine Meduse von Nassau und Green Turtle Harbors, Bahama Islands, die nächst verwandt mit *Epenthesis foliata* Mc. Crady ist. An ihren Geschlechtsproducten trägt sie Campanulaartige Hydroidblastostyls in

chitinösen Gonangien, die sich nicht zu Polypenstöckchen entwickeln, sondern Medusen knospen. Das Ectoderm des Blastostyls hängt direct mit dem der Meduse zusammen; das Entoderm entsteht aus den Keimzellen durch einen Process ähnlich dem, den Metschnikoff bei *Cunina* Sporogenesis genannt hat: Die Blastostyle sind gewissermassen Parasiten auf dem Gewebe der Fortpflanzungsorgane.

Brooks fand ferner bei *Epenthesis folliata* Mc. Crady Vermehrung durch Theilung, wie sie Lang von *Gastroblasta Raffaelli* beschreibt, und rechnet auch die letztere Meduse zu *Epenthesis*, ebenso wie Haeckel Kefersteins *Eucopa gemmifera* (mit Knospen am Magen) dort unterbrachte. Ob Keller's *Gastroblasta timida* ebenfalls eine *Epenthesis* ist, wagt er nicht zu entscheiden wegen der entodermalen Sinnesorgane jener und der grossen Zahl von Tentakeln, während die sonstige Beschreibung gut zu *Epenthesis* passt.

Chun (12) fand in Tiefen von 600—1300 m des Mittelmeeres folgende Hydromedusen, die auch von der Oberfläche bekannt sind, im Sommer aber grössere Tiefen aufsuchen: *Lizzia Köllickeri*, *Cytaeis pusilla*, *Sminthea eurygaster*, *Aglaura hemistoma*, *Rhopalonema velatum*, *Geryonia hastata* (junge Exemplare in der Tiefe, erwachsene an der Oberfläche), *Liriope eurybia*, *Cunina albescens* und *Aeginopsis mediterranea*.

Giard (30) beobachtete *Rathkea octopunctata* Sars im März 1888 bei Wimereux und tritt für die Berechtigung ihres Namens ein, da sich in der That 8 Pigmentflecke an den Tentakelbasen finden, während Boehm und andere Forscher annahmen, dass diese Erscheinung nur auf durch Chylus braungrün bis schwarz gefärbte Canäle zurückzuführen sei. Erst nach dem Tode des Thieres dringt das Pigment durch die Canäle in die Tentakeln hinein.

Haddon (35) beschreibt Actinienlarven aus der Familie der Edwardsiidae, wahrscheinlich zu *Peachia hastata* gehörig, die zu St. Andrews an Leptomedusen schmarotzend gefunden wurden.

Ueber Parasiten der Hydromedusen berichtet auch **Giard** (28) p. 139. Andere Notizen über Hydromedusen bei **Lang** (47) p. 139, **Grieg** (33) p. 140, **Lo Bianco** (54) p. 140, **Giard** (31) p. 140, **Fewkes** (21, 24) pp. 140, 141, **Agassiz** (2) p. 142, v. **Lendenfeld** (50) p. 143.

Hydrocorallinae.

Unter 51 Polypen, die das Riff der Insel Kamarane aufbauen, erwähnt **Faurot** (20) auch 2 Milleporiden: *Millepora plicata* und *M. verrucosa*, die nur selten und dann wenig gut entwickelt lebend gefunden wurden und schliesst aus diesem Vorkommen, dass dieselben nur in tiefem Wasser gut gedeihen können.

Weiteres über Hydrocorallinen bei **Agassiz** (2) p. 142, **Hickson** (40) s. Ber. f. 1887.

Siphonophoren.

Haeckel (36, 37) giebt einen Bericht über die während der Reise des „Challenger“ gesammelten Siphonophoren, den er durch Verwerthung zahlreicher früherer Beobachtungen vervollständigt.

Dieser Bericht, dem eine kurze vorläufige Uebersicht voranging, besteht aus einer allgemeinen Einführung in das Studium der Siphonophoren, aus einer Beschreibung der Familien, Gattungen und Arten, einer Zusammenstellung der wissenschaftlichen Bezeichnung der einzelnen Organe in lateinischer Sprache nebst ihrer englischen und deutschen Uebersetzung und einer kurzen statistischen Uebersicht über die im Bericht aufgezählten Familien, Gattungen und Arten der Siphonophoren.

Im Eingange sucht Haeckel die sich gegenüberstehenden Polyorgan- und Polypersonentheorien zu seiner Medusomtheorie zusammenzufassen, indem er annimmt, dass der stets aus einer einzigen Medusenperson sich entwickelnde Siphonophorenstock aus intacten Personen und anderen aufgelösten besteht, deren Organe von einander getrennt, vereinzelt und oft in vermehrter Zahl erscheinen, so dass man an jenem sowohl einzelne Individuen, Personen, als auch einzelne selbstständige Organe unterscheiden kann.

Dann werden die jüngsten Entwicklungsstadien der Siphonophoren beschrieben, die entweder 8strahlig und regulär, Disconula (mit 8 Tentakeln, 8 Luftkammern und centraler Luftflasche) oder bilateral und symmetrisch, Siphonula, sind und in denen sich schon die Spaltung der Siphonophoren in 2 Gruppen: Disconanthae und Siphonanthae offenbart. Aus der Disconula, die gewissen Trachomedusen (Pectylliden) gleicht, entwickelt sich die Porpula durch Auftreten von 8 weiteren Tentakeln und durch Vermehrung der Luftkammern. Nach weiterer Vermehrung dieser Organe knospen zwischen dem mittleren Siphon (Nährpolyp) und dem Schirmrand die 8 oder 16 Gonophorenträger hervor, die bei den monogastrischen Discaliden geschlossen bleiben, bei den Porpitiden und Velelliden aber eine Mundöffnung erhalten. In der Aehnlichkeit mit den Pectylliden zeigt sich Verwandtschaft; die Disconanthae stammen von den Trachomedusen ab.

Die bilaterale Siphonula gleicht gewissen an Corymorpha knospenden Codoniden, an deren cylindrischem Magen ja auch in seiner ganzen Länge neue Medusen knospen können. Sie sind als Vorfahren der Siphonanthae zu betrachten. Aus der ursprünglichen Umbrella der Siphonula (Protocodon) entwickelt sich bei den Calycophoriden die primäre Schwimglocke, bei Physonecten, Cystonecten und Aurnecten der Pneumatophor. Der ursprüngliche Siphon (Protosiphon) der Siphonale bleibt entweder der Magen der monogastrischen Siphonanthae oder entwickelt sich zum Stamm der polygastrischen Formen.

Der Siphonophorenstamm ist entweder einfach und besteht dann aus einer einzelnen centralisirten Gruppe von Personen oder ist zusammengesetzt aus mehreren Cormidien, d. h. individualisirten Personengruppen, die zerstreut am Stamm auftreten und monogastrisch oder polygastrisch sein können. Die Cormidien sind entweder intakt — und dann regelmässig entsprechend den Metameren des gegliederten Stammes angeordnet (Apolemidae, Rhizophysidae)

oder eng zusammengedrängt, so dass die Internodien verschwinden (Discolabidae, Rhodalidae) — oder aufgelöst mit getrennten Organen, Siphon, Taster, Gonophoren, Deckstücken etc. (Physalia, Agalmopsis). In letzterem Falle wird der Bau des Stockes zuweilen noch complicirter durch Vervielfältigung der Organe.

Die monogastrischen Cormidien sind entweder:

1. Eudoxome (Calyconectae), frei als Eudoxia, aus Siphon, Tentakel, Deckstück und Gonophor bestehend,
2. Ersaeome (Calyconectae), frei als Ersaea, bei denen noch eine Specialschwimmglocke hinzukommt,
3. Rhodalome (Rhodalidae) mit Siphon, Tentakel und einem oder mehr Gonophoren (mit Gonopalpon),
4. Athorome (Physophora und Anthophysiden) mit Siphon, Tentakel, ein oder mehreren Palpen und ein oder mehreren Gonophoren,
5. Crystallome (Crystallodes, Anthemodes und andere Physonectae), bei denen noch eine Bracteengruppe hinzukommt.

Die polygastrischen Cormidien sind seltener und weniger mannigfaltig; sie kommen vor bei Apolemia (Physonectae) und Salacia (Cystonectae).

Der Siphonophorenstock zerfällt in Schwimmkörper, Nectosoma und Nährkörper, Siphosoma; der erstere ist gewöhnlich links (♂), der andere rechts (♀) gedreht. Die Theile des Schwimmkörpers wie Schwimmglocken, Pneumatophoren und Aurophoren werden nach der Medusomtheorie als Organe, nicht als Personen gedeutet. Ebenso werden die zum Siphosom gehörigen Deckstücke, Gonophoren, Siphonen (Nährpolypen), Palpen (Taster), Cysten (Afterblasen) und Gonostyle theils als dislocirte Organe von Medusomen, theils als vermehrte Ersatzorgane derselben gedeutet. Deckstück und Siphon zusammen erst bilden ein Medusom. Palpen sind von den Cysten nur durch Fehlen einer distalen Oeffnung, von den Siphons noch durch Mangel von Drüsenzotten und Leberstreifen unterschieden. Tentakel oder Fangfäden werden von den Palpakeln oder Fühlfäden unterschieden. Während erstere am Grunde der Siphonen sitzen, finden sich letztere an der Basis der Palponen. Bei zusammengesetzten Tentakeln werden die secundären Fäden als Tentillen bezeichnet. Ferner sind primäre Deckstücke (Protobracteae), die der Umbrella einer medusoiden Person entsprechen, zu unterscheiden von solchen zweiter Ordnung, die aufgefasst werden können 1. als dislocirte Umbrella secundärer Medusome, 2. als Ergänzungsbracteen der letzteren, 3. als Stücke einer zertheilten Umbrella.

Die häufig baumartig verzweigten Gonostyle sind gewöhnlich mundlos und als sexuelle Palpons zu deuten. Sie übernehmen die Production der Gonophoren. Letztere entsprechen einer Medusenperson, da stets Umbrella und Manubrium vorhanden sind. Die meisten Siphonophoren sind monöcisch; diöcisch sind nur einige Calyconectae (Mitrophyes, Galeolaria) und einige Physonectae (Apolemia und Athoralia). Hermaphroditen sind nicht bekannt.

Nach dieser Schilderung der wichtigsten am Siphonophorenstock zu beobachtenden Organsysteme und Organe beginnt die Beschreibung der neuen Formen. Darunter sind 5 neue Gattungen: *Armenista*, *Lilaea*, *Desmalia*, *Forskaliopsis* und *Stephanolia* und die folgenden 47 Arten, von denen 28 vom Challenger erbeutet wurden, während Haeckel 19 davon (mit * bezeichnet) selbst gesammelt hatte:

Discalia medusina, *Disconalia gastroblasta*, *Porpalia prunella*, *Porpema medusa*, *Porpitella pectanthia*, *Porpita fungia*, *Rataria cristata*, *Armenista sigmoides*, *Cuboides crystallus*, *Amphiroa carina*, *Sphenoides obeliscus*, *Aglaisma Gegenbauri*, *Ersaea compressa*, *Monophyes princeps**, *Mitrophyes peltifera*, *Cymbonectes Huxleyi**, *Cymba crystallus*, *Praya galea*, *Diphyopsis compressa*, *Abyla marina*, *Bassia obeliscus*, *Calpe Gegenbauri*, *Desmophyes annectens**, *Polyphyes unguolata*, *Vogtia Köllikeri*, *Circalia Stephanomia**, *Athoria larvalis**, *Dicymba diphyopsis**, *Crystallodes vitrea**, *Agalma Eschscholtzii**, *Anthemodes ordinata**, *Lychnagalma vesicularia**, *Forskalia theloides**, *Nectalia loligo**, *Discolabe quadrigata**, *Athorybia ocellata**, *Anthophysa Darwinii*, *Stephalia corona**, *Stephanolia bathyphysa*, *Rhodalia miranda*, *Cystalia monogastrica*, *Cannophysa Murrayana**, *Nectophysa Wyvillei**, *Salacia polygastrica*, *Epibulia Ritteriana**, *Alophota Giltischiana**, *Arethusa Challengeri*.

Ferner werden als neu noch 37 Arten erwähnt von denen jedoch nur 9 zur Sammlung des Challenger gehören. Davon sind 12 im Text ganz kurz characterisirt:

Discalia primordialis, *Disconula pectyllis*, *Eudoxella didyma*, *Desmalia imbricata*, *Athoralia coronula*, *Stephanomia nereidum*, *Anthemodes utriculata*, *Stephanospira corona*, *Rhodophysa corona*, *Auralia profunda*, *Aurophysa ordinata*, *Arethusa thalia*,

21 sind als neue Namen nur mit Fundort ohne jede Beschreibung angeführt:

Porpema lenticula, *Porpema pileata*, *Porpita australis*, *Armenista lobata*, *Eudoxella galea*, *Cuboides nacella*, *Sphenoides tetragona*, *Lilaea medusina*, *Cymbonectes cymba*, *Cymba nacella*, *Lilyopsis catena*, *Diphyes gracilis*, *Bassia tetragona*, *Agalmopsis dissoluta*, *Strobalia cupola*, *Strobalia conifera*, *Forskaliopsis magnifica*, *Bathyphysa gigantea*, *Discolabe tetrasticha*, *Pneumophysa Gegenbauri*, *Alophota Mertensii*,

und 3 sind nur im Verzeichniss nicht im Text namentlich erwähnt, ebenfalls ohne Beschreibung:

Hippopodius squamatus, *Hippopodius cupola*, *Athoria beactealis*.

Endlich gehört dazu noch *Cystalia Challengeri*, die nach der Angabe im Text identisch mit *Cystalia monogastrica* ist, aber trotzdem im Verzeichniss als besondere Art aufgeführt wird.

Das System der Siphonophoren stellt dann nach Haeckel sich folgendermassen dar:

System der Siphonophoren.

A. Disconanthae.

I. Disconectae. Stamm von der Umbrella der 8strahligen Meduse gebildet, die einen vielkammerigen Pneumatocyst einschliesst. Knospen in concentrischen Ringen auf der Subumbrella angeordnet, Larve 8strahlig (Disconula).

1. Discalidae. Umbrella kreisrund, und regulär 8strahlig, Blastostyls ohne Mund.	{	Umbrella mit 8 einfachen Tentakeln, Pneumatocyst ohne concentrische Ringkammern	Discalia.
		Umbrella mit zahlreichen Tentakeln in 8 Bündel geordnet. Pneumatocyst mit Ringkammern, die 8strahlige Centralscheibe umfassend	Disconalia.
2. Perpillidae. Umbrella kreisrund, im Centrum 8strahlig, Blastostyls mit Mund.	{	Porpallidae. Umbrella hoch gewölbt, Pneumatocyst glockenförmig mit gelapptem Rand.	
		Tentakeln in 8 radialen Bündeln, die 8 ersten stärker hervorragend	Porpallia.
		Tentakeln sehr zahlreich in einem Kranz, die 8 ersten nicht hervorragend	Perpoma.
	{	Porpitellidae. Umbrella flach, leicht gewölbt, Pneumatocyst scheibenförmig ohne vorstehende Randlappen.	
		Tentakeln in 16 Bündeln, die 8 ersten und 8 2ter Ordnung stärker hervorragend	Porpitella.
3. Veellidae. Umbrella elliptisch oder bilateral, Blastostyls mit Mund.	{	Umbrella elliptisch, ganzrandig, Pneumatocyst ohne Kammern, einfacher Tentakelkranz.	Rataria.
		Umbrella elliptisch oder 4seitig, ganzrandig, Pneumatocyst mit Kammern, einfacher Tentakelkranz	Veella.
		Umbrella 4seitig mit gelapptem Rand, Pneumatocyst mit Kammern, doppelter oder mehrfacher Tentakelkranz	Armenista.

B. Siphonanthae.

Stamm aus dem Magenschlauch der ursprünglichen bilateralen Meduse gebildet; die Knospen entspringen in der Ventrallinie desselben. Larve bilateral (Siphonula).

II. Calyconectae. Kein Pneumatocyst, keine Palponen, dagegen immer 1 oder mehrere Schwimmglocken sind vorhanden.

Calyconectae Mono- gastricae. Stock aus einem einzigen Cormi- dium mit einem Siphon und einem Tentakel be- stehend.	{	Endoxidae. Cormidium aus 2 Medusomen zu- sammengesetzt einem sterilen und einem fertilen ohne Special- schwimmglocke.	{	Diplophy- siden. Deckstückeweder polyedrisch noch prismatisch ohne deutliche scharfe Kanten und poly- gonale Seiten. Ex- umbrella gerun- det und glatt.	{	Deckstücke hemis- phärisch od. nützen- förmig abgerundet ohne scharfe Kante und Spitze,	{	Phyllocyst (Deckstückblase) einfach, ohne Radialcanäle. Phyllocyst mit 4 Radialcanälen, die von seiner Basis aus- gehen	Diplophysa.
		Aglaismidae. Deckstücke poly- edrisch mehr oder weniger prisma- tisch mit vielen scharfen Kanten und polygonalen Seiten.		Deckstücke konisch spatelförmig oder py- ramidal mit Spitze und oft mit unvollständ- igen Kanten.		Phyllocyst einfach, Exumbrella der Deckstücke glatt ohne scharfe Ecken		Eudoxella.	
				Deckstücke mehr oder weniger cubisch mit einer unteren Öff- nung, die in ihre Höhle an der Basalseite führt.		Phyllocyst einfach, Exumbrella der Deckstücke mit 3 oder 5 Kanten		Cucubalus.	
						Deckstücke nicht ku- bisch, mit vorderer Öffnung, die in ihre Höhle an der schief abgestützten Ventral- seite führt.		Phyllocyst mit 2 gelappten seitlichen Canälen, Deck- stück ohne Schwanzanhang. Phyllocyst mit 4 gekreuzten Radialcanälen. Deckstück mit pyramidalem Schwanz- anhang	Cucullus.
Ersaeidae. Cormidium aus 3 Medusomen zu- sammengesetzt einem sterilen, einem fertilen und einer Special- schwimmglocke.	{		{		{	Phyllocyst absteigend mit 2 oberen seitlichen Canälen, Deckstücke mit 5 trapezoi- dalen und 2 paarigen secki- gen Seiten	{	Amphiroa.	
						Phyllocyst aufsteigend mit 1 spornförmigen unteren Canal. Deckstücke mit 4 un- paaren und 4 paarigen Seiten.		Sphenoides.	
						Deckstücke spatelförmig mit Spitze, Phyllocyst einfach ohne Radial- canäle.		Ersaea.	
	{		{		{	Deckstücke gerundet ohne Spitze, Phyllocyst mit 4 Radialcanälen.	{	Lilaea.	

Calyconectae polygastricae. Stock aus langem Stamm bestehend, der zahlreiche regu- läre Cormidien trägt, die durch freie Internodien getrennt sind. Jedes Cormidium mit Siphon und Tentakel.	Monophyidae. Eine Schwimm- glocke an der Spitze des Stammes.	Sphaeronec- tidae. Schwimmglocke halbkugelig oder mützenförmig mit gerundeter Oberfläche ohne scharfe Kanten.	Hydroecium als Ventralgrube der Schwimmglocke, unvollständig durch zwei überhängende Flügel verschlossen. Hydroecium, ein vollständig cylindrischer Canal in der Ventralwand der Schwimmglocke mit basaler Öffnung. Hydroecium fehlt, Schwimmglocke von einem kappen- artigen dorsalen Deckstück geschützt; zwischen ihnen sitzt der Nährkörper	Monophyes. Sphaero- nectes. Mitrophyes.	
		Cymbonec- tidae. Schwimmglocke pyramidal mit 5 hervorragenden scharfen Kanten.	Hydroecium, eine ventrale Rinne der Schwimmglocke, unvollständig durch zwei überhängende Flügel ver- schlossen. Bracteen spatelförmig. Hydroecium, konische oder glockenförmige Höhle in der Ventral- wand der Schwimm- glocke.	Cymbonectes Mugginea. Cymba.	
		Prayidae. Zwei fast gleich grosse und ähn- liche abgerundete Schwimmglocken einander gegen- übergestellt.	Deckstücke der Cor- midien halbkugelig, tassenförmig oder helmartig abgerundet. Phyllocyst mit 4 Ra- dialkanälen.	Cormidien (Eudoxia) ohne Spe- cialschwimmglocke Cormidien (Eudoxia) mit Spe- cialschwimmglocke	Praya. Liliyopsis.
		Diphyopsidae. Zwei fast gleich grosse und ähn- liche Schwimm- glocken hinter- einander, pyrami- dal, 5kantig.	Deckstücke der Cor- midien pyramidal, ko- nisch, spatelförmig mit scharfer Spitze, schief abgestutzter Basis und tiefer Ven- tralspalte. Phyllocyst eiförmig oder rudim- entär ohne Radial- canäle.	Cormidien ohne Special- schwimmglocke, nicht frei- werdend; erste Schwimm- glocke ohne Hydroecium . Cormidien ohne Special- schwimmglocke, Eudoxien frei; erste Schwimmglocke mit konischem Hydroecium. Jedes Cormidium mit Special- schwimmglocke, Eudoxien frei. Erste Schwimmglocke mit konischen Hydroecium.	Galeolaria. Diphyes. Diphyopsis.
	Diphyidae. Zwei Schwimm- glocken an der Spitze des Stammes.	Abylidae. Zwei Schwimm- glocken von sehr verschiedener Größe und Form hintereinander mit polygonalen Seiten und schar- fen Kanten.	Deckstücke der Cor- midien 6seitig pris- matisch. Phyllocyst absteigend mit 2 sei- tlichen Canälen an der Spitze. Deckstücke 4seitig prismatisch, unten keilförmig. Phyllocyst aufsteigend mit einem unpaaren Basalcanal.	Basalschwimmglocke 3seitig prismatisch mit 3 flügeligen Kanten, Mund 3seitig . . . Basalschwimmglocke 4seitig pyramidal mit 4 flügelartigen Kanten, Mund 4seitig . . .	Abyla. Bassia.
		Deckstücke der Cor- midien kubisch mit Schwanzanhang. Phyllocyst mit 4 Ra- dialcanälen.	Basalschwimmglocke 5seitig prismatisch mit 5 flügel- artigen Kanten, Mund 5seitig.	Calpa.	
		Desmophyi- dae. Nectosom (Schwimmkörper) zweiseitig, mit 4, 8 oder mehr paar- weise sich gegen- überstehenden Schwimmglocken Jedes Cormidium mit einem Deck- stück.	Cormidium Eudoxiaartig aus 2 Medusomen (steril und fertil) bestehend, ohne Specialschwimmglocke Cormidium Ersaeaartig aus 3 oder mehr Medusomen bestehend, mit Specialschwimmglocke	Desmalia. Desmophyes.	
		Polyphyidae. Nectosom 2reihig mit 4, 8 oder mehr paarweise sich gegenübersteh- enden Schwimm- glocken. Cormi- dien ohne Deck- stücke.	Hippopodidae, Schwimmglocken gerundet. Vogtidae, Schwimmglocken 6seitig prismatisch.	Ostium ohne Zähne, Cormidien diclinisch . . . Ostium mit 6 Zähnen, Cormidien monoclinisch . . Ostium mit 5 Zähnen, Cormidium monoclinisch . .	Hippopodius Polyphyes. Vogtia.

III. Physonectae. Mit einkammerigem Pneumatocyst, mit Schwimmglocken, Deckstücken und Palponen, ohne Aurophore, mit dünnröhrigem von einfachem Canal durchzogenem Stamm.

Physonectae monogast-ricae. Mit einfachem Siphon und 1 Tentakel.	Circalidae. Athoridae. Nectosom mit Kranz von Deckstücken ohne Schwimmglocke.	Nectosom mit Schwimmglockenkranz ohne Deckstücke. Bracteen mit rudimentärem Schwimmsack, am distalen Ende Stöcke monoecisch, Tentillen ohne Involucrum Bracteen ohne rudimentären Schwimmsack, Stöcke dioecisch, Tentillen mit umhülltem Nesselband	Circalia. Athoria. Athoralia.
	Apolemidae. Syphosom (Nährkörper) mit langem, röhrenartigem Stamm, der länger ist als die Axe des Nectosoms. Nectosom mit 2 Reihen von Schwimmglocken Pneumatophon ohne Radialtaschen, Tentakel einfach.	Dicymbidae. Schwimmkörper mit nur 2 sich gegenüberstehenden Schwimmglocken. Cormidien mit einfachem Siphon und Cyston. Apolempsidae. Nectosom mit 2 gegenübergestellten Reihen von Schwimmglocken. Cormidien mit mehreren Siphons und Cystons.	Dicymba. Apolemia. Apolempsia.
	Agalmidae. Syphosom mit langem röhrenartigem Stamm, der länger ist als die Axe des Nectosoms. Nectosom mit 3 Schwimmglockenreihen. Pneumatophoren mit Radialtaschen, Tentakel verzweigt.	Crystallodinae. Stamm kurz und starr, ungefähr so lang wie der Schwimmkörper. Stamm kaum contractil, dicht bedeckt mit dicken prismatischen od. spheroidischen Bracteen. Anthemodinae. Stamm lang und beweglich, viel länger als der Schwimmkörper. Stamm stark contractil, locker bedeckt mit dünnen blattartigen, selten prismatischen Bracteen.	Stephanomina. Crystallodes. Phyllophysa. Agalma. Anthemodes. Cuneolaria. Halistemma. Cupulita. Agalmopsis. Lychnagalma.
Physonectae polygastri-cae. Zahlreiche Siphons jeder mit besonderem Tentakel versehen.		Cormidien regelmässig, Internodien frei, nur mit Deckstücken bedeckt, Taster und Geschlechts- trauben nur am Grunde des Siphons. Cormidien gelockert. Taster u. Geschlechts- trauben an den Internodien zwischen den Siphons. Cormidien regelmässig, Internodien frei nur mit Bracteen bedeckt. Taster und Geschlechts- trauben am Grunde des Siphons. Cormidien gelockert. Taster u. Geschlechts- trauben im Internodium zwischen den Siphons.	Tentillen mit einfachen Endfäden Tentillen 3spaltig mit 3fachen Endfäden Tentillen mit einfachen Endfäden Tentillen 3spaltig mit 3fachen Endfäden Tentillen mit einfachen Endfäden. Nesselband nackt, ohne Involucrum Tentillen mit einfachen Endfäden. Nesselband von glockenförmigem Involucrum eingehüllt Tentillen mit 3 oder mehr Hörnern endigend, mit 3- oder mehrfachen Endfäden. Terminalampulle der Tentillen mit 2 seitlichen Hörnern Tentillen mit 3 oder mehr Hörnern endigend mit 3- oder mehrfachen Endfäden. Terminalampulle der Tentillen mit einem Kranz von 8 Radialhörnern

Physonectae polygastricae. Zahlreiche Siphons jeder mit besonderem Tentakel versehen.	Forskaliidae. Siphosom mit langem röhrenartigem Stamm, der länger ist als die Axe des Schwimmkörpers; Nectosom vielreihig strobiliform, mit mehreren Spiralreihen von Schwimmglocken.	Schwimmkörper ohne Tentakeln, Stamm gegliedert mit gleich weit abstehenden ringartigen Einschnürungen.	Cormidien regelmässig, Gonodendren dioecisch, von der Basis der Siphonen entspringend	Strobalia.
		Schwimmkörper mit Tentakeln zwischen den Schwimmglocken, Stamm nicht gegliedert, ohne regelmässige Einschnürungen.	Cormidien aufgelöst, Gonodendren monöcisch, mit den Siphonen abwechselnd	Forskalia.
			Cormidien aufgelöst, Geschlechtsstrahlen monoecisch zwischen den Siphonen, welche Leberstreifen (keine Zotten) haben	Forskaliopsis.
			Cormidien aufgelöst, Geschlechtsstrahlen dioecisch zwischen den Siphonen, welche Leberzotten (keine Streifen) haben	Bathypheya.
	Nectaliidae. Siphosom mit kurzem blasenartigem Stamm, der kürzer ist als die Axe des Schwimmkörpers. Nectosom mit 2, 4 oder mehr Schwimmglockenreihen. Siphosom mit einem Kranz von Deckstücken.	Nectosom zweizeilig, Tentillen mit einfachem Endfaden		Nectalia.
		Nectosom 4zeilig, Tentillen 3spaltig mit Endblase und 2 Seitenhörnern		Sphyrophysa.
	Discolabiidae. Siphosom mit blasenartigem Stamm, der kürzer ist als die Axe des Schwimmkörpers. Nectosom, mit 2, 4 oder mehr Schwimmglockenreihen. Siphosom ohne Deckstücke.	Schwimmkörper (Nectosom) zweireihig mit 2 sich gegenüberstehenden Reihen von Schwimmglocken		Physophora.
		Nectosom 4reihig mit 4 gekreuzten Reihen von Schwimmglocken		Discolaba.
		Nectosom vielreihig mit mehreren Spiralreihen von Schwimmglocken		Stephanospira.
	Anthophysidae. Siphosom mit blasenartigem Stamm, der kürzer ist als die Axe des Schwimmkörpers. Nectosom ohne Schwimmglocken aber mit einem Kranz von Deckstücken.	Tentillen mit einfachem (nacktem oder umhülltem) Nesselband und einfachen Endfilamenten.	Deckstücke mit rudimentärem Schwimmsack am distalen Ende. Nesselband nackt	Rhodophya.
			Deckstücke ohne Schwimmsack. Nesselband nackt	Melophya.
		Tentillen mit umhülltem Nesselband u. 3-5 Endfilamenten. Deckstücke ohne Schwimmsack.	Alle Tentillen gleich gestaltet, 3hörnig. Nesselband ohne verästelte Anhänge	Athorybia.
			Tentillen 3hörnig in 2 verschiedenen Formen; die grösseren mit 2 verästelten Anhängen des Nesselbandes	Anthophya.

IV. Auronectae. Einkammerige Pneumatocyste, Schwimmglocken, Deckstücke und Gonopals vorhanden. Mit Aurophor. Dicker Stamm, der von einem Canalnetz durchzogen ist.

Auronectae.	Stephalidae. Stamm mit bleibendem Centralcanal und deutlichem, primärem Mund. Tentakeln einfach ohne Tentillen.	Schwimmglockenkranz einfach; alle Tentakeln von gleicher Grösse und Form	Stephalia.
		Schwimmglockenkranz doppelt oder einfach; ein Kranz von proximalen Tentakeln, die grösser sind als die übrigen	Stephanella.
	Rhodalidae. Stamm ohne bleibenden Centralcanal und ohne deutlichen, primären Mund. Tentakeln verästelt mit einer Tentillenreihe.	Schwimmglockenkranz einfach; Stamm mit weiter Centralhöhle	Auralia.
		Schwimmglockenkranz doppelt oder mehrfach; Stamm ohne weite Centralhöhle	Rhodalia.

V. Cystonectae. Mit Pneumatocyst, der ein apicales Stigma besitzt, ohne Schwimmglocken und Deckstücke.

Cystonectae monogastricae. Stamm mit einfachem grossen Siphon, nur ein Cormidium repräsentirend.	{	Am Grunde des grossen Luftsacks ein Tentakelkranz; Luftflasche ohne Trichtersotten	Cystalidae.
			Cystalia.

Macro- stelinae. Stamm des Nähr- körpers sehr lang und dünn- röhrig mit ver- längerten Inter- nodien. Cystonectae polygastric- ae. Stamm von zahl- reichen Cormi- dien zusammen- gesetzt, jedes mit 1 oder mehr Si- phons und Ten- takeln. Cormidien entweder regel- mässig oder ir- regulär. Ursprüngliche Larve mono- gastrisch. (Cystonula.)	Rhizophy- sidae. Jedes Cormidium mit einem Magen und einem Ten- takel. Pneuma- tosac mit Trich- terzotten.	Cannophys- idae. Cormidien regel- mässig durch freie Internodien getrennt. Gono- styls dem Stamm dicht am Grunde der Siphonen an- geheftet.	Tentillen einfach, nicht verzweigt Auropysa. Tentillen 3spaltig mit 8 Endästen Cannophysa.
		Linophysidae. Cormidien ge- lockert, Gono- styls den Inter- nodien des Stam- mes angeheftet, zwischen den Siphonen zer- streut.	Tentakeln ein- fach, ohne oder mit einfachen un- verzweigten Ten- tillen. Linophysa. Tentakeln immer mit einer Reihe von Tentillen, alle oder einige davon verästelt. Nectophysa. Tentillen 3pal- tig mit 3 End- zweigen Pneumo- physa. Tentillen viel- gestaltig, einfach, verästelt oder handförmig. Rhophysa.
Brachy- stelinae. Stamm des Nähr- körpers kurz und dick, blasig mit verkürzten Inter- nodien.	Physalidae. Cormidien in einer mehrfachen Reihe längs der Ventralseite des Stammes, dessen Dorsalseite durch die fast horizon- tale Pneumatophore eingenommen ist. Ohne Trichterzotten.	Salacidae. Cormidien mit vielen Mägen, jedes mit mehreren Siphons und Tentakeln; Pneumatosaec mit Trichterzotten Salacia.	
		Epibulidae. Cormidien, den blasigen Stamm in spiralem Kranz umgebend, unter der Basis der fast senk- rechten Pneu- matophore. Mit Trichterzotten.	Tentillen einfach, fadenartig, ungetheilt Epibulia. Tentillen distal, 3spaltig mit Ampulle am Ende und zwei seitlichen Hörnern Angela.
		Arethusidae. Pneumatophor einfach ohne viel- zelligen Dorsal- kamm.	Ein einzelner Haupttentakel Alophota. Mehrere grosse Haupttentakel Arethusa.
		Caravellidae. Pneumatophor mit Dorsalkamm der durch Quer- septen in eine Reihe von Kam- mern getheilt wird.	Ein einzelner Haupttentakel Physalia. Mehrere grosse Haupttentakel Caravella.

Dieses von Haeckel „auf phylogenetischer Grundlage“ ent-
worfen System der Siphonophoren wird von Chun (13) critisirt.
Derselbe zeigt, dass Haeckel bei der Trennung seiner Hauptgruppen,
der Disconanthen und Siphonanthen von falscher Voraussetzung
ausgeht, da die beiden Larvenformen Disconula und Siphonula un-
gleichen morphologischen Werth besitzen.

Bei den jüngsten beobachteten Ratarien fand Chun neben einem
grösseren Tentakel 3 kleinere in asymmetrischer Vertheilung. Ohne
Zweifel ging diesem Stadium, ähnlich dem jüngsten Larvenstadium
von Physalia eine echte bilaterale Larve mit einem Tentakel voraus.
Diese ist mit der Siphonula zu parallelisiren, wobei man allerdings
den fundamentalen Unterschied zwischen Siphonanthen und Dis-
conanthen aufgeben und auch auf die Anknüpfung der ersteren an
Anthomedusen und der letzteren an Trachomedusen verzichten muss.
Die Velleen sind echte Physophoriden, deren eigenthümliche Um-
formung auf Anpassung an die passive Bewegung durch den Wind
zurückzuführen ist. Diese Anpassung ging so weit, dass sie die

Fähigkeit Gas zu secerniren verloren und nun darauf angewiesen sind, atmosphärische Luft in die Kammern aufzunehmen und wieder auszutreiben. Durch direkte Beobachtung der Pumpbewegung wurde constatirt, dass Velleen und Porpiten durch Tracheen athmende Coelenteraten sind, die als eigene Gruppe der Tracheophysae den übrigen mit einer Gasdrüse versehenen, als Haplophysae zusammengefassten Physophoriden gegenübergestellt werden.

Chun wendet sich ferner gegen die Medusomtheorie Haeckels, die völlig unbegründet erscheint, da sich nicht nur Dislocationen der Theile der einzelnen Medusenpersonen nicht nachweisen lassen, ein Hervorsprossen von Schwimmglocke, Magenschlauch, Fangfäden und Deckstück aus einer einzigen Knospe nicht beobachtet wurde, sondern auch Rudimente von Fangfäden, Randkörpern und Manubrium an den Schwimmglocken, sowie das Vorkommen einer kleinen Umbrella an den Deckstücken von Athoria und Rhodophysa beweisen, dass Schwimmglocken, Deckstücke, Magenschläuche etc. nicht als Medusenorgane, sondern als Medusenpersonen aufgefasst werden müssen.

Endlich tadelt er noch, dass Haeckel auch hier ohne genügenden Grund neue oft nur wenig modificirte Benennungen statt der früheren z. Th. eingebürgerten Bezeichnungen für Ordnungen und Familien anwendet und die von der Muttercolonie losgelösten Eudoxien als besondere Familien neben den Familien der Muttercolonien einführt. So finden sich im System Haeckels unter den Calyphoriden als 3 gleichwerthige Gruppen: 1) die freigewordenen Eudoxien 2) die dazu gehörigen Muttercolonien 3) die Calyphoriden mit sessilen Eudoxien behandelt. Ausserdem werden darin in derselben Familie Eudoxien vereinigt, die theils von Monophyiden theils von Diphyiden abstammen.

Dann schildert Chun die von ihm bei den Canaren beobachteten Siphonophoren. Er fand 22 Species der Calyphoriden mit 4 neuen Gattungen und 11 neuen Arten und wies bei 8 Arten zum ersten Male mit Bestimmtheit die dazugehörigen Eudoxien nach. Die 4 neuen Gattungen sind folgendermassen charakterisirt:

1. *Doramasia*: Schwimmglocke diphyidenähnlich, schlank, mit lang röhrenförmig ausgezogener Kappe der Subumbrella. Eudoxien mit steriler Specialschwimmglocke als *Ersaea* freiwerdend.
2. *Halopyramis*: Schwimmglocke eine breite vierseitige tetragonale Pyramide. Hydröcium trichterförmig mit vorstehendem gezähneltem Rand. Oelbehälter sehr gross, in der Axe der Pyramide gelegen, Subumbrella excentrisch. Stamm verkürzt, nicht vorstreckbar, Eudoxien ohne Specialschwimmglocke als *Cuboides* frei werdend.
3. *Amphicaryon*: Schwimmglocken von ungleicher Grösse mit abgerundeter Exumbrella, Stamm zu einer Scheibe ausgebildet. Oelbehälter des nützenförmigen Deckstücks mit zwei langen seitlichen Canälen. Die Knospengruppen werden als diplophysenähnliche Eudoxien frei.
4. *Stephanophyes*: 4 kranzförmig in einer Ebene gelagerte Schwimmglocken mit vielfach dichotom getheiltem Oelbehälter.

Stamm monöcisch. Anhangsgruppen, denen bei *Lilyopsis* ähnlich gebaut, sessil bleibend. In den Internodien sitzen heteromorphe Fangfäden mit kleinen, eichelförmigen Batterien ohne Angelfäden.

Die neuen Arten sind: *Monophyes brevitruncata*, *Doramasia picta*, *Halopyramis adamantina*, *Epibulia inflata*, *Epibulia monoica*, *Epibulia aurantiaca* var. *canariensis*, *Diphyes serrata*, *Abylopsis quincunx*, *Ceratocymba spectabilis*, *Amphicaryon acaule*, *Stephanophyes superba*.

Von Physophoriden wurden 9 Arten gefunden mit einer neuen: *Forskalia cuneata*. Bei *Halistemma pictum* Metschn. wurde das Wachstumsgesetz des Stammes entdeckt, das auch gegen Haeckels Theorie von der Multiplication und Dislocation der Medusenorgane am Siphonophorenstock spricht. Während Haeckel noch ebenso wie die früheren Beobachter am Stamm von *Halistemma* keine Ordnung zu erkennen vermochte, zeigt Chun, dass der Stamm internodial wächst. Entsprechend der Formel:

B. k. i. h. g. f. e. d. c. b. α' . a. β . a. A.

(worin A. B. ein durch zwei Magenschläuche begrenztes Internodium, a-k und α . α' . β zwischen A und B gelegene Knospengruppen bedeuten, von denen k α' und β die jüngsten und gleich gross sind.) vermehren sich in jedem einzelnen Internodium die Gruppen in proximaler Richtung und nehmen an Grösse ab, während gleichzeitig neue Knospengruppen zwischen den ältesten neben einander liegenden Gruppen des Internodiums auftreten.

Chun (12) giebt ferner Nachricht über das Vorkommen der Siphonophoren im Mittelmeere. *Diphyes Sieboldii* war sehr häufig von der Oberfläche bis 1300 m Tiefe. Nicht so häufig ist *Abyla pentagona*, die ebenso wie *Diphyes subtilis*, *Galeolaria aurantiaca* und *Monophyes gracilis* Tiefen von 100 m bevorzugt. Im Herbst erschienen die 3 letzteren an der Oberfläche. Während die Larven von *Halistemma pictum* an der Oberfläche häufig waren, wurden Ende August die jugendlichen und erwachsenen Exemplare in Tiefen von 100 m angetroffen, die dann erst vom 23. September an der Oberfläche erschienen. *Apolemia uvaria* ist für grössere Tiefen, 600 bis 1200 m, charakteristisch. An der Oberfläche wurde sie Ende September und Anfang October gefunden. Bruchstücke einer neuen *Forskalia*art wurden im September aus 1300 m Tiefe herausgeholt, während dieselbe im Winter an der Oberfläche erschien. Eigene Siphonophorenarten birgt die Tiefe nicht.

In grösseren Tiefen wurden die *Monophyes* ähnlichen Larven von *Hippopodius* entdeckt, von denen 2 charakteristische Stadien beschrieben werden. Durch die Untersuchung dieser Larven wurde der Nachweis erbracht, dass auch den Polyphyiden (Calycophoriden mit mehr als 2 definitiven Schwimmglocken) eine heteromorphe *Monophyes* ähnliche primäre Schwimmglocke zukommt, die später abgeworfen wird. Eine in 900 m Tiefe gefischte Larve von *Physophora hydrostatica* lehrte, dass ausser der frühzeitig abgeworfenen und den larvalen Batterien alle übrigen Gruppenanhänge in das definitive

Thier aufgenommen werden. Die jugendlichen Larven treten im Frühjahr an der Oberfläche auf, steigen mit Beginn des Sommers in die Tiefe, um dann nach Vollendung ihrer Metamorphose im Winter wieder an der Oberfläche zu erscheinen und dort geschlechtsreif zu werden. Charakteristisch ist für Physophora der frühzeitige Schwund der larvalen Nesselknöpfe. Länger bleibt der larvale Fangfaden bei Halistemma, Forskalia und Agalma erhalten. Bei Rhizophysa verschwinden am Fangfaden die larvalen vogelkopffähnlichen Nesselknöpfe allmählich und werden durch zwei andere Formen von Batterien ersetzt. Wahrscheinlich wird dann auch der dem ältesten Magenschlauch von Physophora ansitzende Fangfaden nicht neu gebildet, sondern nach Verlust der larvalen nur mit neuen definitiven Batterien versehen.

Giard (29), der bezweifelte, dass die von Thery bei Dunkerque entdeckte Physalia durch den Golfstrom verschleppt wäre, publiziert eine Mittheilung von Pelseneer, in der dieser auf das Vorkommen der auf den Antillen häufigen Schalen von Spirula Peronii bei Dunkerque aufmerksam macht. Ebenso wie diese und Cerithium vulgatum Bruguière wäre auch Physalia durch den Einfluss des Golfstroms an die französische Küste gespült. Vergl. Agassiz (2) p. 142.

Fewkes (22) beschreibt eine neue Siphonophore, Ploeophysa Agassizii, die in 2 Exemplaren bei der Fahrt des Albatross 1886 erbeutet wurde und die ihn zur Aufstellung der neuen Gattung Ploeophysa nöthigt. Sie ist charakterisirt durch einen breiten Pneumatophor, der auf einer Seite von einer Kappe eingehüllt wird. Schwimmglocken und Deckstücke fehlen. Unter zahlreichen Tastern ohne (?) Tastfäden sitzen mehrere Nährpolypen mit Tentakeln. Der Stock ist monöcisch. Männliche und weibliche Geschlechtstrauben sprossen an der Basis der Taster hervor. Am meisten Aehnlichkeit hat Ploeophysa mit Angela und Angelopsis, von denen sie sich durch das Auftreten der Kappe unterscheidet.

Haeckel bemerkt dazu (37), dass Ploeophysa Agassizii sehr ähnlich, vielleicht identisch seiner Anthophysa Darwinii ist. Ploeophysa ist eine Anthophyside (entweder Athorybia oder Anthophysa), die ihre Deckstücke verloren hat und deren Pneumatophor stark contrahirt auf der ventralen Seite durch den hervorragenden Nectostyl umfasst wird. Fewkes nennt diesen lamellosen Nectostyl eine Kappe und vermuthet, dass dieselbe ein neues Organ sei, das in dieser Form unter Physophoren unbekannt ist.

Ueber Siphonophoren ferner: Lo Bianco (54) p. 140, Fewkes (21,24) p. 141,142 Agassiz (2) p. 142 und v. Lendenfeld (50) p. 143.

Scyphomedusen.

Fischer (26) beschreibt einige Scyphistomen, die in einer Schale von Lutraria elliptica sich angesiedelt hatten, deren weitere Entwicklung jedoch nicht beobachtet werden konnte. Bei keinem der 40 untersuchten Exemplare war Strobilisation vorhanden. Verfasser

sucht nach Gründen für diese Erscheinung, ohne zum Resultat zu kommen.

Fewkes (23) discutirt die Frage, ob Tiefseemedusen existiren. Von den 10 Tiefseemedusen Haeckels bleiben nur 2, *Pectis* und *Tesserantha*, die als echte Tiefseethiere aufgefasst werden könnten. Doch ist es auch für diese nicht bewiesen, dass sie wirklich aus der Tiefe herausgeholt wurden. Wahrscheinlich werden die an der Oberfläche verbreiteten Medusenformen in der Tiefe durch andere Arten ersetzt, doch hat diese Annahme bisher nicht durch directe Beobachtungen gestützt werden können.

Bergh (5) untersucht die Entwicklung von *Lucernaria* und bestätigt im Wesentlichen die Beobachtungen Kowalewskys. Das erste beobachtete Furchungsstadium zeigte 2 gleich grosse Furchungskugeln mit einem Richtungsbläschen. Die Abscheidung des zweiten, welches nach Kowalewsky vorkommt, wurde nicht bemerkt. Auch weiterhin verläuft die Furchung äqual, ohne dass eine Furchungshöhle entsteht. Die Art der Keimblattbildung konnte wegen der geringen Grösse (ca. 0,04 mm) und der Undurchsichtigkeit des Eies nicht beobachtet werden, doch vollzieht sich diese ohne Einstülpungsprocess. Das Entoderm ist solide und besteht aus wenigen Zellen. Der erst kugelförmige Embryo streckt sich dann, und die Entodermzellen, die den Axenzellen in den Tentakeln der Hydroiden gleichen, ordnen sich in einer Reihe. Die jungen Larven besitzen weder ein Wimperkleid noch schwimmen sie wie *Fol* und *Korotneff* annehmen, sondern sie bewegen sich kriechend vorwärts durch wurmartige Contractionen. Nach einiger Zeit setzen sie sich an Algen fest, behalten aber trotzdem ihre Beweglichkeit bei. Aeltere Stadien konnten nicht erzogen werden. An einem auf Algen gefundenen Jugendstadium, dessen Arme noch nicht entwickelt waren, fanden sich die Tentakeln über den ganzen Glockenrand vertheilt, nicht in Gruppen geordnet wie beim erwachsenen Thier. An 8 Tentakeln in bestimmter Stellung zeigte sich eine Verdickung als Anlage der Randpapillen.

Ferner beschreibt **Bergh** (5) noch Knospenbildung bei *Lucernaria octoradiata*, die als abnorme Bildung in Folge einer Verletzung des Thiers betrachtet wird. Der Mund der Knospe führte in den Gastralraum des Mutterthiers und am Schirmrande jener fehlten zwischen den Armen die Randpapillen.

Mc. Intosh (56) constatirt, dass *Lucernaria*, die früher häufig bei St. Andrews an *Fucus serratus* beobachtet wurde, mehrere Jahre ausblieb, dann plötzlich in reichlicher Menge wieder erschien, vergl. **Glard** (31) p. 140.

Vallentin (62) fand in der *Umbrella* von *Lucernaria cyathiformis* einen Parasiten, *Psorospermium Lucernariae*, der in weissen kugeligen Massen besonders am Schirmrande auftritt. Der Schirmrand war bei den inficirten Exemplaren weiter als sonst zurückgeschlagen, auch war nach einem Reiz des Schirmrandes mit einer Nadelspitze „the latent period“ entschieden länger als bei einem Exemplar von

L. auricula. Das Wohlbefinden des Thiers scheint demnach nicht unwesentlich gestört zu sein.

von Lendenfeld (52) kritisirt Haackes Arbeit betreffend die Scyphomedusen des St. Vincent Golfes und spricht die Vermuthung aus, dass *Cyanea Müllerianthe* Haacke eine Farbenvarietät der *C. Annascala* v. Lendenfeld und identisch mit *C. Annascala* var. *marginata* sei.

Haacke (34) sieht sich genöthigt, diese kritischen Bemerkungen als überflüssig zurückzuweisen und hält auch die Artberechtigung der *C. Müllerianthe* aufrecht für den Fall, dass v. Lendenfelds Abbildungen von *C. Annascala* genau seien.

Vanhöffen (63) untersucht die bei der Weltumseglung des Vettor Pisani von Chierchia und einige von Orsini im Rothen Meere gesammelten *acraspede* Medusen. Es werden 13 Arten von Semaestomen beschrieben, von denen 6 neu sind: *Pelagia neglecta*, *P. crassa*, *P. minuta*, *Chrysaora chinensis*, *Desmonema Chierchiana*, *Aurelia dubia* und 11 Rhizostomen mit ebenfalls 6 neuen Species: *Cassiopeia picta*, *Loborhiza ornatella*, *Stomolophus Chunii*, *Rhizostoma hispidum*, *Mastigias Orsini*, *Desmostoma gracile*. Zur Unterscheidung der Pelagiaarten wurde ein neues Merkmal in der verschiedenartigen Faltung der Nesselwarzen gefunden. Die Gattung *Desmonema* wird nach Ausscheidung von *D. Annasethe* Haeckel und *D. imporcata* Haeckel, die zu *Cyanea* gehören, folgendermassen characterisirt: „Cyanide mit 8 Sinneskolben, 8 Tentakelbündeln, 8 tentacularen und 16 ocularen von jenen deutlich abgesetzten Randklappen. Die Tentakeln stehen in einfacher Reihe an der Basis der Tentacularklappen. Die Mundarme sind kräftig aus breiter Basis verschmälert. Die Gonaden sind kurz, hängen nicht so weit wie bei *Cyanea* herab.“

Unter den Rhizostomen fanden sich 2 neue Gattungen *Loborhiza* und *Desmostoma*.

Loborhiza: Rhizostome mit dreiflügeligen Mundarmen, ohne besondere Anhänge wie Peitschenfilamente oder keulenförmige Blasen.

Desmostoma Rhizostome mit 3 kantig pyramidalen Mundarmen die Gallertknöpfe tragen; Mundscheibe mit einem Büschel kräftiger Peitschenfilamente.

Zum Schluss wird das System der Rhizostomen kritisirt, diese werden dann nach der Beschaffenheit der Mundarme in 7 Gruppen geordnet:

1. *Rhizostomata simplicia*, Mundarme einfach ungetheilt.
 2. *Rhizostomata dichotoma*, Mundarme gabeltheilig.
 3. *Rhizostomata pinnata*, Mundarme gefiedert.
 4. *Rhizostomata triptera*, Mundarme 3 flügelig.
 5. *Rhizostomata scapulata*, Mundarme mit Schulterkrausen.
 6. *Rhizostomata trigona*, Mundarme 3 kantig pyramidal.
 7. *Rhizostomata lorifera*, Mundarme 3 kantig, riemenförmig
- und zuletzt wird die Verbreitung der Semaestomen und Rhizostomen, durch eine Karte erläutert, dargestellt, wobei es sich zeigt, dass

Semaeostomen durch alle Zonen verbreitet, Rhizostomen aber an warme Meere gebunden sind.

Von Lendenfeld (51) adoptirt nach kurzer Erwähnung der früheren Arbeiten über Rhizostomen und einem Bericht über die physicalischen Verhältnisse des Meeres an den australischen Küsten das von Claus aufgestellte System der Rhizostomen, dem er seine Familie der Chaunostomiden einreihet. Er stellt dieselben zwischen Cassiopeiden und Cepheiden und giebt dazu folgende Diagnose: „Chaunostomidae: Armscheibe breit, stiel förmig, Arme gabelspaltig, Armränder frei, mit Kolben, blinde Centripetalkanäle, Subgenitalsaal continuirlich, mit Mundöffnung“. Mit genauen Litteraturangaben werden dann die 12 australischen Rhizostomen aufgezählt unter besonderer Berücksichtigung ihrer Fundorte nebst allgemeinen Bemerkungen über das Vorkommen von rhizostomen Medusen, worauf eine specielle Beschreibung der 3 Arten *Pseudorhiza aurosa*, *Phyllorhiza punctata* und *Crambessa mosaica* folgt. Verf. hält die Möglichkeit nicht für ausgeschlossen, dass *Pseudorhiza aurosa* R. v. L. und *Monorhiza Haeckelii* Haacke nur locale Varietäten resp. verschiedene Entwicklungsstadien derselben Species sind und glaubt, dass *Crambessa mosaica* mit *Cr. Tagi* und *Cr. Pictonum* nur als Varietäten einer kosmopolitischen Art aufgefasst werden könnten.

In besonderem Capitel wird dann im Anschluss an die eigenen Untersuchungen bei den 3 erwähnten Medusen unter Hinweis auf die früheren Beobachtungen der histologische Bau der Rhizostomen im allgemeinen geschildert. Das Epithel der Exumbrella besteht aus einer äusseren Zelllage mit Stützzellen, Becherzellen, Sinneszellen und Nesselzellen und aus dem Subepithel, das junge Cnidoblasten, Ganglienzellen, sogenannte indifferente Zellen und Muskelzellen (bei *Cassiopeia polypoides*) enthält. Die Schirmgallerte, die bei verschiedenen Arten verschieden fest ist, wird von glatten und granulösen Fasern durchsetzt, zwischen denen verschiedenartige Zellen eingelagert sind: 1) rundliche, ihre Gestalt, nie aber ihre Lage verändernde Zellen, die vom Entoderm der Magenoberseite stammen (Claus und Hertwig), 2) unregelmässiger gestaltete bi-, tri- oder multipolare Zellen, die jedoch nicht immer vorhanden sind, 3) amöboide Wanderzellen, 4) Drüsenzellen von unregelmässiger Form und veränderlicher Grösse, die L. nur bei *Phyllorhiza punctata* fand. Er deutet diese Zellhaufen als Giftdrüsen, die den Zweck haben, die Gallerte ungeniessbar zu machen. Bei *Crambessa mosaica* werden dieselben durch Nesselzellen in der Umgebung der Randkörper vertreten, 5) Pigmentzellen und zwar die gelben Zellen, verschiedene rothe, blaue, violette und weisse Pigmentzellen, 6) Krystalle bildende Zellen (Krystalloblasten) bei *Phyllorhiza punctata*, die in Haufen zusammenliegend äusserlich als weisse wolkenartige Flecken erscheinen.

Bei *Phyllorhiza* wurde beobachtet, dass Ephyra und ausgebildete Meduse nur 8 Randkörper hatten, während dazwischen liegende Stadien 24 und 16 Randkörper zeigten. Die Randkörper wurden

bei den jüngsten Stadien von *Phyllorhiza* hohl gefunden. Nur bei *Pseudorhiza aurosa* fand sich auf dem Randkörper ein Pigmentfleck, die Randkörper von *Crambessa mosaica* und *Phyllorhiza punctata* waren farblos. In den Sinnespolstern wurden zwar Ganglienzellen, doch keine eigentlichen Nerven, die dieselben mit den Randkörpern verbinden, gefunden. Das Epithel der Sinnesgrube setzt sich zusammen aus einer oberflächlichen Schicht mit schlanken durchsichtigen Stützzellen, keilförmigen, körnigen Sinneszellen und breiten körnigen Drüsenzellen und dem Subepithel mit wenigen Fasern und zahlreichen tangential ausgebreiteten Ganglienzellen. Der Kranzmuskel der Subumbrella ist bei Rhizostomen doppelt, bei Semaestomen einfach gefaltet. Zum Schluss werden das Gastrovascularsystem mit den Mundarmen und die Genitalorgane eingehend geschildert. Die Untersuchung der letzteren ergab, dass bei den 3 australischen Rhizostomen die weiblichen Organe nach demselben Plane gebaut sind, dass die männlichen aber bei *Crambessa mosaica* und *Phyllorhiza punctata* wie die weiblichen einem Genitalbände eingelagert sind, während bei *Pseudorhiza* (wie auch bei *Monorhiza Haeckelii*) die männlichen Producte in besonders modificirten Gastral-filamenten, den Spermafilamenten gebildet werden.

Ueber Scyphomedusen s. ferner im allg. Theil bei A. E. V. (1) p. 139, Dubois (16) p. 139, Kruckenberg (45. 46), Keller (43), Grieg (33), Hoyle (41), Lo Bianco (54), Giard (31), Fewkes (21 bis 24), Agassiz (2), v. Lendenfeld (50).

Ctenophorae.

Bei der Untersuchung der pelagischen Thierwelt in den grösseren Tiefen des Mittelmeeres erbeutete Chun (12) *Beroë ovata* aus 100 bis 150 m Tiefe; *Cestus Veneris* wurde in Bruchstücken alter Exemplare aus 1200 m Tiefe heraufgeholt und Larven davon wurden in 800 m Tiefe gefunden. *Hormiphora plumosa*, die nur im Winter und Frühjahr an der Oberfläche vorkommt, fand sich Mitte September in 150 m Tiefe. Die gelappten Ctenophoren steigen nicht in die Tiefe.

In besonderem Capitel wird die *Dissogonie* der gelappten Ctenophoren geschildert. Die Larven von *Eucharis multicornis* und *Bolina hydatina* werden kurz nach Verlassen der Eihülle geschlechtsreif. In 2—3 Tagen schwellen die 4 subventralen Gefässe der jungen Bolinalarve zu 4 Zwitterdrüsen an. Während die Larven heranwachsen, legen sie befruchtete Eier ab. Darauf erst beginnt die Metamorphose der Larven unter Rückbildung der Geschlechtsproducte durch Vermehrung der Schwimmlättchen und Verlängerung der Meridionalgefässe. Die jungen Bolinen werden dann wiederum geschlechtsreif gefunden, (indem in allen 8 Rippen in dem zwischen den Schwimmlättchen verlaufenden Gefässabschnitt Sexualorgane gebildet werden), woraus sich ergibt, dass hier die geschlechtliche Thätigkeit eines und desselben Thieres durch eine complicirte Metamorphose unterbrochen wird. Die Vermehrung durch doppelte ge-

schlechtliche Thätigkeit — im Larvenleben und im entwickelten Zustande — wird als Dissogonie bezeichnet. Die Reife der Larven tritt ein unter dem Einfluss erhöhter Temperatur an der Oberfläche. Die auf diese Weise erreichte stärkere Vermehrung ist insofern von Bedeutung, als sie wesentlich beiträgt zur Erhaltung der Art dieser zarten Oberflächenthiere, die sich nicht in die schützende Tiefe zurückziehen vermögen.

M. Jntosh (55) beobachtete bei St. Andreas als neu für die britischen Gewässer, die aus dem Mittelmeer benannte Ctenophore *Lesueurina vitrea* M. Edwards.

Sharp (59) fand zu Sacheche in Nantniket, *Mnemiopsis Leidyi* in Süßwasser, das gelegentlich mit dem Meere in Verbindung gesetzt wurde. Obwohl das Wasser nicht den geringsten Salzgeschmack zeigte, waren die Ctenophoren kräftig und frisch und leuchteten stark bei Nacht. Ob sie sich vollkommen dem Süßwasser angepasst haben, war nicht zu entscheiden, da die Entwicklung von Brut nicht beobachtet wurde.

Siehe ferner **Kruckenber**g (46) p. 139, **Hoyle** (41) p. 140, **Lo Bianco** (54) p. 140, **Giard** (31) p. 140, **Fewkes** (21. 24) p. 140, 141, **Agassiz** (2) p. 142 und **v. Lendenfeld** (50) p. 143.

Fossilia.

Nach speciellem Bericht über Schwämme und Corallen erwähnt **Neumayr** (57) noch von Coelenteraten die zweifelhaften Loftusien aus dem persischen Eocaen, *Parkeria* aus dem Cenoman, *Porosphaera* aus der oberen Kreide, *Ellipsactinia*, *Sphaeractinia* aus dem oberen Jura, fossile Medusen, Stromatoporen und Graptolithen. Die ältesten Coelenteraten sind die von **Nathorst** zuerst erkannten Medusen aus dem Cambrium Schwedens. *Ellipsactinia* und *Sphaeractinia*, den lebenden Hydrozoen näher stehend, führen zu den Stromatoporiden herüber, die von Silur bis Carbon sich finden. Die Stromatoporen, Vorfahren sowohl der lebenden Hydractinien als auch der Milleporiden, treten häufig als caunoporisirte Stücke auf, d. h. die gleichartige Stromatoporengrundmasse ist von Caunoporaröhren durchwachsen. Da die Caunoporaröhren ausser Zusammenhang mit den Höhlungen des Stromatoporenkörpers stehen, wird ihr Erscheinen in letzterem als Commensalismus eines Stromatoporiden und einer mit *Aulopora* und *Syringopora* verwandten tabulaten Koralle gedeutet. **Neumayr** schliesst sich dieser von **F. Römer** und **Nicholson** vertretenen Auffassung an, obwohl auch sie noch keine völlig befriedigende Erklärung der Erscheinungen liefert. Die Graptolithen stellen wahrscheinlich einen selbständigen und vollständig ausgestorbenen Stamm des Thierreichs dar, da sie nach mächtiger Entwicklung in den ältesten Schichten schon im unteren Devon ausstarben und da keine Beweise für die Annahme vorhanden sind, dass sie sich an die Sertularien oder Bryozoen anschliessen, mit denen sie allerdings einige äussere Aehnlichkeit erkennen lassen.

Auf Grund der Untersuchung von Hydrocorallinen aus den unteren Permschichten (Middle Productus Limestone) der Salt-Range und einigen Stücken aus dem Mittel-Devon der Eifel schildert **Wentzel** (67) unter Berücksichtigung der betreffenden Literatur den Bau von Stromatopora und ihrer Verwandten, prüft die Verwandtschaft der verschiedenen Gattungen unter einander und stellt ein

System der Stromatoporidae auf mit Hinweis auf ihre wahrscheinliche phylogenetische Entwicklung.

Die Stromatoporidae bilden knollige oder unregelmässig ausgebildete Massen, deren Oberfläche von structurloser, dünner, porenloser Membran (Epithek) bedeckt wird. Im Stock finden sich entweder Astorhizen (Coenosarkröhren) oder einfache kelchförmige Räume oder beide Gebilde fehlen. Der Centralcanal der Astorhizen wird als homolog den kelchförmigen Räumen der recenten Hydrocorallinen angesehen. Zwischen den Astorhizen breitet sich ein maschiges Canaletz aus mit ampullenartigen Erweiterungen. Zwischen den Ampullen ordnen sich cylindrische Canäle zu einem rechteckigen, rhombischen oder ovalen Maschenetz. Dieses Canaletz stimmt auffallend überein mit dem Bau der Milleporiden und Stylasteriden. Kalktrabeculae trennen die Canäle von einander. Sie ahmen entweder im Verticalschliff die Form eines rechteckigen Gitters nach mit Verdickungen an den Kreuzungspunkten (Rectilinear-Structur) oder breiten sich ungleich nach allen Richtungen des Raumes aus (Curvilinear-Structur). Die Schichten des Stocks werden durch senkrechte oder schief gestellte Pfeiler verbunden, die entweder sich nur von einer Schicht bis zur nächsten oder auch durch mehrere Schichten erstrecken. Zuweilen zeigen die Stücke zitzenförmige Erhabenheiten, die in ihrer Organisation bedingt sind und sich mit den Tuberkeln von Millepora vergleichen lassen. Sie sind nicht von der Unterlage abhängig. Die Trabeculae waren solide, trotz ihrer zuweilen abweichend gefärbten Centralzone. Ihre vermeintlichen Canäle sind auf das Vorkommen heller und dunkler gefärbter Kalkmassen organischen Ursprungs zurückzuführen. Diese Trabeculae setzen sich aus einem Maschenwerk von Kalkfasern zusammen mit Knoten in den Ecken der Maschen, welches auch bei Millepora sich findet.

Die Röhren von Canopora und Diapora gehören wahrscheinlich Fremdkörpern an, die von Stromatopora, ähnlich wie es auch Hydractinien vermögen, durchdrungen und aufgelöst wurden.

Stylodictyon Nich. and Murr. gehört in die Nähe von Ellipsactinia, nicht zur Gruppe der Stromatoporen. Letztere werden mit Zittel zu den Hydrocorallinen gerechnet, unter denen sie sich am meisten an die Milleporiden anschliessen.

Die fossilen Hydrocorallinen zerfallen in 3 Familien:

1. *Tubiferae* mit regellos zerstreuten kelchförmigen Räumen, die in Poren der Oberfläche ausmünden und im Innern zuweilen durch Tabulae in Fächer abgetheilt oder von Trabekeln durchzogen sind. Carbon u. Dyas. Mit den Gattungen:

Cylindrophasma Steinm.

Irregularopora n. g. Mit Kelchen die von Trabekeln durchsetzt sind und unregelmässigen Querschnitt zeigen; mit breiten Canälen im maschigen Canaletz. Einzige Species: *J. undulata* Wentzel aus dem unteren Perm.

Disjectopora n. g. Kelche zerstreut mit Querböden, von der Mitte des Stocks nach aussen divergirend. Ausser dem maschigen Canaletz sind breite Horizontalcanäle und zarte geschlängelte Canälchen vorhanden. Einzige Species: *D. milleporaeforme* Wentzel aus dem unteren Perm.

2. *Coenostromatidae* mit Astrorhizen deren Zwischenräume von maschigem Canalnetz erfüllt sind und deren Central- und Radialcanäle zuweilen von Trabekeln durchzogen werden. Dazu gehören:

Coenostroma Winchell. Silur und Devon.

Porosphaera Steinm. Kreide.

Arduorhiza n. g. Astrorhizen mit schräg vom Centralcanal abgehenden Radialröhren, Centralcanäle in der Mitte des Stocks vertical nach aussen divergirend; Centralcanal und Radialröhren von Trabekeln durchsetzt, Radiärcanäle unregelmässig um den Centralcanal vertheilt. Einzige Species: *A. pyramidata* Wentzel, aus dem unteren Perm.

3. *Stromatoporidae*, Silur-Carbon, mit den Gattungen:

Stromatopora Goldf.

Dictyostroma Nich. und Murr.

?*Labechia* Lonsdale.

Die Stromatoporiden werden als älteste Gruppe der Hydrocorallinen betrachtet. Von ihnen stammen die Coenostromatiden ab, aus denen sich dann die Tubiferen entwickelten. Von diesen erst leiten sich Milleporiden und Stylasteriden ab.

Anhangsweise sind einige ähnliche Formen erwähnt, deren systematische Stellung zweifelhaft gelassen wird:

Lamellatae, characterisirt durch concentrische Lamellen, die von Interlaminarräumen getrennt und durch senkrechte oder schiefe Scheidewände verbunden sind. Lamellen und Scheidewände perforirt. Dazu gehören:

?*Sphaeractinia* Steinm.

Ellipsactinia Steinm.

Stylodictyon retiforme Nich. und Murr.

Circopora n. g. Lamellen regellos perforirt, Interlaminarräume regelmässig von Scheidewänden durchsetzt; die dadurch gebildeten Fächer erscheinen auf der Oberfläche des Stocks als bogenförmig angeordnete Poren. 2 Arten: *C. multitubulosa* Wentzel und *C. faverlata* Wentzel, aus dem unteren Perm.

Carter (10) beschreibt zwei neue mit *Loftusia* verwandte Gattungen mit je einer neuen Art: *Stoliczkiella Theobaldi* gen. et. sp. n. von dem Karakoram Pass und *Millarella cantabrigensis* gen. et. sp. n. aus dem Cambridge Grünsand. Ausserdem wird erwähnt, dass *Loftusia* und *Parkeria* zusammen sowohl im Grünsand von Cambridge als auch auf dem Karakoram Pass in Asien gefunden wurden.

Das Genus *Parkeria*, ursprünglich aus Kalkröhren aufgebaut, findet sich nach Nicholson (58) in kohlensaurem Kalk oder phosphorsaurem Kalk versteinert oder sehr selten auch verkieselt. Das Petrefact besteht aus strahlenförmig von einem Punkt ausgehenden Pfeilern, die durch concentrische Lamellen verbunden werden. Zwischen den Lamellen und den Pfeilern finden sich unregelmässige Kammern, deren Wände durch unzählige radiale Röhren gebildet werden. Das ganze Wesen hat die Form einer Kugel, in deren Centrum sich zuweilen die Schale eines kleinen Cephalopoden, Nautilus oder Ammoniten, nachweisen liess.

Periodisch finden sich dünne concentrische Lagen zwischen dickeren Schichten. Sie bauen sich nicht wie die übrige Masse aus den feinen Röhren auf, sondern bestehen aus weiten unregelmässigen verlängerten Zellen, die durch

dichtes Maschengewebe vereinigt werden. Diese Zwischenlagen können bei kleinen Exemplaren fehlen, bei grösseren aber finden sich 2—3 derselben. Das Erscheinen dieser Zwischenlagen beruht wahrscheinlich auf der periodischen Entwicklung der Geschlechtsthiere, ähnlich dem periodischen Erscheinen der „Ampullen“ bei Stylasteriden. Ausser dem allgemeinen Röhrengewebe treten dann noch, dieses durchsetzend, mehr oder weniger weite elliptische oder kreisrunde Röhren auf, ohne Querböden oder Septen, die in die Kammern oder an der Oberfläche nach aussen münden. Nicholson vermuthet, dass sie den Dactyloporen und Gastroporen der Hydrocorallinen entsprechen. Unter den lebenden Organismen würde *Parkeria* in der Mitte stehen zwischen Hydrocorallinen und Hydractiniden, während sie unter den Fossilien am nächsten mit *Stromatopora*, *Stromatoporella* und *Parallelopora* verwandt ist. Loftusia hält Nicholson für eine Foraminifere.

Carter beschreibt (11) einige Fälle, in denen *Millarella*, die er für eine den Saprolegnien ähnliche Alge hält, die *Parkeria* durchwachsen und das Coenenchym derselben zerstört hat.

Die Hydrocorallinen, Stromatoporiden, Graptolithen und Hydroidpolypen der palaeozoischen Schichten Grossbritanniens sind bei Etheridge (18) zusammengestellt. Silurische Graptolithen werden erwähnt von Lapworth (42) und Ford (27).

Bericht

über die

wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte
der Anthozoen im Jahre 1888.

Von

Dr. A. Ortmann.

Ontogenie.

Jungersen, H. (*Ueber Bau und Entwicklung der Kolonie von Pennatula phosphorea* L. — *Zeitschr. Wiss. Zool.*, Bd. 47, 1888, p. 626—649, pl. 39) konnte an jugendlichen Exemplaren von *Pennatula phosphorea* die Bildung der Kolonie verfolgen. Junge Exemplare bestehen aus einem einfachen Polypen, der in die Länge gestreckt ist, und den Verf. als Achsenindividuum, resp. Terminalpolypen bezeichnet. Derselbe stellt die spätere Achse der Kolonie dar. In den jüngsten vom Verf. beobachteten Exemplaren war schon eine innere Kalkachse vorhanden. Vom stielartigen Theil dieses Achsenindividuums sprossen nun Knospen hervor, und zwar lateral solche, die die Fiederblätter bilden, dorsal eine unpaare: das Achsen- od. Terminalzooïd. Ebenfalls dorsal sprossen dann die weiteren Zooïde hervor. Hiermit ist nachgewiesen, dass die frühere Bezeichnung derjenigen Seite, auf der die Zooïde liegen, als Ventralseite, unrichtig ist, und die Begriffe dorsal und ventral in Beziehung auf die Kolonie umgetauscht werden müssen.

Die lateralen Knospen sitzen in abwechselnder Höhe, so dass die Fiederblätter alterniren, und zwar ist bemerkenswerth, dass das oberste stets zur rechten Seite des Terminalpolypen sitzt. Die Fiederblättchen selbst bilden sich, indem am Grunde jedes entwickelten Lateralpolypen neue Polypen angelegt werden und zwar an der Ventralseite der Achse: diese Polypen verwachsen mit einander.

Bei erwachsenen Exemplaren fehlt der Terminalpolyp; an seiner Stelle finden sich mehrere Scheitelzooïde. Vielleicht wird der Terminalpolyp zu einem Zooïd zurückgebildet. Unter den Scheitelzooïden ist auch das Terminalzooïd zu suchen.

Der Stamm der Kolonie enthält zwei mediane Hauptkanäle, einen dorsalen und einen ventralen, durch eine Querwand geschieden. In letzterer entwickeln sich zwei laterale Längskanäle, die oben und unten blind endigen. In der Wand zwischen ihnen ist die Kalkachse eingeschlossen. Die Magenhöhlen der Polypen stehen mit dem ventralen Hauptkanal, die der Zooide mit dem dorsalen in Verbindung. Wahrscheinlich vermitteln die Zooide das Einströmen von Wasser in die Kolonie, während das Terminalzooide, resp. die Scheitelzooide das Ausströmen regulieren.

Wilson, H. V. (*Development of Manicina areolata*. — *John Hopkins Univ. Circul.* Vol. 7, 1888, p. 31—33. — *Abstr. in: Journ. Roy. Microsc. Soc. London* 1888, p. 434—435) beschreibt die Larvenentwicklung von *Manicina areolata*. Er sieht das Kalkskelett (wie Koch, Fowler u. Bourne) als rein ectodermale Bildung an und macht auf die Analogieen in der larvalen Entwicklung mit *Aurelia* (*Scyphostoma*) aufmerksam.

Morphologie, Anatomie, Histologie.

Haake, W. (*Zur Tektologie und Phylogenie der Korotneffschen Anthozoengenus Polyparium*. — *Biolog. Centralbl.* Bd. 7, 1888, p. 685—690, xyl. 1—6) fasst das *Polyparium ambulans* Korotneff's nicht, wie dieser, als Kolonie, auch nicht, wie Ehlers, als Theilstück einer Person, sondern als vollständige Anthozoenperson auf, die senkrecht zu ihrer Symmetrieebene in die Breite gezogen ist, Schlundrohr und Mund verloren hat, und an der Spitze der Tentakel sekundäre Mundöffnungen erhalten hat.

Fowler, G. H. (*On a new Pennatula from the Bahamas*. — *Proceed. Zool. Soc. London* 1888, p. 135—140, pl. 6) beschreibt eine neue *Pennatula* (bellissima), bei der er an jungen Autozoiden eine Siphonoglyphe beobachtete, welche den fertigen Autozoiden fehlt. Er glaubt, dass dies Vorhandensein derselben bei unausgebildeten Polypen beweise, dass die Siphonoglyphe in der phylogenetischen Entwicklung den Autozoiden verloren gegangen sei, da sie sowohl bei den Siphonozoiden erhalten bleibe, als auch bei solchen Alcyonarienformen gefunden werde, die noch keinen Dimorphismus zeigen (z. B. *Alcyonium*).

Blochmann, F. und Hilger, C. (*Ueber Gonactinia prolifera* Sars, eine durch Quertheilung sich vermehrende Actinie. — *Morphol. Jahrb.*, Bd. 13, Heft 3, 1888, p. 385—398, pl. 14, 15) untersuchen bei *Gonactinia prolifera* Sars zuerst die Anordnung der Septen. Es sind Macrosepten vorhanden, die mit dem Schlundrohr verwachsen sind, und Microsepten, von jeder Sorte 8. Längs der beiden gegenüberliegenden Schlundrinnen verlaufen je zwei Macrosepten (Richtungssepten), zwischen diesen finden sich keine Microsepten. In den übrigen sechs Taschen zwischen den Macrosepten finden sich in zweien, die dem einen Paar Richtungssepten benachbart sind, je

2 Microsepten (Verf. bezeichnen diese Seite als dorsale), in den übrigen vier Taschen ist je ein Microseptum vorhanden. Die Macrosepten, die nicht Richtungssepten sind, sind Genitalsepten, die zwischen ihnen liegenden Microsepten tragen Mesenterialfilamente, die andern nicht. Septen mit zugekehrten Longitudinalmuskeln bilden ein Paar, nur bei den Richtungssepten finden sich die Transversalmuskeln zugekehrt. Die Ringmuskellage des Mauerblattes ist vorn nicht stärker entwickelt, das Mauerblatt kann sich nicht über die Mundscheibe zusammenziehen. Die Längsmuskulatur der Tentakel bildet keine kontinuierliche Lamelle, sondern die Fibrillen sind mehr weniger isolirt.

Die Vermehrung durch Quertheilung scheint bei *Gonactinia prolifera* eine regelmässige Erscheinung zu sein. Ungefähr in der Mitte des Körpers tritt ein Kranz von kleinen Tentakeln auf; dicht darüber schnürt sich das Mauerblatt ringförmig ein, wächst nach unten und bildet für den unteren Theilsprössling Mundscheibe und Schlundrohr, und schliesslich löst sich der obere Theilsprössling ab. Diese Theilung findet nur bei noch nicht geschlechtsreifen Thieren statt. Es ist wahrscheinlich, dass sowohl der obere, wie der untere Theil geschlechtsreif werden kann, und der Vorgang ist wohl nicht als Ströbilisation aufzufassen.

Koch, G. v. (*Ueber Flabellum*. — *Morphol. Jahrb.*, Bd. 14, 1888, p. 329—344, pl. 13) kann durch weitere Untersuchungen an *Flabellum michelini* und *pavoninum* das früher ausgesprochene Gesetz über die Vermehrung der Septen bestätigen: „Bei den Hexakorallen entsteht jedes neue Septum in dem Raum zwischen zwei älteren und zwar die Septen eines jeden Cyclus nahezu gleichzeitig. Abweichungen lassen sich auf den Ausfall einzelner Septen und in letzter Reihe auf Aenderungen im Gesamtwachsthum zurückführen.“ Weiterhin hält er gegenüber anderen Ansichten (Bourne, Fowler) an seiner Auffassung der Wand von *Flabellum* als Epithel fest.

Fowler, G. H. (*The Anatomy of the Madreporaria III*. — *Quaterl. Journ. Microscop. Sc.* 28, 1888, p. 1—19, pl. 1, 2) untersucht eine Anzahl Steinkorallen anatomisch. Bei *Turbinaria* sind die Septen nicht hexameral angeordnet; sie sind nur entocoel (zwischen zwei ein Paar bildenden Mesenterien). Die Aussenseite der ganzen Kolonie ist von der weichen Körperwand umgeben, die aus Ecto-, Meso- und Entoderm besteht und auf Echinulationen des Coenenchyms aufruhrt, aber von keinen „peripheren Lamellen“ (den äusseren Theilen der Mesenterien) getragen wird. Die Polypen zeigen den Actinien-Typus, mit zwei Paaren „Richtungsmesenterien“. Die Tentakel scheinen nur entocoel zu sein.

Bei *Lophohelia prolifera* kann man besondere Verkalkungscentren der Mauer, neben denen der Septen unterscheiden. Die Septen lassen sich ebenfalls nicht immer auf die Sechszahl zurückführen; sie sind entocoel und ectocoel (letzteres bei der Lage zwischen je zwei Paaren von Mesenterien). Die auf der Aussenseite der Kalkkelche gelegene weiche Körperwand wird von „peripheren Lamellen“

getragen, welche Fortsetzungen der inneren Mesenterien sind. Richtungsmesenterien sind nicht erkennbar. Die Tentakel sind entocoel und ectocoel.

Bei *Seriatopora subulata* sind, wenn vollständig vorhanden, sechs entocoele und sechs ectocoele Septen zu beobachten. Die Tentakel, die auffälliger Weise einstülubar sind, sind wie die Septen angeordnet. Richtungsmesenterien sind vorhanden. Die äussere Körperwand ruht auf Echinulationen des Coenenchyms. Von den Mesenterien zeichnen sich gewisse (zwei) durch besondere Länge aus, während sechs sehr kurz sind.

Pocillopora brevicornis stimmt im Wesentlichen mit *Seriatopora* überein. Ob die Tentakel einstülubar sind, konnte nicht beobachtet werden. Die Differenzirung der Mesenterien ist nicht so ausgesprochen.

Betreffs der Gattung *Flabellum* hält Verf. die Umwandlung für eine Theca, die sich nur nach innen verdickt. Er unterscheidet thecale und septale Verkalkungscentren.

Fowler, G. H. (*The Anatomy of the Madreporaria IV. — Quart. Journ. Microscop. Sc.* 28, 1888, p. 413—430, pl. 32, 33) setzt die Untersuchungen über die Anatomie der Steinkorallen fort.

Bei *Madracis asperula* sind die Septen in der Achtzahl vorhanden; sie sind nur entocoel. Die Polypen sind vom Actinientypus, mit Richtungsmesenterien. Tentakel entocoel und ectocoel. Die äussere Körperwand wird theils durch „periphere Lamellen“, theils von Echinulationen der Coenenchyms getragen, ersteres findet nur in der Nähe der Kelchränder statt.

Bei *Amphihelia ramea* (?) sind die Septen nicht streng nach der Sechszahl angeordnet; sie sind entocoel und ectocoel, ebenso wahrscheinlich die Tentakel. Richtungsmesenterien sind vorhanden. Die äussere Körperwand wird theils von peripheren Lamellen, theils von Vorsprüngen des Coenenchyms getragen.

Von *Stephanophyllia formosissima* wurde ein Fragment untersucht. Die Theca ist horizontal ausgebreitet und ist aus radialen und concentrischen Trabekeln zusammengesetzt. Von den radialen Trabekeln erheben sich abwechselnd Septen und Mesenterien. Die Septa sind entocoel und ectocoel und reichen nicht bis zur weichen Körperwand. Diese letztere liegt denjenigen radialen Trabekeln direkt auf, von denen sich die Mesenterien erheben. Die Tentakel sind entocoel und ectocoel. Richtungsmesenterien sind vorhanden. Gewisse Strukturen, die anderweitig als Calicoblasten gedeutet wurden, sind mesodermale Fortsätze, durch die die Mesenterien fest an das Skelett befestigt werden.

Bei den untersuchten Fragmenten von *Sphenotrochus rubescens* konnten keine Richtungsmesenterien gefunden werden, doch scheinen die Mesenterien normal angeordnet zu sein. Die Septen sind entocoel und ectocoel, und es entsprechen ihnen echte Rippen, auf denen die äussere weiche Körperwand aufruht. Die Mundscheibe

zeigt einen deutlichen Ringmuskel (Röttkens Muskel), der sonst bei Madreporarien noch nicht nachgewiesen ist.

Die einzelnen Polypen von *Stephanaria planipora* sind nicht scharf zu begrenzen. Die Septen sind entocoel und ectocoel, die Tentakel entocoel. (?) Die äussere Körperwand ruht theils auf den Fortsetzungen der Mesenterien, theils auf Echinulationen des Coenenchyms. Die Mesenterien werden zwischen den Kelchen von zahlreichen Synaptikeln durchsetzt.

Pocillopora nobilis stimmt mit *P. brevicornis*, *Seriatopora tenuicornis* n. sp. mit *S. subulata* überein.

Bourne, G. C. (*On the Anatomy of Mussa and Euphyllia and the Morphology of the Madreporarian Skeleton.* — *Quart. Journ. Microscop. Sc.* 28, 1888, p. 21—51, pl. 3, 4) findet, dass bei *Mussa corymbosa* die Septa nicht nach der Sechszahl angeordnet sind. Die Theca wird durch periphere seitliche Verschmelzung der Septen gebildet. Ausserhalb der Kelche ist auf eine gewisse Strecke die „Randplatte“ gut entwickelt, die von peripheren Lamellen, den Fortsetzungen der inneren Mesenterien getragen wird. Richtungsmesenterien fehlen. Die Septen sind alle entocoel. Die Histologie bietet nichts bemerkenswerthes.

Euphyllia glabrescens verhält sich im Wesentlichen wie *Mussa*, aber die Theca enthält besondere tangential gerichtete Verkalkungscentren. Eigenthümlich ist die Verlängerung des Stomodaeums tief ins Innere der Gastralhöhle hinein, wo es sich in ein System von Ectoderm- ausgekleideten Kanälen verzweigt. In diesen (Verdauungs-) Kanälen finden sich Reste vegetabilischer Nahrung, der erste Fall, wo nachgewiesen wird, dass eine Koralle sich von pflanzlichen Stoffen nährt.

Das Fehlen der Richtungsmesenterien bei diesen und anderen Formen (vgl. Fowler) hält Verf. entweder für ein primitives Stadium, oder für eine Folge von der Vermehrung der Kelche durch Theilung.

Er gibt einen Ueberblick über den Stand unserer jetzigen Kenntniss der Anatomie der Steinkorallen und unterscheidet folgende vier anatomische Typen:

1. Richtungsmesenterien fehlen.
2. Richtungsmesenterien vorhanden. Radiale und bilaterale Symmetrie combinirt.
3. Richtungsmesenterien vorhanden. Radiale Symmetrie reduziert, bilaterale deutlich.
4. Eine basale „Pseudotheca“ ist vorhanden. Eine „Randplatte“ fehlt (Flabellum).

Systematik und Faunistik.

Agassiz, A. (*Three Cruises of the Steamer „Blake“*. — *Characteristic Deep-Sea Types: Polyps*. — *Bull. Mus. Compar. Zool.* XV, 1888, p. 142—156, fig. 451—483) stellt die Abbildungen einer Anzahl der bisher bekannt gewordenen amerikanischen Tiefsee-Anthozoen mit kurzem begleitendem Text zusammen.

Lacaze-Duthiers (*Les progrès du laboratoire de Roscoff et du laboratoire Arago*. — *Compt. rend. Acad. sc. Paris.* Bd. 106. 1888. p. 1770—1777) erwähnt ein neues Paralcyonium (*P. edwardsi*) von Banyuls.

Vigulier, C., (*Sur un nouveau type d'Anthozoaire, la Fascicularia radicans*. — *Compt. rend. Acad. sc. Paris.* Bd. 107. 1888. p. 186—187) hat bei Algier eine neue Alcyonarie erbeutet, die er *Fascicularia radicans* nennt, die mit der Gattung *Paralcyonium* einige Aehnlichkeit hat. Er will für dieselbe in der Familie Alcyonidae eine neue (dritte) Unterfamilie, *Fasciculariinae*, errichten, die zwischen die *Cornularinae* und *Alcyoninae* zu stellen ist.

Lacaze-Duthiers (*Compt. rend. Acad. sc. Paris.* Bd. 107. 1888. p. 215) erklärt die von Vigulier beschriebene *Fascicularia radicans* für identisch mit seinem *Paralcyonium edwardsi*.

Vigulier, C. (*Etudes sur les animaux inférieurs de la baie d'Alger. III. Un nouveau type d'Anthozoaire*. — *Arch. Zool. expér. et génér.* (2) VI. 1888. p. 351—373, pl. 19, 20) erkennt die Identität von *Fascicularia radicans* mit *Paralcyonium edwardsi* an, will aber die generische Trennung von *Paralcyonium* aufrecht erhalten, so dass die Form *Fascicularia edwardsi* (Lacaze-Duthiers) heissen muss. Er gibt von derselben eine genaue Beschreibung und eine Reihe von Abbildungen.

Studer, Th. (*On some new Species of the Genus Spongodes from the Philippine Islands and the Japanese Seas*. — *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) I. 1888. p. 69—72) beschreibt aus der Gattung *Spongodes* eine neue Art von den Philippinen und sechs neue Arten von Japan. Den *Sp. ramulosa* Klunzinger aus dem Rothen Meer unterscheidet er als neue Art (*Sp. Klunzingeri*) von *Sp. ramulosa* Gray.

Bell, F. J. (*Description of Xiphigorgia ridleyi*. — *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) II. 1888. p. 176—177, 5 xyl.) beschreibt eine neue Art der Gattung *Xiphigorgia* (*ridleyi*) von St. Thomas (Westindien).

Hertwig, R. (*Report on the Actinaria dredged by H. M. S. Challenger during the years 1873—76. Supplement*. — *Report on the Scient. Res. Voy. H. M. S. Challenger. Zool. Vol. 26. 1888. 4 pl.*) giebt einen Nachtrag zu den Challenger-Actinien. Aus den Familien Corallimorphidae, Actinidae, Bunodidae, Phellidae, Amphianthidae, Ilyanthidae, Sicyonidae, Sphenopidae werden neue Arten beschrieben. Zu den Anthiomorphidae gehört die neue Gattung *Ilyanthopsis*, zu den Liponemidae die neue Gattung *Aulorchis*. Die Zoanthidae, die von Erdmann behandelt wurden, werden aufgeführt: es sind darunter drei neue Arten der Gattung *Epizoanthus*. Eine neue Sphenopus-Art wird beschrieben, ausserdem die neue mit Zweifel zu den Zoantheae gestellte Gattung *Stephanidium*. Ueber einer Reihe schon früher aufgestellter Arten werden Bemerkungen nachgetragen.

Fischer, P. (*Description d'une nouvelle espèce du genre Edwardsia*. — *Bull.*

Soc. Zool. France. Bd. 13. 1888. p. 22–23) beschreibt eine neue Actinie aus der Gattung *Edwardsia* (*E. lucifuga*) von den französischen Küsten (Ins. Bréhat), die von bedeutender Grösse ist und gegen Licht sich sehr empfindlich zeigt.

Fowler, G. H. (*Two new types of Actiniaria. — Quart. Journ. Microscop. Science. Bd. 29. No. 114. Octob. 1888. p. 143–152. pl. 15*) beschreibt zwei neue Actinienformen: *Thaumactis medusoides* nov. gen. nov. sp. und *Phialactis neglecta* nov. gen. nov. sp.; die erstere wird wohl einen eigenen Tribus (*Thaumactiniæ*) bilden müssen, die letztere eine neue Familie der Hexactiniae: *Phialactidae*, vielleicht ist sie aber auch zu den *Corallimorphidae* zu rechnen.

Thaumactis bietet folgende ganz auffälligen Merkmale dar. Der Körper ist etwa linsenförmig (biconvex). Ausser echten Tentakeln existiren „Pseudotentakel“, unregelmässig zerstreut auf der Oberseite stehend. Sie bilden sich als Ausstülpungen der Körperwand und sind an der Basis verbreitert („roots“) mit einem fingerartigen Fortsatz. Die Basis trägt Nematocysten, der Fortsatz nicht. Eine Siphonoglyphe ist nicht zu erkennen. Die Körperwand besitzt ein entodermales Lager von concentrischen (Ring-) Muskeln und ein ectodermales Lager von radialen (Längs-) Muskeln. Ein Paar Richtungssepten ist vorhanden. Geschlechtsorgane wurden nicht gefunden.

Phialactis hat eine becherförmige Gestalt, welche dadurch entsteht, dass die Randtheile der Mundscheibe sich auswärts und aufwärts verbreitern. Die Tentakel werden auf der Innenseite des Bechers durch „*Sphaeridia*“ ersetzt, das sind unregelmässig gestellte, ampullenförmige Körper, die mit Mesenterialkammern communiciren. Ihre Oberfläche besteht aus einfachem Epithel, ohne Nematocysten. Eine besondere Musculatur ist nicht erkennbar, ebensowenig eine terminale Oeffnung.

Ortmann, A. (*Studien über Systematik und geographische Verbreitung der Steinkorallen. — Zool. Jahrb. III. 2. 1888, p. 143–188, Pl. 6*) führt die im Strassburger Museum vorhandenen Steinkorallen auf und schliesst daran Betrachtungen über die geographische Verbreitung verschiedener Gattungen. Er theilt den tropischen Korallgürtel in zwei Hauptgebiete; das indo-pacifische und das ost-amerikanische und führt die Trennung beider Faunen auf die Entstehung einer Landverbindung zwischen Nord- und Südamerika zur Alttertiärzeit zurück.

Marenzeller, E. v. (*Ueber einige japanische Turbinoliiden. — Annal. k. k. naturh. Hofmus. Bd. 3, 1888, p. 15–22*) beschreibt folgende Turbinoliden aus Japan: *Caryophyllia japonica* n. sp., *Heterocyathus japonicus* = *Stephanoseris japonica* Verrill. (bei letzterer wird auf den Commensualismus mit Würmern näher eingegangen), ferner: *Stephanotrochus spiniger* n. sp., *Cyathoceras rubescens* Moseley.

Palaeontologie.

Thomson, J. (*On a new Species of Diphyphyllum, and on a remarkable form of the Genus Lithostrotion. — Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II. 1888, p. 317–323, xyl. 1–3*) beschreibt eine neue *Diphyphyllum*-Art, die in erratischen Blöcken in Argyllshire gefunden wurde (*D. argyllii*), und welche Beziehungen zur Gattung

Thysanophyllum zeigt. Ferner beschreibt er ein neues Lithostrotion (*paradoxicum*) aus dem Unt. Carbon von Dumfriesshire. Die Umgrenzung der Gattungen *Diphyphyllum* und *Lithostrotion*, sowie ihre Verwandtschaftsbeziehungen werden erörtert.

Duncan, P. M. (*On Glyphastraea sexradiata* Lonsdale. — *Annal. Mag. Nat. Hist.* (6) I. p. 160) konnte an einem Lonsdale'schen Original nachweisen, dass *Columnaria sexradiata* Lonsd. mit *Glyphastraea* (*Septastraea*) *forbesi* M. E. et H. identisch ist, und dass die Art den Namen *Glyphastraea sexradiata* (Lonsd.) führen muss.

Hinde, G. J. (*On the History and Characters of the Genus Septastraea, and the Identity of its Type Species with that of Glyphastraea.* — *Ann. Mag. Nat. Hist.* (6) I.) will, während Duncan für die miocene *Septastraea forbesi* M. E. et H. die Gattung *Glyphastraea* aufgestellt hat und in die Gattung *Septastraea* später beschriebene jurassische Korallen bringt, den Gattungsnamen *Septastraea* für die ältere, typische Art (*forbesi*) beibehalten wissen.

Koby, F. (*Monographie des Polypiers Jurassiques de la Suisse. 8. part. — Abhandl. Schweiz. palaeont. Gesellsch. Bd. 15, 1888, p. 401–456, pl. 109–120*) setzt die Beschreibung der schweizer jurassischen Korallen fort. Von der Gattung *Microsolena* werden 4 neue Arten beschrieben, von *Comoseris* drei Arten, von *Maeandראה* drei Arten, davon eine neu, von *Thamnaraea* vier Arten, davon zwei neu. Es folgen die Perforaten mit der neuen Gattung *Microsmilia* mit drei Arten, davon eine neu.

Zu den Rugosen rechnet er eine ganze Reihe von Formen, die zur Familie der *Cyathophyllidae* gehören. Es sind dies: *Cheilosmilia* nov. gen. mit einer Art, *Lingulosmilia* nov. gen. mit 4 Arten, *Sclerosmilia* nov. gen. mit 2 Arten, *Pseudothecosmilia* nov. gen. mit 3 Arten, *Thecidiosmilia* nov. gen. mit einer Art, *Amphiastraea* Etallon mit 2 Arten, *Schizosmilia* nov. gen. mit 3 Arten. Alle Arten der Rugosen, mit Ausnahme einer Art von *Amphiastraea* sind neu.

Im Supplement werden beschrieben: 7 Arten, darunter 3 neue (nebst einer unbenannten) der Gattung *Epismilia*, 6 neue Arten der Gattung *Pleurosmilia*, 4 Arten, davon 3 neue der Gattung *Rhipidogyra*, eine neue Art der Gattung *Pachygyra* und je eine Art der Gattungen *Codonosmilia* und *Aplosmilia*.

Biologie.

Sluiter, C. Ph. (*Ein merkwürdiger Fall von Mutualismus.* — *Zoolog. Anzeig. 11. Jahrg. 1888, p. 240–243*) hat bei Batavia auf gewissen Actinien zwischen den Tentakeln kleine Fische aus der Gattung *Trachichtys* herum schwimmend gefunden, die diesen ihren Aufenthaltsort nur selten und auf kurze Zeit verlassen und bei jeder Gefahr sich wieder zwischen den Tentakeln verbergen. Es beruht dieses Zusammenleben auf Gegenseitigkeit, indem einmal die Fische von der Actinie Schutz und z. Th. auch Nahrung, in Gestalt der Excremente derselben, erhalten, andererseits durch das Herumschwimmen der Fische zwischen den Tentakeln für einen Wasserwechsel gesorgt wird, der der Actinie zu Gute kommt. Gelegentlich wird auch durch die Fische Beute herbeigeschleppt, welche die Actinie sonst nicht erlangen könnte.

Haddon, A. C. (*On larval Actiniaee parasitic on Hydromedusae at St. Andrews.* — *Annal. Mag. Nat. Hist.* (6) II. 1888. p. 256—259. 5 xyl.) beschreibt Larven von Actinien, die auf Leptomedusen ectoparasitisch leben, und die er für Larven von *Peachia hastata* hält, die jedoch auch Aehnlichkeit mit *Halcampa* zeigen.

Riffbildung.

Agassiz, A. (*Three Cruises of the Stamer „Blake“.* — *The Florida Reefs.* — *Bull. Mus. Compar. Zool.* XIV, 1888, p. 52—92, Fig. 34—53) giebt eine Zusammenfassung der von ihm schon in früheren Arbeiten veröffentlichten Resultate über die Verhältnisse der Riffbildung an der Küste von Florida. Auch die schon früher publicirten Illustrationen werden wieder zusammengestellt.

Walther, J. (*Die Korallenriffe der Sinaihalbinsel.* — *Abhandl. K. sächs. Ges. Wiss.* Bd. 4, No. 10, 1888, p. 439—505, 8 pl., 34 zink.) unterscheidet auf der Sinaihalbinsel drei Riffe: ein älteres fossiles, ein jüngeres fossiles und das lebende Riff. Das erste ist stark gehoben und gehört dem Miocän oder Pliocän an (genauere Altersbestimmung liess sich nicht ausführen). Das jüngere fossile Riff ist nur wenig über die jetzige Meeresfläche erhoben, pleistocänen Alters, und scheint nur wenig von dem lebenden Riffe verschieden zu sein. Offenbar sind beide durch eine negative Strandverschiebung über die Oberfläche des Meeres gelangt. Die lebenden Riffe theilt Verf. in Saumriffe, dicht an der Küste, und Pelagische Riffe, weiter im Meer draussen.

Die Mächtigkeit dieser Riffe ist nur gering. Sie liegen fast durchweg auf den Schichtenköpfen fester Sediment-Gesteine auf, und Verf. schliesst daraus, dass ein felsiger Untergrund Vorbedingung für eine Riffbildung sei. Das feste Riffgestein setzt sich nicht nur aus in loco gewachsenen Korallen zusammen, sondern eine wesentliche Rolle spielt hierbei ein detritogenes Füllmaterial, welches theils von den zerbrechlicheren Korallenarten (*Madrepora*), theils von Kalkalgen, theils von anderen kalkabscheidenden Organismen geliefert wird. Eine wichtige Rolle als Zerkleinerer organischer Reste sollen hierbei die scheerentragenden Krebse spielen.

Faurot, L. (*Une mission dans la Mer Rouge [île de Kamarane] et dans le Golfe d'Aden.* — *Arch. Zool. Exper. et Gén.* (2) VI, 1888, p. 117—133, 2 xyl.) hat die Riffe der Insel Kamaran im südlichen Rothen Meer und bei Obock im Golf von Aden untersucht. Er giebt eine Liste der an beiden Lokalitäten gesammelten Arten von Steinkorallen, unter denen sich auch einige subfossile befinden, die mit den lebenden meist identisch sind.

An den Strandriffen beider Orte hat er beobachtet, dass der äussere (seewärts gelegene) Theil etwas stärker sich erhebt. Auf diesem Randwall sind die Korallen am häufigsten und wachsen dichtgedrängt. Theilweis werden sie bei Niedrigwasser völlig entblösst. Gegen den Strand zu verschwinden die lebenden Korallen allmählich.

Verf. bezweifelt, dass der Randwall durch Aufschüttung von Trümmern entstanden sei, auch ein lebhafteres Wachsen der Korallen in die Höhe hält er an dieser Stelle für unwahrscheinlich. Dagegen glaubt er, dass der dichte Mantel lebender Korallen diesen Randwall gegen die zerstörende Wirkung der Brandung schützt, während weiter gegen das Land zu, wo die lebenden Korallen sparsamer sind, das Riff von den Wogen leichter zerstört wird.

Ueber die Vertheilung der Korallformen auf dem Riff spricht er die Vermuthung aus, dass letztere nur von der Art des Wachstums der einzelnen Arten abhängt: die feiner verästelten Formen suchen tieferes, ruhigeres Wasser auf, die massigen kommen weiter oben vor.

Wharton, W. J. L. (*Coral-formations*. — *Nature*, Bd. 37, 1888, p. 393—395, 1 xyl.) glaubt, dass man für die Erklärung der Entstehung der Lagunen und Kanäle bei Atollen und Barriereriffen nicht die Theorie Murray's nöthig habe, die annimmt, dass diese Gebilde durch Auflösung des Riffkalkes durch das Meerwasser gebildet werden. Er führt drei Korallriffe aus der China-See an, die schon Atollform haben, trotzdem dass sie die Meeresoberfläche noch nicht erreicht haben. Er glaubt, dass schon in einiger Tiefe an der Peripherie der Riffe ein stärkeres Wachstum eintritt, dass dagegen die mittleren Theile zurückbleiben: und zwar ist der Faktor, der ein derartiges Wachstum bedingt, die ergiebigere Nahrungszufuhr durch die Strömungen an den peripheren Theilen des Riffes, welche letztere den mittleren die Nahrung gewissermaassen wegnehmen.

Murray, J. (*Coral-formations*. — *Nature*, Bd. 37, 1888, p. 414) hält gegenüber Wharton daran fest, dass — ausser den günstigeren Ernährungsbedingungen an der Peripherie eines Korallriffes — die Auflösung des Kalkes im Meerwasser bei der Bildung von Atollen eine Rolle spielt. Lokale Verhältnisse spielen bei jedem Riff mit, doch sind jene beiden Hauptfaktoren überall zu konstatiren, wenn auch die Auflösung des Kalkes oft auf andere Weise (z. B. durch Wachstum von Kalkalgen etc.) paralysirt werden mag.

Bourne, G. C. (*Coral-formations*. — *Nature*, Bd. 37, 1888, p. 414—415) hält, wie Wharton, die Theorie der Auflösung des Kalkes für nicht genügend, die Lagunen der Atolle zu erklären. Er glaubt aber auch nicht, dass das periphere Wachstum von der reichlicheren Nahrungszufuhr an der Peripherie abhängt, da er in der Lagune von Diego Garcia (Chagos Bank) lebende Korallen beobachtete. Dagegen hält er die Wirkung der Strömungen auf das Korallenwachstum für besonders wichtig. Korallen gedeihen schlecht in sehr stark bewegter See, ebenso in ganz stillem Wasser, dagegen gut in mittelmässig bewegtem Medium. An den äusseren Riffkanten wird die Gewalt der Strömungen durch das von unten am Korall-abhang sich hinaufdrängende Wasser gebrochen, so dass die grösste Wucht der Strömung seitlich vorbeigleitet. Auf diese Weise wird

an der äusseren Peripherie des Rifles eine mittelmässige Wasserbewegung erzielt, die das Korallwachsthum begünstigt.

Murray, J. (*Coral-formations. — Nature, Bd. 37, 1888, p. 438*) kommt auf die letztere Bemerkung Bourne's zu sprechen und meint, dass gerade diejenigen Strömungen, von denen Bourne spricht, den Korallen die Nahrung zuführen und so ihr Wachsthum begünstigen.

Guppy, H. B. (*Coral-formations. — Nature, Bd. 37, 1888, p. 462*) hält die meisten der bisher für die Riffbildung aufgestellten Faktoren, die von den Autoren aufgeführt werden, für thatsächlich wirkende, die in mannigfachen Combinationen auftreten und sich z. Th. die Waage halten. Weitere Untersuchungen müssen für jeden Fall die Wirksamkeit derselben im Einzelnen und in ihrem gegenseitigen Verhältniss feststellen.

Reade, T. M. (*Coral-formations. — Nature, Bd. 37, 1888, p. 488*) macht darauf aufmerksam, dass, wenn man einerseits für die Entstehung der Lagunen die Solutionstheorie annimmt, man denselben Vorgang auch bei der Erhöhung von unterseeischen Plateau's durch Ablagerung von Kalk-Detritus (wie sie Murray behauptet hat) in Rechnung ziehen müsse. Er glaubt aber nicht, dass diese Ablagerungen der Lösung die Waage halten können.

Irvine, R. (*Coral-formations. — Nature, Bd. 37, 1888, p. 509*) bemerkt zur Notiz von Reade, dass über die Mächtigkeit der Kalkablagerungen auf unterseeischen Erhebungen und über ihr Verhältniss zur auflösenden Kraft des Seewassers noch gar Nichts bekannt ist.

Irvine, R. (*Coral-formations. — Nature, Bd. 37, 1888, p. 461 bis 462*) hat Versuche über die Löslichkeit von Korallkalk in Seewasser angestellt und durch Rechnung gefunden, dass auf einem Riff mit einer Lagune von $\frac{1}{2}$ Meile Durchmesser, die von 3 Fuss Wasser bedeckt ist, von dem $\frac{1}{6}$ mit dem toten Korallkalk in Berührung ist, und das immer wieder erneuert wird, 3000 Tons Kalk im Jahre gelöst werden können.

Ross, J. G. (*Coral-formations. — Nature, Bd. 37, 1888, p. 462*) berechnet die Löslichkeit des Kalkes in Seewasser für eine Lagune von 4 Meilen Durchmesser in 20 Tagen auf 464, im Jahre auf 8472 Tons, das ist eine Kalkschicht von $\frac{1}{2}$ Zoll auf der ganzen Fläche der Lagune.

Reade, T. M. (*Coral-formations. — Nature, Vol. 37, 1888, p. 535*) hat die Berechnung von Ross geprüft und gefunden, dass anstatt $\frac{1}{2}$ Zoll, nur $\frac{1}{252}$ Zoll Kalk von der Fläche der Lagune im Jahre gelöst wird. Demnach würde eine Million Jahre dazu gehören, um eine Lagune von 60 Fad. Tiefe auszutiefen.

Was die Erhöhung unterseeischer Erhebungen betrifft, so hat er berechnet — unter Zugrundelegung von Murray's Angaben über das pelagische Leben —, dass, unter der Voraussetzung, dass die pelagischen Organismen einen Tag leben, und dass ihre Kalktheile

nicht gelöst werden, und sie sich auf eine submarine Erhöhung aufschichten, 29 Jahre dazu gehören, um einen Zoll zu dieser Erhöhung hinzuzufügen. Ein submariner Berg, der eine halbe Meile unterhalb der für das Korallenwachsthum günstigen Zone liegt, wird diese letztere in 900 000 Jahren erreichen.

Ross, J. G. (*Coral-formations*. — *Nature*, Vol. 37, 1888, p. 584 — 585) macht darauf aufmerksam, dass mit der Berechnung Reade's für die Ablagerungen noch nicht die Frage gelöst ist, ob diese Ablagerungen stärker sind als die Lösung durch das Seewasser. Ueberhaupt sind die bekannten Zahlen, die solchen Berechnungen zu Grunde liegen müssen, noch viel zu gering.

Irvine, R. (*Coral-formations*. — *Nature*, Bd. 37, 1888, p. 605) giebt eine Tabelle der Löslichkeit einiger Korallarten und Korallbildungen.

Bourne, G. C. (*The Atoll of Diego Garcia and the Coral-Formations of the Indian Ocean*. — *Proceed. Roy. Soc. London*, Vol. 43, 1888, p. 440—461, pl. 1 und *Nature*, Bd. 37, 1888, p. 546 — 550) hat Diego Garcia (eine Insel der Chagos Gruppe) untersucht. Dieselbe ist ein typisches Atoll. Es wird gebildet von einem annähernd ringförmigen schmalen Streifen Land, der nicht mehr als 30 Fuss sich erhebt, und der eine Lagune einschliesst, die bis 19 Faden tief ist. Nach Aussen finden sich in geringer Entfernung Tiefen von weit über 100 Faden.

Das feste Land besteht theils aus kahlem Korallfels mit zerstreuten Blöcken („boulders“), theils aus Kalksand. Seewärts ist das Land höher als gegen die Lagune zu. Auf der Seeseite liegt lebendes Riff vor, das bei Springebbe vom Wasser entblösst wird.

Verf. unterscheidet 4 Arten von Korallbildungen: reef rock, boulder rock, shingle rock, sand rock. Die drei ersteren sind durch die Meereswogen, die letztere durch den Wind gebildet. Reef rock besteht aus Korallbruchstücken, die mit Kalk infiltrirt und zu einer kompakten Masse verkittet sind. Boulder rock besteht aus grossen Blöcken, die von den Wogen ausgeworfen werden, und deren Lücken von Detritus ausgefüllt und verkittet werden. Shingle rock sind kleine Korallbruchstücke, vermischt mit Resten von Mollusken, Crustaceen, Echinodermen u. s. w., von festerer oder lockerer Struktur. Alle diese drei Ablagerungen sind von den Wellen über die Meeresfläche emporgespült. Der sand rock ist vom Winde aufgeschüttet. Jedoch sind Anzeichen einer geringen negativen Strandverschiebung vorhanden.

In der Lagune finden sich ebenfalls lebende Korallen, meist fein verzweigte Madreporen. Diese Ansiedelungen wechseln sehr, da die Strömungen im Innern der Lagune nicht konstant sind und bald hier, bald dort Sand ablagern, der das Korallenwachsthum unterdrückt.

Verf. ist der Ansicht, dass der ganze Charakter der Chagos-Gruppe gegen eine Entstehung in einer Senkungsperiode spricht. Das ringförmige Wachsthum der Korallen hängt wesentlich von einer

mittleren Stärke der Strömung ab, die eine Ablagerung von Detritus eben noch verhindert. Solche Bedingungen finden sich gerade an der Peripherie des Riffes. Durch Stürme kann diese letztere (durch Aufschüttung) soweit erhöht werden, dass sie über den Meeresspiegel hervortritt. Die Annahme, dass die Lagune durch Lösung des Kalkes ausgetieft wird, braucht nicht gemacht zu werden, da sich ihre Bildung schon allein durch das periphere Wachsthum erklären lässt.

Guppy, H. B. (*Coral-formations*. — *Nature* Bd. 37, 1848, p. 604) hat in den Ausführungen Bourne's noch einige zweifelhafte Punkte gefunden, besonders ist ihm nicht klar geworden, ob Bourne mit den Grundgedanken von Murray's Theorie (abgesehen vom Agens der Solution) übereinstimmt.

Wilson-Barker, D. (*Coral-formations*. — *Nature* Bd. 37, 1888, p. 604—605) macht einige Angaben über die Riffe von Massaua am Rothen Meer.

Kroll's Buchdruckerei, Berlin S.

— Ausgegeben im Oktober 1891. —

60747.
ARCHIV
FÜR
NATURGESCHICHTE.

GEGRÜNDET VON A. F. A. WIEGMANN,

FORTGESETZT VON

W. F. ERICHSON, F. H. TROSCHEL
UND E. VON MARTENS.

HERAUSGEGEBEN

VON

Dr. F. HILGENDORF,

LEHRER DES K. KÖNIGLICHEN MUSEUMS IN BERLIN

FÜNFUNDFÜNFZIGSTER JAHRGANG.

II. BAND, I. HEFT.

Berlin 1889.

NICOLAISCHE VERLAGS-BUCHHANDLUNG

II. VERLAGS-STRASSE.

Jeder Jahrgang besteht aus 9 Bänden zu je 3 Heften.

Digitized by Google

Inhalt des ersten Bandes.

Erstes Heft.

	Seite
<i>Dr. Ernst Schöff.</i> Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Säugetiere während des Jahres 1888	1
<i>Ant. Reichenow.</i> Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel während des Jahres 1888	102
<i>Dr. Oskar Boettger.</i> Bericht über die Leistungen in der Herpetologie während des Jahres 1888	163
<i>Dr. F. Hilgendorf.</i> Bericht über die Leistungen in der Ichthyologie während des Jahres 1887	273
<i>Dr. Joh. Thiele und Dr. W. Kobelt.</i> Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Malakologie während des Jahres 1888. .	378

Ausgegeben im September 1889.

52. 1889

ARCHIV
der
NATURGESCHICHTE.

HERAUSGEGEBEN VON A. F. A. WIEGMANN.

HERAUSGEGEBEN VON

W. F. RICHSON, E. H. TROSCHEL
UND E. VON MARTENS.

HERAUSGEGEBEN

VON

Dr. F. HILGENDORF.

VERLAG VON E. VON MARTENS IN BREMEN.

FÜNFUNDZWINGSTEN JAHRGANG.

II. BAND. 2. HEFT.

Breslau, 1889.

VERLAG VON E. VON MARTENS IN BREMEN.

1889. Jahrgang besteht aus 2 Bänden zu je 2 Heften.

Digitized by Google

Inhalt des zweiten Bandes.

Zweites Heft.

	Seite
<i>Dr. Ph. Bertkau.</i> Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie während des Jahres 1888	1
<i>Dr. G. Herbert Fowler.</i> Bericht über die Leistungen in der Carcinologie während des Jahres 1887 (Uebersetzung v. Dr. F. Hilgendorf.) . .	265

Diesem Hefte liegt ein Katalog
der Herren **Jules Peilmann & Cie.** in **Paris** bei.

— Ausgegeben im September 1892. —

1892
6744/

ARCHIV FÜR NATURGESCHICHTE.

GEGRÜNDET VON A. F. A. WIEGMANN.

FORTGESETZT VON

W. F. ERICHSON, F. H. TROSCHEL
UND E. VON MARTENS.

HERAUSGEGEBEN

VON

Dr. P. HILGENDORF,

ORDENTL. DEK. Z. ZOOLOG. MUSEUMS ZU BERLIN.

FÜNFUNDFÜNFZIGSTER JAHRGANG.

II. BAND. 2. HEFT.

Berlin 1892.

NICOLAISCHES VERLAGS-BUCHHANDLUNG
H. FRIEDRICH.

Jeder Jahrgang besteht aus 2 Bänden zu je 2 Heften.

Inhalt des zweiten Bandes.

Drittes Heft.

	Seite
<i>Prof. Dr. M. Braun.</i> Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der freilebenden Würmer während des Jahres 1888	1
<i>Dr. von Linstow.</i> Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Helminthen im Jahre 1888	46
<i>Dr. W. Michaelsen.</i> Jahresbericht über die Bryozoën für 1888	93
<i>Dr. A. Collin.</i> Bericht über die Brachiopodenliteratur des Jahres 1888 .	108
<i>Dr. Maximilian Meissner.</i> Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Echinodermen im Jahre 1888	111
<i>Dr. E. Vanhöffen.</i> Jahresbericht für 1888 über die Coelenteraten mit Ausschluss der Spongien und Anthozoen	135
<i>Dr. A. Ortmann.</i> Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Anthozoen während des Jahres 1888	167
Bemerkung. Rotiferen für 1888 siehe im vorigen Jahrgang. Tunicaten, Spongien und Protozoen für 1888 folgen im nächsten Jahrgang.	



3 2044 093 326 791

